CATALOGUS HYMENOPTERORUM

hucusque descriptorum

systematicus et synonymicus

Auctore

Dr. C. G. DE DALLA TORRE
Professore Oenipontano.

Volumen III:

Trigonalidae, Megalyridae, Stephanidae, Ichneumonidae, Agriotypidae, Evaniidae, Pelecinidae.

LIPSIAE
Sumptibus Guilelmi Engelmann
MDCCCCI/MDCCCCII.

Abgeschlossen mit Vol. XXXVII (1900) des Zoological Record und Jahrg. XXIII (1900) des Zoologischen Anzeigers.

Signatur 1—34 (p. 1—544) erschien 1901, Signatur 35—72 (p. 545—1141) erschien 1902.

VORWORT.

Indem ich hiermit das Werk einer fast 20jährigen Thätigkeit der Öffentlichkeit übergebe, scheint mir mehr als ein Grund dafür zu sprechen, dasselbe mit einigen erläuternden Worten einzuleiten.

Das vorliegende Werk, „Catalogus Hymenopterorum hucusque descriptorum systematicus et synonymicus" hat den Zweck, zum ersten Male einen alle (bis zum Schlusse des Jahres 1890) bekannt gewordenen Hymenopteren-Arten aller Länder enthaltenden Catalog dem sich dafür Interessirenden zu bieten, und hat gewissermaßen einen Vorläufer, ja Doppelgänger in dem von Br. E. Harold und Dr. E. Gemminger herausgegebenen „Catalogus Coleopterorum", der zur vorliegenden Arbeit auch die Anregung gegeben hat. Mit ihm hat er außer dem Zwecke, ein Bild des gegenwärtigen Wissensstandes dieser Tiergruppe zu bieten, auch die systematisch-alphabetische Anlage, die Citate und die Angaben über die geographische Verbreitung mutatis mutandis gemeinsam — und doch unterscheidet er sich von demselben in einigen ganz wesentlichen Punkten, ich glaube zu seinen Gunsten.

Ein solcher Hauptunterschied liegt darin, dass in dem „Münchener Cataloge" gewisse Gattungen bloß nach den vorhandenen Monographien behandelt, resp. verzeichnet wurden, während in der vorliegenden Arbeit ausnahmslos aus erster Quelle geschöpft und somit Citat für Citat selbst verglichen wurde. Liegt nun hierin schon eine sehr wertvolle Garantie für die Richtigkeit der Citate, so wächst der Wert dieser selbständigen Forschungs- und Studienmethode noch mehr durch die dadurch erzielte Consequenz bezüglich der Nomenclatur. Ein weiterer wesentlicher Unterschied liegt darin, dass in den aufgeführten Citaten keinerlei Auswahl erfolgte; es sind vielmehr alle Beschreibungen, alle biologischen, anatomischen und physiologischen Angaben, alle Abbildungen mit und ohne Metamorphose, sowie alle Versetzungen in verschiedene Genera ersichtlich

gemacht, wodurch der wissenschaftliche Apparat zwar größer und complicirter, zugleich aber auch bis incl. 1890 abgeschlossen erscheint; der kleine Mangel, dass da und dort, wo es sich um eine ältere namentlich vorlinnéische Angabe handelt, das eine oder andere Citat vielleicht etwas unsicher geworden ist, steht wohl in keinem Verhältnisse zu dem klaren Bilde, welches man in Bezug auf die Geschichte der Kenntnisnahme derselben erhält. — Ein weiterer Unterschied endlich liegt in der formalen Ausführung des Werkes, in der Art der Citate und ihrer Wiedergabe, in den geographischen Verbreitungsangaben, in der Aufnahme der fossilen Arten, und in der Aufnahme der Nahrungspflanzen bei den Phytophagen und der Nahrungstiere bei den parasitischen Arten, wodurch das Werk ein sehr wertvolles Nachschlagebuch über den heutigen Wissensstand geworden ist, wie ein ähnliches nicht existirt. Auch die Beigabe der gesamten hymenopterologischen Literatur möge als ein weiterer wertvoller Unterschied zu Gunsten dieser Arbeit angesehen werden.

Haben wir damit gewissermaßen von oben her das vorliegende Werk in seiner Grundanlage kennen gelernt, so erscheint es immerhin noch nötig, auch auf die Einzelheiten desselben einzugehen, und ich beginne hierbei mit dem Literaturschatze der Hymenopteren. Es erscheint auf den ersten Blick, namentlich in Rücksicht auf die grundlegende Arbeit Dr. A. Hagen's und auf eine vor einem Decennium erschienene Arbeit A. Mocsáry's, sowie auf die beiden erscheinenden Jahresberichte (im Archiv für Naturgeschichte Bd. II. und im Zoological Record) und Carus-Engelmann und Taschenberg's Bibliotheca zoologica (Leipzig, Engelmann 1887 ff.) ein nicht sehr schwieriges, vielleicht sogar ein überflüssiges Unternehmen, eine derartige Zusammenstellung zu veröffentlichen. Ein vergleichender Blick auf alle diese Publikationen im Zusammenhalte mit dieser meiner Bibliographie genügt wohl vollständig, die Existenzberechtigung derselben vollauf anzuerkennen. Die wenigen nicht persönlich verglichenen Aufsätze sind mit einem Sternchen (*) bezeichnet; Auszüge, Übersetzungen und Kritiken sind stets beim Originale aufgeführt; im Übrigen erleichtern zahlreiche Hinweise den Gebrauch und ergänzen die Citate gegeneinander. Eine schwierige Frage war die Bestimmung der Grenzlinie zwischen den rein wissenschaftlichen, den sog. populärwissenschaftlichen und den rein populären Zeitschriften und Vereinsorganen; ich habe alle in den Jahresberichten aufgeführten Aufsätze verglichen, doch prinzipiell die beiden letzteren Kategorieen von Journalen auf die hymenopterologischen Artikel nicht durchgesehen. Ebenso glaubte ich die rein forst- und landwirtschaftlichen, sowie die

Jagdzeitungen und endlich die russischen und ungarischen Zeitschriften (ohne Revue) mit Ausnahme der rein zoologischen resp. rein entomologischen, dann die Bienenliteratur, sowie die biologische (Blumen und Insekten), forstliche und cecidologische Literatur (Gallen) so kurz als thunlich behandeln zu sollen.

Was den Catalog selbst anlangt, so muss ich vor Allem hervorheben, dass derselbe lediglich nur die Aufgabe hat, den Wissensstand der bis heute beschriebenen Hymenopteren-Arten zu bieten. Selbst beim besten Willen und beim objectivsten Studium war es nur in wenigen Fällen möglich und statthaft, für diesen Zweck zunächst Kritik zu üben und dadurch gewissermaßen einer Monographie vorzugreifen. Wo es aber nötig erschien, trotzdem kritische Bemerkungen zu machen, erschien es mir zweckdienlich, dieselben separat unter dem Titel „Hymenopterologische Notizen" in der Wiener entomologischen Zeitung klarzulegen. Für die richtige Begrenzung der Gattungen, Rassen (stirps) und Arten, für die Stellung derselben im Systeme, für die richtige Einordnung gewisser Arten in eine bestimmte Gattung, für die Auslassung oder Zuziehung gewisser Synonyma u. s. w. darf und muss ich die vor mir arbeitenden Forscher verantwortlich machen, denn für gewisse Fragen entziehen sich deren Beschreibungen und Abbildungen ebenso, wie deren „Typen" unzugänglich oder unzulänglich sind. Dass man aber trotzdem die Arbeiten der älteren Autoren (Linné, Fabricius, Schrank u. s. w.) und die mit ihnen zusammenhängende Tradition etwas freier beurteilen muss, als jene der neueren, steht mir fest, um so mehr, als ja sonst die ganze Arbeitsleistung der „Väter der Entomologie" in tausende von Zweifeln und schließlich in Nichts zusammensinken würde. Die Familien, Subfamilien und Genera sind systematisch und zwar in aufsteigender Reihenfolge angeordnet; bei den Tenthrediniden mit Cimbex beginnend, steigen sie, soweit dieser Ausdruck benützt werden darf, zu den Apiden resp. zur Gattung Apis hinan; die neu aufgestellten Genera wurden nach Thunlichkeit conform den dort gemachten Angaben eingereiht; wo aber in der Originalbeschreibung Angaben über ihre Stellung fehlen, dürfte freilich manchesmal ohne Verschulden ein Verstoß in der Einreihung untergelaufen sein.

Die Genera wurden nach dem Prioritätsgesetz in der Weise gestellt, dass ein im Gesamtgebiete der Zoologie einmal vorkommender angewandter Name jede zweite Anwendung ausschließt; anderseits aber reicht jede, auch die geringste Formverschiedenheit des Namens im An- oder Auslaute hin, den ähnlichlautenden Genusnamen benutzbar zu machen. Auf den Genusnamen, der, wo nötig, ausnahmslos etymologisch richtig

gestellt wurde, was auch stets bemerkt ist (z. B. bei Eriades), folgt das Citat der ersten Anwendung derselben, wobei freilich auf dessen Originalumfang keine Rücksicht genommen werden konnte. Ein zweites Citat gibt, wenn nötig, den Autor des heutigen Gattungsumfanges: Was Alles verstand Linné, um nur ein Beispiel zu bringen, unter seiner Gattung Apis, die heute doch nur einen ganz kleinen Formenkreis umschließt! Weiter folgt dann fast ausnahmlos die etymologische Ableitung, und ich benütze mit Freuden diese Gelegenheit, um meinem Freunde, Prof. M. Hechfellner, hier den herzlichsten Dank zu erstatten für die collegiale Teilnahme, mit welcher derselbe meine diesbezüglichen Notizen revidirte und mehrfach corrigirte; einige Namen mussten freilich trotz alledem unaufgeklärt bleiben. Da es mir im Allgemeinen richtiger scheint, den Genusbegriff eher im weiteren als im engeren Umfange aufzufassen, so erscheinen als Erläuterungen desselben die Synonyma, sowie die Subgenera, und nur dort, wo neue Monographieen einzelner Gruppen vorlagen, welche einer weiten Gattungstrennung huldigen, machte auch ich von diesem meinem Principe eine Ausnahme, dem Auctor allein die Verantwortung überlassend. Endlich folgen noch jene Gattungsnamen, unter denen die heute einer Gattung substituirten Arten im Laufe der Zeit beschrieben wurden, mit Angabe der betreffenden Auctoren; da dieselben Namen meist an anderer Stelle als noch in Verwendung stehend aufgeführt sind, wurde daselbst von der Anführung der Citate und der etymologischen Ableitung Umgang genommen, um nicht das Werk durch verhältnismäßig wenig wichtige Angaben all zu sehr zu vergrößern und zu belasten.

Innerhalb der einzelnen Gattungen folgt das alphabetische Verzeichnis der Arten. Hat bereits schon Br. Harold nachgewiesen, dass bei dessen Catalogus Coleopterorum von einer systematischen Anordnung abgesehen und nur die alphabetische Anordnung gewählt werden musste, so sind alle dort aufgeführten Gründe für diesen Vorgang noch viel zutreffender für die Hymenopteren, bei denen die Anzahl unsicher und unzureichend beschriebener Formen bedeutend größer ist, als bei den Coleopteren. Natürlich sind auch diese mangelhaft beschriebenen der alphabetischen Aufzählung einverleibt; um sie aber sofort als der Erklärung und Erläuterung bedürftig zu kennzeichnen, ist denselben ein Rufzeichen (!) beigesetzt, und es mögen daher künftige Forscher diesen Namen, Beschreibungen und Exemplaren ihre besondere Aufmerksamkeit zuwenden oder sie endlich endgiltig ausscheiden. Wo es thunlich erschien, wurden auch die Species-Namen etymologisch richtig gestellt; es sind dies zwar nur wenige Fälle, doch erscheint dies geradezu eine Forderung des wissen-

schaftlichen Anstandes. So ist es z. B. wissenschaftlich gewiss nicht gerechtfertigt, wenn jeder Elementarlateiner befähigt und — berechtigt ist, Wörter, wie laevis, coelestis, sylvaticus zu corrigiren, ohne dass man in wissenschaftlichen Kreisen je davon Notiz genommen hat, und ähnlich verhält es sich auch mit den Geschlechtsendungen, wo auch alle erdenklichen grammatikalischen Fehler gemacht und fortwährend colportirt werden. Möge diese Anregung wenigstens auf dem Gebiete der Hymenopterologie nachhaltig einwirken! Ich habe auch für diese formale Seite der Arbeit keine Mühe gescheut und tausende von lexicographischen Angaben verglichen. Auf diese endgiltig nach dem Prioritätsgesetz fixirten Namen folgt die Angabe, welche Sexualformen bis jetzt beschrieben sind, wobei natürlich ab und zu noch Männchen und Weibchen einer und derselben Art unter verschiedenen Namen erscheinen, weil deren sexuelle Zusammengehörigkeit bis jetzt noch nicht erkannt worden ist. Bei den Tenthrediniden und Siriciden, bei welch beiden Familien die Aufzucht der Larven einen wichtigen Zweig des biologischen Studiums bildet, wurde durch ein Ringelchen (°) auch die gesicherte Kenntnis der Larve angedeutet; ebenso wurde für die Gallen ein besonderes Zeichen (⊕) beigesetzt. In derselben Zeile folgt weiter noch das geographische Verbreitungsareal der betreffenden Art, eine Angabe, deren Eruirung mir sehr viele Arbeit und Mühe gekostet hat; selbstverständlich wurden jegliche irgendwie Zweifel erregende Notizen von vorneherein ausgeschlossen. Dass ich hierbei die Bezeichnung der Continente beibehielt und dann, wo es möglich und wertvoll war, die politisch abgegrenzten Ländercomplexe von Nord gegen Süd vorschreitend, aufführte, hat seinen Grund darin, dass mir die Sclater-Wallace'sche Einteilung der Erdoberfläche dem praktischen Bedürfnisse weniger entsprechend und auch wissenschaftlich noch nicht vollständig und allseitig gesichert und erhärtet scheint. Freilich wäre es von großem Werte gewesen, die geographischen Angaben, soweit als möglich, durch Autoren zu belegen, allein auch hier musste Maß im Raum gehalten werden; zudem liegen die Quellen dem mit der hymenopterologischen Literatur Vertrauten doch nicht so ferne, wie dies in anderen Disciplinen, z. B. bei den Vögeln der Fall ist. Bemerkenswert erscheint nur, dass die Namen der Länder meist lateinisch oder latinisirt, wo dies zu Schwierigkeiten geführt hätte, in der Originalsprache der Bewohner oder Colonisten angeführt sind.

Die folgenden Zeilen bieten den Citaten- und Synonymenschatz, in welchem eigentlich der Schwerpunkt der ganzen Arbeit liegt. Derselbe citirt, wie schon oben angedeutet, in chronologischer Folge von der ersten

Beschreibung oder Abbildung oder selbst namenlosen Anführung der betreffenden Art alle Beschreibungen derselben, alle Abbildungen, alle auf die Anatomie, Physiologie oder Biologie bezüglichen Stellen, natürlich mit Ausschluss aller jener, wo dieselbe blos dem Namen nach erwähnt wird, wie dies z. B. bei faunistischen Listen der Fall ist; wenn jedoch über das isolirte Vorkommen oder auffallend häufige Auftreten, über Nutzen oder Schaden u. s. w. weitläufigere Angaben vorgebracht wurden, wurde auch dieses Citat mit aufgenommen, ebenso wie die älteste auf die betreffende Art mit Sicherheit zu deutende Stelle stets citirt erscheint, selbst wenn für dieselbe noch kein Name oder nur eine Paraphrase beigebracht worden ist; desgleichen sind alle Versetzungen von einem Genus in das andere ersichtlich gemacht. Es gibt somit dieser Citatenschatz wirklich das historische Bild der Kenntnisnahme der Art und zwar in einer Form, welche durch die zeilenweise Anordnung und durch die Ausführlichkeit des Citates selbst wohl nichts zu wünschen übrig lässt. Beiläufig sei hier auch erwähnt, dass bei gleichzeitig erschienenen Hinweisen die selbständigen Werke den Zeitschriftenaufsätzen vorangehen und dass die Zeitschriften nach dem Hauptschlagworte im Titel geordnet sind. Zur leichteren Orientirung wurden die Initialen der germanischen Sprachen groß, jene der romanischen klein geschrieben; bei den im Buchhandel erschienenen und erscheinenden Journalen blieb der Verlagsort und der Redacteur des leichten Wechsels halber gänzlich weg; bei den Gesellschaftsschriften erscheint der Vereinssitz stets vor der Band- resp. Jahreszahl. Die Bandzahl wird stets in römischen, die Heftzahl in arabischen Ziffern angeführt, letztere jedoch nur dort, wo sie wegen der unregelmäßigen Erscheinungszeit absolut notwendig ist; ebenso sind auch Hefte, Fascikel, Partes, Livraisons, No. des Aufsatzes u. s. w. nur dann speciell angeführt, wenn dies von chronologischer Bedeutung ist. Bruchstriche der Bände oder Hefte deuten auf das gleichzeitige Erscheinen derselben hin; die Serieszahlen sind in Klammern eingeschlossen; wo aber möglich, wurde ohne Serien fortlaufend nummerirt. Auf die Band- oder Heftzahl folgt die Jahreszahl und hier sei bemerkt, dass der Jahrgang stets organisch genommen ist, so dass jedes Heft eines Jahrbuches dem betreffenden Jahre zugeschrieben wurde, selbst wenn es nach Jahresschluss ausgegeben wurde. Zu diesem Vorgange leitete mich die Erfahrung, dass wenigstens die Separata meistens noch im entsprechenden Jahre ausgegeben werden und dass das verspätete Erscheinen der betreffenden Hefte meist nur vom Zufalle abhängig ist; die wissenschaftliche Conception entspricht daher wohl immer dem betreffenden Jahrgange. Eine Ausnahme musste natürlich dann gemacht werden, wenn

zwischen dem Datum der Abfassung und dem des Erscheinens ein mehrjähriger Zeitraum verflossen ist, wie dies bei einigen italienischen Journalen (z. B. Atti accad. sc. fis. Napoli) statt hat. In diesem Falle ist die Zeit der wissenschaftlichen Conception resp. Mitteilung durch Vorlage in Klammern, die Zeit des Erscheinens außerhalb derselben gesetzt. Dem gegenüber ist es selbstverständlich, dass bei Zeitschriften, welche heftweise erscheinen und deren Beginn der Bände nicht mit dem Kalenderjahr zusammenfällt, ohne Weiteres dasjenige Jahr angesetzt wird, in welchem der betreffende Aufsatz wirklich erschienen ist. Nach der Jahreszahl wird mit p. die Seitenzahl und mit n. die Nummer der betreffenden Species angegeben; dann folgt noch die event. Angabe des Geschlechtes und wo nötig die Tafel (T.) und die Figur (F.) der Abbildung, oder der bloße Hinweis auf die Nummer der Abbildung im Text (Fig.); bei nicht nummerirten Tafeln ist dies durch ein vorgesetztes Tab., bei mit Buchstaben, nicht mit Zahlen bezeichneten Figuren, durch ein beigesetztes Fig. angedeutet. Die sexuellen und agamen Formen der Cynipiden wurden gleich den Rassen (stirpes) der Formiciden je für sich behandelt und durch Hinweise als zusammengehörig bezeichnet.

Da das vorliegende Werk den Charakter eines ausgesprochenen Nachschlagebuches für Hymenopterologen hat, so glaubte ich noch ein Besonderes zu thun, indem ich anhangsweise in Fußnoten bei den Phytophagen die Nahrungspflanze der Larven, bei den Parasiten die Wirtstiere, soweit es bekannt geworden, anführte. Da hierbei die Verlässlichkeit des Auctors von ganz besonderer Bedeutung ist, und auch nur dieser für die betreffende Angabe verantwortlich gemacht werden muss, so wurde stets auch dessen Name in Klammern aufgeführt; die betreffenden Pflanzen- oder Tiernamen erscheinen aber ohne Berücksichtigung jeglicher Synonymie mit oder ohne Auctor, genau wie in der Originalmitteilung, um deren Charakter möglichst zu wahren; zu allgemeine Angaben, wie Gattungen von Pflanzen (auf „Weiden") oder Ordnungen von Insekten („Dipteren"), wurden principiell ausgeschlossen.

Den Schluss eines jeden Bandes bildet ein alphabetisches Register der Genus- und Speciesnamen; bei ersteren wurden auch die Synonyma berücksichtigt, die letzteren sind der Einfachheit halber ohne Rücksichtnahme auf die Gattungen angeführt.

Endlich sei noch hervorgehoben, dass das gesamte Werk mit dem Jahre 1890 abgeschlossen wurde, dass jedoch auch die folgenden Jahresberichte (Zoological Record, Zoologischer Anzeiger u. s. w.) bis zur Drucklegung für die Feststellung der Synonymie berücksichtigt wurden;

das Datum des Abschlusses ist bei jedem Bande speciell angegeben. Dadurch ist manche mir sehr unangenehme, nichts desto weniger aber unvermeidliche Inconsequenz zu erklären und wohl zu entschuldigen. Ebenso dürfte auch die eine oder andere aufstoßende Inconsequenz in der Behandlung durch die lange Zeitdauer der Abfassung ihre Entschuldigung finden, während welcher ich vom Jüngling zum Manne gereift und ab und zu auch meine Ansicht und deren Durchführung zu ändern mich veranlasst sah.

Schließlich erfülle ich noch die angenehme Pflicht, allen Instituten, an denen ich arbeitete und die mich durch die Vermittelung ihrer reichen Schätze unterstützten, insbesondere dem k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien, der k. k. Universitätsbibliothek in Wien, der k. b. Hof- und Staatsbibliothek in München und der k. k. Universitätsbibliothek in Innsbruck, sowie meinen zahlreichen Freunden, welche einzelne Partieen des Catalogs zu revidiren die Freundlichkeit hatten, den wärmsten Dank auszusprechen. Ebenso sei der Verlagsbuchhandlung für ihr coulantes Entgegenkommen in jeder Beziehung und für ihre schöne, zweckmäßige typographische Ausstattung auf das Freundlichste gedankt.

Und so habe ich die Beruhigung, mit klarem Blick die Arbeit am Beginne überschaut, mit größter Gewissenhaftigkeit sie durchgeführt und mit begeisterter Freude sie abgeschlossen zu haben: möge sie nun auch der Wissenschaft jenen Dienst erweisen, für welchen sie geschaffen wurde!

Innsbruck, im Juli 1891.

Prof. Dr. K. W. v. **Dalla Torre.**

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Der Erinnerung an

Herrn

DR. JOSEF KRIECHBAUMER
(gest. am 2. Mai 1902 zu München),

Conservator an der zoologisch-zootomischen Sammlung des Staates an der Akademie (kgl. bayer. Ludwig-Maximilians Universität) in München

gewidmet

vom Verfasser.

CATALOGUS HYMENOPTERORUM

hucusque descriptorum

systematicus et synonymicus

Auctore

Dr. C. G. DE DALLA TORRE

Professore Oenipontano.

Volumen III:

Trigonalidae, Megalyridae, Stephanidae, Ichneumonidae, Agriotypidae, Evaniidae, Pelecinidae.

Pars I (signatura 1—34).

LIPSIAE

Sumptibus Guilelmi Engelmann

MDCCCCI.

Des dritten Bandes zweite Hälfte erscheint Mitte des Jahres 1902.

Abgeschlossen mit Vol. XXXVI. (1899) des Zoological Record und Vol. V (1900) der Bibliographia Zoologica (Vol. XXIII des Zoologischen Anzeigers.)

I. Fam. Trigonalidae Cress.

TRIGONALYS

Westwood, Proc. Zool. Soc. London III. 1835 p. 53.
τρίγωνος, trigonus; ἅλως, area.

Synon.: Coelius (Lepeletier) Guérin, Rev. zool. 1842 p. 84.
κοιλία, venter.
Lycogaster Shuckard, Entomologist 1841 p. 121.
λύκος, lupus; γαστήρ, venter.
Seminota Spinola, Magas. de zool. X. P. 41-43. 1840 p. 1.
semi; notus.
Sphex Degeer, Göze, Retzius.

apicipennis Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Trigonalys apicipennis Cameron, Ann. Nat. Hist. XIX. 1897 p. 269, ♀.
canadensis Harr. — ♂ — Am.: Victoria.
Trigonalys Canadensis Harrington, Canad. Entomol. XXVIII. 1896 p. 108.
Trigonalys Canadensis Taylor, Canad. Entomol. XXX. 1898 p. 14.
Trigonalys Canadensis Harrington, Canad. Entomol. XXX. 1898 p. 15, ♂.
championii Cam. — ♂ — Am.: Mexico.
Trigonalys Championii Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX. 1897 p. 273, ♂.
costalis Cress.[1] — ♂ — Am.: Massachusetts.
Trigonalys (Lycogaster) costalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 352, ♂.
depressa (Deg.) Smith[2] — ♀ ♂ — Am.: Guiana, Brasilia.
Sphex depressa Degeer, Mém. hist. Insect. III. 1773 p. 590 n. 7; T. 30 F. 7-9.
Sphex depressa Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. III. 1780 p. 382 n. 7; T. 30 F. 7-9.
Sphex depressa Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 66 n. 257.
Trigonalis Leprieuri Spinola, Magas. de zool. X. P. 53. 1840 p. 1, ♂.
Seminota Leprieuri Spinola, Magas. de zool. X. P. 41-43. 1840 p. 6, ♂; T. 41.
Trigonalys obscura Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 538, ♀.
Seminota Leprieuri Spinola, Rev. zool. 1841 p. 18, ♂.
Trigonalys Leprieuri Guérin, Rev. zool. 1842 p. 84 n. 2, ♂.
Trigonalys obscura Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 273 n. 3, ♀.
Trigonalys Leprieurii Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 274 n. 4, ♂.
Trigonalys bipustulata Smith, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) VII. 1851 p. 28, ♂.
Trigonalys depressa Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 6. 1851 p. 176, ♀; T. 16 F. 2.

---

1) *Lep.:* Acronycta lobeliae Guér. (Riley & Howard.)
2) *Hymen.:* Polistes lanio (Smith).

Trigonalys depressa Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 231, ♀ ♂.
Trigonalys depressa Westwood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 125 n. 9, ♀ ♂.

dubia Magr. — ♂ — As.: Burma.
Trigonalys dubia Magretti, Ann. mus. civ. Genova XXXVII. 1896 p. 313 n. 2, ♂; Fig.

fasciatipennis Cam. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Trigonalys fasciatipennis Cameron, Ann. Nat. Hist. XIX. 1897 p. 271, ♀ ♂.

flavonotata Cam. — ♂ — Am.: Mexico.
Trigonalys flavonotata Cameron, Ann. Nat. Hist. XIX. 1897 p. 270, ♂.

gundlachii Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Trigonalys Gundlachii Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 10, ♂.

hahnii Spin. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Trigonalys Hahnii Spinola, Magas. de zool. X. P. 53. 1840 p. 1, ♀; T. 53.
Trigonalys nigra Westwood, Rev. zool. 1841 p. 32.
Trigonalys Hahnii Shuckard, Entomologist 1841 p. 122 n. 1.
Trigonalys Anglicana Shuckard, Entomologist 1841 p. 122 n. 2.
Trigonalys Hahnii Guérin, Rev. zool. 1842 p. 84 n. 3.
Trigonalys Hahnii Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 274 n. 5.
Trigonalys Hahnii Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. III. 1845 p. 561 n. 1, ♂.
Trigonalys Anglica Smith, Zoologist VI. 1848 p. 1994; Fig.
Trigonalys aterrima Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXII. P. 4. 1849 p. 384.
Trigonalys Hahnii Schenck, Jahrb. Ver. Naturk Nassau XVI. 1861 p. 167.
Trigonalys Hahnii Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 221.
Trigonalys Hahnii Westwood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 126 n. 10.
Trigonalys Hahni Jacobs, Ann. soc. entom. Belgique XXI. 1878 Compt. rend. p. CCXL.
Trigonalys nigra Jacobs, Ann. soc. entom. Belgique XXI. 1878 Compt. rend. p. CCXL.
Trigonalys nigra Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 Compt. rend. p. X-XII.
Trigonalys Hahnii Jaroschevski, Trudni Kharkoff Univ. XXII. 1889 p. 133-143.

var. **solitaria** (Jac.) D. T. — ♂ — Eur.: Belgia.
Trigonalys nigra var. solitaria Jacobs, Ann. soc. entom. Belgique XXI. 1878 Compt. rend.
Trigonalys Hahnii var. solitaria m. [p. CCXL-CCXLIV, ♂.

jucunda Westw. — Am.: Brasilia.
Trigonalys jucunda Westwood, Trans. Entom. Soc. London 1868 p. 327 n. 2.
Trigonalys jucunda Westwood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 124 n. 4; T. 23 F. 8.

lachrymosa Westw. — As.: Mindanao.
Trigonalys lachrymosa Westwood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 123 n. 2; T. 23 F. 5.

leviceps Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Trigonalys laeviceps Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. VII, ♀.

lugubris Westw. — Am.: Brasilia.
Trigonalys lugubris Westwood, Trans. Entom. Soc. London 1868 p. 328 n. 3.
Trigonalys lugubris Westwood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 123 n. 1; T. 23 F. 4.

maculata Smith — ♂ — Austr.: New South Wales.
Trigonalys maculata Smith, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) VII. 1851 p. 28, ♂.
Trigonalis maculata Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 231; T. 7 F. 4.

maculifrons Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Trigonalys maculifrons Cameron, Ann. Nat. Hist. XIX. 1897 p. 268, ♀.

marginata Westw. — Am.: Venezuela.
Trigonalys marginata Westwood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 124 n. 6; T. 23 F. 10.

melanoleuca Westw. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Trigonalis melanoleuca Westwood, Proc. Zool. Soc. London III. 1835 p. 53.
Trichonalys melanoleuca Shuckard, Entomologist 1841 p. 122 n. 1; Fig.
Trigonalys Servillei Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 538.

Trigonalys melanoleuca Guérin, Rev. de zool. 1842 p. 84 n. 1.
Coelius Servillei (Lepeletier) Guérin, Rev. de zool. 1842 p. 84 n. 1. [F. 4.
Trigonalys melanoleuca Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 273 n. 1; T. 15
Trigonalys Servillei Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 273 n. 2.
Trigonalys melanoleuca (Westwood) Lepeletier, Hist. nat. Insect. Hymén. III. 1845 p. 562
Trigonalys melanoleuca Westwood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 125 n. 8. [n. 2, ♂.

mexicana Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Trigonalys Mexicanus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. VII, ♂.

natalensis Kriechb. — Afr.: Natal.
Trigonalys Natalensis Kriechbaumer, Ann. soc. entom. Belgique XXXIX. 1894 p. 318.

nevadensis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Nevada.
Trigonalys Nevadensis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. VII, ♀ ♂.

ornata Smith — Am.: Mexico.
Trigonalys ornata Smith, Journ. of Entom. I. 1860 p. 83 n. 1.
Trigonalys ornata Westwood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 123 n. 3; T. 23 F. 7.

pictifrons Smith — ♀ ♂ — As.: Celebes.
Trigonalys pictifrons Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. V. 1860 p. 57 n. 1, ♀ ♂.
Trigonalys pictifrons Westwood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 125 n. 7; T. 23 F. 6.

pulchella Cress. — ♂ — Am.: Virginia.
Trigonalys pulchellus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia VI. 1867 p. 351, ♂.

pullata (Shuck.) Westw. — Am.: Carolina.
Lycogaster pullatus Shuckard, Entomologist 1841 p. 123; Fig.
Trigonalys pullata Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 274 n. 6.
Trigonalys pullata Westwood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 126 n. 11.

rufiventris Magr. — ♂ — As.: Burma.
Trigonalys rufiventris Magretti, Ann. mus. civ. Genova XXXVII. 1896 p. 311 n. 1, ♂.

scutellaris Cam. — ♂ — Am.: Mexico.
Trigonalys scutellaris Cameron, Ann. Nat. Hist. XIX. 1897 p. 267, ♂.

simonii Buyss. — ♂ — Am.: Venezuela.
Trigonalys Simoni Buysson, Ann. soc. entom. France LXIV. 1892 p. 59 n. 41, ♂.

sulcata Davis — ♂ — Am.: New Jersey.
Trigonalys sulcatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 349, ♂.

thwaitesii Westw. — As.: Ceylon.
Trigonalys pulchella Westwood, Trans. Entom. Soc. London 1868 p. 327 n. 1 [non Cresson].
Trigonalys Thwaitesi Westwood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 124 n. 5; T. 23 F. 9.

NOMADINA

Westwood, Trans. Entom. Soc. London 1868 p. 328.
νομάς, errans.

smithii Westw. — Am.: Brasilia.
Nomadina Smithii Westwood, Trans. Entom. Soc. London 1868 p. 328.
Nomadina Smithii Westwood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 130; T. 24 F. 7.

LIABA

Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. P. 9. 1899 p. 3.
Etymol. obscura.

balteata Cam. — Am.: Chili.
Liaba balteata Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. P. 9. 1899 p. 3.

II. Fam. **Megalyridae** Schlett.

MEGALYRA

Westwood, Griffith: Anim. Kingd. Insect. III. 1832 p. 118.
Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 269.
μέγας, magnus; *λύρα*, lyra.

fasciipennis Westw. — ♀ ♂ — Austr.: Tasmania, Melville Ins. [T. 106 F. 4 a-f.
Megalyra fasciipennis Westwood, Griffith: Anim. Kingd. Insect. III. 1832 p. 118, ♀; T. 66 F. 4 &
Megalyra rufipes Erichson, Arch. f. Naturg. VIII. P. 1. 1841 p. 258 n. 227, ♀.
Megalyra fasciipennis Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 270, ♂; T. 14 F. 3.
Megalyra fasciipennis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 542 n. 1, ♀; T. 43 F. 4.
Megalyra rufipes Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 225, ♀.
Megalyra fasciipennis Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 247, ♀ ♂.
melanoptera Schlett. — ♀ — Austr.
Megalyra melanoptera Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 244, ♀.
mutilis Westw. — ♂ — Austr.
Megalyra mutilis Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 226; T. 7 F. 1.
Megalyra mutilis Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 248, ♂.
shuckardii Westw. — ♀ — Austr.
Megalyra Shuckardi Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 226, ♀; T. 7 F. 2.
Megalyra Shuckardi Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 243, ♀.

ISEURA

Spinola, Mem. accad. sc. Torino (2) XIII. 1851 p. 27.
Etymol. obscura.

ghilianii Spin. — ♀ — Am.: Brasilia.
Iseura Ghilianii Spinola, Mem. accad. sc. Torino (2) XIII. 1851 p. 27 n. 8, ♀.

III. Fam. **Stephanidae** Leach.

STENOPHASMUS

Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 169.
στενός, angustus; *φάσμα*, monstrum.

acrogaster Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia.
Stenophasmus acrogaster Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 205, ♀.
apicalis Westw. — As.: Borneo.
Stenophasmus apicalis Westwood, Tijdschr. v. Entom. XXV. 1882 p. 43 n. 29.
büttneri Stdlm. — ♀ — Afr. or.
Stenophasmus Büttneri Stadelmann, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 226, ♀.

cubensis Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Stenophasmus Cubensis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 86, ♀.
femoralis Westw. — ♀ — As.: Mysol.
Stenophasmus femoralis Westwood, Tijdschr. v. Entom. XXV. 1882 p. 43 n. 30, ♀.
gundlachii Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Stenophasmus Gundlachi Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 85, ♀.
iridescens Schlett. — ♂ — Austr.
Stenophasmus iridescens Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 203, ♂.
megischoides Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Stenophasmus megischoides Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 86, ♂.
oncophorus Schlett. — ♀ — Afr.: Cap.
Stenophasmus oncophorus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 207, ♀.
pusillus Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Stenophasmus pusillus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 87, ♂.
ruficeps Smith — ♀ — As.: Aru, Sula.
Stenophasmus ruficeps Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 170, ♀.
Stenophasmus ruficeps Westwood, Tijdschr. v. Entom. XXV. 1882 p. 42 n. 28, ♀; T. 8 F. 1-5.
Stenophasmus ruficeps Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 203, ♀.
terminalis Ashm. — ♀ ♂ — Am.: St. Vincent.
Stenophasmus terminalis Ashmead, Journ. Linn. Soc. Zool. XXV. 1894 p. 114, ♀ ♂.

SCHLETTERERIUS

Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 150.
A. Schletterer, nom. propr.

Synon.: Stephanus Cresson non Jurine.

cinctipes (Cress.) Ashm. — ♀ — Am.: United States.
Stephanus cinctipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VIII. 1880 Proc. p. XVII.
Stephanus cinctipes Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 156, ♀.
Schlettererius cinctipes Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 150.

STEPHANUS

Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 91; T. 2 F. 4.
στέφανος, corona.

Synon.: Bothriocerus Sichel, Ann. soc. entom. France (3) VIII. 1860 p. 759.
βόθριον, fovea; κέρας, cornu.
Foenatopus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 58.
Foenus, nom. propr. Hymen.; πούς, pes.
Megischus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 537.
μέγας, magnus; ἰσχίον, coxa.

Bracon Fabricius, Panzer.
Ichneumon Fabricius, Latreille.
Pimpla Fabricius.
Xorides Lamarck.

acutus Lep. — ♀ — Am.: United States, Brasilia, Columbia.
Stephanus acutus Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 489 n. 2.
Stephanus acutus Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 276 n. 6.
Megischus acutus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 540 n. 4, ♀.
Megischus acutus Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 228.
Stephanus acutus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 137, ♀.

andinus Schlett. — ♀ — Am.: Columbia.
Stephanus andinus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 138, ♀.
anomalipes Först. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Stephanus anomalipes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XII. 1855 p. 228 n. 2, ♀.
Megischus anomalipes Sichel, Ann. soc. entom. France (4) V. 1865 p. 485 n. 8, ♀.
Stephanus anomalipes Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 93, ♀; F. 1.
antinorii (Grib.) Schlett. — ♀ — Afr.: Shoa.
Megischus Antinorii Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 346 n. 13, ♀.
Megischus Antinorii Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 264 n. 1, ♀.
Stephanus Antinorii Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 103, ♀.
bicolor Westw. — ♀ — Am.: Georgia, Kentucky.
Stephanus bicolor Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 538, ♀.
Stephanus bicolor Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 277 n. 7, ♀.
Stephanus bicolor Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 154, ♀.
bruneus (Cress.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Cuba.
Megischus brunneus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 84, ♀ ♂.
Stephanus bruneus m.
canadensis (Davis) D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Megischus Canadensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 349, ♀.
Stephanus Canadensis m.
collarifer Schlett. — ♂ — Am.: Surinam, Brasilia.
Stephanus collarifer Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 141, ♂.
coronator (Fabr.) Boisd. — ♀ ♂ — As. mer. & ins.; Austr.
Pimpla coronator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 118 n. 28.
Ichneumon coronator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273, ♀.
Ichneumon coronator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 345, ♀.
Stephanus coronator Boisduval, Voy. Astrolabe Entom. II. 1835 p. 656, ♀; T. 12 F. 7.
Stephanus coronator Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 276 n. 2.
Megischus coronator Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 538 n. 1, ♀.
Megischus coronator Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 227.
Megischus viduus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 138 n. 3, ♂.
Megischus coronator Sichel, Ann. soc. entom. France (4) V. 1865 p. 477 n. 2, ♀♂. [B (♀).
Megischus longicaudatus A. Costa, Ann. mus. zool. Napoli III. 1866 p. 81, ♀♂; T. 4 F. 1 A (♂) &
Megischus longicaudatus A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli V. 1866 p. 272, ♀ ♂.
Stephanus coronator Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 114, ♀ ♂.
cylindricus (Westw.) Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia.
Megischus cylindricus Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 230.
Stephanus cylindricus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 144, ♀.
damellicus Westw. — ♀ — Austr.
Stephanus Damellicus Westwood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 127, ♀; T. 24 F. 2.
Stephanus Damellicus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 116, ♀.
diadema Westw. — Patria?
Stephanus diadema (Fabricius) Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 277 n. 8.
diversus Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia.
Megischus furcatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 539 n. 3, ♀ [non Lepeletier].
Megischus furcatus Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 228.
Stephanus diversus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 133, ♀.
ducalis (Westw.) Schlett. — ♀ — As. mer. & ins.
Megischus ducalis Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 229, ♀.
Stephanus ducalis Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 112, ♀.

erythrocephalus (Cam.) Schlett. — ♀ — Am.: Panama.
Megischus erythrocephalus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57/58. 1887 Hymen. I. p. 421 n. 4, ♀.
Stephanus erythrocephalus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 140, ♀.

europaeus (Sich.) Schlett. — ♀ — Eur.: Sicilia.
Bothriocerus Europaeus Sichel, Ann. soc. entom. France (3) VIII. 1860 p. 759, ♀.
Megischus Europaeus Sichel, Ann. soc. entom. France (4) V. 1865 p. 484 n. 7, ♀.
Stephanus Europaeus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 95, ♀; T. 1.

floridanus (Davis) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Florida.
Megischus Floridanus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 349, ♀ ♂.
Stephanus Floridanus m.

frontalis Westw. — Afr.: Cap.
Stephanus frontalis (Klug) Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 276 n. 3.

furcatus Lep. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia, Guatemala.
Stephanus furcatus Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 489 n. 1, ♀. [F. 2.
? Stephanus Brasilianus Griffith, Anim. Kingd. Insect. III. 1832 p. 118, ♀; T. 66 F. 3 & T. 106
? Stephanus Brasilianus Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 276 n. 4.
Stephanus furcatus Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 276 n. 5.
Stephanus furcatus Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 408; T. 65 F. 5.
Megischus annulator Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 539 n. 2, ♀; T. 40 F. 5.
Stephanus Brasiliensis Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 227 ♂.
Megischus annulator Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 228 ♀.
Megischus annulator Desmarest, Chenu: Encycl. hist. nat. Annelles 1860, ♀; T. 12 F. 4.
Bothriocerus Americanus Sichel, Ann. soc. entom. France (3) VIII. 1860 p. 761; ♀.
Megischus Americanus Sichel, Ann. soc. entom. France (4) V. 1865 p. 480 n. 4, ♀.
Megischus annulator Sichel, Ann. soc. entom. France (4) V. 1865 p. 482 n. 5, ♀; T. 10 F. 6a-c.
Megischus Brasilianus Sichel, Ann. soc. entom. France (4) V. 1865 p. 483 n. 6, ♂.
Megischus annulator Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57/58. 1887 Hymen. I. p. 419 n. 1, ♀, ♂;
[T. 18 F. 7 (♂) & 8 (♀).
Stephanus furcatus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 130, ♀, ♂.

gigas Schlett. — ♀ — As.: Perna.
Stephanus gigas Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 96, ♀; T. 1.

haematipoda Montr. — ♀ — Austr.: Woodlark.
Stephanus haematipoda Montrouzier, Ann. soc. agric. Lyon (2) VII. 1855 p. 114, ♀.
Stephanus haematipoda Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 117, ♀.

indicus Westw. — ♀ ♂ — As.: Archip. malayicus.
Stephanus Indicus Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 538, ♀ ♂.
Stephanus Indicus Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 277 n. 9, ♀ ♂.
Megischus Indicus Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p, 230.
Foenatopus Indicus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. V. 1860 p. 58.
Foenatopus ruficeps Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. V. 1860 p. 58 n. 1, ♀.
Stephanus Indicus Schletterer, Berl. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 125, ♀, ♂; T. 1 F.

insignis Schlett. — ♀ — Afr. mer.
Stephanus insignis Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 100, ♀; T. 1.

insularis (Smith) D. T. — ♀ ♂ — As.: Borneo.
Megischus insularis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 120 n. 1, ♀ ♂.
Stephanus insularis m.

lacteipennis Schlett. — ♀ — As.: Borneo.
Stephanus lacteipennis Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 119, ♀; T. 1 F. 17.

leucodontus Schlett. — ♀ — As.: Borneo.
Stephanus leucodontus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 121, ♀; T. 1 F. 18.

limpidipennis Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia.
Stephanus limpidipennis Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 147, ♀.
macrurus Schlett. — ♀ — Am.: Surinam.
Stephanus macrurus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 128, ♀; T. 1 F.
maculipennis (Westw.) Schlett. — ♂ — Am.: Brasilia.
Megischus maculipennis Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 229.
Stephanus maculipennis Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 127, ♂.
marginalis Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia.
Stephanus marginalis Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 133, ♀.
martinii Stdm. — As.: Sumatra.
Stephanus Martini Stadelmann, Berlin. entom. Zeitschr. XXXVII. 1892 p. 236; T. 6 F. 4.
natalicus Westw. — ♀ ♂ — Afr.: Port Natal.
Stephanus Natalicus Westwood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 127, ♀ ♂; T. 24 F. 8.
Stephanus Natalicus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 102, ♀ ♂; T. 1.
niger (Smith) Schlett. — ♀ — Am.: Guatemala, Panama.
Megischus niger Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. P. 1. 1862 p. 44, ♀.
Megischus niger Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57/58. 1887 Hymen. I. p. 420 n. 2, ♀; T. 18 F. 19.
Stephanus niger Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 135, ♀.
nigricans (Sich.) Schlett. — ♀ — Ceylon.
Megischus tarsatus var. nigricans Sichel, Ann. soc. entom. France (4) V. 1865 p. 476, ♀.
Stephanus nigricans Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 109, ♀.
nigricaudus (Sich.) Schlett. — ♀ — As.: Manila.
Megischus nigricauda Sichel, Ann. soc. entom. France (4) V. 1865 p. 479 n. 3, ♀.
Stephanus nigricauda Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 106, ♀.
pachylomerus Schlett. — ♀ — Afr.: Gaboon.
Stephanus pachylomerus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 98, ♀; T. 1.
pallescens Schlett. — ♀ — Austr.
? Stephanus Salomonis Westwood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 128; T. 24 F. 10.
Stephanus pallescens Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 123, ♀; T. 1 F.
ruficeps (Cam.) Schlett. — ♀ — Am.: Panama. [T. 18 F. 9 [non Smith].
Megischus ruficeps Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57/58. 1887 Hymen. I. p. 420 n. 3, ♀;
Stephanus capitatus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 151, ♀.
rufipes Say — Am.: Pennsylvania.
Stephanus rufipes Say, Keatings Narrat. Exped. II. 1824 App. p. 324.
Stephanus rufipes Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 218.
Megischus rufipes Cresson, Synops. Hymen. North-America 1887 p. 221.
serrator (Fabr.) Ill. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 60 n. 193, ♀; Tab. Synist. F. 193.
Ichneumon serrator Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 224 n. 106-7; ♀.
Stephanus coronatus Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 76. T. 13 (♀).
Bracon serrator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 108 n. 29, ♀.
Ichneumon coronator Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 179 n. 1, ♀.
Bracon coronatus Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 77.
Stephanus coronatus Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 93, ♀ ♂; T. 7 F. 4 (♀).
Stephanus serrator Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 191.
Stephanus coronatus Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 191.
Stephanus coronatus Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 4.
Xorides coronatus Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 135 n. 3, ♀.
Stephanus coronatus Nees, Nov. Acta Acad. Nat. Curios. IX. 1818 p. 301.
Ichneumon serrator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 269.
Ichneumon serrator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 334.

Stephanus coronator Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 489 n. 3.
Stephanus serrator Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 489 n. 4, ♀ ♂.
Stephanus coronatus Boisduval, Voy. Astrolabe. Zool. II. P. 6. 1833 p. 656; T. 12 F. 7.
Stephanus coronatus Nees, Hymen. Ichneum. affin. Monogr. I. 1834 p. 8 n. 1, ♀ ♂.
Xorides coronatus Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2a IV. 1835 p. 347 n. 3, ♀.
Stephanus coronatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XI. 1838 p. 136.
Stephanus serrator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 329 n. 1.
Stephanus serrator Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 276 n. 1.
Stephanus serrator Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 537, ♀.
Stephanus serrator Blanchard, Orbigny's Dict. univ. hist. nat. XII. 1848 p. 23, ♀.
Ichneumon (Stephanus) serrator Blanchard, Cuvier: Régne anim. Ed. 3a Insect. II. [1849; T. 110 F. 6.
Stephanus serrator Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 227.
Stephanus serrator Sichel, Ann. soc. entom. France (4) V. 1865 p. 472 n. 1, ♀ ♂.
Stephanus serrator Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 91, ♀♂; T. 1 F. 78.

sickmannii Schlett. — ♀ — Am.: United States.
Stephanus Sickmanni Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 152, ♀.

spoliator (Smith) Schlett. — ♀ — Austr.: Waigiou.
Megischus spoliator Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 6 n. 3, ♀.
Stephanus spoliator Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 117, ♀.

submaculatus (Westw.) Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia.
Megischus submaculatus Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 230, ♀.
Stephanus submaculatus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 126, ♀.

sulcifrons Schlett. — ♀ — As.: Philippines.
? Megischus insidiator Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 7 n. 4, ♂.
Stephanus sulcifrons Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 110, ♀.

tarsatus (Sich.) Schlett. — ♀ ♂ — As.: Philippines.
? Megischus tarsalis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. V. 1860 p. 137 n. 2, ♀.
Megischus tarsatus Sichel, Ann. soc. entom. France (4) V. 1865 p. 475 n. 1, ♀♂; T. 10 F. 4(♀) & 5(♂).
Megischus tarsatus A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli V. 1866 p. 271.
Stephanus tarsatus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 107, ♀ ♂.

tener Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia.
Stephanus tener Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 142, ♀.

texanus (Cress.) D. T. — ♀ — Am.: Texas.
Megischus Texanus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IX. 1872 p. 191, ♀.
Stephanus Texanus m.

tibiator Schlett. — ♀ ♂ — As.: Arabia.
Stephanus tibiator Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 293; ♀ ♂.

togoensis Stadelm. — ♂ — Afr.: Togo.
Stephanus Togoensis Stadelmann, Entom. Nachr. XXI. 1895 p. 80, ♂.

turcomanorum Smw. — ♀ — As.: Turcomania.
Stephanus Turcomanorum Semenow, Horae soc. entom. Ross. XXV. 1891 p. 435, ♀.

unicolor Schlett. — ♀ — As.: Philippines.
Stephanus unicolor Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 109, ♀; T. 1.

vadosus Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia.
Stephanus vadosus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 196, ♀.

wüstnei Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia.
Stephanus Wüstnei Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 149, ♀.

WROUGHTONIA

Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 56.
R. C. Wroughton in Bombay.

cornuta Cam. — ♀ — As.: India.
Wroughtonia cornuta Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 57, ♀.

IV. Fam. Ichneumonidae Leach.

Sect. Ophionoidae m.

1. *Subfam.* Plectiscinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 143 & 170.

PROCLITUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 172 n. 18.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 113 n. 23.
προκλίνω, invergo.

Synon.: Aniseres Förster.
Cryptus Bouché, Haliday.
Plectiscus Thomson.

absconditus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus absconditus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 114, ♀.
albidipes Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
? Proclitus albidipes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 117, ♀.
Proclitus albidipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 202, ♂.
attentus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus attentus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 115, ♀.
autumnalis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Proclitus autumnalis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 115, ♀.
Plectiscus (Proclitus) autumnalis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1306 n. 20, ♀♂.
bicarinatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Proclitus bicarinatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 117, ♂.
caudiger Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Proclitus caudiger Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 117, ♀.
? Proclitus caudiger Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 203, ♀♂
cautus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus cautus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 116, ♀.
clypearis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [(excl. ♂).
Proclitus clypearis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 117, ♀
? Proclitus clypearis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 202, ♀ ♂.
Plectiscus (Proclitus) clypearis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1305 n. 19, ♀.
contemptabilis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus contemptabilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 115, ♀.

conturbator Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus conturbator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 115, ♀.
cupidus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus cupidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 114, ♀.
curiosus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus curiosus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 115, ♀.
definitus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus definitus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 116, ♀.
denticulatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Proclitus denticulatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 118, ♂.
dimidiatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus dimidiatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 115, ♀.
displicitus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus displicitus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 116, ♀.
evacuator Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus evacuator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 115, ♀.
exiguus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Proclitus exiguus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 117, ♂.
exilis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus exilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 115, ♀.
flagellatus Davis — ♂ — Am.: Colorado.
Proclitus flagellatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 246, ♂.
fossulatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus fossulatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 115, ♀.
fulvicornis Först. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Proclitus fulvicornis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 114, ♀.
Plectiscus (Proclitus) fulvicornis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1309 n. 28, ♀.
fulvipectus Först. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Proclitus fulvipectus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 115, ♀.
Proclitus clypearis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 117, ♂.
Proclitus fulvipectus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 202, ♀.
Plectiscus (Proclitus) fulvipectus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1305 n. 18, ♀♂.
gracilentus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Proclitus gracilentus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 117, ♂.
grandis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Proclitus grandis Först., Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 116, ♀ & 118, ♂.
Proclitus grandis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 202, ♂.
Plectiscus (Proclitus) grandis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1306 n. 22, ♀ ♂.
heteroocerus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Plectiscus (Proclitus) heterocerus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1307 n. 25, ♀.
humilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Proclitus humilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 117, ♂.
inaestimabilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Proclitus inaestimabilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 118, ♂.
inferior Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus inferior Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 116, ♀.
infimus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Proclitus infimus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 117, ♂.
inquietus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Proclitus inquietus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 114, ♀.

Proclitus albidipes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 117, ♂.
? Proclitus albidipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 202, ♂.
Plectiscus (Proclitus) inquietus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1308 n. 26, ♀ ♂.
instigator Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Proclitus instigator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 115, ♀.
Proclitus instigator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 202, ♀♂.
leptosomus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Proclitus leptosomus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 118, ♂.
litigiosus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus litigiosus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 117, ♀.
longitarsis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Plectiscus (Proclitus) longitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1306 n. 21, ♀.
macrurus Först. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Proclitus macrurus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 116, ♀.
Plectiscus (Proclitus) macrurus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1307 n. 23, ♀.
marginatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Proclitus marginatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 117, ♂.
melanocephalus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Proclitus melanocephalus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 117, ♂.
mesoxanthus Först. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Proclitus mesoxanthus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 116, ♀.
Plectiscus (Proclitus) mesoxanthus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1307 n. 24, ♀.
navus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus navus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 117, ♀.
pallens Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus pallens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 117, ♀.
perditorius Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus perditorius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 116, ♀.
periculosus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Proclitus periculosus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 115, ♀.
Plectiscus (Proclitus) periculosus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1308 n. 27, ♀♂.
procerulus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Proclitus procerulus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 117, ♂.
providus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus providus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 114, ♀.
punctatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus punctatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 115, ♀.
quaesitorius Först. — ♀ (♂) — Eur.: Germania.
Proclitus quaesitorius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 115, ♀.
? Proclitus quaesitorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 202, ♂.
rudis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus rudis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 115, ♀.
sincerus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Proclitus sincerus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 118, ♂.
Proclitus sincerus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 203, ♂.
sordidus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus sordidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 116, ♀.
Proclitus sordidus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 203, ♀.
spectabilis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
? Aniseres pallipes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 93 n. 1, ♂.

Proclitus spectabilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 116, ♀.
Plectiscus (Proclitus) spectabilis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1304 n. 17, ♀♂.

stenogaster Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Proclitus stenogaster Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 117, ♂.

substriatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Proclitus substriatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 118, ♂.

subsulcatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Proclitus subsulcatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 117, ♂.
Proclitus subsulcatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 202, ♂.

unicinctus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus unicinctus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 116, ♀.

validus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus validus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 116, ♀.

visitator Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus visitator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 116, ♀.

zelator Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Proclitus zelator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 116, ♀.

zonatus (Grav.) Först.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Plectiscus zonatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 982 n. 342, ♀ ♂.
Cryptus (Plectiscus) zonatus Bouché, Naturg. d. Insect. 1834 p. 144 n. 14.
Cryptus (Plectiscus) zonatus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 116.
Plectiscus zonatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 60 n. 2, ♀ ♂.
Proclitus ? zonatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 80.

GNATHOCHORISIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 152 n. 18.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 111 n. 22.

γνάθος, maxilla; *χώρησις*, actio.

Synon.: Blapticus Thomson.

flavipes Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Gnathochorisis flavipes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 113, ♀♂.
Blapticus (Gnathochorisis) flavipes Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1291 n. 6.

ENTELECHIA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 171 n. 4.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 110 n. 21.

ἐντελέχεια, agilitas.

Synon.: Blapticus Thomson.

suspiciosa Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Entelechia suspiciosa Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 111, ♂.
Blapticus (Entelechius) suspiciosus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1290 n. 4.

---

[1] *Lep.:* Yponomeuta padella (Bouché).

PANTISARTHRUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 109 n. 20.

πᾶς, omnis; ἴσος, aequus; ἄρθρον, membrum.

Synon.: Plectiscus Thomson.

inaequalis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pantisarthrus inaequalis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 110, ♀.
Plectiscus (Pantisarthrus) inaequalis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1309 n. 29, ♀ ♂.

luridus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pantisarthrus luridus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 110, ♀.
Plectiscus (Pantisarthrus) luridus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1309 n. 30, ♀ ♂.

ochropus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pantisarthrus ochropus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 110, ♀.

EUSTERINX

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 172 n. 17.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 107 n. 19.

εὖ, bene; στῆριγξ, fulcrum.

ambigua Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Eusterinx ambigua Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 108, ♀ ♂.

argutula Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Eusterinx argutula Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 108, ♂.

basalis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Eusterinx basalis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 108, ♀ ♂.
Eusterinx basalis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1294 n. 1, ♀ ♂.

diversa Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Eusterinx diversa Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 108, ♀ ♂.

divulgata Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Eusterinx divulgata Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 108, ♀ ♂.
Eusterinx divulgata Thomson, Opusc. entom. P. 12 1888 p. 1295 n. 2.

fulvicincta Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Eusterinx fulvicincta Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 109, ♀.

fulvicornis Först. — ♀ Eur.: Germania.
Eusterinx fulvicornis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 109, ♀.

intermedia Först. — ♀ — Eur. Germania.
Eusterinx intermedia Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 108, ♀.

levipleuris Först. — ♀ — Eur. Germania.
Eusterinx laevipleuris Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 108, ♀.

maesta Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Eusterinx moesta Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 109, ♀.

negligere Davis — ♀ — Am.: New Jersey.
Eusterinx negligere Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 246, ♀.

obscurella Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Eusterinx obscurella Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871, p. 108, ♀.

oligomera Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Eusterinx oligomera Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 109, ♀ ♂.
Eusterinx oligomera Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1295 n. 3, ♀ ♂.

oreophilus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia.
Eusterinx oreophilus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 107, ♀ ♂.

scitula Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Eusterinx scitula Förster, Verh. naturh. Verh. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 108, ♀.
speculifera Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Eusterinx speculifera Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 109, ♀.
subcincta Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Eusterinx subcincta Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 108, ♀.
subdola Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Eusterinx subdola Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 108, ♂.
tenuis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Eusterinx tenuis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 109, ♀ ♂.
vigil Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Eusterinx vigil Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 108, ♀ ♂.

SYMPHYLUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 105 n. 18.
σύμφυλος, eodem genere.

Synon.: Polysphincta Thomson.

hadrodactylus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Symphylus hadrodactylus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 106, ♀ ♂.
politus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Symphylus politus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 106, ♀ ♂.
Polypshincta (Symphylus) polita Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1251 n. 3.

MEGASTYLUS

Schiödte, Magas. de zool. IX. 1838 P. 6-10. p. 7.
μέγας, magnus; *στύλος*, stylus.

Synon.: Cryptus Haliday.
Helictes Haliday.
Mesoleptus Cresson.
Orthocentrus Provancher.
Spanotecnus Ashmead.

albocollaris Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Illinois.
Mesoleptus (Megastylus?) albocollaris Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 100, ♀.
Orthocentrus albofasciatus Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 14 n. 6, ♀.
Orthocentrus albofasciatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 800 n. 6, ♀.
Megastylus ? albofasciatus Davis, Proc. Acad. Nat. Hist. Philadelphia 1894 p. 190.
Megastylus albocollaris Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 246, ♀ ♂.
caseyi (Ashm.) Davis — ♂ — Am.: Virginia.
Spanotecnus Caseyi Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 196, ♂.
Megastylus Caseyi Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 246, ♂.
conformis Först. — Eur.: Germania.
Megastylus conformis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 105.
cruentator Schiödte — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Megastylus cruentator Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 4 n. 1, ♂; T. 6 F. 1.
Cryptus (Helictes) cruentator Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 115, ♀.
Megastylus cruentator Schiödte, Naturh. Tidsskr. III. 1847 p. 97 n. 1, ♀ ♂.
Megastylus cruentator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1856 P. 3. Tryph. p. 128 n. 1, ♀ ♂.
Megastylus cruentator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. P. 2. 1871 p. 72, ♀ ♂.

[[excl. ♂].
Megastylus cruentator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 104, ♀
Megastylus cruentator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 76, ♀.
Megastylus cruentator Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1313 n. 9, ♀.
Megastylus cruentator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 38, ♂.

facialis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Megastylus facialis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 105, ♂.

fuscicornis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Megastylus fuscicornis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 105.
Megastylus fuscicornis Thomson, Opusc. entom. P. 12 1888 p. 1314 n. 8, ♀ ♂.

impressor Schiödte — ♀ — Eur.: Dania.
Megastylus impressor Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 5 n. 3, ♀.
Megastylus impressor Schiödte, Naturh. Tidsskr. III. 1847 p. 97 n. 3.

leptoderus Först. — Eur.: Germania.
Megastylus leptoderus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 105.

multicolor Costa — Eur.: Italia.
Megastylus multicolor A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 10. 1887 p. 8; T. 1 F. 7.

nigriventris Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Megastylus nigriventris Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 105.
Megastylus nigriventris Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1313 n. 6, ♀.

orbitator Schiödte — ♀ — Eur.: Dania.
Megastylus orbitator Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 6 n. 4, ♀.
Megastylus orbitator Schiödte, Naturh. Tidsskr. III. 1847 p. 98 n. 4.

pauxillus Först. — Eur.: Germania.
Megastylus pauxillus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 105.

pleuralis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Megastylus pleuralis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888. p. 1313 n. 7, ♀ ♂.

rectoligatus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Megastylus rectoligatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 105, ♂.
Megastylus retroligatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 77, ♀.

MYRIARTHRUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 172 n. 15.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 102.
μυρίος, permultus; ἄρθρον, membrum.

Synon.: Megastylus Schiödte, Marshall, Holmgren, Thomson.
Plectiscus Gravenhorst.

aemulus Först. — (♀) ♂ — Eur.: Germania.
Myriarthrus aemulus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 103, ♂.
? Myriarthrus aemulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 202, ♀ ♂.

cingulator Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Myriathrus cingulator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 103, ♀ ♂.
Myriathrus cingulator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 202, ♂.
Megastylus (Myriarthrus) cingulator Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1314 n. 9, ♀ ♂.

flavopictus (Grav.) Först. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Plectiscus flavopictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 983 n. 341.
Megastylus flavopictus Marshall, Catal. Brit. Hymen III. 1872 p. 70 n. 5.
Myriarthrus flavopictus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 103, ♂.

lineator (Schiödte) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia, Dania, Germania.
Megastylus lineator Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 7 n. 5, ♀.
Megastylus lineator Schiödte, Naturh. Tidsskr. III. 1847 p. 98 n. 5.

Megastylus lineator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1855 Tryph. P. 3. p. 129 n. 4, ♀.
Megastylus lineator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 104.
Megastylus (Myriarthrus) lineator Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1314 n. 10, ♀ ♂.
pumilio (Först.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Megastylus pumilio Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 105.
Megastylus pumilio Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 76, ♀.
Megastylus (Myriarthrus) pumilio Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1315 n. 12, ♀ ♂.
rufipleuris Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Myriarthrus rufipleuris Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 103, ♀.
Myriarthrus rufipleuris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 201, ♂.
Megastylus (Myriarthrus) rufipleuris Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1315 n. 11, ♀ ♂.

HEMIPHANES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 172 n. 14.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 100 n. 15.
ἡμι-, semi-; *φαίνω*, monstro.

flavipes Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Hemiphanes flavipes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 101 n. 1, ♂.
Hemiphanes flavipes Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1318 n. 1, ♀ ♂.
gravator Först. — ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Hemiphanes gravator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 102 n. 2, ♂.
Hemiphanes gravator Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1318 n. 2, ♂.

POLYAULON

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 171 n. 13.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 99 n. 14.
πολύς, multum; *αὐλών*, vallis.

atratus Först. — Eur.: Germania.
Polyaulon atratus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 100.
contrarius Först. — Eur.: Germania.
Polyaulon contrarius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 100.
coxalis Först. — Eur.: Germania.
Polyaulon coxalis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 100.
fuscipes Först. — Eur.: Germania.
Polyaulon fuscipes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 100.
fusculus Först. — Eur.: Germania.
Polyaulon fusculus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 100.
incertus Först. — Eur.: Germania.
Polyaulon incertus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 100.
isomorphus Först. — Eur.: Germania.
Polyaulon isomorphus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 100.
pleuralis Först. — Eur.: Germania.
Polyaulon pleuralis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 100.
rufipes Först. — Eur.: Germania.
Polyaulon rufipes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 100.
timidus Först. — Eur.: Germania.
Polyaulon timidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 100.
ultorius Först. — Eur.: Germania.
Polyaulon ultorius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 100.

ATELEUTE

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 171 n. 12.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 98 n. 13.
ἀ-priv.; τελευτή finis.

elongata Davis — ♀ — Am.: New Jersey.
Ateleute elongatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 362, ♀.
linearis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Ateleute linearis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 99, ♂.

APOCLIMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 171 n. 11.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 97 n. 12.
ἀπόκλιμα, declivitas.

signaticorne Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Apoclima signaticorne Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1881 p. 98, ♂.

DICOLUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 171 n. 10.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 96 n. 11.
δίκωλος, binodis.

Synon.: Megastylus Thomson.

excubitor Först. — ♀ — Patria?
Dicolus excubitor Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 97, ♀.
Megastylus (Dicolus) excubitor Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1316 n. 15, ♀.
insectator Först. — ♀ ♂ — Patria?
Dicolus insectator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 97, ♀.
Megastylus cruentator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 104, ♂ [[excl. ♀].
Megastylus (Dicolus) insectator Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1316 n. 16, ♀ ♂.
pectoralis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Dicolus pectoralis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 97, ♀ ♂.
Megastylus (Dicolus) pectoralis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1315 n. 13, ♀ ♂.
subtiliventris Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Dicolus subtiliventris Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 97, ♀.
Dicolus subtiliventris Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1887 p. 368.
Megastylus (Dicolus) subtiliventris Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1315 n. 14, ♀.

HELICTES

Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1838 p. 115.
ἑλίσσω, volvo.

Synon.: Idioxenus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 171 n. 9.
ἴδεος, proprius; ξένος, peregrinus.

Brephoctonus Förster.
Cryptus Haliday.
Ichneumon Gravenhorst.
Megastylus Schiödte.
Plectiscus Gravenhorst, Holmgren.

borealis (Holmgr.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Megastylus borealis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1855 P. 3. Tryph. p. 129 n. 3, ♀ ♂.
Idioxenus borealis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 77, ♀.
Helictes borealis m.

clypeatus (Först.) D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Idioxenus clypeatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 95, ♀.
Helictes clypeatus m.

conspicuus (Först.) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Idioxenus conspicuus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 95, ♂.
Helictes conspicuus m.

coxalis (Först.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Idioxenus coxalis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 95, ♀ ♂.
Megastylus (Helictes) coxalis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1312 n. 3, ♀.

erythrostomus (Gmel.) Hal. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 70 n. 351.
Ichneumon erythrostoma Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2721 n. 396.
Plectiscus erythrostoma Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 718, ♂.
Plectiscus erythrostoma Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 988 n. 345, ♂.
Helictes erythrostoma Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 115, ♂.
Cryptus (Helictes) fulvicornis Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 115, ♀.
Helictes erythrostoma Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 58.
Plectiscus erythrostoma Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 60 n. 1, ♂.
Myriarthrus erythrostoma Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 103, ♀.
Plectiscus erythrostoma Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 2. 1877 p. 7.
Megastylus (Helictes) erythrostoma Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1311 n. 1, ♀ ♂.

impurator (Grav.) Hal. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Plectiscus impurator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 982 n. 340, ♀ ♂.
Helictes impurator Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 115.
Plectiscus impurator Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 58.
Brephoctonus impurator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 79.

inaequalis (Först.) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Idioxenus inaequalis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 95, ♂.
Helictes inaequalis m.

inquilinus (Först.) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Idioxenus inquilinus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 95, ♂.
Helictes inquilinus m.

intricator (Först.) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Idioxenus intricator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 95, ♂.
Helictes intricator m.

invalidus (Först.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Idioxenus invalidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 95, ♀ ♂.
Idioxenus invalidus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 77, ♂.
Helictes invalidus m.

mediator (Schiödte) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Dania, Germania.
Megastylus mediator Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 5 n. 2, ♀.
Megastylus mediator Schiödte, Naturh. Tidsskr. III. 1847 p. 97 n. 2, ♀.
Megastylus mediator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1855 P. 3. Tryph. p. 129 n. 2, ♂.
Idioxenus mediator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 95, ♀ ♂.
Idioxenus mediator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 77, ♂.
Megastylus (Helictes) mediator Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1312 n. 2, ♀ ♂.

pilicornis Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Megastylus (Helictes) pilicornis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1312 n. 4, ♀.
polymerus (Först.) D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Idioxenus polymerus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 95, ♀.
Helictes polymerus m.
propinquus (Först.) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Idioxenus propinquus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 95, ♂.
Helictes propinquus m.
ruficornis Davis — ♂ — Am.: Illinois.
Helictes ruficornis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 245, ♂.
tetraglyptus (Först.) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Idioxenus tetraglyptus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 95, ♂.
Helictes tetraglyptus m.
variator (Först.) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Idioxenus variator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 95, ♂.
Helictes variator m.
varius Hal. — ♂ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Helictes) varius Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 115, ♂.

ANISERES

Förster, Verh. naturh. Verh. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 73 & 92 n. 9.
ἀ-priv.; ἰσήρης, aequiparens.

lubricus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Aniseres lubricus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 93 n. 2, ♂.
pallidipes Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Aniseres pallipes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 93 n. 1, ♂.

MIOMERIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 171 n. 8.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 91 n. 8.
μείων, major; μέρος, pars.

aquisgranensis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Miomeris Aquisgranensis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 92, ♀ ♂.
Miomeris Aquisgranensis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1317 n. 1, ♀ ♂.
glabriventris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Miomeris glabriventris Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1317 n. 2, ♀ ♂.
nasonii Davis — ♀ — Am.: Illinois.
Miomeris Nasoni Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 244, ♀.
rectangulus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Miomeris rectangulus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1317 n. 13, ♀ ♂.

CYRTOCENTRUS

Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 6.
Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 793.
κρυπτός, brevis; κέντρον, aculeus.

quebecensis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Cyrtocentrus Quebecensis Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 7, ♀.
Cyrtocentrus Quebecensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 794, ♀.

NEMIOBLASTUS

Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 901.
νῆμα, filum; βλαστάνω, cresco.

Synon.: Polyblastus Schiödte, Holmgren, Brischke, Thomson.

albicoxus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Polyblastus (Nemioblastus) albicoxa Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 901 n. 4, ♀.
melanostigmus (Holmgr.) Thoms. — ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 29, ♂.
Polyblastus melanostigmus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1855 P. 3. Tryph. p. 214
Polyblastus melanostigmus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 100, ♂.
Polyblastus (Nemioblastus) melanostigma Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 901 n. 3.
palaemon (Schiödte) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Dania, Germania.
Polyblastus Palaemon Schiödte, Magas. de zool. IX 1839 P. 6-10. p. 13 n. 2, ♀ ♂; T. 7 F. 1 (♂).
Polyblastus Palaemon Schiödte, Naturh. Tidsskr. III. 1847 p. 98 n. 7.
Polyblastus Palaemon Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. Tryph. p. 211 [n. 22, ♀ ♂ & I. 2. 1856 P. 5. p. 387.
Polyblastus Palaemon Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 93, ♀ ♂.
Polyblastus Palaemon Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 99, ♀ ♂.
Polyblastus (Nemioblastus) Palaemon Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 901 n. 5, ♀.

PLECTISCUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 978 n. 12.
πλήκτης, pugnax.

Synon.: Cryptus Haliday.
Mesochorus Provancher.
Phytodietus Provancher.
Tryphon Provancher.

abditus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus abditus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 90, ♂.
agitator Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus agitator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 89, ♀.
ambiens Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus ambiens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 91, ♂.
bidentulus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus bidentulus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 91, ♂.
binodulus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus binodulus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 89, ♀.
bistriatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Plectiscus bistriatus Thomson, Opusc. entom. XII. 1888 p. 1299 n. 4, ♀ ♂.
brachyurus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus brachyurus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 87, ♀.
? Plectiscus brachyurus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 201, ♀ ♂.
canaliculatus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Plectiscus canaliculatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 86, ♀.
? Plectiscus canaliculatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 201.
Plectiscus canaliculatus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1303 n. 13, ♀ ♂.
Plectiscus canaliculatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 432.

---

[1] *Hymen.:* Nematus salicis, N. ochraceus (Schiödte).

cinctulus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus cinctulus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 89, ♀.
collaris Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Plectiscus collaris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 987 n. 344, ♀.
Cryptus (Plectiscus) collaris Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 116.
Plectiscus collaris Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 89, ♀.
Plectiscus collaris Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1300 n. 6, ♀ ♂.
communis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus communis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 86, ♀ & 91, ♂.
Plectiscus communis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 200, ♀.
Plectiscus communis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1299 n. 3.
conjunctus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus conjunctus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 87, ♀.
connexus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus connexus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 89, ♀.
cooperator Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus cooperator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 91, ♂.
coxator Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus coxator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 86, ♀.
crassicornis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Plectiscus crassicornis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 89, ♀.
Plectiscus nefastus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 89, ♂.
Plectiscus crassicornis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1301 n. 8, ♀ ♂.
curticaudus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Plectiscus curticauda Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1302 p. 9, ♀.
deterior Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus deterior Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 88, ♀.
determinatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus determinatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 88, ♀.
discolor Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus discolor Förster, Verh. naturh. Verh. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 91, ♂.
disjunctus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus disjunctus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 91, ♂.
distinctus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus distinctus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl, XXVIII. 1871 p. 88, ♀.
elumbis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus elumbis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 90, ♂.
enixus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus enixus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 91, ♂.
erythropygus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus erythropygus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 88, ♀.
eurystigma Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Plectiscus eurystigma Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1301 n. 7, ♀.
eversorius Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus eversorius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 88, ♀.
filiformis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus filiformis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 90, ♂.
flavicentratus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus flavicentratus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 90, ♂.
flavizonus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus flavizonus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 88, ♀.

fraternus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus fraternus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 87, ♀.
fulvus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus fulvus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 86, ♀.
fuscicornis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus fuscicornis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 90, ♂.
gilvus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus gilvus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 86, ♀ & 91, ♂.
gracilis (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Phytodietus gracilis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 331.
Plectiscus gracilis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 210, ♀.
Plectiscus gracilis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 362, ♀.
Plectiscus gracilis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 245, ♀.
habilis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus habilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 88, ♀.
helvolus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus helvolus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 86, ♀.
hostilis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus hostilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 88, ♀.
humeralis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Plectiscus humeralis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 86, ♀.
Plectiscus humeralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 200, ♀.
Plectiscus humeralis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1303 n. 12, ♀ ♂.
hyperboreus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Speetsbergen.
Plectiscus hyperboreus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. VIII. P. 5. 1869 p. 21, ♀ ♂.
jejunus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus jejunus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 91, ♂.
inanis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus inanis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 91, ♂.
incertus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus incertus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 86, ♀.
infirmus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus infirmus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 86, ♀.
iniquus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus iniquus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 90, ♂.
integer Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus integer Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 89, ♂.
laticinctus (Cress.) Davis — ♀ — Am.: Mexico.
Tryphon? laticinctus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 36 n. 2, ♀.
Plectiscus laticinctus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 245.
longicornis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus longicornis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 90, ♂.
maerens Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus moerens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 87, ♀.
? Plectiscus moerens Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 201, ♀.
melanocerus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus melanocerus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 87, ♀.
melanostomus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus melanostomus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 90, ♂.

mendicus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus mendicus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 88, ♀.
Plectiscus mendicus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 201, ♀.
mesoxanthus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus mesoxanthus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 88, ♀.
monochrocerus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus monochrocerus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 91, ♂.
monticola Först. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Plectiscus monticola Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 89, ♀.
Plectiscus monticola Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1302 n. 10, ♀.
niger Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Plectiscus niger Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 6 n. 2, ♀ ♂.
Plectiscus niger Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 793 n. 2, ♀ ♂.
Plectiscus niger Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 245, ♀ ♂.
nigritus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus nigritus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 86, ♀.
pallidipes Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus pallipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 981 n. 339, ♀.
parviceps Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus parviceps Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 90, ♂.
parvulus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus parvulus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 86, ♀.
peregrinus Ruthe — ♀ — Eur.: Islandia.
Plectiscus peregrinus Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 370 n. 53, ♀.
petiolatus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus petiolatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 87, ♀.
? Plectiscus petiolatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 201, ♀ ♂.
pleuralis (Cress.) Davis — ♀ — Am.: New Jersey.
Tryphon pleuralis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 275 n. 5, ♀.
Plectiscus pleuralis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 245, ♀.
posticatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus posticatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 87, ♀.
praedatorius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus praedatorius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 91, ♂.
praepositus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus praepositus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 89, ♀.
procerus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus procerus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 90, ♂.
provancheri D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Plectiscus pleuralis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 330 [nec Cresson].
Mesochorus pleuralis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 209 n. 2, ♀.
Mesochorus pleuralis Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 3 n. 2.
Mesochorus pleuralis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 381 & 791 n. 2, ♀.
Plectiscus pleuralis Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 188.
Plectiscus Provancheri m.
proximus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus proximus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 88, ♀.
sodalis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Plectiscus sodalis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 88, ♀.
Plectiscus sodalis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1303 n. 15, ♀ ♂.

spilotus Först. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Plectiscus spilotus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 90, ♂.
Plectiscus spilotus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 201, ♂.
subangulatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus subangulatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 88, ♀.
subcompletus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus subcompletus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 90, ♂.
subcurvatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus subcurvatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 89, ♀.
subsimilis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus subsimilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 86, ♀.
subteres Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Plectiscus subteres Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1300 n. 5, ♀.
subtilicornis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus subtilicornis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 90, ♂.
subtilis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus subtilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 86, ♀.
Plectiscus subtilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 201, ♀.
tantillus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Plectiscus tantillus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 90, ♂.
tener Först. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Plectiscus tener Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 86, ♀.
Plectiscus tener Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 432, ♀ ♂.
tenthredinarum Gir.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Plectiscus tenthredinarum Giraud, Ann.soc.entom.France (5) I. 1871 p.387, 388 & 396 n.6, ♀ ♂.
tenuicornis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Plectiscus tenuicornis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 86, ♀.
Plectiscus tenuicornis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1303 n. 14, ♀ ♂.
terebrator Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Plectiscus terebrator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 87, ♀.
Plectiscus terebrator Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1302 n. 11, ♀.

DIALIPSIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 171 n. 6.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 83 n. 6.
διάλειψις, interruptio.

Synon.: Plectiscus Thomson.

conjuncta Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Dialipsis conjuncta Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 84, ♀.
crassipes Thoms. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Plectiscus (Dialipsis) crassipes Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1304 n. 16, ♀ ♂.
diversa Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Dialipsis diversa Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 84, ♀.
exilis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Dialipsis exilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 84, ♀ ♂.
intermedia Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Dialipsis intermedia Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 84, ♀.

---

[1]) *Hymen.:* Dineura verna; Selandria melanocephala (Giraud).

mesomelana Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Dialipsis mesomelana Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 84, ♀.
observatrix Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Dialipsis observatrix Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 84, ♀ ♂.
pallida Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Dialipsis pallida Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 84, ♀.

BLAPTICUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 171 n. 5.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 82 n. 5.
βλαπτικός, mortifer.

crassulus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Blapticus crassulus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1289 n. 2, ♀ ♂.
dentifer Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Blapticus dentifer Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1288 n. 1, ♀ ♂.
leucostomus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Blapticus leucostomus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 83, ♂.
Blapticus leucostomus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1291 n. 5, ♂.

ENTYPOMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 171 n. 4.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 81 n. 4.
ἐντύπωμα, depressio.

Synon.: Entypomus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1289.
ἐντύπωμα, depressio.
Blapticus Thomson.

robustum Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Entypoma robustum Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 82, ♀ ♂.
Blapticus (Entypomus) robustus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1289 n. 3.

HOLOMERISTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 171 n. 3.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 80 n. 3.
ὅλος, totus; *μεριστός*, divisus.

tenuicinctus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Holomeristus tenuicintus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 81, ♀.
Holomeristus tenuicinctus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1296 n. 1, ♀ ♂.

APERILEPTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 170 n. 2.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 75 n. 2.
ἀ-περί λεπτός, non definitus.

Synon.: Cryptus Haliday.
Phytodietus Blanchard.
Plectiscus Gravenhorst.

adversarius Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Aperileptus adversarius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 77, ♀.
Aperileptus adversarius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 199, ♀ ♂.

albipalpus (Grav.) Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Plectiscus albipalpus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 986 n. 343, ♀ ♂.
Cryptus (Plectiscus) albipalpus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 116.
Phytodietus (Plectiscus) albipalpus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 316 n. 5.
Aperileptus albipalpus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 77&79, ♀ ♂.
Aperileptus albipalpus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 200, ♀.
Plectiscus (Aperileptus) albipalpus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1298 n. 1, ♀ ♂.
conformis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Aperileptus conformis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 79, ♂.
custodiator Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus custodiator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 78, ♀.
electus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus electus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 78, ♀.
euryzonus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus euryzonus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 78, ♀.
exstirpator Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus exstirpator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 78, ♀.
filiventris Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Aperileptus filiventris Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 79, ♂.
flavus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus flavus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 76, ♀.
frontalis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus frontalis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 78, ♀.
fungicola Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus fungicola Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 77, ♀.
immundus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus immundus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 76, ♀.
impacatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus impacatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 78, ♀.
impurus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus impurus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 76, ♀.
inamoenus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Aperileptus inamoenus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 79, ♂.
Aperileptus inamoenus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 200, ♂.
inclinans Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Aperileptus inclinans Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 79, ♂.
Aperileptus inclinans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 200, ♂.
infuscatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus infuscatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 77, ♀.
labilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Aperileptus labilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 79, ♂.
languidus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Aperileptus languidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 79, ♂.
melanopsis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus melanopsis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 78, ♀.
meritus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus meritus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 78, ♀.
microspilus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Aperileptus microspilus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 77, ♀.
Aperileptus microspilus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 200, ♂.

notabilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Aperileptus notabilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 79, ♂.
obliquus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Plectiscus (Aperileptus) obliquus Thomson, Opusc. entom. XII. 1888 p. 1298 n. 2, ♀ ♂.
penetrans Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus penetrans Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 76, ♀.
penuria Davis — ♂ — Am.: Canada.
Aperileptus penuria Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 244, ♂.
placidus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus placidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 77, ♀.
plagiatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus plagiatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 78, ♀.
secretus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus secretus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 78, ♀.
spoliator Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus spoliator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 77, ♀.
sternoxanthus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Aperileptus sternoxanthus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 79, ♂.
subsignatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus subsignatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 79, ♀.
tricinctus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus tricinctus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 77, ♀.
tropicus Davis — ♂ — Am.: California.
Aperileptus tropicus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 244, ♂.
tutorius Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus tutorius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 77, ♀.
vacuus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus vacuus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 77, ♀.
vanus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus vanus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 78, ♀.
viduatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus viduatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 78, ♀.
vilis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aperileptus vilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 77, ♀.
vittiger Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Aperileptus vittiger Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 79, ♂.

CATOMICRUS

Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1292.

κάτω, deorsum; *μικρός*, parvus.

trichops Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Catomicrus trichops Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1293 n. 1, ♀ ♂.

CATASTENUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 170 n. 1.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 74 n. 1.

κατά-στενος, strictissimus.

Synon.: Mesoleptus Provancher.
Phygadenon Provancher.

femoralis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Catastenus fermoralis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 75 n. 1, ♀.
Catastenus femoralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 199, ♀.
Catastenus femoralis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1292 n. 1, ♀ ♂.
glabrifrons Davis — ♂ — Am.: Illinois.
Catastenus glabrifrons Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 243, ♂.
rufulus (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, New Hampshire.
Phygadenon rufulus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 76 n. 29, ♀.
Mesoleptus rufulus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 229 n. 16.
Mesoleptus rufulus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 353 n. 29.
Phygadenon rufulus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén 1883 p. 322 n. 29, ♀.
Mesoleptus rufulus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 402 n. 16 & p. 775 n. 29.
Catastenus rufulus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1893 p. 243, ♀ ♂.
trifasciatus Ashm. — Am.: Bering ins.
Catastenus trifasciatus Ashmead, Fur Seals & Fur Seals Islands IV. 1899 p. 336.
valerius Davis — ♀ — Am.: Illinois.
Catastenus valerius Davis. Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 243, ♀.

MACROCHASMUS

Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1279.
μακρός, longus; χάσμη, hiatus.

alysiina Thoms. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Macrochasmus alysiina Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1279 n. 1, ♀.

CAMPOTHREPTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 201 n. 6.
κάμπος, balaena; θρεπτός, nutritio.

Synon.: Grypocentrus Cresson.
Mesoleptus Cresson.
Tryphon Cresson.

nasutus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Michigan, Illinois, Pennsylvania, North-Carolina, [Colorado.
Mesoleptus nasutus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. (1868) p. 103.
Tryphon ? nasutus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. (1868) p. 107, ♀ ♂.
Grypocentrus nasutus Cresson, Synops. Hymen. Amer. (1887) p. 211.
Campothreptus nasutus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. (1897) p. 247, ♀ ♂.

GRYPOCENTRUS

Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 51.
γρυπός, curvatus; κέντρον, aculeus.

albipes Ruthe — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Grypocentrus albipes Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 56 n. 3, ♀ ♂.
Grypocentrus albipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 p. 194 n. 3, ♀ ♂; Tryph. [P. 3.
anomalus Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Grypocentrus anomalus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 89, ♂.
Grypocentrus anomalus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 94, ♀ ♂.
apicalis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Grypocentrus apicalis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 905 n. 1, ♀ ♂.

basalis Ruthe — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Grypocentrus basalis Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 57 n. 4, ♀ ♂.
Grypocentrus basalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. Tryph. p. 196 n. 4, ♀.
bipunctatus Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Grypocentrus bipunctatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 358, ♀.
cinctellus Ruthe — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Grypocentrus cinctellus Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 54 n. 1, ♀.
Grypocentrus cinctellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. Tryph. p. 193 [n. 1, ♀.
Grypocentrus cinctellus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 94, ♀ ♂.
dubius Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Grypocentrus dubius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 94, ♀.
incisulus Ruthe — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Grypocentrus incisulus Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 55 n. 2, ♀ ♂.
Grypocentrus incisulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. Tryph. p. 194 n. 2, [♀ ♂.
Grypocentrus incisulus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 89, ♀ ♂.
Grypocentrus incisulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 94, ♀ ♂.
lucidus Brischke[1] — ♀ — Eur.: Germania.
Grypocentrus lucidus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 1. 1888 p. 11, ♀.

CNEMISCHYS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 201 n. 4.
κνήμη, tibia; *ἰσχύς*, robur.

Species exstat.

NOTOMERIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 201 n. 3.
νῶτος, dorsum; *μερίς*, portio.

glabrosus Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Notomeris glabrosus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 242, ♀.

SYNAEMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 201 n. 2.
σύναιμος, consanguineus.

Species exstat.

ADELOGNATHUS

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 196.
ἀδηλέω, incertus sum; *γνάθος*, maxilla.

Synon.: Hemiteles Gravenhorst, Taschenberg, Brischke.
Mesoleptus Cresson.
Polysphincta Holmgren, Fitch.
Tryphon Gravenhorst, Stephens.

aciculatus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Adelognathus aciculatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 879 n. 9, ♀.
Adelognathus aciculatus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1275 n. 7.

---

[1] *Hymen.:* Blennocampa apicalis (Brischke).

brevicornis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Adelognathus brevicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. Tryph. p. 197 [n. 1, ♀ ♂.
Adelognathus brevicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 95, ♀ ♂.
Adelognathus brevicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 40, ♀.

chrysopygus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles chrysopygus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 839 n. 267, ♀.
Hemiteles chrysopygus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 121 n. 4, ♀.
Hemiteles chrysopygus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VI. 1881 p. 347, ♀.
Adelognathus chrysopygus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 879 n. 7.
Adelognathus chrysopygus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1277 n. 12.
Adelognathus chrysopygus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 118, 127 & 527 n. 82, [♀ ♂.

difformis Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Adelognathus difformis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. Tryph. p. 200 [n. 8, ♀.
Adelognathus difformis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1278 n. 18, ♀.

dimidiatus Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Adelognathus dimidiatus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1276 n. 10, ♀.

facialis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Adelognathus facialis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 880 n. 11, ♀.
Adelognathus facialis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1278 n. 17.

fasciatus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Adelognathus fasciatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 878 n. 4, ♀.
Adelognathus fasciatus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1275 n. 5.

flavopictus Davis — ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Adelognathus flavopictus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 242, ♀ ♂.

frigidus Holmgr. — ♂ — As.: Waigiou.
Adelognathus frigidus Holmgren, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 153 n. 29, ♂.

levicollis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Adelognathus laevicollis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 878 n. 5, ♀ ♂.
Adelognathus laevicollis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1275 n. 4.

limbatus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Adelognathus limbatus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1275 n. 9, ♀.

marginellus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Adelognathus marginellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. Tryph. p. 199 [n. 7, ♀.

nanus (Grav.) Holmgr. — ♀ — Eur.: Britannia.
Tryphon nanus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 155 n. 100, ♀.
Tryphon nanus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 236 n. 17.
Adelognathus nanus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. Tryph. p. 196.

nigriceps Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Adelognathus nigriceps Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1274 n. 3, ♀.

nigricornis Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Adelognathus nigricornis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1276 n. 13, ♀.

nigrifrons Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Adelognathus nigrifrons Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. Tryph. p. 197 [n. 2, ♀.
Adelognathus nigrifrons Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1273 n. 1, ♀.

pallidipes Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Adelognathus pallipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. Tryph. p. 198 n. 4, [♀ ♂.
Polysphincta pallipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 33 n. 10, ♀ ♂.
? Polysphincta pallipes Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 175.
Adelognathus pallipes Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 878 n. 6, ♀ ♂.
Adelognathus pallipes Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1277 n. 14.

pilosus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Adelognathus pilosus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1277 n. 16, ♀.
pumilio Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Adelognathus pumilio Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. Tryph. p. 199 n. 6, ♀.
puncticollis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Adelognathus puncticollis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 877 n. 1, ♀.
Adelognathus puncticollis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1275 n. 2.
punctiventris Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Adelognathus punctiventris Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 877 n. 2, ♀.
Adelognathus punctiventris Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1276 n. 11.
punctulatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Adelognathus punctulatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 879 n. 10, ♀ ♂.
Adelognathus punctulatus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1275 n. 8.
punctus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 9, ♀.
Adelognathus punctus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. Tryph. p. 200
pusillus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 5, ♀ ♂.
Adelognathus pusillus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. Tryph. p. 198
Adelognathus pusillus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 879 n. 8, ♀ ♂.
Adelognathus pusillus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1277 n. 15.
rotundiceps (Cress.) Davis — ♂ — Am.: Texas.
Mesoleptus ? rotundiceps Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 167, ♂.
Adelognathus rotundiceps Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 242, ♂.
ruthei Holmgr.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀ ♂; T. 8 F. 13.
Adelognathus Ruthei Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. Tryph. p. 198 n. 3,
Adelognathus Ruthei Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. P. 2. 1871 p. 89, ♂.
scabriculus Thoms. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Adelognathus scabriculus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 877 n. 3, ♀.
Adelognathus scabriculus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1275 n. 6.

2. *Subfam.* Cremastinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 141 & 149.

DEMOPHORUS

Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1457.
δῆμος, populus; *φέρω*, porto.

annellatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Demophorus annellatus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1458 n. 2, ♀ ♂.
arenicola Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Norvegia, Germania.
Demophorus arenicola Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1457 n. 1, ♀ ♂.

PARACREMASTUS

Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 9 & 28.
παρά, ad; Cremastus, nom. propr. Hymen.

genalis Szépl. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Paracremastus genalis Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 10 & 28 n. 61, ♀ ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Emphytus filiformis (Brischke).

CREMASTUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 730 n. 8.

κρεμαστός, suspensus.

Synon.: Atractodes Provancher.
Ichneumon Ratzeburg.
Mesoleptus Provancher.
Ophion Blanchard.
Porizon Zetterstedt.

aciculatus Davis — ♂ — Am.: Michigan.
Cremastus aciculatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 364, ♂.
albifrons Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Cremastus albifrons Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 517 n. 1, ♀.
albipennis (Zett.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Porizon albipennis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 396 n. 12, ♂.
Cremastus albipennis Holmgren, Svensk.Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 109 n. 5,
Cremastus albipennis Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 9 & 28 n. 60. [♀ ♂.
annulatus Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Cremastus annulatus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 6 & 25 n. 52, ♀.
annulicornis Tosqu. — ♀ — Afr.: Delagoa Bay.
Cremastus annulicornis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 416 n. 1, ♀.
arenosus Szépl. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Cremastus arenosus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 1 & 21 n. 44, ♀ ♂.
balteatus Voll. — ♂ — As.: Batavia.
Cremastus balteatus Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXI. 1878 p. 169 n. 16, ♂; T. 10 F. 6.
bellicosus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Cremastus bellicosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 741 n. 157, ♀ ♂.
Cremastus bellicosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8 (Oph.) p. 110 n. 8, ♀ ♂.
Cremastus bellicosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 178, ♀ ♂.
Cremastus bellicosus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1454 n. 14, ♀ ♂.
Cremastus bellicosus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 9 & 28 n. 59.
binotatus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cremastus binotatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 740 n. 156, ♂.
Cremastus binotatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 178, ♂.
Cremastus binotatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 67, ♀ ♂.
buolianus Curt.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Cremastus Buolianus Curtis, Trans. Entom. Soc. London (2) III. P. 2. 1854 p. 60, ♀ ♂.
caudatus Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Cremastus caudatus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 3 & 22 n. 46, ♀.
confluens Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Cremastus confluens Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 735 n. 152, ♀.
Cremastus confluens Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1452 n. 9, ♀ ♂.
cookii Weed[3]) — ♀ ♂ — Am.
Cremastus Cookii Weed, Entom. Amer. IV. 1888 p. 150, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Retinia Buoliana (Curtis).
2) *Lep.:* Retinia Buoliana (Girard).
3) *Lep.:* Phoxopteryx comptana (Weed).

crassicornis Thoms.[1]) — ♂ — Eur.: Italia, Bavaria.
Cremastus crassicornis Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1454 n. 16, ♂.
Cremastus crassicornis Magretti, Atti soc. Ital. sc. nat. XXXVI. 1896 p. 85.
decoratus Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Cremastus decoratus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 734 n. 151, ♀ ♂.
Cremastus decoratus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 178, ♂.
Cremastus decoratus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1452 n. 8, ♀ ♂.
Cremastus decoratus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 9 & 28 n. 56, ♀ ♂.
discoidalis Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Cremastus discoidalis Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 6 & 25 n. 53, ♀.
ferrugineus Davis — ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Cremastus ferrugineus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 364, ♀ ♂.
flavipes Brullé — ♂ — Afr.: Senegal.
Cremastus flavipes Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 181 n. 1, ♂.
forbesii Weed — Am.: Illinois.
Cremastus Forbesi Weed, Bull. Illinois Labor. Nat. Hist. III. 1890 p. 42.
fusiformis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Mesoleptus incompletus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 270.
Atractodes fusiformis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 332.
Cremastus fusiformis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 184 n. 2, ♀.
Cremastus fusiformis Provancher, Natural. Canad. XII. 1882 p. 366 n. 2.
Cremastus fusiformis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 376 & 788 n. 2.
geminus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cremastus geminus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 744 n. 158, ♀.
Cremastus geminus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1454 n. 13, ♀ ♂.
granulatus Davis — ♀ ♂ — Am.: Michigan.
Cremastus granulatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 365, ♀ ♂.
guttifer Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cremastus guttifer Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1449 n. 4, ♀ ♂.
hartii Ashm. — Am.: Illinois.
Cremastus Hartii Ashmead, Bull. Illinois Labor. IV. 1895 p. 277; Fig. 13.
hungaricus Szépl. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Cremastus Hungaricus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 8 & 27 n. 55, ♀ ♂.
infirmus Grav.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
? Ophion moderator Gravenhorst, Vergl. Uebers. zool. System. 1807 p. 268 n. 3794.
? Ophion moderator Gravenhorst, Nova acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 295.
Cremastus infirmus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 746 n. 160, ♀ ♂.
Cremastus infirmus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 22 n. 2, ♀.
Cremastus infirmus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 110 n. 7, ♀ ♂.
Cremastus infirmus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 178, ♀ ♂.
Cremastus infirmus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1452 n. 5, ♀ ♂.
interruptor Grav.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Cremastus interruptor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 736 n. 153, ♀ ♂.
Ichneumon (Cremastus) interruptor Ratzeburg, Forstinsecten III. 1844 p. 26 n. 12; T. 7 F. 2.
Cremastus interruptor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 99 n. 1, ♀ ♂.
Cremastus interruptor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 90 n. 1.

---

[1]) *Lep.:* Psyche Turatii (Kriechbaumer, Magretti).
[2]) *Lep.:* Depressaria badiella (Bridgman), Nothris verbascella (Brischke).
[3]) *Lep.:* Psyche calvella (Gravenhorst).
[4]) *Lep.:* Coccyx buoliana (Ratzeburg), Yponomeuta spec.? Brischke.

Cremastus interruptor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 107 [n. 2, ♀ ♂.
Cremastus interruptus Kolenati, Jahresh. naturw. Sect. mähr.-schles. Ges. f. Ackerbau etc. f. [1858 p. 47 n. 16, ♂.
Cremastus interruptor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 178, ♀ ♂.
Cremastus interruptor Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1450 n. 7, ♀ ♂.

leviusculus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Cremastus laeviusculus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1454 n. 15, ♀ ♂.

lineatus Grav. — ♂ — Eur.
Cremastus lineatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 739 n. 154, ♂.

lucidus Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Cremastus lucidus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 4 & 23 n. 48, ♀.

luctuosus Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Cremastus luctuosus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 51, ♂.

macrostigma Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Cremastus macrostigma Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1448 n. 3, ♀.

nemoralis Davis — ♀ ♂ — Am.: Michigan.
Cremastus nemoralis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 364, ♀ ♂.

oculatus Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Cremastus oculatus Szépligeti, Termész. Füzet. XXXIII. 1900 p. 1 & 21 n. 43, ♂.

ophthalmicus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia. [n. 3, ♂.
Cremastus ophthalmicus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 108

ornatus Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Cremastus ornatus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 3 & 32 n. 47, ♂.

pallidus Kriechb. — ♀ — Afr. or. [n. 8, ♀.
Cremastus pallidus Kriechbaumer, Magretti: Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 243 & 530

partitus Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Cremastus partitus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 2 & 22 n. 45, ♂.

piceus Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Cremastus piceus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 176, ♀.
Cremastus piceus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 363 n. 6, ♀.

pictus Holmgr. — ♀ — Afr.: Cap.
Cremastus pictus Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 419 n. 58, ♀.

pleurovittatus Costa — ♀ — Eur.: Sardinia.
Cremastus pleurovittatus A. Costa, Atti accad. sc. fis. & nat. Napoli (2) I. 1883 p. 100, ♀.
Cremastus pleurovittatus A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1884 p. 337.

puberulus Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Cremastus puberulus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 4 & 24 n. 49, ♀.

punctulatus Ratzb.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cremastus punctulatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 85 n. 2, ♀ ♂.

pungens Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia.
Cremastus pungens Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 745 n. 159, ♀ ♂.
? Porizon albipennis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 396 n. 12, ♂.
? Cremastus albipennis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 109 n. 5, [♀ ♂.
Cremastus pungens Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1453 n. 11, ♀.
Cremastus pungens Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 9 & 28 n. 58.

radialis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Cremastus radialis Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1453 n. 12, ♀.

---

1) *Lep.:* Coccyx strobilana (Ratzeburg).

rectus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Cremastus rectus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 175.
Cremastus rectus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 184 n. 1, ♀.
Cremastus rectus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 366 n. 1.
Cremastus rectus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 376 & 788 n. 1.
retiniae Cress.[1]) — ♂ — Am.: New York (Ithaca).
Cremastus retiniae Cresson, Comstock: Rep. Entomol. U. St. f. 1879. 1880 p. 238, ♂.
sabulosus Voll. — ♂ — As.: Batavia.
Cremastus sabulosus Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXI. 1878 p. 170 n. 17, ♂; T. 10 F. 7 & 7a (♂).
schoenobius Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cremastus decoratus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 22 n. 1, ♀ ♂ [non Grav.].
Cremastus decoratus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 327 n. 17.
Cremastus decoratus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 107 n. 1, ♀ ♂.
Cremastus schoenobius Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1446 n. 1, ♀ ♂.
signatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Cremastus signatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. Oph. p. 108 n. 4, ♀.
Cremastus signatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. 4. 1880 p. 178, ♀.
Cremastus signatus Thomson, Opusc. entom. P. 4. 1890 p. 1447 n. 2, ♀ ♂.
spectator Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cremastus spectator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 740 n. 155, ♀.
Ophion (Cremastus) spectator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 326 n. 12.
Cremastus spectator Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 60.
Cremastus spectator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 1858 P. 8. (Oph.) p. 109 n. 6, ♀ ♂
Cremastus spectator Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1452 n. 10, ♀ ♂.
Cremastus spectator Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 9 & 28 n. 57, ♀ ♂.
subnasutus Thoms. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Cremastus subnasutus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1450 n. 6, ♀.
szepligetii D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Cremastus pictus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 5 & 24 n. 51, ♀ ♂ [nec Holmgren].
Cremastus Szépligetii m.
variegatus Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Cremastus variegatus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 5 & 24 n. 50, ♀.
variipes Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Cremastus variipes Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 7 & 26 n. 54, ♀.
venustulus Tosqu. — ♀ — Afr.: Aegyptus.
Cremastus venustulus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 417 n. 2, ♀.

3. *Subfam.* Pristomerinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 141 & 149.

PRISTOMERIDIA

Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 100.
πριστός, serra sectus; μέρος, pars.

Synon.: Porizon Cresson.

agilis (Cress.) Ashm. — ♀ — Am.: Texas.
Porizon? agilis Cresson Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 175, ♀.
Pristomeridia agilis Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 100.

---

[1]) *Lep.:* Retinia rigidana (Cresson), R. comstockiana (Fernald), Gelechia beneficentella Murtfeld, Crambus luteolellus Clem. (Webster).

PRISTOMERUS

Curtis, Brit. Entom. XIII. 1836 p. 624.
πριστός, serratus; μηρός, perna.

Synon.: Anomalon Jurine.
Ichneumon Panzer.
Ophion Panzer, Gravenhorst, Blanchard.
Pachymerus Gravenhorst, Blanchard.

cunctator Tosqu. — ♀ — Afr.: Delagoa Bai, Senegal.
Pristomerus cunctator Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 422 n. 3, ♀.
euryptychiae Ashm.[1] — Am.: Columbia.
Pristomerus euryptychiae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 192.
gratiosus Tosqu. — ♀ — Afr.: Algeria.
Pristomerus gratiosus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 419 n. 1, ♀.
luteolus Tosqu. — ♂ — Afr.: Gambia.
Pristomerus luteolus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 421 n. 2, ♂.
mexicanus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Pristomerus Mexicanus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 388 n. 1, ♂.
orbitalis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pristomerus orbitalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 3. (Oph.) p. 147 n. 2, [♀ ♂.
Pristomerus orbitalis Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1456 n. 2, ♀ ♂.
pacificus Cress. — ♀ — Am.: California.
Pristomerus pacificus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 370, ♀.
pallidus Thoms. — ♀ — Eur.: Dalmatia.
Pristomerus pallidus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1456 n. 3, ♀.
sardous D. T. — Eur.: Sardinia.
Pristomerus orbitalis A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 2. 1888 p. 12 [nec Holmgren].
Pristomerus sardous m.
vulnerator (Panz.) Curt.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon vulnerator Panzer, Faun. Insect. German. VI. 1799 fasc. 72 T. 5, ♂.
Ophion vulnerator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 90.
Ophion vulnerator Gravenhorst, Vergl. Uebers. zool. System. 1807 p. 268 n. 3793.
Anomalon vulnerator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 116, ♀.
Ophion vulnerator Gravenhorst, Nov. Acta Acad. Nat. Curios. IX. 1818 p. 295.
Pachymerus vulnerator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 724 n. 149, ♀ ♂.
Ophion vulnerator Gravenhorst, Beitr. z. Entom. Schles. I. 1829 p. 13 n. 6, ♀ ♂; T. 1 F. 6.
Pristomerus vulnerator Curtis, Brit. Entom. XIII. 1836 p. 624, F. 624, ♂.
Ophion (Pachymerus) vulnerator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 326 n. 11.
Pristomerus vulnerator Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 60.
Ichneumon Pachymerus) vulnerator Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 26 n. 14; T. 7 F 1.
Pachymerus vulnerator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 103 n. 1, ♀ ♂.
Pachymerus vulnerator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 86.
Pachymerus vulnerator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 90 n. 1, ♂.
Pachymerus vulnerator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 26 n. 1, ♀ ♂.
Pristomerus vulnerator Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 329 n. 22.
Pristomerus vulnerator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 146 n. 1, [♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Euryptychia saligneana (Ashmead).

2) *Lep.:* Carpocapsa pomonana, Retinia Buoliana, Tortrix Bergmanniana, — *Dipt.:* Anthomyia albimana (Brischke).

Pristomerus vulnerator Curtis, Farm Insects 1860 p. 414.
Pristomerus vulnerator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 197, ♀♂.
Pristomerus vulnerator Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1456 n. 1, ♀ ♂.

4. *Subfam.* Porizontinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 141 & 147.

ASTRENIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 148 n. 13.
ἀ-priv.; στρηνής, asper.

Species exstat.

ISURGUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 148 n. 14.
ἰσουργός, paria faciens.

brachygaster Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Isurgus brachygaster Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 224 & 240 n. 26, ♀.
diversus Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Isurgus diversus Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 225 & 241 n. 31, ♂.
lanceolatus Szépl. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Isurgus lanceolatus Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 224 & 241 n. 27, ♀ ♂.
major Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Isurgus major Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 226 & 242 n. 34, ♀.
microgaster Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Isurgus microgaster Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 225 & 241 n. 29, ♀.
minutus Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Isurgus minutus Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 226 & 242 n. 33, ♀.
nigriceps Ashm. — ♀ — Am.: St. Vincent.
Isurgus nigriceps Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 273 n. 190, ♀.
petiolaris Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Isurgus petiolaris Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 224 & 243 n. 28, ♀.
rufipes Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Isurgus rufipes Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 225 & 241 n. 30, ♂.
similis Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Isurgus similis Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 225 & 242 n. 32, ♀.

EUTOMUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 148 n. 12.
εὔτομος, sectu facilis.

Species exstat.

PHRADIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 148 n. 11.
φραδής, consultus.

brevis Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Thersilochus (Phradis) brevis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 195, ♀♂.
monticola Szépl. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Phradis monticola Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 223 & 240 n. 25, ♀ ♂.

ISCHNOBATIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 148 n. 10.
ἰσχνός, macer; βατίς, raja.

Synon.: Porizon Brischke.
Thersilochus Brischke.

albipennis Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Ischnobatis albipennis Szépligeti, Term ész. Füzet. XXII. 1899 p. 221 & 238 n. 21, ♂.
flavigastra Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Ischnobatis flavigaster Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 222 & 239 n. 23, ♀.
flavipes Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Ischnobatis flavipes Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 223 & 239 n. 24, ♀.
lucida Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Ischnobatis lucidus Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 222 & 238 n. 22, ♂.
nigritula (Grav.) Brischke — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Porizon nigritulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 782 n. 176, ♀. [p. 194, ♀.
Thersilochus (Ischnobatis) nigritulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880
punctulata Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Ischnobatis punctulatus Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 221 & 238 n. 20, ♀.
stramineipes Brischke [1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania. [1880 p. 194, ♀ ♂.
Thersilochus (Ischnobatis) stramineipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4.

HETEROCOLA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 148 n. 9.
ἑτερός, alter; κόλος, truncatus.

Synon.: Thersilochus Thomson.

proboscidalis (Thoms.) Szépl. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Bavaria, Hungaria.
Thersilochus proboscidalis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1388 n. 14, ♀ ♂.
Thersilochus proboscidalis Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1602 n. 1.
Heterocola proboscidalis Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 221 & 238 n. 19, ♀ ♂.

THERSILOCHUS

Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 329 n. 21.
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8 (Oph.) p. 135.
Nom. propr.

Synon.: Cynipsichneumon Christ.
Ichneumon Linné.
Mesoleptus Provancher.
Ophion Olivier, Gravenhorst, Blanchard.
Porizon Gravenhorst, Zetterstedt, Ratzeburg, Holmgren, Riley.
Stilpnus Provancher.

apertus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Thersilochus apertus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1382 n. 4, ♀.
boops (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Porizon boops Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 776 n. 172, ♀ ♂.
Porizon boops Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 91 n. 4.
Porizon boops Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 23 n. 3, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Nematus Vallisnierii (Brischke).

Thersilochus boops Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 145 n. 23, [♀♂.
Thersilochus boops Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1389 n. 16, ♂.

brevicaudus Thoms. — ♀ ♂ — Eur. Suecia.
Thersilochus brevicauda Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1382 n. 3, ♀ ♂.

carinatus Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Thersilochus carinatus Bridgman, Trans Entom. Soc. London 1889 p. 431, ♀.

carinifer Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Thersilochus carinifer Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1392 n. 20, ♀.

caudatus Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Porizon moderator var. 4 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 785 n. 177, ♂.
Porizon moderator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 87 n. 2, ♀ ♂.
Porizon moderator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 91 n. 2. [n. 20, ♀.
Thersilochus caudatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 144
Thersilochus caudatus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1393 n. 24, ♀ ♂.
Thersilochus caudatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 193, ♀ ♂.

cognatus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Thersilochus cognatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 1858 P. 8. (Oph.) p. 137 n. 6, ♀.
Thersilochus cognatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 193, ♀.

conotracheli Ril.[2] — ♀ ♂ — Am.: Missouri. [Fig. 9.
Porizon (Thersilochus) conotracheli Riley, 3th Ann. Rep. Insect. Missouri 1871 p. 28, ♀ ♂;
Porizon (Thersilochus) conotracheli Riley, General-Index Rep. Insect. Missouri 1881 p. 64, ♀ ♂.

crassicaudus Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Thersilochus crassicauda Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1396 n. 30, ♀.

crassipes Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Thersilochus crassipes Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1400 n. 35, ♀.

decrescens Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Thersilochus decrescens Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1386 n. 9, ♀ ♂.

deficiens (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Stilpnus deficiens Provancher, Addit. Faun. Canada. Hymén. 1888 p. 359, ♀.
Thersilochus deficiens Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 186.
Thersilochus deficiens Davis, Canad. Entomol. XXVII. 1895 p. 287.

dilatatus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Thersilochus dilatatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 195, ♀.

dorsalis Ashm. — ♀ — Am.: St Vincent.
Thersilochus dorsalis Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 274 n. 189, ♀.

ensifer Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Thersilochus ensifer Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 194, ♀ ♂.

exilis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Thersilochus exilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 140 n. 13, ♀.
Thersilochus exilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 193, ♂.

filicornis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Thersilochus filicornis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1393 n. 23, ♀ ♂.

flavicornis Thoms.[3] — ♀ — Eur.: Britannia.
Thersilochus flavicornis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1391 n. 19, ♀.

fulvipes (Grav.) Marsh. — ♀ — Eur.: Britannia.
Porizon fulvipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 788 n. 178, ♀.
Thersilochus fulvipes Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 63 n. 10.

---

1) *Col.:* Orchesia micans L. (Ratzeburg).
2) *Col.:* Conotrachelus nenuphar Herbst (Riley).
3) *Hymen.:* Nematus gallicola (Bridgman).

fusculus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Thersilochus fusculus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 143 [n. 17, ♀.
gibbus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Thersilochus gibbus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 143 n. 18, ♂.
Thersilochus gibbus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1394 n. 26, ♀ ♂.
heterocerus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Gallia.
Thersilochus heterocerus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1383 n. 6, ♀ ♂.
incidens Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Thersilochus incidens Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1382 n. 5, ♀.
interstitialis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Thersilochus interstitialis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1389 n. 15, ♀ ♂.
jocator (Fabr.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon jocator Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 175 n. 175.
Ophion jocator Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 238 n. 15.
Ophion jocator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 139 n. 40.
Ophion jocator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 515 n. 49.
Ophion jocator Gravenhorst. Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 297.
Ichneumon jocator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 266.
Ichneumon jocator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 322.
Porizon jocator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 721.
Porizon jocator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 769 n. 170, ♀ ♂.
Ophion (Porizon) jocator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 326 n. 13.
Thersilochus jocator Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 329 n. 21.
Thersilochus jocator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 136 n. 2, ♀ ♂.
? Thersilochus cognatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 137 [n. 6, ♀.
Thersilochus jocator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 193, ♂.
Thersilochus jocator Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1390 n. 17, ♀ ♂.
Thersilochus jocator Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 230 & 245 n. 42, ♀.
italicus (Grav.) Marsh. — ♀ — Eur.: Britannia.
Porizon Italicus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 780 n. 174, ♀.
Thersilochus Italicus Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 62 n. 5.
liopleuris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Thersilochus liopleuris Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1398 n. 32, ♀ ♂.
longicornis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Thersilochus longicornis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1384 n. 7, ♀.
longulus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Thersilochus longulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 195, ♀.
maestus Holmgr. — ♀ — Afr.: Cap.
Thersilochus moestus Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 419 n. 59, ♀.
marginatus Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Thersilochus marginatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 354.
Thersilochus marginatus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1391 n. 18, ♀.
maritimus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Thersilochus maritimus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1381 n. 2b, ♀.
maturus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Thersilochus maturus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 92 n. 3, ♀.
melanarius Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Thersilochus melanarius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 1858 P. 8. (Oph.) p. 139 n. 9, [♀ ♂.
Thersilochus melanarius Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1380 n. 2a, ♀ ♂.

melanogaster Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Thersilochus melanogaster Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1392 n. 21, ♀ ♂.
minutus Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Thersilochus minutus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 431, ♀ ♂.
Thersilochus minutus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1385 n. 8, ♂.
moderator (L.) Holmgr.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon moderator Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 564 n. 38.
Ichneumon moderator Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 405 n. 1617.
Ichneumon moderator O. F. Müller, Fauna insect. Fridrichsdal. 1764 p. 71 n. 617.
Ichneumon moderator Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 936 n. 42.
Ichneumon moderator Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 854 n. 42.
Ichneumon moderator O. F. Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776 p. 156 n. 1815.
Ichneumon moderator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 433 n. 78.
Ichneumon moderator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 267 n. 94.
Ichneumon moderator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 170 n. 107.
Ichneumon moderator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2693 n. 42.
Ichneumon moderator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 373.
Cynipsichneumon strobilellae Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 385; T. 42 F. 4 & 5.
Ichneumon moderator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 190 n. 132.
Ichneumon moderator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 175 n. 172.
Ichneumon moderator Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 163 n. 504.
Ophion moderator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 137 n. 33. [n. 9.
Ichneumon moderator Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 958
Ophion moderator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 514 n. 42.
Ichneumon moderator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 275.
Ichneumon moderator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 349.
Porizon moderator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 783 n. 177, ♀ ♂.
Ophion (Porizon) moderator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 326 n. 14. [n. 21, ♀.
Thersilochus moderator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 144
Thersilochus moderator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 193, ♀ ♂.
Thersilochus moderator Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1395 n. 27, ♀ ♂.
montanus Ashm. — ♂ — Am.: Colorado.
Thersilochus montanus Ashmead, Bull. Colorado Biol. Assoc. I. 1890 p. 23, ♂.
monticola Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Thersilochus monticola Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1888 p. 1388 n. 13, ♀ ♂.
morionellus Holmgr.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 10, ♀.
Thersilochus morionellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 139
Thersilochus morionellus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 193, ♀ ♂.
Thersilochus morionellus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1386 n. 10, ♀.
nigricans Szépl. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Thersilochus nigricans Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 230 & 245 n. 41, ♀ ♂.
nitidus Bridgm. — ♀ — Eur.: Germania.
Thersilochus nitidus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 430, ♀.
obliquus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Thersilochus obliquus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1392 n. 22, ♀ ♂.
oculatus Ashm. — ♂ — Am.: Grenada.
Thersilochus oculatus Ashmead, Proc. Zool. Soc. London 1895 p. 779, ♂.
pallidicarpus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Thersilochus pallicarpus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1387 n. 12, ♀ ♂.

---

1) *Col.*: Ceutorrhynchus cyanipennis (Brischke).
2) *Col.*: Meligethes aenea (Brischke).

pallidipes Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Thersilochus pallipes Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 367 n. 2, ♀.
Thersilochus pallipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 789 n. 2, ♀.
parviceps Szépl. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Thersilochus parviceps Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 228 & 243 n. 36, ♀ ♂.
petiolatus Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Thersilochus petiolatus Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 229 & 245 n. 40, ♂.
pratensis Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Thersilochus pratensis Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 229 & 244 n. 38, ♂.
pumilus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Thersilochus pumilus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 140
Thersilochus pumilus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1380 n. 1, ♀. [n. 12, ♀.
pygmaeus (Zett.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia.
Porizon pygmaeus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 397 n. 14, ♀. [♀ ♂.
Thersilochus pygmaeus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8 (Oph.) p. 142 n. 16,
Thersilochus pygmaeus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1398 n. 33, ♀.
quercetorum Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Thersilochus quercetorum Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 229 & 245 n. 39, ♀.
rufiventris Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Thersilochus rufiventris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 196, ♀.
saltator (Grav.) Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Porizon saltator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 777.
Porizon saltator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 397. [♀ ♂.
Thersilochus saltator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 140 n. 11,
Thersilochus saltator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 193, ♀.
Thersilochus saltator Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1397 n. 31, ♀.
sericeus Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Thersilochus sericeus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 196, ♀ ♂.
striola Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Thersilochus striola Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1396 n. 28, ♀.
subdepressus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Thersilochus subdepressus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1396 n. 29, ♀.
temporalis Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Thersilochus temporalis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1387 n. 11, ♀.
triangularis (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Ophion triangulare Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 269 n. 3797-98.
Ophion triangulare Gravenhorst, Nov. Acta Acad. Nat. Curios. IX. 1818 p. 297.
Porizon triangularis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 781 n. 175, ♀. [♀ ♂.
Thersilochus frontellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 137 n. 4,
Thersilochus frontellus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 193, ♂.
Thersilochus triangularis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 193, ♀ ♂.
Thersilochus triangularis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1399 n. 34, ♀ ♂.
tripartitus Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Thersilochus tripartitus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 194, ♀ ♂.
truncorum Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Porizon jocator var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 771. [n. 3, ♀ ♂.
Thersilochus truncorum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 136
Thersilochus (Gonolochus?) truncorum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4.
[1880 p. 193, ♀ ♂.
Thersilochus truncorum Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1393 n. 25, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Micropteryx unimaculella (Bignell).

vernalis Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Thersilochus vernalis Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 228 & 244 n. 37, ♀.

DIAPARSIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 149 n. 18.
διάπαρσις, transfixio.

Synon.: Diaparsus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1369.
Ichneumon Thunberg.
Ophion Fabricius, Olivier.
Porizon Gravenhorst.
Thersilochus Holmgren.

erythrostoma (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Porizon erythrostomus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 760 n. 165, ♀ ♂.
Thersilochus (Diaparsus) erythrostomus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1374 n. 6, ♀.
fenestralis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Thersilochus (Diaparsus) fenestralis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1370 n. 1, ♀ ♂.
gemina (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Thersilochus geminus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 137 n. 5, ♀.
Thersilochus (Diaparsus) geminus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1371 n. 2, ♀ ♂.
genalis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Thersilochus (Diaparsus) genalis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1373 n. 4, ♀ ♂.
gilvipes (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Dania, Germania.
Porizon gilvipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 767 n. 168, ♀.
Thersilochus (Diaparsus) gilvipes Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1378 n. 12, ♀ ♂.
jucunda (Holmgr.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Thersilochus jucundus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 135 [n. 1, ♀.
Thersilochus (Diaparsus) jucundus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1372 n. 3, ♀.
microcephala (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Porizon microcephalus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 766 n. 167, ♀.
Thersilochus pallipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8 (Oph.) p. 138 n. 7, ♀.
Thersilochus (Temelucha?) microcephalus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. [P. 4. 1880 p. 193, ♀ ♂.
Thersilochus (Diaparsus) microcephalus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1375 n. 7, ♀ ♂.
nutritor (Fabr.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ophion nutritor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 139 n. 39.
Ophion nutritor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 515 n. 48.
Ophion nutritor Gravenhorst, Nov. Acta Acad. Nat. Curios. IX. 1818 p. 297.
Ichneumon nutritor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 263.
Ichneumon nutritor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 316.
Porizon nutritor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 762 n. 165, ♀ ♂.
Porizon nutritor Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 60.
Thersilochus (Diaparsus) nutritor Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1373 n. 5, ♀ ♂.
parviceps Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Thersilochus (Diaparsus) parviceps Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1376 n. 9, ♀.
rufipes (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Thersilochus rufipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 145 n. 22, [♀ ♂.
Thersilochus (Diaparsus) rufipes Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1377 n. 11, ♀ ♂.

---

[1]) *Col.:* Balaninus villosus (Giraud).

versutus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Thersilochus versutus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 141 n. 14. [♀ ♂.
Thersilochus (Diaparsus) versutus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1376 n. 8, ♀ ♂,
xanthopus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Thersilochus xanthopus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 138 [n. 8, ♀.
Thersilochus (Diaparsus) xanthopus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1377 n. 10, ♀ ♂.

EPISTATHMUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 149 n. 17.
ἐπίσταθμα, mansiones.
Species exstat.

TEMELUCHA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 148 n. 16.
τημελοῦχος, curans.
Species exstat.

DOLICHOPSELEPHUS

Ashmead, Bull. Colorado Biol. Assoc. I. 1890 p. 23.
δολιχός, longus; *ὄψ*, oculus; *ἐλέφας*, elephas.

cockerellii Ashm. — ♀ — Am.: Colorado.
Dolichopselephus Cockerellii Ashmead, Bull. Colorado Biol. Assoc. I. 1890 p. 23, ♀.

GONOLOCHUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 148 n. 15.
γόνος, soboles; *λόχος*, locus insidiis aptus.

fenestratus Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Gonolochus fenestratus Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 227 & 243 n. 35, ♂.

LEPTOPYGUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 148 n. 8.
Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1366.
λεπτός, tenuis; *πυγή*, nates.

Synon.: Cynipsichneumon Christ.
Ichneumon Schrank.
Ophion Gravenhorst.
Porizon Gravenhorst & auct.

filicornis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Porizon (Leptopygus) filicornis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1366 n. 10, ♀.
harpurus (Schrk.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 362 n. 92.
? Ichneumon bedeguaris Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 425 n. 93.
? Cynipsichneumon bedeguaris Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 282; T. 41 F. 3.
? Ichneumon bedeguaris Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 206 n. 206.
Ichneumon harpurus Schrank, Fauna Boica II. P. 2. 1802 p. 294 n. 2110, ♀.
? Ichneumon parasitus Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 67 n. 91.
? Ophion bedeguaris Gravenhorst, Nov. Acta Acad. Nat. Curios. IX. 1818 p. 297.

---

1) *Hymen.:* Cynips rosae L. (Ratzeburg).

Porizon harpurus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 758 n. 164, ♀ ♂.
Porizon harpurus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 87 n. 1, ♂.
Porizon harpurus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 91 n. 1.
Porizon harpurus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 23 n. 2, ♂.
Porizon harpurus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 134 n. 6, ♀ ♂.
Porizon harpurus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 192, ♂.
Porizon (Leptopygus) harpurus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1366 n. 9, ♀ ♂.

nigricornis Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Leptopygus nigricornis Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 221 & 237 n. 18, ♂.

orbus Davis — ♀ ♂ — Am.: Michigan, Pennsylvania.
Leptopygus orbus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 365, ♀ ♂.

ruficornis Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Leptopygus ruficornis Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 220 & 237 n. 17, ♀.

ANEUCLIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 147 n. 7.
ἀ-εὐκλητς, bene clausus.
Species exstat.

SATHROPTERUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 147 n. 6.
σαθρός, putris; *πτέρον*, ala.
Species exstat.

ALLOPHRYS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 147 n. 5.
ἄλλος, alius; *ὀφρύς*, supercilium.
Species exstat.

PORIZON

Fallén, Specim. nov. Hymén. disp. méthod. 1813 p. 18 n. 19.
Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 748 n. 9.
πορίζω, invenio.

Synon.: Cremastus Provancher.
Ichneumon Fabricius, Thunberg.
Mesoleptes Provancher.
Ophion Fabricius & auct.
Thersilochus Provancher.

albipennis Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Porizon albipennis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 287 n. 2, ♀.

albipes Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Porizon albipes Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 364 n. 5, ♀.

angularis Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Cremastus angularis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 176.
Porizon boreale Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 14.
Porizon boreale Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 206 n. 1, ♀.
Porizon angulare Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 206 n. 2; Fig. 10.
Porizon boreale Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 378 n. 1, ♀.
Porizon angulare Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 378 n. 2, ♂; Fig. 45.

Thersilochus errabundus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 92 n. 4, ♀.
Thersilochus Provancheri Ashmead, Bull. Colorado Biol. Assoc. I. 1890 p. 24.

apicalis Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Porizon apicalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 48, ♂.

arthroleucus Costa — ♂ — Eur.: Sardinia.
Porizon arthroleucus A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. & matem. Napoli XXIV. 1885 p. 340, ♂.
Porizon arthroleucus A. Costa, Atti accad. sc. fis. & matem. Napoli (2) II. 7. 1886 p. 19, ♂.
Porizon arthroleucus A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 115, ♂.

audax Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Porizon audax Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 174, ♂.

californicus Prov. — ♂ — Am.: California.
Porizon Californicus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 364 n. 6, ♂.

delicatus Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Porizon ? delicatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 176, ♂.

dominans Walk. — ♂ — As.: Ceylon.
Porizon dominans Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) V. 1860 p. 307, ♂.

elongatus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Porizon elongatum Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 91 n. 4, ♀ ♂.

exhaustator (Fabr.) Grav. — ♀ ♂ — Eur. feretota.
Ichneumon exhaustator Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 226 n. 1389.
Ophion exhaustator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 135 n. 22.
Ophion exhaustator Klug, Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. 1807 p. 75 n. 20.
Ophion exhaustator Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 P. 107 T. 8.
Ophion exhaustator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 512 n. 28.
Ichneumon exhaustator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon exhaustator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 319.
Porizon hostilis Gravenhorst Ichneum. Europ. III. 1829 p. 753 n. 161, ♀ ♂.
Ophion exhaustator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1044 n. 355.
Porizon exhaustor Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 396 n. 10, ♀.
Porizon exhaustor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 133 n. 3, ♀.
Porizon exhaustor Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1361 n. 1, ♀ ♂.

facilis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Texas.
Porizon facilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 175, ♀ ♂.

fulvescens Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Porizon fulvescens Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 48, ♀.

fuscipennis Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Porizon fuscipennis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 287 n. 1, ♀.

hyalinipennis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Texas.
Porizon hyalinipennis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 174, ♀ ♂.

macer Cress. — ♀ ♂ — Am.: Texas.
Porizon macer Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 175, ♀ ♂.

micans (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Mesoleptes micans Provancher, Natural. Canada. VII. 1875 p. 114.
Thersilochus micans Provancher, Natural. Canada. XI. 1879 p. 207, ♀.
Thersilochus micans Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1885 p. 379, ♀.
Porizon? micans Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 188.

minator Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Porizon minator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 768 n. 169, ♀.
Porizon minator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 396 n. 9, ♂.

obsoletor *Zett.* — ♂ — Eur.: Lapponia.
Porizon obsoletor Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 395 n. 8, ♂.

orbitalis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Texas.
Porizon orbitalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 174, ♀ ♂.
pallidipes Motsch. — ♂ — As.: Ceylon.
Porizon pallipes Motschulsky, Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. 3. 1863 p. 29, ♂.
rufinus Grav.[1] — ♀ — Eur.: Britannia.
Porizon rufinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 754 n. 161b, ♀.
rugosus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Porizon rugosum Provancher, Natural. Canada. XI. 1879 p. 206 n. 3, ♀.
Porizon rugosus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 379 n. 3, ♀.
stigmaterus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Texas.
Porizon stigmaterus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 174, ♀ ♂.
truncatus Grav. — ♂ — Eur.
Porizon truncatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 765 n. 166, ♂.

CYRTOPHION

Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1367.
κυρτός, curvus; Ophion, nom. propr. Hymen.

Synon.: Porizon Gravenhorst, Zetterstedt.
Thersilochus Holmgren.

dissimilis (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Lapponia, Suecia.
Porizon dissimilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 774 n. 171, ♂ [excl. ♀].
Porizon dissimilis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 396 n. 11, ♂.
Thersilochus dissimilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8 (Oph.) p. 141 [n. 15, ♂.
Porizon agilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 1858 P. 8. (Oph.) p. 134 n. 5, ♀.
Porizon (Cyrtophion) dissimilis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1367 n. 11, ♀.
levifrons (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Thersilochus laevifrons Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 143 [n. 19, ♀.
Thersilochus laevifrons Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 193, ♀ ♂.
Porizon (Cyrtophion) laevifrons Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1367 n. 12, ♀.

CRATOPHION

Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1363.
κράτος, robur; Ophion, nom. propr. Hymen.

Synon.: Porizon Gravenhorst & auct.

angustipennis (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Porizon angustipennis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 133 n. 2, ♀.
Porizon angustipennis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 192, ♀.
Porizon (Cratophion) angustipennis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1363 n. 3, ♀ ♂.
caudatulus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Porizon (Cratophion) caudatulus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1364 n. 4, ♀.
gravipes (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Porizon gravipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 757 n. 163, ♀.
Porizon hostilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 23 n. 1, ♂.
Porizon hostilis Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 328 n. 20.
Porizon hostilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 132 n. 1, ♀ ♂.
Porizon (Cratophion) gravipes Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1363 n. 2, ♀ ♂.

---

[1]) *Hymen.*: Cynips rosae L. (Gravenhorst).

BARYCNEMIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 147 n. 3.
Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1364.
βαρύς, gravis; *κνήμη*, tibia.

Synon.: Ichneumon O. F. Müller & Gravenhorst.
Porizon Gravenhorst, Zetterstedt, Ratzeburg, Holmgren, Ruthe.

anura Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Porizon (Barycnemis) anurus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1879 p. 1365 n. 8, ♀.
claviventris (Grav.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
? Ichneumon bellator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 158 n. 1840.
Porizon claviventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 755 n. 162, ♀.
? Ichneumon bellator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 995 n. 161.
Porizon claviventris Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 397 n. 15, ♀.
Porizon claviventris Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 91 n. 3, ♀.
Porizon claviventris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 133 n. 4, ♀.
Porizon claviventris Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 379 n. 68, ♀.
Porizon (Barycnemis) claviventris Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1364 n. 5, ♀ ♂.
gracillima Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Porizon (Barycnemis) gracillimus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1365 n. 6, ♀ ♂.
leviceps Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Porizon (Barycnemis) laeviceps Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1365 n. 7, ♀ ♂.
linearis Ashm. — ♀ — Am.: Canada.
Barycnemis linearis Ashmead, Proc. Entom. Soc. Washington III. 1895 p. 238, ♀.

ORTHOPELMA

Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 137.
ὀρθός, rectus; *πέλμα* planta pedis.

Synon.: Proëdrus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 147 n. 2.
προέδρα, prior sedes.
Cryptus Ratzeburg.
Hemiteles Gravenhorst & auct.

anomalum Taschbg. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Orthopelma anomalum Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 137 n. 2, ♀ ♂.
Orthopelma anomalum Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 59, ♀ ♂.
bedelliae Ashm.[2] — ♂ — Am.: Missouri.
Orthopelma bedelliae Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 415, ♂.
bimaculatum Ashm. — ♂ — Am.: Indiana.
Orthopelma bimaculatum Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 416, ♂.
californicum Ashm. — ♀ ♂ — Am.: California.
Orthopelma Californicum Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 417, ♀ ♂.
coloradense Ashm. — ♀ — Am.: Colorado.
Orthopelma Coloradense Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 418, ♀.
diastrophi Ashm.[3] — ♀ ♂ — Am.: Connecticut.
Orthopelma Diastrophi Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 418, ♀ ♂.
erythropus Ashm. — ♂ — Am.: Virginia.
Orthopelma erythropa Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 416, ♂.

---

1) *Hymen:* Cynips folii L. (Ratzeburg).
2) *Lep.:* Bedellia somnulentella Zett. (Ashmead).
3) *Hymen.:* Diastrophus radicum Bass. (Ashmead).

luteolator (Grav.) Taschbg.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Hemiteles luteolator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 826 n. 256, ♂.
Cryptus (Hemiteles) luteolatus Ratzeburg, Nov. acta acad. nat. curios. XVI. P. 1. 1832 p. 176; [T. 9 F. 33-35.
Hemiteles luteolator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 130 n. 16, ♀ ♂.
Hemiteles luteolator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 155 n. 21.
Hemiteles luteolator Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 101 n. 33, ♀ ♂.
Orthopelma luteolator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 137 n. 1, ♀ ♂.
Orthopelma luteolator Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 59, ♀ ♂.
Hemiteles luteolator Ed. André, Feuille jeun. Natural. V. 1875 p. 69; T. 3 F. 1-4.
Orthopelma luteolator Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 735 n. 1, ♀ ♂.
Orthopelma luteolator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. P. 1/2. 1881 p. 348, ♀ ♂.
Orthopelma luteolator Bridgman & E. A. Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 155, ♀ ♂.

minutum Ashm.[2] — ♀ — Am.: New York.
Orthopelma minutus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 416, ♀.

occidentale Ashm.[3] — ♂ — Am.: Wyoming Terr.
Orthopelma occidentale Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 417, ♂.

ovale (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Hemiteles ovalis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 332.
Hemiteles ovalis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 122 n. 6, ♀ ♂.
Hemiteles ovalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 325 n. 6, ♀ ♂.
Orthopelma ovalis Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 188.

rosaecola Ashm.[4] — ♀ ♂ — Am.: Colorado?
Othopelma rosaecola Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 417, ♀ ♂.

PROBLES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 147 n. 1.
προβλής, projectus.

melanarius Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Probles melanarius Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 219 & 236 n. 16, ♂.

5. *Subfam.* Mesochorinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 143 & 170.

STICTOPISTHUS

Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 327 n. 3.
στικτός, punctus; πιστός, fidelis.

Synon.: Mesochorus Bridgman, Thomson.

aciculatus (Bridgm.) Thoms.[5] — ♀ ♂ — Eur.
Mesochorus aciculatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 162; T. 8 F. 11.
Mesochorus (Stictopisthus) aciculatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 344 n. 1, [♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Aulax hieracii, Rhodites eglanteriae (Bignell), Rh. rosae (Brischke, Mocsáry).
2) *Hymen.:* Rhodites erythrogaster (Ashmead).
3) *Hymen.:* Rhodites similis Bass. (Ashmead).
4) *Hymen.:* Rhodites ignota O. S. (Ashmead).
5) *Lep.:* Pieris brassicae (Bridgman). — *Hymen.:* Apanteles glomeratus in: Pieris brassicae; Limneria ruficincta in: Pterophorus teucrii (Bignell).

bilineatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia.
Mesochorus (Stictopisthus) bilineatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 344 n. 2, ♀ ♂.
convexicollis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesochorus (Stictopisthus) convexicollis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1855 p. 344 n. 4, ♀ ♂.
laticeps Thoms.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Mesochorus (Stictopisthus) laticeps Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 344 n. 3, ♀ ♂.

MESOCHORUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 960 n. 11.
μέσος, medius; *χῶρος*, spatium.

Synon.: Campoplex Packard.
Cryptus Haliday.
Ichneumon Ratzeburg.
Mesoleptus Zetterstedt.
Paniscus Provancher.
Phytodietus Blanchard.
Plectiscus Provancher.
Tryphon Zetterstedt.

acuminatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesochorus acuminatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 343 n. 38, ♀ ♂.
aggressor Fonsc. — ♀ — Eur.: Gallia.
Mesochorus aggressor Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 439 n. 4, ♀.
agilis Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Mesochorus agilis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 266, ♀.
albipes Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesochorus albipes Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 341 n. 31, ♀ ♂.
albitarsis Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Mesochorus albitarsis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 191, ♂.
americanus Cress. — Am.: Pennsylvania, Delaware, Illinois.
Mesochorus Americanus Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 23.
angustatus Thoms.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesochorus angustatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 343 n. 41, ♀ ♂.
Mesochorus angustatus Möller, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 83 n. 4.
annulitarsis Ashm. — ♂ — Am.: St. Vincent.
Mesochorus annulitarsis Ashmead, Journ. Linn. Soc. Zool. XXV. 1894 p. 140, ♂.
anomalus Holmgr.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesochorus anomalus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 130 n. 26, ♀ ♂.
Mesochorus anomalus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 182, ♀ ♂.
Mesochorus anomalus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 342 n. 36, ♀ ♂.
anthracinus Kriechb.[4]) — ♀ — Eur.: Austria.
Mesochorus anthracinus Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 484, ♀.
aprilinus Ashm. — ♀ — Am.: United States.
Mesochorus aprilinus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 195, ♀.

---

1) *Lep.:* Gelechia notatella (Fletcher).
2) *Hymen.:* Microgaster glomeratus (Thomson).
3) *Lep.:* Euchelia jacobeae (Bignell), Plusia gamma, Cucullia argentea, C. asteris, Argynnis Latonia (Brischke). — *Hymen.:* Apanteles popularis in: Euchelia Jacobaeae (Bignell).
4) *Lep.:* Lobophora appensata (Kriechbaumer).

aranearum Ratzbg. — Eur.: Germania.

Mesochorus aranearum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 118 n. 4.

arenarius Hal. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.

Cryptus (Mesochorus) arenarius Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 115, ♀ ♂.

areolaris Ratzbg.[1]) — ♀ — Eur.: Germania.

Mesochorus areolaris Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 119 n. 12, ♀.

areolatus Prov. — ♀ — Am.: Canada.

Mesochorus areolatus Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 3 n. 9, ♀.

Mesochorus areolatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 793 n. 9, ♀.

ater Ratzbg.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.

Mesochorus ater Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 111 n. 9, ♀ ♂.

Mesochorus ater Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 119 n. 11, ♀ ♂.

atricillus Hal. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.

Cryptus (Mesochorus) atricilla Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 114, ♀ ♂.

atriventris Cress. — ♀ — Am.: Canada, Illinois.

Mesochorus atriventris Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 21.

Mesochorus atriventris Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 208 n. 1, ♀.

Mesohcorus atriventris Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 3 n. 1, ♀.

Mesochorus atriventris Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 380 & 791 n. 1, ♀.

basalis Cress. — Am.: Massachusetts.

Mesochorus basalis Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 22.

basalis Curt.! — Eur.: Britannia.

Mesochorus basalis (Haliday) Curtis, Brit. Entom. X. 1833 p. 464 n. 5.

brevicollis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.

Mesochorus brevicollis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 335 n. 8, ♀ ♂.

brevigenus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.

Mesochorus brevigena Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 338 n. 19, ♀ ♂.

brevipetiolatus Ratzbg.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.

Mesochorus brevipetiolatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 148 n. 1, ♂.

Mesochorus brevipetiolatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 117 n. 1, ♀ ♂.

Mesochorus brevipetiolatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 181, [♀ ♂.

bruneus Brischke — ♂ — Eur.: Germania.

Mesochorus brunneus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 184, ♂.

clavatus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.

Mesochorus clavatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 187, ♀.

complanatus Hal. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.

Cryptus (Mesochorus) complanatus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 114, ♀.

? Mesochorus tipularius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 120 n. 15, ♀ [non Grav.].

Mesochorus complanatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 131 [n. 28, ♀ ♂.

Mesochorus complanatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 182, ♀ ♂.

Mesochorus complanatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 46, ♂.

---

1) *Lep.:* Hyponomeuta spec. omn. (Rondani). — *Hymen.:* Lophyrus pini L. (Ratzeburg), Athalia spinarum Brischke.

2) *Lep.:* Lasiocampa pini L., Clisiocampa neustria L. (Ratzeburg).

3) *Lep.:* Trachea piniperda L., Hyponomeuta malinella L. (Ratzeburg), Eupithecia pimpinellaria, E. succenturiaria, E. innotata, E. digitaliaria, Cucullia verbasci, Pseudoterpna cythisaria, Chesias spartiaria, Argynnis Latonia, Diloba coeruleocephala, Dasychira selenitica, Yponomeuta padi (Brischke).

confusus Holmgr.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesochorus splendidulus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 148 n. 2 [p. p.].
Mesochorus splendidulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 59 n. 1, [♀♂ [p. p.].
Mesochorus confusus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 129 n. 23, [♀♂.
var. **cimbicis** Ratzbg.[2]) — ♀ — Eur.: Britannia.
Mesochorus cimbicis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 149 n. 6, ♀.
Mesochorus cimbicis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 110 n. 7.
Mesochorus cimbicis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 118 n. 8.
Mesochorus confusus var. cimbicis Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 60 n. 6.
contractus Ratzbg.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Mesochorus contractus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 109 n. 3, ♀ ♂.
crassicrus Thoms.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia?
Mesochorus crassicrus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 339 n. 21, ♀♂.
crassimanus Holmgr.[5]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 17, ♀.
Mesochorus crassimanus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 125
Mesochorus crassimanus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 340 n. 27, ♀♂.
crassipes Brischke — Eur.: Germania.
Mesochorus crassipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 191.
curvicaudus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesochorus curvicauda Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 335 n. 7, ♀ ♂.
curvulus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia.
Mesochorus curvulus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 343 n. 43, ♀ ♂.
dilutus Ratzbg.[6]) — ♂ — Eur.: Germania.
Mesochorus dilutus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 148 n. 3, ♂.
Mesochorus dilutus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 118 n. 5, ♂.
Mesochorus dilutus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 181, ♂.
dimidiatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 3, ♂.
Mesochorus dimidiatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 118
Mesochorus dimidiatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 180, ♀♂.
Mesochorus dimidiatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 340 n. 26, ♀♂.
dispar Brischke[7]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Mesochorus dispar Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 190, ♀♂.
dolorosus Marsh. — ♀ — Eur.: Islandia.
Mesochorus dolorosus Marshall, Entom. M. Magaz. XII. 1877 p. 242, ♀.
electilis Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Mesochorus electilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 171, ♀.

---

1) *Hymen.:* Cimbex spec., Cladius difformis (Brischke), Microplitis fumipennis in: Xylopoda Fabriciana (Bignell). — *Lep.:* Eupithecia pimpinellaria, Yponomeuta spec. (Brischke), Xylopoda Fabriciana (Bignell).

2) *Hymen.:* Cimbex femorata L., Clavellaria amerinae L., Cladius pectinicornis Frc., Lyda clypeata? — *Lep.:* Hyponomeuta spec. (Ratzeburg).

3) *Lep.:* Dicranura vinula L. (Ratzeburg).

4) *Lep.:* Gelechia notatella (Fletcher).

5) *Lep.:* Hypena rostralis (Brischke).

6) *Lep.:* Liparis chrysorrhoea, Penthina ocellana, Gelechia leucatella (Ratzeburg), Abraxas grossulariata (Brischke).

7) *Lep.:* Harpyia bifida, Smerinthus populi, Lophopteryx camelina (Brischke).

errabundus Htg.[1]) — ♀ — Eur.: Germania.
Mesochorus errabundus Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 262, ♀.
facialis Bridgm.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Dania.
Mesochorus facialis Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1884 p. 431, ♀ ♂.
Mesochorus facialis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 343 n. 39, ♀ ♂.
femoralis Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Mesochorus femoralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N.F. IV. P. 4. 1880 p. 187, ♀.
flavescens Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Mesochorus flavescens Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 437 n. 2, ♂.
flaviceps Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Mesochorus flaviceps Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 210 n. 4, ♀.
Mesochorus flaviceps Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 3 n. 4.
Mesochorus flaviceps Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 382 & 791 n. 4, ♀.
formosus Bridgm.[3]) — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Mesochorus formosus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 154, ♀ ♂.
Mesochorus formosus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 343 n. 40, ♀ ♂.
frontalis Ashm. — Am.: Bering Ins.
Mesochorus frontalis Ashmead, Fur Seals and Fur Seal Islands IV. 1899 p. 336.
fulgurans Hal.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Mesochorus fulgurans (Haliday) Curtis, Brit. Entom. X. 1833 p. 464 n. 4.
Mesochorus laricis Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 273 n. 16, ♀.
Cryptus (Mesochorus) fulgurans Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 114, ♀.
Mesochorus laricis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 149 n. 5, ♀ ♂.
Mesochorus laricis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 118 n. 7.
Mesochorus fulgurans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 127 [n. 20, ♀ ♂.
Mesochorus fulgurans Bignell, Entomologist XIII. 1880 p. 245.
Mesochorus fulgurans Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 336 n. 11, ♀ ♂.
fulvus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesochorus fulvus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 336 n. 13, ♀ ♂.
fuscicornis Brischke[5]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Mesochorus fuscicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 185, ♀ ♂.
fuscipes Ril. — Am.: Missouri.
Mesochorus fuscipes Riley, 7th Ann. Rep. Insect. Missouri 1875 p. 75.
gemellus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesochorus gemellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 123 [n. 13, ♀ ♂.
Mesochorus gemellus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 340 n. 25, ♀ ♂.
gigas Kriechb. — ♀ — Eur.: Tirolia.
Mesochorus gigas Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII. 1897 p. 332, ♀.
gracilentus Brischke[6]) — ♂ — Eur.: Germania.
Mesochorus gracilentus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 188, ♂.

---

1) *Lep.:* Geometra piniaria (Hartig).
2) *Hymen.:* Apanteles popularis — *Lep.:* Euchelia Jacobaeae (Bignell).
3) *Hymen.:* Apanteles fulvipes in: Petasia cassinea et A. difficilis in: Diloba coeruleocephala (Bignell).
4) *Hymen.:* Lophyrus laricis, variegatus pini (Hartig, Brischke). — *Lep.:* Casinaria vidua in: Abraxas grossulariata (Bignell), Eupithecia pimpinellaria (Ratzeburg).
5) *Hymen.:* Apanteles nothus in: Abraxas grossulariata & Melanippe galiata (Bignell).
6) *Hymen.:* Limneria albida in: Gonepteryx rhamni (Bignell).

gracilis Brischke[1]) — ♂ — Eur.: Germania.
Mesochorus gracilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 190, ♂.
grenadensis Ashm. — ♂ — Am.: Grenada.
Mesochorus Grenadensis Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 273 n. 188, ♂.
iridescens Cress. — ♀ — Am.: California.
Mesochorus iridescens Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 369, ♀.
jucundus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Mesochorus jucundus Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 3 n. 8, ♀.
Mesochorus jucundus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 792 n. 8, ♀.
lapponicus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Mesochorus Lapponicus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 336 n. 14, ♀ ♂.
longicaudus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Patria?
Mesochorus longicauda Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 338 n. 18, ♀ ♂.
lucifer Grav. — ♀ — Eur.
Mesochorus lucifer Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 963 n. 331, ♀.
luteipes Cress. — ♀ — Am.: New Jersey.
Mesochorus luteipes Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 22.
Mesochorus luteipes Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 3 n. 7, ♀.
Mesochorus luteipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 792 n. 7, ♀.
macrurus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Mesochorus macrurus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 342 n. 35, ♀ ♂.
marginatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Mesochorus marginatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 339 n. 24, ♀ ♂.
melas Fonsc. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Mesochorus melas Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 440 n. 6, ♀ ♂.
melleus Cress. — Am.: Pennsylvania.
Mesochorus melleus Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 24.
nigriceps Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Mesochorus nigriceps Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N.F. IV. P.4. 1880 p. 192, ♂.
nigripes Ratzbg.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Mesochorus nigripes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 119 n. 13, ♂.
Mesochorus gibbulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 60 n. 3, ♀.
Mesochorus gibbulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 124 [n. 14, ♀ ♂.
Mesochorus nigripes Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 333 n. 3, ♀ ♂.
obliquus Cress.[3]) — Am.: Pennsylvania.
Mesochorus obliquus Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 24.
ocellatus Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Mesochorus ocellatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 187, ♂.
olerum Hal.[4]) — ♀ — Eur.: Britannia.
Mesochorus olerum (Haliday) Curtis, Brit. Entom. X. 1833 p. 464 n. 3.
Cryptus (Mesochorus) olerum Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 114, ♀.
Mesochorus olerum Bignell, Entomologist XIII. 1880 p. 245.
orbitalis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesochorus orbitalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 118 n. 4, ♀.

---

1) *Lep.:* Ocneria dispar L. (Brischke).
2) *Col.:* Phytonomus polygoni L. (Ratzeburg).
3) *Lep.:* Euchaetes egle (Dryander).
4) *Hymen.:* Casinaria vidua in: Abraxas grossulariata (Bignell).

Mesochorus orbitalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 180, ♂.
Mesochorus orbitalis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 335 n. 9, ♀ ♂.

orgyiae D. T.[1]) — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Mesochorus stigmaticus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 341 n. 32, ♀ ♂ [non Mesochorus orgyiae m. Brischke].

palanderi Holmgr. — ♀ ♂ — As.: Spetsbergen.
Mesochorus Palanderi Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. VIII. 5. 1869 p. 21, ♀ ♂.

pallidipes Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Mesochorus pallipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 190, ♂.

pallidus Brischke[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Mesochorus pallidus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 184, ♀ ♂.

pectinipes Bridgm. — ♂ — Eur.: Britannia.
Mesochorus pectinipes Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 166, ♂.

pectoralis Ratzbg.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesochorus splendidulus var. 6 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 965.
Mesochorus pectoralis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 149 n. 4.
Mesochorus pectoralis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 110 n. 5.
Mesochorus pectoralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 59 n. 2, ♀ ♂.
Mesochorus pectoralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 129 [n. 24, ♀ ♂.
Mesochorus pectoralis Jordan, Entom. M. Magaz. VI. 1869 p. 138.
Mesochorus pectoralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 181, ♀ ♂.
Mesochorus pectoralis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 341 n. 33, ♀ ♂.

petiolaris Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Mesochorus petiolaris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 186, ♀.

picticrus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesochorus picticrus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 340 n. 29, ♀ ♂.

pictilis Holmgr.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
? Mesochorus tipularius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 964 n. 331, ♀.
? Mesochorus tipularius Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 58.
Mesochorus pictilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 131 n. 27, ♀ ♂.
? Mesochorus tipularius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 182, ♀ ♂.
Mesochorus pictilis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 342 n. 37, ♀ ♂.

pictus Brischke — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Mesochorus pictus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 186, ♂.
Mesochorus pictus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 353.

'**pieridicola** (Pack.) How.[5]) — ♀ — Am.: United States.
Campoplex pieridicola Packard, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XXI. 1881 p. 20, ♀.
Mesochorus pieridicolus Howard, Scudder: Butterflies U. S. 1889 p. 1882, ♀.

politus Grav.[6]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesochorus politus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 974 n. 337, ♀ ♂.
Mesochorus politus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 119 n. 10.

---

1) *Lep.:* Orgyia antiqua (Norgate).

2) *Lep.:* Hyponomeuta variabilis, Smerinthus populi, Porthesia auriflua, Cucullia argentea, Amphidasis betularia (Brischke).

3) *Lep.:* Cidaria galiaria, Eupithecia centaurearia, Hyponomeuta spec., Fidonia cebraria, Cucullia argentea (Brischke), Ocneria dispar L. (Ratzeburg).

4) *Hymen.:* Apanteles spec. in: Jodis lactearia (Bignell).

5) *Lep.:* Pieris rapae (Packard).

6) *Hymen.:* Blennocampa melanocephala Klug. — *Lep.:* Fidonia piniaria L. Ratzeburg).

Mesochorus politus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 122 n. 11, ♀ ♂.
Mesochorus politus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 180, ♀.
Mesochorus politus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 331 n. 1, ♀ ♂.
Mesochorus politus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig (2) VII. 1. 1888 p. 56.

provancheri D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Mesochorus politus Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 3 n. 5, ♀. [horst].
Mesochorus politus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 791 n. 5, ♀ [non Graven-
Mesochorus Provancheri m.

punctipleuris Thoms. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Mesochorus punctipleuris Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 334 n. 5, ♀ ♂.

rubeculus Htg.[1]) — ♀ — Eur.: Germania.
Mesochorus rubeculus Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. 2. 1883 p. 273 n. 15, ♀.

ruficornis Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Mesochorus ruficornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 189, ♀.

rufipes Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Mesochorus rufipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 189, ♂.

rufoniger Brischke[2]) — ♀ — Eur.: Germania.
Mesochorus rufoniger Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 185, ♀.

rufulus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Paniscus rufulus Provancher, Natural. Canad. VIII. 1876 p. 328.
Mesochorus rufulus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 209 n. 3, ♀.
Mesochorus rufulus Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 4 n. 3, ♀ ♂.
Mesochorus rufulus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 381 & 791 n. 3, ♀ ♂.

rufus Brullé — ♀ — Am.: Guyana.
Mesochorus rufus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 250 n. 1, ♀.

salicis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesochorus salicis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 338 n. 20, ♀ ♂.

scitulus Cress.[3]) — ♂ — Am.: Pennsylvania.
Mesochorus scitulus Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 24.
Mesochorus scitulus Howard, Scudder: Butterflies U. S. 1889 p. 1882, ♂.

semirufus Holmgr.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀ ♂.
Mesochorus semirufus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 125 n. 16,
Mesochorus semirufus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 180, ♀ ♂.
Mesochorus semirufus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 337 n. 17, ♀ ♂.

sericans Curt.[5]) — ♂ — Eur.: Britannia.
Mesochorus sericans (Haliday) Curtis, Brit. Entom. X. 1833 p. 464. ♂; T. 464.

sericeus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Mesochorus sericeus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 187, ♀.

silvarum Curt.[6]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Mesochorus sylvarum Curtis, Brit. Entom. X. 1833 p. 464 n. 6.
Cryptus (Mesochorus) sylvarum Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 114, ♀. [♀ ♂.
Mesochorus sylvarum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 124 n. 15,

---

1) *Hymen.*: Lophyrus pallidus (Hartig).
2) *Lep.*: Leucoma salicis (Brischke).
3) *Lep.*: Eurymus philodice, Leucania unipuncta (Haward).
4) *Hym.*: Limneria erucator in: Hybernia progemmaria et Agrypon clandestinum in Eupithecia castigata (Bignell).
5) *Dipt.*: Exorista vulgaris in: Abraxas grossulariata (Bignell).
6) *Hym.*: Microgaster subcompletus in: Vanessa atalanta (Bignell).

Mesochorus sylvarum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 180, ♂.
Mesochorus silvarum Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 339 n. 22, ♀ ♂.

splendidulus Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Mesochorus splendidulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 717, ♀. [var. 6-8].
Mesochorus splendidulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 965 n. 333, ♀ ♂ [excl.
Phytodietus (Mesochorus) splendidulus Blanchard, Hist. nat. insect. III. 1840 p. 316 n. 4.
Ichneumon (Mesochorus) splendidulus Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 28 n. 30; T. 7 F. 4.
Mesochorus splendidulus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 148 n. 2, ♀ ♂; T. 7 [F. 4 (p. p.).
Mesochorus splendidulus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 117 n. 2.
Mesochorus splendidulus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 435 n. 1, ♀ ♂.
? Mesochorus splendidus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 59 n. 1, ♀ ♂.
Mesochorus splendidulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 182, [♀ ♂ & 183, ♂.
Mesochorus splendidulus var. 6 Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig (2) VII. P. 1. 1888 p. 56.
Mesochorus splendidulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig (2) VII. P. 1. 1888 p. 67, ♀.
Mesochorus splendidulus Kulagin, Zool. Anzeig. XV. 1892 p. 85.
Mesochorus splendidulus Kulagin, Journ. Micr. Soc. 1892 p. 470.

splenium Curt. — Eur.: Britannia.
Mesochorus splenium Curtis, Brit. Entom. X. 1833 p. 464 n. 8.

stigmaticus Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Mesochorus stigmaticus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 183, ♀ ♂.

striatus Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Mesochorus striatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 192, ♀ ♂.

suecicus D. T.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [Bridgman).
Mesochorus pectinipes Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 336 n. 12, ♀ ♂ (non
Mesochorus Suecicus m.

sulphureipes Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Mesochorus sulphuripes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 186, ♂.

tachinae Ashm. — ♀ — Am.: New Hampshire.
Mesochorus tachinae Ashmead, Proc. Entom. Soc. Washington IV. P. 2. 1898 p. 168 n. 50, ♀.

tachypus Holmgr.[3]) — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr. [♀ ♂ var.
Mesochorus tachypus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 130 n. 25,
Mesochorus tachypus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 342 n. 34, ♀ ♂.

temporalis Thoms.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Mesochorus temporalis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 336 n. 10, ♀ ♂.

tenuiscapus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesochorus tenuiscapus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 341 n. 30, ♀ ♂.

testaceus Grav.[5]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Gallia.
Mesochorus testaceus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 973 n. 335, ♂.
Mesochorus testaceus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 439 n. 5, ♂.
Mesochorus testaceus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 128 [n. 21, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Pieris rapae (Scudder ap. Howard), Zygaena peucedani, Ocneria dispar L. (Brischke). — *Hymen.:* Cimbex axillaris Jur. = humeralis Ol. (Ratzeburg).

[2]) *Lep.:* Geometra grossulariata (Thomson).

[3]) *Lep.:* Eupithecia Knautiana (Cross).

[4]) *Lep.:* Zygaena filipendulae (Bignell).

[5]) *Hymen.:* Nematus cirrhopus, Tenthredo repanda. — *Lep.:* Eupithecia pimpinellaria (Brischke).

Mesochorus testaceus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 181, ♀ ♂.
Mesochorus testaceus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 337 n. 16, ♀ ♂.

tetricus Holmgr.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀ ♂.
Mesochorus tetricus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 122 n. 12,
Mesochorus tetricus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 334 n. 6, ♀ ♂.

thomsonii D. T. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr. [Brischke].
Mesochorus nigriceps Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 334 n. 4, ♀ ♂ [non Mesochorus Thomsonii m.

thoracicus Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Gallia.
Mesochorus thoracicus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 971 n. 334, ♀ ♂.
Mesochorus thoracicus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 120 n. 14, ♀.
Mesochorus thoracicus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (6) X. 1852 p. 437 n. 3, ♀.
Mesochorus thoracicus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 328 n. 19.
Mesochorus thoracicus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 117
Mesochorus thoracicus Kawall, Stettin. entom. Zeitg. XXII. 1861 p. 125, ♀. [n. 1, ♀ ♂ var.
Mesochorus thoracicus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 180, ♂.
Mesochorus thoracicus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 339 n. 23, ♀ ♂.
Mesochorus thoracicus R. v. Stein, Entom. Nachr. XI. 1885 p. 308.

totanacus Cress. — Am.: Mexico.
Mesochorus Totanacus Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 23.
Mesochorus Totanacus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 388 n. 1, ♀.

tuberculiger Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesochorus tuberculiger Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 333 n. 2, ♀ ♂.

uniformis Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Mesochorus uniformis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 171, ♀.

velox Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesochorus velox Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 127 n. 19, ♀ ♂.
Mesochorus velox Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 343 n. 42, ♀ ♂.

vitreus Walsh[3]) — ♀ ♂ — Am. bor.
Mesochorus vitreus Walsh, Insect. injur. Illinois 1861 p. 43.
Mesochorus vitreus Walsh-Riley, 2nd Ann. Rep. Insect. Missouri 1870 p. 52; Fig. 19.
Mesochorus vitreus Packard, 9th Rep. U. St. Geol. & Geogr. Surv. f. 1875. 1877 p. 705, ♀ ♂.
Mesochorus vitreus Riley, 8th Ann. Rep. Insect. Missouri 1876 p. 53; Fig. 35.
Mesochorus vitreus Thomas, 10th Rep. State Entomol. Illinois f. 1880. 1881 p. 39.
Mesochorus vitreus Riley, 3th Rep. U. St. Entom. Commiss. 1883 p. 127; T. 2 F. 8.

vittator (Zett.) Holmgr.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Lapponia, Suecia.
Tryphon (Mesoleptus) vittator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 387 n. 19, ♀.
Mesochorus vittator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 126 n. 18,
Mesochorus vittator Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 340 n. 28, ♀ ♂. [♀ ♂ var.

vitticollis Holmgr.[5]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesochorus splendidulus var. 7 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 965, ♀. [♀ ♂.
Mesochorus vitticollis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 128 n. 22,
Mesochorus vitticollis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 181, ♀ ♂.
Mesochorus vitticollis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 337 n. 15, ♀ ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Apanteles octonarius in: Notodonta dromedarius (Bignell).

[2]) *Col.:* Agelastica alni L. (Ratzeburg), Galeruca lineola Fbr. (Ratzeburg), Chrysomela varians (Kawall). — *Lep.:* Zygaena onobrychis (Giraud).

[3]) *Lep.:* Leucania unipunctata (Riley).

[4]) *Hymen.:* Limnebia chrysosticta in: Hyponomeuta evonymella (Bignell).

[5]) *Lep.:* Fidonia cebraria, Cucullia argentea (Brischke).

ASTIPHROMMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 170 n. 2.
ἀ-priv.; στιφρός, densus; ὄμμα, oculus.

Synon.: Astiphrommus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 327 n. 1.
Mesochorus Holmgren.

anale (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesochorus analis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 120 n. 6, ♀ ♂.
Mesochorus analis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 180, ♀ ♂.
Mesochorus (Astiphrommus) analis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 331 [n. 12, ♀ ♂.

buccatum Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesochorus (Astiphrommus) buccatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 329 [n. 5, ♀ ♂.

dorsale (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Mesochorus dorsalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 117 n. 2, ♀ ♂.
Mesochorus (Astiphromma) dorsalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 [p. 180, ♀.
Mesochorus hirsutus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 168.
Mesochorus (Astiphrommus) dorsalis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 328 n. 1, [♀ ♂.

granigerum Thoms.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia.
Mesochorus (Astiphrommus) graniger Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 328 n. 2, [♀ ♂.

hamulum Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Dania.
Mesochorus (Astiphrommus) hamulus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 330 n. 8, [♀ ♂.

incidens Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Mesochorus (Astiphrommus) incidens Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 331 n. 10, [♀ ♂.

leucogrammum (Holmgr.) Thoms.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesochorus leucogrammus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 121 [n. 10, ♀.
Mesochorus leucogrammus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 180, ♀ ♂.
Mesochorus (Astiphrommus) leucogrammus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 [p. 331 n. 11, ♀ ♂.

mandibulare Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesochorus (Astiphrommus) mandibularis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 330 [n. 9, ♀ ♂.

marginellum (Holmgr.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesochorus marginellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 121 [n. 8, ♀.
Mesochorus (Astiphrommus) marginellus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 329 [n. 6, ♀ ♂.

mexicanum Ashm. — Am.: California.
Astiphromma Mexicanus Ashmead, Proc. Californ. Acad. IV. 1894 p. 129.

pectorale Ashm. — ♂ — Am.: Texas.
Astiphromma pectoralis Ashmead, Entom. News III. 1892 p. 107, ♂.

plagiatum Thoms.[3]) — ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Mesochorus (Astiphrommus) plagiatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 332 [n. 15, ♂.

scutellatum (Grav.) Thoms.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesochorus scutellatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 973 n. 336, ♂.
Mesochorus scutellatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 111 n. 8, ♀.
Mesochorus festivus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 121 n. 9, ♀ ♂.

---

1) *Dipt.:* Exorista vulgaris Fabr. in: Abraxas grossulariata (Bignell).
2) *Lep.:* Eupithecia sobrinata, E. pimpinellaria, E. exiguaria, E. lariciaria (Brischke).
3) *Lep.:* Odontopora bidentata (Bignell).
4) *Hymen.:* Lophyrus pini L. (Ratzeburg), Nematus latipes Brischke.

Mesochorus (Astiphromma) scutellatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. [1880 p. 179, ♀♂.
Mesochorus (Astiphrommus) scutellatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 320 [n. 7, ♀♂.

simplex Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesochorus (Astiphrommus) simplex Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 332 n. 13, [♀♂.

strenuum (Holmgr.) Thoms.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesochorus splendidulus var. 6 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 717.
Mesochorus splendidulus var. 6 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 969. [♀♂.
Mesochorus strenuus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 119 n. 5,
Mesochorus strenuus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 180, ♀♂.
Mesochorus (Astiphrommus) strenuus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 329 n. 4, [♀♂.

tenuicorne Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesochorus (Astiphrommus) tenuicornis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 332 [n. 14, ♀♂.

varipes (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesochorus varipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 120 n. 7, ♀.
Mesochorus (Astiphrommus) varipes Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 329 n. 3, [♀♂.

PLESIOPHTHALMUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 170 n. 1.
πλησιός, propinquus; ὀφθαλμός, oculus.

paniscoides Ashm. — ♂ — Am.: Massachusetts.
Plesiophthalmus paniscoides Ashmead, Entom. News III. 1892 p. 107, ♂.

6. *Subfam.* Banchinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 141 & 157.

AGATHILLA[2])

Westwood, Tijdschr. v. Entom. XXV. 1882 p. 23.
Agathis, nom. propr. Hymen.

fulvopicta Westw. — ♀ — Am.: Mexico.
Agathilla fulvopicta Westwood, Tijdschr. v. Entom. XXV. 1882 p. 24 n. 8, ♀; T. 6 F. 1-7.

AGATHOBANCHUS

Asmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 97.
Agathis-Banchus, nom. propr. Hymen.

aequatus (Say) Ashm. — Am.: Indiana.
Banchus aequatus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 247 n. 2.
Banchus aequatus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 701 n. 2.
Agathobanchus aequatus Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 97.

---

[1]) *Lep.:* Cucullia spec., Eupithecia actaeata (Brischke).

[2]) Vide Vol. IV huius operis p. 144. — Hoc genus, a clar. auctore dom. Westwoodio generi Microdo comparatum, a clar. auctore dom. Ashmead Ichneumonidibus adnumeratur.

CERATOGASTER

Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 368.
κέρας, cornu; γαστήρ, venter.

Synon.: Ceratosoma Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 281 [nec Reeves 1880].
κέρας, cornu; σῶμα, corpus.
Exetastes Provancher.

apicalis (Cress.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Colorado.
Ceratosoma apicalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 281, ♀ ♂.
Ceratosoma apicalis Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 102, ♀ ♂.
Ceratogaster apicalis m.

fasciata (Cress.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: United States.
Ceratosoma fasciata Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 283.
Ceratosoma fasciata Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 103, ♀ ♂.
Ceratogaster fasciata m.

rubyata (Davis) D. T. — ♀ — Am.: Illinois.
Ceratosoma rubyata Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 366, ♀.
Ceratogaster rubyata m.

rufa (Prov.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Exetastes rufus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 78.
Exetastes rufus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 213 n. 8, ♀ ♂.
Exetastes rufus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 387 n. 8, ♀ ♂.
Ceratosoma rufa Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 7 n. 794.
Ceratogaster rufa m.

BANCHUS

Fabricius, Suppl. Entom. System. 1798 p. 209 & 233.
Banchus, Nom. propr.

Synon.: Ichneumon Fabricius.

acuminator Fabr.! — Eur. centr.
Ichneumon acuminator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 268 n. 103.
Ichneumon acuminator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 180 n. 137.
Ichneumon acuminator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2695 n. 158.
Ichneumon acuminator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 192 n. 141.
Ichneumon acuminator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 173 n. 165.
Banchus acuminator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 128 n. 9.
Banchus acuminator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1050 n. 264.

borealis Cress. — ♂ — Am.: Canada.
Banchus borealis Cresson, Canad. Entomol. I. 1868 p. 34.
Banchus borealis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 216 n. 4, ♂.
Banchus borealis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 389 n. 4.

canadensis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Banchus Canadensis Cresson, Canad. Entomol. I. 1868 p. 34.
Banchus Canadensis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 217 n. 5, ♀ ♂.
Banchus Canadensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 390 n. 5, ♀ ♂.

compressus Fabr.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon XXX Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 61 F. 6.

---

[1] *Lep.:* Trachea piniperda, Liparis auriflua (Ratzeburg); Hadena porphyrea (Brischke).

Ichneumon spec. Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 120 F. 8.
Ichneumon LXVIII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768; T. 130 F. 4, ♂.
? Ichneumon variegator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 339 n. 66, ♂.
? Ichneumon variegator Fabricius, Spec. Insect. 1781 p. 433 n. 85, ♂.
? Ichneumon volutatorius Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 349 n. 704, ♂.
Ichneumon umbellatarum Schrank, Bayer. Reise 1786 p. 261.
? Ichneumon variegator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 268 n. 102, ♂.
Ichneumon compressus Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 App.
? Ichneumon variegator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 178 n. 130, ♂.
Ichneumon compressus Villers, C. Linnaei Entom. IV. 1789 p. 550 n. 1, ♀.
Ichneumon umbellatarum Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2677 n. 85.
? Ichneumon variegator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2694 n. 157, ♂.
Ichneumon compressus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2707 n. 222, ♀.
Ichneumon aries Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 339; T. 33 F. 6.
? Ichneumon variegator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 361, ♂.
? Ichneumon variegator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 191 n. 140, ♂.
? Ichneumon variegator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 173 n. 164, ♂.
Ichneumon compressus Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 180 n. 195, ♀.
? Banchus variegator Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 234 n. 4, ♂.
Banchus compressus Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 234 n. 5, ♀.
Ichneumon umbellatarum Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 261 n. 2051.
Ichneumon labiatus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 264 n. 2058, ♂.
? Ichneumon volutatorius Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 266 n. 2061, ♂.
Ichneumon tricolor Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 286 n. 2094, ♂.
? Banchus variegator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 128 n. 8, ♂.
Banchus compressus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 129 n. 11, ♀.
Ichneumon vigilatorius Panzer, Nomencl. 1804 p. 79.
Ichneumon (Banchus) compressus Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 8, ♀.
Banchus compressus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 377 n. 2, ♀ ♂.
Banchus compressus Curtis, Brit. Entom. XIII. 1836 p. 588 n. 2, ♀.
Ichneumon (Banchus) compressus Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 26 n. 15; T. 6 F. 3.
Banchus compressus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 104 n. 1, ♀ ♂.
Banchus compressus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 87 n. 1.
Banchus compressus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. 1. 1849 p. 631, ♀ ♂.
Banchus compressus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 93 n. 1.
Banchus compressus Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVIII. 1857 p. 197 n. 13.
Banchus compressus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 148 n. 1,
Banchus compressus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 198, ♂.
Banchus compressus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1897 p. 2411 n. 1, ♀ ♂.

elator Fabr. — Eur.: Austria.
Banchus elator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 128 n. 7.
Banchus elator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1000 n. 176.

falcatorius Fabr.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon volutatorius Ström, Trondhiemske Selsk. Skrift. III. 1765 p. 377 & 419 n. 43.
Ichneumon XV Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1766; T. 20 F. 13, ♂.
Ichneumon LIX Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768; T. 116 F. 5, ♂.
Ichneumon LXIII & LXIV Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768; T. 120 F. 7 & 8, ♂.
Ichneumon LXXXII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 2. 1769; T. 195 F. 3 & 4, ♂.
Ichneumon falcatorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 332 n. 29, ♂.

---

[1]) *Lep.*: Geometra piniaria (Bouché).

Ichneumon venator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 337 n. 57, ♀.
Ichneumon falcatorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 425 n. 30, ♂.
Ichneumon venator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 432 n. 71, ♀.
Ichneumon falcatorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 262 n. 37, ♂.
Ichneumon venator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 267 n. 87, ♀.
Ichneumon falcatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 151 n. 48, ♂.
Ichneumon falcatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2682 n. 101, ♂.
Ichneumon falcatorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 340, ♂.
Ichneumon falcatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 175 n. 55, ♂.
Ichneumon falcatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 148 n. 59, ♂.
Ichneumon venator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 168 n. 143, ♀.
Banchus venator Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 233 n. 1, ♀.
Banchus falcatorius Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 234 n. 8, ♂.
Banchus pictus Panzer, Faun. Insect. German. VI. 1799 P. 71 T. 18 (♂).
Banchus venator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 71 n. 1, ♀.
Banchus falcatorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 71 n. 5, ♂.
Banchus venator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 126 n. 1, ♀.
Banchus falcator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 128 n. 6, ♂.
Ichneumon venator Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 183 n. 16, ♀.
Banchus pictus Panzer, Krit. Rev. II. 1806 p. 85; T. 1 Fig. s.
Ichneumon venator Jurine, Nouv. méth. Class. Hymén. 1807 p. 107, ♀ ♂.
Ichneumon (Banchus) venator Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 8, ♀.
Ichneumon (Banchus) falcator Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 8, ♂.
Banchus venator Panzer, Faun. Insect. German. X. 1812 P. 109 T. 15 (♀).
Banchus venator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 293, ♀.
Banchus falcator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 293, ♂.
Ichneumon venator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265, ♀.
Ichneumon venator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 320, ♀.
Banchus falcator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 385 n. 4, ♀ ♂.
Banchus falcator Bouché, Naturg. d. Insect. 1834 p. 146 n. 19, ♂.
Banchus falcator Curtis, Brit. Entom. XIII. 1836 p. 588 n. 4, ♂.
Banchus Farrani Curtis, Brit. Entom. XIII. 1836 p. 588, ♀; T. 588.
Banchus volutatorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 391 n. 1, ♂.
Banchus venator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 391 n. 3, ♀ [excl. ♂].
Banchus venator Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 59.
Banchus falcator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 106 n. 2, ♀ ♂. [F. 3.
Ichneumon (Banchus) falcatus Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3ª Insect. II. 1849; T. 111
Banchus falcator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 631.
Banchus falcator Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet. Akad. Förh. XV. 1858 p. 330 n. 24.
Banchus falcator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 148 n. 2, ♀ ♂.
Banchus venator Duméril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 897 n. 1.
Banchus falcator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 198, ♀ ♂.
Banchus falcator Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1897 p. 2412 n. 4, ♀ ♂.

ferrugineus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Banchus ferrugineus Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 14.
Banchus ferrugineus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 217 n. 6, ♂.
Banchus ferrugineus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 390 n. 6, ♂.

flavescens Cress. — ♂ — Am.: Canada.
Banchus flavescens Cresson, Canad. Entomol. I. 1868 p. 33.
Banchus flavescens Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 217 n. 7, ♂.
Banchus flavescens Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 391 n. 7, ♂.

flavovariegatus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Banchus flavovariegatus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 61.
Banchus flavovariegatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 215 n. 2, ♀ ♂.
Banchus flavovariegatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 389 n. 2, ♀ ♂.
femoralis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Banchus pictus var. Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 632.
Banchus femoralis Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1899 p. 2411 n. 3, ♀.
formidabilis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Banchus formidabilis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 61.
Banchus formidabilis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 215 n. 1, ♀.
Banchus formidabilis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 388 n. 1, ♀.
fulvus Fabr.! — Am.
Ichneumon fulvus Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 341 n. 77.
Ichneumon fulvus Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 436 n. 97.
Ichneumon fulvus Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 268 n. 115.
Ichneumon fulvus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2707 n. 179.
Ichneumon fulvus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 360.
Ichneumon fulvus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 196 n. 158.
Ichneumon fulvus Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 179 n. 189.
Banchus fulvus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 129 n. 14.
Ichneumon fulvator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 260.
Ichneumon fulvator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 309.
inermis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Banchus inermis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 62.
Banchus inermis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 216 n. 3, ♀.
Banchus inermis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 389 n. 3, ♀.
insignis Prov. — Am.
Banchus insignis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 63.
mexicanus Cam. — ♂ — Am.: Mexico.
Banchus Mexicanus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 50. 1886 Hymen. I. p. 311 n. 1, ♂; T. 12 F. 6.
nervulus Say — Am.: Indiana.
Banchus nervulus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 246 n. 1.
Banchus nervulus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 700 n. 1.
pallescens Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Banchus pallescens Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 62.
Banchus pallescens Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 218 n. 8, ♂.
Banchus pallescens Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 391 n. 8, ♂.
palpalis Ruthe — ♂ — Eur.: Islandia.
Banchus palpalis Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 377 n. 64, ♂.
pictus Fabr.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Frisch, Beschr. Insekt. Teutschland II. 1721 p. 11; T. 2 F. 12.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 67 n. 299.
Ichneumon cultratus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2708 n. 350.
Ichneumon mutillatus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 358; T. 37 F. 4.
Banchus pictus Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 234 n. 7.
Banchus pictus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 129 n. 12.
Ichneumon pictus Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 183 n. 17.

---

[1]) *Lep.:* Panolis piniperda (Brischke), Selenia illunaria (Bignell), Smerinthus populi, Trigonophora empyrea (Giraud), Cirrhoidea ambusta Fabr. (Mocsáry).

Ichneumon pictus Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 111, ♀.
Banchus pictus Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 293.
Banchus pictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 380 n. 3, ♀ ♂.
Banchus pictus Curtis, Brit. Entom. XIII. 1836 p. 588 n. 3, ♀ ♂.
? Banchus pictus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 391 n. 2, ♂.
Banchus pictus Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 326 n. 382.
Banchus pictus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 631.
Banchus pictus Duméril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 897 n. 5.
Banchus pictus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 198, ♀ ♂.
Banchus pictus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1899 p. 2411 n. 2, ♀ ♂.

quadrator Schellenb.! — ♀ — Eur.: Helvetia.
Banchus quadrator Schellenberg, Entom. Beitr. I. 1802 p. 21; T. 8 F. 1-4.
Banchus quadrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 958 n. 114, ♀.

robustus Rdw. — Eur.: Germania.
Banchus robustus Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 246 n. 24.

rufiventris Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Banchus rufiventris Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 125 n. 1, ♀.

spinosus Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Banchus spinosus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 274 n. 2, ♂.

superbus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Colorado.
Banchus superbus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 273 n. 1, ♂.
Banchus polychromus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 366 n. 10, ♀.

varius Fabr.! — Eur.
Ichneumon varius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 181 n. 196.
Banchus varius Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 234 n. 6.
Banchus varius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 71 n. 3.
Banchus varius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 129 n. 13.
Ichneumon varius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 260.
Ichneumon varius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 309.
Banchus varius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1077 n. 312.

villosulus Grav.! — Eur.
Banchus villosulus Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 267 n. 3786-87.

volutatorius (L.) Blanch. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon volutatorius Linné, Syst. nat. Ed. 10a I. 1758 p. 562 n. 15.
Ichneumon volutatorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2a 1761 p. 400 n. 1591.
Ichneumon volutatorius Linné, Syst. nat. Ed. 12a I. 2. 1767 p. 932 n. 14.
Ichneumon volutatorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 330 n. 18.
Ichneumon volutatorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 847 n. 14.
Ichneumon volutatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 153 n. 1777.
Ichneumon volutatorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 423 n. 18.
Ichneumon volutatorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 261 n. 22.
Ichneumon volutatorius Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. Nya Saml. III. 1788 p. ?
Ichneumon volutatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 145 n. 32.
Ichneumon volutatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2680 n. 14.
Ichneumon volutatorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 343.
Ichneumon volutatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 170 n. 33.
Ichneumon volutatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 143 n. 40.
Ichneumon volutatorius Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 158 n. 484.
Ichneumon volutatorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 53 n. 24.
Ichneumon mercatorius (recte volutatorius) Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 61 n. 37.
Ichneumon volutatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♀.

Ichneumon volutatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279.
Ichneumon volutatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 361.
Banchus falcator var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 385 n. 4, ♂.
Banchus monileatus var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 375 n. 4, ♀.
Banchus pictus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 391 n. 2, ♂.
Banchus volutatorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 324 n. 1. [♀♂.
Banchus volutatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 149 n. 3,
Banchus volutatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 198, ♀♂.
Banchus volutatorius Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1899 p. 2413 n. 5, ♀ ♂.

zonatus Rdw. — Eur.: Germania.
Banchus zonatus Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 57 n. 1.

BANCHOIDES

Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. VII. 1888 p. 220.
Banchus, nom. propr. Hymen; εἶδος, forma.

Synon.: Banchopsis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XII. 1886 p. 244 [non Rudow].
Banchus, nom. propr. Hymen.; ὄψ, visus.

graeca (Kriechb.) D. T. — ♀ — Eur.: Graecia.
Banchopsis Graeca Kriechbaumer, Entom. Nachr. XII. 1886 p. 244 n. 4, ♀.
Banchoides Graeca Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. VII. 1888 p. 220.

EUCERIBANCHUS

A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 10. 1887 p. 6.
εὖ bene; κέρας, cornu; Banchus, nom. propr. Hymen.

maculipennis Costa — ♀ — Eur.: Italia. [F. 5.
Euceribanchus maculipennis A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 10. 1887 p. 6, ♀; T. 1

BALIENA

Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIV. P. 5. 1900 No. 15 p. 101.
Etymol. obscura.

leptopus Cam. — ♀ — As.: India or.
Baliena leptopus Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIV. P. 5. 1900 No. 15 p. 102, ♀.

CIDAPHURUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 159 n. 13.
Etymol. obscura.

Species exstat.

CORYNEPHANES

Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 631.
κορύνη, clava; φαίνω, monstro.

Synon.: Banchus Gravenhorst.
Ichneumon Gravenhorst, Curtis, Wesmael, Holmgren.

groenlandicus Auriv. — ♀ ♂ — Am.: Groenlandia.
Banchus (Corynephanus) Groenlandicus Aurivillius, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. XV. P. 4.
[1893 p. 30 n. 10, ♀♂; Fig.

monileatus (Grav.) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
? Ichneumon hastator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 167 n. 141.
? Banchus hastator Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 233 n. 2.
? Banchus hastator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 71 n. 2.
? Banchus hastator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 127 n. 2.
? Ichneumon pungitor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
? Ichneumon pungitor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 320.
Banchus monileatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 393 n. 5, ♀ ♂.
Banchus hastator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1059 n. 281.
Banchus hastator Curtis, Brit. Entomol. XIII. 1836 p. 588 n. 5, ♀ [non Fabricius].
Banchus (Corynephanes) monileatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 631.
Banchus (Corynephanes) monileatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. [(Oph.) p. 149 n. 4, ♀.
Banchus hastator Duméril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 897 n. 2.
Banchus monileatus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1899 p. 2413 n. 6, ♀ ♂.

XENOSCHESIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 158 n. 8.
ξενός, peregrinus; χεσείω, cacaturio.
Species exstat.

KRIECHBAUMERIA

Dalla Torre, Jahresber. naturf. Ges. Graubünden XXVIII. 1885 p. 52.
J. Kriechbaumer, Monacensis.

Synon.: Holmgrenia Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXI. 1877 [p. 146 [non Förster].
A. E. Holmgren, nom. propr.

pulchra (Kriechb.) D. T. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Holmgrenia pulchra Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXI. 1877 [p. 148, ♀.
Kriechbaumeria pulchra m.

EXETASTES

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 395 n. 2.
ἐξεταστής, explorator.

Synon.: Banchus Gravenhorst.
Cryptus Fabricius, Gravenhorst.
Ichneumon Fabricius & auct.
Ophion Fabricius & auct.
Paniscus Provancher.
Tryphon Zetterstedt.

abbreviatus Davis — ♀ ♂ — Am.: New Hampshire.
Exetastes abbreviatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 366, ♀ ♂.
abdominalis Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Exetastes abdominalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 276 n. 4, ♀.
aethiops Rdw.! — ♀ — Eur.: Gallia.
Exetastes aethiops Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 42, ♀ [non Gravenhorst].
aethiops Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Exetastes aethiops Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 398 n. 6, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Anarta myrtilli (Bignell), Hadena baltica (Brischke).

affinis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Colorado.
Exetastes affinis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 277 n. 5, ♀.
Exetastes affinis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 212 n. 3, ♂.
Exetastes affinis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 385 n. 3, ♂.
albiger Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Dalmatia.
Exetastes albiger Kriechbaumer, Entom. Nachr. XII. 1886 p. 245 n. 5, ♀ ♂.
albitarsis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Exetastes albitarsis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 78.
Exetastes albitarsis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 213 n. 5, ♀.
Exetastes albitarsis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 385 n. 5, ♀.
alpinus Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia, Tirolia.
Exetastes alpinus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 354, ♀ ♂.
atrator (Forst.) Marsh.! — Eur.: Britannia.
Ichneumon atrator Forster, Nov. spec. Insect. 1771 p. 84 n. 84.
Ichneumon obscurator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2687 n. 199.
Cryptus obscurator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 287.
Ichneumon atrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 903 n. 37ᵇ.
Exetastes atrator Marshall, Catal. Brit. Hymen. III. 1872 p. 64 n. 14.
bicoloratus Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Exetastes bicoloratus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 421 n. 20, ♀ ♂.
Exetastes bicoloratus Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 26; T. 17 F. 5.
bilineatus Grav. — ♂ — Eur.: Italia.
Exetastes bilineatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 415 n. 16, ♂.
bioculatus Cress.[2]) — ♂ — Am.: Texas.
Exetastes bioculatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 169, ♂.
braunsii D. T. — ♀ ♂ — Eur.
Exetastes scutellaris Brauns, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. P. 1. 1888 p. 7, ♀ ♂ [non Exetastes Braunsii m. [Cresson].
brunnipes Grav. — ♀ — Eur.: Austria inf.
Exetastes brunnipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 399 n. 7, ♀.
caeruleus Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Exetastes coeruleus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 276 n. 3, ♀.
calobates Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Italia.
Exetastes calobatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 405 n. 10ᵇ, ♀.
Exetastes calobatus Bridgman, Entomologist XI. 1878 p. 36, ♂.
Exetastes calobates Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1895 p. 37.
castaneus Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Exetastes castaneus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 130 n. 3, ♀.
caudatus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Anaheim.
Banchus caudatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 121, ♀.
Exetastes caudatus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 189.
cimbicis Vollenh.[3]) — As.: Batavia.
Exetastes cimbicis Vollenhoven, Herklots Bouwstoffen II. P. 3. 1858 p. 281 n. 313.
cinctipes (Retz.) Thoms.[4]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 346 n. 57.

---

[1]) *Lep.:* Cucullia scrophulariae (Giraud).
[2]) = ? E. decoloratus Cress.
[3]) *Hymen.:* Cimbex aenea Fabr. (Vollenhoven).
[4]) *Lep.:* Mamestra brassicae, Retinia pinicolana (Bignell), Noctua persicariae (Vallot), N. oleracea (Boie).

Ichneumon XIV Schaeffer, Icon. Insect Ratisbon. I. 1766; T. 20 F. 12 (♀).
—— Degeer, Mém. hist. Insect. II. 1. 1771 p. 848 n. 4; T. 29 F. 10-11.
—— Götze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 168 n. 4; T. 29 F. 10-11.
Ichneumon cinctipes Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 68 n. 269.
Ichneumon junci Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 413 n. 58.
Ichneumon osculatorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 261 n. 20, ♂.
Ichneumon osculatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 151 n. 50, ♂.
Ichneumon junci Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 155 n. 61.
Ichneumon cinctipes Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 187 n. 162.
Ichneumon osculatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2680 n. 92, ♂.
Ichneumon osculatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 170 n. 31 [non Fabr.]
Ichneumon osculatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 142 n. 38, ♂.
Ichneumon clavator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 151 n. 74, ♀.
Ichneumon osculatorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 53 n. 22, ♂.
Cryptus osculatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 76 n. 23, ♂.
Ophion clavator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 134 n. 17, ♀.
Ophion tarsator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 134 n. 20, ♀.
Ophion clavator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 89.
Ichneumon clavator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀ ♂.
Ophion clavator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 512 n. 23, ♀.
Ophion tarsator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 512 n. 26, ♀.
Banchus osculatorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 294, ♂.
Banchus clavator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 294, ♀.
Ichneumon tarsator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258, ♀.
Ichneumon osculatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277, ♂.
Ichneumon tarsator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 302, ♀.
Ichneumon osculatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 354, ♂.
Exetastes clavator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 405 n. 11, ♀.
Exetastes osculatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 413 n. 15, ♂.
Ichneumon osculatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 938 n. 90.
Ichneumon osculatorius Vallot, Mém. acad. sc. Dijon 1836 p. 244.
Tryphon (Exetastes) tarsator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 386 n. 13, ♀ ♂.
Exetastes clavator Liebold, Zeitschr. f. Entom. IV. 1843 p. 388; T. 2 F. 8.
Exetastes clavator Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 93 n. 23.
Exetastes tarsator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 150 n. 2, ♀ ♂.
Exetastes clavator Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 26; T. 17 F. 3.
Exetastes osculatorius Parfitt, Rep. & Trans. Devon. Assoc. XIII. 1881 p. 272.
Exetastes cinctipes Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1899 p. 2414 n. 1, ♀ ♂.

clavatus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Exetastes clavatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 213 n. 7, ♀.
Exetastes clavatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1886 p. 386 n. 7, ♀.

consimilis Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Exetastes consimilis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 278 n. 7, ♂.

crassus Grav.[1]) — ♀ — Eur.: Hungaria; As.: Batavia.
Exetastes crassus. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 423 n. 22, ♀.
Exetastes crassus Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 26, ♀; T. 17 F. 9.

cressonii D. T. — ♂ — Am.: Colorado.
Exetastes flavitarsis Cresson, Proc. Ent. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 277 n. 6, ♂ [nec Gravenhorst].
Exetastes Cressonii m.

---

1) *Lep.:* Chariclea delphinii L., Notodonta ziczac L. (Mocsáry).

decoloratus Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Exetastes decoloratus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 280 n. 10, ♂.
deuteromaurus D. T. — ♀ — Am.: California.
Exetastes maurus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 370, ♀ [non Desvignes].
Exetastes deuteromaurus m.
exploratus Davis — ♀ ♂ — Am.: Dakota, Michigan.
Exetastes exploratus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 365, ♀♂.
facialis Desv. — ♂ — Eur.: Britannia.
Banchus (Exetastes) facialis Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 95 n. 12, ♂.
fasciatus Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Exetastes fasciatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 128 n. 1, ♀.
fascilpennis Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Exetastes fascipennis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 278 n. 8, ♀.
Exetastes fascipennis Walsh, Trans Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 147, ♀.
Exetastes fascipennis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 92, ♀.
femorator Desv. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Banchus (Exetastes) femorator Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 94 n. 20, ♀♂.
Exetastes femorator Smith, Entomol. Annual f. 1857 p. 33.
Exetastes femorator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 152 n. 6, ♀.
Exetastes femorator Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 26, ♀; T. 17 F. 6.
Exetastes femorator Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1899 p. 2415 n. 2, ♀.
flavipennis Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Exetastes flavipennis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 275 n. 2, ♀.
flavitarsis Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Exetastes flavitarsis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 420 n. 19, ♂.
Exetastes flavitarsis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 199, ♂.
fornicator (Fabr.) Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur. centr.
Ichneumon fornicator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 432 n. 72.
Ichneumon fornicator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 267 n. 88.
Ichneumon fornicator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 176 n. 124.
Ichneumon fornicator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2692 n. 150.
Ichneumon fornicator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 168 n. 144.
Ichneumon fornicator Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 161 n. 496.
Banchus fornicator Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 233 n. 3.
Banchus fornicator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 127 n. 3, ♀.
Banchus fornicator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 86.
Ichneumon fornicator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀.
Banchus fornicator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 294.
Exetastes fornicator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 402 n. 10, ♀ ♂.
Banchus fornicator Trentepol, Isis 1829 p. 964 n. 80, ♀.
Tryphon (Exetastes) fornicator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 386 n. 11, ♀ ♂.
Banchus (Exetastes) fornicator Blanchard, Hist. nat Insect. III. 1840 p. 322 n. 2.
Exetastes fornicator Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 60.
Exetastes fornicator Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 92 n. 22, ♀.
Exetastes fornicator Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 329 n. 23.
Exetastes fornicator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 150 n. 1, ♀ ♂.
Banchus fornicator Duméril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 897 n. 3.
Exetastes fornicator Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 26; T. 17 F. 2.
Exetastes fornicator Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1899 p. 2415 n. 4, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Noctua oleracea (Vollenhoven), Cucullia balsamita (Brischke), Hadena brassicae (Boie).

geniculosus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia. Suecia.
Tryphon (Exetastes) incurvator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 386 n. 14, ♀ ♂ [p. p.].
Exetastes geniculosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 152 n. 5, ♀ ♂.
Exetastes geniculosus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1899 p. 2416 n. 6, ♀ ♂.
gracilicornis Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Exetastes gracilicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 429 n. 26, ♀.
Exetastes gracilicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 199, ♀.
guttatorius Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Exetastes guttatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 411 n. 14, ♀ ♂.
Exetastes guttatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 27 n. 4, ♀ ♂.
Exetastes guttatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 154 n. 10.
Exetastes guttatorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 26; T. 17 F. 7 (♂). [♀ ♂.
Exetastes guttatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 199, ♂.
Exetastes guttatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 67.
Exetastes guttatorius Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894 p. 24, ♀.
Exetastes guttatorius Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1899 p. 2417 n. 10.
var. **procerus** Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Littorale. [p. 24, ♀ ♂.
Exetastes guttatorius var. procera Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894
guttifer Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Exetastes guttatorius var. Gravenhorst, Ichneum. Europ, III. 1829 p. 411 n. 14, ♀.
Exetastes guttifer Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1899 p. 2417 n. 11, ♀.
ichneumoniformis Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Austria.
Exetastes ichneumoniformis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 410 n. 13, ♀ ♂.
Exetastes ichneumoniformis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 303 n. 17, ♀ ♂.
illusor Grav.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Exetastes illusor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 427 n. 25, ♀ ♂.
Exetastes illusor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 27 n. 3, ♀ ♂.
Exetastes illusor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 151 n. 3, ♀ ♂.
Exetastes illusor Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 26; T. 17 F. 4 (♂).
Exetastes illusor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 198, ♀ ♂.
Exetastes illusor Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1899 p. 2416 n. 5.
inquisitor Grav. — ♀ — Eur.: Germania, Austria.
? Ichneumon XXXVIII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 73 F. 1.
? Ichneumon ambustor Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 88.
Exetastes inquisitor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 419 n. 18, ♀.
? Ichneumon ambustor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1032 n. 229.
Exetastes inquisitor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 199, ♀.
levigator (Vill.) Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia, Germania, Italia.
Ichneumon laevigator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 193 n. 189.
Ichneumon laevigator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 216 n. 55.
Ichneumon cothurnatus Gravenhorst, Vergl. Uebers. zool. System. 1807 p. 258 n. 3742.
Cryptus laevigator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 288.
Exetastes laevigator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 424 n. 23, ♀ ♂.
Tryphon (Exetastes) incurvator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 386 n. 14, ♀ ♂ [p. p.].
Banchus (Exetastes) laevigator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 324 n. 3. [♀ ♂.
Exetastes laevigator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 151 n. 4,

---

[1]) *Lep.:* Caradrina Kadenii Ferr., C. ambigua Fbr. (Mocsáry), Toxocampa pastinum (Giraud).

[2]) *Lep.:* Hadena contigua (Brischke), Pieris brassicae (Giraud), Agrotis putris (Mocsáry).

Exetastes laevigator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N.F.IV. P. 4. 1880 p. 198, ♀ ♂.
Exetastes laevigator Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1899 p. 2416 n. 7.

latus Grav. — ♀ — Eur.: Volhynia.
Exetastes latus Gravenhorst, Ichneum. Europ. 1829 p. 400 n. 8, ♀.

maculatus Brullé — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Exetastes maculatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 129 n. 2, ♀ ♂.

matricus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Exetastes matricus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 213 n. 4, ♀.
Exetastes matricus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 385 n. 4, ♀.

maurus Desv. — Eur.: Britannia.
Banchus (Exetastes) maurus Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 95 n. 11.

medianus Szépl. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Exetastes medianus Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 30, ♀ ♂.

mexicanus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Exetastes Mexicanus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 389 n. 3, ♂.

niger Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Exetastes niger Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 275 n. 1, ♂ [excl. ♀].

nigripennis Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Austria, Volhynia.
Exetastes nigripennis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 426 n. 24, ♀ ♂.

nigripes Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Exetastes nigripes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 416 n. 17, ♀ ♂ [excl. var.].
Exetastes nigripes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 94.
Exetastes nigripes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 26 n. 2, ♀ ♂.
Exetastes nigripes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 153 n. 7, ♀ ♂.
Exetastes nigripes Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1899 p. 2415 n. 3, ♀ ♂.

notatus Holmgr.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Exetastes nigripes var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 416 n. 17.
Exetastes notatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 153 n. 8, ♀ ♂.
Exetastes notatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 26; T. 17 F. 8 (♂).
Exetastes notatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 199, ♀ ♂.
Exetastes notatus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1899 p. 2417 n. 8, ♀ ♂.

obscurus Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Exetastes obscurus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 281 n. 11, ♀.

peregrinus Woll. — ♂ — As.: Madeira.
Exetastes peregrinus Wollaston, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) I. 1858 p. 22, ♂; T. 4 F. 2.

provancheri D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Campoplex niger Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 148b n. 2, ♀; Fig. 7a [non Cresson].
Limneria genuina var. niger Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 364 n. 786.
Campoplex niger Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 362 n. 2, ♀; T. 1 F. 40.
Exetastes? niger Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 188.
Exetastes Provancheri m.

puberulus Szépl. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Exetastes puberulus Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 30, ♀ ♂.

robustus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Volhynia, Tauria.
Exetastes robustus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 422 n. 21, ♀ ♂.
Exetastes robustus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 153 n. 9, ♀.
Exetastes robustus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1899 p. 2417 n. 9.

---

[1]) *Lep.:* Mamestra brassicae (Bignell).
[2]) *Lep.:* Cucullia argentea (Brischke).

ruficornis Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Exetastes ruficornis Rudow, Soc. entom I. 1886 p. 42, ♀ ♂.
Exetastes ruficornis Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 245 n. 13, ♀ ♂.
rufofemoratus Prov.[1]) — ♀ — Am.: Canada.
Exetastes rufofemoratus Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 14.
Exetastes rufofemoratus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 212 n. 12, ♀.
Exetastes rufofemoratus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 384 n. 2, ♀.
scutellaris Cress. — ♀ ♂ — Am.: Colorado.
Exetastes scutellaris Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 279 n. 9, ♀ ♂.
segmentarius Pérez — Afr.: Teneriffa.
Exetastes segmentarius Pérez, Ann. soc. entom. France 1895 p. 201.
suaveolens Walsh — ♀ ♂ — Am.: Canada, Illinois.
Exetastes suaveolens Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 146, ♀ ♂.
Paniscus Quebecensis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 106.
Exetastes suaveolens Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 212 n. 1, ♀.
Exetastes suaveolens Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 384 n. 1, ♀.
tarsalis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Exetastes tarsalis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 389 n. 2, ♀ ♂.
tristis Grav. — ♀ — Eur.: Italia.
Exetastes tristis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 409 n. 12, ♀.
variegatus Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Exetastes variegatus Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 30, ♂.
vittatipes Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Exetastes vittatipes Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 389 n. 1, ♀.
zelotypus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Californien.
Exetastes zelotypus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 370, ♀ ♂.

SEMNOPHRYS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 158 n. 9.

σεμνός, venerabilis; *ὀφρύς*, supercilium.

Species exstat.

RHYNCHOBANCHUS

Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 59.

ῥύγχος, rostrum; Banchus, nom. propr. Hymen.

bicolor Kriechb. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Rhynchobanchus bicolor Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 60 n. 15, ♀.

LAPTON

Klug, Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VII. 1813 p. 45.

λάπτω, lambo.

femoralis Nees — ♀ — Eur.: Germania.
Lapton femoralis Nees, Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VII. 1813 p. 45-52; T. 1 F. 1-2a-c.
Lapton femoralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 724 n. 1, ♀.
Lapton femoralis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 137.

---

[1]) *Lep.*: Agrotis alternata Grt.

ITHAGENES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 158 n. 5.

ἰθαγενής, genuinus.

Species exstat.

TROPISTES

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 442 n. 5.

τροπίστης, victor.

Synon.: Banchus Blanchard.

nitidipennis Grav. — ♀ — Eur. centr.
Tropistes nitidipennis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 445 n. 33, ♀.
Banchus (Tropistes) nitidipennis Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 323 n. 6.
var. **fuscipes** Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania.
Tropistes nitidipennis var. fuscipes Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1874 p. 260, ♀.
var. **nigriventris** Kriechb. — ♀ — Eur.: Littorale.
Tropistes nitidipennis var. nigriventris Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1874 p. 260, ♀.
rufipes Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Tropistes rufipes Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 260, ♀.
var. **nigriventris** Kriechb. — ♀ — Eur.: Moravia.
Tropistes rufipes var. nigriventris Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 261, ♀.

7. *Subfam.* Paniscinae

Ashmead, Smith: Insects of New Jersey 1900 p. 582.

ABSYRTUS

Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 323 n. 7.
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 32.

Nom. propr.

luteus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Absyrtus luteus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 323 n. 7.
Absyrtus luteus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 33 n. 1, ♀ ♂.
Absyrtus luteus Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 15 n. 1, ♀ ♂.

PARABATES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 150 n. 6.

παρά, circum; βαίνω, vado.

Synon.: Parabatus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1194.
Ichneumon Geoffroy & auct. ant.
Ophion Gravenhorst.
Paniscus Gravenhorst & auct.

cristatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Parabatus cristatus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1197 n. 4, ♀ ♂.
Parabatus cristatus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 81 n. 5.
Paniscus (Parabatus) cristatus Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 136.

frankii Brauns — ♀ — Eur.: Germania.
Parabatus Frankii Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 80 n. 3, ♀.
Parabatus Franki Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 136, ♀ nota.

latungula Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Parabatus latungula Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1196 n. 2, ♀ ♂.
Parabatus latungula Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 81 n. 4, ♀ ♂.
Paniscus (Parabatus) latungula Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 136.

luteolus Tosqu. — ♀ — Afr.: Togo.
Paniscus (Parabatus) luteolus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 401 n. 1, ♀.

millieratae Kriechb.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Parabatus millieratae Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII. 1897 p. 316, ♀.

nigricarpus Thoms. — ♀ — Eur.: Britannia, Suecia.
Parabatus nigricarpus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1196 n. 1, ♀.
Parabatus nigricarpus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 80 n. 1.
Parabatus nigricarpus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 419.
Paniscus (Parabatus) nigricarpus Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 135.

tarsatus (Brischke) Bridgm.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Paniscus tarsatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 138, ♀ ♂.
Paniscus tarsatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 13, ♀ ♂.
Parabatus tarsatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 420.
Paniscus (Parabatus) tarsatus Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 130 & 137.

virgatus (Fourcr.) Thoms.[3] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 333 n. 25.
Ichneumon virgatus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 401 n. 25.
Ichneumon virgatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 204 n. 228.
Ophion virgatum Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX 1818 p. 295.
Paniscus virgatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 625 n. 106, ♀ ♂.
Paniscus virgatus Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 60.
Paniscus virgatus Newport, Trans. Linn. Soc. London XXI. 1. 1852 p. 71; T. 8 F. 13-19.
Paniscus virgatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 32 n. 4, ♀ ♂.
Paniscus virgatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 138, ♀ ♂.
Paniscus vigatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 13 n. 2, ♀ ♂.
Parabatus virgatus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1197 n. 3, ♀ ♂.
Parabatus virgatus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 80 n. 2, ♀ ♂.
Parabatus virgatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 420.
Parabatus virgatus Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 136, ♀ ♂ nota.

---

[1] *Lep.*: Eupithecia Millierata (Kriechbaumer).

[2] *Lep.*: Eupithecia succenturiata, E. castigata (Brischke), E. virgaureata (Bignell), E. vulgata (Fletcher), E. absynthiata, E. lariciata (Brischke, Bignell), E. abbreviata (Bignell), E. exiguata, Drapana falcula, D. unguicula (Brischke).

[3] *Lep.*: Odontopera bidentata (Bignell), Eupithecia absynthiata, E. succenturiata (Bignell), Drepana unguicula (Brischke), Dicranura bifida (Gravenhorst), Cosmia trapezina (Bignell), Hadena pisi (Newport), Catocala promissa (Giraud etc.), Halias prasinana (Brischke).

PANISCUS

Schrank, Fauna Boica II. P. 2. 1802 p. 316.
Nom. propr.

Synon.: Ichneumon Rossi & auct. ant.
Netelia Gray.
Ophion Olivier, Say.
Perilissus Ashmead.

albipictus Tosqu. — ♂ — Afr.: Delagoa Bay.
Paniscus albipictus Tosquinet, Ichneumon d'Afrique 1896 p. 410 n. 7, ♂.
albotarsatus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Paniscus albotarsatus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 106.
Paniscus albotarsatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 146b n. 3, ♂.
Paniscus albotarsatus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 364 n. 3, ♀. [n. 1, ♀.
Paniscus albotarsatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 361 n. 3, ♂ & p. 385
Perilissus paniscoides Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 197, ♂ (excl. ♀).
albovariegatus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Paniscus albovariegatus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 106.
Paniscus albovariegatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 146b n. 2, ♀.
Paniscus albovariegatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 361 n. 2, ♀.
alpinus Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia.
Paniscus alpinus Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 41, ♀ ♂.
areolatus Boie[1]) — ♂ — Eur.: Germania.
Paniscus areolatus Boie, Stettin. entom. Zeitg. XI. 1850 p. 215 n. 11, ♂.
brachycerus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Paniscus brachycerus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1201 n. 5, ♀ ♂.
Paniscus brachycerus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 83 n. 2.
Paniscus brachycerus Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 128 nota, ♀ ♂.
capensis Holmgr. — ♀ ♂ — Afr.: Cap.
Paniscus Capensis Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 412 n. 47, ♀ ♂.
Paniscus Capensis Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 260 n. 1, ♀.
capito Kok. — ♀ — As.: Transcaucasia.
Paniscus capito Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 132 & 141, ♀.
var. **sibiricola** Kok. — ♀ — As.: Sibiria.
Paniscus var. sibiricola Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 142, ♀.
caucasicus Kok. — ♀ ♂ — As.: Transcaucasia.
Paniscus Caucasicus Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 134 & 140, ♀ ♂.
cephalotes Holmgr.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota. [♀ ♂.
Paniscus cephalotes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 31 n. 1,
Paniscus cephalotes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 138, ♀ ♂.
Paniscus testaceus Andrews, Entomologist XV. 1882 p. 163-164.
Paniscus cephalotes Kingsford, Entomologist XVI. 1883 p. 67-70.
Paniscus cephalotes Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 13 n. 1, ♀ ♂.
Paniscus cephalotus Poulton, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 162-168.
Paniscus cephalotes Poulton, Trans. Entom. Soc. London 1888 p. 588.

---

[1]) *Lep.:* Noctua piniperda (Boie).

[2]) *Lep.:* Orgyia pudibunda, Poecilampa populi, Dicranura vinula (Brischke), D. bifida (Baker), Acronycta tridens, A. psi, A. megacephala, Cucullia scrophulariae, C. thapsiphaga, C. asteris, C. balsamitae, C. artemisiae, C. argentea, C. abrotani (Brischke).

Paniscus cephalotes Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 83 n. 3.
Paniscus cephalotes Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 133.

ceylonicus Cam. — ♀ — As.: Ceylon.
Paniscus Ceylonicus, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 31, ♀.

chloris (Oliv.) Nort. — Am. bor.
Ophion chloris Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 509 n. 4.
Paniscus chloris Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 364 n. 27.

dilatatus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Paniscus dilatatus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1200 n. 4, ♀.
Paniscus dilatatus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 83 n. 1, ♀.
Paniscus dilatatus Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 128, ♀ nota.

ephippiatus Smith — ♀ — Austr.: New Zealand.
Paniscus ephippiatus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 479, ♀.
Paniscus ephippiatus Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 126, ♀.

errans Tosqu. — ♀ — Afr.: Hadda Galla.
Paniscus errans Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 402 n. 2, ♀.

ferrugineus Cam. — ♂ — As.: India.
Paniscus ferrugineus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 p. 107, ♂.

foveatus Cam. — ♀ — Austr.
Paniscus foveatus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 P. 1. p. 36, ♀.

fuscicarpus Kok. — ♀ ♂ — Eur.: Rossia.
Paniscus fuscicarpus Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 129 & 137, ♀ ♂.

fuscicornis Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Paniscus fuscicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 32 n. 2, ♀ ♂.
Paniscus fuscicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 138, ♀ ♂.
Paniscus fuscicornis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 13, ♀ ♂.

fuscipennis Grav. — ♀ — Eur.
Paniscus fuscipennis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 635 n. 109, ♀.

geminatus (Say) Nort. — ♀ ♂ — Am. bor. & centr.
Ophion geminatus Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 76 n. 3.
Ophion geminatus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 379 n. 3.
Paniscus geminatus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 364 n. 26.
Paniscus geminatus Riley, 1st Ann. Rep. Insect. Missouri 1869 p. 89.
Paniscus geminatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 171, ♀ ♂.
Paniscus geminatus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 382 n. 1.
Paniscus appendiculatus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 105.
Paniscus geminatus C. Thomas, 7th Rep. State Entomol. Illinois f. 1877. 1878 p. 218.
Paniscus geminatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 146b n. 1; Fig. 6b.
Paniscus geminatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 360 n. 1, ♀; Fig. 39.
Paniscus geminatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 49. 1886 Hymen. I. p. 302 n. 1; T. 13 F. 5.

genalis Kok. — ♀ — As.: Transcaucasia.
Paniscus genalis Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 129, ♀.

gracilipes Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Paniscus gracilipes Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1201 n. 6, ♀ ♂.
Paniscus gracilipes Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 84 n. 4.
Paniscus gracilipes Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 131.

ineditus Kok. — ♂ — As.: Transcaucasia.
Paniscus ineditus Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 131 & 140, ♂.

---

[1] *Lep.:* Lithostege nivearia (Ray), Leucania obsoleta, Anarta myrtilli (Brischke).

inquinatus Grav.[1]) — ♀ — Eur.: Britannia.
Paniscus inquinatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 631 n. 107b, ♀.
Netelia inquinatus Gray, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) V. 1860 p. 339.
interstitialis Cam. — As.: India.
Paniscus interstitialis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 106.
kriechbaumeri D. T.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Austria, Helvetia.
Paniscus lineatus Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 484, ♀ ♂ [non Brullé].
Paniscus Kriechbaumeri m.
latro Holmgr. — ♂ — Austr.: Ins. Guam
Paniscus latro Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 412 n. 45, ♂.
lineatus Brullé — ♀ — As.: Bengal.
Paniscus lineatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 157 n. 4, ♀.
lineolatus Costa — Eur.: Sardinia.
Paniscus lineolatus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 3. 1883 p. 100.
Paniscus lineolatus A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1884 p. 337.
longipes Brauns — Eur.: Gallia.
Paniscus longipes Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 85 n. 9.
Paniscus longipes Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 129, nota.
longitarsis Cam. — ♂ — As.: India.
Paniscus longitarsis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 108, ♂.
lugubris Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Paniscus lugubris Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 511 n. 3, ♀.
medius Ashm. — ♀ — Am.: California.
Paniscus medius Ashmead, Proc. Calif. Acad. IV. 1894 p. 128 n. 16, ♀.
melanocotis Holmgr. — ♀ — Afr.: Mauritius.
? Paniscus melanopus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 156 n. 2, ♀.
Paniscus melanocotis Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 411 n. 44, ♀.
Paniscus melanocotis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 407 n. 5, ♀.
melanopus Brullé — ♀ — Eur.: Gallia.
Paniscus melanopus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 156 n. 2, ♀.
melanostigma Cam. — ♀ — Am.: Panama.
Paniscus melanostigma Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 49. 1886 Hymen. I. p. 303 n. 3, ♀.
minor Szépl. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Paniscus minor Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 10 & 29 n. 62, ♀ ♂.
montanus Kok. — ♀ — As.: Pamir.
Paniscus montanus Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 132, ♀.
nigricans Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania.
Paniscus nigricans Kriechbaumer, Act. soc. españ. hist. nat. 1898 p. 171, ♀ ♂.
nigripectus Ashm. — ♀ — Am.: Texas.
Paniscus nigripectus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 425, ♀.
nigriventris Brullé — ♀ — As.: Java.
Paniscus nigriventris Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 157 n. 5, ♀.
nomas Kok. — ♀ ♂ — As.: Transcaspia.
Paniscus nomas Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 130 & 146, ♀ ♂.
ocellaris Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Paniscus ocellaris Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1199 n. 3, ♀.
Paniscus ocellaris Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII 1889 p. 84 n. 5.
Paniscus testaceus var. ocellaris Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 135.

---

[1]) *Hymen.:* Cimbex lateralis (Gray).
[2]) *Lep.:* Cidaria corticata (Kriechbaumer).

opaculus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Paniscus opaculus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1199 n. 2, ♀.
Paniscus opaculus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 84 n. 6.
Paniscus opaculus Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 132.
var. **intersitus** Kok. — ♀ — Eur.: Russia.
Paniscus opaculus var. intersita Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 132, ♀.
var. **praetermissus** Kok. — ♀ — Eur.: Russia. [♀.
Paniscus opaculus var. praetermissa Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 132,
ornatus Voll. — ♀ — As.: Batavia.
Paniscus ornatus Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XVI. 1873 p. 218 n. 11, ♀.
pallidus Tosqu. — ♂ — Afr.: Togo, Cap.
Paniscus pallidus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 406 n. 4, ♂.
planiceps Tosqu. — ♀ — Afr.: Scioa.
Paniscus planiceps Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 404 n. 3, ♀.
productus Brullé — ♀ — Austr.: Tasmania.
Paniscus productus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 156 n. 3, ♀.
quadrilineatus Smith — ♀ — As.: Yarkand.
Paniscus quadrilineatus Smith, Scient. Res. 2d Yarkand Miss. 1878 p. 22 n. 61, ♀.
Paniscus quadrilineatus Waterhouse, Aid Ident. Insects P. 25. 1885; T. 162 F. 2.
rossicus Kok. — ♀ ♂ — Eur.: Russia.
Paniscus Rossicus Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 134 & 139, ♀♂.
rufescens Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Marocco.
Paniscus rufescens Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 409 n. 6, ♀ ♂.
rufus Brullé — ♀ ♂ — Am. mer.
Paniscus rufus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 155 n. 1, ♀ ♂.
Paniscus rufus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 513 n. 2, ♀ ♂.
schirjajewii Kok. — ♂ — As.: Sibiria.
Paniscus Schirjajewi Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 129 & 143, ♂.
semenowii Kok. — ♀ ♂ — As.: Transcaspia.
Paniscus Semenowi Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 131 & 145, ♀♂.
semirufus Holmgr. — ♂ — Am.: Brasilia.
Paniscus semirufus Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 412 n. 46, ♂.
silantjewii Kok. — ♀ ♂ — Eur.: Russia.
Paniscus Silantjewi Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 133 & 138, ♀♂.
smithii D. T. — ♀ — Austr.: New Zealand.
Paniscus ephippiatus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1878 p. 3, ♀ [non 1876].
Paniscus (ephippiatus) Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 126, ♀.
Paniscus Smithii m.
subfuscus Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Paniscus subfuscus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 57, ♀.
testaceus Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Réaumur, Mém. hist. Insect. VI. 1742 p. 310; T. 30 F. 9-12.
Ichneumon luteus Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 51 n. 785.
Ichneumon luteus Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 964 n. 18.

---

[1]) *Lep.:* Smerinthus populi (Marshall), Bombyx pini (Ratzeburg), Phigalia pilosaria, Nyssia pomonaria (Scharfenberg), Eupithecia castigata (Bignell), Dicranura vinula (Albin-cele), D. bifida (Brischke), D. furcula (Ratzeburg), Hybocampa Milhauseri (Taschenberg), Clostera anachoreta (Vollenhoven), Acronycta leporina (Brischke), A. psi (Ray), A. megacephala (Giraud), Nonagria geminipuncta (Fletcher), Mesogona oxalina (Giraud), Hadena pisi (Marshall), H. dentina, Xylina rhizolitha (Bignell), Cucullia scrophulariae (Siebold),

Ichneumon ramidulus Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 964
Ichneumon luteus Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 75 n. 785 [n. 19.
Ichneumon luteus Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 112, ♀.
Paniscus testaceus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 626 n. 107, ♀ ♂.
Paniscus testaceus Drewsen, Arch. f. Naturg. II. P. 1. 1836 p. 38 n. 7.
Paniscus testaceus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 100 n. 3, ♀ ♂.
Ophion testaceus Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 326 n. 384.
Paniscus testaceus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 80 n. 3.
Paniscus testaceus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 512 n. 1, ♀ ♂.
Paniscus testaceus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 81 n. 4.
Paniscus testaceus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 22 n. 1, ♀ ♂.
Paniscus testaceus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 323 n. 6.
? Paniscus testaceus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 32 n. 3, ♀ ♂
Paniscus testaceus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 138, ♀ ♂
Paniscus testaceus Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 13 n. 3, ♀ ♂.
? Paniscus melanurus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1199 n. 1.
Paniscus testaceus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 84 n. 7.
Paniscus testaceus Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 134.

var. **melanurus** Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Paniscus testaceus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 32 n. 3, ♀ ♂.
Paniscus melanurus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1199 n. 1, ♀ ♂. [135.
Paniscus testaceus var. melanurus Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 134 &

texanus Ashm. — ♀ — Am.: Texas.
Paniscus Texanus Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XII. 1890 p. 425, ♀.

thomsonii Brauns[1]) — Eur.: Helvetia, Germania, Sicilia.
Paniscus Thomsoni Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 85 n. 8, ♀.

thoracicus Woldst. — ♀ — Eur.: Russia.
Paniscus thoracicus Woldstedt, Stettin. entom. Zeitg. XLI. 1880 p. 174, n. 1, ♀.

tinctipennis Cam. — ♀ — Am.: Panama.
Paniscus tinctipennis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 49. 1886 Hymen. I. p. 303 n. 2, ♀.

turanicus Kok. — ♀ — As.: Transcaspia.
Paniscus Turanicus Kokujew, Horae soc. entom. Ross. XXXIV. 1899 p. 130 & 144, ♀.

unicolor Smith — ♂ — As.: Japonia.
Paniscus unicolor Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 396 n. 1, ♂.

yarkandensis D. T. — ♀ — As.: Turcestania.
Paniscus unicolor Smith, Scient. Res. 2d Yarkand Miss. 1878 p. 21 n. 60, ♀ [non 1874]
Paniscus Yarkandensis m.

CIDAPHUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 149 n. 2.
Etymol. obscura.

Synon.: Mesochorus Gravenhorst.
Plesiopthalmus Brischke.

alarius (Grav.) Brauns — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Mesochorus alarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 977 n. 338, ♂.

C. lychnitis (Giraud), C. asteris (Speyer), C. argentea (Brischke), C. artemisiae (Gravenhorst), Toxocampa craccae (Kriechbaumer), Perigrapha cincta Fabr., Cloantha radiosa Esp., Pygaera curtula L., Polia polymita L. (Mocsáry). — *Hymen.:* Cimbex femorata, Clavellaria amerinae Bouché, Lophyrus abietis F., Lyda erythrocephala L. (Rondani).

1) *Lep.:* Eupithecia innotata (Brauns).

[1880 p. 103, ♀ ♂.

Mesochorus (Plesiophthalmus) alarius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4.

Cidaphus alarius Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 78 n. 1, ♀ ♂.

thuringiacus Brauns — ♂ — Eur.: Germania.

Cidaphus Thuringiacus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 78 n. 2, ♂.

OPHELTES

Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 323 n. 5.
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 30.
Nom. propr.

Synon.: Netelia Gray, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) V. 1860 p. 341.
Etymol. obscura.
Opheletes Kirchner, Catal. Hymen. Europ. 1867 p. 89 n. 221.
Opheltes, err. typogr.
Campoplex Provancher.
Ichneumon Linné & auct.
Ophion Fabricius.
Paniscus Gravenhorst.

glaucopterus (L.) Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota; Am. bor.
—— Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 973.
Ichneumon glaucopterus Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 566 n. 53.
Ichneumon glaucopterus Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 407 n. 1630.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 331 n. 23.
Ichneumon glaucopterus Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 938 n. 57.
Ichneumon XLIV Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767 T. 82 F. 3.
Ichneumon glaucopterus Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 341 n. 79.
Ichneumon glaucopterus Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 857 n. 57.
Ichneumon glaucopterus O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 159 n. 1845.
Ichneumon glaucopterus Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 436 n. 102.
Ichneumon ramidulus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 400 n. 23.
Ichneumon glaucopterus Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 269 n. 120.
Ichneumon glaucopterus Ströms, Danske Vid. Selsk. Skrift. Nya Saml. III. 1788 p. ?
Ichneumon pteromelas Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 196 n. 198.
Ichneumon glaucopterus Villers, C. Linnaei Entom. 1789 p. 199 n. 208.
Ichneumon glaucopterus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2710 n. 57.
Ichneumon glaucopterus Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 51 n. 786.
Ichneumon glaucopterus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 359.
Ichneumon glaucopterus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 196 n. 163.
Ichneumon pteromelas Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 217 n. 65.
Ichneumon glaucopterus Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 181 n. 198.
Ophion glaucopterus Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 236 n. 4.
Ichneumon glaucopterus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 263 n. 2055, ♀.
Ophion glaucopterus Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 72 n. 2.
Ophion glaucopterus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 133 n. 14.
Ichneumon glaucopterus Latreille, Hist. nat. Crust & Insect. XIII. 1805 p. 184 n. 19.
Ichneumon glaucopterus Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 76 n. 786.
Ichneumon glaucopterus Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110, ♀.
Ophion glaucopterus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 510 n. 8.

---

[1]) *Hymen.:* Cimbex femorata (Hartig), C. humeralis (Giraud), C. connata (Siebold), C. variabilis (Brischke), C. lutea (Mocsáry), C. Americanus Leach (auct. amer.).

Ophion glaucopterus Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX 1818 p. 295.
Ichneumon glaucopterus Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon glaucopterus Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 314.
Paniscus glaucopterus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 633 n. 108, ♀.
Ophion (Paniscus) glaucopterus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 324 n. 4.
Paniscus glaucopterus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 100 n. 1.
Paniscus glaucopterus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 80 n. 2.
Paniscus glaucopterus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 80 n. 2.
Opheletes glaucopterus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 30 n. 1, ♀.
Opheltes glaucopterus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 323 n. 5.
Paniscus glaucopterus Gray, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) V. 1860 p. 339.
Paniscus glaucopterus Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 71, ♀ ♂.
Ichneumon glaucopterus Dale, Trans. Entom. Soc. London 1871 Proc. p. XXIV.
Campoplex flavipennis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 143.
Opheletes glaucopterus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 145[b], ♀; Fig. 6[a].
Opheletes glaucopterus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 359 Fig. 38[a].
Opheletes glaucopterus Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 13 n. 1.
Opheletes glaucopterus Anonym, Canad. Entomol. XIX. 1887 p. 80.
Paniscus glaucopterus Siebold, Entomol. Nachr. X. 1884 p. 95.

OPHELTOIDEUS

Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 95.
Opheltes, nom. propr. Hymen.; εἶδος, forma.

johnsonii Ashm. — Patria?
Opheltoides Johnsoni Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 95 [s. descr.].

8. *Subfam.* Campopleginae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 141 & 150.

AMELOCTONUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 157 n. 62.
ἀμελέω, non curo; κτείνω, interficio.
Species exstat.

ANILASTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 157 n. 61.
ἀνίλαστος, non placatus.

Synon.: Anilasta Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1170.
Campoplex Gravenhorst, Ratzeburg, Vollenhoven.
Casinaria Holmgren.
Echthromorpha Tscheck.
Ichneumon Gmelin.
Limneria Holmgren, Marshall, Bridgman, Brischke.

albicrus Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Anilasta albicrus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1171 n. 9, ♀ ♂.

[1] *Lep.:* Thecla betulae (Kriechbaumer).

barrettii (Bridgm.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Limneria Barrettii Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 158, ♀; T. 8 F. 14 (♀).
Limneria Barrettii Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 205.
Anilasta Barrettii Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1171 n. 10, ♀ ♂.

boops Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Anilasta boops Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1173 n. 18, ♀.

braccatus (Gmel.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania, Dalmatia.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 65 n. 273.
Ichneumon braccatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2705 n. 326.
Campoplex braccatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 549 n. 66.
Limneria braccata Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 55 n. 14. [♀ ♂.
Limneria (Eriborus?) braccata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 172,
Limneria braccata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 105 n. 14, ♀ ♂.
Anilasta braccata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1175 n 27, ♀ ♂.

carbonarius (Ratzbg.) Thoms.[3] — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Campoplex carbonarius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 93 n. 2, ♀.
Campoplex carbonarius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 82 n. 6.
Campoplex carbonarius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 83 n. 7.
? Campoplex carbonarius Vollenhoven, Sepp: Nederl. Insect. Ed. 2ª II. 1872 p. 207.
Campoplex carbonarius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 144, ♀.
Anilasta carbonaria Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1170 n. 7, ♀.

coxator Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Anilasta coxator Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1173 n. 19, ♀ ♂.

dolosus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex dolosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 573 n. 83, ♀ ♂.
Limneria dolosa Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 79 n. 46, ♀ ♂.
Limneria dolosa Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 164, ♀ ♂.
Limneria dolosa Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 207 n. 24, ♀ ♂.
Limneria dolosa Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 45, ♀.
Anilasta dolosa Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1172 n. 13, ♀ ♂.

ebeninus (Grav.) Thoms.[4] — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Campoplex ebeninus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 480 n. 15, ♀ ♂ [p. p.].
Limneria melanaria Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 37. [♀ ♂.
Campoplex melanarius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 37 n. 7,
Campoplex melanarius Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 872 n. 5, ♀ ♂.
Anilasta ebenina Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1170 n. 6, ♀ ♂.

facialis Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Anilasta facialis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1174 n. 23, ♀.

horticola (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Campoplex horticola Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 567 n. 80, ♂.
Anilasta horticola Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1873 p. 1169 n. 1, ♀ ♂.

inquinatus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Limneria inquinata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8 (Oph.) p. 75 n. 39, ♀.

---

1) *Lep.:* Oxyptilus teucrii (Bridgman).

2) *Lep.:* Hypena rostralis (Brischke).

3) *Hymen.:* Lophyrus pini (Brischke). — *Lep.:* Fidonia ericae (Vollenhoven), Orgyia antiqua, O. gonostigma (Brischke), O. fascelina (Bouché), Taeniocampa populeti, Tortrix xylosteana (Ratzeburg).

4) *Lep.:* Orgyia ericae Germ. (Mocsáry).

Limneria inquinata, Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 164, ♂.
Limneria inquinata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107 & 108 n. 41, ♀.
Anilasta inquinata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1173 n. 16, ♀.

leucomerus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Limneria tricincta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 80 n. 47, ♀.
Anilasta leucomera Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1172 n. 15, ♀.

longulus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Anilasta longula Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1171 n. 11, ♀ ♂.

nigritarsis Kriechb. — ♀ — Eur.: Littorale.
Limneria (Anilasta) nigritarsis Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymn. Pola 1894 p. 20, ♀.

notatus (Grav.) Thoms.[1]) — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Campoplex notatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 570 n. 82, ♀ ♂ [excl. var. 1].
Limneria notata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 78 n. 44, ♀ ♂.
Limneria notata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P 4. 1880 p. 164, ♀ ♂.
Limneria notata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 206 & 207 n. 54.
Anilasta notata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1169 n. 3, ♀ ♂.
Limneria notata Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894 p. 19, ♀.

ochrostomus (Holmgr.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Casinaria ochrostoma Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 52 n. 7, ♀.
Casinaria (Echthronomus?) ochrostoma Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 59 n. 11.
Anilasta ochrostoma Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1174 n. 21, ♀.

orbator (Grav.) Thoms.[2]) — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex orbator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 558 n. 72, ♀.
Anilasta orbator Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1175 n. 25, ♀.

pectinatus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Anilasta pectinata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1171 n. 12, ♀.

perfidus (Grav.) Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex perfida Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 595 n. 96, ♀.
Anilasta perfida Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1175 n. 26, ♀.

picticollis Thoms. — ♀ — Eur.: Italia.
Anilasta picticollis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1174 n. 24, ♀.

quadrinotatus Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Anilasta quadrinotata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1174 p. 22, ♀.

rapax (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: (Britannia), Suecia, (Germania), Helvetia.
Campoplex crassicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 565 [p. p.].
Campoplex rapax Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 568 n. 81, ♀ ♂.
? Campoplex rapax Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 97 n. 16, ♀.
Campoplex rapax Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 17 n. 24, ♂.
Limneria brevicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 66 n. 23, ♀.
Limneria rapax Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 57 n. 59.
Limneria rapax Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 163, ♂.
Limneria rapax Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 206 n. 59.
Limneria brevicornis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 206 n. 15.
Anilasta rapax Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1169 n. 2, ♀ ♂.

ruficrus Thoms. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Anilasta ruficrus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1172 n. 14, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Gnophos obscurata (Bignell), Noctua suec. (Brischke).
[2]) *Lep.:* Amphipyra effusa (Thomson).

ruficinctus (Grav.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Campoplex notatus var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 572, ♂.
Campoplex ruficinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 580 n. 87, ♀♂.
Campoplex rapax Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1844 p. 97 n. 16, ♀ ♂ [non Grav.].
Campoplex assimilis var. 2 Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 17 n. 26, ♀ ♂.
Limneria ruficincta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 79 n. 45, ♀ ♂.
Limneria ruficincta Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 164, ♀ ♂.
Limneria ruficincta Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 207 n. 60.
Anilasta rufocincta Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1170 n. 8, ♀ ♂.

sicarius (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex sicarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 551 n. 68, ♀.
Limneria sicaria Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 166, ♀.
Anilasta sicaria Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1169 n. 4, ♀ ♂.

tenuicostus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Helvetia.
Anilasta tenuicosta Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1170 n. 5, ♀ ♂.

teucrii Bridgm.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Limneria (Anilasta) teucrii Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 429, ♀ ♂.

tricolor (Ratzbg.) Thoms.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Campoplex tricolor (Hartig) Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 94 n. 8, ♂.
Campoplex tricolor (Hartig) Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 85 n. 16.
Limneria tricolor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 166, ♀ ♂.
Anilasta tricolor Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1173 n. 20, ♀ ♂.

variicoxus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Anilasta varicoxa Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1173 n. 17, ♀ ♂.

HOLOCREMNUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 157 n. 60.
ὅλος, totus; κρεμνός, locus praeruptus.

Synon.: Holocremna Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1178.

annulitarsis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Holocremna annulitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1179 n. 10, ♀ ♂.

argentatus (Grav.) Thoms.[4] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex argentatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 543 n. 64, ♀.
Campoplex argentatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 20 n. 31, ♀ ♂.
Limneria argentata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 81 n. 50,
Campoplex argentatus Kessler, Progr. Realsch. Kassel 1867 p. 10; Fig. 1-11. [♀ ♂ var.
Limneria argentata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 165, ♀.
Limneria argentata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 205 n. 9, ♀ ♂.
Holocremna argentata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1181 n. 18, ♀ ♂.
Limneria argentata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 45, ♀.

---

1) *Lep.:* Earias clorana, Dianthoecia echii, D. porphyrea, Cucullia tanaceti, Ellopia fasciaria, Dianthoecia cucubali (Bignell), Hecatera serena, Anarta myrtilli (Brischke).

2) *Lep.:* Pterophorus teucrii & P. baliodactylus? (Bridgman).

3) *Lep.:* Abraxas grossulariata (Brischke).

4) *Hymen.:* Lophyrus pallidus, L. laricis, L. frutetorum, L. variegatus, L. similis, L. pini (Hartig), Cladius uncinatus, Croesus septentrionalis (Rondani).

bergmannii Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Holocremna Bergmanni Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1182 n. 20, ♀ ♂.
buccatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Holocremna buccata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1180 n. 14, ♀.
canaliculatus (Grav.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex canaliculatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 560 n. 74, ♀.
Limneria canaliculata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 83 n. 52, ♀.
Limneria canaliculata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 165, ♀ ♂.
Limneria canaliculata Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 151.
Limneria canaliculata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 206.
Holocremna canaliculata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1177 n. 4, ♀ ♂.
clandestinus (Holmgr.) Thoms.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Limneria clandestina Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 90 n. 64, [♀ ♂.
Limneria clandestina Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 108 & 205, ♀ ♂.
Holocremna clandestina Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1178 n. 7, ♀ ♂.
cothurnatus (Holmgr.) Thoms.[4] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Campoplex argentatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 96 n. 14.
Limneria cothurnata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 90 n. 63, ♀ ♂.
Limneria cothurnata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 165, ♀ ♂.
Holocremna cothurnata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1178 n. 6, ♀ ♂.
curtigenus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Holocremna curtigena Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1179 n. 11, ♀ ♂.
errabundus (Grav.) Thoms.[5] — ♀ ♂ — Eur.
Campoplex errabundus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 559 n. 73.
Holocremna errabunda Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1177 n. 2, ♀ ♂.
errans (Holmgr.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
? Campoplex errabundus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 559 n. 73.
Limneria errans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 83 n. 53, ♀.
Holocremna errans Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1177 n. 3, ♀.
erythropygus (Holmgr.) Thoms.[6] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria erythropyga Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 91 n. 65, [♀ ♂.
Limneria erythropyga Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 166, ♀ ♂.
Limneria erythropyga Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 108 & 205.
Holocremna erythropyga Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1181 n. 16, ♀.
frutetorum Thoms.[7] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Holocremna frutetorum Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1178 n. 9, ♀ ♂.
heterogaster Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Holocremna heterogaster Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1178 n. 8, ♀ ♂.
incrassator (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Campoplex incrassator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 18 n. 27, ♀ ♂.
Limneria incrassata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 89 n. 62, ♀ ♂.
Limneria incrassata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 207 n. 40.
Holocremna incrassator Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1177 n. 1, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Nematus Bergmanni (Thomson).
2) *Hymen.:* Nematus fraxini (Brischke).
3) *Hymen.:* Croesus varus (Fletcher).
4) *Hymen.:* Lophyrus pini, L. rufus, L. pallidus, Nematus Brischkei (Brischke).
5) *Col.:* Lema merdigera L. (Rondani).
6) *Hymen.:* Tenthredo spec. (Brischke).
7) *Hymen.:* Lophyrus frutetorum (Thomson).

melanogaster Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Holocremna melanogaster Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1181 n. 17, ♀.

pubescens (Ratzbg.) Thoms.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex pubescens Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 96 n. 13.
Campoplex pubescens Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 86 n. 23.
Limneria hyalinata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 93 n. 69, ♀ ♂.
Limneria hyalinata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 166, ♀ ♂.
Limneria hyalinata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 108.
Holocremna pubescens Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1182 n. 21, ♀ ♂.

sinuatus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Holocremna sinuata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1180 n. 15, ♀.

sordidellus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria sordidella Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 82 n. 51, [♀ ♂.
Holocremna sordidella Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1177 n. 5, ♀ ♂.

spiraeae Thoms.[2]) — ♀ — Eur.: Bavaria.
Holocremna spiraeae Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 n. 1182 n. 19, ♀.

tarsator Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Holocremna tarsator Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1180 n. 13, ♀ ♂.

vetulus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria vetula Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 91 n. 66, ♀ ♂.
Holocremna vetula Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1180 n. 12, ♀ ♂.

vexatus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Limneria vexata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 92 n. 67, ♀ ♂.
Limneria vexata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 108 n. 72, ♀ ♂.
Holocremna vexata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1182 n. 22, ♀.
Limneria vexata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 45, ♂.

CALLIDORA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 157 p. 59.
καλλός, pulchritudo; *δορός*, uter.

Synon.: Limneria Holmgren.

albovincta (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria albovincta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 56 n. 6, ♀.
Limneria albovincta Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 105, ♀.
Callidora albovincta Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1136 n. 2, ♀ ♂.

annellata Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Callidora annellata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1136 n. 1, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Cimbex femorata, C. variabilis, Trichiosoma lucorum, Clavellaria amerinae (Brischke), Croesus varius (Bridgman).

2) *Hymen.:* Nematus spiraeae (Kriechbaumer).

LIMNERIUM

Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 368.

λιμνίον, stagnum.

Synon.: Limneria Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 326 n. 13 [non *λιμνίον*, stagnum. [Adams 1857].

Campoplex Gravenhorst.
Ichneumon Gmelin.
Macrus Provancher.
Mesoleptus Cresson.
Ophion Blanchard.
Porizon Zetterstedt.

abbreviatum (Brischke) D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Limneria abbreviata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 157, ♀.
Limnerium abbreviatum m.

abnorme (Brischke) D. T. — ♀ — Eur.: Germania. [p. 169, ♀.
Limneria (Idechthis?) abnormis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880
Limnerium abnorme m.

acronyctae (Ashm.) D. T.[1] — ♂ — Am. bor.
Limneria acronyctae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 194.
Limnerium acronyctae m.

affine (Parf.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Limneria affinis Parfitt, Entom. M. Magaz. XVIII. 1882 p. 252, ♀ ♂.
Limnerium affine m.

agile (Brischke) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Limneria agilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 168, ♂.
Limnerium agile m.

agraense (Cam.) D. T. — ♀ — As.: India.
Limneria Agraensis Cameron, Mem. and Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 29, ♀.
Limnerium Agraense m.

albicans (Brischke) D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Limneria albicans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 158, ♀.
Limnerium albicans m.

albidum (Gmel.) D. T. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 66 n. 280 & 285.
Ichneumon albidus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2705 n. 332.
Campoplex albidus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 474 n. 13, ♀ ♂ [p. p.].
Ophion (Campoplex) albidus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 323 n. 1.
Campoplex albidus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 94 n. 6.
Campoplex albidus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 84 n. 12.
Campoplex albidus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 12 n. 14, ♀.
Limneria albida Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 53 n. 1, ♀ ♂
Limneria albida Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 148, ♀.
Limneria albida Parfitt, Rep. & Trans. Devon. Assoc. XIII. 1881 p. 268.
Limneria albida Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 105 n. 2, ♀ ♂.
Limneria albida Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1104 n. 1, ♀ ♂.
Limnerium albidum m.

---

[1]) *Lep.:* Acronycta oblinata (Ashmead).

albispinum (Cam.) D. T. — ♀ — Am.: Mexico. [F. 13.
Limneria albispina Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 80. 1886 Hymen. I. p. 307 n. 1, ♀; T. 11
Limnerium albispinum m.

alienum (Brischke) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Limneria aliena Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 169, ♂.
Limnerium alienum m.

alienatum (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Campoplex alienatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 620 n. 105, ♀ ♂.
Limneria alienata Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 55 n. 4.
Limneria alienata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 105 n. 4.
Limnerium alienatum m.

alpestre (Cam.) D. T. — ♀ — Am.: Mexico.
Limneria alpestris Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 50. 1886 Hymen. I. p. 307 n. 2, ♀.
Limnerium alpestre m.

annulipes (Cress.) D. T.[1] — ♀ ♂ — Am.: Canada, New Jersey, Illinois.
Mesoleptes annulipes Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 257 n. 2, ♀.
? Mesoleptes tibiator Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 259 n. 4, ♂.
Limneria annulipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 173.
Limneria annulipes Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 175 n. 3, ♀ ♂.
Limneria annulipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 367 n. 3, ♀ ♂.
Limneria annulipes Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XII. 1890 p. 430.
Limnerium annulipes m.

argenteum (Prov.) D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Limneria argentea Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 147.
Limneria argentea Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 177 n. 7, ♀.
Limneria argentea Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 369 n. 7, ♀.
Limnerium argenteum m.

argentifrons (Cress.) D. T.[2] — ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Mesoleptus argentifrons Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 261 n. 9, ♂.
Limneria argentifrons Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 428.
Limnerium argentifrons m.

arvense (Grav.) D. T. — ♂ — Eur.: Britannia.
Campoplex arvensis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 488 n. 20, ♂.
Limneria arvensis Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 55 n. 11.
Limneria arvensis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 106 n. 11.
Limnerium arvense m.

ashmeadii D. T. — ♀ — Am.: Washington.
Limneria sessilis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 433, ♀ [non Provancher].
Limnerium Ashmeadii m.

assimile (Grav.) D. T.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex assimilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 579 n. 86, ♂.
Campoplex assimilis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 88 n. 33, ♀.
Campoplex assimilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 17 n. 26, ♀ ♂.
Limneria assimilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 70 n. 31, ♀ ♂.
Limneria assimilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 163, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Mamestra picta (Hartig), Gelechia pseudacaciella (Chambers), Acrobasis indiginella (Zeller).

[2]) *Lep.:* Crambus zeellus Clem. (Ashmead).

[3]) *Hymen.:* Phyllotoma melanopyga, — *Lep.:* Retinia resinana (Brischke).

Limneria assimilis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 207.
Limnerium assimile m.

barbatum (Prov.) D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Mesoleptus barbatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 98 n. 34, ♀.
Limneria barbatus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 189.
Limnerium barbatum m.

basilare (Prov.) D. T. — ♂ — Am.: Canada.
Limneria basilaris Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 147.
Limneria basilaris Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 179 n. 14, ♂.
Limneria basilaris Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 364 n. 14, ♀. [n. 14, ♀.
Limneria basilaris Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 371 n. 14, ♂ & p. 786
Limnerium basilare m.

belfragei (Ashm.) D. T. — ♂ — Am.: Texas.
Limneria Belfragei Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 435, ♂.
Limnerium Belfragei m.

blackburnii (Cam.) D. T. — Austr.: Insel Hawaienses.
Limneria Blackburni Cameron, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 192.
Limnerium Blackburnii m.

brachyurum (Ashm.) D. T. — ♀ — Am.: Michigan.
Limneria brachyura Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 431, ♀.
Limnerium brachyurum m.

brevicaudum (Prov.) D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Limneria brevicauda Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 88 n. 25, ♀.
Limnerium brevicaudum m.

brevisetum (Brischke) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Limneria breviseta Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 170, ♀ ♂.
Limnerium brevisetum m.

bridgmanii D. T.[1]) — Eur.: Britannia.
Limneria distincta Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1887 p. 367 [non Provancher].
Limnerium Bridgmanii m.

brischkei (Bridgm.) D. T.[2]) — ♀ — Eur.: Britannia.
Limneria Brischkei Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 153, ♀.
Limneria Brischkei Bignell, Entomologist XVI. 1883 p. 69.
Limneria Brischkei Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 106.
Limnerium Brischkei m.

buddha Cam. — ♀ — As.: India.
Limneria Buddha Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 124, ♀.
Limnerium Buddha m.

caedator (Grav.) D. T. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Campoplex caedator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 561 n. 75, ♀.
Limneria caedator Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 55 n. 16.
Limneria caedator Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 393 n. 3, ♀.
Limneria caedator Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 207 n. 16.
Limnerium caedator m.

californicum (Cress.) D. T. — ♂ — Am.: California.
Limneria Californica Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 369, ♂.
Limnerium Californicum m.

---

1) *Lep.:* Gelechia lentiginosella (Fletcher).
2) *Lep.:* Agrotis triangulum (Bignell).

carbonarium (Brischke) D. T.[1] — ♀ — Eur.: Germania.
Limneria carbonaria Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 161, ♀.
Limnerium carbonarium m.

carnifex (Grav.) D. T. — ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex carnifex Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 563 n. 76b, ♂.
Campoplex carnifex Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 16 n. 23, ♂.
Limneria carnifex Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 94 n. 71, ♂.
Limneria carnifex Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 166, ♂.
Limneria carnifex Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 206 n. 17.
Limnerium carnifex m.

ceylonicum (Cam.) D. T. — ♂ — As.: Ceylon.
Limneria Ceylonica Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 p. 28, ♂.
Limnerium Ceylonicum m.

cinctulum (Holmgr.) D. T. — ♂ — Afr.: Cap.
Limneria cinctula Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 415 n. 52, ♂.
Limnerium cinctulum m.

cingulatum (Brischke) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Limneria cingulata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 171, ♂.
Limnerium cingulatum m.

clausum (Brischke) D. T.[2] — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Limneria clausa Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 154, ♀.
Limneria clausa Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107.
Limnerium clausum m.

clavicorne (Brischke) D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Limneria clavicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 162, ♀.
Limnerium clavicorne m.

clypeare (Brischke) D. T.[3] — ♂ — Eur.: Germania.
Limneria clypearis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 155, ♂.
Limnerium clypeare m.

clypeatum (Brischke) D. T.[4] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Limneria clypeata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 171, ♂.
Limnerium clypeatum m.

cognatum (Brischke) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Limneria cognata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 164, ♂.
Limnerium cognatum m.

compactum (Prov.) D. T. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Limneria compacta Provancher, Canad. Entomol. XVII. 1885 p. 116, ♀.
Limneria compacta Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 89 n. 27, ♀.
Limnerium compactum m.

confine (Holmgr.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria confinis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 88 n. 2, ♀ ♂.
Limnerium confine m.

conforme (Ratzb.) D. T.[5] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex conformis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 81 n. 3, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Cidaria pyraliata, Boarmia roboraria, Amphidasys prodromaria (Bignell).

[2]) *Lep.:* Hybernia progemmaria (Bignell).

[3]) *Dipt.:* Syrphus spec. (Brischke).

[4]) *Hymen.:* Nematus Valisnierii, Cryptocampus spec., — *Lep.:* Hadena suffuruncula (Brischke).

[5]) *Lep.:* Tachyptilia populella, Gelechia spec., Tortrix spec. (Brischke).

Campoplex conformis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 83 n. 3.
Limneria conformis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 149, ♀♂.
Limnerium conforme m.

consimile (Ashm.) D. T. — ♀ — Am.: Texas.
Limneria consimilis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 435, ♀.
Limnerium consimile m.

consobrinum (Holmgr.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Campoplex alternans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 19 n. 29, ♂.
Limneria consobrina Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 87 n. 1, ♀♂.
Limnerium consobrinum m.

consumtor (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex consumtor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 515 n. 43, ♀ ♂.
Limneria consumtor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 21, ♂.
Limnerium consumtor m.

contractum (Brischke) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Limneria contracta Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 158, ♀♂.
Limnerium contractum m.

corruptum (Cress.) D. T. — ♀ — Am.: Texas.
Limneria corrupta Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 172, ♀.
Limneria corrupta Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 429.
Limnerium corruptum m.

costale (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Limneria costalis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1106 n. 10, ♀.
Limnerium costale m.

coxale (Brischke) D. T.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Limneria coxalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 151, ♀♂.
Limneria coxalis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107.
Limnerium coxale m.

crassicorne (Prov.) D. T. — ♂ — Am.: Canada.
Limneria crassicornis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 88 n. 26, ♂.
Campoplex crassicornis Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 188.
Limnerium crassicorne m.

crassifemur (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria crassifemur Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1106 n. 9, ♀ ♂.
Limnerium crassifemur m.

croceipes (Marsh.) D. T. — ♀ — Eur.: Britannia.
Limneria croceipes Marshall, Entom. M. Magaz. XII. 1876 p. 194, ♀.
Limneria croceipes Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 105, ♀.
Limnerium croceipes m.

cruentatum (Brischke) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
? Campoplex cruentatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 575 n. 84, ♀.
Limneria cruentata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 167, ♀♂.
Limnerium cruentatum m.

cupressi (Ashm.) D. T. — ♀ — Am.: California.
Limneria cupressi Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 437, ♀.
Limnerium cupressi m.

cylindricum (Brischke) D. T.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Limneria cylindrica Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 159, ♀♂.

---

[1]) *Lep.:* Tortrix spec. (Brischke).
[2]) *Lep.:* Gelechia inopella (Fletcher).

Limneria cylindrica Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1884 p. 427.
Limneria cylindrica Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 106, ♀ ♂.
Limnerium cylindricum m.

declinator (Brischke) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
? Campoplex declinator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 589 n. 92, ♂.
Limneria declinator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 167, ♂.
Limnerium declinator m.

deficiens (Grav.) D. T.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Campoplex deficiens Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 474 n. 12, ♀.
Limneria deficiens Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 104, ♀ ♂.
Limnerium deficiens m.

dentatum (Prov.) D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Macrus dentatus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 150.
Limneria ruficornis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 147.
Limneria dentata Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 181 n. 19, ♀.
Limneria dentata Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 373 n. 19, ♀.
Limnerium dentatum m.

depressum (Brischke) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Limneria depressa Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 157, ♂.
Limnerium depressum m.

dimidiatum (Cress.) D. T.[2] — ♀ — Am.: Illinois.
Mesoleptus ? dimidiatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 265 n. 15, ♀.
Limneria dimidiata Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 429.
Limnerium dimidiatum m.

dispar (Gmel.) D. T.[3] — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 71 n. 363.
Ichneumon dispar Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2721 n. 406.
Campoplex dispar Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 484 n. 18, ♂.
Limneria dispar Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 56 n. 23.
Limneria dispar Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107 n. 23.
Limnerium dispar m.

distinctum (Prov.) D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Limneria distincta Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 365 n. 23, ♀.
Limneria distincta Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 787 n. 23, ♀.
Limnerium distinctum m.

dubitatum (Holmgr.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Limneria dubitata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 78, ♀.
Limnerium dubitatum m.

dumeticolum (Holmgr.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Limneria dumeticola Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 77 n. 42, ♀.
Limnerium dumeticolum m.

elegans (Weed) D. T. — Am.: Illinois.
Limneria elegans Weed, Bull. Illinois Labor. Nat. Hist. III. 1890 p. 40.
Limnerium elegans m.

elongatum (Brischke) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Limneria elongata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 156, ♂.
Limnerium elongatum m.

---

1) *Lep.:* Eupithecia pulchellata (Bignell).
2) *Lep.:* Gelechia gallae solidaginis (Ashmead).
3) *Lep.:* Xylopoda fabriciana (Bignell).

ensiferum (Brischke) D. T. — ♀ — Eur.: Germania. [p. 172, ♀.
Limneria (Phaedroctonus?) ensifera Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880
Limnerium ensiferum m.

ephestiae (Ashm.) D. T.[1] — ♀ ♂ — Am.: Missouri.
Limneria ephestiae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 195, ♀ ♂.
Limnerium ephestiae m.

erraticum (Brischke) D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Limneria erratica Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 170, ♀.
Limnerium erraticum m.

erythrogastrum (Ashm.) D. T. — ♀ — Am.: Alabama.
Limneria erythrogaster Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 434, ♀.
Limnerium erythrogastrum m.

erythropum (Ashm.) D. T. — ♂ — Am.: Texas.
Limneria erythropus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 431, ♂.
Limnerium erythropum m.

eureka (Ashm.) D. T. — ♂ — Am.: California.
Limneria eureka Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 436, ♂.
Limnerium eureka m.

eurycreontis (Ashm.) D. T.[2] — ♀ — Am.: Kansas.
Limneria eurycreontis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 434, ♀.
Limneria eurycreontis Riley, Insect Life II. 1890 p. 328; Fig. 64.
Limnerium eurycreontis m.

euurae (Ashm.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Utah.
Limneria euurae Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 433, ♀ ♂.
Limnerium euurae m.

excavatum (Brischke) D. T.[3] — ♂ — Eur.: Germania.
Limneria excavata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 149, ♂.
Limnerium excavatum m.

extremum (Holmgr.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Limneria extrema Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXIX. P. 6. 1872 p. 98, ♀.
Limnerium extremum m.

ferrugineipes (Ashm.) D. T. — ♂ — Am.: Texas.
Limneria ferrugineipes Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 432, ♂.
Limnerium ferrugineipes m.

flavicinctum (Ashm.) D. T. — ♂ — Am.: Indiana.
Limneria flavicincta Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 436, ♂.
Limnerium flavicinctum m.

flavipes (Prov.) D. T. — ♂ — Am.: Canada.
Limneria flavipes Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 148.
Limneria flavipes Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 179 n. 13, ♂.
Limneria flavipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 371 n. 13, ♂.
Limnerium flavipes m.

flavirictum (Cress.) D. T. — ♀ — Am.: Canada, Pennsylvania.
Mesoleptus flavirictus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 263 n. 13, ♀.
Limneria flavirícta Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 180 n. 16, ♀.
Limneria flaviricta Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 372 n. 16, ♀.
Limnerium flavirictum m.

---

1) *Lep.:* Ephestia zeae? (Ashmead).
2) *Lep.:* Eurycreon rantalis (Guérin).
3) *Lep.:* Tortrix spec. (Brischke).

flaviventre (Ratzbg.) D. T. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Campoplex flaviventris Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 98 n. 18, ♀.
Campoplex flaviventris Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 84 n. 25.
Limneria flaviventris Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 56 n. 33.
Limneria flaviventris Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 105 n. 33, ♀.
Limnerium flaviventre m.

flexicaudum (Holmgr.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Limneria flexicauda Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 73 n. 36, [♀♂.
Limneria flexicauda Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107 n. 34, ♀ ♂.
Limnerium flexicaudum m.

foersteri (Tschek) D. T. — ♀ — Eur.: Rhodus.
Limneria Foersteri Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 59, ♀.
Limnerium Foesteri m.

frigidum (Lundb.) D. T. — Am.: Groenlandia.
Limneria frigida Lundbeck, Vidensk. Meddel. 1896 p. 236.
Limnerium frigidum m.

fugitivum (Say) D. T.[1] — ♀ ♂ — Am.: United States.
Banchus fugitivus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 247 n. 3, ♀ ♂.
Banchus fugitivus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 701 n. 3.
Campoplex fugitivus Riley, 1st Ann. Rep. Insect. Missouri 1869 p. 139.
Limneria fugitiva Riley, 4th Ann. Rep. Insect. Missouri 1872 p. 41.
Limneria fugitiva Riley, 5th Ann. Rep. Insect. Missouri 1873 p. 133 & 141.
Limneria fugitiva Howard, Scudder: Butterflies U. S. 1889 p. 1883.
Limneria fugitiva Lintner, Rep. New York Mus. XLI. 1889 p. 90-91.
Limneria fugitiva Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 430.
Limnerium fugitivum m.

furum (Cress.) D. T. — ♀ — Am.: Texas.
Limneria fura Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 173, ♀.
Limneria fura Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 430.
Limnerium furum m.

fuscicarpum (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Limneria fuscicarpus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1104 n. 2, ♀ ♂.
Limnerium fuscicarpum m.

fusiforme (Prov.) D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Limneria fusiformis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 148.
Limneria fusiformis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 180 n. 15, ♀.
Limneria fusiformis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 371 n. 15, ♀.
Limnerium fusiforme m.

gelechiae (Ashm.) D. T.[2] — ♀ — Am.: Montana.
Limneria gelechiae Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 432, ♀.
Limnerium gelechiae m.

geniculatum (Grav.) D. T.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Lapponia, Suecia, Germania.
Campoplex geniculatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 486 n. 19, ♀ ♂.
Porizon annulator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 394, ♂ [excl. ♀].
Campoplex geniculatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 84 n. 13.

---

[1]) *Lep.:* Euchaetes egle Harr., Clisiocampa silvatica Harr., Anisota pellucida A. & S., Acrobasis indigenella Zell., Anisota rubicunda Fabr., Phycita nebula, Dryocampa senatoria, Dr. stigma, Saturnia maja (Riley), Chlorippe clyton, Chl. celtis, Pholisora catullus (Howard).

[2]) *Lep.:* Gelechia celtisella (Ashmead).

[3]) *Lep.:* Pionea forficalis, Eupithecia succenturiata, Acronycta spec. (Brischke).

Limneria geniculata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 148, ♀♂.
Limneria geniculata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 105 n. 36.
Limneria geniculata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1105 n. 5, ♀.
Limnerium geniculatum m.

gibbum (Brischke) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Limneria gibba Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 155, ♂.
Limnerium gibbum m.

gibbulum (Brischke) D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Limneria gibbula Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 159, ♀.
Limnerium gibbulum m.

gracile (Grav.) D. T.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Campoplex gracilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 511 n. 40, ♂.
Limneria gracilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 150, ♂.
Limneria gracilis ? Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1884 p. 427, ♀ ♂.
Limneria gracilis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 106 & 108 n. 37.
Limnerium gracile m.

guignardii (Prov.) D. T.[2]) — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Limneria Guignardi Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 87 n. 24, ♀ ♂.
Limnerium Guignardii m.

hawaiiense (Cam.) D. T. — Austr.: Ins. Hawaienses.
Limneria Hawaiiensis Cameron, Mem. Manchester Lit. & Philos. Soc. (3) X. 1886 p. 241 n. 72.
Limnerium Hawaiiense m.

heliae (Ashm.) D. T.[3]) — ♂ — Am.: Washington Terr.
Limneria heliae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 194, ♂.
Limnerium heliae m.

helminda (Holmgr.) D. T. — ♀ — Afr.: Cap.
Limneria Helminda Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 417 n. 55, ♀.
Limnerium Helminda m.

hospitum (Holmgr.) D. T. — ♂ — Am.: California.
Limneria hospita Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 416 n. 53, ♂.
Limnerium hospitum m.

hyalinum (Prov.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Limneria hyalina Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 147.
Limneria hyalina Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 177 n. 8, ♀ ♂.
Limneria hyalina Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 369 n. 8, ♀ ♂.
Limneria hyalina Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 428.
Limnerium hyalinum m.

hyperboreum (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Limneria hyperborea Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1106 n. 11, ♀ ♂.
Limnerium hyperboreum m.

illepidum (Cress.) D. T. — ♂ — Am.: Texas.
Limneria illipeda Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 172, ♂.
Limnerium illepidum m.

indicum (Cam.) D. T. — ♀ — As.: India.
Limneria Indica Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 125, ♀.
Limnerium Indicum m.

---

1) *Lep.:* Coriscium cuculipenella (Bignell), Gracilaria stigmatella (Fletcher).
2) *Lep.:* Notodonta concinna (Provancher).
3) *Lep.:* Helia aenula (Ashmead).

infestum (Cress.) D. T. — ♀ — Am.: Texas.
Limneria infesta Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 172, ♀.
Limnerium infestum m.

infumatum (Prov.) D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Limneria infumata Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 148.
Limneria infumata Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 178 n. 11, ♀.
Limneria infumata Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 370 n. 11, ♀.
Limnerium infumatum m.

insidiator (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Campoplex insidiator Gravenhorst, Ichneum Europ. III. 1829 p. 562 n. 76, ♀ ♂.
Limneria insidiator Marshall, Catal. Brit. Hymen. I. 1872 p. 57 n. 43.
Limneria insidiator Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 206 n. 43.
Limnerium insidiator m.

insolvens (Cress.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Limneria ? insolvens Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 386 n. 1, ♀ ♂.
Limnerium insolvens m.

juniperinum (Holmgr.) D. T. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Campoplex juniperinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 15 n. 21, ♂.
Limneria juniperina Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1104 n. 3, ♀ ♂.
Limnerium juniperinum m.

laticeps (Brischke) D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Limneria laticeps Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 167, ♀.
Limnerium laticeps m.

limenitidis (How.) D. T.[1] — ♂ — Am.: United States.
Limneria limenitidis Howard, Scudder: Butterflies U. S. 1889 p. 1883, ♂; T. 88 F. 5.
Limnerium limenitidis m.

lineolatum (Bouché) D. T.[2] — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex lineolatus (Bouché) Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 93 n. 3, ♀.
Campoplex lineolatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 82 n. 7.
Campoplex lineolatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 84 n. 9.
Limneria lineolata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 150, ♀ ♂.
Limnerium lineolatum m.

longicorne (Brischke) D. T.[3] — ♂ — Eur.: Germania.
Limneria longicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 161, ♂.
Limnerium longicorne m.

lophyri (Ril.) D. T.[4] — ♀ ♂ — Am.: Missouri.
Limneria lophyri Riley, 9th Ann. Rep. Insect. Missouri 1877 p. 32, ♀ ♂.
Limneria lophyri Riley, General-Index Rep. Insect. Missouri 1881 p. 65, ♀ ♂.
Limneria lophyri Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 429.
Limnerium lophyri m.

majus (Cress.) D. T. — ♂ — Am.: Canada, Delaware.
Mesoleptes major Cresson, Proc. entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 257 n. 1, ♂.
Limneria genuina Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 177 n. 6, ♂.
Limneria genuina Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 369 n. 6, ♂.

---

1) *Lep.:* Basilarchia tityrus (Howard).

2) *Lep.:* Tortrix spec., Hyponomeuta spec. (Ratzeburg). — *Hymen.:* Lophyrus pini (Brischke).

3) *Lep.:* Sesia formicaeformis (Brischke).

4) *Hymen.:* Lophyrus abbottii (Riley).

Limneria major Cresson, Synops. Hymen. North Amer. 1887 p. 203.
Limnerium majus m.

marginatum (Prov.) D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Campoplex marginatus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 146.
Limneria marginata Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 178 n. 10, ♀.
Limneria marginata Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 370 n. 10, ♀.
Limnerium marginatum m.

melanocoxum (Ashm.) D. T. — ♀ — Am. Texas.
Limneria melanocoxa Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 430, ♀.
Limnerium melanocoxum m.

mellipes (Prov.) D. T.[1]) — ♀ — Am.: Canada.
Atractodes? mellipes Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 332.
Cremastes mellipes Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 185 n. 3, ♀.
Cremastes mellipes Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 366 n. 3.
Cremastes mellipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 377 n. 3, ♀.
Cremastes mellipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 788 n. 3.
Limneria mellipes Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 188.
Limnerium mellipes m.

mississippiense (Ashm.) D. T. — ♀ — Am.: Ithaka.
Limneria Mississippiensis Ashmead, Insect Life VII. 1894 p. 243, ♀.
Limnerium Mississippiense m.

mollipla (Holmgr.) D. T. — ♂ — Afr.: Cap.
Limneria Mollipla Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 417 n. 56, ♂.
Limnerium Mollipla m.

montezuma (Cam.) D. T. — ♀ — Am.: Mexico.
Limneria Montezuma Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 50. 1886 Hymen. I. p. 308 n. 4, ♀.
Limnerium Montezuma m.

monticolanum (Bridgm.) D. T.[2]) — ♀ — Eur.: Britannia.
Limneria monticolana Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 159, ♀.
Limneria monticolana Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 207.
Limnerium monticolanum m.

morosum (Cam.) D. T. — ♀ — As.: Ceylon.
Limneria morosa Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 p. 30, ♀.
Limnerium morosum m.

nematorum (Tschek) D. T. — ♀ ♂ — Eur.
Limneria nematorum Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 65, ♀ ♂.
Limnerium nematorum m.

nephelodis (Ashm.) D. T.[3]) — ♂ — Am.: Missouri.
Limneria nephelodis Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 194, ♂.
Limnerium nephelodis m.

nigricinctum (Ashm.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Washington, Carolina.
Limneria nigricincta Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 431, ♀ ♂.
Limnerium nigricinctum m.

nigricoxum (Prov.) D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Limneria nigricoxa Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 364 n. 21, ♀.
Limneria nigricoxa Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 786 n. 21, ♀.
Limnerium nigricoxum m.

---

1) *Lep.:* Depressaria pulvipennella (Provancher).
2) *Lep.:* Elachista monticola (Bridgman).
3) *Lep.:* Nephelodes violans (Ashmead).

nigritum (Holmgr.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria nigrita Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 74 n. 38, ♀ ♂.
Limnerium nigritum m.

nigritarse (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Campoplex nigritarsus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 506 n. 35, ♀ ♂.
Limneria nigritarsa Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 57 n. 53.
Limneria nigritarsa Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 393 n. 5, ♂.
Limneria nigritarsa Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 150, ♂.
Limneria nigritarsa Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107 n. 53, ♂.
Limnerium nigritarse m.

nigritellum (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Limneria nigritella Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1107 n. 12, ♀.
Limnerium nigritellum m.

nitidum (Brischke) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Limneria nitida Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 150, ♀ ♂.
Limnerium nitidum m.

noctuae (Ashm.) D. T. — ♂ — Am.: Washington.
Limneria noctuae Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 437, ♂.
Limnerium noctuae m.

nolae (Ashm.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: California.
Limneria nolae Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 431, ♀ ♂.
Limnerium nolae m.

normannicum (Rdw.) D. T. — Eur.: Gallia.
Limneria Normannica Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 61 n. 11.
Limnerium Normannicum m.

obliteratum (Cress.) D. T.[1] — ♀ — Am.: Illinois.
Mesoleptus obliteratus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 260 n. 6, ♀.
Limneria obliterata Cresson, Synops. Hymen. North Amer. 1887 p. 204.
Limneria obliterata Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 430.
Limnerium obliteratum m.

obscurum (Cress.) D. T. — ♀ — Am.: Illinois.
Mesoleptes obscurus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 261 n. 8, ♀.
Limneria obscura Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 173.
Limneria obscura Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XII. 1890 p. 429.
Limmerium obscurum m.

occidentale (Ashm.) D. T. — ♀ — Am.: Missouri.
Limneria occidentalis Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XII. 1890 p. 432, ♀.
Limnerium occidentale m.

occultum (Brischke) D. T.[2] — ♀ — Eur.: Germania.
Limneria occulta Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 162, ♀.
Limnerium occultum m.

oculatum (Tschek) D. T. — ♀ — Eur.: Austria.
Limneria oculata Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 60, ♀.
Limnerium oculatum m.

oedemasiae (Ashm.) D. T.[3] — ♀ ♂ — Am.: Washington.
Limneria oedemasiae Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XII. 1890 p. 436, ♀ ♂.
Limnerium oedemasiae m.

---

1) *Lep.:* Gelechia rubidella (Ashmead).
2) *Lep.:* Coleophora curricipennella (Brischke).
3) *Lep.:* Oedemasia concinna (Ashmead).

ovatum (Brischke) D. T. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Limneria ovata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 151, ♀.
Limneria ovata Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1884 p. 428 & 429, ♀.
Limneria ovata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 106, ♀.
Limnerium ovatum m.

oxylus (Cress.) D. T.[1] — ♀ — Am.: Canada, Delaware, Illinois.
Mesoleptus oxylus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 262 n. 11, ♀.
Limneria clavata Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 148.
Limneria clavata Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 179 n. 12, ♀.
Limneria clavata Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 371 n. 12, ♀.
Limneria clavata Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 89 n. 12, ♀.
Limneria oxylus Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XII. 1890 p. 428.
Limnerium oxylus m.

pallidipes (Prov.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Limneria pallipes Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 147.
Limneria pallipes Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 180 n. 18, ♀ ♂.
Limneria pallipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 372 n. 18, ♀ ♂.
Limneria pallipes Riley, Rep. 1886 p. 532.
Limneria pallipes Packard, U. St. Entom. Commiss. 1890 p. 255.
Limnerium pallidipes m.

paniscus (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Campoplex paniscus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 498 n. 29, ♀ ♂.
Campoplex paniscus Curtis, Farm Insects 1860 p. 87.
Limneria paniscus Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 57 n. 57.
Limneria paniscus Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107 n. 57, ♀ ♂.
Limnerium paniscus m.

parvum (Prov.) D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Limneria parva Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 147.
Limneria parva Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 176 n. 4, ♀.
Limneria parva Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 368 n. 4, ♀.
Limnerium parvum m.

patruele (Holmgr.) D. T. — ♀ — Afr.: Cap.
Limneria patruelis Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 414 n. 50, ♀.
Limnerium patruele m.

pattonii (Ashm.) D. T. — ♂ — Am.: Alabama.
Limneria Pattoni Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XII. 1890 p. 434, ♂.
Limnerium Pattonii m.

peraffine (Ashm.) D. T. — ♀ — Am.: Texas.
Limneria peraffinis Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XII. 1890 p. 435, ♀.
Limnerium peraffine m.

peregrinum (Brischke) D. T. — ♂ — Eur. Germania.
Limneria peregrina Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 160, ♂.
Limnerium peregrinum m.

pilosulum (Prov.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Limneria pilosula Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 89 n. 28, ♀ ♂.
Limnerium pilosulum m.

pineticolum (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia, Corfu.
Limneria pineticola Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1108 n. 15, ♀.
Limnerium pineticolum m.

---

[1] *Lep.:* Leucania unipuncta (Haward).

planiscapum (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr. [♀ ♂ [non Grav.].
Limneria geniculata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 54 n. 2,
Limneria planiscapus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1105 n. 6, ♀ ♂.
Limnerium planiscapum m.

plenum (Prov.) D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Limneria plena Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 146.
Limneria plena Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 175 n. 2; Fig. 9b, ♀.
Limneria plena Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 367 n. 2; Fig. 44b.
Limnerium plenum m.

pleurale (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria pleuralis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1105 n. 4, ♀ ♂.
Limnerium pleurale m.

polynesiale (Cam.) D. T. — Austr.
Limneria polynesialis Cameron, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 191, ♀.
Limnerium polynesiale m.

procerum (Brischke) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Limneria procera Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 154, ♀ ♂.
Limnerium procerum m.

prolixum (Holmgr.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Limneria prolixa Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 83 n. 54, ♀.
Limnerium prolixum m.

protervum (Brischke) D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Limneria proterva Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 171, ♀.
Limnerium protervum m.

provancheri D. T.[1]) — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States. [Holmgren].
Mesoleptes dubitatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 259 n. 5, ♀ [non
Limneria dubitata Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 365 n. 22, ♀ ♂.
Limneria dubitata Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 787 n. 22, ♀ ♂.
Limneria dubitata Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XII. 1890 p. 428.
Limnerium Provancheri m.

prussicum (Brischke) D. T.[2]) — ♀ — Eur.: Germania.
Limneria Prussica Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 161, ♀.
Limneria Prussica Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 106.
Limnerium Prussicum m.

pterophorae (Ashm.) D. T. — ♀ — Am.: California.
Limneria pterophorae Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XII. 1890 p. 435, ♀.
Limnerium pterophorae m.

ramidulum (Brischke) D. T.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Limneria ramidula Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 155, ♂.
Limneria ramidula Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 351.
Limnerium ramidulum m.

ratzeburgii (Tschek) D. T.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex seniculus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 96 n. 12 [non Grav.].
Limneria Ratzeburgi Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 64, ♀ ♂.
Limnerium Ratzeburgii m.

---

1) *Lep.:* Laphygma frugiperda (Ashmead).
2) *Hymen.:* Cimbex spec. (Brischke).
3) *Hymen.:* Nematus Vallisnieri, — *Lep.:* Retinia resinana (Brischke), R. pinivorana (Atmore).
4) *Hymen.:* Lophyrus polytomus (Tschek).

reticulatum (Bridgm.) D. T.[1] — ♂ — Eur.: Britannia.
Limneria reticulata Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1884 p. 430, ♂.
Limnerium reticulatum m.
rivale (Cress.) D. T.[2] — ♀ ♂ — Am.: Texas.
Limneria rivalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 173, ♀ ♂.
Limnerium rivale m.
robustum (Woldst.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Limneria robusta Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 394 n. 6, ♀ ♂.
Limneria robusta Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1884 p. 428, ♀ ♂.
Limneria robusta Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 106, ♀.
Limnerium robustum m.
rostrale (Brischke) D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Limneria rostralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 160, ♀.
Limnerium rostrale m.
rufum (Bridgm.) D. T.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Limneria rufa Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 152, ♀ ♂.
Limneria rufa Bignell, Entomologist XVI. 1883 p. 69.
Limneria rufa Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 206.
Limnerium rufum m.
ruficeps (Holmgr.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria ruficeps Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 99 n. 78, ♀ ♂.
Limnerium ruficeps m.
ruficoxum (Prov.) D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Limneria ruficoxa Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 146.
Limneria ruficoxa Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 180 n. 17, ♀.
Limneria ruficoxa Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 372 n. 17, ♀.
Limneria ruficoxa Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XII. 1890 p. 428.
Limnerium ruficoxum m.
rufifemur (Thoms.) D. T.[4] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria rufifemur Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1106 n. 8, ♀ ♂.
Limnerium rufifemur m.
rufipes (Prov.) D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Limneria rufipes Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 149.
Limneria rufipes Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 176 n. 5, ♀.
Limneria rufipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 368 n. 5, ♀.
Limneria rufipes Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 430.
Limnerium rufipes m.
rufiventre (Pérez) D. T. — Afr.: Ins. Canarienses.
Limneria rufiventris Pérez, Ann. soc. entom. France 1895 p. 202.
Limnerium rufiventris m.
rugulosum (Brischke) D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Limneria rugulosa Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 151, ♀.
Limnerium rugulosum m.
salicicolum (Ashm.) D. T. — ♀ — Am.: Ontario.
Limneria salicicola Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 436, ♀.
Limnerium salicicolum m.

---

[1]) *Lep.:* Coccyx ustomaculana (Fletcher).
[2]) *Rhynch.:* Aphis brassicae (Webster).
[3]) *Lep.:* Bombyx quercus (Bignell).
[4]) *Lep.:* Botys sericealis (Kriechbaumer).

sarntheinii D. T.[1]) — ♂ — Am.: Missouri.
Limneria rufa Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 193, ♂ [non Bridgm.].
Limnerium Sarntheinii m.
sericeum (Prov.) D. T. — ♂ — Am.: Canada.
Limneria sericea Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 148.
Limneria sericea Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 181 n. 20, ♂.
Limneria sericea Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 373 n. 20, ♂.
Limnerium sericeum m.
sessile (Prov.) D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Limneria sessilis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 148.
Limneria sessilis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 178 n. 9, ♀.
Limneria sessilis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 370 n. 9, ♀.
Limnerium sessile m.
idnicum (Holmgr.) D. T. — ♀ — Austr.
Limneria Sidnica Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 414 n. 51, ♀.
Limnerium Sidnicum m.
signatum (Brischke) D. T. — ♀ — Eur.: Germania. [p. 168, ♀.
Limneria (Olesicampa?) signata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880
Limnerium signatum m.
sinicum (Holmgr.) D. T. — ♀ — As.: China.
Limneria Sinica Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 412 n. 48, ♀.
Limnerium Sinicum m.
solenobiae (Ashm.) D. T.[2]) — ♂ — Am.: Montana.
Limneria solenobiae Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 433, ♂.
Limnerium solenobiae m.
solitarium (Brischke) D. T.[3]) — ♀ — Eur.: Germania.
Limneria solitaria Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 157, ♀.
Limnerium solitarium m.
sonorense (Cam.) D. T. — Am.: Mexico.
Limneria Sonorensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 50. 1886 Hymen. I. p. 307 n. 3; T. 13 F. 6.
Limnerium Sonorense m.
spectabile (Rdw.) D. T.[4]) — Eur.: Germania.
Limneria spectabilis Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 61 n. 10.
Limnerium spectabile m.
spretum (Woldst.) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Limneria spreta Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 394 n. 7, ♂.
Limnerium spretum m.
spurcum (Holmgr.) D. T. — ♂ — Afr.: Cap.
Limneria spurca Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 413 n. 49, ♂.
Limnerium spurcum m.
stigmaticum (Brischke) D. T. — ♂ — Eur.: Germania. [p. 173, ♂.
Limneria (Erypternus?) stigmatica Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880
Limnerium stigmaticum m.
subrubidum (Cress.) D. T. — ♂ — Am.: New Jersey, Illinois.
Mesoleptus subrubidus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 264 n. 14, ♂.
Limneria subrubida Cresson, Synops. Hymen. North Amer. 1887 p. 204.

---

1) *Lep.:* Aplodes rubivora (Ashmead).
2) *Lep.:* Solenobia Walshella (Ashmead).
3) *Lep.:* Eupithecia pimpinellaria (Brischke).
4) *Lep.:* Cheimatobia brumaria (Rudow).

Limneria subrubida Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 428.
Limnerium subrubidum m.

taiticum (Holmgr.) D. T. — ♀ — Austr.: Tahiti.
Limneria Taitica Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 416 n. 54, ♀.
Limnerium Taiticum m.

tarsatum (Brischke) D. T.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Limneria tarsata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 153, ♀ ♂.
Limnerium tarsatum m.

tegulare (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Limneria tegularis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1107 n. 14, ♀.
Limnerium tegulare m.

tempestivum (Holmgr.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀ ♂.
Limneria tempestiva Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 94 n. 70,
Limnerium tempestivum m.

teutonum D. T. — ♂ — Eur.: Germania. [p. 167, ♀ [non Cresson].
Limneria (Rhimphoctona?) valida Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880
Limnerium teutonum m.

thoracicum (Brischke) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Limneria thoracica Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 156, ♂.
Limnerium thoracicum m.

tibiator (Cress.) D. T.[2]) — ♂ — Am.: New Jersey, Illinois.
Mesoleptus tibiator Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 259 n. 4, ♂.
Limneria tibiator Cresson, Synops. Hymen. North Amer. 1887 p. 204.
Limneria tibiator Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 429.
Limnerium tibiator m.

transiens (Brischke) D. T. — ♂ — Eur.: Germania. [p. 173, ♂.
Limneria (Zaporus?) transiens Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880
Limnerium transiens m.

var. **incompletum** (Brischke) D. T. — ♂ — Eur.: Germania. [p. 174, ♂.
Limneria transiens var. incompleta Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880
Limnerium transiens var. incompletum m.

var. **pumilum** (Brischke) D. T. — ♀ — Eur.: Germania. [p. 174, ♀.
Limneria transiens var. pumila Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880
Limnerium transiens var. pumilium m.

tripunctatum (Bridgm.) D. T. — ♀ — Eur.: Britannia.
Limneria tripunctata Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 351, ♀.
Limnerium tripunctatum m.

triste (Weed) D. T. — Am.: Illinois.
Limneria tristis Weed, Bull. Illinois Labor. Nat. Hist. III. 1890 p. 40.
Limnerium triste m.

turionum (Htg.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Campoplex turionum (Hartig) Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 93 n. 4.
Campoplex turionum (Hartig) Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 82 n. 8.
Campoplex turionum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 11 n. 11.
Limneria turionum Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1105 n. 7, ♀ ♂.
Limnerium turionum m.

---

1) *Lep.:* Myelois cribrella (Brischke).

2) *Rhynch.:* Aphis brassicae (Webster). — *Lep.:* Plutella cruciferarum, Acrobasis indiginella, Plusia brassicae (Riley).

umbratum (Brischke) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Limneria umbrata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 158, ♂.
Limnerium umbratum m.

unicinctum (Grav.) D. T.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex unicinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 529 n. 52, ♀ [excl. ♂].
Campoplex unicinctus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 83 n. 21, ♀. [p. 1.
Campoplex (Limneria) unicinctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. II. P. 1. 1868 Art. 6
Limneria unicincta Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 395 n. 8, ♀ ♂.
Limneria unicincta Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 165, ♀ ♂.
Campoplex unicinctus Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 16, ♀ ♂.
Limneria unicincta Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 206 n. 71.
Limnerium unicinctum m.

validum (Cress.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Mesoleptes ? validus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 258 n. 3, ♀ ♂.
Limneria excavata Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 146.
Limneria valida Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 174 n. 1, ♀ ♂; Fig. 9a.
Limneria valida Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 367 n. 1, ♀ ♂; Fig. 44a.
Limneria valida Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 429.
Limnerium validum m.

variabile (Bridgm.) D. T.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Limneria variabilis Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 352, ♀ ♂.
Limnerium variabile m.

varians (Brischke) D. T.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Limneria varians Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 153, ♀ ♂.
Limnerium varians m.

vexans (Holmgr.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Limneria vexans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 72 n. 34, ♀.
Limnerium vexans m.

vicinum (Cress.) D. T. — ♀ — Am.: New Jersey, Pennsylvania.
Mesoleptus vicinus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 268 n. 22, ♀.
Limneria vicina Cresson, Synops. Hymen. North Amer. 1887 p. 204.
Limneria vicina Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 430.
Limnerium vicinum m.

vitripenne (Holmgr.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀ ♂.
Limneria vitripennis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 92 n. 68,
Limnerium vitripenne m.

vividum (Holmgr.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Limneria vivida Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 76 n. 41, ♀.
Limnerium vividum m.

volens (Cam.) D. T. — ♀ — As.: India.
Limneria volens Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 126, ♀.
Limnerium volens m.

volubile (Holmgr.) D. T.[4] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Limneria volubilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 65 n. 21, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Orgyia antiqua L., Geometra spec., Vanessa polychloros, V. urticae (Brischke), Orgyia pudibunda, Lomaspilis marginata, Limacodes asellus, Eupithecia rectangulata, Cheimatobia brumata, Acronycta ligustri, A. alni (Bignell).

2) *Lep.:* Gelechia notatella (Fletcher).

3) *Lep.:* Noctua spec. (Brischke).

4) *Lep.:* Coleophora albicosta (Dale).

Limneria volubilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 153, ♀.
Limneria volubilis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107, ♀.
Limneria volubilis Dale, Entom. M. Magaz. XXIII. 1887 p. 214.
Limnerium volubile m.

vulgare (Tschek) D. T.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania, Austria.
Limneria vulgaris Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 61, ♀ ♂.
Limneria vulgaris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 150, ♀.
Limneria vulgaris Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 106.
Limnerium vulgare m.

xanthostoma (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex xanthostomus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 460 n. 2, ♂.
Limneria xanthostoma Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1107 n. 13, ♀ ♂.
Limnerium xanthostomum m.

zealandicum (Cam.) D. T. — ♀ — Austr.
Limneria Zealandica Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. P. 1. 1898 p. 36, ♀.
Limnerium Zealandicum m.

CAMPOLETIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 157 n. 57.
Etymol. obscura.

Species exstat.

TRANOSEMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 157 n. 56.
τρανός, clarus; σῆμα, signum.

Synon.: Limneria Holmgren, Brischke.

arenicolum Thoms. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Tranosema arenicola Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1138 n. 3, ♀ ♂.

latiusculum Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Tranosema latiuscula Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1138 n. 2, ♀.

pedellum (Holmgr.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Limneria pedella Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 73 n. 35, ♀ ♂.
Limneria pedella Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 163, ♀ ♂.
Tranosema pedella Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1138 n. 1, ♀ ♂.

MELOBORIS

Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 326 n. 14.
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 96.
μέλι, meli; βιβρώσκω, devoro.

Synon.: Campoplex Gravenhorst, Boie, Blanchard, Holmgren.
Ichneumon O. F. Müller.
Limneria Holmgren, Brischke, Bridgman & Fitch.

crassicornis (Grav.) Thoms.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex crassicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 565 n. 78, ♀ [p. p.].

---

[1]) *Lep.:* Gonopteryx rhamni (Bignell).
[2]) *Hymen.:* Fenusa pumila, Cryptocampus spec. (Brischke).
[3]) *Hymen.:* Nematus Vallisnierii (Brischke).

Campoplex crassicornis Boie, Arch. f. Naturg. II. P. 1. 1836 p. 41 n. 12, ♀ ♂. [n. 24, ♀.
Limneria crassicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 67
Limneria crassicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 163, ♀ ♂.
Limneria crassicornis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 206 n. 20.
Meloboris crassicornis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1151 n. 10, ♀ ♂.

dorsalis (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex dorsalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 528 n. 51, ♂.
Campoplex dorsalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 21 n. 35, ♂.
Limneria dorsalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 96 n. 73, ♀ ♂.
Limneria dorsalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 172, ♂.
Limneria dorsalis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 105 n. 25, ♀ ♂.
Meloboris dorsalis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1149 n. 1, ♀ ♂.

gracilis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Meloboris gracilis Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 326 n. 14.
Meloboris gracilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 100 n. 1, ♀ ♂.

hydropota (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀ ♂ var.
Limneria hydropota Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 69 n. 28,
Limneria hydropota Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 205 n. 38.
Meloboris hydropota Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1140 n. 3, ♀ ♂.

hygrobia Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Meloboris hygrobia Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1151 n. 8, ♀ ♂.

ischnocera Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Meloboris ischnocera Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1151 n. 9, ♀ ♂.

litoralis (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Campoplex litoralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 20 n. 33, ♀ ♂.
Limneria litoralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 69 n. 29, ♀.
Limneria litoralis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 205.
Meloboris litoralis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1150 n. 6, ♀ ♂.

paludicola (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
—— Linné, Acta Upsal. 1736 p. 125 n. 6.
—— Réaumur, Mém. hist. Insect. VI. 1743 p. 310; T. 30 F. 9.
? Ichneumon sagittarius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 159 n. 1848.
? Campoplex inculcator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 553 n. 70, ♀ [non Linné].
? Ophion (Campoplex) inculcator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 324 n. 2.
Limneria paludicola Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 88 n. 60, ♀ ♂.
Limneria paludicola Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 205 n. 56.
Meloboris inculcator Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1150 n. 4, ♀ ♂.

rufiventris (Grav.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex rufiventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 552 n. 69, ♀ ♂.
Campoplex rufiventris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 20 n. 32, ♀ ♂.
Limneria rufiventris Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet-Akad. Förh. XV. 1858 p. 326 n. 2.
Limneria rufiventris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 68 n. 27, ♀ ♂.
Limneria rufiventris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 163, ♀ ♂.
Limneria rufiventris Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 205 n. 63.
Meloboris rufiventris Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1150 n. 5, ♀ ♂.

stagnalis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Campoplex stagnalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 21 n. 34, ♀ ♂.
Meloboris stagnalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 101 n. 3, ♀ ♂.
Meloboris stagnalis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1149 n. 2, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Orthotaelia sparganiella (Brischke).

velox (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria velox Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 67 n. 25, ♀♂.
Meloboris velox Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1150 n. 7, ♀ ♂.

CANIDIELLA

Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 368.
Canidia, nom. propr. Hymen.

Synon.: Canidia Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 103 n. 20 [non Thoms. 1857].
Campoplex Gravenhorst, Ratzeburg, Holmgren.
Limneria Marshall, Parfitt, Bridgman & Fitch.

anura (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Canidia anura Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1113 n. 7, ♀ ♂.
Canidiella anura m.

balearica (Kriechb.) D. T. — ♂ — Eur.: Mallorca.
Canidia Balearica Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 253 n. 32, ♂.
Canidiella Balearica m.

balteata (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Canidia balteata (Bridgman) Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1114 n. 9, ♀ ♂.
Canidiella balteata m.

cingulata (Brischke) D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Canidia cingulata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 176, ♀.
Canidiella cingulata m.

contracta (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Gallia.
Canidia contracta Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1113 n. 6, ♀.
Canidiella contracta m.

corvina (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Canidia corvina Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1111 n. 1, ♀ ♂.
Canidiella corvina m.

curculionis (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
? Campoplex exiguus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 13 n. 16, ♀.
Canidia subcincta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 103 n. 1, ♀ ♂ [non Gravenhorst].
Canidia curculionis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1113 n. 5, ♀.
Canidiella curculionis m.

exigua (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Campoplex exiguus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 499 n. 30, ♀.
? Campoplex exiguus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 13 n. 16, ♀.
Canidia pusilla Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 104 n. 2, ♀ ♂.
Limneria exigua Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 56 n. 29.
Limneria exigua Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 159, ♀ ♂.
Canidia pusilla Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 175, ♀ ♂.
Limneria exigua Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107 n. 29.
Canidia exigua Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1112 n. 4, ♀ ♂.
Canidiella exigua m.

immolator (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Campoplex immolator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 491 n. 23, ♀ ♂.
Limneria immolator Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 56 n. 39.
Canidia immolator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 175, ♀.
Limneria immolator Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107 n. 39, ♂ ♂.
Canidiella immolator m.

lucta (Davis) D. T. — ♀ — Am.: New Hampshire.
Canidia luctus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 364, ♀.
Canidiella lucta m.

quinqueangularis (Ratzbg.) D. T.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Lissonota quinqueangularis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 106 n. 8, ♀.
Canidia quinqueangularis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 175, ♀ ♂.
Canidia quinqueangularis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1112 n. 3, ♀
Canidiella quinqueangularis m.

rostrata (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Canidia rostrata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1112 n. 2, ♀.
Canidiella rostrata m.

stenostigma (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Canidia stenostigma Thomson, Opusc. entom. P. 11. p. 114 n. 8, ♀ ♂.
Canidiella stenostigma m.

subcinctus (Ratzbg.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Campoplex subcinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 494 n. 25b, ♀.
Canidia subcincta Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 175, ♀.
Canidiella subcincta m.

tristis (Grav.) D. T.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Campoplex tristis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 492 n. 24, ♀ ♂.
Limneria tristis Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 58 n. 69.
Canidia tristis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4 1880 p. 175, ♀.
Limneria tristis Parfitt, Rep. & Trans. Devon Assoc. XIII. 1881 p. 269.
Limneria tristis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107 n. 67, ♂ ♂.
Canidiella tristis m.

trochantella (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur. centr. & mer.
Canidia trochantella Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1114 n. 10, ♀.
Canidiella trochantella m.

umbrata (Brischke) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Canidia umbrata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 176, ♂.
Canidiella umbrata m.

BATHYPLECTES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 156 n. 52.
βαθύς, profundus; *πλήκτης*, percussor.
Species exstat.

RHEXINEURA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 156 n. 51.
ῥῆξις, fissio; *νεῦρον*, nervus.
Species exstat.

ISCHNOSCOPUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 156 n. 50.
ἰσχνός, macer; *σκοπέω*, exploro.

synchlorae Ashm. — ♂ — Am.: New Hampshire.
Ichnoscopus synchlorae Ashmead, Proc. Entom. Soc. Washington IV. 1897 p. 168 n. 49, ♂.

---

1) *Col.*: Phytonomus arundinis (Kriechbaumer).
2) *Lep.*: Pseudoterpna cytisaria (Bignell).

PHOBOCAMPE

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 156 n. 49.
φοβέω, terreo; κάμπη, eruca.

Synon.: Phobocampa Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1120.
Campoplex Gravenhorst, Holmgren.
Limneria Holmgren, Marshall, Bridgman & Fitch, Brischke.

alticollis Thoms.[1] — ♀ — Eur.: Germania.
Phobocampe alticollis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1121 n. 2, ♀.
bicingulata (Grav.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Campoplex bicingulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 527 n. 50, ♀ ♂.
Campoplex bicingulatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 19 n. 30, ♀ ♂.
Limneria bicingulata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 80 n. 48, [♀ ♂.
Limneria bicingulata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 206 n. 13.
Phobocampa bicingulata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1122 n. 5, ♀ ♂.
confusa Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex unicinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 529 n. 52, ♂ [excl. ♀].
Phobocampa confusa Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1122 n. 4, ♀.
crassiuscula (Grav.) Thoms.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Campoplex crassiusculus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 531 n. 54.
Limneria crassiuscula Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 56 n. 21.
Limneria crassiuscula Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 393 n. 4, ♂.
Limneria crassiuscula Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 165, ♀ ♂.
Limneria crassiuscula Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 206 n. 21.
Phobocampa crassiuscula Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1121 n. 1, ♀ ♂.
flavicincta Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phobocampa flavicincta Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1122 n. 6, ♀ ♂.
neglecta (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria neglecta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 77 n. 43, ♀ ♂.
Phobocampa neglecta Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1122 n. 7, ♀ ♂.
obscurella (Holmgr.) Thoms.[4] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Britannia. [♀ ♂.
Limneria obscurella Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 75 n. 40,
Limneria obscurella Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107 n. 55, ♀ ♂.
Phobocampa obscurella Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1123 n. 8, ♀.
pulchella Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria unicincta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 81 n. 49, ♂.
Phobocampa pulchella Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1121 n. 3, ♀ ♂.

HYPOTHEREUTES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 156 n. 48.
ὑπό, subtus; θηρευτής, venatio.

geometrae Ashm. — ♂ — Am.: Massachusetts.
Hypothereutes geometrae Ashmead, Proc. Entom. Soc. Washington IV. 1897 p. 167 n. 47, ♂.

---

[1] *Lep.:* Hypsipetes elutaria (Thomson).
[2] *Lep.:* Hybernia progemmaria (Bignell).
[3] *Lep.:* Eupithecia exiguaria, E. satyrata, E. actaeata (Brischke), Dicranura vinula (Bignell).
[4] *Lep.:* Hemithea thymiaria (Bignell).

NEPIERA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 156 n. 47.
Nepier, nom. propr.

concinna (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Limneria concinna Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 84 n. 55, ♀ ♂.
Limneria concinna Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 207.
Nepiera concinna Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1137 n. 1, ♀ ♂.

DIMOPHORA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 155 n. 46.
δειμός, timor; *φέρω*, fero.

cognata Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Dimophora cognata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 177, ♂.
robusta Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Dimophora robusta Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 176, ♀ ♂.
similis Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Dimophora similis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 177, ♀ ♂.

DOLOPHRON

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 155 n. 45.
δολοφρών, dolos meditans.
Species exstat.

SPUDASTICA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 155 n. 44.
σπουδαστικός, industrius.

Synon.: Limneria Bridgman.

kriechbaumeri (Bridgm.) D. T.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Limneria Kriechbaumeri Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 151, ♀ ♂.
Limneria Kriechbaumeri Bridgman, Entomologist XV. 1882 p. 215-216.
Limneria Kriechbaumeri Brigman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 106, ♀ ♂.
Spudastica petiolaris Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1123 n. 1, ♀ ♂.
Limneria Kriechbaumeri Bridgman, Entom. M. Magas. XXV. 1888 p. 163.
Limneria Kriechbaumeri Bignell, Entomologist 1895 p. 82.
Spudastica petiolaris Bloesch, Feuille jeun. natural. XXV. 1895 p. 75.
Spudastica Kriechbaumeri m.

SYNETAERIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 155 n. 43.
συνεταιρίς, sodalis.

Synon.: Limneria Holmgren.

carbonella Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Syntaeris carbonella Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1115 n. 2, ♀ ♂.
heteropus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Syntaeris heteropus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1115 n. 3, ♀ ♂.
sepiella (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria sepiella Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 63 n. 17, ♀ ♂.
Syntaeris sepiella Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1115 n. 1, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Taeniocampa instabilis (Bignell).

NEMERITIS

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 104 n. 21.
νῆμα, filum.

Synon.: Campoplex Gravenhorst.
Limneria Marshall, Bridgman.

canescens (Grav.) Thoms. — ♀ — Eur.: Tauria.
Campoplex canescens Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 555 n. 71, ♀.
Nemeritis canescens Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1120 n. 9, ♀ ♂.

caudatula Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Nemeritis caudatula Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1119 n. 5, ♀ ♂.

convergens Thoms. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Nemeritis convergens Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1120 n. 8, ♀.

cremastoides Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Nemeritis cremastoides Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 105 [n. 1, ♀.
Nemeritis cremastoides Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 177, ♀.
Nemeritis cremastoides Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1118 n. 2, ♀ ♂.

gracilens Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Nemeritis gracilens Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 414, ♀.

lativentris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Nemeritis lativentris Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1119 n. 7, ♀ ♂.

macrocentra (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
? Campoplex gracilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 511 n. 40, ♂.
Campoplex macrocentrus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 519 n. 47, ♀.
Nemeritis macrocentra Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 105 [n. 2, ♀.
? Limneria gracilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 150, ♂.
Nemeritis macrocentra Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 177, ♀ ♂.
? Limneria gracilis Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1884 p. 427, ♀ ♂.
? Limneria gracilis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 106 & 108 n. 37, ♀ ♂.
Nemeritis macrocentra Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1118 n. 4, ♀ ♂.
Nemeritis macrocentra Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 45, ♀.

pusilla (Ratz.) Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
? Campoplex subcinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 494 n. 25b, ♀.
Campoplex pusillus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 82, ♀.
Nemeritis? pusillus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1113.

raphidiae Kriechb.[2] — ♀ — Eur.: Bavaria.
Nemeritis rhaphidiae Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 234, ♀.

rufipes Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Nemeritis rufipes Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 166, ♀.

sordida (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Campoplex sordidus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 466 n. 5, ♀.
Limneria sordida Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 58 n. 66, ♀.
Limneria sordida Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107 n. 66, ♀.
Nemeritis sordida Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1118 n. 3, ♀ ♂.

strenua Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Nemeritis strenua Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1119 n. 6, ♀.

transfuga (Grav.) Holmgr.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex transfuga Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 521 n. 48, ♀ ♂.

---

[1] *Lep.*: Coccyx strobilella (Bignell).
[2] *Neur.*: Rhaphidia ophiopsis? (Kriechbaumer).
[3] *Lep.*: Dioryctria abietella (Brischke).

Campoplex transfuga Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 85 n. 28, ♂.
Campoplex transfuga Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 88 n. 38.
Limneria transfuga Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 97 n. 75, ♀ ♂.
Limneria transfuga Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 172, ♀ ♂.
Limneria transfuga Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 105 n. 68.
Nemeritis transfuga Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1118 n. 1, ♀ ♂.

ANISAMORA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 155 n. 41.
ἀνίσος, inaequalis; *ἄμορος*, infortunatus.
Species exstat.

PANTROPA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 155 n. 40.
πᾶς, omne; *τρέπω*, verto.
Species exstat.

OMORGUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 154 n. 39.
ὠμός, crudus; *ἐργάζομαι*, laboro.

Synon.: Omorga Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1125.
Campoplex Gravenhorst, Ratzeburg.
Ichneumon Gmelin.
Limneria Holmgren & auct.
Porizon Zetterstedt.
Sagaritis Tschek.

angulatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Omorga angulata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1129 n. 15, ♀ ♂.

bilobus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Omorga biloba Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1126 n. 2, ♀ ♂.

borealis (Zett.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Porizon borealis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 395 n. 7.
Campoplex subcinctus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 82 n. 5, ♂.
Campoplex subcinctus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 83 n. 5.
Limneria borealis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 98 n. 77, ♀ ♂.
Sagaritis borealis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 53 n. 11.
Limneria borealis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 172, ♀ ♂.
Omorga borealis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1113 & 1129 n. 12, ♀ ♂.

continuus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Omorga continua Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1132 n. 24, ♀.

coracinus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Omorga coracina Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1130 n. 18, ♀.

cursitans (Holmgr.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Limneria cursitans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 64 n. 20, ♀.
Limneria cursitans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 153, ♂.
Limneria cursitans Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107.
Omorga cursitans Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1129 n. 13, ♀.

---

1) *Lep.:* Vanessa atalanta (Bignell).

difformis (Gmel.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 70 n. 348.
Ichneumon difformis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2720 n. 392.
Campoplex difformis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 458 n. 1, ♀ ♂ [p. p.].
Campoplex difformis Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 60.
Campoplex difformis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 92 n. 1, ♀ ♂.
Campoplex difformis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 81 n. 1.
Campoplex difformis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 82 n. 1.
Campoplex difformis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 11 n. 9, ♀ ♂.
Limneria difformis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 58 n. 8, ♀.
Limneria difformis Gerstaecker, Greenland, 2. deutsch. Nordpolfahrt II. P. 1. 1874 p. 404 n. 3, ♀.
Limneria difformis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 149, ♀ ♂.
Limneria difformis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 106 n. 22, ♀.
Omorga difformis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1127 n. 5, ♀ ♂.

ensator (Grav.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 66 n. 285.
Ichneumon spec. Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2720 n. 407.
Campoplex ensator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 576 n. 85, ♀ ♂.
Campoplex chrysostictus var. 2 Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 13 n. 18, ♀.
Limneria ensator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 72 n. 33, ♀.
Campoplex ensator Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 65.
Limneria ensator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 163, ♀ ♂.
Limneria ensator Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 207 n. 26.
Omorga ensator Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1133 n. 26, ♀.
Limneria ensator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VII. 1890 p. 66, ♀.
Limneria ensator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 45, ♀.

exoletus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Omorga exoleta Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1127 n. 8, ♀ ♂.

fasciatus Bridgm.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Limneria (Omorga) fasciata Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 422, ♀ ♂.

faunus (Grav.) Thoms.[4] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex faunus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 517 n. 45, ♀.
Limneria faunus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 55 n. 4, ♀.
Limneria faunus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 149, ♀.
Limneria faunus Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 105 n. 30, ♀.
Omorga faunus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1126 n. 3, ♀ ♂.

ferinus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria ferina Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 68 n. 26, ♀ ♂.
Omorga ferina Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1133 n. 29, ♀ ♂.

forticosta Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Omorga forticosta Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1131 n. 20, ♀ ♂.

fuscicornis Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Omorga fuscicornis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1132 n. 23, ♀.

---

1) *Lep.:* Tortrix americana (Boie).
2) *Lep.:* Butalis grandipennis (Bignell).
3) *Lep.:* Trycharis aurana, Psyche intermediella, Hypsipetes ruberata?, Grapholitha campoliliana (Fletcher).
4) *Lep.:* Tortrix spec. (Brischke).

fusciplica Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Omorga fusciplica Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1127 n. 6, ♀ ♂.

gastroides (Grav.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Campoplex gastroides Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 538 n. 60, ♀.
Omorga gastroides Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1133 n. 27, ♀.

hadrocerus Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Omorga hadrocera Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1134 n. 32, ♀.

liogaster Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Omorga liogaster Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1130 n. 17, ♀.

litoreus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Omorga litorea Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1134 n. 30, ♀ ♂.

lugubrinus (Holmgr.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria lugubrina Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 64 n. 19, ♀.
Limneria lugubrina Bignell, Entomologist XIII. 1880 p. 19.
Limneria lugubrina Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 152, ♀.
Limneria lugubrina Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107, ♀.
Omorga lugubrina Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1129 n. 14, ♀ ♂.

lyratus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Omorga lyrata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1128 n. 11, ♀.

melampus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Omorga melampus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1131 n. 21, ♀.

melanostictus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex melanostictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 539 n. 61, ♀.
Limneria melanosticta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 70 n. 30, ♀.
Limneria melanosticta Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 163, ♀ ♂.
Limneria melanosticta Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 206 n. 48.
Omorga melanosticta Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1132 n. 22, ♀ ♂.

molestus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Campoplex molestus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 518 n. 46, ♀.
Omorga molesta Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1126 n. 4, ♀ ♂.

multicinctus (Grav.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex multicinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 534 n. 57, ♀ ♂.
Campoplex multicinctus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 83 n. 20, ♀.
Campoplex multicinctus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 87 n. 28.
Limneria multicincta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 71 n. 32, ♀.
Limneria multicincta Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 163, ♀.
Limneria multicincta Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 205 n. 50.
Omorga multicincta Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1134 n. 31, ♀ ♂.

mutabilis (Holmgr.) Thoms.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria mutabilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 55 n. 3, ♀ ♂.
Limneria mutabilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 149, ♀.
Limneria mutabilis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 105 n. 51, ♀ ♂.
Omorga mutabilis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1125 n. 1, ♀ ♂.
Limneria mutabilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VII. 1890 p. 66, ♀.

---

1) *Lep.:* Oecophora flavimaculella (Bignell).

2) *Lep.:* Earias clorana (Brischke). — *Hymen.:* Nematus viminalis L. (Ratzeburg).

3) *Lep.:* Eupithecia pimpinellaria (Brischke), Ephippiphora nigricostana, Tortrix spec. (Bignell).

nigridens Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Omorga nigridens Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1130 n. 16, ♀ ♂.
picticrus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Omorga picticrus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1128 n. 10, ♀.
rothii (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria Rothii Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 56 n. 5, ♀ (♂).
Omorga Rothii Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1132 n. 25, ♀ ♂.
ruficoxa Thoms. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Omorga ruficoxa Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1127 n. 7, ♀.
scaposus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Omorga scaposa Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1128 n. 9, ♀ ♂.
striolatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Omorga striolata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1131 n. 19, ♀ ♂.
submarginatus Bridgm.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Limneria (Omorga) submarginata Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 423, ♀ ♂.
tumidulus (Grav.) Thoms. — ♀ — Eur.: Britannia.
Campoplex tumidulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 594 n. 95, ♀.
Limneria tumidula Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 58 n. 70.
Limneria tumidula Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 207 n. 70, ♀.
Omorga tumidula Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1133 n. 28, ♀.

LATHROPLEX

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 154 n. 38.
λαθρός, procax; πλάξ, tabula.

clypearis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Lathroplex clypearis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1135 n. 1, ♀ ♂.

LATHROSTIZUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 154 n. 37.
λαθρός, procax; Stizus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Lathrostiza Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1152.

forticaudus Thoms. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Lathrostiza forticauda Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1153 n. 2, ♀.
sternocerus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Lathrostiza sternocera Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1152 n. 1, ♀ ♂.

IDECHTHIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 154 n. 36.
ειδηχθής, deformis.
Species exstat.

ANEMPHERES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 154 n. 35.
ά-priv.; ἐμφερής, similis.
Species exstat.

---

1) *Lep.:* Eupithecia pygmaeata (Bridgman).

ECPHOROPSIS

Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 368.
Ecphora, nom. propr. Hymen.; ὄψ, visus.

Synon.: Ecphora Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 154 n. 34
ἐκφορά, elatio. [nec Conrad 1843].
Campoplex Gravenhorst, Holmgren.
Limneria Holmgren, Bridgman.
Porizon Zetterstedt.

fuscipes (Holmgr.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Campoplex fuscipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 16 n. 22, ♂.
Limneria fuscipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 66 n. 22, ♀ ♂.
Ecphora fuscipes Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1124 n. 2, ♀ ♂.
Ecphoropsis fuscipes m.

viennensis (Grav.) D. T.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Campoplex Viennensis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 478 n. 14, ♀ ♂.
Porizon annulator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 394 n. 2, ♀ [excl. ♂].
Limneria Viennensis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 57 n. 7, ♀.
Limneria Viennensis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 106 n. 73.
Ecphora Viennensis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1124 n. 1, ♀ ♂.
Ecphoropsis Viennensis m.

OMOBORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 154 n. 33.
ὠμός, crudus; βορός, vorax.

kincaidii Davis — ♂ — Am.: Washington.
Omoborus Kincaidi Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 363, ♂.

SINOPHORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 153 n. 32.
συνοφρύομαι, supercilia contraho.

canarsiae Ashm.[2] — ♀ — Am.: Illinois.
Limneria (Sinophorus) canarsiae Ashmead, Proc. Entom. Soc. Washington IV. P. 2. 1897 [p. 126, ♀; Fig. 5.

DIADEGMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 153 n. 31.
δια-δείκνυμι, ostendo.
Species exstat.

PYRACMON

Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 326 n. 15.
Nom. propr. mythol.

Synon.: Pyrachmon Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 363.
Campoplex Gravenhorst.
Limneria Provancher.
Porizon Zetterstedt.

aldrichii Davis — ♀ ♂ — Am.: Idaho.
Pyrachmon Aldrichii Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 363, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Sericoris littorana (Bignell). [2]) *Lep.:* Canarsia Hammondi (Ashmead).

austriacus Tschek — ♀ — Eur.: Austria.
Pyracmon Austriacus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 62, ♀.
bucculentus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria bucculenta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 63 n. 18, ♀.
Pyracmon bucculentus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1110 n. 8, ♀ ♂.
fulvipes Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pyracmon fulvipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 102 n. 3, ♂.
Pyracmon fulvipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 174, ♂.
Pyracman fulvipes Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1109 n. 1, ♀ ♂.
fumipennis (Zett.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia, Austria.
Porizon fumipennis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 395 n. 6, ♀.
Pyracmon fumipennis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 101 n. 1, ♀.
Pyracmon melanurus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 102 [n. 4, ♂ [excl. ♀].
Pyracmon fumipennis Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 326 n. 15.
Pyracmon fumipennis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1109 n. 2, ♀ ♂.
idahoensis Davis — ♀ — Am.: Idaho.
Pyrachmon Idahoensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 363, ♀.
lateralis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Pyracmon lateralis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1109 n. 4, ♀.
macrocephalus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Limneria macrocephala Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 149.
Pyracmon macrocephalum Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 182 n. 1, ♀ ♂; Fig. 9 c, d.
Pyracmon macrocephalum Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 374 n. 1, ♀ ♂; [Fig. 44 c, d.
melanurus Holmgr. — ♀ (♂) — Eur.: Suecia, Germania.
? Campoplex megacephalus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 502 n. 31, ♀ ♂.
Pyracmon melanurus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 102 [n. 4, ♀ [excl. ♂].
Pyracmon melanurus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1110 n. 7, ♀ [excl. ♂].
obscuripes Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Austria.
Pyracmon obscuripes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 102 n. 2, ♀.
Pyracmon obscuripes Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 110 n. 6. ♀.
pectoralis Kriechb.[1] — ♂ — Eur.: Austria.
Pyracmon pectoralis Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 484, ♂.
rufipes Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria.
? Pyracmon fulvipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 102 n. 3, ♂.
Pyracmon (Rhimphoctona?) rufipes Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 63, ♀.
truncicola Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Pyracmon truncicola Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1109 n. 3, ♀.
vancouverensis Harrgt. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Pyracmon Vancouverensis Harrington, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 246, ♀.
xoridiformis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pyracmon xoridiformis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 103 n. 5, [♀ ♂.
Pyracmon xoridiformis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 174, ♀ ♂.
Pyracmon xoridiformis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1119 n. 5, ♀ ♂.

RHIMPHOCTONA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 153 n. 29.
ῥίμφα, statim; κτείνω, inficio.
Species exstat.

---

[1] *Col.:* Anthaxia quadripunctata (Kriechbaumer).

OLESICAMPE

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 153 n. 28.
ὄλλυμι — ὤλεσα, perdo; καμπή eruca.

Synon.: Olesicampa Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1139.
Campoplex Gravenhorst, Ratzeburg, Holmgren.
Ichneumon Gmelin, Müller.
Limneria Holmgren, Bridgman & Fitch, Brischke.

alboplica Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia.
Olesicampa alboplica Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1141 n. 7, ♀ ♂.

auctor (Grav.) Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Campoplex auctor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 566 n. 79, ♀ ♂. [var.
Limneria auctor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 95 n. 72, ♀ ♂
Limneria auctor Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 207 n. 12.
Olesicampa auctor Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1140 n. 1, ♀ ♂.

basalis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Olesicampa basalis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1143 n. 11, ♀.

binotata Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Olesicampa binotata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1141 n. 5, ♀.

cavigena Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Olesicampa cavigena Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1140 n. 3, ♀ ♂.

crassitarsis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Olesicampa crassitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1146 n. 21, ♀ ♂.

femorella Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Olesicampa femorella Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1144 n. 17, ♀ ♂.

flavicornis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Olesicampa flavicornis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1143 n. 13, ♀ ♂.

fulcrans Thoms. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Olesicampa fulcrans Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1145 n. 19, ♀ ♂.

fulviventris (Gmel.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Gallia.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 65 n. 264.
Ichneumon fulviventris Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2704 n. 319.
Campoplex fulviventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 540 n. 62, ♀ ♂.
Campoplex fulviventris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 19 n. 28, ♀ ♂.
Limneria fulviventris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 86 n. 58, [♀ ♂ var.
Limneria fulviventris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 165, ♂.
Limneria fulviventris Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 206 n. 35.
Olesicampa fulviventris Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1140 n. 4, ♀ ♂.

var. **audax** (Holmgr.) D. T. — ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria audax Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 86.
Olesicampa fulviventris var. audax m.

geniculella Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Olesicampa geniculella Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1144 n. 15, ♀.

gracilipes Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Olesicampa gracilipes Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1143 n. 14, ♀ ♂.

longipes (Müll.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon longipes O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 159 n. 1847.

---

[1] *Lep.:* Hadena suffuruncula (Brischke).
[2] *Hymen.;* Nematus perspicillaris (Brischke).

Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 64 n. 252.
Ichneumon canescens Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2703 n. 308.
Campoplex longipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 546 n. 65, ♀ ♂.
Ichneumon (Campoplex) argentatus Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 26 n. 11; T.7 F.3.
Campoplex argentatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 96 n. 14, ♀ [non Grav.].
Campoplex argentatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 83 n. 18, ♂.
Campoplex argentatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 87 n. 25.
Campoplex fulviventris var. 1 Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. 1854 p. 19.
Limneria longipes Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 326 n. 1.
Limneria longipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 85 n. 56, ♀ ♂.
Limneria longipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 165, ♀.
Limneria longipes Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 205 n. 45.
Olesicampa longipes Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1142 n. 9, ♀ ♂.

luteipes Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Olesicampa luteipes Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1147 n. 25, ♀ ♂.

nigricoxa Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Olesicampa nigricoxa Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1145 n. 18, ♀ ♂.

nigroplica Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Olesicampa nigroplica Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1143 n. 12, ♀ ♂.

pagana (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Britannia. [var.
Limneria pagana Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 86 n. 59, ♀ ♂
Limneria pagana Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 206.
Olesicampa pagana Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1142 n. 10, ♀.

patellana Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Olesicampa patellana Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1140 n. 2, ♀ ♂.

praecox (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria praecox Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 85 n. 57, ♀.
Olesicampa praecox Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1142 n. 8, ♀ ♂.

punctitarsis Thoms. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Olesicampa punctitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1146 n. 23, ♀.

radiella Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Littorale.
Olesicampa radiella Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1885 p. 1147 n. 26, ♀ ♂.
Olesicampa radiella Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1895 p. 40, ♀.

retusa Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Olesicampa retusa Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1144 n. 16, ♀ ♂.

sericea (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Campoplex sericeus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 15 n. 20, ♀.
Limneria sericea Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 89 n. 61, ♀ ♂.
Limneria sericea Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107 n. 65, ♀ ♂.
Olesicampa sericea Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1141 n. 6, ♀ ♂.

simplex Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Olesicampa simplex Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1147 n. 24, ♀ ♂.

sternella Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Olesicampa sternella Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1146 n. 22, ♀ ♂.

subcallosa Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Olesicampa subcallosa Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1146 n. 20, ♀ ♂.

tricincta (Grav.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex tricinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 530 n. 53, ♂.

---

[1] *Lep.:* Ebulea stachydalis (Barrett).

Limneria tricincta Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 165, ♂.
Limneria tricincta Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 205.
Olesicampa tricincta Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1172.

NYTHOBIA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 153 n. 27.
βιόω, vivo.
Species exstat.

ERIBORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 153 n. 26.
ἔρι, valde; *βορός*, vorax.
Species exstat.

DIOCTES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 153 n. 25.
Etymol. obscura.
Species exstat.

PHAEDROCTONUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 153 n. 24.
φαιδρός, nitidus; *κτείνω*, interficio.
Species exstat.

DIORATICA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 153 n. 23.
διορατικός, perspicax.
Species exstat.

GONOTYPUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 153 n. 22.
γονός, soboles; *τύπος*, forma.

Synon.: Gonotypa Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1136.

melanostomus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Gonotypa melanostoma Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1137 n. 1, ♀ ♂.

ZAPORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 152 n. 21.
ζα-valde; *πόρος*, transitus.
Species exstat.

NEPIESTA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 152 n. 20.
νηπιόεις, infans.

Synon.: Campoplex Gravenhorst.
Limneria Holmgren, Marshall, Brischke, Bridgman & Fitch.

aberrans (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Campoplex anomalus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 490 n. 22, ♀.
Campoplex aberrans Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 496 n. 27, ♂.
? Campoplex perfidus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 595 n. 96, ♀.
Limneria mandibularis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 97 n. 76, [♀ ♂.
Limneria aberrans Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 55 n. 1.
Limneria (Eriborus?) aberrans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 [p. 172, ♀ ♂.
Limneria aberrans Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 104 & 105 n. 1.
Nepiesta aberrans Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1116 n. 1, ♀ ♂.
Limneria anomala Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. IX. 1890 p. 140.
marginella Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia, Gallia, Germania.
Nepiesta marginella Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1117 n. 3, ♀.
subclavata Thoms. — ♀ ♂ — Eur. mer.
Nepiesta subclavata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1116 n. 2, ♀ ♂.

ERIPTERNUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 152 n. 19.
ἐρι, valde; πτερνίον, pernio.
Species exstat.

PODOGASTER

Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 179.
πούς, pes; γαστήρ, venter.

coarctata Brullé — ♀ — Am.: Guyana.
Podogaster coarctatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 179 n. 1, ♀; T. 42 F. 6.
radiolata Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Podogaster radiolatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 329.
Podogaster radiolatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 183.
Podogaster radiolatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 375, ♀.
striata Cam. — Am.: Brasilia.
Podogaster striatus Cameron, Proc. Manchester Philos. Soc. XXVI. 1888 p. 131.
sulcata Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Podogaster sulcatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 90, ♀.

HYPOSOTER

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 152 n. 17.
ὑπό, subtus; σωτήρ, servator.
Species exstat.

ALCIMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 152 n. 16.
ἄλκιμος, fortis, strenuus.
Species exstat.

HOROGENES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 152 n. 15.
ὅρος, terminus; γίγνομαι, nascere.
Species exstat.

CAMPOTREPHUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 152 n. 14.
κάμπος, balaena; τρέφω, alo.
Species exstat.

CASINARIA

Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 325 n. 12.
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 48.
Casina.

Synon.: Campoplex Gravenhorst, Holmgren.
Limneria Marshall, Bridgman & Fitch.

affinis Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austr. inf.
Casinaria (Horogenes?) affinis Tschek, Verh. zool. Ges. Wien XXI. 1871 p. 56 n. 6, ♀ ♂.
albipalpis (Grav.) Tschek — ♀ ♂ — Eur.
Campoplex albipalpis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 495 n. 26, ♀ ♂.
Casinaria (Horogenes?) albipalpis Tschek, Verh. zool. Ges. Wien XXI. 1871 p. 55 n. 4, ♀ ♂.
Limneria albipalpis Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 55 n. 3.
Limneria albipalpis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107 n. 3, ♀ ♂.
Casinaria albipalpis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1102 n. 14, ♀.
alboscutellaris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Casinaria alboscutellaris Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1098 n. 1, ♀ ♂.
alpina Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Tirolia.
Casinaria alpina Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1100 n. 7, ♀ ♂.
americana Ashm. — ♀ — Am.: Colorado.
Casinaria Americana Ashmead, Bull. Colorado Biol. Assoc. I. 1890 p. 22, ♀.
carinata Kriechb. — ♂ — Eur.: Hispania.
Casinaria carinata Kriechbaumer, Act. soc. Españ. hist. nat. XXVII. 1898 p. 172, ♂.
claviventris Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Campoplex declinans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 17 n. 25 [p. p.].
Casinaria claviventris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 49 n. 3, [♀ ♂.
Casinaria claviventris Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1099 n. 4, ♀ ♂.
compacta Davis — ♀ — Am.: Colorado.
Casinaria compacta Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 362, ♀.
dubia Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria ins.
Casinaria dubia Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 57 n. 8, ♀ ♂.
ischnogastra Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Campoplex tenuiventris var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 482 n. 17, ♀ ♂.
Campoplex tenuiventris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 10 n. 7, ♀ [non [Gravenhorst].
Casinaria tenuiventris Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 325 n. 12.
Casinaria tenuiventris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 49 n. 4, ♂.
Casinaria ischnogaster Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1101 n. 12, ♀ ♂.
maesta (Grav.) Woldst.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Campoplex moestus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 599 n. 100, ♂.
Limneria moesta Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 57 n. 49.
Casinaria moesta Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 391 n. 1, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Scodiona belgiaria (Bridgman).
[2]) *Lep.:* Hybernia progemmaria, H. defoliaria (Bignell).

Limneria moesta Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 158, ♂.
Limneria moesta Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 207 n. 49.
Casinaria moesta Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1100 n. 8, ♀ ♂.

magrettii Magr. — ♂ — Afr. orient.
Casinaria Magrettii Kriechbaumer, Magretti: Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 529 n. 7, ♂.
Casinaria Magrettii Magretti, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1884 p. 243.

mesozosta (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Campoplex mesozostus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 532 n. 55, ♂.
Campoplex fallax Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 10 n. 8, ♂.
Casinaria mesozosta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 50 n. 6, ♂.
Casinaria mesozosta Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 57 n. 7, ♀ ♂.
Casinaria mesozosta Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 103 n. 2, ♀ ♂.
Casinaria ischnogaster var. mesozosta Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1102.

monticola Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Pyrenaei montes.
Casinaria monticola Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1100 n. 6, ♀ ♂.

morionella Holmgr.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Casinaria morionella Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 48 n. 2, ♀ ♂.
Casinaria morionella Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 147, ♀ ♂.
Casinaria morionella Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1099 n. 3, ♀ ♂.

nigripes (Grav.) Thoms.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex nigripes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 598 n. 99, ♂.
Campoplex nigripes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 140, ♀ ♂.
Casinaria nigripes Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1102 n. 15, ♀ ♂.

orbitalis (Grav.) Holmgr.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Austria.
Campoplex orbitalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 510 n. 39, ♀.
Casinaria orbitalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 48 n. 1, ♀ ♂.
Casinaria orbitalis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 54 n. 1. [♀ ♂.
Casinaria (Alcima?) orbitalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 147,
Casinaria orbitalis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 103 n. 1, ♀ ♂.
Casinaria orbitalis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1098 n. 2, ♀ ♂.

pallidipes Brischke[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Casinaria pallipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 148, ♀ ♂.

parvula Kriechb. — ♀ — Eur.: Mallorca.
Casinaria parvula Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 253 n. 33, ♀.

protensa Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Casinaria protensa Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1102 n. 13, ♀ ♂.

punctiventris Woldst. — ♀ — Eur.: Germania.
Casinaria punctiventris Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 392 n. 2, ♀.

rufimana (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Campoplex rufimanus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 597 n. 98, ♀ ♂.
Limneria rufimana Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 58 n. 61.
Limneria rufimana Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 207 n. 61.
Casinaria rufimanus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1101 n. 10, ♀ ♂.

scabra Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Casinaria scabra Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1099 n. 5, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Eupithecia absynthiaria, Acidalia triliniaria Cidaria sinuaria (Brischke), Eupithecia expallidata (Bridgman).

[2]) *Lep.:* Orgyia antiqua (Brischke).

[3]) *Lep.:* Deilephila galii, Cidaria sinuaria (Brischke).

[4]) *Lep.:* Nemorea aestivaria (Brischke).

scutellaris Tschek — ♀ — Eur.: Austria inf.
Casinaria scutellaris Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 58 n. 10, ♀.

senicula (Grav.) Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Campoplex seniculus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 473 n. 11, ♂.
Limneria seniculus Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 58 n. 64.
Casinaria (Horogenes?) senicula Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N.F. IV. P. 4. 1880 [p. 147, ♀.

stygia Tschek — ♀ — Eur.: Austra inf.
Casinaria stygia Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 54 n. 2, ♀.

subglabra Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Littorale.
Casinaria subglabra Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1101 n. 9, ♀ ♂.

tenuiventris (Grav.) Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex tenuiventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 482 n. 17, ♀ ♂.
Campoplex canonicus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 95 n. 9, ♂.
Casinaria latifrons Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 50 n. 5, ♀ ♂.
Casinaria (Horogenes?) tenuiventris Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 55 n. 3.
Casinaria tenuiventris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 147, ♀ ♂.
Casinaria tenuiventris Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 103 n. 4, ♀ ♂.
Casinaria tenuiventris Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1101 n. 11, ♀ ♂.

texana Ashm. — ♀ — Am.: Texas.
Casinaria Texana Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 427, ♀.

varians Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Austria.
Casinaria (Horogenes?) varians Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 55 n. 5, ♀ ♂.
Casinaria varians Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 147, ♀ ♂.

vidua (Grav.) Holmgr.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex viduus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 497 n. 28, ♂.
Casinaria vidua Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 51 n. 8, ♀.
Casinaria vidua Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 58 n. 9, ♀.
Campoplex viduus Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 84 n. 40, ♀.
Casinaria vidua Bignell, Entomologist XIII. 1880 p. 246.
Casinaria vidua Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII 1885 p. 103 n. 3, ♀ ♂.
Campoplex viduus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1089 n. 68, ♀ ♂.
Limneria vidua Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. 1890 p. 66, ♂.

TRATHALA

Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 122.

Etymol. obscura.

striata Cam. — ♀ — As.: India.
Trathala striata Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 122, ♀.

RHYTHMONOTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 151 n. 12.

ῥυθμός, rhythmus; νῶτος, dorsum.

Species exstat.

---

1) *Lep.:* Pieris rapae (Rosenbaum ap. Howard), Ocneria dispar (Ratzeburg), Hemithea thymiaria, Hybernia progemmaria (Bignell).

2) *Lep.:* Abraxas grossulariata (Bignell).

ANGITIA

Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 327 n. 16.
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 106.

Nom. propr. mythol.

Synon.: Campoplex Gravenhorst, Holmgren.
Ichneumon Gmelin.
Limneria Bridgman.
Meloboris Holmgren.

aculeata Bridgm.[1]) — ♀ — Eur.: Britannia.
Limneria (Angitia) aculeata Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 428, ♀.

albonotata Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Limneria (Angitia) albonotata Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 427, ♀ ♂.

alternans (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Gallia.
Campoplex alternans Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 537 n. 59, ♀.
? Campoplex alternans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 19 n. 29, ♂.
Limneria alternans Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 55 n 5.
Meloboris alternans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 174, ♀.
Limneria alternans Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 205 n. 5.
Angitia alternans Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1167 n. 51, ♀ ♂.

americana Harrgt. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Angitia Americana Harrington, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 246, ♀.

annulicrus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Angitia annulicrus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1155 n. 3, ♀ ♂.

annulipes Bridgm.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Limneria (Angitia) annulipes Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 424, ♀ ♂.

anura Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Bavaria.
Angitia anura Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1164 n. 40, ♀ ♂.

apostata (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Campoplex apostata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 510 n. 38, ♀.
Limneria apostata Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 55 n. 8.
Limneria apostata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 105 n. 8, ♀.
Angitia apostata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1161 n. 25, ♀ ♂.

areolaris (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Limneria areolaris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 59 n. 10, ♀.
Angitia areolata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1160 n. 24, ♀ ♂ [error.].

armillata (Grav.) Thoms.[3]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Campoplex armillatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 514 n. 42, ♂.
Campoplex chrysostictus var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 524, ♀ ♂.
Campoplex armillatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 95 n. 10, ♀ ♂.
Campoplex armillatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 85 n. 19.
Limneria armillata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 61 n. 14, ♀ ♂.
Limneria armillata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 152, ♀ ♂.
Limneria armillata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 108 n. 10.
Angitia armillata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1158 n. 17, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Lycaena alsus (Bridgman).
2) *Lep.:* Bucculatrix cidariella (Bridgman).
3) *Lep.:* Yponomeuta malinellus, Tortrix spec. (Brischke).

brevivalvis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Angitia brevivalvis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1163 n. 34, ♀.

cerophaga (Grav.) Thoms.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Campoplex cerophagus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 470 n. 9, ♀ ♂.
Limneria majalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 60 n. 12, ♀.
Campoplex cerophagus Goureau, Ann. soc. entom. France (4) VIII. 1868 Bull. p. XVI.
Limneria cerophaga Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 55 n. 18.
Limneria cerophaga Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 106 n. 18.
Angitia cerophaga Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1158 n. 15, ♀ ♂.

chrysosticta (Gmel.) Thoms.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 71 n. 364.
Ichneumon chrysostictos Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2721 n. 407.
Campoplex chrysostictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 522 n. 49, ♀ ♂ [excl. var. 2].
Campoplex chrysostictus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 96 n. 11, ♀ ♂.
Campoplex chrysostictus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 83 n. 15.
Campoplex chrysostictus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 84 n. 20.
Campoplex chrysostictus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 14 n. 18, ♀.
Limneria chrysosticta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 60 n. 13, ♀ ♂.
Limneria chrysosticta Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 152, ♀ ♂.
Limneria chrysosticta Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 108 n. 19.
Angitia chrysosticta Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1157 n. 11, ♀ ♂.
Limneria chrysosticta Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 45, ♂.

claripennis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Angitia claripennis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1161 n. 27, ♀ ♂.

coleophorarum (Ratzbg.) Thoms.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Campoplex coleophorarum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 90 n. 43, ♀ ♂.
Angitia coleophorarum Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1155 n. 5, ♀ ♂.

combinata (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Limneria combinata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 62 n. 16, ♀ ♂.
Limneria combinata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 152, ♀ ♂.
Angitia combinata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1162 n. 31, ♀ ♂.
Limneria combinata ? Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VII. 1890 p. 66, ♀.

crassa Bridgm.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Limneria (Angitia) crassa Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 425, ♀ ♂.

crassiseta Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Angitia crassiseta Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1162 n. 30, ♀.

crataegella Thoms.[5]) — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Angitia crataegella Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1164 n. 38, ♀ ♂.

curvicauda (Holmgr.) Thoms.[6]) — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia, Germania, Helvetia.
Limneria curvicauda Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 74 n. 37, ♀ ♂.
Limneria curvicauda Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 164, ♀ ♂.
Limneria curvicauda Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107.
Angitia curvicauda Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1166 n. 46, ♀ ♂.
Limneria curvicauda Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 45, ♀.

---

1) *Hymen.*: Emphytus melanopygus (Goureau).
2) *Lep.*: Lithocolletis syringella (Ratzeburg).
3) *Hymen.*: Nematus gallicola (Ratzeburg).
4) *Lep.*: Bucculatrix cidariella (Bridgman).
5) *Lep.*: Tinea crataegella (Kriechbaumer).
6) *Hymen.*: Nematus gallicola (Bignell).

elishae (Bridgm.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Limneria Elishae Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1884 p. 426.
Limneria Elishae Bridgman, Entomologist XVIII. 1885 p. 104.
Angitia Elishae Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1165 n. 42, ♀ ♂.

elongata Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Angitia elongata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1155 n. 4, ♀.

exareolata (Ratzbg.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Campoplex exareolatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 89 n. 41, ♀.
Limneria exareolata Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 326 n. 3.
Limneria exareolata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 96 n. 74, ♀ ♂.
Limneria exareolata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 172, ♀ ♂.
Limneria exareolata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 104 n. 28, ♀ ♂.
Angitia exareolata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1163 n. 37, ♀ ♂.

fenestralis (Holmgr.) Thoms.[3] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Campoplex majalis var. 4 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 464, ♀.
Limneria fenestralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 59 n. 11, ♀ ♂.
Limneria fenestralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 150, ♂.
Limneria fenestralis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 108 n. 32.
Angitia fenestralis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1156 n. 10, ♀ ♂.

fitchii (Bridgm.) Thoms.[4] — ♀ — Eur.: Britannia.
Limneria Fitchii Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 157, ♀; T. 8 F. 13.
Limneria Fitchii Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 104.
Angitia Fitchii Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1163 n. 35, ♀.

glabricula Holmgr.[5] — ♀ ♂ — Eur.: (Britannia), Suecia, Germania.
Angitia glabricula Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 327 n. 16.
Angitia glabricula Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 106 n. 1, ♀ ♂.
Angitia glabricula Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 178, ♀.
Limneria ruficornis Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1884 p. 429, ♀.
Limneria ruficornis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 205.
? Angitia gracilis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1167 n. 52, ♀ ♂ [err.?].

holopyga Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Angitia holopyga Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1160 n. 22, ♀.

insectator (Schrk.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon insectator Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 370 n. 748, ♀.
Ichneumon insectator Villers, C. Linnaei Entom. IV. 1789 p. 184 n. 151.
Ichneumon insectator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2698 n. 177.
Ichneumon insectator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 223 n. 99.
Campoplex insectator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 481 n. 16, ♀.
Limneria insectator Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 57 n. 42.
Limneria insectator Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 106 n. 42.
Angitia insectator Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1154 n. 1, ♀ ♂.

insularis Ashm. — ♀ — Am.: St. Vincent.
Cremastus ? insularis Ashmead, Journ. Linn. Soc. Zool. XXV. 1894 p. 140, ♀.
Angitia insularis Ashmead, Proc. Zool. Soc. London 1895 p. 779.

---

[1] *Lep.:* Ornix scoticella?, Nepticula aucuparia? (Elisha).

[2] *Hymen.:* Trigonaspis megaptera (Brischke). — *Lep.:* Vanessa cardui (Bignell), Earias chlorana (Brischke).

[3] *Lep.:* Hydrellia grisola (Brischke), Botys verticalis (Bignell).

[4] *Lep.:* Nola albulalis (Bridgman).

[5] *Lep.:* Elachista cerasella (Fletcher).

interrupta (Holmgr.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Limneria interrupta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 62 n. 15, ♀ ♂.
Limneria interrupta Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 152, ♀ ♂.
Limneria interrupta Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107.
Angitia interrupta Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1162 n. 32, ♀ ♂.
lateralis (Grav.) Thoms. — ♀ — Eur.: Britannia, Suecia.
Campoplex lateralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 467 n. 6, ♀.
Limneria lateralis Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1829 p. 57 n. 44.
Limneria lateralis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 106 n. 44, ♀.
Angitia lateralis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1157 n. 13, ♀.
laticrus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Angitia laticrus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1163 n. 33, ♀.
latungula Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia.
Angitia latungula Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1165 n. 45, ♀ ♂.
macrostoma Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Angitia macrostoma Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1166 n. 48, ♀.
maculata (Grav.) Thoms. — ♀ — Eur.: Britannia, Dalmatia.
Campoplex maculatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 536 n. 58, ♀.
Limneria maculata Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 57 n. 46.
Limneria maculata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 205 n. 46.
Angitia maculata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1159 n. 19, ♀.
majalis (Grav.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia, Germania.
Campoplex majalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 462 n. 4, ♀ ♂.
Campoplex majalis Audouin, Hist. nat. Insect. nuis. 1842 p. 181, ♀; T. 18 F. 1.
Limneria majalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 150, ♀ ♂.
Limneria majalis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII 1885 p. 107 n. 47.
Angitia majalis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1161 n. 28, ♀ ♂.
melania Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Angitia melania Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1160 n. 23, ♀.
micrura Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia.
Angitia micrura Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1164 n. 39, ♀ ♂.
monilicornis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Angitia monilicornis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1167 n. 50, ♀ ♂.
monospila Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Angitia monospila Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1157 n. 12, ♀.
nana (Grav.) Thoms.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex nanus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 469 n. 8, ♀.
Campoplex nanus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 85 n. 18, ♂.
Limneria nana Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 57 n. 52.
Limneria nana Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 160, ♀ ♂.
Limneria nana Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 106 n. 52.
Angitia nana Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1164 n. 41, ♀ ♂.
parvicauda Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Angitia parvicauda Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1163 n. 36, ♀.
parvula (Grav.) Thoms. — ♀ — Eur.: Britannia, Suecia.
Campoplex parvulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 489 n. 21, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Scopula crataegella (Brischke).
[2]) *Hymen.:* Nematus spec. (Brischke), Cynips Kollari (Bignell). — *Lep.:* Plutella porrectella, Tortrix spec. (Brischke).
[3]) *Lep.:* Laverna fulvescens, Coleophora spec. (Brischke).

Limneria parvula Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 57 n. 58.
Limneria parvula Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107 n. 58, ♀.
Angitia parvula Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1155 n. 2, ♀.

polyzona Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Angitia polyzona Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1159 n. 18, ♀ ♂.

punctipes Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Angitia punctipes Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1166 n. 49, ♀.

pusio (Holmgr.) Thoms. — ♀ — Eur.: Britannia, Suecia.
Meloboris pusio Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 100 n. 2, ♀.
Angitia pusio Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1165 n. 43, ♀.

rimator Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Angitia rimator Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1156 n. 9, ♀.

rufata (Bridgm.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Limneria rufata Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1884 p. 429, ♀ ♂.
Limneria rufata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 206.
Angitia rufata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1165 n. 44, ♀ ♂.

rufipes (Grav.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Campoplex difformis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 458 [p. p.].
Campoplex rufipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 961 n. 3, ♀.
Porizon erucator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 394 n. 1, ♀ ♂.
Campoplex fumipennis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXX. 1854 p. 12 n. 12, ♀ ♂.
Limneria erucator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 58 n. 9, ♀ ♂.
Limneria rufipes Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 58 n. 62.
Limneria erucator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 149, ♀ ♂.
Limneria erucator Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 106 n. 27, ♀ ♂.
Limneria rufipes Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107 n. 62.
Angitia rufipes Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1161 n. 26, ♀ ♂.

sanguinicoxa Brauns — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Angitia sanguinicoxa Brauns, Termész. Füzet. XVIII. 1895 p. 49 n. 14, ♀ ♂.

scotiae Bridgm.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Limneria (Angitia) Scotiae Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 426, ♀ ♂.

sordipes Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Angitia sordipes Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1156 n. 8, ♀.

specularis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Angitia specularis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1162 n. 29, ♀.

subbuccata Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Angitia subbuccata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1156 n. 7, ♀ ♂.

tenuipes Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Angitia tenuipes Thomsen, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1158 n. 16, ♀.

tibialis (Grav.) Thoms.[4] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Campoplex tibialis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 468 n. 7, ♀.
Limneria tibialis Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 58 n. 67.
Limneria tibialis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 106 n. 67.
Angitia tibialis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1159 n. 20, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Chloreutes scintillulana (Fletcher).
2) *Hymen.:* Cladius albipes (Brischke). — *Lep.:* Eupithecia castigata (Bignell), Tortrix laevigana Hübner, Coleophora vibiciella (Rondani), Nothris verbascella (Brischke).
3) *Lep.:* Heydenia auromaculella (Bridgman).
4) *Lep.:* Caradrina lenta (Mocsáry).

trochanterata Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Angitia trochanterata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1157 n. 14, ♀ ♂.
truncata Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Angitia truncata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1155 n. 6, ♀ ♂.
vestigialis (Ratzbg.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Campoplex vestigialis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 88 n. 39, ♀ ♂.
Limneria vestigialis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 164, ♀ ♂.
Limneria vestigialis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 104.
Angitia vestigialis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1166 n. 47, ♀ ♂.
virginalis (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex virginalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 472 n. 10, ♀.
Limneria virginalis Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 150.
Limneria virginalis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 106.
Angitia virginalis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1160 n. 21, ♀ ♂.

SAGARITIS

Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 325 n. 11.
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 43.

Synon.: Campoplex Gravenhorst & auct.
Ichneumon Schrank.
Limneria Holmgren, Brischke.
Porizon Zetterstedt.

agilis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Sagaritis agilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 47 n. 7, ♀.
Sagaritis agilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 147, ♂.
Sagaritis agilis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1091 n. 2, ♀ ♂.
Sagaritis agilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 66, ♀ ♂.
annulata (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Campoplex annulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 493 n. 25, ♀.
Limneria annulata Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 55 n. 7.
Limneria annulata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 107 n. 7, ♀.
Sagaritis annulata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1094 n. 9, ♀ ♂.
var. **fuscicarpus** Kriechb. — ♂ — Eur.: Istria. [p. 40, ♂.
Sagaritis annulata var. fuscicarpus Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1895
balearica Kriechb. — ♂ — Eur.: Mallorca.
Sagaritis Balearica Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 250 n. 27, ♂.
brachycera Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Sagaritis brachycera Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1091 n. 1, ♀ ♂.
californica Holmgr. — ♂ — Am.: California.
Sagaritis Californica Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 418 n. 57, ♂.
cognata Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria, Germania.
Sagaritis cognata Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 46 n. 2, ♀ ♂.
Sagaritis cognata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 147, ♀.
congesta Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Austria.
Sagaritis congesta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 44 n. 3, ♂.
Sagaritis congesta Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 47 n. 3, ♂.
Sagaritis congesta Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1091 n. 3, ♀ ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Nematus Vallisnierii, Phyllotoma microcephala. — *Lep.:* Tortrix laevigana, Retinia resinana (Brischke).

crassicornis Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Austria.
Sagaritis crassicornis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 51 n. 9, ♀ ♂.
Sagaritis crassicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 147, ♀ ♂.
declinator (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Lapponia, Suecia, Germania.
Campoplex declinator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 589 n. 92, ♀ ♂.
Porizon mediator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 395 n. 3, ♀ ♂.
Campoplex declinator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 17 n. 25, ♂.
Sagaritis declinator Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 325 n. 11.
Sagaritis declinator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 43 n. 1, ♀ ♂.
Sagaritis declinator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 146, ♂.
Sagaritis declinator Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 101 n. 1, ♀ ♂.
Sagaritis declinator Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1092 n. 4, ♀ ♂.
dorsalis Kriechb. — ♀ — Eur.: Mallorca.
Sagaritis? dorsalis Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXII. 1894 p. 251 n. 30, ♀.
ebenina (Grav.) Tschek[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex ebeninus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 480 n. 15, ♀ ♂ [excl. var.].
Campoplex ebeninus Ratzeburg. Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 93.
Campoplex ebeninus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 84 n. 8.
Campoplex ebeninus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 12 n. 13, ♀ ♂.
Campoplex ebeninus Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 378 n. 65.
Sagaritis ebeninus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 52 n. 10, ♀ ♂.
? Limneria ebenina Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 153, ♀.
Campoplex ebeninus Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1886 p. 15 n. 7, ♀ ♂.
erythropus Thoms. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Sagaritis raptor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 44 n. 2, ♀ ♂ [p. p.].
Sagaritis erythropus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1093 n. 8, ♀ ♂.
fasciata Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Sagaritis fasciata Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1887 p. 366, ♀ ♂.
femoralis (Grav.) Marsh.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Campoplex femoralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 592 n. 94, ♀.
Sagaritis laticollis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 46 n. 5, ♀ ♂.
Sagaritis laticollis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 51 n. 8, ♀ ♂.
Limneria femoralis Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 56 n. 31
Sagaritis laticollis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 101, ♀ ♂.
Limneria femoralis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 207 n. 31, ♀ ♂.
Sagaritis femoralis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1092 n. 5, ♀ ♂.
Sagaritis laticollis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 45, ♂.
holmgrenii Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria.
Sagaritis Holmgreni Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 50 n. 7, ♀ ♂.
incisa Bridgm.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Sagaritis incisa Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 165, ♀ ♂.
Sagaritis incisa Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 101, ♀ ♂.
Sagaritis incisa Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 421.
latrator (Schrk.) Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania, Austria.
Ichneumon latrator Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 306 n. 2142, ♂.
Campoplex latrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 586 n. 90, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Orgyia fascelina (Holmgren), Hyponomeuta evonymella (Ratzeburg).
2) *Lep.:* Depressaria nervosella (Bignell), Noctua gamma (Kriechbaumer).
3) *Lep.:* Eupithecia campanulata (Bridgman).

Sagaritis mitis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 46 n. 6, ♀ ♂.
Sagaritis latrator Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 48 n. 5, ♀ ♂.
Sagaritis latrator Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 101 n. 2, ♀ ♂.
Sagaritis latrator Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1094 n. 11, ♀ ♂.

macroura Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Sagaritis macroura Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1093 n. 7, ♀ ♂.

maculipes Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria.
Sagaritis maculipes Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 49 n. 6, ♀ ♂.

moraguesii Kriechb. — ♀ — Eur.: Mallorca.
Sagaritis? Moraguesi Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 452 n. 31, ♀.

mucronella Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Sagaritis mucronella Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1095 n. 13, ♀.

periscelis Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Mallorca.
Sagaritis periscelis Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 250 n. 28, ♀ ♂.

postica Bridgm. & Fitch — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Sagaritis postica Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 101, ♀ ♂.
Sagaritis postica Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 350, ♀ ♂.

punctata Bridgm.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Sagaritis punctata Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 349, ♀ ♂.

raptor (Zett.) Holmgr.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Lapponia, Suecia, Germania, Austria.
Porizon raptor Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 395 n. 4, ♀.
Sagaritis raptor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 44. n. 2, ♀ ♂.
Sagaritis raptor Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 46 n. 1, ♀.
Sagaritis raptor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 146, ♀ ♂.
Sagaritis raptor Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 101, ♀ ♂.
Sagaritis raptor Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1093 n. 6, ♀ ♂.

trochanterata Kriechb. — ♀ — Eur.: Mallorca.
Sagaritis trochanterata Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 251 n. 29, ♀.

varians Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Sagaritis varians Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1887 p. 1095 n. 12, ♀ ♂.

ventralis Walk. — ♀ — As.: Japonia.
Sagaritis ventralis Walker, Cistula entom. I. P. 11. 1874 p. 307 n. 15, ♀.

zonata (Grav.) Holmgr.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex zonatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 584 n. 89, ♀ ♂.
Sagaritis zonata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 45 n. 4, ♀ ♂.
Sagaritis zonata Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 47 n. 4, ♀.
Sagaritis zonata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 146, ♀ ♂.
Sagaritis zonata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 101 n. 2, ♀ ♂.
Sagaritis zonata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1094 n. 10, ♀ ♂.

OLETHRODOTIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 151 n. 10.
ὄλεθρος, pernicies; *δοτύς*, donum.

Species exstat.

---

1) *Lep.:* Plusia orichalcea (Cross).
2) *Lep.:* Orgyia antiqua (Brischke), Eupithecia sobrinata, E. campanulata (Brischke).
3) *Lep.:* Hecatera serena (Bignell).

CYMODUSA

Holmgren, Öfvers. Svens. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 325 n. 10.
κῦμα, unda; δύνω, submergo.

Synon.: Campoplex Gravenhorst.
Porizon Zetterstedt.

antennator Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [♀♂.
Cymodusa antennator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 41 n. 4.
Cymodusa antennator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 144, ♀,
Cymodusa antennator Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1097 n. 5, ♀ ♂.

cruentata (Grav.) Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia, Germania.
Campoplex cruentatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 575 n. 84, ♀.
Porizon marginellus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 395 n. 5, ♀.
Cymodusa cruentata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 40 n. 2, ♀ ♂.
Cymodusa cruentata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 144, ♀.
Cymodusa cruentata Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 101 n. 2, ♀ ♂.
Cymodusa cruentata Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1096 n. 1, ♀ ♂.

elachistae Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cymodusa elachistae Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 145, ♀ ♂.

exilis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Cymodusa exilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 41 n. 3, ♀ ♂.
Cymodusa exilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 144, ♀.
Cymodusa exilis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1097 n. 4, ♀ ♂.

flavipes Brischke — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Cymodusa flavipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 144, ♂.
Cymodusa flavipes Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 100, ♂.

leucocera Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Cymodusa leucocera Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 325 n. 10.
Cymodusa leucocera Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 40 n. 1, ♀ ♂.
Cymodusa leucocera Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 144, ♀ ♂.
Cymodusa leucocera Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 101 n. 1, ♀ ♂.
Cymodusa leucocera Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1867 p. 1096 n. 2, ♀ ♂.

longicalcar Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cymodusa longicalcar Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1096 n. 3, ♀ ♂.

petulans Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Cymodusa petulans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 42 n. 5, ♀ ♂.
Cymodusa petulans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 144, ♀.
Cymodusa petulans Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1097 n. 6, ♀ ♂.

SYMPLECIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 151 n. 8.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 118.
συμπλεκής, conjunctus.

alpicola Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Helvetia.
Symplecis alpicola Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 119 n. 1, ♂.
Symplecis alpicola Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1287 n. 2, ♀.

basalis Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Symplecis basalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 146, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Anisopteryx aescularia (Bignell).

facialis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Symplecis facialis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1286 n. 1, ♀ ♂.
xanthostoma Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Symplecis xanthostoma Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 119 n. 2, ♂.
Symplecis zonaria Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXVIII. 1871 p. 120 n. 3, ♂.
Symplecis zonaria Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1287 n. 3, ♀ ♂.

THYMARIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 151 n. 7.
Nom. propr.

Synon.: Thymarus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 907.

collaris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Thymarus collaris Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 909 n. 1, ♀ ♂.
compressus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Thymarus compressus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 909 n. 2, ♀ ♂.
fasciatus Bridgm. — ♂ — Eur.: Britannia.
Thymaris fasciatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 100, ♂.
Thymaris fasciatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 348, ♂.
pulchricornis Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Thymaris pulchricornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 145, ♀ ♂.

AMORPHOTA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 151 n. 6.
ἀμόρφωτος, non formatus.

orgyiae How.[1]) — ♀ ♂ — Am.: Columbia.
Amorphota orgyiae Howard, Bull. Dep. Agric. Entom. Techn. V. 1897 p. 20 & 53, ♀ ♂.

HYMENOBOSMINA m.

ὑμήν, membrana; Bosmina, nom. propr. Hymen.

Synon.: Bosmina Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 120 [nec Baird 1845].
Nomen mythol.

spinipes (Cam.) D. T. — ♀ — As.: India.
Bosmina spinipes Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 121, ♀.
Hymenobosmina spinipes m.

ZACHRESTA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 151 n. 5.
ζαχρηής, vehementer desiderans.

dimidiata Ashm. — ♀ — Am.: Missouri.
Zachresta dimidiata Ashmead, Insect Life VII. 1894 p. 243, ♀.
insignis Woldst. — ♀ — Eur.: Russia.
Zachresta insignis Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXIII. 1877 p. 436 n. 1, ♀.
obesa Davis — ♀ — Am.: Michigan.
Zachresta obesa Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 361, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Orgyia leucostigma (Howard).

ECHTHRONOMAS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 151 n. 4.
ἔχθρω, odi; νομάς, in pascuis degens.
Species exstat.

LEPTOBATIDES

Buysson, André: Hymén. Europ. P. 54. 1896 VI. p. 678 nota.
Leptobatus, nom. propr. Hymen.; εἶδος, forma.

abeillei Buyss. — ♀ ♂ — As.: Syria.
Leptobatides Abeillei Buysson, André: Hymén. Europ. P. 54. 1896 VI. p. 678 nota, ♀ ♂.

CAMPOPLEX

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 453 n. 1.
κάμπη, eruca; πλήσσω, caedo.

Synon.: Foenus Blanchard.
Ichneumon Linné & auct. ant.
Limneria Holmgren.
Ophion Fabricius.

adjunctus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex adjunctus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 815 n. 31, ♀.
Campoplex adjunctus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1066 n. 22, ♀ ♂.
adustus Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex adustus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 588 n. 91, ♂.
affinis Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex affinis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 140, ♀ ♂.
albimanus Walk. — ♂ — As.: Japonia.
Campoplex albimanus Walker, Cistula entom. I. P. 11. 1874 p. 306 n. 14, ♂.
albitarsis Rdw. — Eur.
Campoplex albitarsis Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 246 n. 25.
alius Nort. — ♀ — Am.: Canada, Massachusetts.
Campoplex alius Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 367 n. 36, ♀.
Campoplex alius Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 150b n. 7, ♀.
Campoplex alius Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 364 n. 7.
alticola Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Campoplex alticola Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 564 n. 77, ♀.
Limneria alticola Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 55 n. 6.
Limneria alticola Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 206 n. 6.
Campoplex alticola Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1071 n. 49, ♀ ♂.
Campoplex alticola Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 66, ♀.
analis Grav. — ♀ — Eur.
Campoplex analis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 583 n. 88, ♀.
anceps Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Campoplex pugillator var. anceps Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) [p. 35 n. 3, ♀.
Campoplex disparilis Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 790 n. 11, ♂.
Campoplex auriculatus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 840 n. 49, ♀.
Campoplex anceps Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 42 n. 15, ♀ ♂.
Campoplex anceps Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 140, ♀ ♂.

---

[1] *Lep.:* Eupithecia actaeata (Brischke).

Campoplex anceps Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 16, ♀ ♂.
Campoplex auriculatus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1071 n. 31, ♀ ♂.

angustatus Thoms.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Campoplex oxyacanthae Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 60 n. 25 [p. p.].
Campoplex angustatus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1061 n. 10, ♀ ♂.

angustifrons Förat. — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex angustifrons Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 846 n. 54, ♀.
Campoplex angustifrons Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1084 n. 56, ♀.

annexus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex annexus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 780 n. 4, ♂ [excl. ♀].
Campoplex annexus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1088 n. 66, ♂.

antennator Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Campoplex antennator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 13 n. 15, ♂.

anxius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex anxius Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 869 n. 72, ♂.

apicalis Brullé — ♀ — Am.: Guyana.
Campoplex apicalis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 161 n. 5, ♀.

arcticus Curt. — Am. bor.
Campoplex arcticus Curtis, Descr. Insects Cpt. Ross 2d Voy. 1831 App. p. 287 n. 5.

areolator Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Fennia, Germania.
Campoplex areolator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 8 n. 3, ♂ [p. p.].
Campoplex stragifex Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 811 n. 28, ♀ ♂.
Campoplex stragifex Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 31 n. 8, ♀ ♂.
Campoplex stragifex Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1066 n. 21, ♀ ♂.

areolatus Brauns — ♀ — Eur.: Hungaria.
Campoplex areolatus Brauns, Termész. Füzet. XVIII. 1895 p. 48 n. 13, ♀.

argenteus Nort. — ♀ — Am.: Canada, New York.
Campoplex argenteus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 365 n. 30, ♀.
Campoplex argenteus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 83 n. 10, ♀.

assitus Nort. — ♀ — Am.: Connecticut.
Campoplex assitus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 367 n. 34, ♀.

ater Brullé — ♂ — Am.: Chile.
Campoplex ater Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 162 n. 6, ♂.

atriceps Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Campoplex atriceps Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 42, ♀.

aurifer Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Campoplex aurifer Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 383 n. 4, ♀ ♂.

auritus Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Campoplex auritus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXVII. 1883 [p. 108, ♂.

aversus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex aversus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 800 n. 19, ♀.
Campoplex Tscheki Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 54 n. 21, ♀ ♂.
Campoplex aversus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1079 n. 45, ♀ ♂.

bellipes Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Campoplex bellipes Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 21 n. 3, ♂.

bellulus D. T. — ♂ — Am.: Texas.
Campoplex bellus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 172, ♂ [non Cresson 1865].
Campoplex bellulus m.

---

[1]) *Lep.:* Sthanelia hippocastani (Bignell).

bellus Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Campoplex ? bellus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 44, ♀.
bicolor Brischke[1]) — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex bicolor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 142, ♀.
bifidus Thom. — ♀ — Eur.: Bohemia.
Campoplex bifidus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1063 n. 14, ♀.
bimaculatus Grav. — ♂ — Eur.
Campoplex bimaculatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 505 n. 34, ♂.
brevicornis Brischke[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex brevicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 141, ♀♂.
brischkei D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex lateralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 44, ♂ [non
Campoplex Brischkei m. [Kriechbaumer].
brullei D. T. — ♂ — Am.: Brasilia.
Campoplex xanthostoma Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 158 n. 1, ♂ [non Grav.].
Campoplex Brullei m.
bucculentus Holmgr.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Russia. [♀♂.
Campoplex bucculentus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 36 n. 4,
Campoplex melampus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 783 n. 6, ♀♂.
Campoplex bucculentus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 871 n. 3, ♀♂.
Campoplex bucculentus Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 49 n. 18, ♀♂.
Campoplex bucculentus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 140, ♀♂.
Campoplex bucculentus Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 16, ♀ ♂.
Campoplex bucculentus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1073 n. 35, ♀ ♂.
buddha Cam. — ♀ — As.: Mussouri.
Campoplex Buddha Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. P. 4. 1897 p. 26, ♀.
caja Boie[4]) — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex caja Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 103 n. 42, ♀.
calcaratus Spin. — Am.: Chile.
Campoplex calcaratus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 522 n. 8.
calceatus Brauns — ♀ — Eur.: Hungaria.
Campoplex calceatus Brauns, Termész. Füzet. XVIII. 1895 p. 47 n. 11, ♀.
cameronii D. T. — As.: India.
Campoplex carinifrons Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 119 [non
Campoplex Cameronii m. [Holmgren].
cantator (Deg.) Holmgr. — ♀ ♂ — Afr.: Cap.
Ichneumon cantator Degeer, Mém. serv. hist. insect. VII. 1773 p. 594 n. 2; T. 44 F. 9-12.
Ichneumon cantator Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. VII. 1780 p. 211 n. 2; T. 44 F. 9-12.
Ichneumon cantator Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 68 n. 272.
Ichneumon cantator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 218 n. 276.
Ichneumon delusor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon delusor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 265.
Campoplex canaliculatus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 807 n. 24, ♂.

---

1) *Lep.:* Eupithecia spec. (Brischke).

2) *Lep.:* Eupithecia pimpinellaria, E. campanulata, E. innotata, E. centaurearia, E. succenturiaria, E. absynthiaria, E. castigaria (Brischke).

3) *Lep.:* Heliothis dipsacea (Mocsáry), Odontopoera bidentata, Lomaspilis marginata, (Brischke).

4) *Lep.:* Arctia caja (Boie).

Campoplex cantator Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 22 n. 4, ♀ ♂.
Campoplex canaliculatus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1058 n. 3, ♀ ♂.
carinatus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Campoplex carinatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 150b n. 9; Fig. 7d, ♀.
Campoplex carinatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 365 n. 9; Fig. 43.
carinifrons Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex mixtus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 601 [p. p.].
Campoplex carinifrons Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 34 n. 2, ♀.
Campoplex minax Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 795 n. 15, ♀.
Campoplex carinifrons Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 871 n. 2, ♀.
Campoplex carinifrons Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 24 n. 5, ♀.
Campoplex carinifrons Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 16 n. 3, ♀ ♂.
Campoplex carinifrons Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1057 n. 1, ♀.
Campoplex carinifrons Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 2. 1892 p. 44, ♀ ♂.
castanipes Thoms. — ♀ — Eur.: Bohemia.
Campoplex castanipes Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1063 n. 15, ♀.
circumcinctus Förste. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex circumcinctus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 831 n. 43, ♂.
circumspectus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex circumspectus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 842 n. 51, ♂.
Campoplex vagulus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 864 n. 68, ♂.
Campoplex parvulus Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 64 n. 28, ♂.
Campoplex circumspectus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1897 p. 1084 n. 57, ♀ ♂.
cognatus Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Campoplex cognatus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 522 n. 7, ♀.
coleophorarum Ratzbg. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex coleophorarum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 90 n. 43, ♀ ♂.
confusus Först.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Campoplex confusus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 841 n. 50, ♀ ♂.
Campoplex confusus Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 62 n. 27, ♀ ♂.
Campoplex confusus Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 17, ♀ ♂.
Campoplex confusus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1072 n. 33, ♀ ♂.
consobrinus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Campoplex consobrinus Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 87 n. 42, ♂.
contumax Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex contumax Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 814 n. 30, ♀.
Campoplex prominulus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 826 p. 39, ♂.
Campoplex prominulus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1068 n. 26, ♀ ♂.
convexus Tischb.[3] — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex convexus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 349, ♀.
coxalis Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Campoplex coxalis Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 520 n. 3, ♀.
crassipes Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex crassipes Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1075 n. 38, ♀.
cressonii D. T. — ♀ ♂ — Am. Mexico.
Campoplex calcaratus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 384 n. 9, ♀ ♂ [non Spinola].
Campoplex Cressonii m.

---

1) *Lep.:* Macaria aestimaria (Giraud, Bignell). — *Hymen.:* Lophyrus rufus (Rondani).
2) *Lep.:* Taeniocampa populeti (Bignell), Selenia tetralunaris (Kriechbaumer).
3) *Hymen.:* Nematus Wesmaeli (Tischbein).

cryptocentrus Grav.[1] — ♀ — Eur.
Campoplex cryptocentrus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 550 n. 67, ♀.
cultrator Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex cultrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 616 n. 103, ♀ ♂.
Campoplex cultrator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 36 n. 5, ♂.
Campoplex cultrator Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 776 n. 1, ♀.
Campoplex cultrator Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 18 n. 1, ♀♂.
Campoplex cultrator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 140, ♀♂.
Campoplex cultrator Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 16 n. 5, ♀ ♂.
Campoplex cultrator Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1065 n. 18, ♀ ♂.
debilis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex debilis Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 859 n. 64, ♀.
Campoplex debilis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1087 n. 63, ♀.
deserticola Tosqu. — ♂ — Afr.: Aegyptus.
Campoplex deserticola Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 412, ♂.
dimidiatus Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Campoplex dimidiatus Brullé, Hist. nat. insect. Hymén. IV. 1846 p. 160 n. 4, ♀.
disclusus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex disclusus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 837 n. 47, ♀.
Campoplex disclusus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1082 n. 52, ♀.
dissitus Nort. — ♀ — Am. bor.
Campoplex dissitus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 367 n. 35, ♀.
diversus Nort. — ♀ ♂ — Am.: Massachusetts.
Campoplex diversus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 366 n. 31, ♀ ♂.
Campoplex diversus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 148^b n. 4, ♀ ♂; Fig. 7^c.
Campoplex diversus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 363 n. 4, ♀♂; Fig. 42.
divisus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Campoplex divisus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 385 n. 11, ♂.
Campoplex divisus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 50. 1886 Hymen. I. p. 306 n. 14; T. 13 F. 2.
dubiosus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Campoplex dubiosus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 802 n. 20, ♂.
Campoplex fatigator Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 827 n. 40, ♀.
Campoplex fatigator Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1079 n. 46, ♀ ♂.
erythrogaster Först.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex indefessus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 799 n. 18, ♂.
Campoplex affixus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 799 n. 79.
Campoplex erythrogaster Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 836 n. 46, ♀♂.
Campoplex erythrogaster Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 56 n. 22, ♀.
Campoplex erythrogaster Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 16, ♀ ♂.
Campoplex erythrogaster Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1078 n. 44, ♀ ♂.
erythrurus Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Campoplex erythrurus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 521 n. 5, ♀.
euops Ratzb.[3] — ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex euops Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 84 n. 27, ♂.
expertus Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Campoplex expertus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 171, ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Tenthredo colon (Gravenhorst).
[2]) *Lep.:* Hybernia rupicapraria (Bignell), Lobophora polyommata (Kriechbaumer).
[3]) *Hymen.:* Nematus betulae (Retzius).

exsculptus Brischke — ♀ — Eur.: Germania. [1880 p. 143, ♀.
Campoplex (Hypothereutes?) exsculptus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4.
facialis Boie [1]) — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex facialis Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVIII. 1857 p. 198 n. 16, ♀.
falcator (Fabr.) Holmgr.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon falcator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 339 n. 69.
Ichneumon falcator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 434 n. 88.
Ichneumon surratus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 362 n. 729, ♂.
Ichneumon falcator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 268 n. 106.
Ichneumon falcator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 178 n. 131.
Ichneumon surratus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 182 n. 143.
Ichneumon falcator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2695 n. 159.
Ichneumon surratus Gmelin, Linné: Syst nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2697 n. 166.
Ichneumon falcator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 362.
Ichneumon falcator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 192 n. 145.
Ichneumon surratus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 221 n. 90.
Ichneumon falcator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 174 n. 170.
Ophion falcator Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 237 n. 11.
Ophion falcator Walckenaer, Fauna Paris. 1802 p. 73 n. 4.
Ophion falcator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 136 n. 28.
Ichneumon falcator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110, ♀.
Ophion falcator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 513 n. 34.
Ichneumon falcator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon falcator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 319.
Campoplex mixtus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 601 n. 101, ♀♂ [p. p.]
? Campoplex falcator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 393 n. 1, ♀ ♂.
Campoplex mixtus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 324 n. 8.
Campoplex mixtus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 33 n. 1, ♀ ♂.
Campoplex mixtus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 863 n. 67, ♀ ♂.
Campoplex falcator Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 57 n. 23, ♀ ♂.
Campoplex falcator Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 15 n. 1, ♀ ♂.
Campoplex falcator Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1060 n. 7, ♀ ♂.
Campoplex mixtus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VII. 1890 p. 65, ♀.
fallax Grav. — ♀ — Eur.
Campoplex fallax Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 504 n. 33, ♀.
femorator Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Campoplex femorator Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 17, ♀ ♂.
Campoplex femorator Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 347.
flavipalpis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex flavipalpis Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 785 n. 8, ♂.
Campoplex spoliator Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 787 n. 9, ♀.
Campoplex flavipalpis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1067 n. 24, ♀ ♂.
flavipennis Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Campoplex flavipennis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 383 n. 5, ♀.

---

1) *Lep.:* Noctua ripae (Boie).

2) *Lep.:* •Phalera bucephaloides, Simyra nervosa (Mocsáry), Pygaera bucephala (Brischke, Bignell, Norgate), Notodonta ziczac (Bignell), Orgyia pudibunda (Brischke), Biston hirtaria, Amphidasis prodromaria (Bignell), Notodonta camelina (Osborn), Acronycta spec., Cucullia argentea, C. spec. (Brischke), Anarta myrtilli (Desvignes), Halias parasinana (Brischke).

var. **terminalis** Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Campoplex flavipennis var. terminalis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 383.
flaviscapus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia. [[p. p.].
Campoplex oxyacanthae Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 60 n. 25, ♀ ♂
Campoplex flaviscapus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1061 n. 11, ♂.
floricola Grav. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Campoplex floricola Gravenhorst Ichneum. Europ. III. 1829 p. 600 n. 101, ♀.
Campoplex floricola Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 870 n. 1, ♀.
foveolatus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex foveolatus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 818 n. 33, ♀.
Campoplex trisculptus Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 39 n. 13, ♀ ♂.
Campoplex trisculptus Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 16, ♀ ♂.
Campoplex foveolatus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1068 n. 25, ♀.
Campoplex foveolatus Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1863, ♂.
frumentarius Rond.[1]) — Eur.: Italia.
Campoplex frumentarius Rondani, Bull. soc. entom. Ital. VI. 1874 p. 134 n. 28.
Campoplex frumentarius Rondani, Bull. soc. entom. Ital. IX. 1877 p. 169 n. 9.
fugitivus Hal. — ♀ ♂ — Am. mer.
Campoplex fugitivus Haliday, Trans. Linn. Soc. London XVII. P. 3. 1836 p. 318 n. 8, ♀ ♂.
fuscipalpus Cam. — ♀ — As.: India.
Campoplex fuscipalpis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1844 P. 3. p. 115, ♀.
genalis Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex genalis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1070 n. 29, ♀.
genuinus Nort.[2]) — ♀ ♂ — Am.: Connecticut.
Campoplex genuinus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 367 n. 37, ♀ ♂.
geometrae Rdw.[3]) — Eur.
Campoplex geometrae Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 60 n. 8.
glaucus Nort. — ♀ — Am. bor.
Campoplex glaucus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 366 n. 32, ♀.
gnarus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Campoplex gnarus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 384 n. 8, ♂.
gracilis Ratzb.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Campoplex gracilis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 81 n. 2.
Campoplex gracilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 11 n. 10, ♀ ♂.
gracillimus D. T. — ♂ — Eur.: Germania. [Ratzeburg].
Campoplex gracilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 1. 1888 p. 55, ♂ [non
Campoplex gracillimus m.
guatemalensis Cam. — Am.: Guatemala.
Campoplex Guatemalensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 49. 1886 Hymen. I. p. 304 n. 3.
habermehlii Kriechb. — ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex Habermehli Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 313 n. 4, ♂.
henaultii Desv. — Eur.: Britannia.
Campoplex Henaultii Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 98 n. 17.
heterocerus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex heterocerus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 857 n. 63, ♀.
Campoplex heterocerus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1080 n. 48, ♀.

---

1) *Lep.:* Tinea granella L. (Rondani).
2) *Hymen.:* Lophyrus abietis (Norton).
3) *Lep.:* Geometra betularia (Rudow).
4) *Col.:* Ceuthorrhynchus spec. (Ratzeburg).

himalayensis Cam. — As.: India.
Campoplex himalayensis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 117.
holmgrenii D. T. — ♂ — Eur.: Suecia.
Campoplex unicinctus Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 35 n. 11, ♂
Campoplex Holmgrenii m. [[non Gravenhorst, non Spinola].
humilis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex humilis Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 849 n. 56, ♀ ♂.
Campoplex humilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 140, ♂.
inaequalipes Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Campoplex inaequalipes Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 386 n. 15, ♀.
incidens Ratzb. — ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex incidens Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 94 n. 7, ♂.
incompletus Bridgm. — ♂ — Eur.: Britannia.
Campoplex incompletus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1899 p. 420, ♂.
infestus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Campoplex terrificus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 806 n. 23, ♂.
Campoplex infestus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 824 n. 37, ♀ ♂.
Campoplex infestus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1058 n. 4, ♀ ♂.
inermis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex inermis Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 828 n. 41, ♀.
Campoplex inermis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1086 n. 60, ♀.
infelix D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Campoplex rufipes Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 81 n. 38, ♀ [non
Campoplex infelix m. [Gravenhorst].
insignitus Först.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Campoplex insignitus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 844 n. 52, ♀.
Campoplex bistrigosus Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 37 n. 12, ♀ ♂.
Campoplex insignitus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1069 n. 27, ♀ ♂.
insularis Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Campoplex insularis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 42, ♀.
intermedius Ratzb.[2] — ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex intermedius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 82 n. 4, ♂.
juvenilis Först.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Campoplex juvenilis Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 779 n. 3, ♀ ♂.
Campoplex juvenilis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 16, ♀ ♂.
kriechbaumeri Costa — ♂ — Eur.: Sardinia.
Campoplex Kriechbaumeri A. Costa, Atti acad. sc. fis. & matem. Napoli (2) I. 1884 p. 56, ♂.
lacivius Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Campoplex lacivius Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 383 n. 3, ♂.
lacunosus Kriechb.[4] — ♂ — Eur.: Bavaria. [p. 104, ♂.
Campoplex lacunosus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXII. 1883
laetus Ratzb. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex laetus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 83 n. 6, ♀ ♂.
lancifer Ratzb. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex lancifer Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 84 n. 15, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Hylophila bicolorana (Mocsáry).
2) *Lep.:* Tortrix viridana L. (Rondani).
3) *Lep.:* Eupithecia nanata (Bignell).
4) *Lep.:* Rumia luteolata (Kriechbaumer).

lapponicus Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia. [n. 8, ♀ ♂.
Campoplex Lapponicus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 37
Campoplex callizonus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 803 n. 21, ♀.
Campoplex Lapponicus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 872 n. 6, ♀ ♂.
Campoplex Lapponica Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 51 n. 19, ♀ ♂.
Campoplex Lapponicus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1073 n. 34, ♀ ♂.
Campoplex Lapponicus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 420.
Campoplex Lapponicus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VII. P. 4. 1891 p. 65, ♀.

lateralis Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria. [p. 111, ♀.
Campoplex lateralis Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXVII. 1883

laticinctus Cress. — ♀ — Am.: Canada, Colorado.
Campoplex laticinctus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 283, ♀.
Campoplex nigripes Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 145.
Campoplex laticinctus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 148b n. 3, ♀; Fig. 7b.
Campoplex laticinctus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 362.

latungula Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex latungula Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1065 n. 19, ♀.

latus Ratzbg.[2] — ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex latus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 84 n. 26, ♂.

lectus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Campoplex lectus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 384 n. 7, ♂.

legalis Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Campoplex legalis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 385 n. 14, ♂.

leptogaster Holmgr.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania. [♀ ♂.
Campoplex leptogaster Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 38 n. 10,
Campoplex macrostylus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 812 n. 29, ♀.
Campoplex leptogaster Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 872 n. 7, ♀ ♂.
Campoplex leptogaster Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 42 n. 14, ♀ ♂.
Campoplex leptogaster Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 144, ♀.
Campoplex leptogaster Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 17 n. 8, ♀ ♂.
Campoplex leptogaster Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1078 n. 43, ♀ ♂.

leucoraphis Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Campoplex leucoraphis Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 519 n. 2, ♀.

limbatus Grav. — ♀ — Eur.
Campoplex limbatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 591 n. 93, ♀.

limiventris Kriechb.[4] — ♂ — Eur.: Bavaria. [1883 p. 106, ♂.
Campoplex limiventris Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXVII.

limnobius Thoms. — ♀ — Eur. fere tota. [[non Förster].
Campoplex obreptans Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 79 n. 36, ♀
Campoplex limnobius Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1088 n. 65.

longicaudis Ratzbg. — ♀ — Eur.
Campoplex longicaudis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 89 n. 42, ♀.

longipes Smith — ♀ — As.: Kashmir.
Campoplex longipes Smith, Scient. Res. 2d Yarkand Miss. 1878 p. 21 n. 59, ♀.
Campoplex longipes Waterhouse, Aid Ident. Insects. P. 25. 1885 T. 162 F. 5.

---

1) *Lep.:* Melanippe hastata (Bridgman).
2) *Col.:* Anthonomus spec. (Ratzeburg).
3) *Lep.:* Cabera pusaria (Brischke).
4) *Lep.:* Cucullia scrophulariae (Kriechbaumer).

luctuosus Prov. — ♀ — Eur.: Canada.
Campoplex luctuosus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 145.
Campoplex luctuosus Provancher, Natural. Canad. IX. 1879 p. 147b n. 1, ♀.
Campoplex luctuosus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 362 n. 1, ♀,
lugens Grav. — ♀ ♂ — Eur.
Campoplex lugens Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 509 n. 37, ♀.
Campoplex lugens Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 86 n. 24, ♀.
Campoplex lugens Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 485 n. 34, ♀ ♂.
luteipes Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Campoplex luteipes Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1089 n. 67, ♀.
maceratus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Campoplex maceratus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 385 n. 12, ♂.
macilentus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Campoplex macilentus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 384 n. 10, ♀.
mactator Först. — ♀ ♂ — Eur.: Russia.
Campoplex mactator Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 861 n. 66, ♀.
Campoplex similatorius Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 47 n. 17, ♀.
Campoplex mactator Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1059 n. 6, ♀ ♂.
major Cress. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Campoplex major Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 369, ♀.
marginellus Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Campoplex marginellus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 521 n. 6, ♀.
mariae D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Campoplex annexus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 780 n. 4, ♀ [excl. ♂].
Campoplex facialis Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 77 n. 35, ♀ ♂
Campoplex facialis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1068 n. 64, ♀ ♂. [non Boie].
Campoplex Mariae m.
maurus Grav. — ♂ — Eur.
Campoplex maurus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 516 n. 44, ♂.
medianus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex medianus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 788 n. 10, ♀.
megacephalus Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex megacephalus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 502 n. 31, ♀.
melliventris Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Campoplex melliventris Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 383 n. 6, ♀.
meridionalis Ashm. — ♀ ♂ — Am.: St. Vincent.
Campoplex meridionalis Ashmead, Journ. Linn. Soc. Zool. XXV. 1894 p. 139, ♀ ♂.
mexicanus Cam. — ♀ — Am.: Mexico. [T. 13 F. 4.
Campoplex Mexicanus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 50. 1886 Hymen. I. p. 305 n. 10, ♀;
minor Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Campoplex minor Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 150b n. 8, ♀.
Campoplex minor Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 364 n. 8, ♀.
minutus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Campoplex minutus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 13 n. 17, ♀.
Campoplex minutus Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 85 n. 41, ♀.
monozonus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Fennia. [Synon.].
Campoplex floricola Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 10 n. 6, ♀ ♂ [excl.
Campoplex floricola Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 38 n. 9, ♀ ♂.
Campoplex disseptus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 781 n. 5.
Campoplex monozonus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 833 n. 44, ♀ ♂.

Campoplex monozonus Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 52 n. 20, ♀ ♂.
Campoplex monozonus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1081 n. 50, ♀ ♂.

myrtillus Desv.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Campoplex myrtillus Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 99 n. 26.
Campoplex myrtillus Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 15 n. 10, ♀ ♂.

nefastus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Campoplex nefastus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 385 n. 13, ♂.

niger Brullé — ♀ — Am.: Chile.
Campoplex niger Brullé, Hist. nat. insect. Hymén. IV. 1846 p. 159 n. 2, ♀.
Campoplex niger Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 518 n. 1, ♀.

nitens Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex nitens Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 618 n. 104, ♀ ♂.

nitidulator Holmgr.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Fennia, Germania.
Campoplex nitidulator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 9 n. 4, ♀ ♂.
Campoplex nitidulator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 36 n. 6, [♀ ♂.
Campoplex vindex Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 808 n. 25, ♂.
Campoplex circumscriptus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 819 n. 34, ♂.
Campoplex martialis Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 821 p. 35, ♀ ♂.
Campoplex nitidulator Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 871 n. 4, ♀ ♂.
Campoplex nitidulator Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 26 n. 6, ♀ ♂.
Campoplex nitidulator Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 16 n. 6, ♀ ♂.
Campoplex nitidulator Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1062 n. 13, ♀ ♂.

nobilitatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Campoplex nobilitatus Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 19 n. 2, ♀.
Campoplex nobilitatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 15, ♀ ♂.
Campoplex nobilitatus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1064 n. 16, ♀.

notabilis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Campoplex notabilis Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 856 n. 62, ♀ ♂.
Campoplex notabilis Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 71 n. 32, ♀ ♂.
Campoplex notabilis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1080 n. 47, ♀ ♂.

obliteratus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia.
Campoplex falcator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 393 n. 1, ♀ ♂.
Campoplex obliteratus Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 59 n. 24, ♀ ♂.
Campoplex obliteratus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1060 n. 8, ♀ ♂.

occidentalis Davis — ♀ ♂ — Am.: Washington.
Campoplex occidentalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 361, ♀ ♂.

opacus Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex opacus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1074 n. 37, ♀.

opimus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Campoplex opimus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 382 n. 1, ♀.

oxyacanthae Boie[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
? Ichneumon mixtus Pollich, Bemerk. churpfälz. ökon. Ges. v. 1779. 1781 p. 281 n. 7.
? Ichneumon mixtus Pollich, Nova acta acad. nat. curios. VII. 1783 p. 140.
? Ichneumon compressus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 369; T. 39 F. 2.
? Ichneumon mixtus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 282 n. 2089.

---

[1]) *Lep.:* Anarta myrtilli (Desvignes).
[2]) *Lep.:* Eupithecia venosata (Bridgman).
[3]) *Lep.:* Caradrina pulmonaris (Mocsáry), Himera pennaria (Bignell), Fidonia piniaria (Fitch), Miselia oxyacanthae (Boie).

Campoplex mixtus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 601 n. 101, ♀ ♂ [p. p.].
Campoplex oxyacanthae Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 104 n. 43, ♂.
? Campoplex mixtus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 324 n. 8.
? Campoplex mixtus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 33 n. 1, ♀ ♂.
Campoplex mesoxanthus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 791 n. 12, ♀ ♂.
Campoplex oxyacanthae Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 60 n. 25, ♀ ♂
Campoplex oxyacanthae Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 15 n. 1, ♀ ♂. [[p. p.].
Campoplex oxyacanthae Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1060 n. 9.
Campoplex mixtus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 44, ♀ ♂.
Campoplex oxyacanthae Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1895 p. 36.

pallidipes Brullé — ♀ — Eur.: Gallia.
Campoplex pallipes Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 162 n. 7, ♀.

parvulus Först. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Campoplex obreptans Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 778 n. 2, ♀.
Campoplex aemulus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 794 n. 14, ♀.
Campoplex parvulus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 865 n. 69, ♀ ♂.
Campoplex discrepans Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 867 n. 70, ♀.
Campoplex filicornis Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 80 n. 37, ♀.
Campoplex obreptans Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 16, ♀ ♂.
Campoplex aemulus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1082 n. 53, ♀ ♂.

pectoralis Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Campoplex pectoralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 14 n. 19, ♂.

pedalis Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Campoplex ? pedalis Cresson, Proc. entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 43, ♂.

peraffinis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex peraffinis Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 830 n. 42, ♂.

perditor Först.[1]) — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex perditor Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 796 n. 16, ♀.
Campoplex perditor Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXVIII. 1883 [p. 113, ♀.
Campoplex perditor Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1077 n. 42, ♀.

petiolaris Brischke[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex petiolaris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 141, ♀ ♂.

pineticola Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Fennia.
Campoplex pineticola Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1872 p. 44 n. 16, ♀ ♂.
Campoplex pineticola Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1072 n. 32, ♀ ♂.

placidus Desv. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Campoplex placidus Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 97 n. 16, ♀ ♂.

politus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex politus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 784 n. 7, ♀.

pomorum Ratzbg. — Eur.: Germania.
Campoplex pomorum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 88 n. 36.

posticus Walk. — ♂ — Afr.: Aegyptus.
Campoplex posticus Walker, List of Hymen. in Egypt 1871 p. 2 n. 5, ♂.

proximus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex proximus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 868 n. 71, ♂.

psilopterus Grav. — ♀ ♂ — Eur.
Campoplex psilopterus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 508 n. 36, ♂.
Campoplex psilopterus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 86 n. 22, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Hylophila bicolorana (Kriechbaumer, Mocsáry).
2) *Lep.:* Chesias spartiaria, Cidaria rubidaria (Brischke).

pugillator (L.) Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Gödart, Metam. & hist. nat. Insect. I. 1662; T. 6 F. 12.
—— Rajus, Hist. Insect. 1710 p. 155 n. 17.
—— Linné, Acta Upsal. IV. 1736 p. 25 n. 16.
—— Réaumur, Mém. hist. nat. Insect. VI. 1742 p. 267.
—— Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 975.
—— Degeer, Mém. hist. Insect. I. 1752 p. 74 & 573; T. 6 F. 11 & 12.
Ichneumon pugillator Linné, Syst. nat. Ed. 10a I. 1758 p. 565 n. 46.
Ichneumon pugillator Linné, Fauna Suec. Ed. 2a 1761 p. 406 n. 1624.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 332 n. 24.
Ichneumon pugillator Ström, Trondhiemska Selsk. Skrift. III. 1765 p. 379 & 422 n. 46.
Ichneumon pugillator Linné, Syst. nat. Ed. 12a I. 2. 1767 p. 956 n. 50.
Ichneumon pugillator Berkenhout, Outlin. Nat. Hist. Gr. Britain I. 1769 p. 165 n. 8.
Ichneumon pugillator Fabricius, Syst. entom 1775 p. 339 n. 70.
Ichneumon pugillator Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 856 n. 50.
Ichneumon occisor Schrank, Beitr. z. Naturg. 1776 p. 90 n. 56.
Ichneumon compressus Sulz, Abgek. Gesch. Insect. I. 1776 p. 190; T. 26 F. 15.
Ichneumon pugillator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 159 n. 1849.
—— Götze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. I. 4. 1778 p. 26; T. 6 F. 11 & 12.
Ichneumon pugillator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 434 n. 89.
Ichneumon occisor Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 362 n. 730, ♀.
Ichneumon pugillator Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 363 n. 732, ♀.
Ichneumon pugillator Schrank, Neu. Magaz. Liebh. Entom. I. P. 3. 1782 p. 294 n. 732.
Ichneumon pugillator Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 401 n. 24.
Ichneumon pugillator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 268 n. 107.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 62 n. 230.
Ichneumon pugillator Römer, Gen. Insect. 1789 p. 58; T. 26 F. 15 [nec 14].
Ichneumon pugillator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 172 n. 115.
Ichneumon occisor Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 184 n. 152.
Ichneumon pugillator Gmelin, Linné: Syst nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2695 n. 50.
Ichneumon occisor Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2697 n. 167.
Ichneumon subfalcatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2701 n. 293.
Ichneumon pugillator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 47 n. 773.
Ichneumon pugillator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 374.
Ichneumon pugillator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 193 n. 146.
Ichneumon occisor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 221 n. 91.
Ichneumon pugillator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 174 n. 171.
Ichneumon pugillator Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 162 n. 503.
Ophion pugillator Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 238 n. 12.
Ichneumon compressus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 268 n. 2064, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Phalera bucephaloides, Cirrhoidea ambusta (Mocsáry), Geometra brumata, G. obscurata, Noctua marginata, N. derasa, Tortrix quercus (Boie), ? Aporia crataegi (Ratzeburg), Thecla betulae (Eedle), ? Zygaena filipendulae (Degen), Z. rhadamanthus (Giraud), Odontopora bidentata (Brischke), Amphidasis betularia (Bignell), Gnophos obscurata (Drewsen & Boie), Corycia temerata (Bignell), Selidosema taeniolaria (Giraud), Cheimatobia brumata (Drewsen & Boie), Eupithecia abbreviata, E. absynthiata (Bignell), Anticlea rubidata, Notodonta dictaeoides (Brischke), N. ziczac (Linné), Gonophora derasa (Rothe), Cymatophora ridens, Taeniocampa populeti (Bignell), Hecatera dysodea, Cucullia spec. (Brischke), Heliothis marginata (Boie), H. dipsacea, Halias quercana (Boie, Giraud), Philolocera quercana (Gravenhorst), Odontopora dentaria, Cidaria rubidaria (Brischke).

Ophion pugillator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 73 n. 5.
Ophion latrator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 135 n. 23.
Ophion pugillator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 136 n. 30.
Ichneumon pugillator C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- u. Baumhölzer I. P. 2-3. 1805 p. 102.
Ichneumon pugillator Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 962 [n. 17.
Ophion nidulator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 89.
Ichneumon pugillator C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- u. Baumhölzer II. P. 6. 1807 p. 301.
Ichneumon pugillator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 70 n. 773.
Ichneumon pugillator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110, ♀.
Ophion nidulator Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 P. 100 P. 15.
Ophion latrator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 513 n. 29.
Ophion pugillator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 513 n. 36.
Ophion pugillator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 294.
Ichneumon pugillator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 264.
Ichneumon nidulator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 320.
Ichneumon latrator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 269.
Ichneumon pugillator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 n. 318.
Ichneumon nidulator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 319.
Ichneumon latrator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 334.
Campoplex pugillator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 606 n. 102, ♀ ♂.
Ichneumon pugillator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1022 n. 213.
Campoplex pugillator Boie, Arch. f. Naturg. II. P. 1. 1836 p. 40 n. 11.
Campoplex pugillator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 394 n. 2, ♀ ♂.
Ophion (Campoplex) pugillator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 324 n. 3.
Campoplex pugillator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 98 n. 17.
Campoplex pugillator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 88 n. 31.
Campoplex areolator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 8 n. 3, ♂ [p. p.].
Campoplex pugillator Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 104 n. 44, ♀ ♂.
Campoplex pugillator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 34 n. 3, [♀ ♂.
Ophion pugillator Duméril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 895 n. 5.
Campoplex pugillator Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 816 n. 32, ♀.
Campoplex pugillator Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 29 n. 7, ♀.
Campoplex pugillator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 139, ♀ ♂.
Campoplex pugillator Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 16 n. 2, ♀ ♂.
Campoplex pugilator Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1066 n. 20.
Campoplex pugillator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 65, ♀.
Campoplex pugillator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 44, ♀ ♂.

pulchripes Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Campoplex pulchripes Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 62 n. 26, ♂.

pumilio Grav. — ♂ — Eur.
Campoplex pumilio Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 541 n. 63, ♂.

punctatus Bridgm. — ♂ — Eur.: Britannia.
Campoplex punctatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 345, ♂.

punctus Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Campoplex punctus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXVII. 1883 [p. 101, ♂.

quadrimaculatus Ratzbg. [1]) — Eur.: Germania.
Campoplex quadrimaculatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 89 n. 40.

rectus Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex rectus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1086 n. 61, ♀.

---

1) *Lep.*: Aglia tau (Ratzeburg).

relectus Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Campoplex relectus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 361, ♀.

remotus Först.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex remotus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 848 n. 55, ♀.
Campoplex blandus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 854 n. 60, ♀.
Campoplex Forsseli Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 73 n. 33, ♀ ♂.
Campoplex blandus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1085 n. 59, ♀ ♂.

retectus Htg.[2]) — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex retectus Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 272 n. 14, ♀.
Campoplex retectus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 94 n. 5, ♀.

rufinus Rdw. — Eur.: Germania.
Campoplex rufinus Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 60 n. 9.

rufipes Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Campoplex rufipes Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 81 n. 38, ♀.

rufoniger Brischke[3]) — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex rufoniger Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 141, ♀.

rugifer Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex rugifer Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 825 n. 38, ♂.
Campoplex rugifer Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1059 n. 5, ♀.

rugulosus Först.[4]) — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Campoplex rugulosus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 798 n. 17, ♀.
Campoplex rugulosus Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 16, ♀.
Campoplex rugulosus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1057 n. 2, ♀.

semidivisus Ratzbg. — ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex semidivisus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 97 n. 15.
Campoplex semidivisus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 83 n. 19, ♂.

semiflavus Costa — ♀ — Eur.: Sardinia.
Campoplex semiflavus A. Costa, Atti accad. fis. Napoli (2) I. P. 2. 1883 p. 100, ♀.
Campoplex semiflavus A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1884 p. 337.

semirufus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Campoplex semirufus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 364 n. 9, ♀.
Campoplex semirufus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 786 n. 9, ♀.
Campoplex semirufus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 84 n. 9, ♂.

senegalensis (Blanch.) Brullé — ♀ — Afr.: Senegal.
Foenus Senegalensis Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 300 n. 2, ♀.
Campoplex Senegalensis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 163 n. 8, ♀.

sericeus Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex sericeus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 142, ♀ ♂.

signator Brauns — ♀ — Eur.: Hungaria.
Campoplex signator Brauns, Termész. Füzet. XVIII. 1895 p. 48 n. 12, ♀.

sobolicidus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Campoplex sobolicida Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 860 n. 65.
Campoplex ulceratus Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 83 n. 39, ♀ ♂.
Campoplex sobolicida Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1085 n. 58, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Larentia truncata (Thomson).
2) *Hymen.:* Lophyrus pini (Hartig).
3) *Lep.:* Cucullia spec. (Brischke).
4) *Lep.:* Trachea piniperda (Norgate).

speciosus Cam. — ♀ — As.: Ceylon.
Campoplex speciosus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. P. 4. 1897 p.27, ♀.

spinipes Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex spinipes Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1076 n. 40, ♀.

spinolae D. T. — ♀ — Am.: Chile.
Campoplex unicinctus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 520 n. 4, ♀ [non Gravenhorst, non Holmgren].
Campoplex Spinolae m.

spinulosus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex spinulosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 143, ♀.

splendens Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Campoplex splendens Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1064 n. 17, ♀.

spurius Grav. — ♂ — Eur.
Campoplex spurius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 533 n. 56, ♂.

stenocarus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Campoplex stenocarus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1083 n. 55, ♀.

stenogaster Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex stenogaster Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 834 n. 45, ♀.
Campoplex stenogaster Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1082 n. 51, ♀.

stygius Först. — ♂ — Eur.: Gallia.
Campoplex stygius Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 845 n. 53, ♂.
Campoplex stygius Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1074 n. 36, ♂.

subaequalis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Campoplex subaequalis Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 822 n. 36, ♂.
Campoplex subaequalis Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 33 n. 9, ♀ ♂.
Campoplex subaequalis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1067 n. 23, ♀ ♂.

subcinctus Först.[1] — ♀ — Eur.: Germania.
Campoplex subcinctus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 792 n. 13, ♀.
Campoplex subcinctus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1075 n. 39, ♀.

subimpressus Först. — ♂ — Eur.: Gallia.
Campoplex subimpressus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 838 n. 48, ♂.
Campoplex subimpressus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1076 n. 41, ♂.

subsulcatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Campoplex subsulcatus Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 66 n. 29, ♀ ♂.

sumptuosus Cam. — ♀ — As.: Ceylon.
Campoplex sumptuosus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 28, ♀.

tarsalis Walk. — ♀ — Afr.: Aegyptus.
Campoplex tarsalis Walker, List of Hymen. in Egypt 1871 p. 2 n. 4, ♀.

tenthredinum Tschek[2] — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Campoplex tenthredinum Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 44, ♀ ♂.

tenuis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex tenuis Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 851 n. 58, ♀.
Campoplex agnatus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 852 n. 59, ♂.
Campoplex tenuis Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 69 n. 31, ♀ ♂.
Campoplex tenuis Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 17, ♀ ♂.
Campoplex tenuis Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1087 n. 62, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Tischeria complanella (Rondani).
2) *Hymen.:* Cimbex spec. (Tschek).

tepanecus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Campoplex Tepanecus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 382 n. 2, ♀ ♂.
Campoplex Tepanecus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 49. 1886 Hymen. I. p. 304 n. 2, ♀ ♂;
terebrans Grav. — ♀ ♂ — Eur. [T. 13 F. 1.
Campoplex terebrans Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 503 n. 32, ♀ ♂.
terebrator Först. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex terebrator Förster, Verh. zool. boot. Ges. Wien 1868 p. 810 n. 26 & 27, ♀ ♂.
Campoplex terebrator Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 34 n. 10, ♀ ♂.
Campoplex terebrator Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 16, ♀ ♂.
Campoplex terebrator Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1062 n. 12, ♀ ♂.
tessellatus Ratzbg.[1]) — ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex tessellatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 87 n. 26, ♂.
texanus Ashm. — ♀ — Am.: Texas.
Campoplex Texanus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 427, ♀.
tibialis Brischke[2]) — ♂ — Eur.: Germania.
? Ichneumon carpinellae Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 301 n. 2129, ♂.
? Ichneumon carpinellae C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- u. Baumhölzer II. 5. 1807 p. 162.
? Ichneumon carpinellae Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 990 n. 152 ♂.
Campoplex tibialis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 142, ♂.
tibiator Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Campoplex tibiator Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 41, ♀.
tomentosus Desv. — ♀ — Eur.: Britannia.
Ophion (Campoplex) tomentosus Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 100 n. 27, ♀.
transiens Ratzbg.[3]) — Eur.: Germania.
Campoplex transiens Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 84 n. 24.
tyrannus Cam. — ♂ — As.: India.
Campoplex tyrannus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1829 P. 3. p. 116, ♂.
unicinctus Holmgr. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Campoplex unicinctus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 35 n. 11, ♂.
validicornis Holmgr.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Campoplex validicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 9 n. 5, ♀ ♂.
Campoplex validicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 140, ♀ ♂.
variipes Grav.[5]) — ♂ — Eur.
? Ichneumon annulator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 158 n. 1837.
Campoplex varipes Gravenhorst, Ichneum. III. 1829 p. 513 n. 41, ♂.
? Ichneumon annulator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 995 n. 160 ♂.
veraepacis Cam. — Am.: Mexico. [F. 3.
Campoplex Veraepacis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 50. 1886 Hymen. I. p. 305 n. 5; T. 13
vicinus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Campoplex vicinius Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 145, ♀.
Campoplex vicinus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 149b n. 6, ♀.
Campoplex vicinus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 364 n. 6, ♀.
vigilator Först. — ♂ — Eur.: Suecia, Gallia.
Campoplex vigilator Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 855 n. 60, ♂.
Campoplex vigilator Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1069 n. 28, ♂.

---

1) *Hymen.:* Tenthredo tricincta (Rondani).
2) *Lep.:* Fidonia cebraria (Brischke).
3) *Hymen.:* Strongylogaster cingulata (Ratzeburg).
4) *Lep.:* Eupithecia succenturiata, E. pimpinellaria, Cucullia artemisiae (Brischke).
5) *Lep.:* Hyponomeuta padella (Giraud).

villosus Nort. — ♀ ♂ — Am.: Albany.
Campoplex villosus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 365 n. 29, ♀♂.
vitticollis Nort. — ♀ — Am.: Canada, Connecticut.
Campoplex vitticollis (Harris) Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 365 n. 28, ♀.
Campoplex vitticollis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 149b n. 5, ♀.
Campoplex vitticollis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 364 n. 5, ♀.
xanthogaster Brullé — ♀ — Am. bor.
Campoplex xanthogaster Brullé, Hist. nat. insect. Hymén. IV. 1846 p. 159 n. 3, ♀.
Campoplex xanthogaster Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 366 n. 33, ♀.
xenocamptus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Campoplex xenocamptus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 804 n. 22, ♀.
Campoplex xenocamptus Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 67 n. 30, ♀♂.
Campoplex xenocamptus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 140, ♀.
Campoplex xenocamptus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1071 n. 30, ♀ ♂.
zonellus Först.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campoplex zonellus Förster, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 850 n. 57, ♀.
Campoplex eurynotus Holmgren, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. P. 2. 1872 p. 75 n. 34, ♀ ♂
Campoplex zonellus Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1083 n. 54, ♀ ♂.

CHAROPS

Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 324 n. 9.
Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 39.

Nom. propr.

Synon.: Campoplex Gravenhorst.

annulipes Ashm. — ♂ — Am.: Missouri.
Charops annulipes Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 425, ♂.
apaturae Ashm.[2]) — ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Charops apaturae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 193, ♀ ♂.
bimaculatus Ashm. — ♀ — Am.: Grenada.
Charops bimaculata Ashmead, Proc. Zool. Soc. London 1895 p. 778, ♀.
breviceps Kriechb. — ♀ ♂ — Afr. or. [n. 6, ♀♂.
Charops breviceps Kriechbaumer, Magretti: Ann. mus. civ. stor. nat. Genova (2) I. 1884 p. 529
Charops breviceps Kriechbaumer, Magretti: Bull. soc. entom. Ital. XV. 1883 p. 243.
decipiens (Grav.) Holmgr.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Campoplex decipiens Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 596 n. 97, ♀.
Charops decipiens Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 324 n. 9.
Charops decipiens Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 39 n. 1, ♀♂.
Charops decipiens Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 100 n. 1.
Charops deficiens Thomson, Opusc. entom. P. 11. 1887 p. 1090 n. 1, ♀ ♂ [err. typogr.].
Charops decipiens Bridgman, Entom. M. Magaz. XXV. 1889 p. 185.
erythrogaster Ashm. — ♀ ♂ — As.: Ceylon.
Charops erythrogaster Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII. 1896 p. 644, ♀ ♂.
fuscipennis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Charops fuscipennis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 365, ♀.

---

1) *Lep.:* Thecla betulae (Eedle).
2) *Lep.:* Apatura Clyton (Ashmead).
3) *Lep.:* Zygaena laeta, Z. punctum (Mocsáry).

luteipes Walk. — ♀ — As.: Japonia.
Charops? luteipes Walker, Cistula entom. I. P. 11. 1874 p. 307 n. 16, ♀.
tibialis Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Charops tibialis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 173, ♂.
unicinctus Ashm. — ♀ — Am.: Grenada.
Charops unicinctus Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 272 n. 186, ♀.

9. *Subfam.* Anomalinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 140 & 145.

HABRONYX

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 145.
ἁβρός, splendidus; ὄνυξ, unguis.

Synon.: Anomalon Wesmael & auct.

flavistigma Davis — ♂ — Am.: New York.
Habronyx ? flavistigma Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 362, ♂.
gravenhorstii Först.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria, Dalmatia, Balcanus; As. minor.
Habronyx Gravenhorstii Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 148 n. 99, ♀ ♂.
Anomalon (Habronyx) gigas Kriechbaumer, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 75.
heros (Wesm.) Först.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Anomalon heros Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 2. 1849 p. 125 n. 4, ♀; F. 1 B.
Anomalon heros Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV. 1857 p. 171 n. 5, ♀ ♂; [T. 2 F. 1 & 3 (♂).
Anomalon heros Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 20 n. 6, ♀ ♂.
Habronyx heros Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 149.
Anomalon heros Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1874 p. 6; T. 3 F. 3.
Anomalon heros Buysson, Revue d'entom. XI. 1892 p. 258; T. 1 F. 5.
Anomalon (Habronyx) heros Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1759 n. 1, ♀.
Anomalon (Habronyx) heros Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2118 n. 1.

CAMPOSCOPUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 145 n. 3.
κάμπος, balaena; σκοπέω, exploro.

Species exstat.

APHANISTES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 145 n. 2.
ἀφανιστός, e medio sublatus.

Synon.: Anomalon Wesmael & auct.
Ichneumon Schrank, Villers, Gmelin, Thunberg.
Ophion Fabricius, Olivier.
Therion Curtis.

bellicosus (Wesm.) Brischke[3] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia.
Anomalon bellicosum Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 2. 1849 p. 124 n. 2, ♀ ♂.

---

[1] *Lep.:* Noctua dryophaga (Kriechbaumer).
[2] *Lep.:* Lasiocampa pini, L. dryophaga, Deilephila galii (Brischke).
[3] *Lep.:* Sphinx pinastri (Mocsáry).

Anomalon bellicosum Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV. 1857 p. 168 n. 2, ♀.
Anomalon bellicosum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 18 n. 3, ♀.
Anomalon bellicosum Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 66; T. 43 F. 5. [p. 135, ♀♂.
Anomalon (Aphanistes) bellicosum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880
Anomalon bellicosum Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 223 n. 5, ♀ ♂.
Anomalon (Aphanistes) bellicosum Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1761 n. 3, ♀♂.

biguttatus (Grav.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Anomalon biguttatum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 642 n. 111, ♀.
Anomalon biguttatum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 88 n. 3, ♀ ♂.
Anomalon biguttatum Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 2. 1849 p. 125 n. 3, ♀♂; [F. 2, 5 & 6.
Anomalon biguttatum Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV. 1857 p. 170 n. 4, ♀.
Anomalon biguttatum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 19 n. 5, ♀♂.
Anomalon biguttatum Kawall, Stettin. entom. Zeitg. XIX. 1858 p. 68 n. 46, ♀ ♂.
Anomalon biguttatum Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 66; T. 43 F. 1.
Anomalon biguttatum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 136, ♀.
Anomalon biguttatum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. 1891 p. 65, ♀.
Anomalon (Aphanistes) biguttatus Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1760 n. 1, ♀.

ruficornis (Grav.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Anomalon xanthopus var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 652, ♂.
Anomalon ruficorne Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 655 n. 116b, ♀ ♂.
Anomalon gliscens Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 260.
Therion ruficorne Curtis, Brit. Entom. XVI. 1839 p. 736 n. 5.
Anomalon ruficorne Boie, Naturh. Tidsskr. III. 1841 p. 323 n. 12, ♀.
Anomalon gliscens Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 89 n. 7.
Anomalon ruficorne Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 18 n. 2, ♀.
Anomalon ruficorne Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 223 n. 4, ♀ ♂.
Anomalon ruficorne Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. IX. 1890 p. 140.
Anomalon (Aphanistes) ruficornis Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1762 n. 5, ♀♂.
Anomalon (Aphanistes) ruficornis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2119.

wesmaelii (Holmgr.) Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Anomalon ruficorne Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 655, ♀ [excl. ♂].
Anomalon bellicosum var. Wesmael, Bull. acad. sc. Bruxelles V. 1849 p. 124.
Anomalon Wesmaeli Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 25 n. 3, ♀♂.
Anomalon Wesmaeli Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV. 1857 p. 169 n. 3, ♀♂.
Anomalon Wesmaeli Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 18 n. 4, ♀♂.
Anomalon Wesmaeli Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1874 p. 6; T. 3 F. 4. [p. 135, ♀♂.
Anomalon (Aphanistes) Wesmaeli Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880
Anomalon (Aphanistes) Wesmaeli Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1762 n. 4, ♀♂.

xanthopus (Schrk.) D. T.[3] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon xanthopus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 370 n. 749, ♀ ♂.
Ichneumon xanthopus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 201 n. 216.
Ichneumon xanthopus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2711 n. 188.
Ophion xanthopus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 133 n. 13.
Ophion xanthopus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 511 n. 19.
Ophion xanthopus Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 295.

---

[1]) *Lep.:* Fidonia piniaria (Boie), Lasiocampa pini L. (Rondani), Panolis piniperda (Brischke).

[2]) *Lep.:* Gastropacha piniperda (Hartig).

[3]) *Lep.:* Eugonia quercaria, Acronycta cuspis (Mocsáry), Cucullia lychnitis (Giraud).

Ichneumon xanthopor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon xanthopor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 321.
Anomalon xanthopus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 652 n. 116, ♀ ♂.
Therion xanthopus Curtis, Brit. Entom. XVI. 1839 p. 736 n. 4.
Anomalon xanthopus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 89 n. 6.
Anomalon armatum Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 2. 1849 p. 122 n. 1, ♀♂; F. 6 & 7.
Anomalon xanthopus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 79 n. 11.
Anomalon xanthopus Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 106 n. 47.
Anomalon armatum Kirchner, Lotos VI. 1856 p. 234; Taf. F. 9 & 13.
Anomalon xanthopus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV. 1857 p. 167 n. 1, ♀♂.
Anomalon xanthopus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 17 n. 1, ♀♂.
Anomalon xanthopus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 323 n. 4.
Acrotomus xanthopus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. P. 2. 1871 p. 96, ♂.
Anomalon xanthopus Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1874 p. 6; T. 3 F. 8.
Anomalon xanthopus Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 223 n. 1, ♀ ♂.
Anomalon (Aphanistes) armatum Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1761 n. 2, ♀.
Aphanistes xanthopus m.

HETEROPELMA

Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1849 p. 119 n. 2.
ἕτερος, alius; πέλμα, palma.

Synon.: Anomalon Gravenhorst, Wesmael, Say, Brullé.

calcator Wesm.¹) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Anomalon xanthopus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 652, ♀ [excl. ♂, non Schrank].
Anomalon (Heteropelma) calcator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 2. 1849 p. 120, [♀♂; F. 1.
Heteropelma calcator Kirchner, Lotos VI. 1856 p. 234; Taf. F. 11.
Heteropelma calcator Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV. 1857 p. 165 n. 1, ♀♂.
Heteropelma calcator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 15 n. 1, ♀♂.
Anomalon (Heteropelma) calcator Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 [p. 322 n. 3.
Heteropelma calcator Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 187 n. 1, ♀ ♂.
Anomalon (Heteropelma) calcator Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1758 n. 1, ♀ ♂.

datanae Ril.²) — ♀ — Am. bor.
Heteropelma datanae Riley, Insect. Life I. 1888 p. 177, ♀.

flavicorne (Say) Nort. — ♀ ♂ — Am.: Arkansas, Canada.
Anomalon flavicornis Say, West. Quart Rep. Cincinnati II. 1823 p. 73.
Anomalon flavicorne Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 171 n. 2, ♀♂; T. 40 F. 4.
Anomalon flavicornis Leconte, Writ. of Th. Say Entom I. 1859 p. 163.
Heteropelma flavicorne Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 360 n. 12.
Heteropelma flavicorne Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 122ᵇ, ♂.
Heteropelma flavicorne Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 355 n. 1, ♂.

fulvitarse Cam. — ♀ — As.: India.
Heteropelma fulvitarse Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 111, ♀.

reticulatum Cam. — As.: India.
Heteropelma reticulatum Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 110.

sonorense Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Heteropelma Sonorensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 79. 1886 Hymen. I. p. 298 n. 1, ♀; [T. 12 F. 30.

---

¹) *Lep.*: Fidonia piniaria (Kawall), Trachea piniperda, Halias prasinana (Brischke).
²) *Lep.*: Datana integerrima (Riley).

EXOCHILUM

Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 2. 1849 p. 119 n. 3.
ἔξω, extra; χεῖλος, labium.

Synon.: Anomalon Jurine & auct.
Ichneumon Linné & auct.
Ophion Fabricius & auct.
Therion Curtis.

acronyctae Ashm.[1]) — ♀ — Am.: California, Washington Terr.
Exochilum acronyctae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 190, ♀.
capitatum (Desv.) Bridgm. — ♂ — Eur.: Britannia.
Anomalon capitatum Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 104 n. 5, ♂.
Exochilum (Anomalon) capitatum Bridgman, Trans. Entom. Soc. 1886 p. 344, ♂.
circumflexum (L.) Wesm.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 974.
Ichneumon circumflexus Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 566 n. 54.
Ichneumon circumflexus Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª. 1761 p. 408 n. 1631.
Ichneumon circumflexus Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 938 n. 59.
Ichneumon circumflexus Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 341 n. 80.
Ichneumon circumflexus Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 858 n. 59.
Ichneumon circumflexus O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 159 n. 1846.
Ichneumon LXXXVIII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. III. 1779; T. 225 F. 4.
Ichneumon circumflexus Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 437 n. 103.
Ichneumon circumflexus Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 269 n. 121.
Ichneumon circumflexus Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. Nya Saml. III. 1788 p. ?
Ichneumon circumflexus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 199 n. 209.
Ichneumon circumflexus Gmelin, Linné: Syst nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2710 n. 59.
Ichneumon circumflexus Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 52 n. 788.
Ichneumon ramidulus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 357; T. 37 F. 2.
Ichneumon circumflexus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 197 n. 164.
Ichneumon circumflexus Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 181 n. 199.
Ophion circumflexum Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 236 n. 6.
Ophion circumflexus Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 73 n. 3.
Ophion circumflexus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 133 n. 15.
Ichneumon circumflexus Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 77 n. 788.
Anomalon circumflexus Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 116, ♀.
Ophion circumflexus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 511 n. 20.
Ophion circumflexum Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 295.
Ichneumon circumflexus Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 276.
Ichneumon circumflexus Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 351.
Anomalon circumflexum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 643 n. 112, ♀ ♂.
Anomalon circumflexum Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 380 n. 837.
Ophion circumflexus Gravenhorst, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1833. 1834 [p. 79.
Ophion (Anomalon) circumflexum Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 392 n. 4, ♀ ♂.
Therion circumflexum Curtis, Brit. Entom. XVI. 1839 p. 736 n. 2.

---

[1]) *Lep.:* Acronycta lupina, A. hastilifera (Ashmead).

[2]) *Lep.:* Euplexia lucipara (Brischke), Lasiocampa pini (Ratzeburg, Brischke, Harris).

Ophion (Anomalon) circumflexum Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 324 n. 5.
Ichneumon (Anomalon) circumflexus Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 25 n. 10; T. 6 F. 2 & [T. 9 F. 11-22.
Anomalon circumflexum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 87 n. 1, ♀ ♂.
Anomalon circumflexus Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 327 n. 385.
Anomalon circumflexum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 77.
Anomalon (Exochilum) circumflexum Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. 2. 1849 p. 122,
Exochilum circumflexum Kirchner, Lotos VI. 1856 p. 234; T. 8 F. 8 & 12. [♀ ♂; F. 2, 5, 6.
Exochilum circumflexum Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV. 1857 p. 163 n. 1, [♀ ♂; var. T. 2 F. 2 (♀).
Exochilum circumflexum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 14 [n. 1, ♀ ♂.
Anomalon (Exochilum) circumflexum Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 [p. 322 n. 2.
Ophion circumflexus Duméril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 895 n. 4.
Anomalon circumflexum Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1874 p. 6; T. 3 F. 6 (♀).
Exochilum circumflexum Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 181 n. 1, ♀ ♂.
Anomalon (Exochilum) circumflexum Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1759 n. 1, ♀ ♂.

var. **giganteum** Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Anomalum giganteum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 647 n. 113.
Anomalon circumflexum var. giganteum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 87.

fuscipenne Nort. — ♀ — Am.: Canada.
Exochilum fuscipennis Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 359 n. 9, ♀.
Exochilum fuscipenne Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 121b n. 2, ♀; F. 4b.
Exochilum fuscipenne Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 355 n. 2; F. 36b.

mundum (Say) Nort.[1] — ♀ ♂ — Am.: Canada, Indiana.
Ophion mundus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 239 n. 3.
Anomalon flavipes Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 170 n. 1, ♀ ♂.
Ophion mundus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 695 n. 3.
Exochilum mundus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 360 n. 10.
Exochilum mundum Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 375 n. 1.
Anomalon nigripenne Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 173.
Exochilum mundum Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 120b n. 1, ♀ ♂.
Exochilum mundum Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 354 n. 1, ♀ ♂.
Exochilum mundum Howard, Scudder: Butterflies U. S. 1889 p. 1881, ♂.

nigrovarium (Brullé) Nort. — ♀ — Am. bor.
Anomalon nigrovarium Brullé, Hist. nat. insect. Hymén. IV. 1846 p. 172 n. 4, ♀.
Exochilum nigrovarium Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 359 n. 8.

nigrum Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
? Anomalon ambiguum Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 362 n. 15, ♀.
Anomalon nigrum Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 142b n. 1, ♀ ♂.
Anomalon nigrum Provancher, Faun. entom. Canad. Hymén. 1883 p. 356 n. 1, ♀ ♂.
Exochilum nigrum Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 76 n. 3.

occidentale Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Exochilum occidentale Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 366, ♀.

petiolatum Davis — ♀ ♂ — Am.: Dakota.
Exochilum petiolatum Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 356, ♀ ♂.

pyramidatum Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Anomalon (Exochilum) pyramidatum Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2118 n. 1, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Vanessa cardui, Iphiclides ajax (Howard).

tenuipes Nort.[1]) — ♀ — Am.
Exochilum tenuipes Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 360 n. 11, ♀.
texanum Ashm. — ♂ — Am.: Texas.
Exochilum Texanum Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 426, ♂.

ERIGORGUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 146 n. 8.
ἐρι, valde; γοργός, terribilis.

Synon.: Anomalon Brischke.

flavimanus Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Erigorgus flavimanus Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 214 & 232 n. 3, ♂.
interstitialis Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Erigorgus interstitialis Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 214 & 231 n. 2, ♂.
purpuratae Kriechb.[2]) — Eur.
Erigorgus purpuratae Kriechbaumer, Insektenbörse XVII. 1900 p. 132.
ruficornis Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Erigorgus ruficornis Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 213 & 231 n. 1, ♂.
similis Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Erigorgus similis Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 214 & 232 n. 4, ♂.

ACANTHOSTOMA

Kriechbaumer, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1893/94 p. 128.
ἄκανθα, spina; στόμα, os.

japonicum Kriechb. — ♀ ♂ — As.: Japonia.
Acanthostoma Japonicum Kriechbaumer, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1893/94 p. 129 n. 7, [♀ ♂.

SYMPRATIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 146 n. 9.
συμπράτης, qui cum alio aliquid vendit.
Species exstat.

BARYLYPA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 146 n. 10.
βαρύς, gravis; λυπέω, dolore afficio.

Synon.: Anomalon Gravenhorst, Wesmael.
Laphyctes Förster.

genalis Thoms.[3]) — ♀ — Eur.: Suecia.
Anomalon (Barylypa) genalis Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1767 n. 2, ♀.
humeralis Brauns — ♂ — Eur.: Hungaria.
Anomalon (Barylypa) humerale Brauns, Termész. Füzet. XVIII. 1895 p. 44 n. 5, ♂.
laticeps Thoms. — ♂ — Eur.: Suecia.
? Anomalon pallidum Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 676 n. 126.
Anomalon (Barylypa) laticeps Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1766 n. 1, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Spilosoma Virginica (Fabricius).
[2]) *Lep.:* Arctia purpurata (Kriechbaumer).
[3]) *Lep.:* Bombyx castrensis (Mocsáry).

uniguttatum (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Anomalon uniguttatum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 685 n. 134, ♀ ♂.
Anomalon uniguttatum Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. 2. 1849 p. 131 n. 11, ♀; F. 5.
Laphyctes uniguttatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXV. 1878 p. 75 n. 3,
Anomalon (Barylypa) uniguttatum Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2119 n. 1. [♀ ♂.

SARNTHEINIA

Ludovicus comes de Sarnthein. [Stål].

Synon.: Laphyctes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 146 n. 11 [non Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXV. 1878 p. 71.
λαφύκτης, ganeo.

Anomalon Brischke.

carinata (Brischke) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Littorale. [p. 136, ♂.
Anomalon (Erigorgus) carinatum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880
Laphyctes carinatus Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894 p. 20, ♀ ♂.
Sarntheinia carinata m.
insidiator (Förست.) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Laphyctes insidiator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXV. 1878 p. 73 n. 2, ♂.
Laphyctes insidiator Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 215 & 232 n. 5, ♀ ♂.
Sarntheinia insidiator m.
mesozona (Först.) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Laphyctes mesozonus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXV. 1878 p. 72 n. 1, ♂.
Sarntheinia mesozona m.
rubricator (Szépl.) D. T. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Laphyctes rubricator Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 215 & 232 n. 6, ♀.
Sarntheinia rubricator m.

BLAPTOCAMPUS

Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1765.
βλάπτω, laedo; *κάμπος*, balaena.

Synon.: Anomalon Wesmael.

nigricornis (Wesm.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia, Austria.
Anomalon nigricorne Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. 2. 1849 p. 126 n. 6, ♀ ♂; F. 2 & 7.
Anomalon nigricorne Kirchner, Lotos VI. 1856 p. 234; Taf. F. 10.
Anomalon nigricorne Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV. 1857 p. 175 n. 9, ♀ ♂.
Anomalon nigricorne Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 22 [n. 10, ♀ ♂.
Anomalon canaliculatum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 23 n. 12.
Anomalon (Blaptocamptus) nigricorne Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1766 n. 1, ♀ ♂.
perspicuus (Wesm.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer. [5 & 6.
Anomalon perspicuum Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. 2. 1849 p. 127 n. 7, ♀ ♂; F. 2,
Anomalon perspicuum Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV. 1857 p. 176 n. 10, ♀ ♂.
Anomalon perspicuum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 22
Anomalon perspicuum Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 66; T. 43 F. 3. [n. 11, ♀ ♂.
Anomalon perspicuum Bridgman & E. A. Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 224, ♀ ♂.
Anomalon (Blaptocampus) perspicuus Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1766 n. 2, ♀.
Anomalon (Blaptocampus) perspicuus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2119 n. 1.

---

[1]) *Lep.:* Cleora lichenaria (Atmore).

ANOMALON

Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 114; T. 3 F. 2.
ἀνώμαλος, anomalus.

Synon.: Banchus Walckenaer, Fabricius.
Cremastus Cresson.
Cryptus Fabricius.
Heteropelma Provancher.
Ichneumon Thunberg.
Ophion Fabricius, Olivier.
Therion Curtis.

affine Luc. — ♂ — Afr.: Algeria.
Anomalon affine Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 327 n. 386, ♂; T. 18 F. 9.
agnatum Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Anomalon agnatum Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 379 n. 8, ♂.
alpinum Davis — ♀ — Am.: Idaho.
Anomalon alpinus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 360, ♀.
ambiguum Nort. — ♀ — Am.: Massachusetts.
Anomalon ambiguus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 362 n. 19, ♀.
anale (Say) Nort. — ♀ ♂ — Am. bor.
Ophion analis Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 75 n. 2, ♀.
Ophion analis Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 379 n. 2.
Anomalon analis Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 361 n. 14, ♀.
Anomalon anale Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 143b n. 4, ♀ ♂.
Anomalon anale Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 357 n. 4, ♀ ♂.
annulatum (Fabr.) Trent. — ♀ — As.: India.
Ichneumon annulatus Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 179 n. 190.
Banchus annulatus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 129 n. 15.
Ichneumon marmorator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822. p. 273.
Ichneumon marmorator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 342.
Anomalon annulatus Trentepol, Isis 1826 p. 300 n. 66, ♀ [non 69].
Anomalon annulator Trentepol, Isis 1829 p. 948 n. 63, ♀.
annulitarse Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Anomalon annulitarse Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1764 n. 5, ♀ ♂.
anomelas Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Anomalon anomelas Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 680 n. 130, ♀.
Anomalon anomelas Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 224, ♀ ♂.
apicipenne Spin. — ♀ — Am.: Brasilia.
Anomalon? apicipenne Spinola, Mem. accad. sc. Torini (2) XIII. 1851 p. 41 n. 21, ♀.
arquatum Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Anomalon arquatum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 668 n. 123, ♀ ♂.
Anomalon arquatum Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 224, ♀ ♂.
attractum Say — Am.: Indiana.
Anomalon attractus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 241 n. 1.
Anomalon attractus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 696 n. 1.
basilicon Davis — ♀ — Am.: Idaho.
Anomalon basilicon Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 359, ♀.

---

[1]) *Lep.*: Taeniocampa gothica (Bignell).

batis Ratzbg.[1]) — Eur.: Germania.
Anomalon batis (Ratzeburg) Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 106 n. 48.
bipartitanum Davis — ♂ — Am.: Michigan.
Anomalon bipartitana Davis, Trans. Amer. Entom Soc. XXIV. 1897 p. 358, ♂.
brachypterum Cam. — ♂ — As.: Ceylon.
Anomalon brachypterum Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. P. 2. 1896 p. 25, ♂.
breviator (Fab.) Trent. — Am. mer.
Cryptus breviatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 78 n. 29.
Ichneumon breviator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon breviator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 299.
Anomalon breviator Trentepol, Isis 1829 p. 951 n. 66.
brevicolle Wesm. — ♀ — Eur.: Belgia.
Anomalon brevicolle Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. 2. 1849 p. 136 n. 15, ♀.
brevicorne Grav.[2]) — Eur.
Anomalon brevicorne Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 656 n. 117, ♀ ♂.
brischkei D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Anomalon flavitarsum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 137, ♀ ♂
Anomalon Brischkei m. [nec Brullé, nec Rudow].
bucephalum Vollenh. — As.: Batavia.
Anomalon bucephalum Vollenhoven, Herklots Bouwstoffen II. 3. 1858 p. 281 n. 329.
Anomalon bucephalum Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XVI. 1873 p. 217 n. 10.
californicum Cress. — ♀ — Am.: California.
Anomalon Californicum Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 367, ♀.
capillosum Htg.[3]) — ♂ — Eur.: Germania.
Anomalon capillosum Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. 2. 1838 p. 265, ♂.
Anomalon capillosum Ratzeburg, Ichnem. d. Forstinsect. I. 1844 p. 89 n. 8, ♂.
Anomalon capillosum Verloren, Mém. d'entom. soc. entom. Pays-Bas I. 1858 Versl. p. 38.
carinifrons Cam. — ♀ — As.: India.
Anomalon carinifrons Cameron, Ann. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 113, ♀.
cinctum Trent. — Eur.
? Cryptus (Pezomachus) bicolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 902 n. 304, ♀.
Anomalon cinctus Trentepol, Isis 1829 p. 955 n. 71.
claripenne Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Anomalon claripennis Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1764 n. 6, ♀ ♂.
clathratum Brullé — ♂ — Am.: Brasilia.
Anomalon clathratum Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 175 n. 8, ♂.
clavatum Davis — ♀ — Am.: Dakota.
Anomalon clavatum Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 357, ♀.
clavipes Davis — ♂ — Am.: Michigan.
Anomalon clavipes Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 359, ♂.
coarctatum Brullé — ♀ — Austr.
Anomalon coarctatum Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 176 n. 9, ♀.
cruentatum Panz. — ♀ — Eur.: Germania.
Anomalon cruentatus Panzer, Faun. Insect. German. VIII. 1805 P. 94 T. 15.
Ophion cruentatus Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 90.
Anomalon cruentatus Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 116, ♀.

---

1) *Lep.:* Thyatira batis L. (Ratzeburg).
2) *Lep.:* Cucullia scrophulariae (Giraud).
3) *Lep.:* Geometra liturata (Hartig), Trachea piniperda (Verloren).

Ophion cruentatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 517 n. 60.
Ophion cruentatum Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. Curios. IX. 1818 p. 296.
Anomalon cruentatum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1047 n. 261, ♀.

curtum Nort. — ♂ — Am.: Maine, Delaware.
Anomalon curtus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 362 n. 18, ♂.

cylindricum Bridgm.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia,
Anomalon cylindricum Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1884 p. 424.
Anomalon cylindricum Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 224, ♀ ♂.

debile Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Belgia.
Anomalon debile Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. 2. 1849 p. 133 n. 13, ♀ ♂.

decorum Cam. — ♀ — As.: Ceylon.
Anomalon decorum Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. P. 2. 1896 p. 24, ♀.

delarvatum Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Austria, Italia.
Anomalon delarvatum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 678 n. 129, ♀ ♂.

densatum Say — ♀ — Am.: Indiana.
Anomalon densatus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 243 n. 4, ♀.
Anomalon densatus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 698 n. 4.

discrepans Brauns — ♂ — Eur.: Hungaria.
Anomalon discrepans Brauns, Termész. Füzet. XVIII. 1895 p. 46 n. 7, ♂.

divaricatum Say — Am.: Florida.
Anomalon divaricatus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 244 n. 7.
Anomalon divaricatus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 699 n. 7.

edemae Davis[2] — ♀ ♂ — Am.: Michigan.
Anomalon edemae Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 360, ♀ ♂.

edwardsii Cress. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Anomalon Edwardsii Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 367, ♀.

ejuncidum Say — Am.: United States.
Anomalon ejuncidus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3 1836 p. 241 n. 2.
Anomalon ejuncidus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 697 n. 2.

elegans Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Anomalon? elegans Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 379 n. 9, ♀.

elevator (Panz.) Jur. — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon elevator Panzer, Faun. insect. German. VI. 1799 P. 71 T. 15.
Anomalon elevator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 116, ♀.
Ichneumon elevator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 138 n. 8.
Ichneumon elevator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 904 n. 40, ♀.
Ichneumon elevator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª IV. 1835 p. 350 n. 8.

elongatum Davis — ♀ ♂ — Am.: Dakota, New Hampshire.
Anomalon elongatum Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 357, ♀ ♂.

emarginatum Say — Am. bor.
Anomalon emarginatus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 245 n. 8.
Anomalon emarginatus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 699 n. 8.

eureka Ashm. — ♀ — Am.: California.
Anomalon eureka Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 423, ♀.

excavatum Ratzbg.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Anomalon excavatum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 78 n. 5, ♀ ♂.
Anomalon excavatum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 78 n. 7.

---

[1] *Lep.:* Euchelia jacobaeae (Fitch).
[2] *Lep.:* Edema albifrons (Davis).
[3] *Lep.:* Orgyia pudibunda, Sphinx pinastri (Ratzeburg).

exile Prov.[1]) — ♀ — Am.: Canada.
Anomalon exile Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 174.
Anomalon exile Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 144b n. 6, ♀.
Anomalon exile Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 358 n. 6, ♀.
falcator Smith — As.: Celebes.
Anomalon falcator Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. (V. 1860) p. 64 n. 1.
ferrugator Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Anomalon ferrugator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 663 n. 121, ♀.
ferrugineum Nort. — ♀ — Am.
Anomalon ferrugineus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 363 n. 21, ♀.
fibulator Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Anomalon fibulator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 681 n. 131, ♀ ♂.
Therion fibulator Curtis, Brit. Entom. XVI. 1839 p. 736 n. 10.
Anomalon fibulator Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV. 1857 p. 174 n. 8, ♀ ♂.
Anomalon fibulator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 21 n. 8, ♀ ♂.
Anomalon fibulator Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 66; T. 43 F. 2.
Anomalon fibulator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 136, ♂.
Anomalon fibulator Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 224 n. 8, ♀ ♂.
filiforme Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Anomalon filiforme Provancher, Addit. Faun. Canada. Hymén. 1886 p. 83 n. 12, ♀ ♂.
flavifrons (Grav.) D. T.[3]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ophion flavifrons Gravenhorst, Übers. zool. System. 1807 p. 267 n. 3790.
Ophion flavifrons Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 295.
Anomalon cerinops Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 658 n. 118, ♀ ♂.
Ophion (Anomalon) pubescens Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 393 n. 5, ♂.
Therion cerinops Curtis, Brit. Entom. XVI. 1839 p. 736 n. 6.
Anomalon cerinops Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 90 n. 10, ♀ ♂.
Anomalon cerinops Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. 2. 1849 p. 126 n. 5, ♀ ♂.
Anomalon cerinops Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 79 n. 16.
Anomalon cerinops Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV. 1857 p. 173 n. 7, ♀ ♂.
Anomalon cerinops Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 20 n. 7, ♀ ♂.
Anomalon cerinops Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1874 p. 6; T. 3 F. 7.
Anomalon cerinops Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 136, ♂.
Anomalon cerinops Bridgman & Fitch, Entomologist VII. 1884 p. 224 n. 6, ♀ ♂.
Anomalon flavifrons Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. IX. 1890 p. 140.
Anomalon cerinops Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1763 n. 2, ♀ ♂.
flavifrontatum D. T — ♀ — As.: Japonia.
Anomalon flavifrons Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 395 n. 1, ♀.
Anomalon flavifrontatum m.
flavipenne Brauns — ♀ — Eur.: Hungaria.
Anomalon flavipenne Brauns, Termész. Füzet. XVIII. 1895 p. 46 n. 9, ♀.
flavitarse Brullé — ♂ — Austr.: Tasmania.
Anomalon flavitarse Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 171 n. 3, ♂.
flavitarse Rdw.! — Eur.: Germania.
Anomalon flavitarse Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 57 n. 2 [nec Brischke, nec Brullé].

---

1) *Lep.:* Platysamia gloveri Streck.? (Howard).
2) *Lep.:* Diloba coeruleocephala, Bombyx castrensis (Giraud).
3) *Lep.:* Calocampa exoleta (Mocsáry), Diloba coeruleocephala (Ratzeburg), Orthosia gracilis (Giraud).

försteri D. T. — ♀ — Eur.: Hungaria. [Gravenhorst].
Anomalon brevicorne Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XII. 1855 p. 236 n. 8, ♀ [nec Anomalon Försteri m.

fuliginosum Davis — ♀ — Am.: Michigan.
Anomalon fuliginosa Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 356, ♀.

fulvescens Cress. — ♀ ♂ — Am.: Colorado.
Cremastus fulvescens Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 285, ♀ ♂.
Anomalon fulvescens Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 170, ♀ ♂.

fulvohirtum Cam. — Am.: Brasilia.
Anomalon fulvohirtum Cameron, Proc. Manchester Philos. Soc. XXVI. 1888 p. 132.

fumipenne Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Anomalon fumipenne Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 379 n. 7, ♀.

gracilipes (Curt.) Marsh. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Therion gracilipes Curtis, Brit. Entom. XVI. 1839 p. 736 n. 9, ♂.
Anomalon gracilipes Marshall, Catal. Brit. Hymen. III. 1872 p. 52 n. 14.
Anomalon gracilipes Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 225 n. 14, ♀ ♂.

guatemalenum Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [T. 12 F. 26.
Anomalon Guatemalenum Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 49. 1886 Hymen. I. p. 300 n. 7, ♀;

guttigerum Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Anomalon guttiger Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 215 & 233 n. 7, ♂.

histrio (Fabr.) Trent. — ♀ ♂ — Eur. centr.
Ichneumon histrio Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 182 n. 201.
Banchus histrio Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 71 n. 4.
Ichneumon histrio Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 69 n. 85.
Ichneumon histrio Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♀ ♂.
Ichneumon histrio Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 263.
Ichneumon histrio Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 315.
Anomalon histrio Trentepol, Isis 1829 p. 816 n. 64, ♀.

hyalinum Nort. — ♀ — Am.: Canada.
Anomalon hyaline Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 361 n. 16, ♀.
Anomalon hyalinum Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 142b n. 2, ♀.
Anomalon hyalinum Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 357 n. 2, ♀.

insidiator Smith — ♀ — As.: Japonia.
Anomalon insidiator Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 396 n. 2, ♀.

interruptum Desv. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia. [non ♂].
Ophion (Anomalon) interruptum Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 106 n. 18, ♀ [nec
Anomalon interruptum Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 224 n. 11, ♀ ♂.

klugii Htg.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Anomalon Klugii Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. 2. 1838 p. 269, ♀ ♂.
Anomalon Klugii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 89 n. 5, ♀ ♂.

lapponicum Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Anomalon Lapponicum Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1763 n. 3, ♀.

laterale Brullé — ♀ — Am. bor.
Anomalon laterale Brullé, Hist. nat. insect. Hymén. IV. 1846 p. 175 n. 7, ♀.
Anomalon laterale Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 81 n. 10, ♀.

laticeps Rdw. — Eur.: Germania.
Anomalon laticeps Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 58 n. 3.

---

[1]) *Lep.:* Sphinx pinastri (Hartig).

latro (Schrank) Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur. centr.
Ichneumon latro Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 360 n. 726, ♀.
Ichneumon latro Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 181 n. 140.
Ichneumon latro Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2697 n. 164.
Ichneumon latrator Olivier, Encycl. méthod. Insect VII. 1792 p. 184 n. 103.
Ophion latro Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 295.
Anomalon latro Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 677 n. 128, ♀ ♂.
Anomalon latro Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 137, ♀ ♂.
Anomalon latro Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1765 n. 7, ♀ ♂.

liberatorium (Fabr.) Trent. — Am. mer.
Cryptus liberatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 70 n. 1.
Ichneumon liberatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255.
Ichneumon liberatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 295.
Anomalon liberator Trentepol, Isis 1829 p. 950 n. 65, ♀.

lineatulum Say — Am.: Indiana.
Anomalon lineatulus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1835 p. 244 n. 6.
Anomalon lineatulus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 299 n. 6.

longicorne Brauns[2] — ♀ — Eur.: Hungaria.
Anomalon longicorne Brauns, Termész. Füzet. XVIII. 1895 p. 46 n. 8, ♀.

longipes (Prov.) Davis — ♂ — Am.: California.
Heteropelma longipes Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 120, ♂.
Heteropelma longipes Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 363, ♂.
Anomalon longipes Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 188.

luteopectum Nort. — ♂ — Am.
Anomalon luteopectus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 363 n. 23, ♂.

luteum Rdw.[3] — Eur.
Anomalon luteum Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 58 n. 5.

maceratum Cress. — ♂ — California.
Anomalon maceratum Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 368, ♂.

magniceps Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Anomalon magniceps Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 170, ♀.

magnum Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Anomalon magnum Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 377 n. 3, ♀ ♂.

megarthrum Ratzbg.[4] — ♀ — Eur.: Germania.
Anomalon megarthrum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 78 n. 7, ♀.
Anomalon megarthrum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 79 n. 10.

melanobatum Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Anomalon melanobatum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 662 n. 120, ♂.
Anomalon bellicosum var. melanobatum Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 66; T. 43 F. 6.
Anomalon melanobatum Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 224 n. 7, ♀ ♂.

melanocneme Voll. — ♀ — Eur.: Gallia.
Anomalon melanocneme Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXI. 1878 p. 168 n. 15, ♀; T. 10 [F. 5 & 5a.

melanops Först. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Anomalon melanops Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XII. 1855 p. 234 n. 7, ♀.

---

1) *Lep.:* Diloba coeruleocephala, Perigrapha cincta (Mocsáry).
2) *Lep.:* Phalera bucephala (Mocsáry).
3) *Lep.:* Geometra spec. (Rudow).
4) *Lep.:* Fidonia piniaria, Trachea piniperda (Ratzeburg).

melleum Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Anomalon melleum Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 171, ♀.

menyanthidis Boie[1]) — Eur. centr.
Anomalon menyanthidis Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 105 n. 45.

metallicum Nort. — ♀ — Am.. Massachusetts.
Anomalon metallicus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 364 n. 25, ♀.

mexicanum Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Anomalon Mexicanum Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 376 n. 1, ♀.

minutum Bridgm.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Anomalon minutum Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1884 p. 425.
Anomalon minutum Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 224, ♀ ♂.

mirabile Desv. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Anomalon mirabile Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 105 n. 6, ♂.
Anomalon mirabile Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 224 n. 3, ♀ ♂.

mussouriense Cam. — ♀ — As.: India.
Anomalon Mussouriense Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. P. 4. 1897 p. 26, ♀.

nigripes Bridgm. — ♂ — Eur.: Britannia.
Anomalon nigripes Bridgman, Entom. M. Magaz. XXIV. 1887 p. 150, ♂.

nigritum Nort. — ♂ — Am.: Canada, Massachussetts.
Anomalon nigritum Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 363 n. 22, ♂.
Anomalon nigritum Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 80 n. 7, ♂.

nigrorufum Nort. — ♀ — Am.: Canada.
Anomalon nigrorufus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 361 n. 17, ♀.
Anomalon nigrorufum Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 81 n. 8, ♀.

orbitale Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Anomalon orbitale Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 170, ♂.

palaeon Wey. — Eur.: Bavaria.
Anomalon palaeon Weyenbergh, Period. Zool. Argentin. I. 1874 p. 91 n. 6531; T. 3 F. 7 & 8.

palliditarse Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Anomalon pallitarse Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 170, ♂.

pallidum Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Anomalon pallidum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 675 n. 126, ♂.

paradoxum Brauns — ♀ — Eur.: Hungaria.
Anomalon paradoxum Brauns, Termész. Füzet. XVIII. 1895 p. 45 n. 6, ♀.

peritum Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Anomalon peritum Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 377 n. 4, ♀.

perspicillator Grav.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Anomalon perspicillator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 683 n. 132, ♂.
Anomalon perspicillator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 137, ♀ ♂.
Anomalon perspicillator Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 224 n. 9, ♀ ♂.

pictum Rdw. — Eur. mer.
Anomalon pictum Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 35 n. 6.

pinastri Htg.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Anomalon pinastri Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 269, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Noctua menyanthidis (Boie).

[2]) *Lep.:* Chrysocoris festaliella (Fletcher).

[3]) *Lep.:* Cloantha hyperici (Mocsáry), Acronycta menyanthidis (Bignell), Cnethocampa pithyocampa (Giraud), Simyra nervosa (Brischke).

[4]) *Lep.:* Sphinx pinastri (Hartig).

Anomalon pinastri Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 89 n. 4.
Anomalon pinastri Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 78 n. 9.

prismaticum Nort. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Anomalon prismaticus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 364 n. 24, ♀.
Anomalon prismaticum Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 143b n. 5, ♀ ♂.
Anomalon prismaticum Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 358 n. 5, ♀♂.

var. **canadense** Prov. — Am.: Canada.
Anomalon Canadense Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 174.
Anomalon prismaticum var. Canadense Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 143b.
Anomalon prismaticum var. Canadense Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 358.

var. **rufum** Prov. — Am.: Canada.
Anomalon rufum Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 174.
Anomalon prismaticum var. rufum Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 143b.
Anomalon prismaticum var. rufum Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 358.

procerum Grav. — ♀ — Eur.: Suecia.
Anomalon procerum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 651 n. 115, ♀.
Anomalon procerum Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV. 1857 p. 172 n. 6, ♀.
Anomalon procerum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 21 n. 9, ♀.
Anomalon procerum Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1763 n. 1, ♀.

propinquum Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Anomalon propinquum Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 284 n. 2, ♂.

propugnator Först. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Anomalon propugnator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XII. 1855 p. 233 n. 6, ♀.

protogaeum Heer — Eur.
Anomalon protogaeum Heer, Neu. Denkschr. schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 167 n. 74; [T. 13 F. 12.
Anomalon protogaeum Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 647.
Anomalon protogaeum Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1856 p. 156.

provancheri D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Anomalon unicolor Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 82 n. 10, ♀ [non Ratzbg.].
Anomalon Provancheri m.

pseudargioli How.[1]) — ♀ — Am.: United States.
Anomalon pseudargioli Howard, Scudder: Butterflies U. S. 1889 p. 1881, ♀.

pyriforme Ratzbg.[2]) — ♀ — Eur.: Germania.
Anomalon pyriforme Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 79 n. 17, ♀.

quadrilineatum Cam. — Am.: Guatemala.
Anomalon quadrilineatum Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 49. 1886 Hymen. I. p. 301 n. 11.

recurvum Say — ♀ ♂ — Am.: Indiana.
Anomalon recurvus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 243 n. 5, ♀ ♂.
Anomalon recurvus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 698 n. 5.

relictum (Fabr.) Nort. — ♀ ♂ — Am. bor.
Ophion relictus Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 236 n. 5.
Ophion relictus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 133 n. 12.
Ophion relictus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 511 n. 18.
Ichneumon relictus Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon relictus Thunberg. Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 314.
Anomalon relictus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 360 n. 13, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Uranotus melinus, Cyaniris pseudargiolus (Howard).
2) *Lep.:* Sphinx pinastri, Diloba coeruleocephala (Ratzeburg).

Anomalon relictum Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 143b n. 3, ♀ ♂; Fig. 5.
Anomalon relictum Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 357 n. 3; Fig.

renidens Tosq. — ♀ — Afr.: Aegyptus.
Anomalon renidens Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 397 n. 1, ♀.

residuum Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Anomalon residuum Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 378 n. 5, ♀.

rotundum Davis — ♂ — Am.: Kansas.
Anomalon rotundus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 360, ♂.

rufiventre Rdw. — Eur.: Germania.
Anomalon rufiventre Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 58 n. 4.

rufulum Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Anomalon rufulum Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 80 n. 6, ♀.
Anomalon chlamidatum Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 82 n. 11, ♀.

scabridum Boie — ♂ — Eur.: Germania.
Anomalon scabridum Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 106 n. 49, ♂.

scelerosum Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Anomalon scelerosum Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 378 n. 6, ♀ ♂.

secernendum Costa — ♀ ♂ — Eur.: Sardinia.
Anomalon secernendum A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli XXIV. 1885 p. 324, ♂.
Anomalon posticum A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli XXIV. 1885 p. 324.
Anomalon secernendum A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p 17, ♂.
Anomalon posticum A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p. 18, ♀.
Anomalon secernendum A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 114, ♂.
Anomalon posticum A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 15.

segne Tosqu. — ♀ — Afr.: Algeria.
Anomalon segne Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 399 n. 2, ♀.

semirufum Nort. — ♀ — Am.: Canada, Albania.
Anomalon semirufus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 362 n. 20, ♀.
Anomalon semirufum Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 79 n. 1, ♀.

serratorium (Fabr.) Trent. — ♀ — Am. mer.
Cryptus serratorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 74 n. 18.
Ichneumon serratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon serratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 285.
Anomalon serratorius Trentepol, Isis 1829 p. 949 n. 64, ♀.

sexlineatum Say — Am.
Anomalon sexlineata Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 74 n. 1.
Anomalon sexlineata Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 378 n. 1.

signatum Grav.[1] — ♂ — Eur.
Anomalon signatum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 661 n. 119, ♂.

simile Ashm. — ♀ — Am.: California.
Anomalon simile Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XII. 1890 p. 423, ♀.

smithii Davis — ♂ — Am.: New Jersey.
Anomalon Smithii Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 357, ♂.

sphingum Ratzbg.[2] — Eur.: Germania.
Anomalon sphingum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 77.
Anomalon sphingum Ratzeburg, Stettin. entom. Zeitg. VIII. 1847 p. 61 n. 15.
Anomalon sphingum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 78 n. 6.

---

1) *Lep.:* Bombyx lanestris, B. trifolii, Saturnia pavonia (Mocsáry).
2) *Lep.:* Sphinx pinastri (Ratzeburg).

suburbe Davis — ♀ ♂ — Am.: Idaho.
Anomalon suburbe Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 358, ♀ ♂.
tarsatorium (Fabr.) Trent. — ♀ — Am. mer.
Cryptus tarsatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 73 n. 13.
Ichneumon tarsatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253.
Ichneumon tarsatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 290.
Anomalon tarsatorius Trentepol, Isis 1829 p. 953 n. 68, ♀.
tenuitarsum Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Anomalon tenuitarsum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 683 n. 133, ♀ ♂.
Therion tenuitarsum Curtis, Brit. Entom. XVI. 1839 p. 736 n. 11.
Anomalon tenuitarsum Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 224 n. 10, ♀ ♂.
thomsonii D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Anomalon orbitale Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1764 n. 4, ♀ [non Cresson].
Anomalon Thomsonii m.
thoracicum Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Anomalon thoracicum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 136, ♀ ♂.
tinctipenne Cam. — ♀ — As.: India.
Anomalon tinctipenne Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 112, ♀
trachynotum Brauns[1]) — ♀ — Eur.: Hungaria.
Anomalon trachynotus Brauns, Termész. Füzet. XVIII. 1895 p. 42 n. 2, ♀.
tricolor Brullé — ♂ — Am.: Brasilia.
Anomalon tricolor Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 174 n. 6, ♂.
unicolor Ratzbg.[2]) — Eur.: Germania.
Anomalon unicolor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 87 n. 2.
Anomalon unicolor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 78 n. 3.
varians Brauns — ♀ — Eur.: Hungaria.
Anomalon varians Brauns, Termész. Füzet. XVIII. 1895 p. 47 n. 10, ♀.
variicorne Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Anomalon varicorne Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2119 n. 1, ♀ ♂.
verbosum Cress. — ♀ ♂ — Am.: California.
Anomalon verbosum Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 368, ♀ ♂.
vicinum Först. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Anomalon vicinum Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XII. 1855 p. 232 n. 5, ♂.
villosum Grav.[3]) — ♂ — Eur.
Anomalon villosum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 676 n. 127, ♂.
vindicator (Fabr.) Trent. — ♀ — Am. mer.
Cryptus vindicator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 79 n. 38.
Ichneumon vindicator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258.
Ichneumon vindicator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 303.
Anomalon vindicator Trentepol, Isis 1829 p. 952 n. 67, ♀.
vitticolle Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Anomalon vitticolle Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 377 n. 2, ♀.
vivum Cress. — ♀ — Am.: Oregon.
Anomalon vivum Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 368, ♀.
xanthomelas Brullé — ♀ — Afr: Cap.
Anomalon xanthomelas Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 173 n. 5, ♀.

---

1) *Lep.:* Zygaena laeta (Mocsáry).
2) *Lep.:* Bombyx trifolii, Pachetra leucophaea, Trachea piniperda (Ratzeburg).
3) *Lep.:* Crateronyx dumeti (Giraud).

xanthopsis Ashm. — ♂ — Am.: California.
Anomalon xanthopsis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 423, ♂.
xanthum Boie[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Anomalon xanthum Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 106 n. 46, ♀ ♂.

SCHIZOLOMA

Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 2. 1849 p. 118 n. 1.
σχίζω, findo; λῶμα, margo.

Synon.: Schizopoma Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 145 n. 5.
σχίζω, findo; πῶμα, operculum.
Anomalon Gravenhorst.
Ichneumon Fabricius & auct.
Ophion Fabricius & auct.
Therion Curtis.

amictum (Fabr.) Wesm.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon amictus Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 341 n. 78.
Ichneumon amictus Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 436 n. 101.
Ichneumon amictus Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 269 n. 119.
Ichneumon amictus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 200 n. 213.
Ichneumon amictus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2710 n. 183.
Ichneumon amictus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 361.
Ichneumon amictus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 196 n. 162.
Ichneumon amictus Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 123 n. 270.
Ichneumon amictus Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 181 n. 197.
Ophion amictus Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 237 n. 10.
Ophion amictus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 133 n. 11.
Ophion amictus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 511 n. 17.
Ophion amictum Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 295.
Ichneumon amictor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 263.
Ichneumon amictor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 316.
Anomalon amictum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 650 n. 114, ♀ ♂.
Therion amictum Curtis, Brit. Entom. XVI. 1839 p. 736 n. 3, ♂; T. 736.
Ophion (Anomalon) amictum Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 325 n. 6.
Anomalon amictum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 88 n. 4, ♀ ♂.
Anomalon amictum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 77 n. 4, ♀ ♂. [Fig. 1.
Anomalon (Schizoloma) amictum Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 2. 1849 p. 120, ♀ ♂;
Anomalon (Schizoloma) amictum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 24
Schizoloma amictum Kirchner, Lotos VI. 1856 p. 234; Taf. F. 11. [n. 1, ♀.
Schizoloma amictum Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV. 1857 p. 162 n. 1, ♀ ♂.
Schizoloma amictum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 13 n. 1, ♀ ♂.
Anomalon (Schizoloma) amictum Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 322
Anomalon amictum Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1874 p. 6; T. 3 F. 5. [n. 1.
Schizoloma amictum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 135, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Noctua obsoleta (Boie).

[2]) *Lep.:* Callimorpha dominula (Buchanan), Orgyia pudibunda (Brischke), Demas coryli? (Marshall), Bombyx rubi (Ratzeburg), Cnethocampa processionea (Gravenhorst etc.), Pygaera bucephala (Ratzeburg), Eupithecia linariata (Bignell), Xylina rhizolitha (Giraud), Cucullia spec. (Bond), Halias prasinana (Brischke).

Schizoloma amictum Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 181 n. 1, ♀♂.
Anomalon (Schizoloma) amictum Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1757 n. 1, ♀♂.
bucephalum Brauns — Eur.: Germania.
Schizoloma bucephalum Brauns, Arch. Ver. Fr. Naturgesch. Mecklenburg LI. 1898 p. 71.
confusum Ashm. — ♀ — Am.: Carolina.
Schizoloma confusa Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 426, ♀.
fulvicorne Cam. — ♀ — As.: India.
Schizoloma fulvicornis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3 p. 104, ♀.

LABRORYCHUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 146 n. 13.
λάβρος, vehemens; ὀρυκτής, fossor.

anaitidis Szépl.[1] — ♀ — Eur.: Hungaria.
Labrorychus Anaitidis Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 216 & 233 n. 8, ♀.
nigrifrons Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Labrorychus nigrifrons Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 217 & 234 n. 11, ♂.
polyxenae Szépl.[2] — ♂ — Eur.: Hungaria.
Labrorychus Polyxenae Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 217 & 234 n. 10, ♂.
ruficoxis Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Labrorychus ruficoxis Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p 218 & 235 n. 12, ♂.
variegatus Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Labrorychus variegatus Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 216 & 234 n. 9, ♀.

TRICHOMMA

Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 2. 1849 p. 119 n. 5.
θρίξ, τριχός, pilus; ὄμμα, oculus.

Synon.: Anomalon Gravenhorst, Wesmael.
Ichneumon Rossi, Illiger.
Ophion Gravenhorst.
Therion Westwood, Curtis.

enecator (Rossi) Wesm.[3] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon enecator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 48 n. 777.
Ichneumon (Ophion) enecator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 72 n. 777.
Ophion enecator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 294.
Anomalon enecator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 641 n. 110, ♀ ♂.
Therion enecator Curtis, Brit. Entom. XVI. 1839 p. 736 n. 1.
Therion enecator Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 60.
Anomalon (Trichomma) enecator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 2. 1849 p. 137 [n. 1, ♀♂.
Trichomma enecator Kirchner, Lotos VI. 1856 p. 234; Taf. F. 11.
Trichomma enecator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 30 n. 1, ♀♂.
Trichomma enecator Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 66; T. 43 F. 9.
Trichomma enecator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 138, ♀.
Trichomma enecator Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 227 n. 1, ♀♂.
Anomalon (Trichomma) enecator Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1772 n. 1, ♀.

---

[1] *Lep.:* Anaitis plagiata (Szépligeti).
[2] *Lep.:* Thais polyxena (Szépligeti).
[3] *Lep.:* Tortrix spec. (Bridgman), Earias clorana (Brischke).

fulvidens Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Belgia.
Anomalon (Trichomma) fulvidens Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 2. 1849 p. 138
Trichomma fulvidens Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 66; T. 43 F. 8. [n. 2, ♀♂.
Trichomma fulvidens Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 227 n. 2, ♀♂.
reticulatum Davis — ♀ — Am.: Michigan.
Trichomma reticulata Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 361, ♀.
ruficoxe Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Trichomma ruficoxis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 149 n. 100, ♀.

ATROMETUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 146 n. 14.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXV. 1878 p. 76.
ἀτρομητός, impavidus.

Synon.: Agrypon Thomson.
Anomalon Holmgren.

areolatus Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Atrometus areolatus Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 218 & 235 n. 13, ♀.
geniculatus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania. [♀♂.
Anomalon geniculatum Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Forh. XIV. 1857 p. 182 n. 17,
Anomalon geniculatum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 27
[n. 19, ♀♂.
Anomalon geniculatum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 137, ♀.
Anomalon geniculatum Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 224, ♀ ♂.
Anomalon (Atrometus) geniculatus Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1768 n. 1, ♀♂.
insignis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia mer.
Atrometes insignis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXV. 1878 p. 77, ♀ ♂.
melanosoma Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Atrometus melanosoma Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1899 p. 217 & 236 n. 14, ♀.
rubricatus Först. — ♂ — Eur.: Hispania.
Atrometus rubricatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXV. 1878 p. 79, ♂.
trochanteratus (Holmgr.) Szépl. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 15, ♂.
Anomalon trochanteratum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 25
Anomalon (Agrypon) trochanteratus Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1770 n. 4, ♀.
Anomalon (Agrypon) trochanteratus Thomson, Opus. entom. P. 19. 1895 p. 2120 n. 4.
Atrometus trochanteratus Szépligeti, Termész. Füzet. XXII. 1898 p. 219 & 236 n. 15, ♀.

AGRYPON

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 151.
ἀ-γρυπός, non-curvus.

Synon.: Anomalon Gravenhorst, Wesmael, Holmgren.
Ichneumon Zschach, Gmelin.
Ophion Gravenhorst, Zetterstedt.
Therion Curtis.

aggressorium Först. — Eur.
Agrypon aggressorium Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 152.
anxium (Wesm.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia.
Anomalon anxium Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. 2. 1849 p. 130 n. 10, ♀.
Anomalon anxium Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 137, ♂.
Anomalon anxium Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 224, ♀ ♂.

Anomalon (Agrypon) anxium Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1770 n. 5, ♀.
Anomalon (Agrypon) anxius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2120 n. 5.

boreale Ashm. — ♀ — Am.: British Columbia.
Agrypon boreale Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 424, ♀.

brachypterum Först. — Eur.
Agrypon brachypterum Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 152.

canaliculatum Ratzbg. (Först.) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Anomalon canaliculatum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 90 n. 9.
Anomalon canaliculatum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 79 n. 11. [♀♂.
Anomalon canaliculatum Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Forh. XIV. 1857 p. 177 n. 11,
Anomalon canaliculatum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 23 [n. 12, ♀ ♂.
Agrypon canaliculatum Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 153.
Anomalon canaliculatum Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 66; T. 43 F. 4.
Anomalon canaliculatum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 137, ♀ ♂.
Anomalon canaliculatum Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 224, ♀ ♂.

clandestinum (Grav.) Först. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Anomalon clandestinum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 670 n. 124, ♀ ♂.
Anomalon clandestinum Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. 2. 1849 p. 129 n. 9, ♀; F. 6.
Anomalon clandestinum Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV. 1857 p. 180 n. 14, [♀ ♂.
Anomalon affine Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Forh. XIV. 1857 p. 181 n. 15, ♀ ♂.
Anomalon clandestinum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 26 [n. 16, ♀ ♂.
Anomalon affine Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 27 n. 17, ♀ ♂.
Agrypon clandestinum Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 151.
Anomalon clandestinum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 137, ♀ ♂.
Anomalon clandestinum Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 224 n. 12, ♀ ♂.
Anomalon (Agrypon) clandestinus Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1770 n. 3, ♀ ♂.

cognatum Först. — Eur.
Agrypon cognatum Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 152.

confusum Först. — Eur.
Agrypon confusum Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 152.

elegantulum Först. — Eur.
Agrypon elegantulum Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 152.

flaveolatum (Grav.) Först. [1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 61 n. 203.
? Ichneumon auricapillus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2699 n. 271.
Ophion flaveolatum Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 268 n. 3792.
Ophion flaveolatum Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 295.
Anomalon flaveolatum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 664 n. 122, ♀ ♂.
Anomalon flaveolatum Boie, Arch. f. Naturg. II. 1. 1836 p. 44 n. 25, ♀ ♂.
Ophion (Anomalon) flaveolatus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 393 n. 6, ♂ [excl. ♀].
Therion flaveolatum Curtis, Brit. Entom. XVI. 1839 p. 736 n. 7.
Anomalon flaveolatum Audouin, Hist. nat. insect. nuis. 1842 p. 181; T. 16 F. 4 & 4*.
Anomalon flaveolatum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 90.
Anomalon flaveolatum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 79 n. 12.
Anomalon flaveolatum Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 2. 1849 p. 128 n. 8, ♀ ♂; F. 8.

---

1) *Lep.:* Taeniocampa miniosa (Bignell).

Anomalon flaveolatum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 79 n. 15.
Anomalon flaveolatum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 25 n. 4, ♂.
Anomalum flaveolatum Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Forh. XIV. 1857 p. 179 n. 13, ♀♂.
Anomalon septentrionale Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV. 1857 p. 181 n. 16, ♀.
Anomalon flaveolatum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 25 [n. 14, ♀♂.
Anomalon septentrionale Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 27 [n. 18, ♀.
Anomalon flaveolatum Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 378 n. 66, ♀♂.
Agrypon flaveolatum Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 152.
Anomalon flaveolatum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 137, ♀♂.
Agrypon flaveolatum Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 224, ♀♂.
Anomalon septentrionale Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 224, ♀♂.
Anomalon (Agrypon) flaveolatus Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1771 n. 6, ♀♂.

flavopictum Ashm. — ♂ — Am.: Grenada.
Agrypon flavopictus Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 271 n. 185, ♂.

furtivum Först. — ♂ — Eur.
Agrypon furtivum Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 152, ♂.

macrurum Först — Eur.
Agrypon macrurum Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 152.

melanomerum Först. — Eur.
Agrypon melanomerum Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 151.

praediscae Ashm.[1] — ♀♂ — Am.: Missouri, Virginia.
Agrypon praediscae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII, 1896 p. 190, ♀♂.

puparum Ashm. — ♀ — Am.: California.
Agrypon puparum Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 424, ♀.

rubricatum Först. — Eur.
Agrypon rubricatum Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 153.

rufum (Holmgr.) Thoms. — ♀♂ — Eur.
Anomalon rufum Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV. 1857 p. 178 n. 12, ♀.
Anomalon rufum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 24 n. 13, ♀♂.
Anomalon rufum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 137, ♂.
Anomalon (Agrypon) rufus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2120 n. 8.

rugiferum Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Anomalon (Agrypon) rugifer Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2119 n. 2^b, ♀.

serpentinum Först. — Eur.
Agrypon serpentinum Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 153.

stenostigma Thoms. — ♀♂ — Eur.: Suecia.
? Anomalon arquatum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 668 n. 123.
Anomalon (Agrypon) stenostigma Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1771 n. 7, ♀♂.

subclavatum Först. — Eur.
Agrypon subclavatum Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 151.

tenuicorne (Grav.) Först.[2] — ♀♂ — Eur. centr.
Anomalon tenuicorne Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 671 n. 125, ♀♂.
Therion tenuicorne Curtis, Brit. Entom. XVI. 1839 p. 736 n. 8.
Anomalon tenuicorne Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. 2. 1849 p. 134 n. 14, ♀♂.
Anomalon tenuicorne Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV. 1857 p. 183 n. 18, ♀♂.

---

[1]) *Lep.:* Praedisca (!) spec. (Ashmead).

[2]) *Lep.:* Hyponomeuta padella, H. malinella, H. evonymella (Rondani), Anisopteryx aescularia (Bignell), Thais polyxena (Mocsáry).

Anomalon tenuicorne Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 323 n. 4.
Anomalon tenuicorne Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 28 n. 20,
Agrypon tenuicorne Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XVII. 1860 p. 152. [♀♂.
Anomalon bellicosum var. tenuicorne Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 66; T. 43 F. 7.
Anomalon tenuicorne Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 137, ♀♂.
Agrypon tenuicorne Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 225, ♀ ♂.
Anomalon tenuicorne Bridgman, Entom. M. Magaz. XXIV. 1887 p. 149.
Anomalon (Agrypon) tenuicornis Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1769 n. 1, ♀ ♂.

variitarsum (Wesm.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Anomalon varitarsum Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. 2. 1849 p. 131 n. 12, ♀♂.
Anomalon varitarse Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIV. 1857 p. 185 n. 19, ♀ ♂.
Anomalon varitarse Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 29 n. 21, ♀♂.
Anomalon (Agrypon) varitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1769 n. 2, ♀ ♂.

EIPHOSOMA

Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 52; F. 5.

ἴψ, ἰπός, vermis; *σῶμα*, corpus.

annulatum Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Eiphosoma annulata Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 54, ♀.

atrovittatum Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Eiphosoma atrovittata Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 52, ♀.

aztecum Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Eiphosoma Azteca Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 381 n. 3, ♀ ♂.
Xiphosoma Azteca Marshall, Ann. soc. entom. France LXI. 1892 p. 65 n. 55.

mexicanum Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Eiphosoma Mexicana Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 380 n. 1, ♀.
Eiphosoma Mexicanum Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 49. 1886 Hymen. I. p. 302 n. 1; [T. 12 F. 31.

nigrovittatum Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Eiphosoma nigrovittata Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV 1865 p. 55, ♀.

pyralidis Ashm. — ♀ — Am.: Missouri.
Eiphosoma pyralidis Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 191, ♀.

texanum Cress. — ♀ — Am.: Texas
Eiphosoma Texanum Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 176, ♀.

vitticolle Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Eiphosoma vitticollis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 53, ♀.

10. *Subfam.* Nototrachinae

Ashmead, Smith: Insects of New Jersey 1900 p. 580.

(Trachynotinae Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 140 & 147).

EUGNOMUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 147 n. 1.

εὐγνώμων, placidus.

mannii Tschek — ♀ — As. minor.
Eugnomus Manni Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 67, ♀.

NOTOTRACHYS

Marshall, Catal. Brit. Hymen. III. 1872 p. 50.
Marshall, Trans. Entom. Soc. London 1872 p. 260.
νῶτος, dorsum; *τραχύς*, asper.

Synon.: Trachynotus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 713 n. 6 [non Latreille [1829].
τραχύς, asper; *νῶτος*, dorsum.
Bassus Fabricius, Gravenhorst.
Ichneumon Thunberg.
Ophion Fabricius, Blanchard.

annulicornis Ashm. — ♀ — Am.: Texas.
Nototrachys annulicornis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 422, ♀.
basalis Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Trachynotus basalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 50, ♂.
Nototrachys basalis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 375.
californicus Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Nototrachys Californicus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 366, ♀.
canadensis (Prov.) Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Trachynotus Canadensis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 119b, ♀.
Trachynotus Canadensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 353, ♀.
Nototrachys Canadensis Cresson, Synops. Hymen. N. Amer. 1887 p. 200, ♀.
cincticornis Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Trachynotus cincticornis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 49, ♀.
Nototrachys cincticornis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 375.
foliator (Fabr.) Marsh.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 325 n. 9.
? Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 353 n. 71.
? Ichneumon petiolatus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 396 n. 9.
? Ichneumon cruentatus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 418 n. 72.
? Ichneumon petiolatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 188 n. 165.
? Ichneumon petiolatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 206 n. 3.
Ophion foliator Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 239 n. 21.
Bassus foliator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 100 n. 29.
Bassus foliator Gravenhorst, Magaz. f. Entom. IV. 1821 p. 271 n. 9, ♀ ♂.
Ichneumon foliator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 274.
Ichneumon foliator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 347.
Trachynotus foliator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 715 n. 148, ♀ ♂.
Ophion (Trachynotus) foliator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 326 n. 10.
Trachynotus foliator Westwood, Introd. mod. classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 60.
Trachynotus foliator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 24 n. 1, ♀ ♂.
Trachynotus foliator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 13 n. 1, ♀ ♂.
Trachynotus foliator Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 322 n. 3, ♀ ♂.
Trachynotus foliator Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 70, ♀ ♂.
Nototrachys foliator Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 50.
Nototrachis foliator Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 180 n. 1, ♀ ♂.
fuscatus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Cuba.
Trachynotus fuscatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 50, ♀ ♂.
Nototrachys fuscatus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 375.

---

[1]) *Lep.:* Hymenorus Doublieri (Giraud).

humeralis (Brullé) D. T. — Eur.: Graecia.
Trachynotus humeralis Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 381 n. 845; T. 51 F. 12.
Nototrachys humeralis m.
minimus Ashm. — ♀ ♂ — Am.: St. Vincent.
Nototrachys minimus Ashmead, Journ. Linn. Soc. Zool. XXV. 1894 p. 139, ♀ ♂.
niger Ashm. — ♀ ♂ — Am.: St. Vincent.
Nototrachys niger Ashmead, Journ. Linn. Soc. Zool. XXV. 1894 p. 139, ♀ ♂.
reticulatus Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Trachynotus reticulatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 285, ♂.
Nototrachys reticulatus Cresson, Synops. Hymen. N. Amer. 1887 p. 201.
texanus Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Trachynotus Texanus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 169, ♀.
Nototrachys Texanus Cresson, Synops. Hymen. N. Amer. 1887 p. 201.

PHARSALIA

Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 117.
Nom. propr.

Synon.: Ophionellus Westwood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 128; T. 24.
Ophion, nom. propr. Hymen.

fragilis (Westw.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Ophionellus fragilis Weswood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 128 n. 1; T. 24 F. 3.
Ophionellus fragilis Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 238, ♀.
Pharsalia fragilis m.
texana Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Pharsalia Texana Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 177, ♀.
virginiensis Cress. — Am.: Virginia.
Pharsalia Virginiensis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 177.

11. *Subfam.* Ophioninae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 141 & 149.

AGATHOPHIONA [1])

Westwood, Tijdschr. v. Entom. XXV. 1882 p. 19.
Agathis, nom. propr. Hymen.; Ophion, nom. propr. Hymen.

fulvicornis Westw. — Am.: Mexico.
Agathophiona fulvicornis Westwood, Tijdschr. v. Entom. XXV. 1882 p. 20 n. 2; T. 4 F. 5-13.
Agathophiona fulvicornis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48/49. 1886 p. 297 n. 1; T. 12 F. 11.

RETANISIA

Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 49. 1886 Hymen. I. p. 299.
Etymol. obscura.

facialis Cam. — ♂ — Am.: Guatemala.
Retanisia facialis Cameron, Biol. Centr-Amer. P. 49. 1886 Hymen. I. p. 299 n. 1, ♂; T. 12 F. 10.

---

[1]) Vide Vol. IV p. 145. Hoc genus, a cl. auctore Westwood generi Microdo comparatum, a cl. auctore Ashmead fam. Ichneumonidibus adscribitur.

OPHIOPTERUS

Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 153.
Ophion, nom. propr. Hymen; πτερόν, ala.

Synon.: Ophionopterus Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 87.
Ophion, nom. propr. Hymen.; πτερόν, ala.

coarctatus Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Ophiopterus coarctatus Brullé, Hist. nat. insect. Hymén. IV. 1846 p. 153 n. 1, ♀; T. 42 F. 5.
ferrugineus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ophiopterus ferruginens Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 380 n. 1, ♀.
fuscipes Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Ophiopterus fuscipes Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48. 1886 Hymen. I. p. 296 n. 1, ♀.
niger Cam. — ♂ — Am.: Mexico.
Ophiopterus niger Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48. 1886 Hymen. I. p. 296 n. 2, ♂.
striatifrons Cam. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Ophiopterus striatifrons Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 49. 1886 Hymen. I. p. 297 n. 4, ♀♂.

ALLOCAMPTUS

Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1189 [nec Förster].
ἄλλος, alter; καμπτός, flexilis.

Synon.: Enicospilus Thomson.
Ophion Gravenhorst & auct.

undulatus (Grav.) Brauns [1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania, Belgia.
Ophion undulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 697 n. 137, ♀ ♂.
? Ophion undulatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 12 n. 7, ♀♂.
Ophion undulatus Borre, Ann. Soc. entom. Belgique XV. 1872 Compt. rend. p. XCII.
Ophion undulatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 430 n. 12.
Ophion undulatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 44; T. 28 F. 4.
Ophion undulatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 178 n. 3, ♀ ♂.
Enicospilus (Allocamptus) undulatus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1189 n. 4.
Ophion undulatum Magretti, Naturaliste (2) II. 1889 p. 84.
Allocamptus undulatus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 97.
Ophion undulatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2120 n. 1.
var. **giganteus** (Rdw.) D. T. — Eur.: Germania.
Ophion undulatus var. giganteus Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 59 n. 6.
Allocamptus undulatus var. giganteus m.

HENICOSPILUS

(Stephens, Catal. Brit. Insect. 1820 p. 352 [s. descr.]).
Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 126 [Enicospilus].
ἑνικός, unicus; σπῖλος, macula.

Synon.: Allocamptus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 150 n. 7
ἄλλος, alter; καμπτός, flexilis. [[nec Thomson].
Anomalon Jurine.
Ichneumon Linné & auct.
Ophion Fabricius & auct.

---

[1]) *Lep.:* Bombyx quercus, B. spartii (Bridgman & Fitch), Lasiocampa tremulifolia Hbn. (Mocsáry), Bombyx everia, B. trifolii, B. rubi, B. quercus, B. catax (Giraud), B. trifolii (Gravenhorst), B. quercus var. spartii (Bellardi), B. spec. (Rudow), Samia cecropia (Taschenberg), ? Taeniocampa gothica (Harris).

albiger Kriechb. — ♀ — Afr.: Delagoa Bay. [n. 21, ♀.
Ophion (Henicospilus) albiger Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 308
anceps Tosqu. — ♂ — Afr.: Togo.
Ophion (Enicospilus) anceps Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 392 n. 14, ♂.
biimpressus Brullé — ♀ — Afr. mer.
Ophion biimpressus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 148 n. 23.
Ophion (Enicospilus) biimpressus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 380 n. 7, ♀.
bipartitus Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Ophion (Enicospilus) bipartitus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 377 n. 5, ♀.
braunsii Kriechb. — ♀ — Afr. occ. [n. 16, ♀.
Ophion (Henicospilus) Braunsi Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 53
ceylonicus Cam. — ♀ — As.: Trincomali.
Enicospilus Ceylonicus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 23, ♀.
combustus (Grav.) Steph. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Ophion combustus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 701 n. 140, ♂.
Enicospilus combustus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Suppl. 1846 p. 3; T. 40 F. 4.
Ophion combustus Stuvely, Trans. Linn. Soc. London XXIII. 1. 1860; T. 16 F. 18.
Henicospilus combustus Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 176 n. 1, ♀ ♂.
Enicospilus combustus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 96 n. 5.
concolor (Cress.) Cam. — ♀ — Am.: Cuba.
Ophion concolor Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 56, ♀.
Ophion (Enicospilus) concolor Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48. 1886 Hymen. I. p. 291 n. 2;
Enicospilus concolor Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 271. [T. 12 F. 24.
dolosus Tosqu. — ♀ — Afr.: Aegyptus.
Ophion (Enicospilus) dolosus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 389 n. 12, ♀.
dubius Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Togo.
Ophion (Enicospilus) dubius Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 390 n. 13, ♀ ♂.
expeditus Tosqu. — ♀ — Afr.: Togo.
Ophion (Enicospilus) expeditus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 385 n. 10, ♀.
flavoscutellatus (Brullé) Cam. — Am. centr., Brasilia.
Ophion flavoscutellatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 140 n. 6.
Ophion (Enicospilus) flavoscutellatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48. 1886 Hymen. I. [p. 291 n. 4; T. 12 F. 25.
Ophion thoracicus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48. 1886 Hymen. I. p. 291 n. 4; T. 12 F. 25.
flavus (Fabr.) Cam. — ♀ ♂ — Am. centr.
Ichneumon flavus Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 341 n. 76.
Ichneumon flavus Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 436 n. 96.
Ichneumon flavus Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 268 n. 114.
Ichneumon flavus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2707 n. 178.
Ichneumon flavus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 360.
Ichneumon flavus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 196 n. 157.
Ichneumon flavus Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 179 n. 188.
Ophion flavus Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 236 n. 3.
Ophion flavus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 131 n. 4.
Ophion flavus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 509 n. 5.
Ichneumon flavarius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon flavarius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 314.
Ophion flavus Guérin & Percheron, Gen. des Insect. livr. 2 H. 7 1835 T. 3.
Ophion flavus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 139 n. 3, ♀.
Ophion flavus Guérin, Ramon Sagra: Hist. fis. Cuba VII. 1857 p. 753.

Ophion flavus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 57. [T. 12 F. 21.
Ophion (Enicospilus) flavus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48. 1886 Hymén. I. p. 292 n. 6;
Enicospilus flavus Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 270 n. 181.

fuscicornis Cam. — Am.: Guatemala.
Ophion (Eniscopilus) fuscicornis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48. 1886 Hymen. I. p. 291 n. 5.

guatemalensis Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [p. 293 n. 9, ♀; T. 12 F. 22.
Ophion (Eniscopilus) Guatemalensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48. 1886 Hymen. I.

infuscatus Tosqu. — ♂ — Afr.: Togo.
Ophion (Allocamptus) infuscatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 373 n. 3, ♂.

kriechbaumeri D. T. — ♀ — Afr.: Sansibar.
Ophion (Henicospilus) rufus Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 307
Ophion (Henicospilus) Kriechbaumeri m. [n. 19, ♀ [non Brullé].

leionotus Tosqu. — ♀ — Afr.: Togo.
Ophion (Enicospilus) leionotus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 393 n. 15, ♀.

longescutellaris Kriechb. — ♀ — Afr. occ. [p. 308 n. 20, ♀.
Ophion (Henicospilus) longescutellatus Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894

maculipennis Cam. — ♀ — Am.: Panama. [n. 8, ♀; T. 12 F. 29.
Ophion (Eniscopilus) maculipennis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48. 1886 Hymen. I. p. 292

merdarius (Grav.) Steph.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ophion merdarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 698 n. 138, ♀ ♂.
Enicospilus merdarius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 126; T. 40 F. 4.
Ophion merdarius Curtis, Brit. Entom. XIII. 1836 p. 600 n. 2.
Ichneumon (Ophion) merdarius Ratzeburg, Forstinsecten III. 1844 p. 26 n. 13; T. 6 F. 8.
Ophion merdarius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 101 n. 1, ♀ ♂.
Ophion merdarius Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 321 n. 2.
Ophion (Enicospilus) merdarius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) [p. 11 n. 1, ♀ ♂.
Ophion merdarius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 435 n. 22.
Ophion merdarius Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 44; T. 28 F. 5.
Henicospilus merdarius Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 177 n. 1, ♀ ♂.
Henicospilus merdarius Bignell, Entomologist XX. 1887 p. 19.
Enicospilus merdarius Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1188 n. 2.
Enicospilus merdarius Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 96 n. 7.

mexicanus (Cress.) Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Ophion Mexicanus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 374 n. 1, ♀.
Ophion (Enicospilus) Mexicanus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48. 1886 Hymen. I. p. 290 [n. 1, ♀; T. 12 F. 23.

monostigma (Voll.) Brauns — Eur. centr.
Ophion monostigma Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 62; T. 39 F. 8.
Enicospilus monostigma Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 95 n. 1.

monticola Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [n. 7, ♀; T. 12 F. 28.
Ophion (Enicospilus) monticola Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48. 1886 Hymen. I. p. 292

pellucidus Kriechb. — ♀ — Afr.: Camerun. [n. 17, ♀.
Ophion (Henicospilus) pellucidus Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 54

---

[1]) *Lep.:* Trachea piniperda (Ratzeburg), Dianthoecia irregularis, D. echii (Brischke), Hecatera dysodea (Giraud), Cucullia argentea (Brischke), Grammodes algira, Pseudophia tirrhoea (Kriechbaumer), ? Samia cecropia (Taschenberg), Cucullia chrysanthemi, Dianthoecia albimacula, Simyra nervosa (Mocsáry), Hecatera serena (Bignell).

ramidulus (L.) Steph.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Aldrovandi, De anim. insect. 1602 T. 7 F. 1.
—— Rajus, Hist. Insect. 1710 p. 253 n. 7.
—— Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 969.
Ichneumon ramidulus Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 566 n. 52.
Ichneumon ramidulus Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 407 n. 1629.
Sphex truncata Poda, Insect. mus. Graec. 1761 p. 107 n. 5.
Ichneumon spec. Gronov, Acta Helvet. V. 1762 p. 152 n. 391.
Sphex truncata Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 290 n. 768; T. 41 F. 768.
Ichneumon ramidulus Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 938 n. 56.
Ichneumon ramidulus Berkenhout, Outlin. Nat. Hist. Gr. Britain I. 1769 p. 166 n. 12.
Ichneumon ramidulus Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 857 n. 56; T. 26 F. 7.
Ichneumon ramidulus O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 158 n. 1844.
Ichneumon ramidulus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 372 n. 751, ♀ ♂.
Ichneumon ramidulus Villers, C. Linnaei Entom. II. 1789 p. 198 n. 207.
Ichneumon ramidulus Gmélin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2710 n. 56.
Ichneumon ramidulus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 341; T. 34 F. 3.
Ichneumon truncatus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 365.
Ichneumon ramidulus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 198 n. 173.
Ichneumon ramidulus Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 178 n. 187.
Ophion ramidulus Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 236 n. 2.
Ichneumon ramidulus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 263 n. 2054, ♀ ♂.
Ophion ramidulus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 131 n. 2.
Anomalon ramidulum Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 116.
Ophion ramidulus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 509 n. 3.
Ophion ramidulum Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX 1818 p. 296.
Ichneumon ramidulus Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon ramidulus Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 314.
Ophion ramidulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 699 n. 139, ♀ ♂.
Ophion ramidulus Curtis, Brit. Entom. XIII. 1836 p. 600 n. 3.
Ophion ramidulus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 392 n. 3, ♀ ♂.
Ophion ramidulus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 102 n. 2.
Enicospilus ramidulus Stephens, Illustr. Suppl. 1846 p. 3.
Ophion ramidulus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 79 n. 2.
Ophion (Enicospilus) ramidulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) [p. 11 n. 2, ♀ ♂.
Ophion ramidulus Duméril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 895 n. 2.
Ophion ramidulus Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 44; T. 28 F. 6.
Ophion ramidulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 134, ♀ ♂.
Henicospilus ramidulus Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 177 n. 2, ♀ ♂.
Enicospilus ramidulus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1188 n. 1, ♀ ♂.
Enicospilus ramidulus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 96 n. 6.

repentinus (Holmgr.) Bridgm. & Fitch — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ophion repentinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 11 n. 3, ♀ ♂
Ophion repentinus Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 62; T. 39 F. 6.
Henicospilus repentinus Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 177 n. 4, ♀ ♂.
Enicospilus repentinus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1189 n. 3.
Enicospilus repentinus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 96 n. 2.

---

[1]) *Lep.:* Poecilocampa populi (Rondani), Eriogaster lanestris (Scopoli), Dipterygia pinastri (Drewsen), Trachea piniperda (Hartig), Dianthoecia capsincola (Giraud), Hadena pisi (Gravenhorst, Bignell).

reticulatus Cam. — ♀ — As.: India.
Enicospilus reticulatus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 102, ♀.
rubens Tosqu. — ♀ — Afr.: Togo.
Ophion (Enicospilus) rubens Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 382 n. 8, ♀.
rufus (Brullé) Tosqu. — ♀ — As. mer. & ins.; Afr. mer.
Ophion rufus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 149 n. 24.
Paniscus perforator Smith, Ann. & Mag. Nat. Hist. (4) XVII. 1876 p. 449, ♀.
Ophion rufus Smith, Philos. Trans. Roy. Soc. CLXVIII. 1879 p. 537.
Ophion (Enicospilus) rufus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 378 n. 6, ♀.
senescens Tosqu. — ♂ — Afr.: Togo.
Ophion (Allocamptus) senescens Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 375 n. 4, ♂.
sericatus Tosq. — ♂ — Afr.: Scioa.
Ophion (Enicospilus) sericatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 384 n. 9, ♂.
striatus Cam. — As.: India.
Enicospilus striatus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 103.
thoracicus (Cress.) Cam. — Am.: Cuba.
Ophion thoracicus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 55.
Ophion (Enicospilus) thoracicus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48. 1886 Hymen. I. p. 291 n. 3.
Enicospilus thoracicus Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 271.
tournieri (Vollenh.) Brauns — Eur. centr.
Ophion repentinus Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 44; T. 28 F. 7 [non Holmgr.].
Ophion Tournieri Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 61.
Enicospilus Tournieri Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 96 n. 3.
trimaculatus Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Togo.
Ophion (Enicospilus) trimaculatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 395 n. 16, ♀♂.
unicallosus (Vollenh.) Brauns — ♀ — Eur.: Gallia.
Ophion unicallosus Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXI. 1878 p. 167 n. 14, ♀; T. 10 F. 4 & 4a.
Ophion unicallosus Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 62; T. 39 F. 7.
Enicospilosus unicallosus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 96 n. 4.
vecors Tosqu. — ♂ — Afr.: Cap.
Ophion (Enicospilus) vecors Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 387 n. 11, ♂.

EREMOTYLUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 150 n. 8.
ἐρῆμος, desertus; τύλος, callus.

Synon.: Anomalon Jurine.
Ophion Gravenhorst & auct.

arctiae Ashm. — ♀ ♂ — Am.: Washington Terr., Missouri, New York, Alabama, California.
Eremotylus arctiae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 192, ♀ ♂.
marginatus (Jur.) Brauns — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Anomalon marginatum Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 116, ♀; T. 8 F. 2b.
Ophion marginatum Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 296.
Ophion marginatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 704 n. 142, ♀ ♂.
Ophion marginatus Curtis, Brit. Entom. XIII. 1836 p. 600 n. 4.
Ophion marginatus Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 409; T. 65 F. 6.
Ophion marginatum Curtis, Farm Insects 1860 p. 600, ♀ ♂.
Ophion marginatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 428 n. 9.
Ophion marginatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 135, ♀.
Ophion marginatum Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 178 n. 5, ♀ ♂.
Ophion marginatus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1193 n. 8.
Eremotylus marginatus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 98.

PYCNOPHION

Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 87.
πυκνός, densus; Ophion, nom. propr. Hymen.

molokaiensis Ashm. — Patria?
Pycnophion Molokaiensis Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 87 [s. descr.].

BANCHOGASTRA

Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 87.
Banchus, nom. propr. Hymen.; γαστήρ, venter.

nigra Ashm. — Patria?
Banchogastra nigra Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 87 [s. descr.].

ATYHREODON

Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 87.
ἀ-, Thyreodon, nom. propr. Hymen.

thoracicus Ashm. — Patria?
Athyreodon thoracicus Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 87 [s. descr.].

THYREODON

Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 150.
θυρεός, scutum; ὀδούς, dens.

Synon.: Ichneumon Fabricius & auct.
Ophion Fabricius & auct.

affinis Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Thyreodon affinis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 46, ♂.
cyaneus Brullé — ♀ ♂ — Am. mer.
Ophion morio Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 168 n. 22, ♀ [non Fabricius].
Thyreodon cyaneus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 151 n. 1, ♀♂; T. 42 F. 3.
elegans Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Thyreodon elegans Cresson, Proc. entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 47, ♀.
erythrocerus Cam. — Am.: Mexico.
Thyreodon erythrocera Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 288 n. 2; T. 12 F. 13.
flammipennis Ashm. — ♀ — Am.: California.
Thyreodon flammipennis Ashmead, Proc. Californ. Acad. IV. 1894 p. 125 n. 10, ♀.
fulvescens Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Thyreodon fulvescens Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 46, ♂.
grandis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Cuba.
Thyreodon grandis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 45, ♀ ♂.
grenadensis Ashm. — ♀ — Am.: Grenada.
Thyreodon Grenadensis Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 270 n. 179, ♀.
laticinctus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Thyreodon laticinctus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 376 n. 3, ♀.
Thyreodon laticinctus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48. 1886 Hymen. I. p. 289 n. 5, ♀; T. 12 [F. 14.
maculipennis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Thyreodon maculipennis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 375 n. 2, ♀♂.
marginipennis Brullé — ♀ ♂ — Am.: Uruguay, Argentinia.
Thyreodon marginipennis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 152 n. 3, ♂.
Thyreodon marginipenne Holmberg, Anal. soc. cient. Argent. XVIII. P. 5. 1884 p. 227 n. 37, ♀♂.

morio (Fabr.) Brullé [1]) — ♀ — Am.
Ichneumon morio Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 436 n. 100.
Ichneumon morio Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 269 n. 118.
Ichneumon morio Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ᵃ I. 5. 1790 p. 2709 n. 182.
Ichneumon morio Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 196 n. 161.
Ichneumon morio Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 180 n. 194.
Ophion morio Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 237 n. 8.
Ophion morio Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 132 n. 9.
Ophion morio Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 511 n. 14.
Ophion atricolor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 511 n. 15.
Ichneumon morio Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 272.
Ichneumon morio Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 341.
Thyreodon morio Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 152 n. 2, ♀.
Thyreodon morio Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 359 n. 7.
Thyreodon morio Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 170.
Thyreodon morio Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 119, ♀.
Thyreodon morio Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 352, ♀.

morosus Smith — ♀ — Am.: Costa Rica.
Thyreodon morosus Smith, Descr. New Spec. Hymen. 1879 p. 230 n. 1, ♀.
Thyreodon morosus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48. 1886 Hymen. I. p. 289 n. 3.

niger Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Thyreodon niger Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 375 n. 1, ♀ ♂.
Thyreodon niger Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 288 n. 1, ♀ ♂; T. 12 F. 12.

ornatipennis Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Thyreodon ornatipennis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 376 n. 4, ♀.

principalis Smith — ♀ — Am.: Costa Rica.
Thyreodon principalis Smith, Descr. New Spec. Hymen. 1879 p. 230 n. 2, ♀.

purpurascens Smith — ♀ — As.: Japonia.
Thyreodon purpurascens Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 395 n. 1, ♀.

rufithorax Cam. — ♀ — Am.: Panama. [F. 15.
Thyreodon rufithorax Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 49. 1886 Hymen. I. p. 290 n. 7, ♀; T. 12

texanus Ashm. — ♂ — Am.: Texas.
Thyreodon Texanus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 422, ♂.

PLEURONEUROPHION

Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 86.
πλευρά, costa; *νεῦρα*, nervus; Ophion, nom. propr. Hymen.

hawaiensis Ashm. — Austr.: Ins. Hawaiens.
Pleuroneurophion Hawaiensis Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 86 [s. descr.].

DICTYONOTUS

Kriechbaumer, Sickmann: Zool. Jahrb. System. VIII. 1894 p. 198.
δίκτυον, rete; *νῶτος*, dorsum.

Synon.: Ophion Sickmann.

melanarius Sickm. — ♀ ♂ — As.: China. [p. 197, ♀ ♂.
Ophion (Dictyonotus) melanarius Kriechbaumer, Sickmann: Zool. Jahrb. System. VIII. 1894

---

[1]) *Lep.:* Sphinx coniferarum Abb. (Ashmead).

DISPILUS

Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 309.
δίς, bis; σπῖλος, macula.

Synon.: Ophion Kriechbaumer.

natalensis Kriechb. — ♀ — Afr.: Natal. [n. 22, ♀.
Ophion (Dispilus) Natalensis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 309

STAUROPOCTONUS

Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 93 n. 5.
Stauropus, nom. propr. Lepidopt; κτείνω, neco.

Synon.: Ophion Gravenhorst, Brischke, Bridgman.

bombycivorus (Grav.) Brauns[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Ophion bombycivorus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 705 n. 143, ♀.
Ophion bombycivorus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 135, ♀ ♂.
Ophion bombycivorus Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 178 n. 6, ♀ ♂.
Stauropoctonus bombycivorus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 94.

BARYCEPHALUS

Brauns, Termész. Füzet. XVIII. 1895 p. 43.
βαρύς, gravis; κεφαλή, caput.

mocsaryi Brauns — ♂ — Eur.: Hungaria.
Barycephalus Mocsáryi Brauns, Termész. Füzet. XVIII. 1895 p. 43 n. 3, ♂.
seminiger Brauns — ♀ — Eur.: Hungaria.
Barycephalus seminiger Brauns, Termész. Füzet. XVIII. 1895 p. 44 n. 4, ♀.

OPHION

Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 210 & 235.
ὀφίων, animal fabulosum.

Synon.: Ichneumon Linné & auct ant.
Paniscus Schrank.

aciculatus Taschbg. — ♀ — As.: Java.
Ophion aciculatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 434 n. 20, ♀.
adustus Hall. — Eur.: Helvetia.
Ophion adustus Haller, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VII. P. 4. 1885 p. 200.
aggressor Fabr. — Eur.: Selandia.
Ophion aggressor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 132 n. 8.
Ophion aggressor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 510 n. 13.
Ichneumon aggressor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon aggressor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 321.
Ophion aggressor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1072 n. 302.
albigena Taschbg. — Patria?
Ophion albigena Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 431 n. 14.
albopictus Smith — ♀ — As.: Turcestania.
Ophion albopictus Smith, Scient. Res. 2d Yarkand Miss. 1878 p. 22 n. 63, ♀.
Ophion albipictus Waterhouse, Aid Ident. Insects P. 25. 1885; T. 162 F. 4.

---

[1]) *Lep.:* Stauropus fagi (Gravenhorst).

ancyloneurus Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [F. 17.
Ophion ancyloneura Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48. 1886 Hymen. I. p. 294 n. 13, ♀; T. 12
angustatus Brullé — Afr.: Ile de France.
Ophion angustatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 148 n. 22.
arcuatus Brullé — As.: China.
Ophion arcuatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 146 n. 18.
areolaris Brauns — Eur.: Germania.
Ophion areolaris Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 92 n. 12.
areolatus Cam. — As.: India.
Ophion areolatus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 101.
artemisiae Boie[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ophion artemisiae Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 107 n. 50, ♀ ♂.
atriventris Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ophion atriventris Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 374 n. 4, ♀.
austro-caledonicus Montr. — Austr.: New Caledonia.
Ophion austro-caledonicus Montrouzier, Ann. soc. Linn. Lyon N. S. XI. 1864 p. 248.
bedeguaris Panz. — Eur.: Germania.
Ophion bedeguaris Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 P. 107 T. 9.
biangularis Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Ophion biangularis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 432 n. 17, ♀.
bicolor Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Ophion bicolor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 434 n. 19, ♀.
bifoveolatus Brullé — ♀ ♂ — Am. bor.
Ophion bifoveolatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 138 n. 2.
Ophion bifoveolatus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 358 n. 5, ♀ ♂.
Ophion bifoveolatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 118^b n. 4, ♀ ♂.
Ophion bifoveolatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 351 n. 4, ♀ ♂.
bilineatus Say[2]) — ♀ ♂ — Am. bor.
Ophion bilineatus Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 75 n. 1.
Ophion bilineatus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 240 n. 4.
Ophion bilineatus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 378 n. 1.
Ophion bilineatus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 695 n. 4.
Ophion bilineatus Riley, 3th Ann. Rep. Insect. Missouri 1871 p. 69.
Ophion bilineatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 117^b n. 3, ♀ ♂; F. 3^c & 4^a.
Ophion bilineatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 351 n. 3, ♀ ♂; F. 26.
Ophion bilineatus Howard, Scudder: Butterflies U. S. 1889 p. 1880; T. 88 F. 8.
brachiator Say — Am.: Indiana.
Ophion brachiator Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 240 n. 5.
Ophion brachiator Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 695 n. 5.
cameronii D. T. — ♀ — Am.: Guatemala.
Ophion curvinervis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48. 1886 Hymen. I. p. 293 n. 10, ♀; T. 12
Ophion Cameronii m. [F. 19 [non Kriechbaumer].
chilensis Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Ophion Chinensis Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 515 n. 1, ♀.
chiriquensis Cam. — ♀ — Am.: Panama. [F. 20.
Ophion Chiriquensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48. 1886 Hymen. I. p. 294 n. 11, ♀; T. 12
clathratus Brullé — Am.: Guyana.
Ophion clathratus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 139 n. 5.

---

1) *Lep.:* Cucullia artemisiae (Rondani).
2) *Lep.:* Epargyreus tityrus (Howard), Agrotis Morrisoniana (Riley).

coarctatus Brullé — Austr.
Ophion coarctatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 146 n. 20.
compensator Fabr. — Eur.
Ichneumon compensator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 176 n. 176.
Ophion compensator Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 238 n. 16.
Ophion compensator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 74 n. 8.
Ophion compensator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 139 n. 41. [p. 957 n. 5.
Ichneumon compensator Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805
Ophion compensator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 515 n. 50.
Ichneumon compensator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon compensator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 320.
Ophion compensator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1045 n. 258.
costalis Cress. — ♀ — Am.: California.
Ophion costale Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 366, ♀.
costatus Ratzbg.[1]) — ♀ — Eur.: Germania.
Ophion costatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 79 n. 6, ♀.
Ophion costatus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 88 n. 1.
cubensis Nort. — ♀ — Am.: Cuba.
Ophion Cubensis Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 358 n. 2, ♀.
Ophion Cubensis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 57.
curvinervis Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria. [[p. p.].
Ophion undulatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 12 n. 7, ♀♂
Ophion curvinervis Kriechbaumer, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 249 n. 1, ♀.
Ophion curvinervis, Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 61; T. 39 F. 3.
dentator Fabr. — Am. mer.
Ophion dentator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 138 n. 36.
Ophion dentator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 514 n. 45.
Ichneumon dentator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 272.
Ichneumon dentator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 341.
dentatus Smith — ♀ — As.: Kashmir.
Ophion dentatus Smith, Scient. Res. 2d Yarkand Miss. 1878 p. 22 n. 62, ♀.
Ophion dentatus Waterhouse, Aid Ident. Insects P. 25. 1885; T. 162 F. 3.
dichromopterus Costa — ♀ — Eur.: Sardinia.
Ophion dichromopterus A. Costa, Rend. accad. sc. fis. & matem. Napoli XXIV. 1886 p. 324, ♀.
Ophion dichromopterus A. Costa, Atti accad. sc. fis. & matem. Napoli (2) II. (7) 1886 p. 17, ♀.
Ophion dichromopterus Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 114, ♀.
dimidiator Fabr. — Am. mer.
Ophion dimidiator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 136 n. 31.
Ophion dimidiator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 514 n. 38.
Ichneumon demidator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon demidator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 314.
dispar Brauns — ♂ — Eur.: Helvetia, Hungaria.
Ophion dispar Brauns, Termész. Füzet. XVII. 1895 p. 42 n. 1, ♂.
distans Thoms.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Ophion distans Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1191 n. 3, ♀ ♂.
Ophion distans Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 91 n. 6.
Ophion distans Bridgman, Trans. Entom Soc. London 1889 p. 419.

---

[1]) *Lep.:* Acronycta aceris (Ratzeburg), Noctua formosa (Brauns).
[2]) *Lep.:* Dianthoecia irregularis (Bridgman).

dositheae Audouin [1]) — ♀ — Eur.: Gallia.
Ophion dositheae Audouin, Ann. soc. entom. France III. 1834 p. 425-427, ♀; T. 1 F. 6-12.
erigator Fabr. — Eur.
Ichneumon erigator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 175 n. 174.
Ophion erigator Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 238 n. 14.
Ophion erigator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 73 n. 7.
Ophion erigator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 139 n. 38.
Ophion erigator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 515 n. 47.
Ichneumon erigator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon erigator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 321.
Ophion erigator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1045 n. 257.
extenuator Fabr. — Am. mer.
Ophion extenuator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 137 n. 35.
Ophion extenuator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 514 n. 44.
Ichneumon extenuator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon extenuator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 321.
fabricator Oliv. — Eur.: Gallia.
Ophion fabricator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 510 n. 9.
fallax Oliv. — Eur.: Gallia.
Ophion fallax Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 509 n. 7.
femoratus Oliv. — Patria?
Ophion femoratus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 517 n. 57.
fenestratus Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Ophion fenestratus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 425 n. 4, ♀.
ferrugineus Smith — Austr.: New Zealand.
Ophion ferrugineus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1878 p. 2.
Ophion ferrugineus Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 125.
ferrugineus Fabr.! — Eur.
Ichneumon ferrugineus Fabricius, Entom. system. IV. 1794 p. 456 n. 188-189.
Ichneumon ferrugineus Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 228 n. 189-190.
Ophion ferrugineus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 131 n. 3.
Ophion ferrugineus Olivier, Encyl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 509 n. 6.
Ichneumon ferrugineus Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon ferrugineus Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 315.
Ophion ferrugineus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1091 n. 337.
Ophion ferrugineus Duméril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 895 n. 3.
flagellator Fabr. — Eur.
Ichneumon flagellator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 176 n. 178.
Ophion flagellator Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 239 n. 18.
Ophion flagellator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 139 n. 43.
Ophion flagellator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 516 n. 52.
Ichneumon flagellator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon flagellator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 319.
Ophion flagellator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1046 n. 259.
flaviceps Brullé — Am.: Brasilia.
Ophion flaviceps Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 142 n. 10.
flavidus Brullé — Am.: Brasilia.
Ophion flavidus Brullé, Hist. nat. Insect Hymén. IV. 1846 p. 143 n. 12.

---

[1]) *Lep.:* Dosythea scutellaria (Audouin).

flavifrons Fabr. — Eur.: Italia.
Ophion flavifrons Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 237 n. 9.
Ophion flavifrons Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 133 n. 10.
Ophion flavifrons Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 511 n. 16.
Ichneumon flavifrontator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon flavifrontator Thunberg, Mém. acad. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 321.
• Ophion flavifrons Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1088 n. 332.
flavofuscus Brullé — Am.: Brasilia.
Ophion flavofuscus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 139 n. 4.
flavolineatus Brullé — Austr.: Nova Guinea.
Ophion flavolineatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 147 n. 21.
flavoorbitalis Cam. — ♀ — Am.: Mexico, Panama. [F. 16.
Ophion flavoorbitalis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48. 1886 Hymen. I. p. 294 n. 12, ♀; T. 12
flavopictus Smith — ♀ — As.: Japonica.
Ophion flavopictus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 397 n. 2, ♀.
flavorufus Brullé — Am. mer.
Ophion flavorufus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 144 n. 14.
fomentator (L.) Fabr. — Eur. bor.
Ichneumon fomentator Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 936 n. 46.
Ichneumon fomentarius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 338 n. 64.
Ichneumon fomentator Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 855 n. 46.
Ichneumon fomentator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 433 n. 83.
Ichneumon fomentator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 267 n. 99.
Ichneumon fomentator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 171 n. 111.
Ichneumon fomentator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2694 n. 46.
Ichneumon fomentator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 374.
Ichneumon fomentator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 191 n. 137.
Ichneumon fomentator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 170 n. 154.
Ophion fomentator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 136 n. 26.
Ophion fomentator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 513 n. 32.
Ichneumon fomentator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 266.
Ichneumon fomentator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 322.
Ichneumon fomentator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1052 n. 267.
frustrator Oliv. — Eur.: Gallia.
Ophion frustrator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 516 n. 53.
fuscator Panz. — ♀ — Eur.: Germania.
Ophion fuscator Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 P. 102 T. 22.
Ichneumon fuscator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 931 n. 81, ♀.
fuscicornis Er. — Austr.: Tasmania.
Ophion fuscicornis Erichson, Arch. f. Naturg. VIII. 1. 1884 p. 257 n. 225.
fuscomaculatus Cam. — As.: India.
Ophion fuscomaculatus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 99.
generator Fabr.[1]) — As.: India or.
Ophion generator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 135 n. 25.
Ophion generator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 513 n. 31.
Ichneumon generator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon generator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 307.
Ichneumon generator Vallot, Mém. acad. sc. Dijon 1836 p. 244.

---

[1]) *Lep.:* Noctua persicariae (Vallot).

glabratus Say[1]) — Am.: Indiana.
Ophion glabratus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 239 n. 2.
Ophion glabratus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 695 n. 2.
gracilis Oliv. — Eur.: Gallia.
Ophion gracilis Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 514 n. 41.
holosericeus Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Ophion holosericeus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 427 n. 8, ♀.
inflexus Ratzbg.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ophion inflexus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 102 n. 3, ♀.
Ophion inflexus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 80 n. 3.
Ophion inflexus Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879; T. 39 F. 4.
Ophion inflexus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 135, ♀ ♂.
infuscatus Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Ophion infuscatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 429 n. 11.
insinuator Smith — ♀ — As.: Kaisaa.
Ophion insinuator Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. (V. 1860) p. 141 n. 3, ♀.
insularis Kby. — Austr.: New Zealand.
Ophion insularis W. F. Kirby, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 46 n. 62.
Ophion insularis W. F. Kirby, New Zealand Journ. of Sc. II. 1884 p. 73 n. 62.
insulicola D. T. — ♀ — Austr.: New Zealand.
Ophion inutilis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1878 p. 2 [non 1876].
Ophion inutilis Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 125, ♀.
Ophion insulicola m.
intricatus Brullé — Am.: Chile.
Ophion intricatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 143 n. 13.
inutilis Smith — ♀ — Austr.: New Zealand.
Ophion inutilis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 478, ♀.
Ophion inutilis Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 124, ♀.
iridipennis Smith — ♀ — As.: Borneo, Java.
Ophion iridipennis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 121 n. 1, ♀.
Ophion iridipennis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 431 n. 15.
latipennis Kby. — Austr.: Ogové.
Ophion latipenne Kirby, Ann. & Mus. Nat. Hist. (6) XVIII. 1896 p. 263; T. 12 F. 6.
lativertex Taschbg. — ♀ — As.: Java.
Ophion lativertex Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 435 n. 21, ♀.
leucocotis Tosqu. — ♂ — Afr.: Cap.
Ophion leucocotis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 372 n. 2, ♂.
lineator Oliv. — Eur.: Gallia.
Ophion lineator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 510 n. 11.
lineatus Cam. — Austr.: Ins. Hawaienses.
Ophion lineatus Cameron, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 192.
longicornis Brauns — Eur.: Germania.
Ophion longicornis Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. p. 92 n. 10.
longigena Thoms.[3]) — Eur.: Britannia, Suecia.
Ophion longigena Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1191 n. 2.
Ophion longigena Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 90 n. 5.
Ophion longigena Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 419.

---

1) *Lep.:* Hyphantria cunea (Ashmead).
2) *Lep.:* Eriogaster lanestris (Ratzeburg).
3) *Lep.:* Cucullia scrophulariae (Bridgman), C. formosa, C. chamomillae (Mocsáry).

luteus (L.) Fabr.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Gödart, Metam. & hist. nat. Insect. II. 1662 p. 135; F. 37.
—— Lister, Gödartus: De Insect. 1685 p. 61; Fig. 20c.
—— Rajus, Hist. Insect. 1710 p. 253 n. 6.
—— Albin, Nat. Hist. Engl. Insects 1720; T. 11.
—— Linné, Acta soc. sc. Upsal. IV. 1736 p. 125 n. 15.
—— Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 967.
—— Bonnet, Mém. acad. sc. sav. étrang. Paris II. 1755 p. 281-282.
Ichneumon luteus Linné, Syst. nat. Ed. 10a I. 1758 p. 566 n. 51.
Ichneumon luteus Brünnich, Prodr. insectol. Siaelland 1761 p. 18.
Ichneumon luteus Linné, Fauna Suec. Ed. 2a 1761 p. 407 n. 1628.
Ichneumon luteus Sulzer, Kennz. d. Insect. 1761 p. 49; T. 18 F. 118.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 330 n. 21.
Ichneumon vinulae Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 286 n. 755; T. 41 F. 755.
Ichneumon luteus O. F. Müller, Fauna Insect. Fridrichsdal 1764 p. 71 n. 620.
Ichneumon luteus Ström, Trondhiemske Selsk. Skrift. III. 1765 p. 390 & 422 n. 47.
—— Harris, Aurelian 1766 T. 7.
Ichneumon I Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1. 1766 T. 1 F. 10.
Ichneumon luteus Linné, Syst. nat. Ed. 12a I. 2. 1767 p. 937 n. 55.
Ichneumon luteus Berkenhout, Outlin. Nat. Hist. Gr. Britain I. 1769 p. 166 n. 11.
—— Degeer, Mém. hist. Insect. II. 1. 1771 p. 850 n. 5; T. 29 F. 15-26.
Ichneumon luteus Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 341 n. 75.
Ichneumon luteus Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 857 n. 55.
Ichneumon luteus O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 158 n. 1843.
Ichneumon luteus Sulzer, Abgek. Gesch. Insect. 1776 p. 190.
Ichneumon luteus J. B. Fischer, Naturg. v. Livland 1778 p. 159 n. 393.
—— Götze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 169 n. 5; T. 29 F. 15-26.
Ichneumon luteus Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 435 n. 95.
Ichneumon fulvus Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 68 n. 271.
Ichneumon luteus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 400 n. 21.
Ichneumon luteus Petagna, Specim. Insect. ult. Calabr. 1786 p. 31 n. 159.
Ichneumon luteus Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 268 n. 113.
Ichneumon luteus Razoumowski, Hist. nat. Jorat. I. 1. 1789 p. 215 n. 249.
Ichneumon luteus Römer, Gen. Insect. 1789 p. 58; T. 35 F. 5.
Ichneumon luteus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 198 n. 206.
Ichneumon luteus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2706 n. 55.
Ichneumon luteus americana Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 358; T. 37 F. 5.
Ichneumon luteus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 359; T. 37 F. 6.
Ichneumon vinulae Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 367.
Ichneumon luteus J. B. Fischer, Vers. Naturg. Lievland Ed. 2a 1791 p. 342 n. 783.

---

[1]) *Lep.:* Sesia formicaeformis (Brischke), Chelonia villica (Degeer), Bombyx pini (Ratzeburg), B. quercus (Marshall), Demas coryli, Dicranura bifida (Brischke), D. vinula (Degeer, Gravenhorst), Cymatophora flavicornis, Acronycta aceris (Brischke, A. leporina (Bignell), Leucania lithargyria (Butler), Dipterygia pinastri (Drewsen & Boie), Agrotis praecox (Gravenhorst, Bignell), Trachea piniperda (Ratzeburg), Taeniocampa populeti (Bignell), T. munda (Giraud), Dianthoecia capsincola (Marshall), D. cucubali (Drewsen & Boie, Marshall), Miselia oxyacanthae (Bignell), Hadena pisi (Marshall), Cucullia verbasci (Giraud), C. scrophulariae (Brischke), C. absynthii (Müller, Brischke), C. chamomillae, C. artemisiae (Giraud, Brischke), C. argentea, C. thapsiphaga, C. mixta, C. abrotani (Brischke), C. argentina Hufn. (Mocsáry).

Ichneumon luteus Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 178 n. 186.
Ichneumon luteus Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 164 n. 507.
Ophion luteus Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 235 n. 1.
Ichneumon luteus Dwigubsky, Prim. faun. Mosquens. 1802 p. 166 n. 579.
Ichneumon (Paniscus) luteus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 316.
Ophion luteum Schrökenstein, Verz. d. Halbkäfer etc. 1802 p. 29 n. 94.
Ophion luteus Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 72 n. 1.
Ophion luteus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 130 n. 1.
Ichneumon luteus C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- u. Baumhölzer I. 2-3. 1805 p. 64.
Ichneumon luteus Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 183 n. 18; T. 100 F. 3.
Joppa lutea Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 66.
Ichneumon (Ophion) luteus Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 7.
Ophion luteum Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 508 n. 1.
Ophion luteum Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 296.
Ichneumon luteus Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon luteus Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 315.
Ophion luteus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 692 n. 136, ♀ ♂.
Ophion luteus Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 380 n. 836.
Ophion vinulae Dale, Magaz. of Nat. Hist. VII. 1834 p. 60.
Ophion luteus Curtis, Brit. Entom. XIII. 1836 p. 600 n. 1, ♀ ♂.
Ophion luteum Boie, Arch. f. Naturg. II. 1. 1836 p. 39 n. 3, ♀ ♂.
Ophion luteus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 392 n. 1, ♀ ♂.
Ophion luteum Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 325 n. 7.
Ophion luteus Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 60.
Ophion luteus Schiödte, Naturh. Tidsskr. IV. 1843 p. 106 n. 4.
Ophion luteus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 102 n. 4.
Ophion luteum Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 326 n. 383.
Ophion luteus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 79 n. 4.
Ichneumon (Ophion) luteus Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3ª Insect. II. 1849; T. 111 F. 2.
Ophion luteus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 516 n. 2.
Ophion luteus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 80 n. 4.
Ophion luteus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 12 n. 5, ♀ ♂.
Ophion luteus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 321 n. 2.
Ophion luteus Duméril, Mém. acad. sc. Paris XXXI 1860 p. 895 n. 1.
Ophion luteus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 426 n. 6.
Ophion luteus Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 44; T. 28 F. 1.
Ophion luteus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 134, ♀ ♂.
Ophion luteus Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1882 p. 124.
Ophion luteus Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 178 n. 2, ♀ ♂.
Ophion luteus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1190 n. 1, ♀ ♂.
Ophion luteus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 90 n. 4.

macilentus Ol. — Eur.: Gallia.
Ophion macilentus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 514 n. 40.

macrurus (L.) Westw.[1] — ♀ ♂ — Am. bor.
Ichneumon macrurus Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 App. p. ?
Ichneumon macrurus Drury, Illustr. Nat. Hist. I. 1770 p. 97; T. 43 F. 5.
Ichneumon macrurus Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. Suppl. 1776 p. 319 n. 54ª.
Ophion macrurum Westwood, Drury: Illustr. Nat. Hist. Ed. 2ª I. 1837 p. 92; T. 43 F. 5.

---

[1]) *Lep.:* Telea polyphemus Cr., Platysamia cecropia L., Apatelodes torrefacta Sm. (Ashmead).

Ophion rugosus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 138 n. 1.
Ophion cecropiae Scudder, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. IX. 1863 p. 188-189.
Ophion macrurum Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 359 n. 6.
Ophion macrurum Trouvelot, Amer. Natural. I. 1867 p. 89; Fig.
Ophion macrurum Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) V. 1867 Proc. p. LXXXV.
Ophion macrurus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1868 Proc. p. XXXII.
Ophion macrurum Riley, Amer. Entomol. II. 1870 p. 100; Fig. 63 & 64.
Ophion macrurum Riley, 4th Ann. Rep. Insect. Missouri 1872 p. 107-108; Fig. 37 & 38.
Ophion macrurum Worthington, Canad. Entomol. VIII. 1876 p. 220.
Ophion macrurum Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 117b n. 1, ♀ ♂.
Ophion macrurum Riley, Amer. Entomol. III. 1880 p. 134; Fig. 52.
Ophion macrurum W. Saunders, Canad. Entom. XIV. 1882 p. 43; Fig. 2.
Ophion macrurum Clarkson, Canad. Entomol. XV. 1883 p. 162.
Ophion macrurum Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 350 n. 1, ♀ ♂.
Ophion macrurum Weed, Papilio IV. 1884 p. 112.
Ophion macrurum Waterhouse, Trans. Entom. Soc. London 1887 Proc. p. XXIII.
Ophion macrurus Fallou, Ann. soc. entom. France (6) IX. 1889 Bull. p. CXXXII.

maculator Ol. — Eur.
Ophion maculator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 511 n. 21.

mandibularis Grav.! — Eur.: Germania.
Ophion mandibulare Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 268 n. 3795.

melanostigma Cam. — ♂ — Am.: Panama. [T. 12 F. 18.
Ophion melanostigma Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 48. 1886 Hymen. I. p. 295 n. 14, ♂;

mercator Fabr. — ♀ — Eur.
Ichneumon XLVII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon I. 2. 1767; T. 83 F. 7.
Ichneumon mercator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 176 n. 177.
Ophion mercator Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 238 n. 17.
Ophion mercator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 74 n. 9.
Ophion mercator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 139 n. 42.
Ichneumon mercator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110, ♀.
Ophion mercator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 516 n. 51.
Ichneumon mercator Trentepol, Isis 1826 p. 84 n. 29, ♀.

metallicus Rad. — As.: Korea.
Ophion metallicum Radoszkowsky, Horae soc. entom. Ross. XXI. 1887 p. 433.

minutus Kriechb.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ophion minutus Kriechbaumer, Entom. Nachr. V. 1879 p. 105, ♀ ♂.
Ophion minutus Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 61; T. 39 F. 1.
Ophion minutum Savage, Entom. M. Magaz. XVII. 1881 p. 236.
Ophion minutus Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 178, ♀ ♂.
Ophion minutus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1192 n. 5.
Ophion minutus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 91 n. 8.

mocsaryi Brauns[2]) — Eur.: Hungaria.
Ophion Mocsáryi Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 89 n. 2.

nidulator Fabr. — ♀ — Eur.
Ophion nidulator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 136 n. 29.
Ichneumon nidulator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110, ♀.
Ophion nidulator Olivier, Encycl. méthod. Insect VIII. 1811 p. 513 n. 35.

---

1) *Lep.:* Taeniocampa cruda, Pionea forficalis (Vollenhoven).
2) *Lep.:* Cirrhoidea ambusta Fabr. (Mocsáry).

Ophion nidulator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 294.
Ophion nidulator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1044 n. 256.

nigrator Fabr. — Am. mer.
Ophion nigrator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 140 n. 46.
Ophion nigrator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 517 n. 56.
Ichneumon planator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon planator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 307.

nigricans Ruthe — ♀ — Eur.: Islandia.
Ophion nigricans Ruthe, Stettin. entom. Zeitg XX. 1859 p. 378 n. 67, ♀.

nigricauda Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia, Venezuela.
Ophion nigricauda Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 437 n. 27, ♀

nigricornis Brullé — Am.: Brasilia.
Ophion nigricornis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 141 n. 8.

nigritulus D. T. — Austr.: Ins. Hawaienses.
Ophion nigricans Cameron, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 193 [nec Ruthe].
Ophion nigritulus m.

nigrovarius Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Ophion nigrovarius Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 104.
Ophion nigrovarius Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 118^b n. 5, ♀ ♂.
Ophion nigrovarius Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 351 n. 5, ♀ ♂.

nubilicarpus Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Ophion nubilicarpus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 370 n. 1, ♀.

nunciator Fabr. — ♀ — Eur.
Ichneumon nunciator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 166 n. 137.
Ophion nunciator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 134 n. 21.
Ichneumon nunciator Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect XIII. 1805 p. 179 n. 3.
Ichneumon nunciator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀.
Ophion nunciator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 512 n. 27.
Ichneumon nunciator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 274.
Ichneumon nunciator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 348.
Ophion nunciator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1000 n. 177, ♀.

obscurator Panz. — Eur.: Germania.
Ichneumon XLI (recte LI) Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768; T. 101 F. 4.
Ophion obscurator Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 P. 107 T. 10.

obscurus Fabr.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon luteus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 371 n. 750, ♀ ♂ [non Linné].
Ichneumon luteus Schrank, Neu. Magaz. Liebh. Entom. II. 1785 p. 328 n. 95.
Ichneumon luteus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 195 n. 186.
Ichneumon luteus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 262 n. 2053, ♀ ♂.
Ophion obscurus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 132 n. 7.
Anomalon obscurus Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 116, ♀ ♂.
Ophion obscurus Gravenhorst, Magaz. f. Entom. IV. 1821 p. 269 n. 8, ♀ ♂.
Ichneumon polyguttator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 272.

---

[1] *Lep.:* Arge galathea (Raynald), Sesia formicaeformis (Brischke), Bombyx pini (Ratzeburg), Dicranura vinula (Eedle), Pseudoterpna cytisaria (Brischke), Geometra spec. (Ratzeburg), Episema scoriacea Esp., Polysphaenis sericata Bkh. (Mocsáry), Hybernia aurantiaria, Lasiocampa pini (Ratzeburg), Acronycta leporina (Drewsen & Boie), Pachetra leucophaea (Ratzeburg), Agrotis porphyrea (Brischke), Hadena protea, Epunda lichenea, Miselia oxyacanthae, Agrotis praecox, Acronycta leporina, Poecilocampa populi, Demas coryli (Bignell).

Ichneumon polyguttator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 341.
Ophion obscurus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 689 n. 135, ♀ ♂.
Ophion obscurus Boie, Arch. f. Naturg. II. 1. 1836 p. 39 n. 2, ♀.
Ophion obscurus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 103 n. 5.
Ophion obscurus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 79 n. 5.
Ophion obscurus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 80 n. 5.
Ophion obscurus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 11 n. 4, ♀ ♂.
Ophion obscurus Stavely, Trans. Linn. Soc. London XXIII. P. 1. 1860; T. 16 F. 17.
Ophion obscurus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 426 n. 5.
Ophion obscurus Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 44; T. 28 F. 2.
Ophion obscurus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 134, ♀ ♂.
Ophion obscurus Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 178 n. 1, ♀ ♂.
Ophion obscurus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1191 n. 4.
Ophion obscurus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 91 n. 7.

var. **obscuratus** Fabr. — Eur.: Germania.
Ophion obscuratus Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 237 n. 7.
Ophion obscuratus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 510 n. 12.
Ophion obscurum var. obscuratum Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 50 n. 1.

operator Ol. — Eur.
Ophion operator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 513 n. 37.

pacificus Holmgr. — ♀ — Afr.: Cap.
Ophion pacificus Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 411 n. 43, ♀.

pallens Ol. — Eur.: Gallia; As.: Arabia.
Ophion pallens Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 509 n. 2.

pallidipes Brullé — Am.: Brasilia.
Ophion pallipes Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 144 n. 15.
Ophion pallipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 427 n. 7.

pallidus Taschenbg. — Afr.: Nubia.
Ophion pallidus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 436 n. 26.

parvulus Kriechb.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Ophion parvulus Kriechbaumer, Entom. Nachr. V. 1879 p. 104, ♀ ♂.
Ophion parvulus Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 61; T. 39 F. 2.

pennator Fabr. — Am.: Georgia.
Ophion pennator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 135 n. 24.
Ophion pennator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 513 n. 30.
Ichneumon pellator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon pellator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 314.
Ichneumon pennator Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 209.

peregrinus Smith — ♀ — Austr.: New Zealand.
Ophion peregrinus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 478, ♀.
Ophion peregrinus Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 125, ♀.

petiolator Fabr. — Eur.: Austria.
Ophion petiolator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 140 n. 44.
Ophion petiolator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 516 n. 54.
Ichneumon petiolator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 264.
Ichneumon petiolator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 319.
Ophion petiolator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1046 n. 260.

plicatus Brullé — As.: Java.
Ophion plicatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 145 n. 17.

---

[1]) *Lep.:* Cucullia tanaceti Schaeff., C. artemisiae Hufn. (Mocsáry).

pteridis Kriechb.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Ophion pteridis Kriechbaumer, Entom. Nachr. V. 1879 p. 89, ♀ ♂.
Ophion pteridis Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 61; T. 39 F. 5.
Ophion pteridis Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 89 n. 3.
punctatus Cam. — Austr.
Ophion punctatus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. P. 1. 1898 p. 34.
pungens Smith — ♀ — As.: Japonia.
Ophion pungens Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 396 n. 1, ♀.
purgatus Say[2] — ♀ ♂ — Am.: Indiana.
Ophion purgatus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 238 n. 1.
Ophion lateralis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 141 n. 9.
Ophion purgatus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 694 n. 1.
Ophion purgatus Norton, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1863 p. 358 n. 1.
Ophion lateralis Riley, 2d Ann. Rep. Insect. Missouri 1870 p. 53.
Ophion purgatus Riley, 2d Ann. Rep. Insect. Missouri 1870 p. 53; Fig. 25.
Ophion purgatus Riley, 8th Ann. Rep. Insect. Missouri 1876 p. 54; Fig. 38.
Ophion purgatus Packard, 9th Rep. U. St. Geol. & Geogr. Surv. f. 1875. 1877 p. 704.
Ophion purgatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 117b n. 2, ♀ ♂.
Ophion purgatus Thomas, 10th Rep. State Entomol. Illinois f. 1880. 1881 p. 41.
Ophion purgatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 351 n. 2, ♀ ♂.
Ophion purgatus Riley, 3th Rep. U. St. Entom. Commiss. 1883 p. 128; T. 2 F. 5.
Ophion purgatus Caulfield, Canad. Entomol. XVI. 1884 p. 122.
quadrator Fabr. — Am. mer.
Ophion quadrator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 137 n. 32.
Ophion quadrator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 514 n. 39.
Ichneumon quadrator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon quadrator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersburg IX. 1824 p. 315.
quaestor Fabr. — Am. mer.
Ophion quaestor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 132 n. 6.
Ophion quaestor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 510 n. 10.
Ichneumon quaestor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon quaestor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 307.
scutellaris Thoms. — Eur.: Suecia, Germania.
Ophion scutellaris Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1192 n. 6.
Ophion scutellaris Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 92 n. 9.
scutellatus Ol.! — Eur.
Ophion scutellatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 517 n. 58.
skeltonii Kby. — Austr.: New Zealand.
Ophion Skeltoni W. F. Kirby, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 46 n. 61.
Ophion Skeltoni W. F. Kirby, New Zealand, Journ. of Sc. II. 1884 p. 73 n. 61.
slavicekii Kriechb. — ♂ — Eur.: Moravia.
Ophion Slaviceki Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 233, ♂.
slossonae Davis[3] — ♂ — Am.: Illinois.
Ophion Slossonae Davis, Entom. News IV. 1893 p. 135, ♂.
smithii D. T. — ♀ — As.: Japonia.
Ophion unicolor Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 397 n. 3, ♀ [non 1860].
Ophion Smithii m.

---

1) *Lep.:* Eriopus pteridis (Kriechbaumer).
2) *Lep.:* Mamestra trifolii Rott., M. picta Harr., Coelodasys unicornis Abb. & Sm., Leucania unipuncta (Riley).
3) *Lep.:* Acronycta spec. (Davis).

spectabilis Perty — Am.
Ophion spectabilis Perty, Delect. Anim. Artic. Brasil. 1833 p. 131; T. 26 F. 10.
sphacelatus Er. — Am.: Guyana.
Ophion sphacelatus Erichson, Schomburgk: Reisen in Guiana III. 1848 p. 587.
sphinx Spin. — ♀ — Afr.: Aegyptus.
Ophion Sphinx Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 439 n. II, ♀.
spinator Fabr. — Am. mer.
Ophion spinator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 138 n. 37.
Ophion spinator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 515 n. 46.
Ichneumon spinator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon spinator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 313.
stimulator Smith — ♀ — Austr.: New Guinea.
Ophion stimulator Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 65 n. 1, ♀.
stramineus Taschbg. — ♀ — Am. bor.
Ophion stramineus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 431 n. 13, ♀.
striatus Brullé — Am.: Brasilia.
Ophion striatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 142 n. 11.
subfuliginosus Ashm. — ♀ ♂ — Am.: California.
Ophion subfuliginosa Ashmead, Proc. Calif. Acad. IV. 1894 p. 126 n. 11, ♀ ♂.
tityri Pack.[1] — ♂ — Am.: United States.
Ophion tityri Packard, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XXI. 1881 p. 19, ♂.
triangularemaculatus Motsch. — ♀ ♂ — As.: Ceylon. [p. 30, ♀ ♂.
Ophion triangularemaculatus Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXIII. P. 3. 1863
tricolor Fabr. — Eur.
Ichneumon tricolor Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 182 n. 203.
Ophion tricolor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 133 n. 16.
Ophion tricolor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 511 n. 22.
Ichneumon tricolor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 264.
Ichneumon tricolor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 317.
Ophion tricolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1078 n. 313.
trilineatus Brullé — Am.: Brasilia.
Ophion trilineatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 140 n. 7.
trilobus Brullé — As.: Java.
Ophion trilobus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 145 n. 16.
trimaculatus Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Ophion trimaculatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 433 n. 18, ♀.
trimaculatus Ol.! — Eur.
Ophion trimaculatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 517 n. 59.
unicolor Smith — ♀ — As.: Batchian.
Ophion unicolor Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 141 n. 2, ♀.
univittatus Brullé — As.: India.
Ophion univittatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 146 n. 19.
variegatus Rdw. — Eur.: Germania.
Ophion variegatum Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 59 n. 7.
ventricosus Grav.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ophion ramidulum Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 267 n. 3789 [non Linné].
Ophion ventricosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 702 n. 141, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Eudamus tityrus (Packard).
2) *Lep.:* Callimorpha dominula (Giraud), Bombyx quercus (Marshall).

Ophion ventricosus Curtis, Brit. Entom. XIII. 1836 p. 600, ♂; T. 600.
Ophion ventricosus Zetterstedt, Insect. Lappon I. 1838 p. 392 n. 2, ♀ ♂.
Ophion ventricosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 12 n. 6, ♂.
Ophion ventricosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 432 n. 16.
Ophion ventricosus Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 44; T. 28 F. 3.
Ophion ventricosus Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 178 n. 4, ♀ ♂.
Ophion ventricosus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1192, ♀.
Ophion ventricosus Brauns, Arch. Naturg. Mecklenburg XLIII. 1889 p. 92 n. 11.

vestigator Smith — ♀ — As.: Malacca.
*Ophion vestigator Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 122 n. 2, ♀.

vittator Smith — ♀ — As.: Batchian.
Ophion vittator Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 140 n. 1, ♀.

vollenhovenii Taschbg. — ♀ — As.: Halmaheira.
Ophion Vollenhoveni Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 436 n. 25, ♀.

volubilis Holmgr. — ♀ ♂ — Am.: Uruguay.
Ophion volubilis Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 410 n. 42, ♀ ♂.

wüstneii Kriechb. — ♂ — Eur.: Germania.
Ophion Wüstnei Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 232, ♂.

GRAVENHORSTIA

Boie, Arch. f. Naturg. II. P. 1. 1836 p. 42.
J. L. Gravenhorst, nom. propr.

Synon.: Odontopsis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 150 n. 1. ὀδοῦς, dens; ὤψις, visus.
Anomalon Giraud, Bond.
Ophion Taschenberg.

picta Boie [1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania, Dalmatia, Sicilia; As.: Syria.
Gravenhorstia picta Boie, Arch. f. Naturg. II. P. 1. 1836 p. 42 n. 24, ♀ ♂.
Anomalon fasciatum Giraud, Verh. zool. bot. Ver. Wien VII. 1857 p. 170, ♀ ♂.
Anomalon fasciatum Bond, Trans. Entom. Soc. London 1872 Proc. p. XLIV.
Anomalon fasciatum (Smith) Marshall, Entom. M. Magaz. IX. 1873 p. 240, ♀ ♂.
Gravenhorstia picta Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1874 p. 6; T. 3 F. 1 (♂) & 2.
Ophion septemfasciatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVI. 1875 p. 428 n. 10, ♀.
Gravenhorstia picta Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 227, ♀ ♂.
Gravenhorstia picta Kriechbaumer, Schletter: Progr. Gymnas. Pola 1895 p. 39.

12. *Subfam.* Hellwigiinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 141 & 149.

HELLWIGIA

Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. XI. 2. 1823 p. 315; T. 43.
J. Ch. Hellwig, nom. propr.

Synon.: Ichneumon Blanchard.

elegans Grav. [2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Hellwigia elegans Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. XI. 2. 1823 p. 318; T. 43.

---

[1]) *Lep.:* Lasiocampa trifolii (Bond), Bombyx quercus var. spartii (Giraud).
[2]) *Lep.:* Thalpochares rosina (Giraud).

Hellwigia elegans Schilling, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1828. 1829 p. 75.
Hellwigia elegans Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 798 n. 1, ♀ ♂.
Hellwigia elegans Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 327. [T. 111 F. 4.
Ichneumon (Hellwigia) elegans Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3ª Insect. II. 1849;
Hellwigia elegans Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 321 n. 1.
Hellwigia elegans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 10 n. 1, ♀ ♂.
Hellwigia elegans Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 70, ♀ ♂.
Hellwigia elegans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 134, ♀.

obscura Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hellwigia obscura Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. XI. 2. 1823 p. 321.
Hellwigia obscura Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 801 n. 2, ♀.
Hellwigia obscura Brauns, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VIII. P. 1. 1888 p. 7, ♀ ♂.

Sect. B. Tryphonoidae m.

13. *Subfam.* Metopiinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 142 & 159.

SCALLAMA

Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 216.
Etymol. obscura.

crassipes Cam. — ♂ — As.: India.
Scallama crassipes Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 219, ♂.

trilineata Cam. — ♂ — As.: India.
Scallama trilineata Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. P. 3. 1899 p. 217, ♂.

METOPIUS

Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 78.
μέτωπον, frons.

Synon.: Peltastes Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 55.
πελταστής, clipeatus.

Crypturus Lamarck.
Ichneumon Fabricius & auct.

Subg.: Peltocarus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 196.
πέλτη, scutum; *κάρος*, sopor cum gravedine.

albipictus Tosqu. — ♂ — Afr.: Delagoa Bay.
Metopius albipictus Tosquinet, Ichmeum. d'Afrique 1896 p. 366 n. 4, ♂.

anxius Wesm. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Metopius anxius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. 1. 1849 p. 628 n. 5.
Metopius anxius Holmgren. Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 373 n. 4, ♀ ♂.
Metopius anxius Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 25, ♀; T. 16 F. 5.
Metopius anxius Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 196 n. 6, ♀ ♂.

audax Tosq. — ♀ — Afr.: Caffraria.
Metopius audax Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 363 n. 2, ♀.

basalis Cress. — ♀ — Am.: Florida.
Metopius basalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. XXVII, ♀.
Metopius basalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 199, ♀.
bellatorius Först. — ♀ — Eur.: Gallia.
Metopius bellatorius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. VII. 1850 p. 277 n. 1, ♀.
bellus Cress. — ♂ — Am.: Nevada.
Metopius bellus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. XXVIII, ♂.
Metopius bellus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 201, ♂.
brevispina Thoms. — ♀ ♂ — Eur. bor.
? Ichneumon vespoides Panzer, Faun. Insect. Germ. IV. 1797 P. 47 T. 19.
Metopius brevispina Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 195 n. 5, ♀ ♂.
Metopius brevispina Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2130 n. 3.
circumcinctus Först.[1]) — ♀ — Eur.: Gallia, Austria.
Metopius circumcinctus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. VII. 1850 p. 278 n. 2, ♀.
? Metopius nasutus Giraud, Verh. zool. bot. Ver. Wien VII. 1857 p. 169, ♀♂; T. 3 F. 4-5.
? Metopius nasutus Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 25; T. 16 F. 7.
clypealis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
? Metopius nasutus Giraud, Verh. zool. bot. Ges. Wien VII. 1857 p. 169, ♀ ♂; T. 3 F. 4-5.
Metopius clypealis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 n. 196 n. 7, ♀ ♂.
comptus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Colorado.
Metopius comptus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. XXVIII, ♀.
Metopius laticinctus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. XXVIII, ♀.
Metopius comptus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 201, ♀ ♂.
connexorius Wesm. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Metopius connexorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. 1. 1849 p. 624 n. 3, ♀ ♂.
Metopius connexorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 114, ♀♂.
Metopius connexorius Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 195 n. 3, ♀ ♂.
Metopius connexorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2129 n. 1.
crassipes Smith — As.: Celebes.
Metopius crassipes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 62 n. 1.
croceicornis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
? Peltastes necatorius Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 4 n. 1.
Metopius (Peltocarus) croceicornis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 196 [n. 8, ♀ ♂.
dentatus (Fabr.) Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon dentatus Fabricius, Reise n. Norwegen 1779 p. 328.
Ichneumon dentatus Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 436 n. 99, ♂.
Ichneumon dentatus Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 269 n. 117.
Ichneumon dentatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 200 n. 212.
Ichneumon dentatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2707 n. 181.
Ichneumon dentatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 196 n. 160.
Ichneumon dentatus Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 180 n. 192.
Pimpla dentata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 119 n. 30.
Ichneumon denticularius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279.
Peltastes pini Curtis, Brit. Entom. I. Ed. 1ª 1824 p. 4; T. 4.
Ichneumon denticularius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 362.
Peltatus dentatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 720.

---

1) *Lep.:* Eriogaster lanestris, E. populi L., Bombyx catax L. (Mocsáry).
2) *Lep.:* Bombyx trifolii Fbr. (Rondani), B. quercus (Giraud, Bignell, Mocsáry), Lasiocampa quercifolia (Parfitt).

Metopius dentatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 304 n. 4, ♀ ♂.
Metopius dentatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. 1. 1849 p. 629 n. 6, ♀ ♂.
Metopius dentatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 374 n. 5,
Peltastes dentatus Curtis, Farm Insects 1860 p. 485. [♀ ♂.
Metopius dentatus Guérin, Ann. soc. entom. France (4) V. 1865 Bull. p. XXVI.
Metopius dentatus Sichel, Ann. soc. entom. France (4) V. 1865 Bull. p. XXVI.
Metopius dentatus Gouley, Ann. soc. entom. France (4) V. 1865 Bull. p. XXVI.
Metopius dentatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 25; T. 16 F. 6 [♂].

dirus Mocs. — ♀ — As.: Caucasus.
Metopius dirus Mocsáry, Magy. Akad. Termész. Értek. XIII. P. 11. 1883 p. 12 n. 15, ♀.

discolor Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Cap, Caffraria.
Metopius discolor Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 361 n. 1, ♀ ♂.

dissectorius Panz. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon dissectorius Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 P. 98; T. 14.
Metopius dissectorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 80.
Peltastes dissectorius Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 4 n. 3.
Peltastes dissectorius Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 37 n. 4, ♀.
Metopius sicarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 291 n. 1, ♀.
Peltastes dissectorius Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 59.
Peltastes sicarius Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 409; T. 65 F. 9.
Metopius dissectorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. 1. 1849 p. 622 n. 1, ♀ ♂.
Metopius dissectorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 372
Metopius dissectorius Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 67, ♀ ♂. [n. 1, ♀.
Metopius dissectorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 25; T. 16 F. 2.
Metopius dissectorius Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 194 n. 1, ♀ ♂.

errantia Davis — ♀ — Am.: Michigan.
Metopius errantia Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 199, ♀.

erythropus Kriechb. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Metopius erythropus Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 58 n. 13, ♀.

femoratus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Metopius femoratus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 393 n. 1, ♂.
Metopius femoratus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 6. 1886 Hymen. I. p. 278 n. 1; T. 11 F. 23.

fulvicornis Mocs. — ♀ — As.: Syria.
Metopius fulvicornis Mocsáry, Magy. Akad. Termész. Értek. XIII. P. 11. 1883 p. 13 n. 16, ♀.

fuscipennis Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
? Metopius scrobiculatus Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. 2. 1838 p. 272 n. 11.
? Metopius scrobiculatus Ratzeburg, Ichneum d. Forstinsect. I. 1844 p. 122 n. 1.
Metopius fuscipennis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. 1. 1849 p. 623 n. 2, ♀ ♂.
Metopius fuscipennis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 372 n. 2,
Metopius fuscipennis Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 25; T. 16 F. 1. [♀ ♂.
Metopius fuscipennis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 194 n. 2, ♀ ♂.

hilaris Tosqu. — ♂ — Afr.: Caffraria.
Metopius hilaris Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 365 n. 3, ♂.

intermedius Först. — ♀ — Eur.: Gallia.
Metopius intermedius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. VII. 1850 p. 280 n. 4, ♀.

interruptus Thoms.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
? Ichneumon polyzonius Forster, Nov. spec. Insect. 1771 p. ? n. 85.

---

[1]) *Hymen.:* Lophyrus pini (Hartig, Vollenhoven).
[2]) *Lep.:* Lasiocampa trifolii (Thomson).

? Ichneumon chrysopus Lewin, Trans. Linn. Soc. London III. 1797 p. 4; T. 1 F. 5.
Peltastes dentatus Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 4 n. 2; T. 4. [n. 9, ♀ ♂.
Metopius (Peltocarus) interruptus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 197

leiopygus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
? Metopius necator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 292 n. 2.
Metopius leiopygus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. VII. 1850 p. 281 n. 5, ♀.

leviusculus Dom. — Eur.: Russia.
Metopius laeviusculus Dominique, Bull. soc. Ouest-France VIII. 1898 p. 90; T. 4 F. 3.

lugubris Tosqu. — ♂ — Afr.: Cap.
Metopius lugubris Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 368 n. 5, ♂.

marchandii Dom. — Eur.: Gallia.
Metopius Marchandi Dominique, Bull. soc. Ouest-France VIII. 1898 p. 87; T. 4 F. 1.

melanopsis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Metopius melanopsis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. VII. 1850 p. 279 n. 3, ♀.

micratorius (Fabr.) Panz.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon fasciatus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 428 n. 105.
? Ichneumon fasciatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 192 n. 186 & p. 205 n. 229.
? Ichneumon lunulatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 203 n. 224.
? Ichneumon variegator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 46 n. 772; T. 10 F. 13.
? Ichneumon lunulatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 219 n. 74.
? Ichneumon lunulatus Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 122 n. 269.
Ichneumon micratorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 62 n. 41, ♂.
Metopius micratorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 79.
Peltastes micratorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 55.
Ichneumon micratorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♀ ♂.
Peltastes micrator Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 191. [F. 13.
Ichneumon variegator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 69 n. 772, ♀; T. 10
Metopius micratorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1815 p. 292.
Ichneumon micratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279.
Ichneumon micratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 359.
Peltastes micratorius Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 36 n. 1.
Metopius micratorius Trentepol, Isis 1826 p. 295 n. 62.
Peltastes necatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 720.
Metopius necatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 292 n. 2, ♀.
Metopius micratorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 299 n. 3, ♂.
Metopius micratorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. 1. 1849 p. 625 n. 4, ♀ ♂.
Metopius micratorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 373 [n. 3, ♀ ♂.
Peltastes (Metopius) fasciatus Doumerc, Ann. soc. entom. France (3) VIII. 1860 p. 317-321.
Metopius micratorius Kiesenwetter, Berlin. entom. Zeitschr. V. 1861 p. 192-194.
Metopius migratorius Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 67, ♀ ♂. [♀ ♂.
Metopius migratorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. P. 2. 1871 p. 106,
Metopius micratorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 114, ♂.
Metopius micratorius Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 195 n. 4, ♀ ♂.
Metopius micratorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2129 n. 2.

montanus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Colorado, Nevada, California.
Metopius montanus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. XXVIII, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Harpyia bifida, Acronycta psi (Brischke), Dicranura herminea, Saturnia pyri (Rondani).

Metopius concinnus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. XXVIII, ♂.
Metopius mirandus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. XXVIII, ♀.
Motopius montanus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 202, ♀ ♂.

nevadensis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Nevada.
Metopius Edwardsii Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 376, ♂.
Metopius Nevadensis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. XXVII, ♀ ♂.
Metopius Nevadensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 200, ♀ ♂.

nigrator (L.) D. T. — Eur.: Gallia.
Peltastes nigrator Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 37 n. 3, ♀.
Metopius nigrator m.

peltator Marsh. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Metopius peltator Marshall, Entomol. Annual f. 1874 p. 130 ♀.
Metopius peltator Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 26; T. 17 F. 1.

pollinctorius (Say) Walsh — ♀ ♂ — Am.: United States.
Peltastes pollinctorius Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 245, ♀ ♂.
Metopius pinatorius (Boie) Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 120 n. 1, ♂.
\Peltastes pollinctorius Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 700.
Metopius cordiger Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 120 n. 2, ♂.
Metopius (Peltastes) pollinctorius Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 91, ♀ ♂.
Metopius pollinctorius Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 200, ♀ ♂.

pulchellus Cress. — ♀ — Am.: Colorado, New Mexico, Dakota.
Metopius pulchellus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 271 n. 2, ♀.
Metopius pulchellus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 202, ♀.

rivolletii Dom. — Afr.: Tunisia.
Metopius Rivolletii Dominique, Bull. soc. Ouest-France VIII. 1898 p. 89; T. 4 F. 2.

robustus Cress. — ♀ — Am.: Maryland.
Metopius robustus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. XXVII, ♀.
Metopius robustus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 201, ♀.

rufipes Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Metopius rufipes Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 270 n. 1, ♀.
Metopius rufipes Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 199, ♀.

scitulus Cress. — ♂ — Am.: Nevada.
Metopius scitulus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. XXIX, ♂.
Metopius scitulus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 201, ♂.

scutatifrons Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Metopius scutatifrons Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 393 n. 2, ♂.

sinensis Smith — ♀ — As.: China.
Metopius Sinensis Smith, Proc. Zool. Soc. London 1877 p. 411, ♀; T. 44 F. 4.

ultimatus Davis — ♂ — Am.: Illinois.
Metopius ultimatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 199, ♂.

vespoides (Scop.) D. T.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Sphex vespoides Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 296 n. 789; T. 42 F. 789.
Ichneumon LXVI Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. I. 1768; T. 128 F. 5.
Ichneumon necator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 435 n. 94.
Ichneumon vespiformis Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 361 n. 728, ♂.
Ichneumon necator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 268 n. 112.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 61 n. 210.

---

1) *Lep.:* Arctia urticae Esp., Harpyia fagi L. (Boie), Clisiocampa neustria L., Cnethocampa populi L. (Rondani), Bryophila ravulana (Giraud).

Ichneumon vespiformis Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 181 n. 142.
Sphex vespoides Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 248 n. 79.
Ichneumon necator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2696 n. 161.
Ichneumon vespiformis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2697 n. 165.
Ichneumon bimaculatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2699 n. 276.
Ichneumon vespiformis Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 221 n. 89.
Ichneumon necatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 144 n. 45.
Ichneumon vespoides Panzer, Faun. Insect. German. IV. 1797 P. 47; T. 19.
Ichneumon chrysopus Lewin, Trans. Linn. Soc. London III. 1797 p. 4; T. 1 F. 5.
Ichneumon vespiformis Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 300 n. 2124.
Ichneumon necatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 62 n. 42.
Ichneumon vespoides Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 975 [n. 41.
Ichneumon vespoides Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 184 n. 20.
Metopius necatorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 79.
Peltastes necatorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 55.
Ichneumon necatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♂.
Peltastes necatorius Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 191.
Ichneumon (Metopius) necatorius Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 7.
Crypturus vespoides Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 142 n. 6.
Metopius necatorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 292.
Ichneumon necatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Peltastes necatorius Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 4 n. 1.
Ichneumon necatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 359.
Peltastes necatorius Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 36 n. 2, ♀.
Metopius necatorius Trentepol, Isis 1826 p. 294 n. 61.
Ichneumon necatorius v. d. Höven, Bijdr. natuurk. Vet. I. 1826 p. 439 n. 11.
Crypturus vespoides Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª IV. 1835 p. 353 n. 6.
Peltastes necatorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 320.
Metopius necatorius Nylander, Notis. Saellsk. Faun. & Fl. Förh. I. 1848 p. 297 n. 5, ♀ ♂.
Ichneumon (Peltastes) necator Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3ª Insect. II. 1849; T. 112 [F. 1.
Metopius necatorius Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 92 n. 21.
Metopius necatorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 25, ♀ ♂; T. 16 F. 3 (♂) & 4 (♀).
Metopius vespoides m.

xanthostigma Ashm. — ♂ — Am.: Carolina.
Metopius xanthostigma Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 438, ♂.
Metopius xanthostigma Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 200, ♂.

CULTRARIUS

Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 197.

culter.

Synon.: Metopius Marlatt.

rileyi (Marl.) Davis — ♀ — Am.: Kansas, Dacota.
Metopius Rileyi Marlatt, Proc. Entom. Soc. Washington II. 1891 p. 102, ♀.
Cultrarius Rileyi Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 197.

14. *Subfam.* Sphinctinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 143 & 170.

SPHINCTUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 363 n. 5.
σφιγκτός, constrictus.

serotinus Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Sphinctus serotinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 365 n. 232, ♀ ♂.
Sphinctus serotinus Hartig, Arch. f. Naturg. III. P. 2. 1837 p. 155; T. 4 F. 5 & 7.
Sphinctus serotinus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 310.
Sphinctus serotinus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 119.
Sphinctus serotinus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 131.
Sphinctus serotinus Ingall, Zoologist XIV. 1856 p. 5326.
Sphinctus serotinus Smith, Entomol. Annual f. 1857 p. 33.
Sphinctus serotinus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 114, ♀.

15. *Subfam.* Tylocomninae

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 63 & 81.
Trachydermatinae Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 142 & 161.

CATOCENTRUS

Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 89.
κάτω, infra; κέντρον, aculeus.

Synon.: Tryphon Cresson.

philanthoides (Cress.) Walsh — ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Tryphon philanthoides Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 110, ♀.
Catocentrus philanthoides Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1873 p. 89, ♀ ♂.
Catocentrus philanthoides Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 205, ♀.

LETHADES

Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 197 & 204.
Etymol. obscura.

Synon.: Adelognathus Ashmead.

texanus (Ashm.) Davis — ♀ — Am.: Texas.
Adelognathus Texanus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 442, ♀.
Lethades Texanus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 204.

THIBETOIDES

Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 205.
Etymol. obscura.

flosamoris Davis — ♀ — Am.: California.
Thibetoides flosamoris Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 205, ♀ [?].

---

[1]) *Lep.:* Tortrix testudinana (Ratzeburg).

TYLOCOMNUS

Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p.76
τύλος, callus; κομψός, ornatus nimis quaesitus.

Synon.: Trachyderma Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 283 n. 9 [nec Latreille τραχύς, asper; δέρμα, cutis. [1829].

Chorinaeus Holmgren.
Pimpla Blanchard.

brevis (Ruthe) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Trachyderma breve Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 87, ♂.
Tylocomnus brevis m.

indigus Davis — ♀ ♂ — Am.: Colorado, New Hampshire.
Tylocomnus indigus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 204, ♀ ♂.

minoris Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Tylocomnus minoris Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 204, ♀.

scabra (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Trachyderma scabra Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 285 n. 124, ♂.
Pimpla (Trachyderma) scabra Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 320 n. 14.
Trachyderma scabra Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 112. [♀ ♂.
Chorinaeus lapponicus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 320 n. 1,
Tylocomnus scaber Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 77 n. 1, ♀ ♂;
Tylocomnus scaber Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 59; T. 38 F. 1. [T. 2 F. 10 (♀).
Trachyderma scabra Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 199 n. 1.

umbrosus Davis — ♀ — Am.: Nevada, Washington Terr.
Tylocomnus umbrosus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 203, ♀.

PSEUDOMETOPIUS

Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 202.
ψευδής, mendax; Metopius, nom. propr. Hymen.

Synon.: Metopius Cresson, Provancher.

hagenii (Cress.) Davis — ♀ — Am.: Canada, Texas.
Metopius Hageni Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 168, ♀.
Metopius Hageni Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 69, ♀.
Metopius Hageni Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 473, ♀.
Pseudometopius Hageni Davis, Trans. Amer. Entom. XXIV. 1897 p. 202.

16. *Subfam.* Exochinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 142 & 161.

AITHRIS

Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIV. P. 5. 1900 Nr. 15 p. 106.
Etymol. obscura.

coenutus Cam. — ♂ — As.: India or.
Aithris coenutus Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIV. P. 5. 1900 Nr. 15 p. 107, ♂.

EXOCHUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 328 n. 3.
ἔξοχος, eminens.

Synon.: Hypsicera Latreille, Cuvier: Règn. anim. Ed. 2a V. 1829 p. 288.
ὕψι, alte; *κέρας*, cornu.
Bassus Zettersteot.
Cryptus Fabricius.
Ctenisscus Desvignes.
Ichneumon Fourcroy & auct. ant.
Metacoelus Holmgren.
Pimpla Spinola.

affinis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Exochus affinis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. P. 5. 1856 (Tryph.) p. 312 n. 10, ♀ ♂.
Exochus affinis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 100, ♂.
Exochus affinis Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 68 n. 10, ♀ ♂.
Exochus affinis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 208 n. 6, ♀ ♂.
Exochus affinis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2132 n. 6.
aitkinii Cam. — ♂ — As.: Bengal.
Exochus Aitkini Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 31, ♂.
albiceps Walsh — ♂ — Am.: Illinois.
Exochus albiceps Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 96, ♂.
Exochus albiceps Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 215, ♂.
albicinctus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia, Britannia.
Exochus albicinctus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 71 n. 17, ♂.
Exochus albicinctus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 217 n. 28, ♂.
Exochus albicinctus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2137 n. 28.
alpinus Zett.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Lapponia, Suecia, Germania.
Bassus (Exochus) alpinus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 379 n. 11, ♀.
Exochus alpinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 311 n. 7, ♀.
Exochus alpinus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 99, ♀ ♂.
Exochus alpinus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 75 n. 25, ♀.
Exochus alpinus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 214 n. 20.
Exochus alpinus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2136 n. 20.
annulicrus Walsh[2] — ♂ — Am.: Illinois.
Exochus annulicrus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 95, ♂.
annulitarsis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Exochus annulitarsis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXI. 1887 p. 215 n. 22, ♀ ♂.
Exochus annulitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2136 n. 22, ♀ ♂.
anospilus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Exochus anospilus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 217 n. 29, ♀ ♂.
Exochus anospilus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2137 n. 29, ♀ ♂.
antiquus Hal. — ♂ — Eur.: Britannia.
Exochus antiquus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 113, ♂.
Exochus antiquus Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 57.
atrocoxalis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Texas, Dakota, Colorado, Nevada, Montana, Washington Terr., [California.
Exochus atrocoxalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 114, ♀.
Exochus atricoxalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 217, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Tortrix xylostana? (Bignell).
2) *Lep.:* Tortrix rileyana (Grote).

australis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Istria.
Exochus australis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2137 n. 4b, ♀ ♂.
bruneiventris Rdw.[1]) — Eur.: Germania.
Exochus brunniventris Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 64 n. 16.
caeruleiventris Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Exochus coeruleiventris Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 38 n. 1, ♂.
castaneiventris Brauns — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Exochus castaniventris Brauns, Termész. Füzet XIX. 1896 p. 272 n. 4, ♀ ♂.
citripes Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Exochus citripes Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI 1887 p. 213 n. 17, ♀.
Exochus citripes Thomson, Opusc. entom. P. 19 p. 2135 n. 17.
compressiventris Ratzbg.[2]) — ♀ — Eur.: Germania.
Exochus compressiventris Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 121 n. 4, ♀.
concinnus Holmgr. — ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia.
Exochus concinnus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 315 n. 17, ♂.
Exochus concinnus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 69 n. 12, ♂.
consimilis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania Hungaria.
Exochus consimilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. P. 5. 1856 (Tryph.) p. 310 n. 5, [♀ ♂.
Exochus consimilis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 2. 1871 p. 99, ♂ ♀ var.
Exochus consimilis Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 67 n. 8, [♀ ♂.
Exochus consimilis Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 395 n. 9, ♂.
Exochus consimilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 107, ♂.
Exochus consimilis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2132 n. 8b.
Exochus consimilis Szépligeti, Rovart. Lapok. V. 1898 p. 61, ♂.
coronatus Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Exochus coronatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 342 n. 218, ♀ ♂.
Exochus coronatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 266 n. 6, ♀ ♂.
Bassus coronatus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 379 n. 10, ♀ ♂.
Exochus coronatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 234 n. 3, ♀ ♂.
Exochus coronatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 316 n. 20, [♀ ♂.
Exochus coronatus Kawall, Stettin. entom. Zeitg. XIX. 1858 p. 67 n. 44.
Exochus coronatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 100, ♀ ♂ var.
Exochus coronatus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 73 n. 22, [♀ ♂.
Exochus coronatus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 211 n. 12, ♀ ♂.
Exochus coronatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2134 n. 12.
var. **erythronotus** Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon erythronotus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 384 n. 138, ♀.
Exochus erythronotus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 355 n. 228, ♀ ♂.
Exochus erythronotus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 235 n. 5, ♀ ♂.
Exochus erythronotus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 314 [n. 15, ♀ ♂.
Exochus coronatus var. erythronotus Kawall, Stettin. entom. Zeitg. XIX. 1858 p. 67.
Exochus erythronotus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 100, ♀ ♂.
Exochus erythronotus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 65 [n. 4, ♀ ♂.
Exochus erythronotus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 107, ♀.

---

[1]) *Hymen.:* Nematus spec. (Rudow).
[2]) *Col.:* Agrilus biguttatus (Ratzeburg).

var. **pumilus** Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Exochus pumilus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 73 n. 21, ♂.
Exochus pumilus Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 396 n. 11.
Exochus coronatus var. pumilus m.
crassicornis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.
Exochus crassicornis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2134 n. 13b, ♀ ♂.
decoratus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Exochus decoratus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 64 n. 3, ♂.
Exochus decoratus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 213 n. 16, ♀ ♂.
Exochus decoratus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2135 n. 16, ♀ ♂.
Exochus decoratus Szépligeti, Rovart. Lapok. V. 1898 p. 60, ♂.
dorsalis Cress. — ♀ ♂ — Am.: New Jersey.
Exochus dorsalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 286 n. 6, ♂.
Exochus dorsalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 215, ♀ ♂.
var. **annulicrus** Davis — ♂ — Am.: Michigan, New Hampshire.
Exochus dorsalis var. annulicrus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 216, ♂.
erythrinus Holmgr. — ♀ — Afr.: Cap.
Exochus erythrinus Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 409 n. 39, ♀.
flavifrons Boh. — ♀ — Eur.: Suecia.
Exochus flavifrons Boheman, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XX. 1863 p. 79 n. 18.
Exochus flavifrons Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 71 n. 18, ♀.
Exochus flavifrons Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2134 n. 11b.
flavifrontalis Davis — ♀ ♂ — Am.: Michigan, Nevada.
Exochus flavifrontalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 217, ♀ ♂.
flavomarginatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Exochus flavomarginatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 80 n. 3, ♂.
Exochus flavomarginatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 311 [n. 8, ♀ ♂.
Exochus flavomarginatus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 64
Exochus flavomarginatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 12, ♂; T. 8 F. 8. [n. 2, ♀ ♂.
Exochus flavomarginatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 107, ♀ ♂.
Exochus flavolimbatus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 209 n. 9, ♀ ♂.
Exochus flavomarginatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2133 n. 9.
fletcheri Bridgm.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Exochus Fletcheri Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1884 p. 432, ♀ ♂.
Exochus Fletcheri Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 216 n. 26.
Exochus Fletcheri Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2136 n. 26.
frontellus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Exochus frontellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1858 P. 5. (Tryph.) p. 318 n. 25, ♂.
Exochus frontellus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 75 n. 26, ♂.
Exochus frontellus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2136 n. 21b.
globulipes Desv. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Cteniscus (Exochus) globulipes Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 45 n. 6, ♀ ♂.
gravipes Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon gravipes Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 384 n. 137, ♀.
Exochus gravipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 693, ♀.
Exochus gravipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 351 n. 225, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Gelechia notatella (Fletcher).

[2]) *Lep.:* Hyponomeuta padella (Ratzeburg), Tinea consociella (Brischke). — *Col.:* Dermestes vulpinus (Vollenhoven).

Exochus gravipes Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 257 n. 10.
Exochus gravipes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 124 n. 2, ♀ ♂.
Exochus gravipes Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 237 n. 8, ♀♂.
Exochus gravipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 79 n. 1, ♂.
Exochus gravipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 310 n. 4, [♀ ♂; T. 9 F. 20.
Exochus gravipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 99, ♀♂.
Exochus gravipes Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 63 n. 1, ♀♂;
Exochus gravipes Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 12; T. 8 F. 6. [T. 2 F. 7 [♂], 4&8.
Exochus gravipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 107, ♀ ♂.
Exochus gravipes Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 207 n. 1.

gravis Grav. — ♂ — Eur.: Britannia, Gallia, Dania, Germania.
Exochus gravis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 354 n. 227, ♂.
Exochus gravis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 208 n. 3.
Exochus gravis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2131 n. 3.

incidens Thoms. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr. [♂ [non Gravenhorst].
Exochus tardigradus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 315 n. 16;
Exochus incidens Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 208 n. 2, ♀ ♂.
Exochus incidens Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2131 n. 2.

lentipes Grav. [1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Exochus lentipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 344 n. 219, ♂.
Exochus lentipes Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 266 n. 7, ♂.
Exochus lentipes Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 235 n. 4.
Exochus lentipes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 131 n. 12, ♀ ♂.
Exochus cylindricus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 317 [n. 21, ♀.
Exochus cylindricus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 76 [n. 28, ♀.
Exochus lentipes Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 215 n. 23, ♀ ♂.
Exochus cylindricus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. 1891 p. 62, ♀.
Exochus lentipes Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2136 n. 23.

lictor Hal. — ♀ — Eur.: Britannia.
Exochus lictor Haliday, Ann. of Nat. Hist II. 1839 p. 113, ♀.

lineifrons Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Exochus lineifrons Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 213 n. 18, ♀ ♂.
Exochus lineifrons Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2135 n. 18, ♀ ♂.

longicornis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Exochus longicornis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 214 n. 19, ♀ ♂.
Exochus longicornis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2136 n. 19, ♀ ♂.

lucidus Dest. — ♀ — Eur.: Sicilia.
Exochus lucidus Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 148, ♀; T. 1 F. 5.

maculatus Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Exochus maculatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 2. 1871 p. 100, ♂.

märklinii Holmgr. — ♀. ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Exochus Märklini Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 315 n. 18, ♂.
? Exochus Märklini Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 100, ♀ ♂.
Exochus Märklini Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 65 n. 5, ♂.

melanarius Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Exochus melanarius Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 70 n. 15, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Tinea populella (Ratzeburg).

melanocephalus Cam. — ♂ — Am.: Mexico.
Exochus melanocephalus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 280 n. 5, ♂.
mitratus Grav.[1]) — ♀ — Eur.: Germania, Gallia.
Exochus mitratus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 350 n. 224, ♀.
Exochus mitratus Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 395 n. 10, ♀.
Exochus mitratus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 208 n. 4.
Exochus mitratus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2131 n. 4.
morionellus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Exochus morionellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 313 [n. 13, ♂.
Exochus morionellus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 70 n. 14, ♂.
Exochus morionellus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2133 n. 8c.
nigripalpis Thoms. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Exochus nigripalpis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 209 n. 8, ♀ ♂.
Exochus nigripalpis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2132 n. 8.
notatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Exochus notatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 317 n. 23, ♀ ♂.
Exochus notatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 100, ♀ ♂.
Exochus Woldstedtii Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 67 n. 7, ♀ ♂.
Exochus notatus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 75 n. 27, ♀ ♂.
Exochus notatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 12; T. 8 F. 10.
Exochus notatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 107, ♀.
Exochus notatus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 214 n. 21.
Exochus notatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2136 n. 21.
ostentatus Davis — ♂ — Am.: Columbia.
Exochus ostentatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 217, ♂.
pallidipes Cress.[2]) — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Exochus pallipes Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 287 n. 7, ♂.
Exochus albifrons [Walsh] Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 114, ♀.
Exochus evectus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 168, ♀.
Exochus albifrons Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 94, ♀ ♂.
Exochus albifrons Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 6 n. 4, ♂.
Exochus albifrons Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 438 n. 4, ♂.
Exochus xanthopsis Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 201, ♂.
Exochus pallipes Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 216, ♀ ♂.
var. **pleuralis** Cress. — ♂ — Am.: Illinois.
Exochus pleuralis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 286 n. 5, ♂.
Exochus pallipes var. pleuralis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 216, ♂.
parvispina Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Exochus parvispina Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 216 n. 25, ♀ ♂.
Exochus parvispina Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2136 n. 25, ♀ ♂.
pectoralis Hal.! — ♂ — Eur.: Britannia.
Exochus pectoralis Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 113, ♂.
pictus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Exochus pictus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 312 n. 9, ♀ ♂.
Exochus pictus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 100, ♀ ♂.
Exochus pictus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 66 n. 6, ♀ ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Andricus lanificus (Giraud).
[2]) *Lep.:* Tortrix rileyana (Grote), Cacoecia fervidana, C. cerasivorana (Davis).

Exochus pictus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 210 n. 10, ♀ ♂.
Exochus pictus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2133 n. 10.
Exochus pictus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 10 & 29 n. 63, ♀ ♂.

procerus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Exochus procerus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 68 n. 11, ♀ ♂.
Exochus procerus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 107, ♂.

propinquus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Michigan, Connecticut, Maine, Massachusetts.
Exochus propinquus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 114, ♀ (♂?).
Exochus propinquus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 217, ♀ ♂.

prosopius Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Gallia.
Exochus prosopius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 349 n. 223, ♂.
Exochus prosopius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 267 n. 9.
Exochus prosopius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 236 n. 7.
Exochus prosopius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 79 n. 2, ♂.
Exochus prosopius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 310 n. 6, ♂.
Exochus prosopius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. P. 2. 1871 p. 99, ♀ ♂.
Exochus prosopius Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 12; T. 8 F. 7.
Exochus prosopius Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 209 n. 7, ♀ ♂.
Exochus prosopius Buysson, Revue d'entom. XI. 1892 p. 258; T. 1. F. 7.
Exochus prosopius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2132 n. 7.

pulchripes Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Exochus pulchripes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 38 n. 3, ♂.

puncticeps Cam. — ♂ — Am.: Mexico.
Exochus puncticeps Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 279 n. 2, ♂.

punctus Homgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Exochus punctus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 313 n. 12, ♂.
Exochus punctus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 71 n. 16, ♂.
Exochus punctus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2137 n. 27b.

ratzeburgii Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 24, ♀.
Exochus Ratzeburgi Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 318
Exochus Ratzeburgi Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 72 n. 20, ♂.
Exochus Ratzeburgi Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 210 n. 11, ♀ ♂.
Exochus Ratzeburgi Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2134 n. 11.

rufus Pérez — Afr.: Teneriffa.
Exochus rufus Pérez, Ann. soc. entom. France 1895 p. 203.

scitulus Prov. — Am.: Canada.
Exochus scitulus Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 15.

semilividus Vollenh. — Eur.: Helvetia.
Exochus semilividus Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 13; T. 8 F. 11.

semirufus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Exochus semirufus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 114, ♀ ♂.
Exochus semirufus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 6 n. 5, ♀.
Exochus semirufus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 438 n. 5, ♀.
Mesoleius inflatifrons Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 107 n. 11, ♀.
Exochus rufigaster Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 443, ♀.
Exochus semirufus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 218, ♀ ♂.

septentrionalis Holmgr. — ♀ — Eur.: Britannia, Lapponia, Suecia. [n. 19, ♀.
Exochus septentrionalis Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 72
? Exochus septentrionalis Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 160.
Exochus septentrionalis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2137 n. 27c, ♀.

signifrons Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Exochus signifrons Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 216 n. 27, ♀ ♂.
Exochus nigrifrons Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2136 n. 27.

solitarius Davis — ♂ — Am.: Canada.
Exochus solitarius Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 216, ♂.

stramineipes Cam. — ♂ — Am.: Panama. [T. 11 F. 7.
Exochus stramineipes Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 279 n. 1, ♂;

tardigradus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Exochus tardigradus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 348 n. 222, ♀. [♀ ♂.
? Exochus tardigradus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 315 n. 16,
Exochus ophthalmicus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 74 [n. 24, ♀ ♂.
Exochus tardigradus Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 396 n. 12.
Exochus ophthalmicus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 107, ♀.
Exochus tardigradus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 211 n. 14.
Exochus tardigradus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2135 n. 15.

tegularis Ashm. — ♂ — Am.: St. Vincent.
Exochus tegularis Ashmead, Journ. Linn. Soc. London XXV. 1894 p. 141, ♂.

tibialis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania. [n. 22, ♀ ♂.
Exochus tibialis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 317 & 389
Exochus tibialis Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 76 n. 29, ♀ ♂.
Exochus tibialis Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 12; T. 8 F. 9.
Exochus tibialis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 108, ♀.
Exochus tibialis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 215 n. 24.
Exochus tibialis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2136 n. 24.

tricarinatus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Exochus tricarinatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 38 n. 2, ♂.

turgidus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Dania, Germania.
Exochus turgidus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 312 n. 11, ♀.
Exochus turgidus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. P. 2. 1871 p. 100, ♀.
Exochus turgidus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 70 n. 13, ♀.
Exochus turgidus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 208 n. 5.
Exochus turgidus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2131 n. 5.

vafer Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Exochus vafer Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 73 n. 23, ♀ ♂.
Exochus vafer Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 211 n. 13.
Exochus vafer Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2134 n. 13.

validus Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Exochus validus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 18, ♂.

ventralis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 14, ♂.
Exochus geniculatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 314
Exochus ventralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 316 n. 19, ♀.
Metacoelus ventralis Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 62 n. 4, ♀.
Exochus geniculatus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 68 n. 9, ♂.
Exochus ventralis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 212 n. 15, ♀ ♂.
Exochus ventralis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2135 n. 15.

Exochus pictus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 210 n. 10, ♀ ♂.
Exochus pictus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2133 n. 10.
Exochus pictus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 10 & 29 n. 63, ♀ ♂.

procerus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Exochus procerus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 68 n. 11, ♀ ♂.
Exochus procerus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 107, ♂.

propinquus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Michigan, Connecticut, Maine, Massachusetts.
Exochus propinquus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 114, ♀ (♂?).
Exochus propinquus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 217, ♀ ♂.

prosopius Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Gallia.
Exochus prosopius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 349 n. 223, ♂.
Exochus prosopius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 267 n. 9.
Exochus prosopius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 236 n. 7.
Exochus prosopius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 79 n. 2, ♂.
Exochus prosopius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 310 n. 6, ♂.
Exochus prosopius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. P. 2. 1871 p. 99, ♀ ♂.
Exochus prosopius Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 12; T. 8 F. 7.
Exochus prosopius Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 209 n. 7, ♀ ♂.
Exochus prosopius Buysson, Revue d'entom. XI. 1892 p. 258; T. 1. F. 7.
Exochus prosopius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2132 n. 7.

pulchripes Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Exochus pulchripes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 38 n. 3, ♂.

puncticeps Cam. — ♂ — Am.: Mexico.
Exochus puncticeps Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 279 n. 2, ♂.

punctus Homgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Exochus punctus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 313 n. 12, ♂.
Exochus punctus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 71 n. 16, ♂.
Exochus punctus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2137 n. 27b.

ratzeburgii Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 24, ♀.
Exochus Ratzeburgi Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 318
Exochus Ratzeburgi Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 72 n. 20, ♂.
Exochus Ratzeburgi Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 210 n. 11, ♀ ♂.
Exochus Ratzeburgi Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2134 n. 11.

rufus Pérez — Afr.: Teneriffa.
Exochus rufus Pérez, Ann. soc. entom. France 1895 p. 203.

scitulus Prov. — Am.: Canada.
Exochus scitulus Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 15.

semilividus Vollenh. — Eur.: Helvetia.
Exochus semilividus Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 13; T. 8 F. 11.

semirufus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Exochus semirufus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 114, ♀ ♂.
Exochus semirufus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 6 n. 5, ♀.
Exochus semirufus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 438 n. 5, ♀.
Mesoleius inflatifrons Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 107 n. 11, ♀.
Exochus rufigaster Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 443, ♀.
Exochus semirufus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 218, ♀ ♂.

septentrionalis Holmgr. — ♀ — Eur.: Britannia, Lapponia, Suecia. [n. 19, ♀.
Exochus septentrionalis Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 72
? Exochus septentrionalis Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 160.
Exochus septentrionalis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2137 n. 27c, ♀.

signifrons Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Exochus signifrons Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 216 n. 27, ♀ ♂.
Exochus nigrifrons Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2136 n. 27.

solitarius Davis — ♂ — Am.: Canada.
Exochus solitarius Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 216, ♂.

stramineipes Cam. — ♂ — Am.: Panama.
Exochus stramineipes Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 279 n. 1, ♂; [T. 11 F. 7.

tardigradus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Exochus tardigradus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 348 n. 222, ♀.
? Exochus tardigradus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 315 n. 16, [♀ ♂.
Exochus ophthalmicus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 74 [n. 24, ♀ ♂.
Exochus tardigradus Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 396 n. 12.
Exochus ophthalmicus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 107, ♀.
Exochus tardigradus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 211 n. 14.
Exochus tardigradus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2135 n. 15.

tegularis Ashm. — ♂ — Am.: St. Vincent.
Exochus tegularis Ashmead, Journ. Linn. Soc. London XXV. 1894 p. 141, ♂.

tibialis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Exochus tibialis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 317 & 389 [n. 22, ♀ ♂.
Exochus tibialis Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 76 n. 29, ♀ ♂.
Exochus tibialis Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 12; T. 8 F. 9.
Exochus tibialis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 108, ♀.
Exochus tibialis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 215 n. 24.
Exochus tibialis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2136 n. 24.

tricarinatus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Exochus tricarinatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 38 n. 2, ♂.

turgidus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Dania, Germania.
Exochus turgidus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 312 n. 11, ♀.
Exochus turgidus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. P. 2. 1871 p. 100, ♀.
Exochus turgidus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 70 n. 13, ♀.
Exochus turgidus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 208 n. 5.
Exochus turgidus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2131 n. 5.

vafer Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Exochus vafer Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 73 n. 23, ♀ ♂.
Exochus vafer Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 211 n. 13.
Exochus vafer Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2134 n. 13.

validus Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Exochus validus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 18, ♂.

ventralis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Exochus geniculatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 314 [n. 14, ♂.
Exochus ventralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 316 n. 19, ♀.
Metacoelus ventralis Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 62 n. 4, ♀.
Exochus geniculatus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 68 n. 9, ♂.
Exochus ventralis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 212 n. 15, ♀ ♂.
Exochus ventralis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2135 n. 15.

POLYCLISTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 161 n. 10.
Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 217.
πολύς, multum; *κλίνω*, inclino.

Synon.: Mima Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 219.
Etymol. obscura.

Anomalon Trentepol. [Brischke.
Exochus Gravenhorst, Blanchard, Ratzeburg, Fonscolombe, Holmgren,
Ichneumon Geoffroy, Fourcroy, Villers, Olivier, Gravenhorst.
Metacoelus Holmgren.
Pimpla Spinola.

femoralis (Fourcr.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 326 n. 11.
Ichneumon femoralis Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 396 n. 11.
Ichneumon femoralis Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 188 n. 166.
Ichneumon femoralis Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 206 n. 4.
Ichneumon femoralis Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 285.
Ichneumon femoralis Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 383 n. 136, ♀.
Exochus femoralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 346 n. 220, ♀.
Exochus femoralis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 266 n. 8, ♀.
Exochus femoralis Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 309 n. 3.
Exochus femoralis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 236 n. 6.
Pimpla femoralis Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 506 n. 5, ♀ ♂.
Exochus femoralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 308 n. 1, ♀.
Exochus femoralis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 99, ♀ var.
Metacoelus femoralis Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 61 n. 1,
Exochus femoralis Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 12; T. 8 F. 3. [♀♂; T. 2 F. 1
Polyclistus femoralis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 218 n. 1, ♀♂.

flaviceps (Ratzbg.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Exochus flaviceps Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 132 n. 4, ♂.
Exochus flaviceps Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 309 n. 3, ♀.
Metacoelus flaviceps Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 62 n. 3, ♂.
Exochus flaviceps Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 11; T. 8 F. 5.
Polyclistus facialis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 218 n. 2, ♀ ♂.

mansuetor (Grav.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon mansuetor Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 254 n. 3720-21.
Anomalon curvator Trentepol, Isis 1829 p. 956 n. 72.
Exochus mansuetor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 339 n. 217, ♀.
Exochus mansuetor Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 265 n. 5.
Exochus mansuetor Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 309 n. 2.
Exochus mansuetor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 124 n. 1, ♀.
Exochus mansuetor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 120 n. 1; T. 1 F. 17.
Exochus mansuetor Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 234 n. 2.
Exochus femoralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 80 n. 4, ♀ ♂ [non
[Fourcroy].

---

[1]) *Col.:* Anobium pertinax (Vollenhoven).

[2]) *Lep.:* Pyralis farinalis (Bignell), Hyponomeuta spec. (Ratzeburg). — *Dipt.:* Stratiomys viridulus (Giraud).

Exochus mansuetor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 309 n. 2, ♀♂.
Exochus mansuetor Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 99, ♀.
Metacoelus mansuetor Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 61
Exochus mansuetor Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 11; T. 8 F. 4. [n. 2, ♀♂.
Polyclistus mansuetor Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 218 n. 3, ♀.

washingtonensis (Davis) D. T. — ♀ — Am.: New Hampshire.
Mima Washingtonensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 219, ♀.
Polyclistus Washingtonensis m.

METACOELUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 161 n. 9.
Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 61.

μετά, inter; *κοῖλος*, cavus.

Synon.: Exochus Cresson, Walsh, Provancher.

levis (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, Illinois.
Exochus laevis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 286 n. 4, ♀ ♂.
Exochus laevis Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 93, ♀.
Exochus laevis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 5 n. 3, ♀.
Exochus laevis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 437 n. 3, ♀.
Metacoelus laevis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 214, ♀ ♂.

AMESOLYTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 161 n. 8.

ἄμεσος, media carens; *λυτός*, solutus.

melanarius Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Amesolytus melanarius Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 60, ♂.

nigricans Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Amesolytus nigricans Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 59, ♀.

rufidorsum Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Amesolytus rufidorsum Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 60, ♀.

TRICLISTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 161 n. 7.
Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 57.

τρεῖς, tres; *κλειστός*, fissus.

Synon.: Amesolytus Ashmead.
Cryptus Fabricius.
Exochus Gravenhorst, Stephens, Holmgren, Boheman, Brischke, Bridgman.
Ichneumon Fabricius, Gravenhorst, Thunberg.

aethiops (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Exochus aethiops Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 693 n. 216b.
Exochus aethiops Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 265 n. 4.
Exochus aethiops Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 101, ♂.
Triclistus aethiops Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 206 n. 12, ♀.

albicinctus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Triclistus albicinctus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 206 n. 14, ♀.

apicalis (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Illinois, Massachusetts, New Hampshire, Columbia.
Exochus apicalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 285 n. 1, ♂.
Triclistus terminalis Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 201, ♂.
Triclistus apicalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 213, ♀ ♂.

areolatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Triclistus areolatus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 203 n. 2, ♀ ♂.

atriceps (Walsh) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, Illinois.
Exochus atriceps Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 95, ♂.
Exochus rufomaculatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 113 n. 6, ♀.
Triclistus atriceps Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 214, ♀ ♂.

bruneipes (Cress.) Davis — ♀ — Am.: Nevada.
Exochus brunnipes Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 374, ♀.
Triclistus brunnipes Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 212, ♀.

congener Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania; Am.: Nevada, Montana, Washington.
Exochus congener Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 319 n. 28, [♀ ♂.
Exochus congener Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 2. 1871 p. 101, ♀ ♂.
Triclistus congener Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 57 n. 2, ♀ ♂.
Exochus congener Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 60; T. 38 F. 6.
Triclistus congener Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 212, ♀ ♂.

curvator (Fabr.) Holmgr.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania; Am.: Canada, [United States.
Ichneumon curvator Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 177 n. 182.
Cryptus curvator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 88 n. 78.
Ichneumon curvator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 285.
Ichneumon curvator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 274.
Ichneumon curvator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 347.
Exochus curvator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 335 n. 215, ♀.
Exochus curvator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 265 n. 2.
Exochus curvator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 319 n. 27, [♀ ♂.
Exochus fulvipes Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 285 n. 2, ♀ ♂.
Exochus curvator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 101, ♀ ♂.
Triclistus curvator Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. 1873 P. 4. p. 58 n. 4, ♀.
Exochus fulvipes Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 5 n. 1, ♀.
Exochus fulvipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 437 n. 1, ♀.
Triclistus curvator Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 213, ♀ ♂.

discretus Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Triclistus discretus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 10 & 29 n. 64, ♂.

facialis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Triclistus facialis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 205 n. 10, ♀.

ferrugineus (Ashm.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Texas.
Amesolytus ferrugineus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 201.
Triclistus ferrugineus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 213, ♀.

holmgrenii (Boh.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Exochus Holmgreni Boheman, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XX. 1863 p. 79 n. 19, ♀ ♂.
Triclistus Holmgreni Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 57 n. 1, [♀; T. 2 F. 6 [♀].
Exochus Holmgreni Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 60; T. 38 F. 5.
Triclistus Holmgreni Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 205 n. 11, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Nothris verbascella (Brischke).

2) *Lep.:* Tortrix rileyana (Grote), Nothris verbascella (Brischke).

lativentris Thoms.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Triclistus lativentris Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 203 n. 3, ♀♂.

levigatus (Ratzbg.) Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Exochus laevigatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 120 n. 3, ♀.
Triclistus laevigatus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 206, ♀.

longicalcar Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Triclistus longicalcar Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 205 n. 7, ♀.

niger (Bridgm.) Thoms. — ♀ — Eur.: Britannia.
Exochus niger Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 169, ♀.
Triclistus niger Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 206 n. 13, ♀.

nigritellus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [♀, non Gravenhorst.
Exochus podagricus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 320 n. 29,
Triclistus nigritellus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. 1873 P. 4. p. 60 n. 6, ♀.

nitidifrons Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia.
Triclistus nitidifrons Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 204 n. 6, ♀♂.

pallidipes Holmgr.[2]) — ♀ — Eur.: Suecia.
Triclistus pallipes Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 59 n. 5, ♀.
Triclistus pallipes Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 204 n. 5, ♀.

podagricus (Grav.) Holmgr.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Exochus podagricus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 336 n. 216, ♀.
Exochus podagricus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 265 n. 3.
Exochus podagricus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 309 n. 1.
? Exochus laevigatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 120 n. 3, ♀.
Exochus podagricus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 2. 1871 p. 101, ♀♂.
Triclistus podagricus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 58 n. 3, ♀;
Exochus podagricus Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 60; T. 38 F. 7. [T. 2 F. 5 & 6.
Triclistus podagricus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 204 n. 4, ♀♂.

pubiventris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Triclistus pubiventris Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 205 n. 8, ♀♂.

pygmaeus (Cress.) Davis — ♀ — Am.: Canada, Illinois.
Exochus pygmaeus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 285 n. 3, ♀.
Exochus pygmaeus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 5 n. 2, ♀.
Exochus pygmaeus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 437 n. 2, ♀.
Triclistus pygmaeus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 213, ♀.

spiracularis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Triclistus spiracularis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 205 n. 9, ♀.

squalidus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Exochus squalidus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 319 n. 26, ♀.
Exochus squalidus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 101, ♀♂.
Triclistus squalidus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 60 n. 7,
Exochus squalidus Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 60; T. 38 F. 8. [♀♂.
Triclistus squalidus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 203 n. 1, ♀.

thoracicus Ashm. — ♀ — Am.: Virginia.
Triclistus thoracicus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 201.
Triclistus thoracicus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 213, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Emmelesia alchemillata (Fletcher).
[2]) *Lep.:* Eupithecia trisignaria (Brischke).
[3]) *Lep.:* Symaethis oxyacanthella (Bignell).

CHORINAEUS

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 320.
χωρίζω, separo.

Synon.: Polyrrhabdus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 98 (Polyrhabdus).
πολύς, multus; ῥάβδος, baculus.
Tylocomus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 76 n. 5.
τύλος, callus; κῶμος, comissatio.
Exochus Gravenhorst, Stephens, Haliday.
Tryphon Cresson.

asper (Grav.) Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Exochus asper Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 694 n. 225b.
Exochus asper Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 267 n. 11.
Chorineus asper Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 165, ♀ ♂.
australis Thoms. — ♂ — Eur.: Littorale.
Chorinaeus australis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 201 n. 6, ♂.
brevicalcar Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Chorinaeus brevicalcar Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXI. 1887 p. 201 n. 2, ♀ ♂.
carinatus (Cress.) Prov. — ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Tryphon carinatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 273 n. 2, ♂.
Exochus (Polyrhabdus) carinatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 114.
Chorinaeus carinatus Provancher, Natural Canad. XI. 1879 p. 278, ♀.
Chorinaeus carinatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 433, ♀.
Chorinaeus Californicus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXVIII. 1896 p. 200.
Chorinaeus carinatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 208, ♀ ♂.
cariniger (Walsh) Cress.—♀ ♂—Am.: Illinois, Michigan, Washington, Connecticut, Wisconsin.
Polyrhabdos cariniger Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 98, ♀ ♂.
Chorinaeus cariniger Cresson, Synops. Hymen. Amer. 1887 p. 213.
Chorinaeus flavifrons Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 444, ♀.
Chorinaeus cariniger Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 210, ♀ ♂.
constrictus Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Chorinaeus constrictus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 209, ♀.
costatus Davis — ♀ ♂ — Am.: New Hampshire, Connecticut.
Chorinaeus costatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 211, ♀ ♂.
cristator (Grav.) Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Exochus cristator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 352 n. 226, ♀ ♂.
Exochus cristator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 267 n. 12, ♀ ♂.
Chorinaeus subcarinatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 321 [n. 2, ♂.
Chorinaeus cristator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 2. 1871 p. 101, ♂.
Chorinaeus cristator Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 78 n. 3, ♀ ♂.
Chorinaeus cristator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 108, ♂.
Chorinaeus cristator Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 59; T. 38 F. 3 & 4.
Chorinaeus cristator Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 200 n. 1, ♀ ♂.
Chorinaeus cristator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 42, ♀ ♂.
excessorius Davis — ♀ — Am.: Washington.
Chorineus excessorius Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 209, ♀.
facialis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Chorinaeus facialis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXI. 1887 p. 202 n. 10, ♀ ♂.

flavipes Bridgm. — Eur.: Britannia.
Chorinaeus flavipes Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 165; T. 8 F. 15.
fortipes Cam. — ♀ — Austr.: New Zealand.
Chorinaeus? fortipes Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. P. 1. 1898 p. 29, ♀.
funebris (Grav.) Holmgr.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Exochus funebris Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 695 n. 226b, ♂.
Exochus funebris Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 268 n. 13.
Chorinaeus funebris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 321 [n. 3, ♀ ♂.
Chorinaeus funebris Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 2. 1871 p. 101, ♀.
Chorinaeus funebris Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. 1873 P. 4. p. 78 n. 2, [♀ ♂; T. 2 F. 11.
Chorinaeus funebris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 108, ♀.
Chorinaeus funebris Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 201 n. 5, ♀ ♂.
longicalcar Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Chorinaeus longicalcar Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 201 n. 4, ♀♂.
longicornis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Chorinaeus longicornis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 201 n. 3, ♀♂.
marlattii Ashm. — ♀ — Am.: Illinois, Kansas.
Chorinaeus Marlatti Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 200, ♀.
Chorinaeus Marlatti Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 211, ♀.
nigripes Cam. — ♀ — Austr.: New Zealand.
Chorinaeus nigripes Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. P. 1. 1898 p. 30, ♀.
nitidifrons Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Chorinaeus nitidifrons Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 202 n. 9, ♀ ♂.
onitis Davis — ♀ ♂ — Am.
Chorinaeus onitis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 210, ♀ ♂.
opacitas Davis — ♀ — Am.: Nevada.
Chorinaeus opacitas Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 210, ♀.
pleturus Davis — ♀ — Am.: Michigan.
Chorinaeus pleturus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 211, ♀.
pulchripes Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Chorinaeus pulchripes Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 14, ♀.
Chorinaeus pulchripes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 800, ♀.
pusillus Davis — ♀ ♂ — Am.: Washington, Colorado, New Hampshire.
Chorinaeus pusillus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 211, ♀ ♂.
talpa (Hal.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Exochus talpa Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 113, ♀.
Chorinaeus talpa Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 202 n. 7, ♀♂.
texanus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Texas, Colorado.
Exochus Texanus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 168, ♂.
Chorinaeus Texanus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 209, ♀ ♂.
tricarinatus Holmgr.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Chorinaeus tricarinatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 321 [n. 4, ♀ ♂.
Chorinaeus tricarinatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 101, ♀♂.
Chorinaeus tricarinatus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 77 [n. 1, ♀♂; T. 2 F. 12.

---

[1]) *Lep.:* Depressaria heracleana (Bignell).
[2]) *Lep.:* Hyponomeuta padella (Giraud).

Chorinaeus tricarinatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 108, ♀ ♂.
Chorinaeus tricarinatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 59; T. 38 F. 2.
Chorinaeus tricarinatus Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 202 n. 8, ♀ ♂.

HYPERACMUS

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 322.
ὑπέρ, valde; ἀκμός, acutus.

Synon.: Exochus Gravenhorst.

crassicornis (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Exochus crassicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 347 n. 221, ♀. [n. 1, ♀.
Hyperacmus crassicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 322
Hyperacmus crassicornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 101, ♀ ♂.
Hyperacmus crassicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 108, ♀ ♂.
Hyperacmus crassicornis Capron, Entomolog. XVI. 1883 p. 240, ♀ ♂.
Hyperacmus crassicornis Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1890 p. 199 n. 1, ♀ ♂.
ovatus Davis — ♀ — Am.: Connecticut.
Hyperacmus ovatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 218, ♀.

STRONGYLOPSIS

Brauns, Termész. Füzet. XIX. 1896 p. 274.
Strongylus, nom. propr. Hymen.; ὄψ, visus.

anomala Brauns — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Strongylopsis anomala Brauns, Termész. Füzet. XIX. 1896 p. 274 n. 6, ♀ ♂.

COLPOTROCHIA

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.). p. 307.
κόλπος, sinus; τροχιός, curvus.

Synon.: Anomalon Jurine, Trentepol.
Cryptus Fabricius.
Ichneumon Schrank & auct.
Sphex Scopoli.
Tryphon Gravenhorst, Stephens, Desvignes.

affinis Vollenh. — ♀ — Eur.: Germania.
Colpotrochia affinis Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 12, ♀; T. 8 F. 2.
Colpotrochia affinis Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 110, ♀.
amoena Rdw. — Eur.
Colpotrochia amoena Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 33 n. 3.
elegantula (Schrank) Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon mandator Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 565 n. 41.
? Ichneumon mandator Linné, Faun. Suec. Ed. 2ª 1761 p. 405 n. 1620.
? Sphex cincta Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 292 n. 773; T. 42 F. 773.
? Ichneumon V Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1766; T. 6 F. 13.
? Ichneumon mandator Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 936 n. 45.
? Ichneumon mandator Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 854 n. 45.
Ichneumon elegantulus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 361 n. 727, ♂.

---

1) *Lep.:* Leucania turca (Giraud).

Ichneumon mandator Fabricius, Mant. Insect. 1787 p. 266 n. 83.
Ichneumon elegantulus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1879 p. 144 n. 31 & p. 181 n. 141.
Ichneumon mandator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 171 n. 110 & p. 179 n. 134.
Ichneumon mandator Villers, C. Linnaei Entom. IV. 1789 p. 550 n. 134.
Ichneumon mandator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2694 n. 45.
Ichneumon mandator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 373.
Ichneumon elegantulus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 221 n. 88.
Ichneumon mandator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 187 n. 121.
Ichneumon mandator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 165 n. 132.
Cryptus mandator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 86 n. 65.
Anomalon mandator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 116, ♂.
Ichneumon elegantulus Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 285.
Ichneumon elegantulus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 375 n. 127, ♂.
? Ichneumon mundator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 267.
Ichneumon mandator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 268.
? Ichneumon mundator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 328.
Ichneumon mandator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 330.
Anomalon mandator Trentepol, Isis 1826 p. 300 n. 67.
Ichneumon mandator Germar, Fauna Insect. Europ. P. 4. 1828; Tab. 19.
Tryphon elegantulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 235 n. 154, ♂ [excl. var. 1].
Tryphon elegantulus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 249 n. 49, ♂.
Tryphon elegantulus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 308 n. 9.
Tryphon elegantulus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 225 n. 17, ♂.
Colpotrochia elegantula Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 81 n. 1, ♂.
Colpotrochia elegantula Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) [p. 307 n. 1, ♀.
Colpotrochia elegantula Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXX. P. 4. 1873 p. 56 [n. 1, ♀; T. 2 F. 9.
Colpotrochia elegantula Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 11; T. 8 F. 1.
Colpotrochia elegantula Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 199 n. 1.
Colpotrochia elegantula Buysson, Revue d'entom. XI. 1892 p. 258; T. 1 F. 8.

var. **notata** Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Littorale.
Colpotrochia elongatula var. notata Kriechbaumer, Progr. Gymnas. Pola 1894 p. 18, ♀ ♂.

scotica (Desv.) Marsh. — ♂ — Eur.: Britannia.
Tryphon Scoticus Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 41 n. 40, ♂.
Colpotrochia Scotica Marshall, Catal. Brit. Hymen. III. 1872 p. 79 n. 2.

ALCOCERUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 161 n. 3.
ἀλκή, alces; κέρας, cornu.

Synon.: Exochoides Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 37 [non Holmgren].
Exochus, nom. propr. Hymen.; εἶδος, visus.

concinnus (Cress.) D. T. — ♂ — Am.: Mexico.
Exochoides concinna Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 37 n. 2, ♂.
Alcocerus concinnus m.

mexicanus (Cress.) D. T. — ♂ — Am.: Mexico.
Exochoides Mexicana Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 37 n. 1, ♂.
Alcocerus Mexicanus m.

trifasciatus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Pennsylvania.
Tryphon ? trifasciatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 276 n. 6, ♂.
Alcocerus trifasciatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 207, ♀ ♂.

ISCHYROCNEMOPSIS

Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 81.
ἰσχυρός robur; *κνήμη*, tibia; *ὄψ*, visus.

Synon.: Exochoides Cresson, Davis.

texana (Cress.) Ashm. — ♀ ♂ — Am.: Texas, Carolina.
Exochodes Texana Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 167, ♂.
Ischyrocnemis Carolina Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 443, ♂.
Exochoides Texanus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 207, ♀ ♂.
Ischyrocnemopsis Texanus Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 81.

ISCHYROCNEMIS

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 306.
ἰσχυρός, potens; *κνημίς* tibia.

goesii Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Ischyrocnemis Goesi Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 306 n. 1, ♂.
pacifica Ashm. — ♀ ♂ — Am.: California.
Ischyrocnemis pacificus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 199, ♀ ♂.

PERIOPE

Haliday, Curtis: Guide Ed. 2. 1829 p. 538[a].
Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 113.
Haliday, Westwood: Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 57.
περί, circum; *ὤψ*, oculus.

Synon.: Monoplectron Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 81.
μόνος, solus; *πλῆκτρον*, plectrum.
Oligoplectron Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 161 n. 1.
ὀλίγος, paucus; *πλῆκτρον*, plectrum.
Tryphon Cresson.

aethiops (Cress.) Davis — ♂ — Am.: Canada, Massachusetts, Connecticut.
Tryphon aethiops Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 106, ♂.
Periope aethiops Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 206, ♂.
auscultator Hal. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Periope auscultator Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 114, ♀.
Periope auscultator (Haliday) Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 57.
Monoplectron zygaenator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 81 n. 1, ♀ ♂.
Monoplectron zygaenator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 306 [n. 1, ♀ ♂; T. 9 F. 19 (♂).
Monoplectron auscultator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) [p. 389 n. 1.
Periope auscultator Thomson, Deutsch. entom. Zeitschr. XXXI. 1887 p. 198 n. 1.

17. *Subfam.* Orthocentrinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 142 & 159.

CAMAROTOPS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 160 n. 13.
κάμαρος, cancer marinus; ὤψ, oculus.

Synon.: Neuratelus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 203 [non Ratzeburg].
νεῦρον, nervus; ἀτελής, non perfectus.
Brephoctonus Ashmead.

americana (Ashm.) Davis — ♀ — Am.: Maryland.
Neuratelus Americanus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 203, ♀.
Camerotops Americanus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 226, ♀.

aspera Davis — ♀ — Am.: Illinois.
Camerotops asperus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 226, ♀.

premita Davis — ♂ — Am.: Michigan.
Camerotops premitus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 226, ♂.

ulmicola (Ashm.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Ohio, Columbia. Washington Terr., Florida.
Brephoctonus flavosus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 202.
Neuratelus ulmicola Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 203, ♀.
Neuratelus liriodendri Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 203, ♀ ♂.
Camerotops ulmicola Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 226, ♀ ♂.

STENOMACRUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 160 n. 12.
Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2423.
στενός, angustus; Macrus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Pachyonyx Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 99.
παχύς, crassus; ὀνύξ, unguis.
Bassus Zetterstedt.
Orthocentrus Gravenhorst, Holmgren, Brischke.

affinis (Zett.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Bassus affinis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 379 n. 9, ♀.
Orthocentrus affinis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 347 n. 45, ♀ ♂.
Orthocentrus (Stenomacrus) affinis Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2449 n. 31, ♀ ♂.

agilis (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Orthocentrus agilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 337 n. 22, ♀ ♂.
Orthocentrus agilis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 102, ♀ ♂.
Orthocentrus agilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 109, ♂.
Orthocentrus (Stenomacrus) agilis Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2439 n. 11, ♀.

anceps Szépl. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Stenomacrus anceps Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 59, ♀ ♂.

borealis Ashm. — ♀ — Am.: Bering ins.
Stenomacrus borealis Ashmead, Fur Seals and Fur Seal Islands IV. 1899 p. 338 n. 8, ♀.

callidulus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Orthocentrus callidulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 338 n. 24, ♀ ♂.
Orthocentrus (Stenomacrus) callidulus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2438 n. 9, ♀ ♂.

caudatus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 52, ♀ [p. p.].
Orthocentrus caudatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 350
Orthocentrus (Stenomacrus) caudatus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2440 n. 13, ♀ ♂.

celer (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 24, ♂ [excl. ♀].
? Orthocentrus callidulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 338
Orthocentrus celer Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 341 n. 31, ♀.
Orthocentrus (Stenomacrus) celer Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2435 n. 2, ♀ ♂.

compressus Thoms. — Eur.: Suecia.
Orthocentrus (Stenomacrus) compressus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2436 n. 6.

concinnus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 20, ♀ [excl. ♂].
Orthocentrus concinnus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 336
Orthocentrus concinnus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 102, ♀ ♂; [[var. ♀].
Orthocentrus concinnus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 109, ♀.
Orthocentrus (Stenomacrus) concinnus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2441 n. 15, ♀ ♂.

confinis (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 46, ♀ ♂.
Orthocentrus confinis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 348
Orthocentrus (Stenomacrus) confinis Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2448 n. 27, ♂.

crassicornis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Orthocentrus (Stenomacrus) crassicornis Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2434 n. 1, ♀.

cubiceps Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Orthocentrus (Stenomacrus) cubiceps Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2447 n. 24, ♀ ♂.

curvicaudatus (Brischke) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Orthocentrus curvicaudatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 103, ♀.
Orthocentrus curvicaudatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 111, ♀.
Orthocentrus (Stenomacrus) curvicaudatus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2444 n. 22, [♀ ♂.

curvulus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Orthocentrus (Stenomacrus) curvulus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2443 n. 18, ♀.

deletus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Orthocentrus (Stenomacrus) deletus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2442 n. 16, ♀.

exilis (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀ ♂.
Orthocentrus exilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 340 n. 27,
Orthocentrus (Stenomacrus) exilis Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2438 n. 10, ♀ ♂.

exserens Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Orthocentrus (Stenomacrus) exserens Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2448 n. 28, ♀ ♂.

falcatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Orthocentrus (Stenomacrus) falcatus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2435 n. 3, ♀ ♂.

femoralis (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 34, ♀ ♂.
Orthocentrus silvaticus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 342
Orthocentrus femoralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 346 [n. 42, ♀ ♂.
Orthocentrus silvaticus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 103, ♀ ♂.
Orthocentrus femoralis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 103, ♀ ♂.
Orthocentrus femoralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 110, ♂.
Orthocentrus (Stenomacrus) femoralis Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2445 n. 21, ♀ ♂.

flaviceps (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Orthocentrus flaviceps Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 364 n. 31, ♀.
Orthocentrus flaviceps Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 335 [n. 19, ♂ [p. p.].

Orthocentrus concinnus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 336 [n. 20, ♂ [excl. ♀].
Orthocentrus caudatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 350 [n. 52, ♀ [p. p.].
Orthocentrus flaviceps Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 102, ♂.
Orthocentrus flaviceps Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 109, ♂.
Orthocentrus (Stenomacrus) flaviceps Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2440 n. 14, ♀ ♂.

flavicornis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Orthocentrus (Stenomacrus) flavicornis Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2439 n. 12, ♀.

fortipes Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 19, ♂ [p. p.].
Orthocentrus flaviceps Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 335
Orthocentrus (Stenomacrus) fortipes Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2442 n. 17, ♀ ♂.

hastatus Davis — ♀ — Am.: California.
Stenomacrus hastatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 225, ♀.

innotatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Orthocentrus (Stenomacrus) innotatus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2449 n. 32, ♀ ♂.

intermedius (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [p. 344 n. 37, ♀ ♂.
Orthocentrus intermedius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.)
Orthocentrus intermedius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 103, ♀ ♂.
Orthocentrus intermedius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 110, ♀ ♂.
Orthocentrus (Stenomacrus) intermedius Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2447 n. 25, [♀ ♂.

intritus Davis — ♂ — Am.: Canada.
Stenomacrus intritus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 225, ♂.

laminatus Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Stenomacrus laminatus Szépligeti, Rovart. Lapok. V. 1898 p. 59, ♀.

merula (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Lapponia, Suecia, Germania.
? Ichneumon annulator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 158 n. 1837.
? Ichneumon annulator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 995 n. 160.
Orthocentrus merula Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 366 n. 34, ♀ ♂.
Bassus pusillus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 379 n. 12, ♂.
Bassus minutissimus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 379 n. 8, ♀. [♀ ♂.
Orthocentrus merula Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 349 n. 48,
Orthocentrus (Stenomacrus) merula Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2446 n. 23, ♀ ♂.

minutus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 29, ♀.
Orthocentrus minutus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 340
Orthocentrus (Stenomacrus) minutus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2449 n. 30, ♀ ♂.

nemoralis (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 41, ♀ ♂.
Orthocentrus nemoralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 345
Orthocentrus (Stenomacrus) nemoralis Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2448 n. 29, ♀.

ochripes (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
? Bassus pusillus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 379 n. 12. [n. 51, ♂
Orthocentrus ochripes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 350
Orthocentrus (Stenomacrus) ochreipes Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2446 n. 22, ♀ ♂.

palustris (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 40, ♀ ♂.
Orthocentrus palustris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 345
Orthocentrus (Stenomacrus) palustris Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2450 n. 32, ♀ ♂.

pusillus (Holmgr.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 32, ♀.
Orthocentrus pusillus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 341
Orthocentrus pusillus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 103, ♀.
Orthocentrus (Stenomacrus) pusillus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2436 n. 5, ♀.

ridibundus (Grav.) Thoms.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Orthocentrus ridibundus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 366 n. 33, ♂. [n. 21, ♀ ♂.
Orthocentrus ridibundus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 336
Orthocentrus (Stenomacrus) ridibundus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2437 n. 7, ♀ ♂.
stigmatias (Walsh) Davis — ♀ — Am.: Illinois.
Pachyonyx (Orthocentrus) stigmatias Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 101, ♀.
Stenomacrus ? stigmatias Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 225, ♀.
superus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Orthocentrus (Stenomacrus) superus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2443 n. 19, ♀ ♂.
tristis (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 38, ♂ [excl. ♀].
Orthocentrus tristis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 344
Orthocentrus (Stenomacrus) tristis Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2448 n. 26, ♂.
ungula Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Orthocentrus (Stenomacrus) ungula Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2436 n. 4, ♀.
ventralis (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 23, ♀.
Orthocentrus ventralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 338
Orthocentrus vittatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 339 [n. 26, ♂.
Orthocentrus vittatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 102, ♀ ♂.
Orthocentrus vittatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 109, ♂.
Orthocentrus (Stenomacrus) ventralis Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2437 n. 8, ♀ ♂.

PHAENOSEMUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 160 n. 11.
φαίνω, in lucem edo; *σημαῖον*, nota.
Species exstat.

ORTHOCENTRUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 358 n. 2.
ὀρθός, rectus; *κέντρον*, aculeus.

Synon.: Mnesidacus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 159 n. 2.
Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 202.
μνῆσις, recordatio; *δάκος*, animal venenatum.
Cryptus Haliday.
Bassus Zetterstedt, Blanchard.
Pachyonyx Walsh.
Tryphon Zetterstedt.

ambiguus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 7, ♀.
Orthocentrus ambiguus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 329
atratus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 28, ♀.
Orthocentrus atratus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 340
Orthocentrus atratus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 109, ♂.
attenuatus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 9, ♀.
Orthocentrus attenuatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 330
Orthocentrus attenuatus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2428 n. 9, ♀.
bifasciatus Brullé — ♀ — Austr.: Tasmania.
Orthocentrus bifasciatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 115 n. 1, ♀.

[1]) *Dipt.:* Sciara nigripennis (Giraud).

binotatus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 43, ♀.
Orthocentrus binotatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 346
bispinus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia. [n. 49, ♂.
Orthocentrus bispinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 349
canadensis Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Orthocentrus Canadensis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 142.
Orthocentrus Canadensis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 279 n. 2, ♀ ♂.
Orthocentrus Canadensis Provancheer, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 435 n. 3, ♀ ♂.
Orthocentrus Canadensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 224, ♂.
carinulatus Holmgr. — ♂ — As.: Waigiou.
Orthocentrus carinulatus Holmgren, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 156 n. 35, ♂.
cephalotes Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 47, ♀ ♂.
Orthocentrus cephalotes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 348
cognatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 39, ♀ ♂.
Orthocentrus cognatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 344
corrugatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania. [n. 8, ♂.
Orthocentrus corrugatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 329
Orthocentrus corrugatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 102, ♂.
Orthocentrus frontalis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 103, ♀.
Orthocentrus corrugatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 108, ♂.
Orthocentrus frontalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 110, ♀.
Orthocentrus corrugatus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2425 n. 2, ♀ ♂.
discolor Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 18, ♀ ♂.
Orthocentrus discolor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 332
Orthocentrus discolor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 109, ♀.
Orthocentrus discolor Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2426 n. 7, ♀ ♂.
dispar Holmgr. — ♀ ♂ — As.: Waigiou.
Orthocentrus dispar Holmgren, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 156 n. 36, ♀ ♂.
facialis Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Orthocentrus facialis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 110, ♀.
frontator (Zett.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Tryphon frontator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 398 n. 26, ♀. [n. 3, ♀ ♂.
Orthocentrus frontator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 326
Orthocentrus frontator Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2425 n. 3, ♀ ♂.
fulvipes Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Orthocentrus anomalus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 360 n. 27, ♀ [nec ♂].
Orthocentrus incisus var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 361, ♂.
Orthocentrus fulvipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 363 n. 30, ♂ [nec ♀].
Bassus (Orthocentrus) anomalus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 321 n. 2.
Orthocentrus anomalus Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 59.
Orthocentrus fulvipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 334 [n. 16, ♀ ♂.
Orthocentrus anomalus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 351 [n. 53, ♀ [excl. ♂].
Orthocentrus anomalus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 110, ♀.
Orthocentrus fulvipes Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2429 n. 1', ♀ ♂.
hastatus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 54, ♀.
Orthocentrus hastatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 352

---

[1]) *Col.:* Saperda scalaris (Giraud).

hilaris Holmgr. — ♀ — As.: Waigiou.
Orthocentrus hilaris Holmgren, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 158 n. 40, ♀.
hirticornis Holmgr. — ♀ ♂ — As.: Waigiou.
Orthocentrus hirticornis Holmgren, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 157 n. 38, ♀ ♂.
histrio Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 12, ♀ ♂.
Orthocentrus histrio Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 331
incisus Grav. — ♂ — Eur.: Britannia.
Orthocentrus incisus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 361 n. 28, ♂.
insularis Ashm. — ♂ — Am.: St. Vincent.
Orthocentrus insularis Ashmead, Journ. Linn. Soc. Zool. XXV. 1894 p. 142, ♂.
intermedius Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Orthocentrus intermedius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Reinl. VII. 1850 p. 499 n. 20, ♀.
laricis (Hal.) Marsh. — ♀ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Acrodactylus) laricis Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 117, ♀.
Orthocentrus laricis Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 81 n. 4.
laticollis Holmgr. — ♀ — As.: Waigiou.
Orthocentrus laticollis Holmgren, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 158 n. 41, ♀.
lineatus Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Orthocentrus lineatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 102, ♂.
Orthocentrus lineatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 109, ♂.
longicornis Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 2, ♀.
Orthocentrus longicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 326
lucens Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Orthocentrus lucens Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 280 n. 4, ♀.
Orthocentrus lucens Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 479 n. 4, ♀.
Orthocentrus lucens Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 224, ♀.
marginatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 4, ♀ ♂.
Orthocentrus marginatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 327
Orthocentrus marginatus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2425 n. 4, ♀ ♂.
medialis Davis — ♀ — Am.: Illinois.
Orthocentrus medialis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 224, ♀.
molestus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia. [n. 33, ♂.
Orthocentrus molestus Holmgren, Svensk. Vet-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 342
monilicornis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 13, ♀ ♂.
Orthocentrus monilicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 332
Orthocentrus monilicornis Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2426 n. 6, ♀.
morio Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀ ♂.
Orthocentrus morio Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 339 n. 25,
morionellus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 30, ♀ ♂.
Orthocentrus morionellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 341
Orthocentrus morionellus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 102, ♀ ♂.
Orthocentrus morionellus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 109, ♀ ♂.
neglectus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Orthocentrus neglectus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. VII. 1850 p. 498 n. 19, ♀.
nigricornis Boh. — ♀ ♂ — As.: Spitzbergae. [♀ ♂.
Orthocentrus nigricornis Boheman, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXII. 1865 p. 369 n. 5,
Orthocentrus nigricornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. VIII. 5. 1869 p. 24.
nigricoxus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Illinois, Washington Terr.
Orthocentrus nigricoxus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 369 n. 7, ♀.
Mnesidacus apicalis Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 202.
Orthocentrus nigricoxus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 223, ♀ ♂.

nigristernus Rond.[1] — ♂ — Eur.: Italia.
Orthocentrus incisus var. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 361 n. 28, ♂.
Orthocentrus nigristernus Rondani, Bull. soc. entom. Ital. IX. 1877 p. 192 n. 57.
pallidipes Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 44, ♀ ♂.
Orthocentrus pallipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 347
palpalis Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Borussia.
Orthocentrus palpalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 43, ♀ ♂.
patulus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 6, ♀.
Orthocentrus patulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 328
Orthocentrus patulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 42, ♀.
pedestris Holmgr. — ♀ ♂ — As.: Spitzbergen.
Orthocentrus pedestris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. VIII. 5. 1869 p. 23, ♀ ♂.
petiolaris Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Orthocentrus petiolaris Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2428 n. 10, ♀.
pexatus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia; As.: Waigiou. n. 35, ♂.
Orthocentrus pexatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 343
pilifrons Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Orthocentrus pilifrons Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 279 n. 1, ♀.
Orthocentrus pilifrons Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 438 n. 1, ♀.
Orthocentrus pilifrons Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 223, ♀.
pirasii Costa — ♂ — Eur.: Sardinia.
Orthocentrus Pirasii A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli XXIV. 1885 p. 323.
Orthocentrus Pirasii A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. 7. 1886 p. 16, ♂.
Orthocentrus Pirasii A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. II. 1890 p. 114.
protervus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 10, ♀.
Orthocentrus protervus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 330
protuberans Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia; As.: Waigiou. [p. 333 n. 15, ♀ ♂.
Orthocentrus protuberans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.)
Orthocentrus protuberans Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2429 n. 12, ♀ ♂.
pumilus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 55, ♀.
Orthocentrus pumilus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 352
radialis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Orthocentrus radialis Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2430 n. 14, ♀ ♂.
repentinus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. n. 5, ♀ ♂.
Orthocentrus repentinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 327
Orthocentrus repentinus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2427 n. 8, ♂.
reptilis Marsh. — ♀ — As.: Spitzbergae, Loom Bay.
Orthocentrus reptilis Marshall, Entom. M. Magaz. XIII. 1877 p. 242, ♀.
rivosus Holmgr. — ♀ ♂ — As.: Waigou.
Orthocentrus rivosus Holmgren, Entom. Tidskr. IV. 1883 p. 156 n. 33, ♀ ♂.
rufescens Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Orthocentrus rufescens Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 102, ♀.
Orthocentrus rufescens Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 108, ♀.
rufipes Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Orthocentrus rufipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 103, ♀
Orthocentrus rufipes Brischke, Schrift. naturf. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 110, ♀.
rufus Brullé — ♂ — Afr.: Senegal.
Orthocentrus rufus Brullé, Hist. nat. insect. Hymén. IV. 1846 p. 116 n. 2, ♂.

---

[1]) *Col.:* Balaninus glandium (Rondani).

sannio Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 11, ♀ ♂.
Orthocentrus Sannio Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 331
Orthocentrus Sannio Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 102, ♂.
Orthocentrus Sannio Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 109, ♂.
Orthocentrus Sannio Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2426 n. 5, ♀ ♂.
solitarius Holmgr. — ♂ — As.: Waigiou.
Orthocentrus solitarius Holmgren, Entom. Tidskr. IV. 1883 p. 156 n. 34, ♂.
spurius Grav. — ♀ — Eur.
Orthocentrus spurius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 362 n. 29, ♀.
stigmaticus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [p. 325 n. 1, ♀ ♂.
Orthocentrus stigmaticus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.)
Orthocentrus stigmaticus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 102, ♂.
Orthocentrus stigmaticus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 108, ♂.
Orthocentrus stigmaticus Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2424 n. 1, ♀ ♂.
strigatus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 17, ♀.
Orthocentrus strigatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 335
Orthocentrus strigatus Thomson, Opusc. P. 22. 1898 p. 2428 n. 11, ♀.
testaceipes Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Orthocentrus testaceipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 110, ♀.
trifasciatus Walsh — ♀ ♂ — Am.: Illinois. [♀ ♂.
Pachyonyx (Orthocentrus) trifasciatus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 100,
Orthocentrus trifasciatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 224, ♀ ♂.
vafer Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. n. 36, ♀.
Orthocentrus vafer Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 343
validicornis Boh. — ♀ ♂ — As.: Spitzbergen, Waigiou. [♀ ♂.
Orthocentrus validicornis Boheman, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXII. 1865 p. 370 n. 6,
Orthocentrus validicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. VIII. 5. 1869 p. 24.
variabilis Ashm. — ♀ ♂ — Am.: St. Vincent.
Orthocentrus variabilis Ashmead, Journ. Linn. Soc. Zool. XXV. 1894 p. 141, ♀ ♂.
varius Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 18, ♂.
Orthocentrus varius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 335
vitripennis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 50, ♀ ♂.
Orthocentrus vitripennis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 350
winnertzii Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania. [♀ ♂.
Orthocentrus Winnertzii Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. VII. 1850 p. 496 n. 18,

ATMETUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 160 n. 9.
ἄτμητος, non sectus.

Synon.: Orthocentrus Provancher.

californicus Ashm. — ♀ — Am.: Ohio.
Atmetus Californicus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 204, ♀.
Atmetus Californicus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 222, ♀.
carinatus (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, Colorado, Illinois.
Orthocentrus carinatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 281 n. 5, ♂.
Orthocentrus carinatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 436 n. 5, ♂.
Atmetus tetrazonatus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 204, ♀.
Atmetus carinatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 223, ♀ ♂.
insularis Ashm. — ♂ — Am.: Copper, Island.
Atmetus insularis Ashmead, Fur Seals & Fur Seal Islands IV. 1899 p. 337 n. 7, ♂.

nigritus Ashm. — ♀ — Am.: Ohio, Illinois.
Atmetus nigritus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 204, ♀.
Atmetus nigritus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 222, ♀.

TAPINOPS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 160 n. 8.
ταπεινός, humilis; ὄψ, visus.

Synon.: Exochiscus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 96.
Exochus, nom. propr. Hymen.
Alomyia Provancher.
Ophion Say, Leconte.
Orthocentrus Provancher, Ashmead.

emarginata (Say) Ashm. — ♀ ♂ — Am.: Indiana.
Ophion emarginatus Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 76 n. 4.
Ophion emarginatus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 380 n. 4.
Exochiscus pusillus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 97, ♂.
Alomyia abdominalis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 129, ♀ ♂.
Orthocentrus abdominalis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 280 n. 3, ♀ ♂.
Orthocentrus abdominalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 435 n. 3, ♀ ♂.
Orthocentrus Californicus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 442, ♀.
Tapinops Californicus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 204.
Tapinops emarginatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 222, ♀ ♂.

DELETER

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 160 n. 7.
δηλητήρ, qui laedit.

obscurus Davis — ♀ ♂ — Am.: Michigan, Illinois.
Deleter obscurus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 221, ♀ ♂.
suffuscus Davis — ♂ — Am.: New Hampshire.
Deleter suffuscus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 221, ♂.
undulatus Davis — ♀ ♂ — Am.: Michigan, Illinois.
Deleter undulatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 221, ♀ ♂.

NEURATELES

Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 86 n. 8.
νεῦρον nervus; ἀτελής, non perfectus.

Synon.: Orthocentrus Ashmead.

leucopsis (Ashm.) Davis — ♂ — Am.: Colorado.
Orthocentrus leucopsis Ashmead, Bull. Colorado Biol. Assoc. I. 1890 p. 24, ♂.
Neuratelus leucopsis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 221, ♂.
meridionalis Ashm. — ♀ — Am.: Granada.
Neurateles meridionalis Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 269 n. 178, ♀.
papyraceus Ratzbg.[1] — ♀ — Eur.: Germania.
Neurateles papyraceus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 86, ♀.

---

[1] *Col.:* Pissodes notatus (Ratzeburg).

HYPOLEPTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 159 n. 5.
ὑπό, subtus; λεπτός, tenuis.

columbianus Ashm. — ♂ — Am.: Washington Terr.
Hypoleptus Columbianus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 202, ♂.
Hypoleptus Columbianus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 220.

BREPHOCTONUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 159 n. 4.
βρέφος, infans; κτείνω, interficio.

californicus Ashm. — ♂ — Am.: California, Florida.
Brephoctonus Californicus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 202, ♂.
Brephoctonus Californicus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 220, ♂.

PICROSTIGEUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 159 n. 3.
Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2423.
πικρός, acerbus; στίγευς, subula.

Synon.: Orthocentrus Gravenhorst, Brischke.

debilis (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.
Orthocentrus debilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 365 n. 32.
Orthocentrus (Picrostigeus) debilis Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2432 n. 2, ♀♂.
recticauda Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 18, ♂.
? Orthocentrus varius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 335
Orthocentrus anomalus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 351 [n. 53, ♀.
Orthocentrus (Picrostigeus) recticauda Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2431 n. 1, ♀♂.
setiger (Brischke) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Orthocentrus setiger Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 103, ♀.
Orthocentrus setiger Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 110, ♀.
Orthocentrus (Picrostigeus) setiger Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1898 p. 2432 n. 3, ♀.

MNESIDACUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 159 n. 2.
μνῆσις, recordatio; δάκος, animal venenatum.

Vide genus Orthocentrus.

SYNOPLUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 159 n. 1.
σύνοπλος, armorum socius.

Species exstat.

18. *Subfam.* **Bassinae**

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 142 & 162.

HOMOTROPUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 162 n. 10.
ὅμοιος, par; τρόπος, modus.

Synon.: Homoporus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1488.
ὅμοιος, par; πόρος, transitus.
Bassus Gravenhorst & auct., Walsh, Provancher, Cresson.
Lampronota Cresson.
Tryphon Zetterstedt, Provancher.

abdominator (Bridgm.) D. T. — ♀ — Eur.: Britannia.
Bassus abdominator Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 365, ♀.
Homoporus abdominator Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1502 n. 10, ♀.
Homotropus abdominator m.
affinis Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Homotropus affinis Szépligeti, Rovart. Lapok. V. 1898 p. 78, ♀.
alpinus (Holmgr.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Bassus alpinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 361 n. 19, ♀.
Bassus alpinus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 2. 1871 p. 104, ♀.
Bassus alpinus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 112, ♀.
Homoporus alpinus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1498 n. 6, ♀ ♂.
Homotropus alpinus m.
bicapillaris (Walsh) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, Colorado, Illinois, New Hampshire.
Bassus bicapillaris Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 88, ♂.
Bassus pectoralis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 32.
Bassus Belangeri Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 56.
Bassus Belangeri Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 275 n. 7, ♀.
Bassus pectoralis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 276 n. 9, ♂.
Bassus Belangeri Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 430.
Bassus pectoralis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 431.
Homotropus bicapillaris Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 28, ♀ ♂.
var. **albopictus** Davis — ♀ ♂ — Am. bor.
Homotropus bicapillaris var. albopictus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 28, ♀ ♂.
bifoveolatus (Kriechb.) D. T. — ♀ — Eur.: Mallorca.
Homoparus bifoveolatus Kriechbaumer, Anal. soc. hist. nat. Españ. XXIII. 1894 p. 246 n. 20, ♀
Homotropus bifoveolatus m. [[err. typogr.].
biguttatus (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Bassus biguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 332 n. 10, ♂. [♀ ♂.
Bassus biguttatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 358 n. 12,
Bassus biguttatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 2. 1871 p. 104, ♂.
Bassus biguttatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1875 p. 4; T. 1 F. 8.
Bassus biguttatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 112, ♂.
Homoporus biguttatus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1500 n. 9, ♀ ♂.
Homotropus biguttatus m.
bizonarius (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Bassus bizonarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 350 n. 23, ♂.
Bassus bizonarius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 2. 1871 p. 104, ♀ ♂.

Bassus bizonarius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 111, ♀ ♂.
Bassus bizonarius Jacob & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 120.
Homoporus bizonarius Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1493 n. 2, ♀ ♂.
Homotropus bizonarius m.

brevicornis (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Gallia.
Homoporus brevicornis Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1507 n. 16, ♀.
Homotropus brevicornis m.

brevitarsis (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia.
Homoporus brevitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1495 n. 4, ♀ ♂.
Homotropus brevitarsis m.

caudatus (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Homoporus caudatus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1499 n. 7, ♀ ♂.
Homotropus caudatus m.

crassicrus (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Oelandia. [[non Gravenhorst].
Bassus fissorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 362 n. 22, ♀
Homoporus crassicrus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1516 n. 22, ♀.
Homotropus crassicrus m.

decoratus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: California, Nevada.
Bassus decoratus Cresson, Proc. Acad. Sc. Philadelphia 1878 p. 375, ♂.
Homotropus decoratus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. 1895 p. 29, ♀ ♂.

elegans (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Bassus elegans Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 313 n. 2, ♂.
Bassus elegans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 371 n. 40, ♀ ♂.
Bassus elegans Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (3.) I. 3. 1862 p. 221, ♀ ♂.
Bassus elegans Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 2. 1871 p. 106, ♀ ♂.
Bassus elegans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 113, ♀ ♂.
Homoporus elegans Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1520 n. 26, ♀ ♂.
Homotropus elegans m.

fissorius (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Bassus fissorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 335 n. 12, ♀.
Bassus fissorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 116 n. 6.
Bassus fissorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 2. 1871 p. 105, ♀.
Bassus fissorius Kriechbaumer, Entom. Nachr. III. 1877 p. 166.
Bassus fissorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 112, ♀.
Homoporus fissorius Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1504 n. 13, ♀ ♂.
Homotropus fissorius m.

flavolineatus (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia. [stedt].
Bassus flavolineatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 337 n. 14b [non Zetter-
Bassus flavolineatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 358 [n. 11, ♀.
Bassus flavolineatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. P. 2. 1871 p. 104, ♀ var.
Bassus flavolineatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 112, ♀.
Bassus flavolineatus Jacob & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 121.
Homoporus flavolineatus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1502 n. 11, ♀ ♂.
Homotropus flavolineatus m.

haemorrhoidalis Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Homotropus haemorrhoidalis Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 78, ♀. [California.

humeralis (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, Nevada, Colorado, Montana, Washington,
? Lampronota macra Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 163 n. 12, ♂.
Tryphon humeralis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 117.
Bassus fuscitarsus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 143.

Bassus humeralis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 274 n. 5, ♀ ♂.
Bassus fuscitarsis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 275 n. 6, ♂.
Bassus humeralis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 429 n. 5, ♀ ♂.
Bassus fuscitarsis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 430 n. 6, ♂.
Homotropus humeralis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 27, ♀ ♂.

hygrobius (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Bassus festivus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 84 n. 10, ♀ ♂ [non Fabricius].
Bassus festivus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 368 n. 34, ♀ ♂ [non Fabricius].
Bassus festivus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. P. 2. 1871 p. 106, ♀ ♂.
Homoporus hygrobius Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1524 n. 29, ♀ ♂.
Homotropus hygrobius m.

incisus (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Homoporus incisus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1511 n. 19, ♀.
Homotropus incisus m.

lateralis (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania, Belgia.
Bassus lateralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 342 n. 19, ♂.
Bassus lateralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 83 n. 6, ♂.
Bassus lateralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 355 n. 5, ♀ ♂.
Bassus lateralis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 104, ♀ ♂.
Bassus lateralis Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1875 p. 3; T. 1 F. 5.
Bassus lateralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 111, ♂.
Bassus lateralis Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 121.
Homoporus lateralis Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1492 n. 1, ♀ ♂.
Homotropus lateralis m.

longiventris (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Bassus pumilus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 364 n. 27, ♀ ♂ [p. p.].
Homoporus longiventris Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1514 n. 21, ♀ ♂.
Homotropus longiventris m.

megaspis (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Homoporus megaspis Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1516 n. 23, ♀.
Homotropus megaspis m.

nigricornis (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Homoporus nigricornis Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1506 n. 15, ♀.
Homotropus nigricornis m.

obscuripes (Holmgr.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Bassus obscuripes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 369 n. 38, ♀ ♂.
Bassus picitans Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (3.) I. 3. 1862 p. 217, ♀ ♂.
Homoporus graculus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1494 n. 3, ♀ ♂.
Homotropus obscuripes m.

ornatus (Grav.) D. T.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Bassus deplanatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 340 n. 17, ♀ [excl. ♂].
Bassus ornatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 341 n. 18, ♂.
Bassus ornatus Boie, Arch. f. Naturg. II. P. 1. 1836 p. 39 n. 1.
Bassus deplanatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 87 n. 7, ♀.
Bassus deplanatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 362 n. 21, ♀ ♂.
Bassus ornatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 105, ♂.
Bassus ornatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 113, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Noctua chenopodii (Boie).

Homoporus ornatus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1505 n. 14, ♀ ♂.
Homotropus ornatus m.

pallidipennis (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Bassus pallipennis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 56.
Bassus pallipennis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 276 n. 10, ♀.
Bassus pallipennis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 431 n. 10, ♀.
Homotropus pallipennis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 28, ♀.

pallidipes (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Bassus pallipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 325 n. 5, ♂. [[non ♀].
Bassus pallipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 301 n. 41, ♂
Homoporus pallipes Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1519 n. 25, ♀ ♂.
Homotropus pallidipes m.

pectoratorius (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Bassus pectoratorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 333 n. 11, ♀ ♂.
Bassus pectoratorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 116 n. 4, ♀ ♂.
Bassus pectoratorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 82 n. 2, ♂.
Bassus pectoratorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 357 [n. 9, ♀ ♂.
Bassus pectoratorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 104, ♀ ♂.
Bassus pectoratorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1875 p. 4; T. 1 F. 7.
Bassus pectoratorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 112, ♀ ♂.
Bassus pectoratorius Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 120.
Homoporus pectoratorius Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1496 n. 5, ♀ ♂.
Homotropus pectoratorius m.

pictus (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Bassus pictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 336 n. 13, ♀ ♂.
Bassus pictus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 361 n. 20, ♀.
Bassus pictus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 112.
Homoporus pictus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1511 n. 20, ♀ ♂.
Homotropus pictus m.

pulcher (Holmgr.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Belgia.
Bassus pulcher Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 370 n. 39, ♀ ♂.
Homoporus pulcher Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 125.
Homoporus pulcher Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1522 n. 27, ♀ ♂.
Homotropus pulcher m.

pumilus (Holmgr.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
? Bassus pictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 336 n. 13, ♀ ♂.
Bassus pumilus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 364 n. 27, ♀ ♂
Homoporus pumilus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1513, ♀ ♂. [[p. p.].
Homotropus pumilus m.

punctiventris (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Dania.
Homoporus punctiventris Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1500 n. 8, ♀.
Homotropus punctiventris m.

ruficornis (Holmgr.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Bassus ruficornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 363 n. 23, ♀.
Bassus ruficornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 105, ♀.
Bassus ruficornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 112, ♀.
Homoporus ruficornis Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1509 n. 18, ♀ ♂.
Homotropus ruficornis m.

sexcinctus Brauns — ♂ — Eur.: Hungaria.
Bassus (Homotropus) sexcinctus Brauns, Termész. Füzet. XIX. 1896 p. 273, ♂.

signatus (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia, Germania.
Bassus signatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 325 n. 6, ♀.
Tryphon nigricornis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 399 n. 29, ♀.
Bassus signatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 85 n. 12, ♀ ♂.
Bassus signatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 367 n. 33, ♀ ♂.
Bassus signatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 105, ♀ ♂.
Bassus signatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 113, ♀ ♂.
Homoporus signatus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1523 n. 28, ♀ ♂.
Homotropus signatus m.

sundevalli (Holmgr.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Bassus Sundevalli Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 364 n. 26, [♀ ♂.
Bassus scabrosus Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (3) I. P. 3. 1862 p. 217, ♂.
Bassus Sundevalli Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 113, ♀.
Homoporus Sundevalli Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1508 n. 17, ♀ ♂.
Homotropus Sundevalli m.

tarsatorius (Panz.) D. T.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Belgia.
Bassus tarsatorius Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 P. 102 T. 19.
Bassus exsultans Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 328 n. 8, ♂.
Bassus insignis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 349 n. 22, ♀.
Bassus tarsatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 932 n. 82.
Bassus exsultans Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 122 n. 2.
Bassus insignis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 116 n. 5, ♀.
Bassus exsultans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 359 n. 13, [♀ ♂ [excl. var. 1].
Bassus insignis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 360 n. 16, ♀.
Bassus insignis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 104, ♀.
Bassus exsultans Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 104, ♀ ♂.
Bassus insignis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 112, ♀.
Bassus exsultans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 112, ♀ ♂.
Bassus tarsatorius Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 122.
Homoporus tarsatorius Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1503 n. 12, ♀ ♂.
Homotropus tarsatorius m.

tuberculatus Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Orthocentrus (Homotropus ?) tuberculatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. [P. 4. 1891 p. 62, ♀ ♂.

xanthaspis (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Dania.
Homoporus xanthaspis Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1518 n. 24, ♀ ♂.
Homotropus xanthaspis m.

ENIZEMUM

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 162 n. 9.
ἐνίζημα, sedes.

Synon.: Bassus Cresson, Provancher.

tibiale (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, Illinois, Montana, Colorado.
Bassus tibialis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 110, ♀.
Bassus tibialis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 273 n. 1, ♀.
Bassus tibialis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 428 n. 1, ♀.
Enizemum tibiale Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 27, ♀ ♂.

---

[1] *Dipt.:* Syrphus balteatus (Ratzeburg).

ANIAROPHRON

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 162 n. 7.
ἀνιαρός, moerorem afferens; φρόνημα, cognitio.

Species exstat.

PHTHORIMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 162 n. 8.
φθόριμος, qui corrumpitur.

Synon.: Phthorimus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1474.
Bassus Desvignes, Kriechbaumer.

compressa (Desv.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Bassus compressus Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 91 n. 19, ♀.
Bassus compressus Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (3) I. P. 3. 1862 p. 220, ♀ ♂.
Bassus ? ibalioides Kriechbaumer, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 211, ♀.
Phthorimus compressus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1474 n. 1, ♀.

SYRPHOCTONUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 162 n. 6.
Syrphus, nom. propr. Dipt.; κτείνω, interficio.

Synon.: Bassus Cresson, Provancher, Cameron.
Mesoleius Provancher.

agilis (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Bassus agilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 111, ♂.
Bassus frontalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 111, ♀.
Bassus frontalis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 274 n. 4, ♀.
Bassus agilis Provancher, Natural. Canad, XI. 1879 p. 275 n. 8, ♀.
Mesoleius junctus Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 11 n. 7, ♂.
Bassus frontalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 429 n. 4, ♀.
Bassus agilis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 431 n. 8, ♀.
Mesoleius junctus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 797 n. 7, ♂.
Bassus frontalis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 281 n. 1; T. 11 F. 8.
Syrphoctonus frontalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 25, ♀ ♂.
Syrphoctonus agilis Harrington, Canad. Entomol. XXIX. 1897 p. 45.

cressonii Davis — ♀ — Am.: Nevada.
Syrphoctonus Cressonii Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 27, ♀.

gillettii Davis — ♀ ♂ — Am.: Colorado.
Syrphoctonus Gillettii Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 26, ♀.

maculifrons (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: California, Nevada, Colorado, Montana, Illinois.
Bassus maculifrons Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 272 n. 2, ♀.
Bassus semifasciatus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 87, ♂.
Bassus maculifrons Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 374, ♀ ♂.
Syrphoctonus maculifrons Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 26, ♀ ♂.

mellipes (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Bassus mellipes Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 429 n. 23, ♀.
Syrphoctonus mellipes Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 26, ♀.

pacificus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: California, Nevada, Vancouvers Island, Washington.
Bassus pacificus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 376, ♀ ♂.
Bassus xanthopsis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 440, ♂.
Syrphoctonus pacificus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 26, ♀ ♂.
Syrphoctonus pacificus Harrington, Canad. Entomol. XXIX. 1897 p. 45.
pleuralis (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: California, Ohio.
Bassus pleuralis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 111, ♀.
Bassus syrphicola Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 439, ♀.
Syrphoctonus pleuralis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 25, ♀ ♂.
robustus Davis — ♂ — Am.: Washington.
Syrphoctonus robustus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 25, ♂.

ZOOTREPHES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 162 n. 5.
Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1486.
ζῶον, animal; *τρέφω*, alo.

Synon.: Bassus Cresson & auct.

antennatus Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, New Hampshire.
Zootrephes antennatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 23, ♀ ♂.
cingulatus (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, New Hampshire.
Bassus cingulatus Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 11 n. 16.
Bassus cingulatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 798 n. 16, ♀.
Zootrephes cingulatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 24, ♀ ♂.
compressus Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Zootrephes compressus Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 76, ♀.
fasciatus Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Zootrephes fasciatus Szépligeti, Természr. Füzet. XXIII. 1900 p. 11 & 29 n. 65, ♂.
frigidus (Cress.) Davis — ♀ — Am.: Hudsons Bay.
Bassus frigidus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 111, ♀.
Zootrephes frigidus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 22, ♀.
hilaris Woldst. — ♂ — As.: Sibiria.
Bassus (Zootrephes) hilaris Woldstedt, Stettin. entom. Zeitg. XLI. 1880 p. 175 n. 2, ♂.
holmgrenii (Bridgm.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Bassus Holmgreni Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 161, ♀ ♂.
Zootrephus Holmgreni Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1487 n. 1, ♀ ♂.
ichneumonoides (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Bassus ichneumonoides Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 57, ♀.
Bassus ichneumonoides Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 277 n. 14, ♀ ♂.
Bassus ichneumonoides Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 11 n. 14.
Bassus ichneumonoides Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 432 & 798 n. 14.
Zootrephes ? ichneumonoides Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 23, ♀ ♂.
inconstans Davis — ♀ ♂ — Am.: Washington, Nevada, Colorado, Massachusetts.
Zootrephes inconstans Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 23, ♀ ♂.
montanus Davis — ♀ ♂ — Am.: Montana, Nevada, Michigan.
Zootrephes montanus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 24, ♀ ♂.
rufiventris Thoms. — ♀ — Eur.
Zootrephus rufiventris Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1488 n. 2, ♀.
saginatus (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, New Hampshire.
Bassus saginatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 277 n. 13, ♀.

Bassus saginatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 432 n. 13, ♀.
Zootrephes saginatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 23, ♀ ♂.
scapulatus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Bassus scapulatus Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 11 n. 15, ♀.
Bassus scapulatus Provancher, Faun. entom. Canad. Hymén. 1883 p. 798 n. 15, ♀.
Zootrephes scapulatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 22, ♀.
tricolor Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Zootrephes tricolor Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 77, ♀.

LIOPSIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 162 n. 4.
λεῖος, levis; ὄψις, visus.

Species exstat.

BIOBLAPSIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 162 n. 3.
βιόω, vivo; βλάψις, laesio.

Synon.: Trichomastix Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXI. 1878 p. 160.
Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1455.
θρίξ, pilus; μάστιξ, virga.
Bassus Holmgren, Bridgman.

flavipes (Holmgr.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania. [[nec Lucas].
Bassus flavipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 356 n. 7, ♂
Trichomastix polita Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXI. 1878 p. 161 n. 8; T. 9 F. 4 & 4a-c.
Bassus tibialis Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 170, ♀.
Trichomastix pallipes Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1473 n. 1, ♀ ♂ [error.].
Bioblapsis flavipes m.

PROMETHES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 162 n. 2.
πρό, antea; μηθείς, μηδείς, nemo.

Synon.: Promethus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1475.
Bassus Gravenhorst & auct.
Ichneumon Fabricius.
Ophion Fabricius.

albicoxa Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Gallia.
Promethus albicoxa Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1479 n. 4, ♀ ♂.
albipes Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Promethes albipes Szépligeti, Rovart. Lapok. V. 1898 p. 76, ♂.
cognatus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Promethus cognatus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1481 n. 5, ♀.
costalis (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, New Hampshire, Montana, Washington.
Bassus costalis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 58, ♀.
Bassus costalis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 277 n. 12, ♀.
Bassus longicornis Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 14 n. 18, ♀.
Bassus costalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 432 n. 12, ♀.
Bassus longicornis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 799 n. 18, ♂.

Bassus aciculatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 368 n. 22, ♀.
Bassus auriculatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 429 n. 22, ♀.
Promethus costalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 21, ♀ ♂.

dorsalis (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Belgia, Germania.
Bassus dorsalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 367 n. 32, ♀.
Bassus maculatus Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (3) I. P. 3. 1862 p. 216, ♀ ♂.
Bassus dorsalis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 105, ♀ ♂.
Bassus dorsalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 113, ♂.
Bassus dorsalis Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 125.
Promethus dorsalis Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1485 n. 9, ♀ ♂.

elongatus (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, New Hampshire, Michigan.
Bassus elongatus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 57, ♂.
Bassus ichneumonoides var. elongatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 277.
Bassus elongatus Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 11 n. 17, ♀ ♂.
Bassus ichneumonoides var. elongatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 433.
Bassus elongatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 799 n. 17, ♀ ♂.
Promethus elongatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 21, ♀ ♂.

festivus (Fabr.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon festivus Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 230 n. 213-214.
Ophion festivator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 140 n. 45.
Ophion festivator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 516 n. 55.
Bassus festivator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 293.
Ichneumon festivator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon festivator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 319.
Bassus festivus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 314 n. 3, ♀ ♂.
Bassus festivus Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 372 n. 56, ♀.
Bassus festivus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 105, ♀ ♂.
Bassus festivus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 113, ♀.
Promethus festivus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1484 n. 8, ♀ ♂.
Bassus festivus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 63, ♂.

laticarpus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Promethus laticarpus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1481 n. 6, ♀ ♂.

melanaspis Thoms. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Promethus melanaspis Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1477, ♀.
Bassus (Promethus) melanaspis Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1773 n. 5.

nigriventris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Promethus nigriventris Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1476 n. 1, ♀ ♂.

pulchellus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Bassus sulcator var. 1-4 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 321, ♀ ♂.
Bassus sulcator var. 1-4 Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 84, ♀ ♂.
Bassus pulchellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph) p. 366 n. 30, ♀ ♂ [non Desvignes].
Bassus pulchellus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 105, ♀ ♂.
Bassus pulchellus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 113, ♀ ♂.
Bassus pulchellus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 124.
Promethus pulchellus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1483 n. 7, ♀ ♂.

---

[1] *Col.:* Phytonomus polygoni (Brischke). — *Dipt.:* Syrphus spec. (Brischke). — *Lep.:* Elachista roesella (Rondani).

ruficrus (Walsh) Davis — ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Bassus ruficrus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 86, ♂.
Promethus ruficrus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 21, ♀ ♂.
scutellaris (Bridgm.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Bassus scutellaris Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 364, ♀ [nec ♂].
Promethus scutellaris Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1478 n. 2, ♀ ♂.
sulcator (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Germania.
Bassus sulcator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 320 n. 4, ♀ ♂.
Bassus festivus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 378 n. 4, ♀.
Bassus sulcator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 84 n. 9, ♀ ♂.
Promethus sulcator Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1479 n. 3, ♀ ♂ [excl. var.].

BASSUS

Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 93 n. 11.
Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 309.
Bassus, nom. propr.

Synon.: Diplason (Nees) Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. ?
διπλάζω, duplico.
Anomalon Jurine.
Crypturus Lamarck.
Ichneumon Schrank, Fabricius & auct. ant.
Pimpla Fabricius, Gravenhorst, Spinola.
Polysphincta Provancher.
Tryphon Zetterstedt.

aciculatus Ruthe — ♀ — Eur.: Islandia.
Bassus aciculatus Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 373 n. 56, ♀.
albicinctus Desv. — Eur.: Britannia.
Bassus albicinctus Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (3.) I. 3. 1862 p. 218.
albosignatus Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon XX Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1766; T. 43 F. 4-6.
Bassus laetatorius Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 P. 100; T. 14.
Bassus laetator Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 P. 102; T. 18 [♀].
Bassus albosignatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 343 n. 20, ♀ [excl. var. 1 & 4].
Bassus albosignatus Bouché, Naturg. d. Insect. 1834 p. 147 n. 20.
Bassus flavolineatus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 378 n. 5, ♀ ♂; var. b.
Ichneumon (Bassus) albosignatus Ratzeburg, Forstinsect III. 1844 p. 27 n. 22; T. 7 F. 7.
Bassus albosignatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 122 n. 1, ♀ ♂.
Bassus albosignatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 82 n. 3, ♀ ♂.
Bassus albosignatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 354 n. 2, ♀ ♂.
Bassus albosignatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. P. 2. 1871 p. 104, ♀ ♂ [[var. ♂].
Bassus albosignatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1875 p. 3; T. 1 F. 2.
Bassus albosignatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 111, ♂.
Bassus albosignatus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1466 n. 1, ♀ ♂.
Bassus albosignatus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 119.
Bassus albosignatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 6. 1891 p. 63, ♀ ♂.
var. **lapponicus** Zett. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Bassus Lapponicus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 378 n. 6, ♀ ♂.
Bassus albosignatus var. Lapponicus m.

---

1) *Dipt.:* Syrphus laetus (Bouché, Brischke).

albovarius Woll. — Afr.: Madeira.
Bassus albovarius Wollaston, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3.) I. 1858 p. 23.
annulatus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia.
Bassus annulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 348 n. 21, ♀.
Bassus annulatus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1468 n. 3, ♀ ♂.
arcticus Holmgr.[1]) — ♀ ♂ — As.: Spitsbergia.
Bassus arcticus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. VIII. P. 5. 1869 p. 22, ♀ ♂.
areolatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Bassus sulcator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 320 n. 4, ♀ ♂ [p. p.].
Bassus areolatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 85 n. 11, ♀ ♂.
Bassus areolatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 365 n. 29, ♀ ♂.
Bassus areolatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 2. 1871 p. 105, ♀ ♂.
Bassus areolatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 113, ♀.
athaliiperdus Curt. — Eur.: Britannia.
Bassus athaliiperdus Curtis, Farm Insects 1860 p. 53.
balearicus Kriechb. — ♀ — Eur.: Mallorca.
Bassus Balearicus Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. XXIII. 1894 p. 246 n. 19, ♀.
bicolor Zett. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Bassus bicolor Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 377 n. 3, ♀.
bidens Fabr.! — Eur.: Italia.
Ichneumon bidens Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 228 n. 203-204.
Bassus bidens Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 101 n. 33.
Ichneumon bidentor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon bidentor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 340.
Bassus bidens Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1092 n. 338.
bimaculatus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Bassus bimaculatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 360 n. 15, ♂.
Bassus bimaculatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 2. 1871 p. 104, ♂.
Bassus bimaculatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 112, ♂.
borealis Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Bassus borealis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 357 n. 10, ♂.
brunneator Fabr.! — Am.: Cayenne.
Bassus brunneator Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 222 n. 28-29.
Bassus brunneator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 98 n. 18.
Ichneumon brunneator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258.
Ichneumon brunneator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg XI. 1824 p. 304.
carinulatus Ruthe — ♀ ♂ — Eur.: Islandia.
Bassus carinulatus Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 373 n. 57, ♀ ♂.
cinctipes Holmgr. — ♀ — Afr.: Cap.
Bassus cinctipes Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 409 n. 40, ♀.
cinctus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Germania.
Bassus cinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 327 n. 7, ♀.
Bassus cinctus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 83 n. 4, ♂.
Bassus cinctus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 356 n. 6, ♂.
Bassus cinctus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 2. 1871 p. 104, ♂.
Bassus cinctus Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1875 p. 3; T. 1 F. 6.
Bassus cinctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 112, ♂.
Bassus cinctus Vollenhoven, Tijdskr. v. Entom. XXI. 1878 p. 162 n. 9, ♀.
Bassus cinctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 43, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Scaeva dryadis (Holmgren).

cingulatus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Bassus cingulatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 369 n. 37, ♂.

clavatorius Fabr.! — Am. mer.
Bassus clavatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 96 n. 11.
Ichneumon capitatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Ichneumon capitatorius Thunberg, Mém. acd. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 355.

clypearis Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Bassus clypearis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 43, ♂.

coccinatus Tosqu. — ♀ — Afr.: Algeria.
Bassus coccinatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 359 n. 2, ♀.

cognatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Bassus cognatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 366 n. 31, ♀ ♂.
Bassus cognatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 2. 1871 p. 105, ♂.
Bassus cognatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 113, ♀ ♂.

concinnus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Connecticut, Massachusetts.
Bassus concinnus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 111, ♀.
Bassus concinnus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 20, ♀ ♂.

confiscator Fabr.! — Eur.: Austria.
Bassus confiscator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 100 n. 26.
Ichneumon confiscator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 267.
Ichneumon confiscator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 327.

confusus Woldst. — ♀ — Eur.: Fennia.
Bassus deplanatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 340 n. 17, ♀ [excl. ♂].
Bassus confusus Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. natur. & Folk. XXI. 1873 p. 84 n. 5, ♀.

congener Tosqu. — ♀ — Afr.: Scioa.
Bassus congener Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 357 n. 1, ♀.

cunctator Fabr. — Eur.: Germania.
Ichneumon cunctator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 176 n. 179.
Ophion cunctator Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 239 n. 19.
Bassus cunctator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 100 n. 27.
Ichneumon cunctator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 264.
Ichneumon cunctator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 317.
Ichneumon cunctator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1019 p. 210.

curvatorius Fabr.! — Am. mer.
Bassus curvatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 96 n. 8.
Ichneumon curvatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon curvatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 285.

deletus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Dania.
Bassus deletus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1471 n. 6, ♀ ♂.

deplanatus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Bassus deplanatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 340 n. 17, ♂ [excl. ♀].
Bassus deplanatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 2. 1871 p. 105, ♀ ♂.
Bassus deplanatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 112, ♀ ♂.

desvignii Marsh. — ♂ — Eur.: Britannia.
Bassus exsultans var. 1 Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 359, ♂.
Bassus pulchellus Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (2.) I. 3. 1862 p. 221, ♂ [non Holmgren].
Bassus Desvignii Marshall, Catal. Brit. Hymen. III. 1872 p. 83 n. 31.

dimidiatus (Schrank) Holmgr. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon dimidiatus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 293 n. 2109.

Ichneumon dimidiatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 950 n. 103.
Bassus dimidiatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 363 n. 25, ♂.

electorius Fabr.! — Eur.: Moravia.
Bassus electorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 93 n. 2.
Ichneumon electorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
Ichneumon electorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 295.
Bassus electorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 874 n. 3.

festatorius Costa — Eur.: Sardinia.
Bassus festatorius A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli 1888 p. 106.
Bassus festatorius A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 2. 1888 p. 5; T. 2 F. 5.

flagratorius Fabr.! — Am. mer.
Bassus flagratorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 94 n. 3.
Ichneumon flagratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255.
Ichneumon flagratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 293.

flavatorius Fabr.! — Am. mer.
Bassus flavatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 95 n. 6.
Ichneumon flavatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon flavatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 285.

flavipes Luc. — ♂ — Afr.: Algeria.
Bassus flavipes Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 325 n. 381, ♂.

flavus Desv. — ♂ — Eur.: Britannia.
Bassus flavus Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (3.) I. 3. 1862 p. 219, ♂.

frenator Desv. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Bassus frenator Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (3.) I. 3. 1862 p. 218, ♀ ♂.

frigidus Woldst. — ♂ — Eur.: Fennia.
Bassus frigidus Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur. & Folk. XXI. 1872 p. 58 n. 32, ♂.

frontalis Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Bassus frontalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 113, ♂.

frontatorius Fabr.! — ♂ — Eur.
Ichneumon frontatorius Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 145 n. 46.
Bassus frontatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 96 n. 10.
Ichneumon frontatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♂.
Ichneumon frontatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 281.
Ichneumon frontatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 368.
Ichneumon frontatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 930 n. 80.

generosus Cam. — ♀ — New Zealand.
Bassus generosus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 p. 31, ♀.

gracilentus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Bassus gracilentus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 368 n. 35, [♀♂.
Bassus gracilentus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 6. 1891 p. 63, ♂.

graculus Grav. — ♀ — Eur.: Britannia.
Bassus graculus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 339 n. 16, ♀.

grönlandicus Holmgr. — ♂ — Eur.: Grönlandia.
Bassus Grönlandicus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXIX. P. 6. 1872 p. 97, ♂.

hispanicus Spin. — Eur.: Hispania.
Bassus Hispanicus Spinola, Ann. soc. entom. France (2) I. 1843 p. 118 n. 8.

hyperboreus Marsh. — ♂ — Eur: Britannia.
Bassus hyperboreus Marshall, Entom. M. Magaz. XIII. 1877 p. 241, ♂.

interruptus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Bassus interruptus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 359 n. 14, ♂.

laetatorius (Fabr.) Panz.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota; Am. bor.
Ichneumon laetatorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 424 n. 26.
Ichneumon dichrous Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 352 n. 710, ♂.
Ichneumon elegantulus var. Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 361 n. 727.
Ichneumon laetatorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 262 n. 32.
Ichneumon laetatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 150 n. 46.
Ichneumon laetatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2682 n. 99.
Ichneumon dichrous Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2683 n. 110.
Ichneumon laetatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 173 n. 47.
Ichneumon dichrous Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 220 n. 83.
Ichneumon laetatorius Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 116 n. 254.
Ichneumon laetatorius Fabricius Entom. system. II. 1793 p. 147 n. 54.
Ichneumon laetatorius Panzer, Faun. Insect. German. II. 1794 P. 19; T. 19.
Ichneumon laetatorius Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 158 n. 487.
Ichneumon lituratorius Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 287 n. 2097.
Ichneumon laetatorius Schrökenstein, Verz. d. Halbkäfer etc. 1802 p. 25 n. 68.
Ichneumon laetatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 63 n. 45.
Ichneumon laetatorius Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 185 n. 21.
Bassus laetatorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 74.
Ichneumon laetatorius Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 262 n. 3759.
Anomalon laetatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 116, ♀.
Crypturus laetatorius Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 141 n. 4.
Bassus laetatorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 293.
Ichneumon laetatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277.
Ichneumon laetatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 353.
Anomalon laetatorius Trentepol, Isis 1826 p. 298 n. 64, ♀.
Ichneumon laetatorius v. d. Höven, Bijdr. natuurk. Wet. I. 1826 p. 439 n. 12.
Bassus laetatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 353 n. 26.
Crypturus laetatorius Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª IV. 1835 p. 353 n. 4.
Bassus laetatorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 377 n. 1, ♀ ♂.
Bassus laetatorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 321 n. 1.
Bassus laetatorius Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 59.
Bassus laetatorius Ratzeburg, Ichneum d. Forstinsect. II. 1848 p. 109 n. 2.
Pimpla laetatoria Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 505 n. 4, ♂.
Bassus laetatorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 116 n. 2.
Bassus laetatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 353 n. 1, ♀ ♂.
Bassus laetatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 104, ♀.
Bassus tripicticrus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis P. 1. 1873 p. 85, ♀ ♂.
Bassus laetatorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1875 p. 3; T. 1 F. 1.
Bassus laetatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 111, ♀.
Bassus laetatorius Bignell, Entomologist XVII. 1884 p. 167.
Bassus laetatorius Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1470 n. 5, ♀.
Bassus laetatorius Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 118.
Bassus laetatorius Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 21, ♀ ♂.

var. **sycophanta** Cress. — ♀ ♂ — Am.: New York.
Bassus sycophanta (Walsh) Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 112, ♀ ♂.
Bassus tripicticrus var. sycophanta Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 86, ♀.
Bassus sycophanta Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 276 n. 11, ♀ ♂; F. 16.

---

[1] *Dipt.:* Syrphus balteatus (Ratzeburg, Bignell). — *Col.:* Adimonia rustica (Rondani).

Bassus sycophanta Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 431 n. 11, ♀ ♂; F. 46.
Bassus laetatorius var. sycophanta Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 19.

var. **terminalis** Davis — Am. bor.
Bassus laetatorius var. terminalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 19.

lineatus Fabr.! — Am. mer.
Bassus lineatus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 101 n. 32.
Ichneumon striator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 261.
Ichneumon striator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 312.

longipes Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Bassus longipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 361 n. 18, ♀.

maculifrons Holmgr. — ♀ — Am.: California.
Bassus maculifrons Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 410 n. 41, ♀.

marginator Fabr.! — Eur.: Austria.
Bassus marginator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 98 n. 20.
Ichneumon marginator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 270.
Ichneumon marginator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 336.

melanogaster Holmgr. — ♂ — Am.: Grönlandia.
Bassus melanogaster Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXIX. P. 6. 1872 p. 98, ♂.

meritorius Fabr.! — Am. mer.
Bassus meritorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 95 n. 5.
Ichneumon meritorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon meritorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 285.

minutorius Fabr.! — Am. mer.
Bassus minutorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 97 n. 12.
Ichneumon minutorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 276.
Ichneumon minutorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 351.

minutus Zett. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Bassus minutus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 379 n. 8, ♀.

monticola Vollenh. — Eur.: Helvetia.
Bassus monticola Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1875 p. 4; T. 1 F. 9.

multicolor Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Bassus multicolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 352 n. 25, ♀.
Bassus multicolor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 355 n. 4, ♀ ♂.
Bassus multicolor Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1875 p. 3; T. 1 F. 4.
Bassus multicolor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 111, ♂.
Bassus multicolor Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 119.

nemoralis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Bassus albosignatus var. 1 & 4 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 343.
Bassus flavolineatus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 378 n. 5, ♀ [excl. ♀ & var., non [Gravenhorst].
Bassus nemoralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 354 n. 3, ♀ ♂.
Bassus nemoralis Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1875 p. 3; T. 1 F. 3.
Bassus nemoralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 111, ♂.
Bassus nemoralis Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1469 n. 4, ♀ ♂.
Bassus nemoralis Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 119.

nigritarsus Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Bassus nigritarsus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 338 n. 15, ♀.
Bassus nigritarsus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 365 n. 28, ♀ ♂.
Bassus nigritarsus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 105, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Bombyx quercus (Bignell).

orbitalis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Bassus orbitalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 272 n. 1, ♀.
Bassus amoenus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 55.
Bassus albicoxis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874. p. 56.
Bassus cinctulus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 375, ♀ ♂.
Bassus orbitalis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 273 n. 3, ♀ ♂.
Bassus orbitalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 429 n. 31, ♀ ♂.
Bassus orbitalis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 439, ♀ ♂.
Bassus orbitalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 20, ♀ ♂.
pedatorius Panz.! — Eur.: Germania.
Bassus pedatorius Panzer, Faun. Insect. German. IX. P. 102 1809; T. 20.
Bassus pedatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1048 262.
personatus Marsh.[1]) — ♀ — Eur.: Britannia.
Bassus personatus Marshall, Entom. M. Magaz. XII. 1876 p. 194, ♀.
planus Desv. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Bassus planus Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (3.) I. 3. 1862 p. 220, ♀ ♂.
praedator Fabr.! — Am. mer.
Bassus praedator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 99 n. 22.
Ichneumon praedator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon praedator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 339.
pulchripes Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada, New Hampshire, Colorado.
Bassus pulchripes Provancher, Natural Canad. VII. 1875 p. 143.
Polysphincta pleuralis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 312.
Bassus pulchripes Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 273 n. 2, ♀ ♂.
Bassus pulchripes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 428 n. 2, ♀ ♂.
Bassus pulchripes Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 20, ♀ ♂.
punctatus Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Bassus punctatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1887 p. 375, ♀.
quadricinctus Schrk.! — Eur.: Germania.
Ichneumon quadricinctus Schrank, N. Magaz. Liebh. Entom. II. 1785 p. 326 n. 89.
Bassus quadricinctus Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 293.
quadriguttatus Voll. — ♀ — Eur.: Batavia.
Bassus quadriguttatus Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XVI. 1873 p. 211 n. 3, ♀.
remotus Marsh. — Eur.: Lapponia.
Bassus remotus Marshall, Entom. Record VIII. 1896 p. 296.
ruficornis Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Bassus ruficornis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 378 n. 7, ♂.
rufipes Grav. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Bassus rufipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 337 n. 14, ♀.
Bassus rufipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 360 n. 17, ♀.
Bassus rufipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 104, ♀.
Bassus rufipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 112, ♀.
rufocinctus Desv. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Bassus rufocinctus Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (3.) I. 3. 1862 p. 215, ♀ ♂.
rufonotatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Bassus rufonotatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 369 n. 36, [♀ ♂.
Bassus rufonotatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 106, ♀ ♂.
Bassus rufonotatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 5. 1891 p. 63, ♀.

---

1) *Hymen.:* Nematus cadderensis (Marshall).

scabriculus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Fennia, Germanica.
Bassus scabriculus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 357 n. 8, ♀ ♂.
Bassus scabriculus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 104, ♂.
Bassus scabriculus Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 396 n. 13, ♂.
Bassus scabriculus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 112, ♂.

scutellaris Cress.[1] — ♀ ♂ — Am.: United States.
Bassus scutellaris Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 112, ♀ ♂.
Bassus scutellaris Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 84, ♀ ♂.
Bassus scutellaris Provancher, Addit. Faun. Canada. Hymén. 1886 p. 112 n. 21, ♀.
Bassus scutellaris Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 20, ♀ ♂.

spectator Fabr.! — Am. mer.
Bassus spectator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 100 n. 28.
Ichneumon spectator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 274.
Ichneumon spectator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 347.

spinator Fabr.! — Afr.: Cap.
Ichneumon spinator Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 224 n. 100-101.
Bassus spinator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 98 n. 19.
Ichneumon femorator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 261.
Ichneumon femorator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 311.

striatus Zett. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Bassus striatus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 377 n. 2, ♀.

sulphuratorius Fabr.! — Am. mer.
Bassus sulphuratorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 95 n. 7.
Ichneumon sulphuratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253.
Ichneumon sulphuratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 288.

suspiciosus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Bassus suspiciosus Brischke, Schrift. phys. ökon. Königsberg XI. 1871 p. 106, ♀.
Bassus suspiciosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 114, ♀.

thoracicus Desv. — ♀ — Eur.: Britannia.
Bassus thoracicus Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 3. 1862 p. 219, ♀.

tricinctus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Bassus tricinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 351 n. 24, ♂.
Bassus tricinctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 111, ♀.

variicoxa Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Bassus varicoxa Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1460 n. 2, ♀.

19. *Subfam.* Tryphoninae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 145 & 201.

DICKSONIA

Holmgren, Nov. spec. Insect 1881 p. 11.
Wm. Dickson, nom. propr.

arctica Holmgr. — ♀ ♂ — As.: Novaja Semlja.
Dicksonia arctica Holmgren, Nov. spec. Insect. 1881 p. 12.
Dicksonia arctica Holmgren, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 152 n. 25, ♀ ♂.

---

[1] *Lep.:* Leucania unipuncta (Howard).

NEASTUS

Holmgren, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 154.
νεάζω, adolesco.

laeviceps Holmgr. — ♀ ♂ — As.: Novaja Semlja.
Neastus laeviceps Holmgren, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 155 n. 31.

MESOLEIUS

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 130.
Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2035 n. 8.
μέσος, medius; λεῖος, levis.

Synon.: Cryptocentrum Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 156 [non κρύπτω, abscondo; κέντρον, aculeus. [W. Kirby].
Anomalon Jurine, Gravenhorst.
Echthrus Provancher.
Ichneumon Gravenhorst.
Tryphon Gravenhorst & auct.

abbreviatus Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleius abbreviatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 76, ♂.
Mesoleius abbreviatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 81, ♂.
abdominalis Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleius abdominalis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 78, ♂.
aemulus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius aemulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 157 n. 63, ♀.
Mesoleius aemulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 29 n. 69, ♀.
Mesoleius aemulus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2051 n. 77, ♀.
aequabilis Holmgr. — Eur.: Suecia.
Mesoleius aequabilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 37 n. 93, ♀.
affinis Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleius affinis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 35, ♀ ♂.
agilis Brischke[1]) — ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleius agilis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 81, ♂.
Mesoleius agilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 86, ♂.
albopictus (Grav.) Thoms.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Tryphon albopictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 255 n. 166.
Mesoleius viduus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 175 n. 105, ♂.
Mesoleius viduus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 381, ♀.
Mesoleius viduus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 23 n. 58, ♀ ♂.
Mesoleius viduus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 89, ♀ ♂.
Mesoleius albopictus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2040 n. 54, ♀ ♂.
aleutianus Cress. — ♂ — Am.: Aleutes.
Mesoleius ? aleutinus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 371, ♂.
alni Woldst. — ♀ — Eur.: Fennia.
Mesoleius alni Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur. & Folk. XXI. 1872 p. 41 n. 18, ♀.
alpestris Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.
Mesoleius alpestris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 14 n. 30, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Macrophyia simulans (Brischke).
2) *Hymen.:* Cladius uncinatus (Brischke).

alticola Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesoleius alticola Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 150 n. 46, ♀.
Mesoleius alticola Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 76, ♂.
Mesoleius alticola Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 15 n. 32, ♀.
Mesoleius alticola Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 80, ♀.
Mesoleius alticola Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2066 n. 107, ♀ ♂.

alutaceus Woldst. — ♀ — Eur.: Fennia.
Mesoleius alutaceus Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur. & Folk. XXI. 1872 p. 40 n. 15, ♀.

amabilis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius amabilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 144 n. 31, ♀.
Mesoleius amabilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 380.
Mesoleius amabilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 20 n. 49, ♀.
Mesoleius amabilis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2071 n. 120, ♀ ♂.

amictus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius amictus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 177 n. 109, [♀ ♂.
Mesoleius amictus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 23 n. 57, ♀ ♂.
Mesoleius amictus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2039 n. 53, ♀ ♂.

analis Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Mesoleius analis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 89, ♀.

annulatus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Mesoleius annulatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 77, ♀.

appendiculatus Tosqu. — ♂ — Afr.: Delagoa Bay.
Mesoleius appendiculatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 352 n. 2, ♂.

arctophylax Marsh. — ♀ ♂ — As.: Ins. Spetsberg.
Mesoleius arctophylax Marshall, Entom. M. Magaz. XIII. 1877 p. 241, ♀ ♂.

armillatorius (Grav.) Holmgr.¹) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon armillatorius Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 262 n. 3758.
Ichneumon armillatorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 285.
Tryphon armillatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 182 n. 120, ♂.
Tryphon luteifrons Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 215 n. 141, ♀.
Tryphon armillatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 241 n. 29, ♂.
Tryphon luteifrons Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 246 n. 43, ♀.
Tryphon armillatorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 221 n. 11, ♂.
Mesoleius armillatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 70 n. 6, ♀ ♂.
Mesoleius armillatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 155 [n. 59, ♀ ♂.
Mesoleius armillatorius Giraud, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 p. 386 & 387.
Mesoleius armillatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 78, ♂.
Mesoleius armillatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 41 n. 102, ♀ ♂.
Mesoleius armillatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 82, ♂.
Mesoleius armillatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 1. 1888 p. 59, ♂.
Mesoleius armillatorius Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 78.
Mesoleius armillatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 34, ♂.
Mesoleius armillatorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2043 n. 62, ♀ ♂.

articularis Davis — ♀ — Am.: Colorado, Washington.
Mesoleius articularis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 300, ♀.

---

¹) *Hymen.:* Dineura verna (Klug), Athalia spinarum Fabr., Blennocampa pubescens Zdd., B. melanocephala Fabr., Nematus ribis (Goureau).

astutus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius astutus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 13 n. 27, ♀.
Mesoleius astutus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2059 n. 91, ♀.
attenuatus Bridgm. — ♂ — Eur.: Britannia.
Mesoleius attenuatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1887 p. 371, ♂.
audax Davis — ♀ — Am.: Colorado, New Hampshire.
Mesoleius audax Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 299, ♀.
aulicus (Grav.) Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Tryphon aulicus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 173 p. 113, ♀ ♂.
Tryphon aulicus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 239 n. 25, ♀ ♂.
Tryphon aulicus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 220 n. 10, ♀ ♂.
Tryphon aulicus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 124 n. 28, ♀.
Mesoleius aulicus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 70 n. 3, ♀ ♂.
Mesoleius aulicus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 134 n. 4, ♀ ♂.
Mesoleius dubius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 134 n. 5, ♀.
Mesoleius aulicus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 73, ♀ ♂.
Mesoleius aulicus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 9 n. 17, ♀ ♂.
Mesoleius aulicus Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 61; T. 23 F. 2.
Mesoleius aulicus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 77, ♀ ♂.
Mesoleius aulicus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 71.
Mesoleius aulicus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2058 n. 89, ♀ ♂.
autumnalis Woldst. — ♀ — Eur.: Fennia.
Mesoleius autumnalis Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur. & Folk. XXI. 1872 p. 42 n. 22, ♀.
balearicus Kriechb. — ♀ — Eur.: Baleares. [n. 18, ♀.
Tryphon (Mesoleius) Balearicus Kriechbaumer, Anal. soc. hist. nat. Españ. XXIII. 1894 p. 245
bignellii Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Mesoleius Bignelli Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 163, ♀; T. 8 F. 12.
bilineatus (Grav.) Brischke[2] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Tryphon bilineatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 179 n. 118, ♀.
Mesoleius bilineatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 85, ♀ ♂.
Mesoleius bilineatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 84, ♀ ♂.
Mesoleius bilineatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 61, ♀.
bipunctatus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Mesoleius bipunctatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 34, ♀.
bisignatus Costa — Eur.: Sardinia.
Mesoleius bisignatus A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli (2) II. 1888 p. 107.
Mesoleius bisignatus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 2. 1888 p. 7; T. 2 F. 7.
borealis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [♀ ♂.
Mesoleius borealis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 146 n. 34,
Mesoleius borealis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 75, ♂.
Mesoleius borealis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 19 n. 45, ♀ [excl. ♂].
Mesoleius borealis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2055 n. 83, ♀.
bovii Holmgr. — ♀ ♂ — As.: Novaja Semlja.
Mesoleius Bovii Holmgren, Nov. spec. Insect. 1881 p. 13.
Mesolejus Bovei Holmgren, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 152 n. 27, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Selandria ovata (Brischke), Nematus croceus (Ratzeburg).
2) *Hymen.:* Nematus spec. (Salix viminalis), N. Valisnieri, Selandria fulvicornis, S. crataegi (Brischke).

brachyacanthus Parf. — ♂ — Eur.: Britannia.
Mesoleius brachyacanthus Parfitt, Entom. M. Magaz. XVIII. 1881 p. 78, ♂.
Mesoleius brachyacanthus Parfitt, Rep. Devon. Assoc. XIII. 1881 p. 275.

brachypus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius brachypus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2054 n. 81, ♀.

brevipalpis Thoms. — ♀ — Eur.: Oelandia.
Mesoleius brevipalpis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2047 n. 70, ♀.

brevis Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Mesoleius brevis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 77, ♀.

brevitarsis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius brevitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2037 n. 47, ♀.

brischkei D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Mesoleius albopictus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 34, ♀.
Mesoleius Brischkei m.

caligatus (Grav.) Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Tryphon caligatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 170 n. 111, ♀.
Tryphon caligatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 233 n. 7.
Tryphon caligatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 222 n. 12, ♀.
Mesoleius caligatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 135 n. 6, ♀.
Mesoleius caligatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 73, ♀.
Mesoleius caligatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 25, ♀ [excl. ♂].
Mesoleius caligatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 36; T. 23 F. 3.
Mesoleius caligatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 77, ♀.
Mesoleius caligatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2059 n. 90, ♀ ♂.

callidulus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius callidulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 177 n. 108, ♀.
Mesoleius callidulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 24 n. 60, ♀.
Mesoleius callidulus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2038 n. 49, ♀.

caninae Bridg.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Mesoleius caninae Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 363, ♀ ♂.

celator Holmgr. — ♀ — Eur.
Mesoleius celator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 29 n. 70, ♀.

ciliatus Holmgr.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius ciliatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 151 n. 49, ♀ ♂.
Mesoleius ciliatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 15 n. 33, ♀ ♂.
Mesoleius ciliatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2066 n. 108, ♀.

cingulatus Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleius cingulatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 80, ♂.

circumspectus Holmgr. — ♀ — Eur.
Mesoleius circumspectus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 20 n. 48, ♀.

clypealis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
? Mesoleius modestus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 16 n. 35, ♀ ♂.
Mesoleius clypealis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2077 n. 134, ♀ ♂.

clypearis Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Mesoleius clypearis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 90, ♀.

---

1) *Hymen.:* Cladius viminalis, Nematus fulvus (Brischke).
2) *Hymen.:* Eriocampa caninae (Bridgman).
3) *Hymen.:* Athalia spinarum Fabr. (Holmgren).

cognatus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Mesoleius cognatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 79, ♀.
Mesoleius cognatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 83, ♀.

commotus Holmgr. — ♀ — Eur.
Mesoleius commotus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 17 n. 40, ♀.

compar Marsh. — Eur.: Lapponia.
Mesoleius compar Marshall, Entomol. Record VIII. 1896 p. 296.

conformus Davis — ♀ ♂ — Am.: Colorado, Oregon, New York, New Hampshire.
Mesoleius conformus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 300, ♀ ♂.

consimilis Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesoleius consimilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 143 [n. 27, ♀.
Mesoleius consimilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 8 n. 16, ♀ ♂.
Mesoleius lophyrorum var. 3 Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 78, ♀.

consors Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Mesoleius consors Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 297, ♀.

contractus Davis — ♀ — Am.: Canada.
Mesoleius contractus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 297, ♀.

contrarius Holmgr. — ♀ (♂) — Eur.: Suecia.
? Tryphon silvestris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 138 n. 84, ♂.
Mesoleius silvestris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 140 n. 18, ♀.
Mesoleius contrarius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 18 n. 43, ♀.
Mesoleius contrarius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2062 n. 97, ♀.

convergens Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Mesoleius convergens Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 296, ♀.

convexus Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Mesoleius convexus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 298, ♀.

coriaceus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius coriaceus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 145 n. 32, ♀.
Mesoleius coriaceus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 43 n. 114, ♀.

corrugatus Holmgr. — ♀ — Eur.
Mesoleius corrugatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 35 n. 86, ♀.

costaricensis Cam. — ♂ — Am.: Costa Rica.
Mesoleius Costaricensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 284 n. 1, ♂.

crassipes Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius crassipes Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2060 n. 94, ♀ ♂.

crassitarsis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius crassitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 935 n. 15, ♀.
Mesoleius crassitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1262 n. 4, ♀ ♂.
Mesoleius crassitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2060 n. 93, ♀ ♂.

curtitarsis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius curtitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2038 n. 50, ♀.

curvicrus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius melancholicus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 141 [n. 20, ♀ [non Gravenhorst, excl. citatis].
Mesoleius curvicrus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 18 n. 41, ♀.
Mesoleius curvicrus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2062 n. 99, ♀.

decipiens Woldst. — ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleius decipiens Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 401 n. 31, ♂.

deletus Thoms. — ♀ ♂ — Eur. centr.
Mesoleius deletus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2069 n. 114, ♀ ♂.

difformis Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia. [♀ [excl. ♂].
Mesoleius leptogaster Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 175 n. 104,
Mesoleius difformis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 24 n. 59, ♀.
Mesoleius difformis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2044 n. 64, ♀ ♂.

discedens Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius discedens Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 144 n. 30, ♀ ♂.
Mesoleius discedens Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 21 n. 51, ♀.
Mesoleius discedens Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2069 n. 116, ♀ ♂.

dives Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesoleius dives Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 162 n. 77, ♂.
Mesoleius dives Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 80, ♀ ♂.
Mesoleius dives Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 42 n. 105, ♂.
Mesoleius dives Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 84, ♀ ♂.

dorsalis (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Tryphon dorsalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 226 n. 148, ♂. [♀ ♂.
Mesoleius dorsalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 169 n. 93,
Mesoleius dorsalis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 83, ♀ ♂.
Mesoleius dorsalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 32 n. 77, ♂.
Mesoleius dorsalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 88, ♂.
Mesoleius dorsalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 104 n. 11, ♀.
Mesoleius dorsalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 61, ♀.
Mesoleius dorsalis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2036 n. 44, ♀ ♂.

drewsenii Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 14-15, ♀.
Mesoleius Drewseni Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 379
Mesoleius Drewseni Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 12 n. 24, ♀.

dubius Holmgr.[2] — ♀ — Eur.: Suecia.
? Mesoleius dubius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855. P. 3. (Tryph.) p. 134 n. 5, ♀.
Mesoleius dubius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 33 n. 80, ♀.
Mesoleius dubius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 77, ♀.
Mesoleius dubius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2065 n. 105, ♀.

efferus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius efferus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 19 n. 47, ♀ ♂.

elegans Parf. — ♀ — Eur.: Britannia.
Mesoleius elegans Parfitt, Entom. M. Magaz. XVIII. 1882 p. 273, ♀.

elongatus Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleius elongatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 81, ♂.
Mesoleius elongatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 85, ♂.

ephippiger Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius ephippiger Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 4 n. 4, ♀.

ephippius Tschek — ♀ — Eur.: Austria inf.
Mesoleius ephippium Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 445 n. 6, ♀.

excavatus (Prov.) Davis — ♂ — Am.: Canada.
Tryphon excavatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 310, ♂.
Tryphon excavatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 254 n. 5, ♂.
Tryphon excavatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 412 n. 5, ♂.
Mesoleius excavatus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 189.

---

[1] *Hymen.:* Cladius Brullaei (Fletcher).
[2] *Hymen.:* Nematus ribesii (Bignell).

exculpus Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleius exculpus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 85, ♀ ♂.
exiguus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius exiguus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 18 n. 42, ♀.
Mesoleius exiguus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2057 n. 86, ♀ ♂.
facetus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius facetus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 29 n. 72, ♀.
Mesoleius facetus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2053 n. 80, ♀.
facialis Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Mesoleius facialis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 80, ♀.
femorator Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius femorator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2047 n. 68, ♀.
fidelis Davis — ♀ ♂ — Am.: New-Hampshire.
Mesoleius fidelis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 297, ♀ ♂.
filicornis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius filicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 40 n. 100, ♀ ♂.
Mesoleius filicornis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2068 n. 13, ♀ ♂.
flavicaudatus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 55, ♀.
Mesoleius flavicaudatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 154
Mesoleius flavicaudatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 17 n. 39, ♀.
flavipes Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleius flavipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 84, ♂.
Mesoleius flavipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 89, ♂.
flavopictus (Grav.) Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Mesoleptus flavopictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 33 n. 20, ♂.
Mesoleptus trimaculatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 217 n. 17, ♀.
Mesoleptus flavopictus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 217 n. 19, ♂.
Mesoleius flavopictus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 82, ♀.
Perilissus flavopictus Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 69 n. 3.
Mesoleius flavopictus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 86, ♀.
försteri Holmgr — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀ ♂.
Mesoleius Försteri Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 169 n. 92,
Mesoleius Försteri Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 48 n. 121, ♀ ♂.
formosus (Grav.) Holmgr.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Tryphon formosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 185 n. 121, ♀ ♂.
Tryphon formosus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 242 n. 31, ♀ ♂.
Mesoleius formosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 160 n. 70,
Mesoleius formosus Giraud, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 p. 400 n. 8, ♀ ♂. [♀ ♂.
Mesoleius lepidus Giraud, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 p. 401, ♀.
Mesoleius formosus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 79, ♀ ♂ (bis).
Mesoleius formosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 82, ♀ ♂ &
Mesoleius formosus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1262 n. 5. [p. 83, ♀.
Mesoleius formosus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2074 n. 126, ♀ ♂.
fraudator Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 38, ♀.
Mesoleius fraudator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 147
Mesoleius fraudator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 22 n. 54, ♂
[(non ♀).

---

[1]) *Hymen.:* Dineura verna Klug, Blennocampa bipunctata Klug, B. pubescens Zadd., B. melanocephala Klug (Giraud).

frenalis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius frenalis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2047 n. 69, ♀ ♂.
frigidus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Belgia.
Mesoleius frigidus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 178 [n. 112, ♀.
Mesoleius frigidus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 85.
frontatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius frontatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2069 n. 115, ♀ ♂.
furax Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius furax Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 136 n. 8, ♀.
Mesoleius furax Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 34 n. 82, ♀.
Mesoleius furax Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 36; T. 23 F. 5.
fuscipes Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius meridionalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 71 n. 6, ♀.
Mesoleius fuscipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 158 n. 66, ♂.
Mesoleius meridionalis Holgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 163 [n. 79, ♀ ♂.
Mesoleius meridionalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph) p. 381.
Mesoleius fuscipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 34 n. 83, ♀ ♂.
Mesoleius fuscipes Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2045 n. 66, ♀ ♂.
gallicus Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Mesoleius Gallicus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2041 n. 57, ♀.
geniculatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius geniculatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 152 [n. 50, ♀ ♂.
Mesoleius geniculatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 76, ♂.
Mesoleius geniculatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 45 n. 115, ♀ ♂.
Mesoleius geniculatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2065 n. 106, ♀ ♂.
glyptus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia, Bavaria.
Mesoleius glyptus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2076 n. 131, ♀.
gracilicornis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius gracilicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 155 [n. 58, ♀ ♂.
Mesoleius gracilicornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 77, ♀ ♂.
Mesoleius gracilicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 27 n. 66, ♀ [[excl. ♂].
Mesoleius gracilicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 82, ♀ ♂.
Mesoleius gracilicornis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2052 n. 78, ♀ ♂.
gracilipes Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius gracilipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 149 n. 44, [♂.
Mesoleius taeniopus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 159 n. 69, ♀.
Mesoleius gracilipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 38 n. 97, ♀ ♂.
grossulariae (Ratzbg.) Brischke[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Tryphon grossulariae Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 122 n. 10.
Mesoleius grossulariae Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 75, ♀ ♂.
Mesoleius grossulariae Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 78, ♀ ♂.
haemotodes (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Tryphon haematodes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 177 n. 116, ♀.
Tryphon haematodes Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 240 n. 27, ♀.
Mesoleius haematodes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 137 [n. 11, ♀ ♂.

---

[1]) *Hymen.*: Nematus ventricosus, N. conjugatus, N. septentrionalis, Selandria cinxia (Brischke).

Mesoleius haematodes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 73, ♀.
Mesoleius haematodes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 16 n. 36, ♀♂.
Mesoleius haematodes Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 36; T. 23 F. 7.
Mesoleius haematodes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 78, ♀.
Mesoleius haematodes A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 2. 1888 p. 107.
Mesoleius haematodes A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 2. 1888 p. 12.
Mesoleius haematodes Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 72.
Mesoleius haematodes Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2075 n. 128, ♀ ♂.

hamulus (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Tryphon hamulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 322 n. 208, ♀.
Tryphon hamulus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 263 n. 93.
Mesoleius hamulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 172 n. 99, ♀.
Mesoleius nobilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 178 n. 110, ♂.
Mesoleius nobilis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 84, ♀ ♂.
Mesoleius hamulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 24 n. 61, ♀♂.
Mesoleius nobilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 89, ♀ ♂.
Mesoleius hamulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 33, ♀.
Mesoleius hamulus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2038 n. 48, ♀ ♂.

heros Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius heros Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 132 n. 1, ♀.
Mesoleius heros Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 379.
Mesoleius heros Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 3 n. 1, ♀♂.

hirtus Rdw. — Eur.: Germania.
Mesoleius hirtus Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 34.

humerellus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius humerellus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2042 n. 60, ♀ ♂.

hyperboreus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 40, ♀ [excl. ♂].
Mesoleius hyperboreus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 148
Mesoleius hyperboreus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 35 n. 85, ♀.

idahoensis Davis — ♀ ♂ — Am.: Idaho, Colorado.
Mesoleius Idahoensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 297, ♀ ♂.

ignavus Holmgr.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia. [n. 103, ♀♂.
Mesoleius ignavus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 174
Mesoleius ignavus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 381.
Mesoleius ignavus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 32 n. 78, ♀♂.
Mesoleius ignavus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2039 n. 52, ♀ ♂.

imitator Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 42, ♀♂.
Mesoleius imitator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 148
Mesoleius imitator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 46 n. 116, ♀♂.
Mesoleius imitator Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 82.

immarginatus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius immarginatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2037 n. 45, ♀.

impressus Brischke[2]) — ♀ — Eur.: Germania.
Mesoleius impressus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 85, ♀.

improbus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia. [♀♂.
Mesoleius improbus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 5. (Tryph.) p. 152 n. 51,
Mesoleius improbus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 40 n. 101, ♀♂.
Mesoleius improbus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2048 n. 72, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Nematus spec. (Brischke).
2) *Hymen.:* Cladius uncinatus (Brischke).

incidens Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius incidens Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2077 n. 132, ♀ ♂.

incisus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius incisus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2064 n. 103, ♀.

infidus Woldst. — ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleius infidus Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 401 n. 32, ♂.

juvenilis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius juvenilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 143 n. 29, [♀ ♂.
Mesoleius juvenilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 20 n. 50, ♀ [[excl. ♂].
Mesoleius juvenilis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2057 n. 85, ♀ ♂.

lateralis (Grav.) Marsh. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Tryphon lateralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 690 n. 169b.
Tryphon lateralis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 255 n. 67.
Mesoleius lateralis Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 72 n. 25, ♀ ♂.

latipes Brischke[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleius latipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 76, ♀ ♂ [var. 1 & [2, ♂].
Mesoleius latipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 81, ♀ ♂.

latiscapus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius latiscapus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2060 n. 92, ♀.

lautus Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Mesoleius lautus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 350 n. 1, ♀ ♂.

leptogaster Holmgr.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesoleius leptogaster Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 175 [n. 104, ♂ [excl. ♀].
Mesoleius leptogaster Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 381.
Mesoleius leptogaster Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 84, ♀ ♂.
Mesoleius leptogaster Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 25 n. 62, ♂ [non ♀ var.].
Mesoleius leptogaster Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 88, ♀ ♂.
Mesoleius leptogaster Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2042 n. 58, ♀.

leucopygus Holmgr.[3]) — ♀ — As.: Spetsbergen.
Mesoleius leucopygus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. VIII. P. 5. 1869 p. 22, ♀.

levipectus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius laevipectus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2041 n. 56, ♀ ♂.

linitus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius linitus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 157 n. 64, [♂ [excl. ♀].
Mesoleius sanguinosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 28 n. 68, ♀ [[excl. ♂].
Mesoleius linitus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 29 n. 71, ♂ [excl. ♀].
Mesoleius linitus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2053 n. 79, ♀ ♂.

liosternus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius liosternus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2078 n. 135, ♀ ♂.

lituratus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius lituratus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 147 n. 37, [♂.
Mesoleius lituratus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 26 n. 65, ♀ ♂.
Mesoleius lituratus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2079 n. 137, ♀.

---

1) *Hymen.:* Nematus melanocephalus (Brischke).
2) *Hymen.:* Nematus hypogastricus (Brischke).
3) *Hymen.:* Nematus arcticus (Holmgren).

lobatus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius lobatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2072 n. 122, ♀.

longicornis Woldst. — ♂ — Eur.: Fennia.
Mesoleius longicornis Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur & Folk XXI. 1872 p. 43 n. 29, ♂.

longicornutus D. T. — ♀ — Eur.: Germania. [(non Woldstedt).
Mesoleius longicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 36, ♀
Mesoleius longicornutus m.

luctuosus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, (Germania). [♀♂.
Mesoleius luctuosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 158 n. 65,
Mesoleius luctuosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 30 n. 73, ♀♂.
? Mesoleius luctuosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 82, ♂.
Mesoleius luctuosus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2077 n. 133, ♀.

lunaris Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleius lunaris Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 81, ♂.

maculatus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Mesoleius maculatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 74, ♀.
Mesoleius maculatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 79, ♀.

melanogaster Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 57, ♀.
Mesoleius melanogaster Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 155
Mesoleius melanogaster Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 5 n. 8, ♀.
Mesoleius melanogaster Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2068 n. 111, ♀.

melanoleucus (Ratzbg.) Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Tryphon melanoleucus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 169 n. 110, ♀.
Tryphon melanoleucus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 125 n. 35.
Cteniscus melanoleucus Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 78 n. 14.
Mesoleius melanoleucus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 33, ♀.
Mesoleius melanoleucus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2065 n. 104, ♀ ♂.

mellipes Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada, New Hampshire, New York, Washington.
Echthrus mellipes Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 60.
Mesoleius mellipes Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 258 n. 3, ♂.
Mesoleius mellipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 416 n. 3, ♂.
Mesoleius mellipes Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 298, ♀ ♂.

mixtus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀♂.
Mesoleius mixtus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 146 n. 36,
Mesoleius mixtus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 21 n. 52, ♀♂.

modestus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Mesoleius modestus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 11. 1876 p. 16 n. 35, ♀♂.

molestus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia. [♀♂.
Mesoleius molestus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 147 n. 39,
Mesoleius molestus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2045 n. 65, ♀ ♂.

mollis (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Tryphon mollis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 137 n. 83, ♀.
Mesoleius mollis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 142 n. 23, ♀.
Mesoleius perspicuus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 143
[n. 28, ♂ (excl. ♀).
Mesoleius mollis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 38 n. 96, ♀ ♂.
Mesoleius mollis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2061 n. 95, ♀.

montezuma Cam. — ♂ — Am.: Mexico. [F. 4.
Mesoleius Montezuma Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 386 n. 3, ♂; T. 12

multicolor (Grav.) Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Tryphon multicolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 168 n. 109, ♀.
Tryphon multicolor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 128 n. 10, ♀.
Mesoleius multicolor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 160 n. 72, [♀♂.
? Mesoleius napaeus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 161 [n. 74, ♀♂.
? Mesoleius dives Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 162 n. 77, ♂.
? Mesoleius napaeus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 381.
? Mesoleius napaeus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 80, ♀ ♂.
? Mesoleius dives Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 80, ♀ ♂.
Mesoleius multicolor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 41 n. 103, ♀♂.
? Mesoleius napaeus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 42 n. 104, ♀♂.
? Mesoleius dives Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 42 n. 105, ♂.
? Mesoleius napaeus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 84, ♂.
? Mesoleius dives Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 84, ♀ ♂.
? Mesoleius napaeus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1880 p. 79.
Mesoleius multicolor Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2046 n. 67, ♀ ♂.

napaeus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesoleius napaeus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 161 n. 74, [♀♂.
Mesoleius napaeus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 381.
Mesoleius napaeus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 80, ♀ ♂.
Mesoleius napaeus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 42 n. 104, ♀♂.
Mesoleius napaeus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 84, ♂.
Mesoleius napaeus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 79.

nemati Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
? Tryphon albicinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 224 n. 147, ♀.
Mesoleius nemati Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2067 n. 109, ♀.

niger (Grav.) Holmgr.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Tryphon niger Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 126 n. 74, ♀.
Tryphon niger Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 231 n. 1.
Tryphon niger Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 114 n. 13, ♀♂; T. 1 F. 9.
Mesoleius niger Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 165 n. 82, ♀♂.
Mesoleius niger Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 381.
Mesoleius niger Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 80, ♀ ♂.
Mesoleius niger Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 50 n. 129, ♀♂.
Mesoleius niger Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 85, ♀♂.
Mesoleius niger Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2049 n. 73, ♀ ♂.

nigratus D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Mesoleius niger Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 11 n. 6, ♀ [non Gravenhorst].
Mesoleius niger Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 796 n. 6, ♀.
Mesoleius nigratus m.

nigropalpis Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleius nigropalpis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 83, ♂.
Mesoleius nigropalpis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 88, ♂.

nivalis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesoleius nivalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 163 n. 78, ♀♂.
Mesoleius nivalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 36, ♀.
Mesoleius nivalis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2070 n. 119, ♀.

---

[1]) *Hymen.:* Lophyrus polytomus (Giraud).

[2]) *Hymen.:* Strongylogaster cingulata (Ratzeburg).

nubilus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius nubilus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 176 n. 107, ♀.
Mesoleius nubilus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 35 n. 86, ♀.
Mesoleius nubilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 89, ♀ ♂.

nuperus Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Mesoleius nuperus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 296, ♀.

obliquus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.
Mesoleius obliquus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2070 n. 118, ♀ ♂.

obtusus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius obtusus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 139 n. 15, ♀.
Mesoleius conformis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 139 n. 16, ♀.
Mesoleius obtusus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 35 n. 84, ♀.
Mesoleius obtusus Holmgren, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2061 n. 96, ♀.

olympiae Ashm. — ♀ ♂ — Am.: Washington.
Mesoleius Olympiae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1896 p. 199, ♀ ♂.

ophthalmicus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia. [n. 76, ♂.
Mesoleius ophthalmicus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 162
Mesoleius ophthalmicus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 7 n. 12, ♂.
Mesoleius ophthalmicus Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 36; T. 23 F. 9.

opticus (Grav.) Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Tryphon opticus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 176 n. 114, ♀ ♂.
Tryphon opticus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 240 n. 26.
Mesoleius opticus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 136 n. 9, ♀.
Mesoleius opticus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 73, ♀ ♂ var.
Mesoleius opticus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 33 n. 81, ♀ ♂.
Mesoleptes opticus Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 36; T. 23 F. 4.
Mesoleius opticus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 77, ♂.
Mesoleius opticus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2074 n. 125, ♀ ♂.

orbitalis Thoms. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Mesoleius orbitalis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2050 n. 75, ♀.

palmenii Woldst. — ♀ — Eur.: Fennia.
Mesoleius Palmeni Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur. & Folk. XXI. 1872 p. 39 n. 7, ♀.

pannicularius Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 111, ♀.
Mesoleius pannicularius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 178

parvus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius parvus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 142 n. 25, ♀.
Mesoleius parvus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 17 n. 38, ♀.

patagiatus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius patagiatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 15 n. 34, ♀.

pectoralis Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleius pectoralis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 83, ♀ ♂.
Mesoleius pectoralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 87, ♀ ♂.

periscelius Kriechb. — ♀ — Eur.: Helvetia, Austria.
Mesoleius periscelius Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 294, ♀.

perspicuus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 28, ♀ [excl. ♂].
Mesoleius perspicuus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 143
Mesoleius perspicuus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 13. 1876 p. 39 n. 98, ♀.
Mesoleius perspicuus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2058 n. 88, ♀.

pertinax Davis — ♀ ♂ — Am.: Colorado, New Hampshire.
Mesoleius pertinax Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 299, ♀ ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Nematus pavidus, N. fulvus (Brischke).

perturbatus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius perturbatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 36 n. 87, ♀.
Mesoleius perturbatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2057 n. 87, ♀ [err. typogr.].

pervivax Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius pervivax Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 19 n. 44, ♀.
Mesoleius pervicax Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2063 n. 100, ♀ ♂.

picticoxa Thoms. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Mesoleius picticoxa Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2072 n. 123, ♀.

pictus Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleius pictus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 79, ♀ ♂.
Mesoleius pictus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 83, ♀ ♂.

pineti Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius pineti Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2071 n. 121, ♀ ♂.

pini Bridgm.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Mesoleius pini Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 156, ♀ ♂.

placidus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀ ♂.
Mesoleius placidus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 157 n. 62,
Mesoleius placidus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 5 n. 9, ♀ ♂.
Mesoleius placidus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2068 n. 112, ♀ ♂.

pleuralis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius pleuralis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2076 n. 129, ♀ ♂.

polyblastoides Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Mesoleius polyblastoides Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1897 p. 170, ♀ ♂.

praecatorius Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀ ♂.
Mesoleius praecatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 48 n. 123,
Mesoleius praecatorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2037 n. 46, ♀.

pulchranotus Davis — ♂ — Am.: Texas.
Mesoleius pulchranotus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 298, ♂.

pulverulentus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 47, ♀ ♂.
Mesoleius pulverulentus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 150
Mesoleius pulverulentus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 76, ♂.
Mesoleius pulverulentus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 5 n. 7, ♀ ♂.
Mesoleius pulverulentus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 81, ♂.

punctulatus Woldst. — ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleius punctulatus Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 402 n. 33, ♂.

puritanicus Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Mesoleius Puritanicus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 299, ♀.

pusio Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius pusio Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 159 n. 68, ♀ ♂.
Mesoleius pusio Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2067 n. 110, ♀.

rubidus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
? Mesoleius Sahlbergi Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 26 n. 64. ♀ ♂.
Mesoleius rubidus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1885 p. 935 n. 14, ♀.
Mesoleius rubidus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2079 n. 138, ♀.

ruficollis Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 100, ♀.
Mesoleius ruficollis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 172
Mesoleius ruficollis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 25 n. 63, ♀.
Mesoleius ruficollis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2078 n. 136, ♀.

---

1) *Hymen.:* Lophyrus pini (Fletcher).

rufogibbosus Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Mesoleius rufogibbosus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1897 p. 169, ♂.
rufus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Pyracmon rufum Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 365 n. 3, ♀.
Pyracmon rufum Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 787 n. 3, ♀.
Mesoleius rufus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 188.
sahlbergii Woldst. — ♀ ♂ — Eur.: Fennia, Suecia, Novaja Semlia.
Mesoleius Sahlbergi Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur. & Folk. XXI. 1872 p. 44 n. 40, ♀.
Mesoleius Sahlbergi Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 26 n. 64, ♀♂.
sanguinosus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 61, ♂.
Mesoleius sanguinosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 156 [[excl. ♂].
Mesoleius linitus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 157 n. 64, ♀
Mesoleius sanguinosus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 78, ♀♂.
Mesoleius sanguinosuss Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 28 n. 68, ♂ [[excl. ♀].
Mesoleius sanguinosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 82, ♀♂.
scapularis (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Connecticut, Montana, California, Washington.
Mesoleptus scapularis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 98, ♂.
Mesoleius scapularis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 296, ♀ ♂.
scutellaris Rdw. — ♀ — Eur.: Germania.
Mesoleius scutellaris Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 42, ♀.
segmentator Holmgr.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania. [n. 83, ♀.
Mesoleius segmentator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 165
Mesoleius segmentator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 80, ♀♂ var.
Mesoleius solitarius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 14 n. 31, ♀ ♂.
Mesoleius segmentator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 85, ♀♂.
Mesoleius segmentator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2049 n. 74, ♀ ♂.
senilis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius senilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 4 n. 6, ♀ ♂.
sepulchralis Holmgr.[2]) — ♀ — Eur.: Britannia, Suecia.
Mesoleius sepulchralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 10 n. 20, ♀.
Mesoleius sepulchralis Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1884 p. 432.
similis Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleius similis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 35, ♀♂.
simulans Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 54, ♀.
Mesoleius simulans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 151
Mesoleius simulans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 36 n. 91, ♀.
Mesoleius simulans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 82, ♀♂.
sincerus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀♂.
Mesoleius sincerus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 153 n. 52,
Mesoleius sincerus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 31 n. 75, ♀.
Mesoleius sincerus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2054 n. 82, ♀.
sinuatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius sinuatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2040 n. 55, ♀ ♂.
sobrinus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius sobrinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 19 n. 46, ♀.

---

1) *Hymen.:* Nematus salicis, N. melanocephalus (Brischke).
2) *Lep.:* Zaraea fasciata (Bridgman).

spurius Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia [[excl. ♂].
Mesoleius spurius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 135 n. 7, ♀
Mesoleius spurius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 36 n. 90, ♀.
Mesoleius spurius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 60, ♀.

stenostigma Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius stenostigma Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2042 n. 59, ♀.

sternoxanthus (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Tryphon sternoxanthus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 178 n. 117, ♀.
Tryphon sternoxanthus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 240 n. 28.
Mesoleius pulchellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 156 [n. 60, ♀ ♂.
Mesoleius sternoxanthus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 160 [n. 71, ♀.
Mesoleius languidulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 161 [n. 73, ♀ ♂.
Mesoleius sternoxanthus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 80, ♀.
Mesoleius sternoxanthus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 27 [n. 67, ♀ ♂.
Mesoleius sternoxanthus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 84, ♀.
Mesoleius languidulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 84, ♂.
Mesoleius pulchellus Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894 p. 22, ♂.
Mesoleius sternoxanthus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2051 n. 76, ♀ ♂.

stipator Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius stipator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 162 n. 81, [♀ ♂.
Mesoleius stipator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2070 n. 117, ♀ ♂.

striatus Davis — ♀ ♂ — Am.: New Hampshire.
Mesoleius striatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 299, ♀ ♂.

subfasciatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius subfasciatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 142 [n. 26, ♀.
Mesoleius hyperboreus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 148 [n. 40, ♂ [excl. ♀].
Mesoleius subfasciatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 22 n. 56, ♀ ♂.
Mesoleius subfasciatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 79, ♂.

submarginatus (Cress.) Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Tryphon? submarginatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 274 n. 4, ♂.
Tryphon submarginatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 105, ♀ ♂.
Cryptocentrus submarginatus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 157, ♀.
Tryphon canaliculatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 116.
Mesoleius submarginatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 258 n. 2, ♀ ♂.
Mesoleius submarginatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 416 n. 2, ♀ ♂.
Mesoleius submarginatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 298, ♀ ♂.

subroseus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius subroseus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1262 n. 6, ♀ ♂.
Mesoleius subroseus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2074 n. 127, ♀ ♂.

subtilis Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius subtilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 146 n. 35, ♀.

suspicax Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius suspicax Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 9 n. 18, ♀.

tenuitarsis Thoms. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Mesoleius tenuitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2039 n. 51, ♀.

tenuiventris Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n.110-111, ♂.
Mesoleius tenuiventris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 82
Mesoleius erythrogaster Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 44 [n. 112, ♀ var.
Mesoleius tenuiventris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2043 n. 61, ♀ ♂.

tibialis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [♀ ♂.
Mesoleius tibialis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 138 n. 12.
Mesoleius tibialis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 73, ♀.
Mesoleius tibialis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 11 n. 23, ♀ ♂.
Mesoleius tibialis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 60, ♀ ♂.
Mesoleius tibialis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2064 n. 102, ♀ ♂.

torvus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius torvus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 30 n. 74, ♀ ♂.
Mesoleius torvus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2062 n. 98, ♀.

transiens (Ratzbg.) Brischke[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Tryphon intermedius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 116 n. 24, ♀ ♂.
Tryphon transiens Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 126 n. 38.
Mesoleius transiens Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 82, ♀ ♂.
Mesoleius transiens Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 88, ♀ ♂.

tricoloripes A. Costa — Eur.: Sardinia.
Mesoleius tricoloripes A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli 1885 p. ?
Mesoleius tricoloripes A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p. 16.
Mesoleius tricoloripes A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 114.

tristis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius tristis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 140 n. 19, ♀.
Mesoleius tristis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 21 n. 53, ♀ ♂.
Mesoleius tristis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2063 n. 101, ♀.

trochanteratus Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria, Hungaria.
Mesoleius trochanteratus Kriechbaumer, Termész. Füzet. XIX. 1896 p. 132, ♀.

trochantericus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Mesoleius trochantericus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 73, ♀.

truncatus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Mesochorus truncatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 365 n. 10, ♀.
Mesoleius truncatus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 188.
Mesoleius truncatus Harrington, Canad. Entomol. XXIX. 1897 p. 45.

unifasciatus Holmgr.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 75, ♀ ♂.
Mesoleius unifasciatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 162
Mesoleius unifasciatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 80, ♀ ♂.
Mesoleius unifasciatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 45 n. 113, ♀ ♂.
Mesoleius unifasciatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 84, ♀ ♂.
Mesoleius unifasiatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 60, ♀.
Mesoleius unifasciatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2048 n. 71, ♀.

ustulatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀ ♂.
Mesoleius ustulatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 168 n. 91.
Mesoleius ustulatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 13. 1876 p. 43 n. 108, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Lophyrus spec. (Brischke).
2) *Hymen.:* Selandria stramineipes (Brischke).

variegatus (Jur.) Kriechb.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Anomalon variegatum Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 116, ♀; T. 8 F. 2.
Tryphon sanguinicollis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 187 n. 122, ♀ ♂.
Anomalon variegatum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 875 n. 4, ♀.
Tryphon sanguinicollis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 242 n. 32.
Tryphon sanguinicollis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 128 n. 50, ♀.
Mesoleius sanguinicollis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 71 n. 8, ♀.
Mesoleius sanguinicollis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 137 [n. 10, ♀ ♂.
Mesoleius sanguinicollis Giraud, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 1286 n. 5.
Mesoleius sanguinicollis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 73, ♀ ♂.
Mesoleius sanguinicollis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 13 [n. 29, ♀ ♂.
Mesoleptus sanguinicollis Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 36; T. 23 F. 6.
Mesoleius sanguinicollis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 78, ♀.
Mesoleptus variegatus Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VI. P. 7. 1882 p. 391.
Mesoleius sanguinicollis Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 72.
Mesoleius sanguinicollis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2073 n. 124, ♀ ♂.

varilcoxa Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius varicoxa Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2044 n. 63, ♀.

ventosus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius ventosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 11 n. 22, ♂.

versutus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♂ [excl. ♀].
Mesoleius versutus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 172 n. 98,
Mesoleius versutus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 38 n. 95, ♂.

vicinus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [[excl. ♂].
Mesoleius vicinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 153 n. 53, ♀
Mesoleius vicinus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 77, ♀.
Mesoleius vicinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 37 n. 92, ♀.
Mesoleius vicinus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 82, ♀.
Mesoleius vicinus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2056 n. 84, ♀ ♂.

vigens Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius vigens Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 142 n. 24, ♀.
Mesoleius vigens Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 16 n. 37, ♀.
Mesoleius vigens Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2076 n. 130, ♀.

visoris Davis — ♀ ♂ — Am.: Michigan.
Mesoleius visoris Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 296, ♀ ♂.

wahlbergii Holmgr. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Mesoleius Wahlbergi Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 13 n. 26, ♂.

zapotecus Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesoleius Zapotecus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 285 n. 2, ♀.

CAMPODORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 213 n. 113.
κάμπος, cetus; *δορός*, uter.

Species exstat.

[1]) *Hymen.:* Nematus gallicola (Westwood), Nematus spec. in Salix caprea (Bignell).

LATHROPHAGUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 213 n. 112.
λαθρός, procax; φάγειν, edo.

Species exstat.

HOLMGRENIA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 213 n. 111.
A. E. Holmgren, nom. propr.

Synon.: Bassus Ashmead.
Tryphon Davis.

cressonii Davis — ♀ — Am.: Texas.
Holmgrenia Cressoni Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 293, ♀.
euurae (Ashm.) Davis — ♂ — Am.: California.
Bassus euurae Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 440, ♂.
Tryphon euurae Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 30.
Holmgrenia euurae Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 294, ♂.
lanceolata Davis — ♀ ♂ — Am.: Colorado.
Holmgrenia lanceolata Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 294, ♀ ♂.
picea Davis — ♀ — Am.: Colorado.
Holmgrenia picea Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 294, ♀.
tarsalis (Cress.) Davis — ♀ (♂) — Am.: Connecticut.
Tryphon tarsalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 106, ♀ (♂?).
Holmgrenia tarsalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 293, ♀.
virginiensis Davis — ♀ — Am.: Virginia.
Holmgrenia Virginiensis (Ashmead) Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p.294, ♀.

BARYTARBES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 212 n. 110.
βαρύς, gravis; ταρβής, attonitus.

Synon.: Barytarbus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 931.
Mesoleius Holmgren, Brischke, Thomson.
Tryphon Gravenhorst.

adpropinquator (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Tryphon adpropinquator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 324 n. 210, ♀. [n.95, ♀.
Mesoleius adpropinquator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 170
Mesoleius adpropinquator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 381.
Mesoleius adpropinquator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 83, ♂.
Mesoleius adpropinquator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 10 [n. 21, ♀ ♂.
Mesoleius adpropinquator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 88, ♂.
Mesoleius (Barytarbus) adpropinquator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 931 n. 3, ♀ ♂.
Mesoleius (Barytarbus) adpropinquator Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1893 p. 1874 n. 6, ♀ ♂.
Barytarbus adpropinquator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2020.
annulipes Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius (Barytarbus) annulipes Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 932 n. 5, ♀ ♂.
Mesoleius (Barytarbus) annulipes Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1893 p. 1875 n. 8, ♂.

colon (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Gallia.
Tryphon colon Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 211 n. 137, ♂.
Tryphon colon Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 223 n. 15, ♂.
Mesoleius colon Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 83, ♂.
Mesoleius colon Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 88, ♂.
Mesoleius colon Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 158.
Mesoleius (Barytarbus) colon Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 931 n. 4, ♀ ♂.
Mesoleius (Barytarbus) colon Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1893 p. 1874 n. 7, ♀ ♂.
flavicornis Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Mesoleius (Barytarbus) flavicornis Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1893 p. 1875 n. 9, ♀.
flavoscutellatus Thoms. — ♂ — Eur.: Gallia.
Mesoleius (Barytarbus) flavoscutellatus Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1893 p. 1876 n. 10, ♂.

DOLIOCTONUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 212 n. 109.
δόλιος, fraudulentia; *κτείνω*, interficio.
Species exstat.

APYSTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 212 n. 108.
ἄπυστος, fando inauditus.
Species exstat.

SARCORYCHUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 212 n. 107.
σάρξ, caro; *ὀρύσσω* (*ὀρύχω*), fodio.
Species exstat.

PHAGESORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 212 n. 106.
φάγος, devorator; *σωρός*, cumulus.
Species exstat.

PHAESTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 212 n. 105
φαίνω, in lucem edo.

gloriosus Davis — ♀ — Am.: Washington Terr.
Phaestus gloriosus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 292, ♀.

HYPAMBLYS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 212 n. 104.
Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2007.
ὑπό, subtus; *ἀμβλύς*, obtusus.

Synon.: Euryproctus Thomson.
Mesoleius Holmgren, Brischke.
Syndipnus Thomson.

buccatus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀ ♂.
Mesoleius buccatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 145 n. 33,

Mesoleius buccatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 380.
Syndipnus (Hypamblys) buccatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2008 n. 25.

carinatus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 48, ♀.
Mesoleius carinatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 151
Mesoleius carinatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 380.
Mesoleius carinatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 39 n. 99, ♀.
Mesoleius carinatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 181, ♀♂.
Syndipnus (Hypamblys) carinatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2007 n. 23.

lineiger Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Syndipnus (Hypamblys) lineiger Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2007 n. 24, ♀ ♂.

transfuga (Holmgr.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [♀ ♂.
Mesoleius transfuga Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 169 n. 80,
Mesoleius transfuga Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 80, ♀♂.
Mesoleius transfuga Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 85, ♀♂.
Euryproctus (Syndipnus) transfuga Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 928 n. 14.
Syndipnus (Hypamblys) transfuga Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2008 n. 26.

TAUTOZELUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 212 n. 103.
ταύτα, eatenus; ζῆλος, aemulatio.
Species exstat.

CAMPONASTES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 212 n. 102.
κάμπος, balaena; νάστης, habitator.

basilicus Davis — ♀ — Am.: Vermont.
Camponastes basilicus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 292, ♀.

RHINOTORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 211 n. 101.
ῥινοτόρος, scuta perforans.
Species exstat.

SPUDAEA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 211 n. 100.
σπουδαῖος, sedulus.

Synon.: Spudaeus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 932.
Mesoleius Holmgren, Thomson.
Trematopygus Holmgren, Brischke.
Tryphon Gravenhorst.

assidua (Holmgr.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius assiduus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 13 n. 28, ♀.
Spudaeus assiduus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2015 n. 15.

atrata (Holmgr.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania. [n. 4, ♀.
Trematopygus atratus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 181

---

[1] *Hymen.:* Nematus hypogastricus, N. testaceus (Brischke).
[2] *Hymen.:* Nematus septentrionalis (Brischke, Wilson).

Trematopygus atratus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 86, ♀ ♂.
Trematopygus atratus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 90, ♀ ♂.
Trematopygus atratus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 38, ♀.
Spudaeus atratus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2010 n. 3.

clypearis Brischke[1]) — ♀ — Eur.: Germania. [p. 7, ♀.
Trematopygus (Spudaea) clypearis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 1. 1888

confusa (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 15–16, ♀ ♂.
Mesoleius confusus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 376
? Mesoleius erosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 382, ♂.
Mesoleius (Spudaeus) confusus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 932 n. 7, ♀ ♂.
Spudaeus confusus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2011 n. 4.

congruens (Holmgr.) Thoms. — ♂ — Eur.: Suecia. [n. 56–57, ♂.
Mesoleius congruens Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 380
Spudaeus congruens Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2015 n. 14.

erosa (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 1, ♀.
Trematopygus erosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 179
Trematopygus erosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 382, ♂.
Mesoleius (Spudaeus) erosus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 932 n. 6.
Spudaeus erosus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2014 n. 12.

facialis Thoms. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Spudaeus facialis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2014 n. 13, ♀.

leucostoma (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Tryphon leucostomus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 217 n. 143, ♀.
Mesoleius leucostomus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 84, ♀ ♂.
Mesoleius (Spudaeus) leucostomus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 932 n. 8.
Spudaeus leucostomus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2011 n. 5.

mandibularis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Spudaeus mandibularis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2013 n. 10, ♀ ♂.

mesocastana Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Spudaeus mesocastanus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2011 n. 7, ♀.

nigridens Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia.
Spudaeus nigridens Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2013 n. 11, ♀ ♂.

ochrostoma (Grav.) Thoms. — ♀ — Eur.: Britannia, Suecia.
Tryphon ochrostomus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 227 n. 149, ♀.
Spudaeus ochrostomus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2010 n. 1.

ovalis Davis — ♀ — Am.: Michigan.
Spudaea ovale Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 291, ♀.

sanguinipes Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Spudaeus sanguinipes Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2012 n. 8, ♀ ♂.

similis Brischke[2]) — ♀ — Eur.: Germania.
Mesoleius (Spudaea) similis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 20, ♀.

stenocera Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Spudaeus stenocerus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2013 n. 9, ♀ ♂.

subimpressa Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Spudaeus subimpressus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2011 n. 6, ♀ ♂.

umbrarum (Holmgr.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 2, ♀.
Trematopygus umbrarum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 180
Spudaeus umbrarum Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2010 n. 2.

---

1) *Hymen.:* Nematus palleatus (Brischke).
2) *Hymen.:* Cladius difformis (Brischke).

SYNODITES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 211 n. 199.
συνοδίτης, comes.

Synon.: Synodytes Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2001.
Euryproctus Thomson.
Mesoleius Holmgren.
Syndipnus Thomson.
Tryphon Holmgren.

assimilis (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 18–19, ♀ ♂.
Tryphon assimilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 384
Euryproctus (Syndipnus) assimilis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 928 n. 10.
Syndipnus (Synodytes) assimilis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2002 n. 9.
contractus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 17, ♀ ♂.
Mesoleius contractus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 140
Mesoleius contractus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 32 n. 79, ♀ ♂.
Syndipnus (Synodites) contractus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2003 n. 13, ♀ ♂.
orbitalis Thoms. — ♀ — Eur.: Oelandia.
Syndipnus (Synodytes) orbitalis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2002 n. 10, ♀.
parviceps Thoms. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Syndipnus (Synodytes) parviceps Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2003 n. 12, ♂.
subscaber Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Syndipnus (Synodytes) subscaber Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2002 n. 11, ♀.

ENOECETIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 211 n. 98.
Etymol. obscura.

scutellaris Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Enoecetis scutellaris (Förster) Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII. 1897 p. 175, ♀.

ALLOCRITUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 211 n. 97.
ἄλλος, alius; κριτός, judicatus.

Species exstat.

GEMOPHAGA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 211 n. 96.
γέμος, plenus sum; φάγω, edo.

Species exstat.

SCOPARCHES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 211 n. 95.
σκοπάρχης, exploratorum praefectus.

Species exstat.

HYPERBATUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 210 n. 94.
ὑπέρ, super; *βατός*, pervius.
Species exstat.

HYPERALLUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 210 n. 93.
ὑπέρ, super; *ἄλλος*, alius.
Species exstat.

TACHYPORTHUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 210 n. 92.
ταχύς, celer; *πορθήτωρ*, eversor.
Species exstat.

EXACRODUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 210 n. 91.
ἔξω, foras; *ἄκρος*, extremus, *ὀδοῦς*, dens.
Species exstat.

HYBRISTES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 210 n. 90.
ὕβρις, injuria.
Species exstat.

ATITHASUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 210 n. 89.
ἄτιτος, inhonoratus.

stellarius Davis — ♀ ♂ — Am.: Texas.
Atithasus stellarius Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 291, ♀ ♂.

TROMOPOEA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 210 n. 88.
τρομοποιέω, tremefacio.
Species exstat.

SAOTIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 210 n. 87.
σαόω = *σῴζω*, servo.

Synon.: Saotus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 933.
Mesoleius Thomson, Bridgman.

brevispina Thoms.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Britannia.
Mesoleius (Saotus) brevispina Thomson, Opusc. Entom. P. 9. 1883 p. 934 n. 11, ♀ ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Nematus purpureae (Fletcher).

Mesoleius brevispina Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1887 p. 372.
Saotus brevispina Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2018 n. 4.

compressiusculus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius (Saotus) compressiusculus Thomson, Opusc. Entom. P. 9. 1883 p. 934 n. 12.
Saotus compressiusculus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2019 n. 6.

dorsatus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius (Saotus) dorsatus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1264 n. 9, ♀.
Mesoleius dorsatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2019 n. 8.

emarginatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius (Saotus) emarginatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 933 n. 9, ♀ ♂.
Saotus emarginatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2018 n. 1.

heteropus Thoms. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Mesoleius (Saotus) heteropus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 934 n. 13, ♀.

liopleuris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius (Saotus) liopleuris Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1263 n. 7, ♀ ♂.
? Mesoleius bilineatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 61, ♀.
Saotus liosternus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2018 n. 3 [err. typogr.].

longiventris Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius (Saotus) longiventris Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1263 n. 8, ♀.
Saotus longiventris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2019 n. 7.

nigriscuta Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius (Saotus) nigriscuta Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1264 n. 10, ♀.
Saotus nigriscuta Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2018 n. 5.

nigriventris Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Saotus nigriventris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2019 n. 10, ♀.

tricolor Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius (Saotus) tricolor Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 933 n. 10, ♀ ♂.
Saotus tricolor Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2018 n. 2.

variicoxa Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Saotus varicoxa Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2019 n. 9, ♀.

BOETHUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 210 n. 86.
βοηθός, opitulans.

alaingens Davis — ♀ — Am.: California.
Boethus alaingens Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 291, ♀.

glabranotus Davis — ♀ — Am.: Montana.
Boethus glabranotus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 291, ♀.

howardii Davis[1]) — ♀ ♂ — Am.: Missouri.
Boethus Howardi Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 290, ♀ ♂.

CALLIPHRURUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 210 n. 85.
καλλός, pulchritudo; *φρουρός*, custos.

granulosus Davis — ♂ — Am.: Illinois.
Calliphrurus granulosus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 290, ♂.

---

1) *Hymen.:* Schizocerus ebenus (Norton).

SYNTACTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 210 n. 84.
συντάσσω, compono.

Species exstat.

CAMPOPORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 210 n. 83.
κάμπος, balaena; *πόρος*, transitus.

Species exstat.

PANTOPORTHUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 209 n. 82.
πᾶς, omnis; *πορθέω*, diruo.

Species exstat.

ASELASMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 209 n. 81.
ἀ-priv.; *σέλασμα*, actio splendendi.

Species exstat.

CAMPOGENES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 209 n. 80.
κάμπη, eruca; *γενέσιος*, natalis.

Species exstat.

ATRESTES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 209 n. 79.
ἄτρεστος, intrepidus.

Species exstat.

POLYTERUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 209 n. 78.
πολύς, multum; *τηρός*, custos.

franconiaensis Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Polyterus franconiaensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 289, ♀.

TLEMON

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 209 n. 77.
τλήμων, patiens.

Species exstat.

LISTROTA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 209 n. 76.
λιστρωτός, complanatus.

Synon.: Phobetes Harrington.

canadensis (Harrgt.) Davis — ♀ — Am.: Canada, Vancouvers Island.
Phobetes Canadensis Harrington, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 248, ♀.
Listrota Canadensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1897 p. 289, ♀.

VOLUCRIS

Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 267 & 287.
volucer.

Synon.: Tryphon Cresson, Provancher.

semirufus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Illinois, Montana, Colorado, Oregon.
Tryphon semirufus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 278 n. 10, ♀.
Tryphon rufocinctus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 280 n. 14, ♀.
Tryphon rufocintus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 103 n. 12, ♀.
Volucris semirufus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 287, ♀ ♂.

SYNDIPNUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 209 n. 75.
Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 927.
σύν, conjunctus; *δίπνος*, duo spiracula habens.

Synon.: Euryproctus Thomson.
Mesoleius Holmgren.
Trematopygus Holmgren, Brischke.

alutaceus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Trematopygus alutaceus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Trph.) p. 181 [n. 5, ♀ ♂.
Syndipnus alutaceus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2006 n. 20.

atricornis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Euryproctus (Syndipnus) atricornis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 928 n. 12, ♀ ♂.
Syndipnus atricornis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2004 n. 19.

conformis (Holmgr.) Thoms. — ♂ — Eur.: Suecia.
Trematopygus conformis Holmgen, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 183 [n. 11, ♂.
Euryproctus (Syndipnus) conformis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 928 n. 13.
Syndipnus conformis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2006 n. 19.

discolor (Holmgr.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Trematopygus discolor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 180 [n. 3, ♀ ♂.
Trematopygus discolor Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 86, ♀ ♂ var.
Trematopygus discolor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 90, ♀ ♂.
Syndipnus discolor Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2006 n. 18.

fasciellus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius fasciellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 148 n. 41, [♀ ♂.
Syndipnus fasciellus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2007 n. 22.

longipes Davis — ♀ — Am.: Texas.
Syndipnus longipes Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 288, ♀.

macrocerus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Euryproctus (Syndipnus) macrocerus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 928 n. 11, ♀ ♂.
Syndipnus macrocerus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2005 n. 15.

monticola (Holmgr.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius monticola Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 141 [n. 21, ♀.
Mesoleius monticola Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 37 n. 94, ♀.
Syndipnus monticola Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2006 n. 21.

pectoralis Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Syndipnus pectoralis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2006 n. 17, ♀.

punctiscuta Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Gallia.
Syndipnus punctiscuta Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2005 n. 16, ♀ ♂.

---

[1] *Hymen.:* Lophyrus rufus, Nematus spec. (Brischke).

SMICROLIUS

Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2008.
σμικρός, parvus; λεῖος, levis.

Synon.: Syndipnus Thomson.

parvicalcar Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Syndipnus (Smicrolius) parvicalcar Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2008 n. 27, ♀♂.

SCOPESIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 209 n. 74.
σκόπησις, contemplatio.

Synon.: Scopesus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2028 n. 7.
Bassus Zetterstedt.
Mesoleius Holmgren, Brischke, Thomson.
Tryphon Gravenhorst, Stephens.

depressa Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius (Scopesus) depressus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2030 n. 33, ♀.
fraterna (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia. [n. 102, ♀♂.
Mesoleius fraternus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 173
Mesoleius fraternus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 47 n. 120, ♀♂.
Mesoleius (Scopesus) fraternus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2032 n. 40, ♀♂.
guttigera (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [[excl. ♂].
Mesoleius guttiger Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 171 n. 97, ♀
Mesoleius guttiger Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 381.
Mesoleius guttiger Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 47 n. 119, ♂
[[excl. ♀].
Mesoleius (Scopesus) guttiger Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2030 n. 35, ♀ ♂.
longigena Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia.
Mesoleius (Scopesus) longigena Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2031 n. 36, ♀ ♂.
macropus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Tryphon semicaligatus var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 273 n. 178, ♂.
Mesoleius (Scopesus) macropus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2030 n. 34, ♀ ♂.
nigricollis (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Tryphon nigricollis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 234 n. 153, ♂.
Tryphon nigricollis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 248 n. 48.
Bassus (Tryphon) nigricollis Zetterstedt, Ins. Lappon. I. 1838 p. 380 n. 17, ♀ ♂.
Mesoleius nigricollis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 69 n. 1.
Mesoleius nigricollis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 176
[n. 106, ♀ ♂.
Mesoleius nigricollis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 84, ♀ ♂.
Mesoleius nigricollis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 36 n. 88, ♀♂.
Mesoleius nigricollis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 89, ♀.
Mesoleius (Scopesus) nigricollis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2032 n. 39, ♀ ♂.
obscura (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀♂.
Mesoleius obscurus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 173 n. 101,
Mesoleius obscurus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 22 n. 55, ♀♂.
Mesoleius (Scopesus) obscurus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2033 n. 42, ♂.
pallidifrons (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesoleius politus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 141 n. 22, ♀.

Mesoleius pallifrons Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph. p. 149 n. 43, ♀ ♂.
Mesoleius politus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 75, ♀ ♂.
Mesoleius pallifrons Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 46 n. 117, ♀ ♂.
Mesoleius politus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 79, ♀ ♂.
Mesoleius (Scopesus) pallifrons Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2032 n. 38, ♀ ♂.

rufolabris (Zett.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Tryphon semicaligatus var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 272 n. 178, ♂.
Bassus (Tryphon) rufolabris Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 380 n. 15, ♀.
Mesoleius rufolabris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 171 [n. 96, ♀ ♂.
Mesoleius rufolabris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 3. (Tryph.) p. 381 [p. p.].
Mesoleius rufolabris Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 83, ♀ ♂.
Mesoleius rufolabris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 46 n. 118, [♀ ♂ [p. p.].
Mesoleius rufolabris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 88, ♂.
Mesoleius rufolabris Butler, Entom. M. Magaz. XVII. 1881 p. 236.
Mesoleius (Scopesus) rufolabris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2029 n. 32, ♀ ♂.

rufonotata (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Mesoleius rufonotatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 31 n. 76, ♀ ♂.
Mesoleius (Scopesus) rufonotatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2033 n. 41, ♀ ♂.

tegularis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♂ [non Gravenhorst].
Mesoleius longipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 170 n. 94,
Mesoleius guttiger Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 171 n. 97, [♀ [excl. ♂].
Meloleius guttiger Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 47 n. 119, ♀ [[excl. ♂].
Mesoleius longipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 88, ♀ ♂.
Mesoleius (Scopesus) tegularis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2031 n. 37, ♀ ♂.

PHILOTYMMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 209 n. 73.
φίλος, amicus; *τύμμα*, ictus.

Species exstat.

SPHECOPHAGA

Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 57.
σφήξ, vespa; *φάγω*, comedo.

Synon.: Cacotropa Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 208 n. 72.
κακός, malus; *τρέφω*, alo.

Anomalon Curtis.
Euceros Cresson, Couper, Provancher.
Specophagus Zabriskie.
Tryphon Ratzeburg.

burra (Cress.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Canada, New York.
Euceros burrus Cresson, Canad. Entomol. I. 1869 p. 104 & 105 n. 4, ♀.
Euceros burrus Couper, Canad. Entomol. II. 1870 p. 53.

---

[1]) *Hymen.:* Tenthredo spec. (Brischke).

Euceros burrus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 271 n. 3, ♀.
Euceros burrus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 426 n. 3, ♀.
Sphecophagus ? praedator Zabriskie, Journ. New York Entom. Soc. II. 1894 p. 84.
Cacotropa burrus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 288, ♀ ♂.
Sphecophaga burra m.

vesparum (Curt.) Westw.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Helvetia.
Anomalon vesparum Curtis, Brit. Entom. V. 1828 p. 198 n. 2; T. 198.
Sphecophaga vesparum Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 57.
Tryphon versparum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 128 n. 48, ♀.
Anomalon vesparum Smith, Trans. Entom. Soc. London (3.) I. 1862 Proc. p. 77.
Anomalon vesparum Stone, Zoologist XX. 1862 p. 74 & 79.
Cacotropa sericea Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1259 n. 1, ♀ ♂.
Sphecophaga vesparum Bignell, Entom. M. Magaz. XXIV. 1890 p. 191-192.
Cacotropa sericea Bloesch, Feuille jeun. natural. XXV. 1895 p. 75, ♀ ♂.

RHIGELUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 208 n. 71.
ῥιγηλός, rigidus.
Species exstat.

TRAPEZOCORA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 208 n. 70.
τράπεζα, mensa; κόρη, pupa.
Species exstat.

CAMPORYCHUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 208 n. 69 (Camporhychus).
κάμπη, eruca; ὀρύσσω (ὀρύχω), fodio.
Species exstat.

ASTHENARA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 208 n. 68.
ἀ-priv.; σθεναρός, robustus.

Synon.: Asthenarus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1437.
Anomalon Trentepol.
Catoglyptus Thomson.
Ichneumon Linné & auct. ant.
Mesoleptus Gravenhorst, Stephens, Blanchard.
Tryphon Blanchard.

crassifemur Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Asthenarus crassifemur Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1437 n. 1, ♀ ♂.
Catoglyptus (Asthenarus) crassifemur Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1975 n. 9.

delusor (L.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon delusor Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 564 n. 32.
Ichneumon delusor Brünnich, Prodr. insectol. Siaelland. 1761 p. 18.
Ichneumon delusor Linné, Fauna Suecia Ed. 2ª 1761 p. 403 n. 1610.

---

1) *Hymen.*: Vespa vulgaris, V. rufa (Curtis).

Mesoleius pallifrons Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph. p. 149 n. 43, ♀ ♂.
Mesoleius politus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 75, ♀ ♂.
Mesoleius pallifrons Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 46 n. 117, ♀ ♂.
Mesoleius politus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 79, ♀ ♂.
Mesoleius (Scopesus) pallifrons Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2032 n. 38, ♀ ♂.

rufolabris (Zett.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Tryphon semicaligatus var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 272 n. 178, ♂.
Bassus (Tryphon) rufolabris Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 380 n. 15, ♀.
Mesoleius rufolabris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 171 [n. 96, ♀ ♂.
Mesoleius rufolabris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 3. (Tryph.) p. 381 [p. p.].
Mesoleius rufolabris Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 83, ♀ ♂.
Mesoleius rufolabris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 46 n. 118, [♀ ♂ [p. p.].
Mesoleius rufolabris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 88, ♂.
Mesoleius rufolabris Butler, Entom. M. Magaz. XVII. 1881 p. 236.
Mesoleius (Scopesus) rufolabris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2029 n. 32, ♀ ♂.

rufonotata (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Mesoleius rufonotatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 31 n. 76, ♀ ♂.
Mesoleius (Scopesus) rufonotatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2033 n. 41, ♀ ♂.

tegularis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♂ [non Gravenhorst].
Mesoleius longipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 170 n. 94,
Mesoleius guttiger Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 171 n. 97, [♀ [excl. ♂].
Meloleius guttiger Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 47 n. 119, ♀ [[excl. ♂].
Mesoleius longipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 88, ♀ ♂.
Mesoleius (Scopesus) tegularis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2031 n. 37, ♀ ♂.

PHILOTYMMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 209 n. 73.
φίλος, amicus; *τύμμα*, ictus.

Species exstat.

SPHECOPHAGA

Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 57.
σφήξ, vespa; *φάγω*, comedo.

Synon.: Cacotropa Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 208 n. 72.
κακός, malus; *τρέφω*, alo.

Anomalon Curtis.
Euceros Cresson, Couper, Provancher.
Specophagus Zabriskie.
Tryphon Ratzeburg.

burra (Cress.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Canada, New York.
Euceros burrus Cresson, Canad. Entomol. I. 1869 p. 104 & 105 n. 4, ♀.
Euceros burrus Couper, Canad. Entomol. II. 1870 p. 53.

---

1) *Hymen.:* Tenthredo spec. (Brischke).

Euceros burrus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 271 n. 3, ♀.
Euceros burrus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 426 n. 3, ♀.
Sphecophagus ? praedator Zabriskie, Journ. New York Entom. Soc. II. 1894 p. 84.
Cacotropa burrus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 288, ♀ ♂.
Sphecophaga burra m.

vesparum (Curt.) Westw.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Helvetia.
Anomalon vesparum Curtis, Brit. Entom. V. 1828 p. 198 n. 2; T. 198.
Sphecophaga vesparum Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 57.
Tryphon versparum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 128 n. 48, ♀.
Anomalon vesparum Smith, Trans. Entom. Soc. London (3.) I. 1862 Proc. p. 77.
Anomalon vesparum Stone, Zoologist XX. 1862 p. 74 & 79.
Cacotropa sericea Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1259 n. 1, ♀ ♂.
Sphecophaga vesparum Bignell, Entom. M. Magaz. XXIV. 1890 p. 191-192.
Cacotropa sericea Bloesch, Feuille jeun. natural. XXV. 1895 p. 75, ♀ ♂.

RHIGELUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 208 n. 71.
ῥιγηλός, rigidus.
Species exstat.

TRAPEZOCORA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 208 n. 70.
τράπεζα, mensa; κόρη, pupa.
Species exstat.

CAMPORYCHUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 208 n. 69 (Camporhychus).
κάμπη, eruca; ὀρύσσω (ὀρύχω), fodio.
Species exstat.

ASTHENARA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 208 n. 68.
ἀ-priv.; σθεναρός, robustus.

Synon.: Asthenarus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1437.
Anomalon Trentepol.
Catoglyptus Thomson.
Ichneumon Linné & auct. ant.
Mesoleptus Gravenhorst, Stephens, Blanchard.
Tryphon Blanchard.

crassifemur Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Asthenarus crassifemur Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1437 n. 1, ♀ ♂.
Catoglyptus (Asthenarus) crassifemur Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1975 n. 9.

delusor (L.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon delusor Linné, Syst. nat. Ed. 10a I. 1758 p. 564 n. 32.
Ichneumon delusor Brünnich, Prodr. insectol. Siaelland. 1761 p. 18.
Ichneumon delusor Linné, Fauna Suecia Ed. 2a 1761 p. 403 n. 1610.

---

[1]) *Hymen.*: Vespa vulgaris, V. rufa (Curtis).

Ichneumon delusor Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 934 n. 34.
Ichneumon delusor Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 337 n. 54.
Ichneumon delusor Ph. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 852 n. 34.
Ichneumon delusor O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 156 n. 1811.
Ichneumon delusor Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 431 n. 67.
Ichneumon delusor Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 364 n. 734, ♂.
Ichneumon delusor Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 266 n. 80.
Ichneumon delusor Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 168 n. 100.
Ichneumon delusor Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2691 n. 34.
Ichneumon delusor Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 371.
Ichneumon delusor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 187 n. 118.
Ichneumon delusor Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 165 n. 129.
Ichneumon delusor Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 281 n. 2086, ♂.
Ichneumon delusor Schrökenstein, Verz. d. Halbkäfer etc. 1802 p. 27 n. 82.
Ichneumon delusor Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 60 n. 57.
Ichneumon delusor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 67 n. 71.
Ichneumon delusor Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 188 n. 36.
Ichneumon delusor Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110, ♂.
Ichneumon delusor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon delusor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 319.
Anomalon delusor Trentepol, Isis 1826 p. 299 n. 65, ♀.
Mesoleptus delusor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 83 n. 49, ♀.
Mesoleptus delusor Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 225 n. 40, ♀.
Tryphon (Mesoleptus) delusor Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 307 n. 4.
Catoglyptus delusor Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 923 n. 6.
Catoglyptus (Asthenarus) delusor Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1975 n. 10.

fusiformis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Catoglyptus (Asthenarus) fusiformis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1975 n. 11, ♀♂.

scabricula Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Catoglyptus (Asthenarus) scabriculus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1975 n. 12, ♀.

SYCHNOPORTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 208 n. 67.

συχνός, frequens; *πορτάζω*, vitulor.

rufopectus Ashm. — ♂ — Am.: New Hampshire.
Sychnoportus rufopectus Ashmead, Proc. Entom. Soc. Washington IV. 1897 p. 169, ♂.

XENONASTES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 208 n. 66.

ξενός, peregrinus; *νάστης*, habitator.

Species exstat.

POLYPYSTIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 208 n. 65.

πολύς, multum; *πύστις*, auditio.

Species exstat.

AEOLOMETIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 207 n. 64.
ἄειλος, sole carens; μῆτις, nequis.

Synon.: Aelometis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2034 n. 7.
Mesoleius Thomson.
Scolobates Gravenhorst, Vollenhoven.
Tryphon Kriechbaumer.

italicus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Scolobates Italicus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 362 n. 231, ♂.
Scolobates corallinus Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XVI. 1873 p. 211 n. 4, ♀.
Tryphon Italicus Kriechbaumer, Entom. Nachr. III. 1877 p. 135, ♀ ♂.
Mesoleius (Aelometis) Italicus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2034 n. 43, ♀ ♂.

NYTHOPHONA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 207 n. 63.
Etymol. obscura.
Species exstat.

TRYSICAMPE

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 207 n. 62.
τρῦσις, afflictio; κάμπη, eruca.
Species exstat.

PARAPLESIUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 207 n. 61.
παρά, ad; πλησίος, propinquus.
Species exstat.

NOEMON

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 207 n. 60.
νοήμων, mentis compos.

Synon.: Tryphon Cresson.

californicus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: California.
Tryphon Californicus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 373, ♀ ♂.
Noemon Californicus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 286, ♀ ♂.
lusorius (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: California.
Tryphon lusorius Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 373, ♂.
Noemon lusorius Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 287, ♀ ♂.
palmaris Davis — ♀ ♂ — Am.: California.
Noemon palmaris Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 287, ♀ ♂.

DYSANTES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 207 n. 59.
δυσάντης, cujus sinister est occursus.
Species exstat.

ONEISTA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 207 n. 58.
ὀνήϊστος, utilissimus.

bohemannii Kriechb. — ♀ — Eur.: Lapponia, Bavaria.
Oneista Bohemani (Förster) Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 41, ♀.

ZEMIOPHRON

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 206 n. 57.
ζημία, damnum; φέρω, fero.
Species exstat.

DIALGES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 206 n. 56.
διαλγής, qui acri dolore cruciatur.

fasciatus Davis — ♂ — Am.: Massachusetts.
Dialges fasciatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 286, ♂.
frontalis Davis — ♀ ♂ — Am.: New Hampshire, Michigan, Colorado, Indiana.
Dialges frontalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 285, ♀ ♂.
var. **rivalis** Davis — ♀ — Am.: Michigan, Philadelphia.
Dialges frontalis var. rivalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 286, ♀.
var. **tricolor** Davis — ♀ ♂ — Am.: New Hampshire, Massachusetts, Illinois, Montana.
Dialges frontalis var. tricolor Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 285, ♀ ♂.

ZAPEDIAS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 206 n. 55.
ζα-, valde; πεδιάς, campestris.
Species exstat.

PANTORHAESTES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 206 n. 54.
πᾶς, omne; ῥαιστής, habens vim.
Species exstat.

GASTROPORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 206 n. 53.
γάστρα, fundus vasis; πόρος, transitus.
Species exstat.

SYNOMELIX

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 206 n. 52.
Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII. 1897 p. 186.
συνομῆλιξ = ὁμῆλιξ, ejusdem aetatis.

sieboldii Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania.
Synomelix Sieboldi Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII. 1897 p. 188, ♀.

TROPHOCTONUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 206 n. 51.
Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1999.
τρέφω, alo; κτείνω, interficio.

Synon.: Euryproctus Holmgren, Thomson.
Mesoleius Brischke, Bridgman, Jacobs & Tosquinet.
Syndipnus Thomson.
Tryphon Gravenhorst, Stephens.

curvulus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 18, ♂ [non Gravenhorst].
Euryproctus albopictus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 114
Euryproctus albopictus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 378, ♀.
Syndipnus (Trophoctonus) curvulus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2000 n. 6.
xanthostomus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Tryphon xanthostomus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 257 n. 167, ♀.
Tryphon xanthostoma Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 254 n. 64.
Mesoleius xanthostomus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 82, ♀ ♂.
Mesoleius xanthostomus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 87, ♀ ♂.
Mesoleius xanthostomus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 158.
Euryproctus (Syndipnus) xanthostomus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 927 n. 9, ♀ ♂.
Mesoleius xanthostomus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 81, ♂.
Syndipnus (Trophoctonus) xanthostomus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2000 n. 5.

LAMACHUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 206 n. 50.
Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1876 n. 3.
λάμαχος, strenue pugnans.

Synon.: Mesoleius Holmgren, Brischke, Thomson.
Tryphon Hartig, Ratzeburg.

castaneiventris Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius (Lamachus) castaneiventris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2023 n. 1, ♀.
contortionis Davis — ♀ — Am.: Columbia.
Lamachus ? contortionis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 284, ♀.
dispar (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius dispar Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 138 n. 13, ♀.
Mesoleius dispar Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 379.
Mesoleius dispar Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 7 n. 11, ♀ ♂.
Mesoleius (Lamachus) dispar Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1878 n. 12, ♀.
frutetorum (Htg.) Thoms.[1]) — ♀ . ♂ — Eur.: Germania.
Tryphon frutetorum Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 271 n. 7, ♀.
Tryphon frutetorum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 126 n. 3, ♀.
Mesoleius frutetorum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 78, ♀ ♂.
Mesoleius (Lamachus) frutetorum Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1878 n. 13, ♀.
longiventris Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius (Lamachus) longiventris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2023 n. 2, ♀.

---

[1]) *Hymen.:* Lophyrus frutetorum (Hartig).

lophyrorum (Htg.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Tryphon lophyrorum Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 271 n. 8, ♀ ♂.
Ichneumon (Tryphon) lophyrorum Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 27 n. 24; T. 9 F. 7&8.
Tryphon lophyrorum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 126 n. 5, ♂.
Tryphon lophyrorum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 125 n. 32.
Mesoleius lophyrorum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 138 [n. 14, ♀ ♂.
Mesoleius lophyrorum Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 74, ♀ ♂.
Mesoleius lophyrorum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 6 n. 10, ♀.
Mesoleius lophyrorum Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 36; T. 23 F. 8.
Mesoleius lophyrorum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 78, ♀ ♂.
Mesoleius (Lamachus) lophyrorum Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1877 n. 11, ♀ ♂.
var. **frutetorum** (Holmgr.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia. [[non Hartig].
Mesoleius frutetorum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 8 n. 15, ♀
Mesoleius (Lamachus) lophyrorum var. frutetorum Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1877, [♀.
marginatus (Brischke) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Mesoleius marginatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 74, ♂.
Mesoleius marginatus Cameron, Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow III. 1876 p. 110 n. 2.
Mesoleius marginatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 7 n. 13, ♀ ♂.
Mesoleius (Lamachus) marginatus Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1878 n. 14, ♀ ♂.
silvarum (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius silvarum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 10 n. 19, ♀ ♂.
Mesoleius (Lamachus) sylvarum Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1880 n. 16, ♀ ♂.
spectabilis (Holmgr.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius spectabilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 8 n. 14, ♀.
Mesoleius (Lamachus) spectabilis Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1879 n. 15, ♀.

ADEXIOMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 206 n. 49.
ἀ-priv.; δεξίωμα, res grata.

angularis Davis — ♀ — Am.: Washington.
Adexioma angularis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 284, ♀.

ZAPHTHORA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 206 n. 48.
ζα-, valde; φθείρω, perdo.
Species exstat.

ADRANES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 205 n. 47.
ἀδρανής, infirmus.
Species exstat.

AZELUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 205 n. 46.
ἄζηλος, sine aemulatione.
Species exstat.

---

[1]) *Hymen.:* Lophyrus pini, L. variegatus (Hartig).

DASPLETIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 205 n. 45.
δασπλῆτις, horrendus.

Species exstat.

LAGAROTIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 205 n. 44.
λαγαρός, laxus; ὠτίς, otis.

Synon.: Lagarotus Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1880 n. 4.
Bassus Zetterstedt.
Ichneumon Gravenhorst.
Mesoleius Holmgren, Brischke, Thomson.
Tryphon Gravenhorst, Stephens.

didymus Thoms. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Mesoleius (Lagarotus) didymus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2024 n. 1, ♀.
erythrocerus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Tryphon erythrocerus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 689.
Tryphon erythrocerus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 230 n. 151, ♀ ♂.
Tryphon erythrocerus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 247 n. 46.
Bassus (Tryphon) erythrocerus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 380 n. 16, ♂.
Mesoleius erythrocerus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 69 n. 2, ♀.
Mesoleius erythrocerus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 166 [n. 86, ♀ ♂.
Mesoleius erythrocerus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 50.
Mesoleius erythrocerus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 34, ♂.
Mesoleius (Lagarotus) erythrocerus Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1882 n. 19, ♀ ♂.
insolens (Grav.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia.
Tryphon insolens Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 691, ♀.
Tryphon insolens Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 274 n. 179, ♀ ♂.
Tryphon insolens Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 258 n. 77.
? Mesoleius insolens Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 167 [n. 88, ♀ ♂.
Mesoleius insolens Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 82, ♂.
Mesoleius insolens Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 44 n. 110, ♀ ♂.
Mesoleius insolens Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 87, ♂.
Mesoleius insolens Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 80.
Mesoleius (Lagarotus) insolens Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1881 n. 17, ♀ ♂.
var. **evolans** (Grav.) Thoms. — ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Tryphon evolans Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 692, ♂.
Tryphon evolans Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 277 n. 182, ♂.
Tryphon evolens Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 259 n. 80, ♂.
Mesoleius insolens var. 2 Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 167 [n. 88, ♂.
Mesoleius insolens var. 2 Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 44, ♂.
Mesoleius (Lagarotus) insolens var. evolens Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1881, ♂.
var. **petulans** (Grav.) Thoms. — ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Gallia.
Tryphon petulans Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 275 n. 180, ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Tenthredo spec. (Brischke.

Tryphon petulans Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 259 n. 79.
Tryphon petulans Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 228 n. 22, ♂.
Mesoleius insolens Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 167 n. 88, ♂.
Mesoleius insolens Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 44, ♂.
Mesoleius (Lagarotus) insolens var. petulans Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1881, ♂.

pubescens (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Belgia.
Mesoleius pubescens Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 166 [n. 85, ♀.
Mesoleius pubescens Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 44 n. 111, ♀ ♂.
Mesoleius pubescens Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 82.
Mesoleius (Lagarotus) pubescens Holmgren, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1883 n. 20, ♀ ♂.

rapinator (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Tryphon rapinator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 133 n. 79, ♀ ♂.
Mesoleius semicaligatus var. 1 Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) [p. 167 n. 87, ♀ ♂.
Mesoleius semicaligatus var. 1 Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 43 [n. 109, ♀ ♂.
Mesoleius rapinator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 61, ♀ ♂.
Mesoleius (Lagarotus) semicaligatus var. rapinator Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1893 p. 1882.

semicaligatus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon semicaligatus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 362 n. 109, ♂.
Tryphon semicaligatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 271 n. 178, ♂.
Tryphon semicaligatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 258 n. 76.
Mesoleius semicaligatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 167 [n. 87, ♀ ♂.
Mesoleius semicaligatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 82, ♀ ♂.
Mesoleius semicaligatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 43 [n. 109, ♀ ♂.
Mesoleius semicaligatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 86, ♂.
Mesoleius semicaligatus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 80.
Mesoleius (Lagarotus) semicaligatus Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1881 n. 18, ♀ ♂.

EPACHTHES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 205 n. 43.
ἐπαχθής, gravis.

Synon.: Epachtus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1999.
Euryproctus Thomson.
Ichneumon Gmelin.
Mesoleius Holmgren.
Syndipnus Thomson.
Trematopygus Holmgren, Brischke, Jacobs & Tosquinet.
Tryphon Gravenhorst, Stephens, Fonscolombe.

basilicus Davis — ♀ ♂ — Am.: Montana, Colorado, Oregon, California.
Epachtes basilicus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 283, ♀ ♂.

erythropalpus (Gmel.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 63 n. 235.
Ichneumon erythropalpus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2702 n. 297.
Tryphon erythropalpus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 290 n. 193, ♂.
Tryphon erythropalpus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 259 n. 81, ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Dolerus gonager (Brischke).

Tryphon erythropalpus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 230 n. 25, ♂.
Trematopygus erythropalpus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) [n. 183 n. 12, ♀ ♂.
Trematopygus erythropalpus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 87, ♀.
Trematopygus erythropalpus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 [p. 91, ♀ ♂.
Euryproctus (Syndipnus) erythropalpus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 927 n. 6.
Trematopygus erythropalpus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. [1890 p. 87.
Syndipnus (Epachtus) erythropalpus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1999 n. 1.

tenellus (Holmgr.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius tenellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 168 n. 90, ♀.
Mesoleius tenellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 43 n. 107, ♀.
Euryproctus (Syndipnus) tenellus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 927 n. 7.
Syndipnus (Epachtus) tenellus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1999 n. 2.

LAEPSERUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 205 n. 42.
λαιψηρός, admodum coler.
Species exstat.

APIMELES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 205 n. 41.
ἀ-πιμελής, pinguis.

lusorius Davis — ♀ — Am.: Canada.
Apimeles lusorius Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 283, ♀.

ALCOCHERA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 205 n. 40.
ἀλκή, alces; χείρ, manus.
Species exstat.

ZAPLETHIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 205 n. 39.
ζα-, valde; πλέθω, plenus sum.
Species exstat.

PERISPUDA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 205 n. 38.
περί, circum; σπουδαῖος, serius.

Synon.: Perispudus Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1873 n. 2.
Ichneumon Gravenhorst.
Mesoleius Thomson, Jacobs & Tosquinet.
Mesoleptus Gravenhorst, Stephens, Fonscolombe.

facialis (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia.
Mesoleptus facialis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 12 n. 4, ♂.
Mesoleptus facialis Capron, Entomologist XVII. 1884 p. 46.

Mesoleius facialis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1261 n. 2, ♀ ♂.
Mesoleius facialis Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 70, ♀ ♂.
Perispuda facialis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 42 n. 3, ♀ ♂.
Mesoleius (Perispudus) facialis Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1893 p. 1873 n. 3, ♀ ♂.

flavitarsis Thoms. — ♂ — Eur.: Gallia.
Mesoleius (Perispudus) flavitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2023 n. 3, ♂.

mesoxantha Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Mesoleius (Perispudus) mesoxanthus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2022 n. 1, ♀.

sulphurata (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Gallia.
Ichneumon sulphuratus Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 258 n. 3741.
Ichneumon sulphuratus Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 285.
Mesoleptus sulphuratus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 685.
Mesoleptus sulphuratus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 81 n. 47, ♀ ♂.
Mesoleptus sulphuratus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 225 n. 39.
Mesoleptus sulphuratus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 115 n. 5, ♂.
Mesoleius (Perispudus) sulphuratus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2022 n. 2, ♀ ♂.

ZACALLES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 204 n. 37.
Etymol. obscura.

magnus Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Zacalles magnus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 283, ♀.

NEALES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 204 n. 36.
νεαλής, iuvenis.
Species exstat.

ISODIAETA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 204 n. 35.
ἴσος, aequalis; *δίαιτα*, vitae ratio.
Species exstat.

NARCOPOEA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 204 n. 34.
νάρκωσις, pellis lanata; *ποιέω*, facio.
Species exstat.

POLYRHYSIA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 204 n. 33.
πολύς, multum; *ῥύσιος*, liberans.

Synon.: Polyrhysius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1999.
Euryproctus Thomson.
Syndipnus Thomson.
Tryphon Gravenhorst, Holmgren.

anterior Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Syndipnus (Polyrhysius) anterior Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1999 n. 4, ♀ ♂.

tenuicornis (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Tryphon tenuicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 228 n. 150, ♂.
Tryphon tenuicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 78 n. 7, ♂.
Tryphon tenuicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 192 n. 19,
Euryproctus (Syndipnus) tenuicornis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 927 n. 8. [♀ ♂.
Syndipnus (Polyrhysius) tenuicornis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1999 n. 3.

TRYPHONOPSIS

Brauns, Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklenburg LI. 1898 p. 62.
Tryphon, nom. propr. Hymen.; ὄψ, visus.

ensator Brauns — ♀ — Eur.: Germania.
Tryphonopsis ensator Brauns, Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklenburg LI. 1898 p. 63, ♀.

TRYPHON

Fallen, Specim. nov. Hymen. disp. method. 1813 p. 16 n. 15.
τρυφή, asperitas.

Synon.: Cyrtocentrus Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 6.
κυρτός, curvus; κέντρον, aculeus.
Bassus Fabricius, Zetterstedt.
Erromenus Provancher.
Ichneumon Linné & auct.
Mesoleptus Gravenhorst.
Monoblastus Hartig.
Pyracmon Provancher.

aemulus Ruthe — ♂ — Eur.: Islandia.
Tryphon aemulus Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 374 n. 58, ♂.
affinis Cress. — ♀ — Am.: Pennsylvania, New Jersey.
Tryphon affinis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 277 n. 8, ♀.
albicinctus Grav. — ♂ — Eur.: Britannia, Gallia.
Ichneumon albicinctus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 375 n. 128 ♂.
Tryphon albocinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 204 n. 132, ♂.
Tryphon albocinctus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 245 n. 40, ♂.
Tryphon albocinctus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 223 n. 14, ♂.
alpinus Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Tryphon alpinus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 389 n. 24, ♂.
ambiguus Ratzbg.[1] — Eur.: Germania.
Tryphon ambiguus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 122 n. 13.
angustator Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Tryphon angustator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 385 n. 9, ♂.
annulatus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Pyracmon annulatum Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 182 n. 2, ♀.
Pyracmon annulatum Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 374 n. 2, ♀.
Tryphon? annulatus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 188.
annulicornis (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Polyblastus annulicornis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 108 n. 7, ♀.
Tryphon annulicornis Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 189.
auricularis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Tryphon auricularis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 897 n. 8, ♀ ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Nematus ribesii (Ratzeburg).

axillaris Steph. — Eur.: Britannia.
Tryphon axillaris Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 256 n. 70.
basalis Steph. — ♀ — Eur.: Britannia.
Tryphon basalis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 255 n. 69.
bedardii (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Erromenus Bedardi Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 266 n. 2, ♀.
Erromenus Bedardi Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 424 n. 2, ♀.
Tryphon Bedardi Davis, Proc. Acad. Nat. Hist. Philadelphia 1894 p. 190.
bicornutus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Tryphon bicornutus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 76 n. 4, ♀ ♂.
Tryphon bicornutus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 188 [n. 7, ♀ ♂.
Tryphon bicornutus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 92, ♀ ♂.
Tryphon bicornutus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 896 n. 4.
Tryphon bicornutus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 91.
bidentatus Steph. — Eur.: Britannia.
Tryphon bidentatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 253 n. 62.
bidentulus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Tryphon bidentulus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 897 n. 9, ♀ ♂.
bilineolatus Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Tryphon bilineolatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII. 1897 p. 189, ♂.
bimaculatus Desv. — Eur.: Britannia.
Tryphon bimaculatus Desvignes, Catal Brit. Ichneum. 1856 p. 43 n. 60.
bipunctatus (Grav.) Ratzbg.[1] — ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleptus bipunctatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 54 n. 32.
Tryphon bipunctatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 122 n. 12.
bisculptus Grav. — ♂ — Eur.: Britannia.
Tryphon bisculptus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 251 n. 163, ♂.
Tryphon bisculptus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 252 n. 59.
braccatus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Italia.
Ichneumon braccatus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino 1820 p. 381 n. 134.
Tryphon braccatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 304 n. 204.
Tryphon braccatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 187 n. 6, ♀ ♂.
Tryphon braccatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1855 P. 5. (Tryph.) p. 383.
Tryphon braccatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 88, ♂.
Tryphon braccatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 92, ♂.
brachyacanthus (Gmel.) Grav.[2] — ♀ ♂ — — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 63 n. 247 & p. 65 n. 272.
Ichneumon testaceus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2702 n. 303.
Ichneumon brachyacanthus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2705 n. 325.
Tryphon brachyacanthus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 242 n. 157, ♀ ♂.
Tryphon brachyacanthus Gravenhorst, Beitr. z. Entom. Schles. I. 1829 p. 11 n. 5, ♀ ♂; T. 1 F. 7.
Tryphon brachyacanthus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 250 n. 52, ♀ ♂.
Tryphon brachyacanthus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 388 n. 21, ♀.
Tryphon brachyacanthus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 186 [n. 2, ♀ ♂.
Tryphon brachyacanthus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 87, ♀ ♂.
Tryphon brachyacanthus Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 35; T. 22 F. 2.

---

1) *Hymen.:* Nematus ribesii (Ratzeburg).
2) *Hymen.:* Athalia spinarum (Brischke).

Tryphon brachyacanthus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 92, ♀ ♂.
Tryphon brachyacanthus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 896 n. 2.

breviusculus Fonsc. — Eur.: Gallia.
Tryphon breviusculus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 117 n. 3.

brunneiventris Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Tryphon brunniventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 281 n. 187, ♀ ♂.
Tryphon brunniventris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 76 n. 2, ♀ ♂.
Tryphon brunniventris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 190 [n. 4, ♀ ♂; T. 8 F. 11.
Tryphon brunniventris Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 88, ♀ ♂.
Tryphon brunniventris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 93, ♀ ♂.
Tryphon brunniventris Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 899 n. 18, ♀ ♂ [excl. synon.].

burgessii Cress. — ♂ — Am.: Massachusetts.
Tryphon Burgessi Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 105, ♂.

calceolatus Grav. — ♂ — Eur.: Britannia.
Tryphon calceolatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 286 n. 190, ♂.

ceratophorus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Belgia.
Tryphon ceratophorus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1256 n. 2, ♀ ♂.
Tryphon ceratophorus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 88.

cerberus Dew. — ♂ — Am.: Portorico.
Tryphon Cerberus Dewitz, Berlin. entom. Zeitschr. XXV. 1881 p. 207, ♂; T. 5 F. 11.

chicoutimiensis (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Mesoleius Chicoutimiensis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 368 n. 9, ♀.
Tryphon Chicoutimiensis Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 189.

chrysopus (Gmel.) Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 63 n. 234 & 238.
Ichneumon chrysopus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2702 n. 296.
Tryphon chrysopus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 302 n. 203, ♂.

cinctus Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Tryphon cinctus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 16, ♂.

clapinii Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Tryphon Clapini Provancher, Natural. Canad. VIII. 1876 p. 327.
Tryphon Clapini Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 256 n. 10, ♀.
Tryphon Clapini Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 414 n. 10, ♀.

claviventris Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Tryphon ? claviventris Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 17, ♂.

clypeator Grav. — ♂ — Eur.: Britannia.
Ichneumon clypeator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 372 n. 122, ♂.
Tryphon clypeator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 131 n. 77, ♂.
Tryphon clypeator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 233 n. 5, ♂.

collaris Grav. — ♀ — Eur.: Gallia.
Tryphon collaris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 278 n. 184, ♀.
Tryphon collaris Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 229 n. 23, ♀.

communis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Tryphon communis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 103, ♀ ♂.
Tryphon communis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 255 n. 8, ♀ ♂.
Tryphon Dionnei Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 256 n. 9, ♀.
Tryphon communis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 413 n. 8, ♀ ♂.
Tryphon Dionnei Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 414 n. 9, ♀.
Tryphon communis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 282, ♀ ♂.

var. **atripes** Davis — ♀ ♂ — Am.: United States.
Tryphon communis var. atripes Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 282, ♀♂.
var. **clypeatus** Prov. — ♂ — Am.: Canada, United States.
Tryphon clypeatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 309.
Tryphon clypeatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 254 n. 4, ♂.
Tryphon clypeatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 412 n. 4, ♂.
Tryphon communis var. clypeatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 283, ♂.
compressus Ratzbg.[1]) — Eur.: Germania.
Tryphon compressus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 122 n. 11.
compunctor Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Belgia, Gallia.
Tryphon compunctor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 130 n. 76, ♀♂ [non Linné].
Tryphon compunctor Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 232 n. 4.
Tryphon compunctor Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 216 n. 2, ♂.
Tryphon compunctor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 79 n. 10, ♀♂.
Tryphon compunctor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 192 [n. 20, ♀♂.
Tryphon compunctor Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 894 n. 12.
Tryphon compunctor Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 93.
confinis Holmgr. — ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Tryphon confinis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 77 n. 5, ♂.
Tryphon confinis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 191 n. 17, ♂.
Tryphon confinis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 88, ♂.
consobrinus Holmgr.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Tryphon rutilator var. 5 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 310. [♀♂.
Tryphon consobrinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 188 n. 8,
Tryphon consobrinus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 88, ♀♂.
Tryphon consobrinus Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 35; T. 22 F. 6.
Tryphon consobrinus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 92, ♀♂.
Tryphon consobrinus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 898 n. 14, ♀ ♂.
Tryphon consobrinus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 91.
croceiventris Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Tryphon croceiventris Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 36 n. 1, ♂.
debilis Fonsc. — Eur.: Gallia.
Tryphon debilis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 226 n. 20.
delicatulus Fonsc. — Eur.: Gallia.
Tryphon delicatulus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 227 n. 21.
deliciosus Ratzbg. — Eur.: Germania.
Tryphon deliciosus Ratzeburg, Stettin. entom. Zeitg. VIII. 1847 p. 60 n. 13.
dorsalis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Tryphon dorsalis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 253 n. 3, ♀.
Tryphon dorsalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 411 n. 3, ♀.
elongator (Fabr.) Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon LXXII Schaeffer, Icon. insect. Ratisbon. II. 2. 1769; T. 168 F. 8.
Ichneumon elongator Fabricius, System. entom. 1775 p. 337 n. 55.
Ichneumon elongator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 431 n. 68.
Ichneumon elongator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 266 n. 81.
Ichneumon elongator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 175 n. 122.
Ichneumon elongator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2692 n. 145.
Ichneumon elongator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 361.

---

1) *Hymen.:* Nematus ribesii (Ratzeburg).
2) *Hymen.:* Dolerus spec. (Brischke).

Ichneumon elongator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 187 n. 119.
Ichneumon elongator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 165 n. 130.
Ichneumon elongator Schrank, Faun. Boica II. 1802 p. 282 n. 2088.
Ichneumon elongator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 67 n. 72.
Ichneumon elongator Latreille, Hist. nat. Crust. Insect. XIII. 1805 p. 185 n. 22.
Ichneumon elongator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110, ♂.
Ichneumon elongator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IV. 1818 p. 285.
Ichneumon elongator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 376 n. 128, ♂.
Ichneumon elongator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 267.
Ichneumon elongator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 328.
Ichneumon elongator Trentepol, Isis 1826 p. 224 n. 41.
Tryphon elongator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 689.
Tryphon elongator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 238 n. 155, ♀ ♂.
Tryphon elongator Gravenhorst, Beitr. z. Entom. Schles. I. 1829 p. 8 n. 4, ♀♂; T. 1 F. 6.
Tryphon elongator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 249 n. 50, ♀ ♂.
Monoblastus elongator Hartig, Arch. f. Naturg. III. P. 1. 1837 p. 155.
Tryphon elongator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 388 n. 22, ♀ ♂.
Tryphon elongator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 185 n. 1, [♀♂.
Tryphon elongator Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 35; T. 22 F. 1.
Tryphon elongator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 92, ♀♂.
Tryphon elongator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 896 n. 1.
Tryphon elongator Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1256 n. 1.
Tryphon elongator Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 88.

ephippium Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Tryphon ephippium Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 190 n. 13, [♀♂.
Tryphon ephippium Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 35; T. 22 F. 9.
Tryphon ephippium Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 896 n. 3.

eques Htg.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Tryphon eques Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 272 n. 10, ♀ ♂.
Tryphon eques Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 126 n. 2, ♀ ♂.
Tryphon eques Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 122 n. 15.

erythrogaster Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Tryphon erythrogaster Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 897 n. 11, ♀ ♂.

eupitheciae Boie[3] — Eur.: Germania.
Tryphon eupitheciae Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 92 n. 19.

excavatus Ratzbg.[4] — ♀ — Eur.: Germania.
Tryphon excavatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 129 n. 52, ♀.

exclamationis Grav. — ♀ ♂ — Eur.
Tryphon exclamationis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 279 n. 185, ♀ ♂.

exiguus Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Tryphon ? exiguus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 16, ♀.

expers Ratzbg.[5] — Eur.: Germania.
Tryphon expers Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 113 n. 7.

flavescens Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Tryphon scotopterus var. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 244 n. 158, ♂.
Tryphon flavescens Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 226 n. 19.

---

1) *Hymen.:* Selandria melanocephala (Giraud).
2) *Hymen.:* Lophyrus rufus (Hartig).
3) *Lep.:* Eupithecia minutata (Boie).
4) *Hymen.:* Eriocampa limacina (Ratzeburg).
5) *Hymen.:* Nematus laricis (Hartig).

flavicinctus (Gmel.) Grav. — ♀ ♂ — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 62 n. 230.
Ichneumon flavicinctus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2701 n. 292.
Tryphon flavocinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 154 n. 99, ♀.
Mesoleius flavocinctus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 70 n. 5, ♀♂.
flavifrons Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Tryphon flavifrons Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 399 n. 28, ♂.
flavilabris Steph. — Eur.: Britannia.
Tryphon flavilabris Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 232 n. 3.
flavipes Grav. — ♂ — Eur.: Britannia.
Tryphon flavipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 241 n. 156, ♂.
Tryphon flavipes Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 250 n. 51.
flavoguttatus Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Tryphon flavoguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 136 n. 82, ♀.
flavomaculatus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Tryphon flavomaculatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 252 n. 164, ♀ ♂.
Tryphon flavomaculatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 253 n. 63.
frontalis Zett. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Bassus (Tryphon) frontalis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 381 n. 19, ♀.
fulvescens Fonsc. — Eur.: Gallia.
Tryphon fulvescens Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 229 n. 24.
fulvilabris Grav. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Tryphon fulvilabris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 292 n. 194, ♀.
Tryphon fulvilabris Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 260 n. 82.
fulviventris Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 15, ♀♂.
Tryphon fulviventris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 191
Tryphon fulviventris Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 88, ♀.
Tryphon fulviventris Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 35; T. 22 F. 8.
Tryphon fulviventris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 93, ♀.
gaspesianus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Tryphon Gaspesianus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 252 n. 1, ♀.
Tryphon Gaspesianus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 410 n. 1, ♀.
Polyblastus Gaspesianus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 107 n. 5.
Tryphon Gaspesianus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 490.
grossus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Tryphon grossus Bsischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 38, ♀.
haematopus Ruthe — ♀ — Eur.: Islandia.
Tryphon haematopus Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 374 n. 59, ♀.
heliophilus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Tryphon heliophilus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 284 n. 188, ♀ ♂.
Tryphon heliophilus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 76 n. 3, ♂.
Tryphon heliophilus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 194 n. 16,
Tryphon heliophilus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 899 n. 19, ♀ ♂. [♀ ♂.
hervieuxii Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Tryphon Hervieuxi Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 254 n. 6, ♀.
Tryphon Hervieuxi Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 412 n. 6, ♀.
holosericeus Ratzbg.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Tryphon holosericeus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 115 n. 17, ♀ ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Nematus virescens (Ratzeburg).

humeralis Grav.! — ♂ — Eur.
Tryphon humeralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 323 n. 209, ♂.

humeralis Zett.! — ♂ — Eur.: Lapponia.
Tryphon humeralis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 384 n. 6, ♂.

humilis Grav. — ♀ — Eur.: Italia.
Tryphon humilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 293 n. 195, ♀.

immaturus Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Tryphon immaturus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 200 n. 128, ♂.

incertus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Tryphon incertus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 88, ♀.
Tryphon incertus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 93, ♀.

incestus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Tryphon rutilator var. 8 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 311, ♀ ♂. [♀♂.
Tryphon incestus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 188 n. 9,
Tryphon incestus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 383.
Tryphon incestus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 88, ♀ ♂.
Tryphon incestus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 92, ♀.
Tryphon incestus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 898 n. 15, ♀ ♂.
Tryphon incestus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 91.

incisus Grav. — ♀ — Eur.: Tauria.
Tryphon incisus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 197 n. 127, ♀.

instabilis Ruthe — ♀ — Eur.: Islandia.
Tryphon instabilis Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 375 n. 60, ♀.

integrator (Müll.) Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania, Dania.
Ichneumon integrator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 157 n. 1824.
Tryphon integrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 143 n. 90, ♀ ♂.
Tryphon integrator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 234 n. 10, ♂.
Tryphon integrator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 123 n. 22, ♂.

intermedius Grav.[2]) — ♀ — Eur.: Germania, Austria.
Tryphon intermedius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 216 n. 142, ♀.

involutor Grav.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Tryphon involutor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 296 n. 198, ♀ ♂.
Tryphon involutor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 114 n. 14, ♀ ♂.

iratus Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Tryphon iratus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 287 n. 191, ♂.

largus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Mesoleptus largus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 98 n. 35, ♀.
Tryphon largus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 189.

latigaster (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Mesostenus latigaster Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 77 n. 10, ♀.
Tryphon latigaster Davis, Canad. Entomol. XXVII. 1895 p. 288.

leucodactylus Ratzbg.[4]) — Eur.: Germania.
Tryphon leucodactylus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 114 n. 11.

---

1) *Lep.:* Coccyx resinana (Ratzeburg).
2) *Hymen.:* Lophyrus pini (Rondani).
3) *Hymen.:* Lyda silvatica (Ratzeburg).
4) *Hymen.:* Nematus gallicola (Ratzeburg).

leucostictus Ratzbg.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Tryphon leucostictus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 127 n. 7, ♂.
Tryphon leucostictus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 125 n. 34, ♀.
levis Ratzbg.[2]) — ♀ — Eur.: Germania.
Tryphon laevis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 116 n. 25, ♀.
lineola Steph. — Eur.: Britannia.
Tryphon lineola Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 255 n. 68.
lineolatus Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Tryphon lineolatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 318 n. 1, ♀.
longipes Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Tryphon longipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 319 n. 206, ♂.
Tryphon bicolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 326 n. 212, ♀.
Tryphon bicolor Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 264 n. 94.
Tryphon bicolor Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 233 n. 30, ♀.
Tryphon ? bicolor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 33, ♀.
luteicornis Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Tryphon luteicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 276 n. 181, ♀.
lutorius Smith — ♀ — As.: Celebes.
Tryphon lutorius Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 60 n. 1, ♀.
maculatus Grav. — ♂ — Eur.: Italia.
Tryphon maculatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 140 n. 87, ♂.
maculicollis Steph. — Eur.: Britannia.
Tryphon maculicollis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 234.
maculipennis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Tryphon maculipennis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 392 n. 3, ♀ ♂.
maculosus Steph. — Eur.: Britannia.
Tryphon maculosus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 234 n. 9.
melanonotus Grav. — ♀ — Eur.: Italia.
Tryphon melanonotus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 269 n. 176, ♀.
mesochoroides Ratzbg.[3]) — ♀ — Eur.: Germania.
Tryphon mesochoroides Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 123 n. 26, ♀.
mesoxanthus Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Tryphon mesoxanthus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 319 n. 2, ♀.
mexicanus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Tryphon Mexicanus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 391 n. 1, ♂.
mitigosus Grav. — ♀ — Eur.
Tryphon mitigosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 689, ♀.
Tryphon mitigosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 258 n. 168, ♀.
Tryphon subfasciatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 251 n. 55.
Tryphon mitigosus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 254 n. 65.
montezuma Cam. — ♂ — Am.: Mexico. [F. 2.
Tryphon Montezuma Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 286 n. 2, ♂; T. 12
murinus Grav. — ♂ — Eur.: Gallia.
Tryphon murinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 125 n. 72, ♂.
Tryphon murinus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 216 n. 1, ♂.

---

1) *Hymen.:* Lophyrus virens, L. pini, L. variegatus (Ratzeburg).
2) *Hymen.:* Lophyrus hercyniae, L. pini, L. frutetorum, Lyda arvensis (Ratzeburg).
3) *Hymen.:* Nematus laricis (Ratzeburg).

mutilatus Ratzbg.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Tryphon mutilatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 112 n. 6, ♀ ♂.
nasutus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Tryphon nasutus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 264 n. 172, ♀ ♂.
Tryphon nasutus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 256 n. 71.
nemati Ratzbg.[2]) — ♀ — Eur.: Germania.
Tryphon nemati Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 125 n. 31, ♀.
nigrinus Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Tryphon nigrinus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 88, ♀ ♂.
Tryphon nigrinus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 93, ♀.
nigripes Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Tryphon rutilator var. 11 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 313, ♂.
Tryphon nigripes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 189 n. 10, ♀.
Tryphon nigripes Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 898 n. 16, ♀ ♂.
Tryphon nigripes Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 91.
nigritarsus Grav. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Tryphon nigritarsus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 158 n. 101, ♀.
Tryphon nigritarsus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 237 n. 18, ♀.
nigrolineatus Grav. — ♀ — Eur.: Britannia.
Tryphon nigrolineatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 203 n. 131, ♀.
niger Davis — ♂ — Am.: Michigan.
Tryphon nigrum Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 281, ♂.
nitidus Grav. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Tryphon nitidus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 134 n. 80, ♂.
Tryphon nitidus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 233 n. 8.
obscurus Steph. — Eur.: Britannia.
Tryphon obscurus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 253 n. 61.
obstructor Smith — Austr.: New Zealand.
Tryphon obstructor Smith, Trans. Entom. Soc. London 1878 p. 4.
Tryphon obstructor Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 127.
perfidus Woldst. — ♀ — Eur.: Fennia.
Tryphon perfidus Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur & Folk XXI. 1872 p. 47 n. 12, ♀.
petiolator Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Bassus (Tryphon) petiolator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 380 n. 14, ♂.
pilosus Brischke — ♀ — Eur.: Germania. [p. 39, ♀.
Tryphon (Rhimphalia ?) pilosa Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892
pleuralis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Tryphon pleuralis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 897 n. 10, ♀ ♂.
pubescens Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Bassus (Tryphon) pubescens Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 380 n. 13, ♂.
pusillus Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Tryphon pusillus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 385 n. 10, ♂.
pyriformis Ratzbg.[3]) — ♀ — Eur.: Germania.
Tryphon pyriformis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 124 n. 29, ♀.
quebecensis (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Cyrtocentrus Quebecensis Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 6, ♀.

---

1) *Hymen.*: Nematus laricis (Ratzeburg).
2) *Hymen.*: Nematus betulae (Ratzeburg).
3) *Hymen.*: Lyda stramineipes (Ratzeburg).

Cyrtocentrus Quebecensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 794, ♀.
Tryphon Quebecensis Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 188.

ratzeburgii Gorski [1]) — ♀ ♂ — Eur.
Tryphon Ratzeburgii Gorski, Anal. ad entomogr. 1852 p. 200, ♀ ♂; T. 3 F. 3.
Tryphon Ratzeburgii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 113 n. 24, ♀ ♂.

rennenkampfii Ratzbg. [2]) — ♀ — Eur.: Germania.
Tryphon Rennenkampfii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 126 n. 41, ♀.

rhodocerae Rond. [3]) — Eur.: Italia.
Tryphon rhodocerae Rondani, Bull. soc. entom. Ital. IX. 1877 p. 202 n. 78.

ridibundus Grav. — Eur.: Britannia, Germania.
Tryphon ridibundus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 188 n. 123.

rubiginosus Grav. — ♂ — Eur.: Italia.
Tryphon rubiginosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 145 n. 92, ♂.

rufipes Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Tryphon rufipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 148 n. 95, ♀.

rufithoracicus Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Tryphon ? rufithoracicus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 107, ♂.

rufonotatus Fonsc. — Eur.: Gallia.
Tryphon rufonotatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 218 n. 4.

rufopectus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Tryphon rufopectus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 367 n. 15, ♂.

rugicollis Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Tryphon rugicollis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 388 n. 20, ♂.

rugosus Ratzbg. [4]) — ♂ — Eur.: Germania.
Tryphon rugosus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 129 n. 53, ♂.

rutilator (L.) Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon rutilator Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 403 n. 1607.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. insect. II. 1762 p. 357 n. 82.
Ichneumon rutilator Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 934 n. 30.
Ichneumon rutilator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 336 n. 50.
Ichneumon rutilator Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 851 n. 30.
Ichneumon rutilator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 430 n. 61.
Ichneumon rutilator Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 367 n. 742, ♂.
Ichneumon impraegnator Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 368 n. 743, ♂.
Ichneumon cepae Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 421 n. 83.
Ichneumon rutilator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 265 n. 73.
Ichneumon rutilator Razoumowsky, Hist. nat. Jorat. I. 1789 p. 215 n. 247.
Ichneumon rutilator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 166 n. 96.
Ichneumon impraegnator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 183 n. 148.
Ichneumon caepae Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 192 n. 185.
Ichneumon rutilator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2690 n. 30.
Ichneumon impraegnator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2697 n. 173.
Ichneumon rutillator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 49 n. 780.
Ichneumon rutilator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 366.
Ichneumon rutilator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 185 n. 111.

---

1) *Hymen.:* Tenthredo adumbrata (Gorski).
2) *Hymen.:* Lophyrus pini (Ratzeburg).
3) *Lep.:* Rhodocera rhamni (Rondani).
4) *Hymen.:* Lophyris pini, L. frutetorum (Ratzeburg).

Ichneumon cepae Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 212 n. 28.
Ichneumon impraegnator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 222 n. 95.
Ichneumon rutilator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 161 n. 116.
Ichneumon rutilator Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 285 n. 2093.
Ichneumon anodon Schrank, Fauna Bocia II. 2. 1802 p. 287 n. 2095.
Ichneumon rutilator Schrökenstein, Verz. d. Halbkäfer etc. 1802 p. 26 n. 78.
Ichneumon rutilator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 59 n. 52.
Ichneumon cepae Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 68 n. 93.
Ichneumon rutilator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 66 n. 67.
Ichneumon insultator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 259 n. 3744.
Ichneumon rutilator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 262 n. 3755-56.
Ichneumon rutilator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 73 n. 780.
Ichneumon rutilator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 112, ♂.
Ichneumon rutilator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 285.
Ichneumon insultator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 285.
Ichneumon rutilator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 381 n. 135, ♀ ♂.
Ichneumon rutilator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 264.
Ichneumon rutilator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 317.
Ichneumon rutilator Trentepol, Isis 1826 p. 225 n. 42.
Tryphon rutilator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 692.
Tryphon rutilator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 305 n. 205, ♀ ♂ [excl. varr.].
Tryphon rutilator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 262 n. 88, ♀ ♂.
Tryphon quadratus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 262 n. 89.
Tryphon atriceps Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 262 n. 90.
Monoblastus rutilator Hartig, Arch. f. Naturg. III. 1. 1837 p. 155.
Tryphon rutilator Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 57.
Tryphon rutilator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 232 n. 28, ♀ ♂.
Tryphon rutilator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 78 n. 9, ♀ ♂.
Tryphon rutilator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 186 n. 3, ♀ ♂.
Tryphon rutilator Kolenati, Jahresh. naturw. Sect. mähr.-schles. Ges. f. Ackerbau etc. 1858 [p. 47 n. 18.
Tryphon rutilator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 87, ♀ ♂; var. 1.
Tryphon rutilator Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 35; T. 22 F. 3. [2, ♂.
Tryphon rutilator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 92, ♀ ♂.
Tryphon rutilator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 896 n. 5.
Tryphon rutilator Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 89.
Mesoleptus rutilator Magretti, Ann. mus. civ. Genova XXIX. 1890 p. 530 n. 16, ♀.

scapularis Steph. — Eur.: Britannia.
Tryphon scapularis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 267 n. 75.

schmiedeknechtii Brauns — ♀ ♂ — Eur.
Tryphon Schmiedeknechti Brauns, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. P. 1. 1888 p. 4, ♀ ♂.

scutellaris Cress. — ♀ — Am.: Connecticut.
Tryphon scutellaris Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 104, ♀.

segmentarius (Fabr.) Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon segmentarius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 262 n. 27.
Ichneumon segmentarius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 152 n. 52.
Ichneumon segmentarius Gmélin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2681 n. 97.
Ichneumon segmentarius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 172 n. 41.
Ichneumon segmentarius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 149 n. 63.
Bassus segmentarius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 97 n. 13.
Ichneumon segmentarius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110, ♂.

Ichneumon segmentarius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277.
Ichneumon segmentarius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 353.
Tryphon segmentarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 209 n. 136, ♀ ♂.
Tryphon segmentarius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 246 n. 42.

seminiger Cress. — ♀ ♂ — Am.: United States.
Tryphon seminiger Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 278 n. 9, ♀.
Tryphon seminiger Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 255 n. 4, ♀ ♂.
Tryphon seminiger Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 413 n. 7, ♀ ♂.
Tryphon pediculatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 102 n. 11, ♂.
Metopius terminalis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 438, ♂.
Tryphon seminiger Davis, Trans. Amer Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 282, ♀ ♂.

senilis Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Bassus (Tryphon) senilis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 381 n. 18, ♂.

septentrionalis Ratzbg.[1] — ♀ — Eur.: Germania.
Tryphon melancholicus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 113 n. 8.
Tryphon septentrionalis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 121 n. 9, ♀.

sexpunctatus Grav. — ♀ — Eur.
Tryphon sexpunctatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 278 n. 183, ♀.

signator Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Tryphon signator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 301 n. 202, ♀ ♂.
Tryphon signator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 261 n. 87.
Tryphon facialis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 263 n. 91.
Tryphon signator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 189 n. 11, ♀ ♂.
Tryphon signator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 384.
Tryphon signator Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 35; T. 22 F. 7.
Tryphon signator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 898 n. 13.

stigmaticus Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Bassus (Tryphon) stigmaticus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 381 n. 21, ♂.

subspinosus Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Tryphon subspinosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 262 n. 170, ♂.

subsulcatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Tryphon subsulcatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 189 [n. 12, ♀ ♂.
Tryphon subsulcatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 898 n. 17, ♀ ♂.
Tryphon subsulcatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VI. P. 4. 1887 p. 87, ♀.
Tryphon subsulcatus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 94.

translucens Ratzebg.[2] — ♀ — Eur.: Germania.
Tryphon translucens Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 128 n. 49, ♀.

tricolor Grav. — ♂ — Eur.: Britannia.
Tryphon tricolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 207 n. 134, ♂.
Tryphon tricolor Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 246 n. 41.

trisculptus Steph. — Eur.: Britannia.
Tryphon trisculptus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 252 n. 60.

trochanteratus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Tryphon rutilator var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 308.
Tryphon trochanteratus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 187 [n. 5, ♀ ♂.
Tryphon trochanteratus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 88, ♀ ♂ var.
Tryphon trochanteratus Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 35; T. 22 F. 5.

---

[1] *Hymen.:* Croesus septentrionalis (Ratzeburg).
[2] *Hymen.:* Eriocampa limacina, Nematus aethiops (Ratzeburg, Rondani).

Tryphon trochanteratus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 n. 92, ♀ ♂.
Tryphon trochanteratus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 896 n. 6.
tuberculifer Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Tryphon tuberculifer Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 103 n. 13, ♀.
ustulatus Desv. — Eur.: Britannia.
Tryphon ustulatus Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 38 n. 13.
utilis Tischb.[1] — ♂ — Eur.
Tryphon utilis Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XIV. 1853 p. 348, ♂.
variabilis Ratzbg. — Eur.: Germania.
Tryphon variabilis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 127 n. 6.
Tryphon variabilis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 116 n. 20; T. 1 F. 8.
variifrons Cress. — ♂ — Am.: Connecticut, Massachusetts.
Tryphon varifrons Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 104, ♂.
virginiensis (Ashm.) Davis — ♀ — Am.: Virginia.
Bassus Virginiensis Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XII. 1890 p. 440, ♀.
Tryphon Virginiensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 30.
vulgaris Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia.
Tryphon rutilator var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 309, ♀ ♂.
Tryphon vulgaris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 186 n. 4, ♀ ♂.
Tryphon vulgaris Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 87, ♀ ♂; var. 1-3.
Tryphon vulgaris Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 35; T. 22 F. 4.
Tryphon vulgaris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 92, ♀ ♂.
Tryphon vulgaris Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 896 n. 7, ♀ ♂.
Tryphon vulgaris Chyzer, Rovart. Lapok. III. 1886 p. 44.
Tryphon vulgaris Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 90.
zonatus Steph. — Eur.: Britannia.
Tryphon zonatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 258 n. 78.

LABIUM

Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 316.
λάβιον, ansa.

bicolor Brullé — ♂ — Am.: New Guinea.
Labium bicolor Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 316 n. 1, ♂.

NELEGES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 204 n. 31.
νηλεγής, negligens.
Species exstat.

SYMBOETHUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 204 n. 30.
συμβοηθός, auxiliaris.
Species exstat.

OTITOCHILUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 203 n. 29.
ὠτῖτις, auriculus; χεῖλος, labium.
Species exstat.

---

1) *Hymen.:* Nematus Wesmaeli (Tischbein).

QUADRIGANA

Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 265 & 280.
quattuor.

Synon.: Tryphon Cresson.

americana (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Tryphon Americanus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 276 n. 7, ♂.
Tryphon Americanus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 102 n. 11, ♀ ♂.
Quadrigana Americana Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 280, ♀ ♂.

PSILOSAGE

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 203 n. 28.
ψιλός, nudus; *σάγη*, tegmen.
Species exstat.

COSMOCONUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 203 n. 27.
κόσμος, ordo; *κῶνος*, conus.

Synon.: Mesoleius Provancher.
Tryphon Provancher.

canadensis (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, New Hampshire, Colorado, Washington.
Tryphon Canadensis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 117.
Mesoleius Canadensis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 259 n. 4, ♀ ♂.
Mesoleius Canadensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 417 n. 4, ♀ ♂.
Cosmoconus Canadensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 280, ♀ ♂.

COELOCONUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 203 n. 26.
κοῖλος, cavus; *κῶνος*, conus.
Species exstat.

AMORPHOGNATHON

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 203 n. 25.
ἄμορφος, informis; *γνάθος*, maxilla.

Synon.: Tryphon Gravenhorst, Stephens, Blanchard.

melanocerus (Grav.) Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Tryphon melanocerus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 265 n. 173, ♂.
Tryphon melanocerus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 256 n. 72.
Tryphon melanocerus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 309 n. 10.
Amorphognathon melanocerus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII. 1897 p. 185, ♀ ♂.

SYNOECETES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 203 n. 24.
συνοικέτης, contuberanalis.

Synon.: Mesoleptus Cresson.
Tryphon Cresson.

festivus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Illinois, Colorado.
Tryphon festivus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 279 n. 12, ♂.
Synoecetes festivus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 279, ♀ ♂.

propinquus (Cress.) Davis — ♂ — Am.: Massachusetts, Delaware.
Mesoleptus propinquus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 97, ♂.
Synoecetes propinquus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 279, ♂.
sedulus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: United States.
Mesoleptus sedulus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 97, ♂.
Synoecetes sedulus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 279, ♀ ♂.

ZEMIOPHORA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 203 n. 23.
ζημία, damnum; φέρω, fero.

Synon.: Zemiophorus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2000.
Mesoleius Holmgren, Brischke.
Syndipnus Thomson.
Tryphon Hartig, Ratzeburg.

scutulata (Htg.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Tryphon scutulatus Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 272 n. 9, ♀ ♂.
Tryphon scutulatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 128 n. 8, ♀ ♂. [p. 76, ♀.
Mesoleius Brischkii Holmgren, Brischke: Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871
Mesoleius Brischkii Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 79, ♀.
Syndipnus (Zemiophorus) scutulatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2000 n. 7, ♀ ♂.

HOMOBIA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 203 n. 22.
ὁμόβιος, una ratione vivens.

Synon.: Colpotrochia Ashmead.

cinctiventris (Ashm.) Davis — ♀ — Am.: Massachusetts.
Colpotrochia ? cinctiventris Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 200.
Homobia cinctiventris Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 278, ♀.

SYNAGRYPNUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 203 n. 21.
συνάγρυπνος, simul vigil.
Species exstat.

PROVANCHERELLA m.

Synon.: Baryceros Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 269 [non Gravenhorst].
Mesoleptus Provancher.
Tryphon Davis.

rhopalocera (Prov.) D. T. — ♂ — Am.: Canada.
Baryceros rhopalocerus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 269.
Mesoleptus rhopalocerus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 232 n. 26, ♂.
Mesoleptus rhopalocerus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1886 p. 405 n. 26, ♂.
Tryphon rhopalocerus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 189.
Baryceros rhopalocerus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 278, ♂.
Provancherella rhopalocera m.

---

[1]) *Hymen.:* Lophyrus virens, pini, L. variegatus (Ratzeburg).

TREMATOPYGUS

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 179.
τρῆμα, foramen; πύγη, anus.

Synon.: Ichneumon Gravenhorst.
Mesoleius Brischke.
Mesoleptus Gravenhorst, Stephens.
Tryphon Gravenhorst, Stephens.

albipes (Grav.) Brischke — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Tryphon albipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 221 n. 145, ♀.
Mesoleius albipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 82, ♀.
Trematopygus albipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 91, ♀.
annulatus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Trematopygus annulatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 91, ♀.
aprilinus Gir.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Trematopygus aprilinus Giraud, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 p. 403 n. 11, ♀ ♂.
assimilis Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia. [n. 12-13, ♂.
Trematopygus assimilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 383
bicolor Rdw. — Eur.: Germania.
Trematopygus bicolor Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 63 n. 14.
cultriformis Ashm. — ♀ — Am.: Nebraska.
Trematopygus cultriformis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 441, ♀.
curtispina Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Trematopygus curtispina Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 930 n. 7, ♀.
facialis Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Trematopygus facialis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 87, ♀ ♂.
Trematopygus facialis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 91, ♀ ♂.
fusculosus Davis — ♂ — Am.: Michigan.
Trematopygus fusculosus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 277, ♂.
kriechbaumeri Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Trematopygus Kriechbaumeri Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2015 n. 1, ♀.
lapponicus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 14, ♀ ♂.
Trematopygus Lapponicus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 184
Trematopygus Lapponicus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 930 n. 5.
lethierryi Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Trematopygus Lethierryi Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2016 n. 2, ♀ ♂.
leucostomus (Grav.) Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Mesoleptus leucostomus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 17 n. 10, ♀.
Mesoleptus leucostomus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 214 n. 7, ♀.
Tematopygus leucostomus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 91, ♀ ♂.
niger Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 6, ♂.
Trematopygus niger Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 181
Trematopygus niger Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 90, ♀.
nigricornis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia. [n. 9, ♂.
Trematopygus nigricornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 183
Trematopygus nigricornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 87, ♀ ♂.
Trematopygus nigrocornis Brischke, Schrift naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 90, ♀ ♂.
Trematopygus nigricornis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 930 n. 3.
Trematopygus nigricornis Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 87.

---

1) *Hymen.:* Selandria melanocephala, S. pubescens, S. bipunctata (Giraud).

obliteratus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 10, ♀.
Trematopygus obliteratus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 183
procurator (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia.
Ichneumon procurator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 379 n. 131, ♂.
Tryphon procurator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 266 n. 174, ♀ ♂.
Tryphon procurator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 267 n. 73.
Trematopygus procurator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 184 [n. 13, ♀ ♂.
Trematopygus procurator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 91, ♀.
Trematopygus procurator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 930 n. 4, ♀ ♂.
Trematopygus procurator Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 87.
Trematopygus procurator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 39, ♀.
rotundatus Davis — ♀ ♂ — Am.: Michigan.
Trematopygus rotundatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 277, ♀ ♂.
ruficornis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 8, ♀ ♂.
Trematopygus ruficornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 182
Trematopygus ruficornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 86, ♀.
Trematopygus ruficornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 90, ♀.
Trematopygus ruficornis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 930 n. 2.
Trematopygus ruficornis Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 86.
rufiventris Rdw. — ♀ — Eur.: Gallia.
Trematopygus rufiventris Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 63 n. 15, ♀.
scabriculus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Trematopygus scabriculus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 930 n. 6, ♀ ♂.
scutellatus (Ashm.) Davis — ♀ — Am.: Washington.
Prionopoda scutellata Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 441, ♀.
Trematopygus scutellatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 278, ♀.
selandrivorus Gir.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Trematopygus selandrivorus Giraud, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 p. 402 n. 10, ♀ ♂.
signatipes (Cress.) Davis — ♀ — Am.: Hudsons Bay.
Tryphon signatipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 105, ♀.
Trematopygus signatipes Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 277, ♀.
varius Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 9-10, ♀ ♂.
Trematopygus varius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 382
vellicans (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Tryphon vellicans Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 263 n. 171, ♂. [n. 7, ♀ ♂.
Trematopygus vellicans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 182
Trematopygus vellicans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 90, ♀.
Trematopygus vellicans Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 930 n. 1.

HODOSTATES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 202 n. 19.
ὁδός, via; ἵστημι, stare.

Synon.: Hodostatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 929.

brevis Thoms.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hodostatus brevis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 929 n. 1, ♀ ♂.
Hodostatus brevis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1258 n. 1.

---

[1]) *Hymen.:* Selandria melanocephala, S. pubescens (Giraud).
[2]) *Hymen.:* Eriocampa umbratica (Thomson).

OTLOPHORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 202 n. 18.
Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2026 n. 6.
ὄτλος, aerumna; φέρω, fero.

Synon.: Mesoleius Holmgren, Brischke, Thomson.
Tryphon Gravenhorst.

anceps (Holmgr.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius anceps Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 154 n. 56, ♀.
Mesoleius anceps Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 4 n. 5, ♀.
Mesoleius (Otlophorus) anceps Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2027 n. 28, ♀.

cruralis (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Gallia.
Tryphon cruralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 212 n. 138, ♀.
Mesoleius (Otlophorus) cruralis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2028 n. 31, ♀ ♂.
Mesoleius cruralis Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1895 p. 36.

hypomelas Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Mesoleius (Otlophorus) hypomelas Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2027 n. 29, ♀.

innumerabilis Davis — ♀ ♂ — Am.: United States, California.
Otlophorus innumerabilis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1897 p. 276, ♀ ♂.

var. **feria** Davis — ♀ ♂ — Am.: New Hampshire, New York, Michigan.
Otlophorus innumerabilis var. feria Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1897 p. 276, ♀ ♂.

melanocarus Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Mesoleius (Otlophorus) melanocarus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2027 n. 30, ♀.

vepretorum (Grav.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Belgia.
Tryphon vepretorum Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 142 n. 89, ♀ ♂.
Mesoleius vepretorum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 133 [n. 3, ♀ ♂.
Mesoleius vepretorum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 3 n. 2, ♀ ♂.
Mesoleius vepretorum Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 68.
Mesoleius (Otlophorus) vepretorum Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2026 n. 27.
Mesoleius vepretorum Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1897 p. 68.

UDENIA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 202 n. 17.
οὐδείς, nullus.

herrichii Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Udenia Herrichii (Förster) Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 40, ♂.

GNESIA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 202 n. 16.
γνήσιος, legitimus.

Species exstat.

---

[1] *Hymen.:* Nematus betularis (Hartig), Lophyrus polytomus (Giraud).

POLYTRERA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 202 n. 15.
πολύς, multus; τρηρός, trepidus.

Synon.: Polytreres Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1873.
Barytarbus Thomson.
Mesoleius Holmgren, Thomson.
Tryphon Gravenhorst.

leviuscula Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius (Barytarbus) laeviusculus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 931 n. 2, ♀ ♂.
Mesoleius (Polytreres) laeviusculus Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1874 n. 5, ♀ ♂.
virgultorum (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Tryphon virgultorum Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 172 n. 112, ♀.
Mesoleius virgultorum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 159 [n. 67, ♀ ♂.
Mesoleius virgultorum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 48 [n. 123, ♀ ♂.
Mesoleius (Barytarbus) virgultorum Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 931 n. 1, ♀ ♂.
Mesoleius (Polytreres) virgultorum Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1873 n. 4, ♀ ♂.

LABROSSYTA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 202 n. 14.
λαβροσσύτος, cum impetu ruens.

Synon.: Labrossytus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2001.
Labrossyta, nom. propr. Hymen.
Ichneumon Gravenhorst.
Gryptocentrus Ashmead.
Syndipnus Thomson.
Tryphon Gravenhorst, Stephens, Fonscolombe.

bimaculata (Ashm.) Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Gryptocentrus bimaculatus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 199, ♀.
Labrossyta bimaculatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1897 p. 276, ♀.
frontosa Davis — ♀ ♂ — Am.: Colorado, Nevada, Washington, Idaho.
Labrossyta frontosa Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1897 p. 275, ♀ ♂.
scotoptera (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia.
Ichneumon scotopterus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 377 n. 129, ♀ ♂.
Tryphon scotopterus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 244 n. 158, ♂.
Tryphon scotopterus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 250 n. 53.
Tryphon scotopterus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 225 n. 18, ♂.
Syndipnus (Labrossytus) scotopterus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2001 n. 8.

ERIGLOEA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 202 n. 13.
ἔρι, valde; γλοιός, viscosus.

excavata Davis — ♀ — Am.: Montana, Massachusetts.
Erigloea excavata Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 275, ♀.
fulvicornis Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Erigloea fulvicornis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 300, ♀.

gagatina Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Erigloea gagatina Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 300, ♀.
opulenta Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Erigloea opulenta Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 275, ♀.
polita Kriechb. — ♀ ♂ — Patria?
Erigloea polita (Förster) Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 299, ♀ ♂!

NEOERYMA

Ashmead, Proc. Entom. Soc. Washington IV. 1897 p. 169.
νέος, novus; Eryma, nom. propr. Hymen.

Synon.: Eryma Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 202 n. 12 [nec ἔρυμα, tutamen. [Albert 1854, nec Oppel 1861].

lophyri Ashm. — ♀ ♂ — Am.: New Hampshire.
Neoeryma lophyri Ashmead, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1897 p. 169, ♀ ♂.
pilosum (Davis) D. T. — ♂ — Am.: Montana, Massachusetts.
Eryma pilosa Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 274, ♂.
Neoeryma pilosum m.
stygium (Kriechb.) D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Eryma stygium (Förster) Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 301, ♀.
Neoeryma stygium m.

WESTWOODIA

Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 126.
O. J. Westwood, nom. propr.

fumipennis Prov. — ♀ — Am.: Canada, New Hampshire.
Westwoodia fumipennis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 329.
Westwoodia fumipennis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 219, ♀.
Westwoodia fumipennis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 392 n. 1, ♀.
Westwoodia fumipennis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 280, ♀.
ruficeps Brullé — ♀ — Austr.: Tasmania.
Westwoodia ruficeps Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 127 n. 1, ♀; T. 41 F. 2.

RHIMPHALEA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 202 n. 11.
ῥιμφαλέος, celer.

brevicorpa Davis — ♀ — Am.: Illinois.
Rhimphalea brevicorpa Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 274, ♀.

PROTARCHUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 201 n. 9.
Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1872 n. 1.
πρῶτος, primus; ἀρχός, princeps.

Synon.: Mesoleius Holmgren & auct.
Tryphon Gravenhorst, Stephens, Ratzeburg.

grandis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleius grandis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1260 n. 1.
Mesoleius (Protarchus) grandis Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1872 n. 2, ♀.

melanurus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleius (Protarchus) melanurus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2020 n. 1, ♀ ♂.
rufus (Grav.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Tryphon rufus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 200 n. 129, ♀.
Tryphon rufulus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 244 n. 36, ♂; T. 36 F. 3.
Tryphon conspicuus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 244 n. 37, ♀.
Tryphon rufus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 117 n. 30, ♀.
Mesoleius rufus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 133 n. 2, ♀.
Mesoleius rufus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 73, ♀.
Mesoleius rufus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 4 n. 3, ♀.
Mesoleius rufus Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 36; T. 23 F. 1.
Mesoleius rufus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 77, ♀.
Mesoleius rufus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 68.
Mesoleius (Protarchus) rufus Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1872 n. 1, ♀.
sorbi (Ratzbg.) Thoms.[2] — ♂ — Eur.: Germania.
Tryphon Sorbi (Saxesen) Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 126 n. 1, ♂.
Tryphon Sorbi Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 114 n. 9.
Mesoleius (Protarchus) Sorbi Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2021 n. 2, ♂.

OTOBLASTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 201 n. 8.
Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 895.

Synon.: Tryphon Gravenhorst, Cresson.

bidens Davis — ♂ — Am.: Michigan.
Otoblastus bidens Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 273, ♂.
compressiventris (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Connecticut, Massachusetts.
Tryphon compressiventris Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 105, ♀ ♂.
Otoblastus compressiventris Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 273, ♀ ♂.
cultriformis Davis — ♀ — Am.: Colorado.
Otoblastus cultriformis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 273, ♀.
erodens Davis — ♀ ♂ — Am.: Wyoming, Colorado.
Otoblastus erodens Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 273, ♀ ♂.
luteomarginatus (Grav.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania, Italia.
Tryphon luteomarginatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 146 n. 93, ♀.
Otoblastus luteomarginatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 900 n. 1, ♀.
minimus (Cress.) Davis — ♀ — Am.: Illinois.
Tryphon minimus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 281 n. 15, ♀.
Otoblastus minimus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 273, ♀.

ACROGONIA

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 369.
ἀκρογώνιος, angulis acutis insignis.

scutellaris Kriechb. — ♂ — Eur.: Belgia.
Acrogonia scutellaris Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 371, ♂.
semirufa Kriechb. — ♂ — Eur.: Belgia.
Acrogonia semirufa Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 370, ♂.

---

1) *Hymen.:* Trichiosoma lucorum, T. sorbi (Brischke).
2) *Hymen.:* Cimbex femorata, Trichiosoma sorbi (Ratzeburg).

ECCLINOPS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 201 n. 7.
Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 913.
ἐκκλίνω, eeflecto; ὤψ, oculus.

Synon.: Mesoleptus Gravenhorst, Stephens.
Perilissus Holmgren, Brischke, Vollenhoven, Thomson.
Tryphon Gravenhorst.

albitarsis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Perilissus (Ecclinops) albitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 914 n. 16, ♀ ♂.
compressa Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Perilissus (Ecclinops) compressus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 914 n. 17, ♀ ♂.
emarginata Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Perilissus (Ecclinops) emarginatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 914 n. 18, ♀ ♂.
frontator Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Perilissus (Ecclinops) frontator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 914 n. 14, ♀ ♂.
orbitalis (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Tryphon orbitalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 254 n. 165. [n. 5, ♀ ♂.
Perilissus bucculentus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 123
Perilissus bucculentus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 70, ♂.
Perilissus bucculentus Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 52; T. 33 F. 4.
Perilissus bucculentus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 72, ♂.
Perilissus (Ecclinops) orbitalis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 913 n. 12.
pallida (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Belgia, Germania.
Mesoleptus pallidus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 30 n. 18, ♂.
Mesoleptus pallidus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 216 n. 15.
Perilissus pallidus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 124 n. 7, ♀ ♂.
Perilissus pallidus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 70, ♀ ♂.
Perilissus pallidus Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 52; T. 33 F. 5.
Perilissus pallidus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 73, ♀ ♂.
Perilissus (Ecclinops) pallidus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 914 n. 15.
Perilissus pallidus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 63.
subcincta (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
? Mesoleptus luteolator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 42 n. 25, ♂.
? Mesoleptus luteolator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 217 n. 18.
Perilissus subcinctus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 123 [n. 6, ♀ ♂.
Perilissus subcinctus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 70, ♀ ♂.
Perilissus subcinctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 72, ♀ ♂.
Perilissus (Ecclinops) subcinctus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 914 n. 13.
Perilissus subcinctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1891 p. 60, ♂.

PAMMICRA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 181 n. 5.
πάμμικρος, perpusillus.

Synon.: Pammicrus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 880.
Adelognathus Thomson, Schmiedeknecht.
Hemiteles Gravenhorst, Taschenberg.

dorsalis (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles dorsalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 838 n. 266, ♀ ♂.

Hemiteles dorsalis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 127 n. 29, ♀♂.
Adelognathus (Pammicrus) dorsalis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 880 n. 12, ♀♂.
Adelognathus dorsalis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1278 n. 19.
Adelognathus dorsalis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 118 & 527 n. 80, ♀♂.

GENERA SEDIS INCERTAE.

DIPLOMORPHUS

Giraud, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 p. 409.
δίπλοος, duplex; μορφή, forma.

Synon.: Aethalodes Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VIII. P. 5. 1890 p. 207.
αἰθαλώδης fuliginosus.

mesomelas (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia.
Aethalodes mesomelas Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VIII. P. 5. 1890 p. 209
Diplomorphus mesomelas m. [n. 2, ♀♂.

seminiger (Kriechb.) D. T.[1] — ♂ — Eur.: Helvetia.
Aethalodes seminiger Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VIII. P. 5. 1890 p. 208
Diplomorphus seminiger m. [n. 1, ♂.

thoracicus Gir.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia.
Diplomorphus thoracicus Giraud, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 p. 409 n. 15, ♀ ♂.

BRAUNSIANUS

Berg, Comun. mus. Buenos Aires I. 1898 p. 42.
S. Brauns, Suerinensis, nom. propr.

Synon.: Anelpistus Brauns, Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklenburg LI. 1898 p. 60 [nec Horn].
ἀ-ελπιστός, sperabilis.

bidentatus Brauns — Eur.: Germania.
Anelpistus bidentatus Brauns, Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklenburg LI. 1898 p. 60.

BREMIELLA m.

Synon.: Bremia Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VIII. P. 5. 1890 p. 209 [nec Bremi-Wolf. [Rondani 1860, nec Robineau Desvoidy 1863].

pulchella Kriechb. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Bremia pulchella Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VIII. P. 5. 1890 p. 210, ♀.

20. *Subfam.* Ctenopelmatinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 145 & 195.

SCOPIORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 196 n. 16.
Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 902.
σκοπιωρός, custos speculae.

Synon.: Polyblastus Holmgren, Brischke, Thomson.
Tryphon Gravenhorst, Stephens, Zetterstedt.

---

1) *Lep.:* Grapholitha caryana (Hamilton).
2) *Hymen.:* Hylotoma atrata (Giraud).

albiventris Brischke — ♂ — Eur.: Borussia.
Polyblastus (Scopiorus) albiventris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 [p. 41, ♂.
analis (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Pennsylvania, Illinois, New Hampshire.
Tryphon analis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 279 n. 11, ♂.
Tryphon occidentalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 109, ♀.
Scopiorus analis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 258, ♀ ♂.
angulatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Polyblastus (Scopiorus) angulatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 902 n. 9, ♀ ♂.
expansus Davis — ♂ — Am.: Colorado, Montana.
Scopiorus expansa Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 258, ♂.
extricatus Davis — ♀ — Am.: Colorado.
Scopiorus extricatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 259, ♀.
fuscicornis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Polyblastus (Scopiorus) fuscicornis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 903 n. 11, ♀.
gillettii Davis — ♀ — Am.: Colorado.
Scopiorus Gillettii Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 258, ♀.
hiatus Davis — ♀ ♂ — Am.: Michigan.
Scopiorus hiatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 258, ♀ ♂.
lucidus Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Borussia.
Polyblastus (Scopiorus) lucidus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 [p. 40, ♀ ♂.
marginatus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Polyblastus arcuatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 209 [n. 17, ♀.
Polyblastus marginatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 210 [n. 18.
Polyblastus marginatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 387.
Polyblastus marginatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 93, ♀ ♂.
Polyblastus marginatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 98, ♀ ♂.
Polyblastus (Scopiorus) marginatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 903 n. 12.
quebecensis (Prov.) Davis [1]) — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Eucerus Quebecensis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 30.
Polyblastus Quebecensis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 262 n. 3, ♀.
Polyblastus Quebecensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 420 n. 3, ♀.
Tryphon flavifrons Fyles, Canad. Entomol. XXV. 1893 p. 107.
Scopiorus Quebecensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 258, ♀ ♂.
sphaerocephalus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Tryphon sphaerocephalus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 247 n. 160, ♀.
Tryphon sphaerocephalus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 251 n. 56.
Tryphon bifasciatus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 398 n. 27, ♂.
Tryphon trisculptus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 77 n. 6, ♀.
Polyblastus sphaerocephalus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) [p. 206 n. 8, ♀ ♂.
Polyblastus sphaerocephalus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 92.
Polyblastus sphaerocephalus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 [p. 97, ♀ ♂.
Polyblastus (Scopiorus) sphaerocephalus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 903 n. 10, ♂.
Polyblastus sphaerocephalus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 [p. 98.
subcrassus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: New England, Canada.
Tryphon subcrassus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 109, ♀ ♂.
Catocentrus dilatatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 316 [err. typ.].

---

[1]) *Hymen.:* Nematus spec. (Fyles).

Polyblastus subcrassus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 262 n. 4, ♂.
Polyblastus dilatatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 281 n. 2, ♂.
Polyqlastus dilatatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 419 n. 2, ♂.
Polyblastus subcrassus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 420 n. 4, ♂.
Scopiorus subcrassus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 259, ♀ ♂.

POLYBLASTUS

Hartig, Arch. f. Naturg. III. P. 1. 1837 p. 155.
πολύς, multus; *βλαστός*, germen.

Synon.: Bassus Gravenhorst.
Catocentrus Provancher.
Coleocentrus Provancher.
Erromenus Provancher.
Ichneumon Gravenhorst.
Pimpla Ratzeburg.
Tryphon Gravenhorst & auct.

aberrans Brischke[1]) — ♂ — Eur.: Germania.
Polyblastus aberrans Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 93, ♂.
Polyblastus aberrans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 98, ♂.
affinis Woldst. — ♀ — Eur.: Fennia.
Polyblastus affinis Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur & Folk XXI. 1873 p. 83 n. 3, ♀.
albovinctus (Grav.) Htg. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Tryphon albovinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 224 n. 147, ♀.
Tryphon albovinctus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 247 n. 45, ♀.
Polyblastus albovinctus Hartig, Arch. f. Naturg. III. 1. 1837 p. 155.
Polyblastus albovinctus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 158.
alternans Schiödte[2]) — ♀ ♂ — Eur. bor.
Polyblastuus alternans Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6–10. p. 19 n. 6, ♀; T. 8 F. 2.
Polyblastus alternans Schiödte, Naturh. Tidsskr. III. 1847 p. 98 n. 11. [n. 30, ♀ ♂.
Polyblastus grammicus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 215
Polyblastus alternans Boheman, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XX. 1863 p. 78 n. 17, ♀ ♂.
anilis Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Polyblastus anilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 218 n. 40, ♀.
annulatus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 24, ♀.
Polyblastus annulatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 212
Polyblastus annulatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 388.
annulicornis Gir. — ♀ — Eur.: Austr. inf.
Polyblastus annulicornis Giraud, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 p. 406 n. 13, ♀.
aztecus Cam. — ♂ — Am.: Mexico. [F. 3.
Polyblastus ? Aztecus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymén. I. p. 287 n. 1, ♂; T. 12
bicingulatus Kriechb. — ♀ — Eur.: Hispania.
Polyblastus bicingulatus Kriechbaumer, Act. soc. hist. nat. Españ. XXVII. 1898 p. 169, ♀.
binotatus Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Polyblastus binotatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII. 1897 p. 190, ♀.
bipustulatus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 15, ♀.
Polyblastus bipustulatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855. P. 3. (Tryph.) p. 209

---

1) *Hymen.:* Fenusa rubi (Brischke).
2) *Hymen.:* Nematus hypogastricus, Blennocampa furcata (Schiödte).

boiei Schiödte[1] — ♀ — Eur.: Dania.
Polyblastus Boiei Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 16 n. 4, ♀.
Polyblastus Boiei Schiödte, Naturh. Tidsskr. III. 1847 p. 98 n. 9.
breviseta (Ratzbg.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Islandia, Suecia, Germania.
Pimpla breviseta Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 97 n. 18, ♀.
Polyblastus senilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 219 n. 41, [♀ ♂.
Tryphon aberrans Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 85, ♀.
Polyblastus senilis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 94, ♀ ♂.
Polyblastus senilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 100, ♀ ♂.
Polyblastus breviseta m.
bridgmanii Parf. — ♀ — Eur.: Britannia.
Polyblastus Bridgmani Parfitt, Entom. M. Magaz. XVIII. 1882 p. 251, ♀.
calcator (Müll.) Brischke[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania, Dania.
Ichneumon calcator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 158 n. 1835.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 66 n. 277.
Ichneumon erythropus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2705 n. 329.
Tryphon calcator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 235 n. 13.
Tryphon calcator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 129 n. 13.
Tryphon calcator Ratzeburg, Ichneum d. Forstinsect. III. 1852 p. 125 n. 45.
Polyblastus calcator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 94, ♂.
cancer Htg. — Eur.: Germania.
Polyblastus cancer Hartig, Arch. f. Naturg. III. P. 1. 1837 p. 155; T. 4 F. 1 [s. descr.].
carbonarius (Grav.) Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Tryphon carbonarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 141 n. 88, ♂.
Polysphincta carbonaria Blackwall, Rep. Brit. Assoc. Adv. Sc. 12th Meet. Manchester 1842 [p. 68.
Polyblastus carbonarius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 212 [n. 23, ♀ ♂.
Polyblastus carbonarius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. P. 5. 1856 (Tryph.) p. 388.
Polyblastus carbonarius Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 900 n. 2.
carinatus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Polyblastus carinatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 220 [n. 46, ♂.
Polyblastus carinatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 94, ♂.
Polyblastus carinatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 100, ♂.
cinctipes Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Polyblastus cinctipes Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 356 n. 2, ♀.
clypearis Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Polyblastus clypearis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 61, ♂.
consobrinus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Polyblastus consobrinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 216 [n. 33, ♀.
cothurnatus (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Dania, Germania.
Tryphon cothurnatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 285 n. 189, ♀.
Polyblastus Drewseni Schiödte, Magas. de zool. IX. P. 6-10. 1839 p. 15 n. 3, ♀; T. 8 F. 1.
Polyblastus Drewseni Schiödte, Naturh. Tidsskr. III. 1847 p. 98 n. 8.
Polyblastus cothurnatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 74 n. 2, ♀.
Polyblastus cothurnatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 205 [n. 7, ♀.
Polyblastus cothurnatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 92, ♀.
Polyblastus cothurnatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 97, ♀.

---

1) *Hymen.:* Nematus spec. (Boie).
2) *Hymen.:* Lophyrus pini. — *Lep.:* Coccyx resinana (Ratzeburg).

gilvipes Holmgr. — ♀ — Eur.: Germania. [n. 12, ♀.
Polyblastus gilvipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 207
Polyblastus gilvipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 387.
Polyblastus gilvipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 98, ♀.
glabellus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 34, ♀.
Polyblastus glabellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 216
grossus Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Polyblastus grossus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 94, ♀.
Polyblastus grossus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 100, ♂.
haematosternus (Hal.) Marsh. — ♀ — Eur.: Britannia.
Tryphon haemosternus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 112, ♀.
Polyblastus haemosternus Marshall, Catal. Brit. Hymen. III. 1872 p. 77 n. 14.
hilaris Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Britannia.
Polyblastus hilaris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 209 n. 16, ♀.
Polyblastus hilaris Parfitt, Rep. & Trans. Devon Assoc. XIII. 1881 p. 276.
holmgrenii Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Polyblastus Holmgreni Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 93, ♀ ♂.
Polyblastus Holmgreni Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 99, ♀ ♂.
impressus (Grav.) Marsh. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Tryphon impressus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 161 n. 103, ♀.
Tryphon impressus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 238 n. 20.
Tryphon impressus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 129 n. 11, ♀.
Tryphon impressus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 117 n. 27.
Tryphon impressus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 127 n. 43.
Tryphon impressus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 193 [n. 21, ♀ ♂.
Tryphon impressus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 89, ♀ ♂.
Polyblastus impressus Marshall, Catal. Brit. Hymen. III. 1872 p. 77 n. 12.
Tryphon impressus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 93, ♂.
infestus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 4, ♀.
Polyblastus infestus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 204
Polyblastus infestus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 97, ♀.
lateralis Gir.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Tryphon (Polyblastus) lateralis Giraud, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 p. 401 n. 9, ♀ ♂.
leviculus Davis — ♂ — Am.: Colorado.
Polyblastus leviculus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 263, ♂.
limosus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 38, ♀.
Polyblastus limosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 217
Polyblastus limosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 288.
macrocentrus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Polyblastus macrocentrus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1257 n. 1, ♀ ♂.
mixtus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Polyblastus mixtus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 217 n. 37, ♀.
mutabilis Holmgr.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Tryphon pastoralis var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 249. [n. 9, ♀ ♂.
Polyblastus mutabilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 206
Polyblastus mutabilis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 92, ♀ ♂.
Polyblastus mutabilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 97, ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Selandria melanocephala, S. pubescens (Giraud).
[2]) *Hymen.:* Nematus myosotidis (Brischke).

nigellus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 36, ♀.
Polyblastus nigellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 217
nigrifrons Holmgr. — ♀ — As.: Waigatsch.
Polyblastus nigrifrons Holmgren, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 154 n. 30, ♀.
nitidiventris Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 28, ♀.
Polyblastus nitidiventris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 214
pallidicoxa Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Polyblastus pallicoxa Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. p. 1257 n. 2, ♀ ♂.
pallidipes Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Polyblastus pallipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 101, ♂.
palustris Holmgr.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 3, ♀ ♂.
Polyblastus palustris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 203
parvulus (Grav.) Marsh. — ♂ — Eur.: Britannia.
Tryphon parvulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 294 n. 196, ♂.
Tryphon parvulus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 260 n. 83.
Polyblastus parvulus Marshall, Catal. Brit. Hymen. III. 1872 p. 77 n. 11.
pastoralis (Grav.) Marsh. — ♀ — Eur.: Britannia.
Tryphon pastoralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 689.
Tryphon pastoralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 248 n. 161, ♀ [excl. varr.].
Tryphon pastoralis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 251 n. 57.
Polyblastus pastoralis Marshall, Catal. Brit. Hymen. III. 1872 p. 77 n. 13.
pedalis (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Tryphon pedalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 273 n. 1, ♂.
Bassus Bouleti Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 32.
Erromenus pedalis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 265 n. 1, ♀.
Erromenus pedalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 423 n. 1, ♀.
Polyblastus pedalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 263, ♀ ♂.
phygadeuontoides Kriechb. — ♀ — Eur.: Belgia.
Polyblastus phygadeuontoides Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 367, ♀.
pictipennis Tosqu. — ♂ — Afr.: Delagoa Bay.
Polyblastus pictipennis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 354 n. 1, ♂.
pinguis (Grav.) Htg. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon pinguis Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 373 n. 124, ♀ ♂.
Tryphon pinguis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 150 n. 97, ♀ ♂.
Tryphon pinguis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 235 n. 14.
Polyblastus pinguis Hartig, Arch. f. Naturg. III. 1. 1837 p. 155.
Polyblastus pinguis Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 12 n. 1, ♂.
Polyblastus pinguis Schiödte, Naturh. Tidsskr. III. 1847 p. 98 n. 6.
Tryphon pinguis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 219 n. 5, ♀.
Polyblastus pinguis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 210 [n. 19, ♀ ♂.
Polyblastus pinguis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 93, ♀ ♂.
Polyblastus pinguis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 98, ♀ ♂.
praedator Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 35, ♀.
Polyblastus praedator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 216
pumilus Holmgr.[2]) — ♀ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 32, ♀.
Polyblastus pumilus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 215

---

1) *Hymen.:* Blennocampa pubescens (Rondani).
2) *Hymen.:* Nematus Valisnierii (Brischke).

Polyblastus pumilus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 388.
Polyblastus pumilus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 100, ♀.
pyramidatus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 43, ♀.
Polyblastus pyramidatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 219
rivalis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀ ♂.
Polyblastus rivalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 208 n. 14.
rixator Woldst. — ♂ — Eur.: Germania.
Polyblastus rixator Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 399 n. 28, ♂.
ruficornis Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Polyblastus ruficornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 92, ♂.
Polyblastus ruficornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 97, ♂.
rufiventris (Grav.) Marsh. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Bassus rufiventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 312 n. 1, ♂.
Tryphon erythrozonus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. VII. 1850 p. 283 n. 6, ♀.
Polyblastus rufiventris Marshall, Catal. Brit. Hymen. III. 1872 p. 77 n. 10.
sanguinatorius (Ratzbg.) Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Tryphon sanguinatorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 129 n. 51, ♂.
Polyblastus sanguinatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) [p. 213 n. 25, ♀.
Polyblastus sanguinatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 93, ♀ ♂.
Polyblastus sanguinatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 99, ♀ ♂.
scutellaris Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia. [n. 44, ♂.
Polyblastus scutellaris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 220
selandriae Brischke[2] — ♂ — Eur.: Germania.
Polyblastus selandriae Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 98, ♂.
sordidus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia. [n. 13, ♂.
Polyblastus sordidus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 208
stenhammari Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 6, ♀ ♂.
Polyblastus Stenhammari Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 205
stenocentrus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 31, ♀ ♂.
Polyblastus stenocentrus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 215
Polyblastus stenocentrus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 94, ♀ ♂.
Polyblastus stenocentrus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 100, ♀ ♂.
subalpinus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 21, ♀ ♂.
Polyblastus subalpinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 211
subtilis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Polyblastus subtilis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 900 n. 1, ♀.
tibialis (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, Illinois.
Tryphon tibialis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 280 n. 13, ♂.
Tryphon annulipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 108, ♀.
Polyblastus annulipes Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 261 n. 1, ♀ ♂.
Polyblastus annulipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1893 p. 419 n. 1, ♀ ♂.
Polyblastus tibialis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 263, ♀ ♂.
unicinctus Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Polyblastus unicinctus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 433, ♀.
validicornis Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Polyblastus validicornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 92, ♂.
Polyblastus validicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 98, ♂.

[1] *Hymen.:* Cladius viminalis, C. eucera, Nematus spec. (Brischke).
[2] *Hymen.:* Selandria pubescens (Brischke).

variitarsus (Grav.) Htg. — ♀ ♂ — Eur. fere tota; Am.: Montana, Colorado, Nevada.
Tryphon varitarsus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 688.
Tryphon varitarsus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 222 n. 146, ♀ ♂.
Tryphon varitarsus Curtis, Brit. Entom. IX. 1832 p. 399, ♀ ♂; T. 399.
Tryphon varitarsus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 247 n. 44.
Polyblastus varitarsus Hartig, Arch. f. Naturg. III. 1. 1837 p. 155.
Polyblastus varitarsus Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 17 n. 5, ♀ ♂.
Polyblastus varitarsus Schiödte, Naturh. Tidsskr. III. 1847 p. 98 n. 10.
Polyblastus varitarsus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 71 n. 1, ♀ ♂.
Polyblastus varitarsus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 204 [n. 5, ♀ ♂; T. 8 F. 15.
Polyblastus varitarsus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 91, ♀ ♂.
Polyblastus varitarsus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 97, ♀ ♂.
Polyblastus varitarsus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 96.
Polyblastus varitarsus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 263, ♀ ♂.

vetustus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀ ♂.
Polyblastus vetustus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 219 n. 42,

wahlbergii Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 26, ♀ ♂.
Polyblastus Wahlbergi Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 213
Polyblastus Wahlbergi Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 99, ♀ ♂.
Polyblastus Wahlbergi Billups, Proc. Entom. Soc. London 1880 Proc. p. XXVIII, ♂.

wesmaelii Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 27, ♀.
Polyblastus Wesmaeli Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 214

westringii Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 20, ♀.
Polyblastus Westringi Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 210

woldstedtii D. T. — ♂ — Eur.: Fennia. [[nec Brischke].
Polyblastus Holmgreni Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur. & Folk. XXI. 1872 p. 49 n. 13, ♂
Polyblastus Woldstedtii m.

xanthopygus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [p. 218 n. 39, ♀ ♂.
Polyblastus xanthopygus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.)

LATHROLESTES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 196 n. 14.
λάϑρα, clam; ληστεύω, latrocinor.

Synon.: Lathrolestus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 911.
Grypocentrus Holmgren.
Tryphon Zetterstedt.
Perilissus Holmgren, Brischke.

caudatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Lathrolestus caudatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 917 n. 4, ♀ ♂.

clypeatus (Zett.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Lapponia, Suecia.
Tryphon clypeatus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 399 n. 30, ♀.
Grypocentrus clypeatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 195
Lathrolestus clypeatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 916 n. 1. [n. 5, ♀ ♂.

luteolus Thoms. — ♂ — Eur.: Suecia.
Lathrolestus luteolus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 917 n. 6, ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Fenusa betulae (Brischke).

macropygus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Perilissus macropygus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 126 [n. 12, ♂.
Perilissus soleatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 126 n. 13, ♀.
Perilissus macropygus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 71, ♂.
Perilissus macropygus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 73, ♀ ♂.
Lathrolestus macropygus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 917 n. 3, ♀ ♂.
marginatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Lathrolestus marginatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 917 n. 5, ♀ ♂.
Lathrolestus marginatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1982.
nasonii Davis — ♀ ♂ — Am.: Illinois Montana.
Lathrolestes Nasoni Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 264, ♀ ♂.
pleuralis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Lathrolestus pleuralis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 916 n. 2, ♀ ♂.
similis Davis — ♀ — Am.: Colorado.
Lathrolestes similis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 265, ♀.
ungularis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Lathrolestus ungularis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 918 n. 7, ♀ ♂.

CTENACME

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 196 n. 13.
κτείς, pecten; *ἀκμή*, acus.

Synon.: Ctenacmus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 901.
Polyblastus Thomson.

genalis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Polyblastus (Ctenacmus) genalis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 902 n. 8, ♀.
nigripalpis Thoms. — ♂ — Eur.: Suecia.
Polyblastus (Ctenacmus) nigripalpis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 902 n. 7, ♂.
scutellaris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Polyblastus (Ctenacmus) scutellaris Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 901 n. 6, ♀ ♂ [non Polyblastus scutellatus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1257 n. 3. [Holmgren].

MONOBLASTUS

Hartig, Arch. f. Naturg. III. P. 1. 1837 p. 155.
μόνος, solus; *βλαστός*, germen.

Synon.: Ichneumon Schrank, Huber, Bechstein & Scharfenberg.
Polyblastus Holmgren.
Tryphon Ratzeburg.

aciculatus Davis — ♂ — Am.: Montana.
Monoblastus aciculatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 262, ♂.
angulatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Monoblastus angulatus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1256 n. 1, ♀ ♂.
capronii Bridgm. — ♂ — Eur.: Britannia.
Monoblastus Caproni Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 159, ♂.
caudatus Htg. — Patria?
Monoblastus caudatus Hartig, Arch. f. Naturg. III. 1837 p. 155; T. 4 F. 3 [s. descr.].
erythropygus Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Monoblastus erythropygus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) [p. 386 n. 4, ♀ ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Dineura alni (Brischke).

Monoblastus erythropygus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 90, ♀.
Monoblastus erythropygus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N.F. IV. P.3. 1878 p.96, ♀♂.

lateralis Kriechb. — ♀ — Eur.: Belgia.
Monoblastus lateralis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 368, ♀.

levigatus Holmgr.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Polyblastus laevigatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 75 n. 4, ♀ ♂.
Polyblastus laevigatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 203 [n. 1, ♀ ♂.
Monoblastus laevigatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 385.
Monoblastus laevigatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 90, ♀ ♂.
Monoblastus laevigatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 95, ♂.
? Monoblastus exstirpatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 95, ♀♂.

longicornis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Littorale.
Monoblastus longicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 387 [n. 5, ♀♂.
Monoblastus longicornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 91, ♀ ♂.
Monoblastus longicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 96, ♂.
Monoblastus longicornis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 903 n. 1.
Monoblastus longicornis Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894 p. 18.

longigena Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Monoblastus longigena Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 903 n. 2.

neustriae (Schrank) Brischke[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ichneumon neustriae Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 304 n. 2137, ♀ ♂.
Ichneumon neustriae C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- u. Baumhölzer II. 5. 1807 p. 162.
Ichneumon neustriae Bechstein, Forstinsect. 1818 p. 145 n. 303 & p. 499 n. 17.
Tryphon neustriae Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 115 n. 16, ♂.
Monoblastus femoralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 203 n. 2, [♀♂.
Monoblastus neustriae Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 90, ♀ ♂.
Monoblastus neustriae Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 96, ♀ ♂.

obscurellus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: California, Washington, Colorado, Montana.
Erromenus obscurellus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 373, ♀.
Monoblastus obscurellus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 261, ♀ ♂.

palustris Holmgr.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Polyblastus palustris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 203 [n. 3, ♀ ♂.
Monoblastus palustris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 386.
Monoblastus palustris Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 90, ♀ ♂.
Monoblastus palustris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 96, ♀♂.

punctifrons Davis — ♀ — Am.: Texas.
Monoblastus punctifrons Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 261, ♀.

spinosus Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Monoblastus spinosus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 91, ♂.

variifrons (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Tryphon varifrons Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 104, ♂.
Tryphon frontalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 109, ♀.
Tryphon Defresnei Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 309, ♂.
Tryphon Dufresnei var. scutellaris Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 310, ♀ ♂.
Tryphon Dufresnei var. scutellaris Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 253, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Nematus flavus (Brischke).
2) *Hymen.:* Nematus citreus (Brischke).
3) *Hymen.:* Nematus cirrhopus, N. gracilis, Selandria hyalina, Dineura verna (Brischke).

Tryphon Dufresnei Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 253 n. 2, ♀ ♂.
Tryphon Dufresnei Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 411 n. 2, ♀ ♂.
Tryphon Dufresnei var. scutellaris Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 411, ♀ ♂.
Tryphon Dufresnei Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 189, ♀.
Monoblastus varifrons Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 262, ♀ ♂.

TRICHOCALYMMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 196 n. 11.
θρίξ, capillus; καλύπτω, abscondo.

Synon.: Trichocalymmus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 903.
Polyblastus Holmgren, Brischke, Thomson.
Tryphon Gravenhorst, Stephens.

bipunctatum Woldst. — ♀ — Eur.: Russia.
Trichocalymma bipunctatum Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXIII. 1877 p. 457 [n. 3, ♀.

plebejum Woldst. — ♂ — Eur.: Russia.
Trichalymma plebejum Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXIII. 1877 p. 456 n. 1, ♂.

pratense (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia.
Tryphon pratensis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 299 n. 200, ♂.
Tryphon pratensis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 260 n. 85.
Tryphon pratensis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 231 n. 27, ♂.
Polyblastus pratensis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 207 [n. 11, ♀ ♂.
Polyblastus (Trichocalymmus) pratensis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 903 n. 13.

propinquum (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Tryphon propinquus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 300 n. 201, ♂.
Tryphon propinquus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 261 n. 86.
Polyblastus caudatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 74 n. 3, ♀.
Polyblastus propinquus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 206 [n. 10, ♀ ♂.
Polyblastus propinquus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 387.
Polyblastus propinquus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 92, ♀ ♂.
Polyblastus propinquus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 98, ♂.
Polyblastus (Trichocalymmus) propinquus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 903 n. 14.

punctatum Woldst. — ♂ — Eur.: Russia.
Trichocalymma punctatum Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXIII. 1877 p. 456 [n. 2, ♂.

ERROMENUS

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 5. (Tryph.) p. 221.
ἐρρωμένος, validus.

Synon.: Bassus Provancher.
Exochus Gravenhorst, Stephens, Fonscolombe.
Ichneumon Gravenhorst.
Polyblastus Holmgren.
Tryphon Gravenhorst, Hartig, Ratzeburg, Cresson.

analis Brischke[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Erromenus analis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 95, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Nematus crassulus (Fletcher), N. Valisnieri (Brischke).

Erromenus analis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 101, ♀ ♂.
Erromenus analis Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 169, ♀♂.
Erromenus analis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1258 n. 1, ♀.

arenicola Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Erromenus arenicola Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 905 n. 7, ♀ ♂.

brevitarsis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Erromenus brevitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 904 n. 4, ♀ ♂.

brunicans (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Tryphon brunnicans Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 270 n. 177, ♀ ♂.
Tryphon brunnicans Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 267 n. 74, ♀ ♂.
Polyblastus brunnicans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 75 n. 5, ♀ ♂.
Erromenus brunnicans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 221 [n. 1, ♀ ♂.
Erromenus brunnicans Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 95, ♀.
Erromenus brunnicans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 101, ♀ ♂.
Erromenus brunnicans Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 904 n. 3.
Erromenus brunnicans Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 100.

cavigena Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Erromenus cavigena Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 904 n. 1, ♀ ♂.

crassus (Cress.) Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Massachusetts, New Jersey.
Tryphon crassus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 107, ♀ ♂.
Tryphon Fejonicus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 372 ♂.
Erromenus crassus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 266 n. 3, ♀.
Erromenus crassus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 424 n. 3, ♀.
Erromenus crassus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 260, ♀ ♂.

defectivus Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Erromenus defectivus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 41, ♂.

dimidiatus (Cress.) Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada, New Jersey, Pennsylvania.
Tryphon dimidiatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 108, ♂.
Tryphon atricoxus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 104, ♀ ♂.
Erromenus dimidiatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 111 n. 6, ♀.
Erromenus dimidiatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 260, ♀ ♂.

exareolatus Brischke[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Erromenus exareolatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 96, ♂.
Erromenus exareolatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 102, ♀ ♂.

fasciatus (Grav.) Gir.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia.
Tryphon fasciatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 139 n. 86, ♀.
Tryphon fasciatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 236 n. 16.
Erromenus fasciatus Giraud, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 p. 387 & 404 n. 12, ♀ ♂.
Erromenus fasciatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 158.

frenator (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia, Germania.
Exochus frenator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 332 n. 214, ♀ ♂.
Exochus frenator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 264 n. 1, ♀ ♂.
Exochus frenator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 233 n. 1.
Erromenus frenator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 222. [n. 4, ♀ ♂.
Erromenus frenator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 95, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Selandria adumbrata (Brischke).
2) *Hymen.:* Dineura verna (Giraud).

Erromenus frenator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 101, ♀ ♂.
Erromenus frenator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 905.
Erromenus frenator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1887 p. 87, ♀.
Erromenus frenator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 41.

fumatus Brischke[1]) — ♂ — Eur.: Germania.
Erromenus fumatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 96, ♂.
Erromenus fumatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 102, ♂.

glabrosus Davis — ♀ ♂ — Am.: Wyoming, California.
Erromenus glabrosus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 260, ♀ ♂.

haemorrhoicus (Htg.) Brischke[2]) — ♀ — Eur.: Germania.
Tryphon haemorrhoicus Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. 2. 1838 p. 27 n. 5, ♀.
Tryphon haemorrhoicus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 129 n. 12, ♀.
Tryphon haemorrhoicus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 127 n. 4.
Erromenus haemorrhoicus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 95, ♀.
Erromenus haemorrhoicus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 101, ♀.

marginatus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Erromenus marginatus Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 11 n. 4, ♀.
Erromenus marginatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 797 n. 4, ♀.
Erromenus marginatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 260, ♀.

oelandicus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Polyblastus Oelandicus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 220 [n. 45, ♂.
Erromenus Oelandicus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 904 n. 5, ♀.

proditor (Grav.) Marsh. — ♂ — Eur.: Britannia.
Tryphon proditor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 298 n. 199, ♂.
Erromenus proditor Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 77 n. 4.

punctulatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Erromenus punctulatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 222 [n. 3, ♂.
Erromenus punctulatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 101, ♀.
Erromenus punctulatus Woldstedt, Horae soc. entom. Ross. XVI. 1881 p. 64.
Erromenus punctulatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 904 n. 6, ♀.

simplex Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Erromenus simplex Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 905 n. 8, ♀ ♂.

tristis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Erromenus tristis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 110 n. 5, ♀.
Erromenus tristis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 260, ♀.

zonarius (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Italia.
Ichneumon zonarius Gravenhorst, Mem. Accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 380 n. 132, ♀.
Tryphon zonarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 268 n. 175, ♀ ♂.
Erromenus zonarius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 221 [n. 2, ♀ ♂.
Erromenus zonarius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 95, ♀ ♂.
Erromenus zonarius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 101, ♂.
Erromenus zonarius Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 904 n. 2.
Erromenus zonarius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 41, ♀.

---

1) *Hymen.:* Selandria adumbrata (Brischke).
2) *Hymen.:* Lophyrus pini (Hartig), Lophyrus spec. (Brischke).

EUCEROS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 368 n. 3.

εὖ, bene; κέρας, cornu.

Synon.: Eumesius Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 59.
εὖ, bene; μέσος, medius.
Bassus Blanchard.
Tryphon Gravenhorst.

albitarsus Curt. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Euceros albitarsus Curtis, Brit. Entom. XIV. 1837 p. 660, ♂; T. 660.
Euceros dimidiatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 117 n. 1, ♀ ♂.
Euceros albitarsus Giraud, Verh. zool. bot. Ver. Wien VII. 1857 p. 166, ♀ ♂; T. 3 F. 3 (♂) & 2 (♀).
Eucerus crassicornis Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 53, ♂; T. 33 F. 7 [non Gravenh.].

canadensis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, New York, Michigan.
Euceros Canadensis Cresson, Canad. Entomol. I. 1869 p. 103 & 105 n. 1, ♀.
Euceros Canadensis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 270 n. 1, ♀ ♂.
Euceros Canadensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 425 n. 1, ♀ ♂.
Euceros Canadensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 254, ♀ ♂.

couperi Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, New Hampshire.
Euceros Couperii Cresson, Canad. Entomol. I. 1869 p. 104 & 105 n. 2, ♂.
Euceros Couperii Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 270 n. 2, ♂.
Euceros Couperii Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 426 n. 2, ♂.
Euceros Couperii Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 255, ♀ ♂.

crassicornis Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
? Tryphon pruinosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 189 n. 124, ♀ [non ♂].
Euceros crassicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 370 n. 35, ♂.
Euceros crassicornis Shuckard, Burmeister: Manual of Entom. 1836 Frontisp. F. 2.
Euceros crassicornis Curtis, Brit. Entom. XIV. 1837 p. 660 n. 1.
Bassus (Euceros) crassicornis Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 321 n. 3.
Eumesius crassicornis Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 59.
Euceros crassicornis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VIII. 1. 1840 p. 362. [n. 3, ♀.
Euceros morionellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 201
Euceros crassicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 385, ♀ ♂.
Euceros crassicornis Giraud, Verh. zool. bot. Ver. Wien VII. 1857 p. 164, ♀ ♂; T. 3 F. 1 (♀).
Eumesius crassicornis Marshall, Entom. M. Magaz. XII. 1876 p. 195 & 228.
Eucerus crassicornis Verhoeff, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 4 n. 2, ♂.
Euceros pruinosus Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. XVI. 1890 p. 139, ♀.

egregius Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia. [[excl. var.].
Euceros egregius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 201 n. 2, ♀ ♂
Euceros grandicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 200
Eucerus egregius Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 53; T. 33 F. 8. [n. 1, ♂.
Eucerus egregius Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1888 p. 198.

faciens Davis — ♂ — Am.
Euceros faciens Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 256, ♂.

flavescens Cress. — ♀ ♂ — Am.: Connecticut, Virginia, Illinois.
Euceros flavescens Cresson, Canad. Entomol. I. 1869 p. 105 n. 7, ♀ ♂.
Euceros flavescens Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 257, ♀ ♂.

---

[1] *Lep.:* Cidaria berberaria (Brischke), Thecla quercus (Giraud).

frigidus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Maine, New Hampshire.
Euceros frigidus Cresson, Canad. Entomol. I. 1869 p. 105 n. 5, ♀.
Euceros frigidus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 271 n. 4, ♀.
Euceros frigidus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 426 n. 4, ♀.
Euceros frigidus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 255, ♀ ♂.
medialis Cress. — ♀ — Am.: Canada, United States, California.
Euceros medialis Cresson, Canad. Entomol. I. 1869 p. 105 n. 6, ♀.
Euceros medialis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 271 n. 5, ♀.
Euceros medialis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 427 n. 5, ♀.
Euceros medialis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 256, ♀.
obesus Davis — ♀ — Am.: Illinois.
Euceros obesa Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 255 [♀].
sanguineus Davis — ♀ ♂ — Am.
Euceros sanguineus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 256, ♀ ♂.
superbus Kriechb.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Euceros superbus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 199, ♀ & 353, ♂.
thoracicus Cress. — ♂ — Am.: Canada, Connecticut.
Euceros thoracicus Cresson, Canad. Entomol. I. 1869 p. 105 n. 3, ♂.
Euceros thoracicus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 256, ♂.
unifasciatus Vollenh. — ♀ — Eur.: Suecia, Batavia. [n. 2, ♀.
Eucerus egregius var. Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 201
Eucerus unifasciatus Vollenhoven, Tijdsskr. v. Entom. XXI. 1878 p. 159 n. 7.

SCOLOBATES

Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 357 n. 4.
σχωλοβατίζο, salto.

Synon.: Ichneumon Fabricius.

auriculatus (Fabr.) Holmgr.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota; Am.: Canada, United States.
Ichneumon auriculatus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 69 n. 82.
Scolobates crassitarsus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 360 n. 230, ♀ ♂.
Scolobates crassitarsus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 269 n. 1.
Scolobates crassitarsus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 310 n. 1.
Scolobates crassitarsus Westwod, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 7.
Scolobates crassitarsus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 237 n. 1, ♀ ♂.
Scolobates auriculatus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Handl. XV. 1858 p. 330 n. 25.
Scolobates auriculatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 154
Scolobates auriculatus Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 74, ♀ ♂. [n. 1, ♀ ♂.
Scolobates crassitarsus Kriechbaumer, Entom. Nachr. III. 1877 p. 134, ♀ ♂.
Scolobates crassitarsus R. v. Stein, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 103-106.
Prionopoda Canadensis Harrington, Canad. Entomol. XXIV. 1892 p. 98, ♀.
Scolobates crassitarsus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 264, ♀.
hylotomae Kriechb.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Scolobates hylotomae Kriechbaumer, Entom. Nachr. III. 1877 p. 135, ♀ ♂.
intrudens Smith — ♀ — Austr.: New Zealand.
Scolobates intrudens Smith, Trans. Entom. Soc. London 1878 p. 3, ♀.
Scolobates intrudens Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 127, ♀.

---

1) *Lep.:* Callimorpha dominula (Kriechbaumer).
2) *Lep.:* Smerinthus ocellatus. — *Hymen.:* Hylotoma pagana (Bouché), H. rosae (Giraud).
3) *Hymen.:* Hylotoma berberidis (Kriechbaumer).

longicornis Grav. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Scolobates longicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 359 n. 229, ♀.
Scolobates longicornis Kriechbaumer, Entom. Nachr. III. 1877 p. 149, ♀.
Scolobates longicornis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1265 n. 1, ♀.
marshallii Voll. — ♂ — Eur.: Pyrenaei montes. F. 1 & 1a.
Scolobates Marshalli Vollenhoven, Tijdskr. v. Entom. XXI. 1878 p. 166 n. 13, ♂; T. 10
nigripennis Sich. — ♂ — Eur.: Sicilia.
Scolobates nigripennis Sichel, Ann. soc. entom. France (3) VIII. 1860 p. 758, ♂.
variicornis Cam. — ♂ — Am.: Guatemala. [T. 12 F. 5.
Scolobates ? varicornis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 50. 1886 Hymen. I. p. 310 n. 1, ♂;
variipes Smith — ♀ — Austr.: New Zealand.
Scolobates varipes Smith, Trans. Entom. Soc. London 1878 p. 3, ♀.
Scolobates varipes Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 126, ♀.
Scolobates varipes Hudson, Entomologist XVII. 1884 p. 171.
Scolobates varipes W. W. Smith, Entom. M. Magaz. XXXVI. 1900 p. 160.

PRIONOPODA

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 120.
πρίων, serra; πούς pes.

Synon.: Prionopus Billberg, Enum. Insect. 1820 p. 100 [s. descr.].
Mesoleptus Gravenhorst & auct.
Tryphon Zetterstedt.

acanthomera (Dalm.) D. T. — Eur.: Suecia.
Prionopus acanthomerus Dalman, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XLVI. 1825 p. 393; T. 5 F. 18.
Prionopoda acanthomera m.
beginii Ashm. — ♀ — Am.: Canada.
Prionopoda Beginii Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 198, ♀.
Prionopoda Beginii Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 253, ♀.
glabra Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Prionopoda glaber Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 360, ♀ ♂.
stictica (Fabr.) Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 333 n. 27.
? Ichneumon apicarius Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 402 n. 27.
? Ichneumon apicarius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 189 n. 170.
? Ichneumon apicarius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 208 n. 11.
Ichneumon sticticus Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 229 n. 205-6 [p. p.].
Cryptus sticticus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 89 n. 83 [p. p.].
Ichneumon sticticus Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 285 [p. p.].
Ichneumon stictator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 260 [p. p.].
Ichneumon stictator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 309 [p. p.].
Mesoleptus sticticus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 682.
Mesoleptus sticticus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 31 n. 19, ♀ ♂.
? Ichneumon apicarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1075 n. 308.
Mesoleptus sticticus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 216 n. 16.
Tryphon testaceus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 387 n. 17.
Mesoleptus sticticus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 212 n. 2, ♀ ♂.
Priopoda sticticus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 63. [♀ ♂.
Prionopoda stictica Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 120 n. 1,

---

[1]) *Hymen.:* Tenthredo repanda, Hylotoma ustulata (Brischke).

Prionopoda stictica Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 50; T. 31 F. 6 & 7.
Prionopoda stictica Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 71, ♂.
Perilissus (Prionopoda) sticticus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 912 n. 6, ♂.

xanthopsana (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Mesoleptus xanthopsanus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 59 n. 37, ♀ ♂.
Prionopoda xanthopsanus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 63 n. 2, ♀.
Prionopoda xanthopsana Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 121 [n. 2, ♀ ♂.
Prionopoda xanthopsana Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 50; T. 31 F. 8.
Perilissus (Prionopoda) xanthopsanus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 912 n. 7.

ECZETESIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 196 n. 7.
ἐκζήτησις, exquisitio.

Synon.: Paniscus Ashmead.

paniscoides (Ashm.) Davis — ♀ — Am.: Canada, New York.
Perilissus paniscoides Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 197, ♀ [excl. ♂].
Eczetesis paniscoides Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 253, ♀.

PHRUDUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 196 n. 6.
Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 360.
φροῦδος, qui disparuit.

monilicornis Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Phrudus monilicornis Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 361, ♀ ♂.
Phrudus monilicornis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1258 n. 1.

SYMPHERTA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 196 n. 5.
συμφερτός, confertus.

Synon.: Mesoleptus Provancher.
Tryphon Cresson.

burra (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Connecticut.
Tryphon burrus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 108, ♀.
Sympherta burrus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 252, ♀ ♂.

unicolor (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, Pennsylvania, Delaware.
Mesoleptus unicolor Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 271 n. 28, ♀.
Mesoleptus unicolor Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 229 n. 18, ♀ ♂.
Mesoleptus unicolor Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 402 n. 18, ♂.
Sympherta ? unicolor Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 253, ♀.

OETOPHORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 196 n. 4.
οἰέτης, aequalis; *φέρω*, fero.

Synon.: Mesoleius Cresson.

nasonii Davis — ♀ — Am.: Illinois.
Oetophorus Nasoni Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 251, ♀.

oculatus Davis — ♀ — Am.: Texas.
Oetophorus oculatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 252, ♀.

osflavus Davis — ♀ — Am.: Michigan.
Oetophorus osflavus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 252, ♀.
stretchii (Cress.) Davis — ♀ (♂) — Am.: California, Colorado.
Mesoleius Stretchii Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 371.
Oetophorus Stretchi Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 252, ♀ (♂).

XANIOPELMA

Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 443.
ξάνιον, pecten; *πέλμα*, planta pedis.

sericans Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Xaniopelma sericans Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 444 n. 5, ♀♂.

CTENOPELMA

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 117.
κτείς, pecten; *πέλμα*, planta pedis.

Synon.: Mesoleptus Provancher.
Tryphon Gravenhorst, Stephens.

affine Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Ctenopelma affinis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 118 n. 4, ♂.
Ctenopelma affinis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 378.
athimi Kriechb. — ♀ — Eur.: Belgia.
Ctenopelma Athimi Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 362, ♀.
boreale Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 10, ♀.
Ctenopelma borealis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 120
defectivum Tschek — ♂ — Eur.: Austr. inf.
Ctenopelma defectiva Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 443 n. 4. ♂.
fuscipenne Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia. [n. 5, ♂.
Ctenopelma fuscipennis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 118
Ctenopelma fuscipennis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 69, ♂.
Ctenopelma fuscipennis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 71, ♂.
indotatum Davis — ♀ ♂ — Am.: Texas.
Ctenopelma indotata Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 250, ♀ ♂.
lapponicum Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 6, ♀ ♂.
Ctenopelma Lapponica Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 119
luteum Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Ctenopelma lutea Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 117 n. 2, ♂.
nigricorne (Prov.) Harrgt. — ♀ — Am.: Canada.
Mesoleptus nigricornis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 99 n. 36, ♀.
Ctenopelma nigricornis Harrington, Canad. Entomol. XXIV. 1892 p. 99.
Ctenopelma nigricornis Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 189.
Ctenopelma nigricornis Davis, Canad. Entomol. XXVII. 1895 p. 289.
Ctenopelma nigricornis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 250, ♀.
nigrum Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Ctenopelma nigra Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 120 n. 9, ♂.
Ctenopelma nigra Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 69, ♂.
Ctenopelma nigra Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 71, ♂.
primosum Davis — ♂ — Am.: Texas.
Ctenopelma primosa Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 250, ♂.

pulchrum Ashm. — ♂ — Am.: Massachusetts.
Ctenopelma pulchra Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1896 p. 198, ♂.
ruficorne Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 8, ♀ ♂.
Ctenopelma ruficornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 119
sanguineum Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Delaware, New Jersey, Montana, Idaho,
Tryphon sanguineus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 118, ♀. [Washington.
Ctenopelma sanguinea Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 248, ♂.
Ctenopelma sanguinea Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 406, ♂.
Ctenopelma sanguinea Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 251, ♀ ♂.
spectabile Rdw. — Eur.: Germania.
Ctenopelma spectabilis Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 34.
variabile Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Ctenopelma variabilis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 440 n. 3, ♀ ♂.
ventrator (Grav.) Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleptus ventrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 105 n. 64, ♂.
Ctenopelma ventrator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 71, ♂.
verticinum Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ctenopelma verticina Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 925 n. 1, ♀.
xanthostigma Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [p. 118 n. 3, ♀ ♂.
Ctenopelma xanthostigma Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.)

LABROCTONUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 195 n. 2.
λάβρος. vehemens; *κτείνω*, interficio.

Synon.: Tryphon Cresson.

articulatus (Cress.) Davis — ♀ — Am.: Hudson Bay.
Tryphon articulatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 110, ♀.
Labroctonus articulatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 249, ♀.

RHORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 195 n. 1.
ῥωρός, vehemens.

Synon.: Ctenopelma Holmgren.
Ischyrocnemis Harrington.
Mesoleptus Cresson.
Prionopoda Ashmead.
Tryphon Gravenhorst.

bicolor (Cress.) Davis — ♂ — Am.: Pennsylvania, New York, Michigan.
Mesoleptus bicolor Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 269 n. 25, ♂.
Prionopoda ruficornis Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 198, ♂.
Rhorus bicolor Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 249, ♂.
conspicuus Kriechb. — ♂ — Eur.: Germania.
Rhorus conspicuus (Förster) Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 249, ♂!
mesoxanthus (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Tryphon punctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 692.
Tryphon mesoxanthus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 233 n. 152, ♂.
Tryphon punctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 326 n. 213, ♂.
Tryphon mesoxanthus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 248 n. 47.
Ctenopelma mesoxantha Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 117
[n. 1, ♀ ♂.

osflavus Davis — ♀ — Am.: Michigan.
Oetophorus osflavus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 252, ♀.
stretchii (Cress.) Davis — ♀ (♂) — Am.: California, Colorado.
Mesoleius Stretchii Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 371.
Oetophorus Stretchi Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 252, ♀ (♂).

XANIOPELMA

Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 443.
ξάνιον, pecten; *πέλμα*, planta pedis.

sericans Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Xaniopelma sericans Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 444 n. 5, ♀♂.

CTENOPELMA

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 117.
κτείς, pecten; *πέλμα*, planta pedis.

Synon.: Mesoleptus Provancher.
Tryphon Gravenhorst, Stephens.

affine Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Ctenopelma affinis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 118 n. 4, ♂.
Ctenopelma affinis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 378.
athimi Kriechb. — ♀ — Eur.: Belgia.
Ctenopelma Athimi Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 362, ♀.
boreale Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 10, ♀.
Ctenopelma borealis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 120
defectivum Tschek — ♂ — Eur.: Austr. inf.
Ctenopelma defectiva Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 443 n. 4. ♂.
fuscipenne Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia. [n. 5, ♂.
Ctenopelma fuscipennis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 118
Ctenopelma fuscipennis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 69, ♂.
Ctenopelma fuscipennis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 71, ♂.
indotatum Davis — ♀ ♂ — Am.: Texas.
Ctenopelma indotata Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 250, ♀ ♂.
lapponicum Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 6, ♀ ♂.
Ctenopelma Lapponica Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 119
luteum Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Ctenopelma lutea Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 117 n. 2, ♂.
nigricorne (Prov.) Harrgt. — ♀ — Am.: Canada.
Mesoleptus nigricornis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 99 n. 36, ♀.
Ctenopelma nigricornis Harrington, Canad. Entomol. XXIV. 1892 p. 99.
Ctenopelma nigricornis Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 189.
Ctenopelma nigricornis Davis, Canad. Entomol. XXVII. 1895 p. 289.
Ctenopelma nigricornis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 250, ♀.
nigrum Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Ctenopelma nigra Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 120 n. 9, ♂.
Ctenopelma nigra Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 69, ♂.
Ctenopelma nigra Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 71, ♂.
primosum Davis — ♂ — Am.: Texas.
Ctenopelma primosa Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 250, ♂.

pulchrum Ashm. — ♂ — Am.: Massachusetts.
Ctenopelma pulchra Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1896 p. 198, ♂.
ruficorne Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n.8, ♀ ♂.
Ctenopelma ruficornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 119
sanguineum Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Delaware, New Jersey, Montana, Idaho,
Tryphon sanguineus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 118, ♀. [Washington.
Ctenopelma sanguinea Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 248, ♂.
Ctenopelma sanguinea Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 406, ♂.
Ctenopelma sanguinea Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 251, ♀ ♂.
spectabile Rdw. — Eur.: Germania.
Ctenopelma spectabilis Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 34.
variabile Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Ctenopelma variabilis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 440 n. 3, ♀ ♂.
ventrator (Grav.) Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleptus ventrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 105 n. 64, ♂.
Ctenopelma ventrator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 71, ♂.
verticinum Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ctenopelma verticina Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 925 n. 1, ♀.
xanthostigma Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [p. 118 n. 3, ♀ ♂.
Ctenopelma xanthostigma Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.)

LABROCTONUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 195 n. 2.
λάβρος, vehemens; κτείνω, interficio.

Synon.: Tryphon Cresson.

articulatus (Cress.) Davis — ♀ — Am.: Hudson Bay.
Tryphon articulatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 110, ♀.
Labroctonus articulatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 249, ♀.

RHORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 195 n. 1.
ῥωρός, vehemens.

Synon.: Ctenopelma Holmgren.
Ischyrocnemis Harrington.
Mesoleptus Cresson.
Prionopoda Ashmead.
Tryphon Gravenhorst.

bicolor (Cress.) Davis — ♂ — Am.: Pennsylvania, New York, Michigan.
Mesoleptus bicolor Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 269 n. 25, ♂.
Prionopoda ruficornis Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 198, ♂.
Rhorus bicolor Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 249, ♂.
conspicuus Kriechb. — ♂ — Eur.: Germania.
Rhorus conspicuus (Förster) Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 249, ♂!
mesoxanthus (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Tryphon punctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 692.
Tryphon mesoxanthus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 233 n. 152, ♂.
Tryphon punctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 326 n. 213, ♂.
Tryphon mesoxanthus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 248 n. 47.
Ctenopelma mesoxantha Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 117
[n. 1, ♀ ♂.

Ctenopelma mesoxantha Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 69, ♀.
Ctenopelma mesoxantha Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 71, ♀.
Rhorus mesoxanthus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 247 n. 6.
Rhorus punctus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 247.
Tryphon punctus R. Stein, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 102, ♀ ♂.
Tryphon mesoxanthus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 203 n. 1, ♂.
Tryphon punctus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 204 n. 3.

ottawensis (Harrgt.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Ischyrocnemis Ottawensis Harrington, Canad. Entomol. XXIV. 1892 p. 98, ♀.
Rhorus Ottawensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 249, ♀.

21. *Subfam.* Cteniscinae

Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 875-880.
Exenterinae Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 144 & 194.

ACTENONYX

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 195 n. 11.
ἀκτή, eminentia quaedam; ὄνυξ, unguis.
Species exstat.

EXYSTON

Schiödte, Magas. de zool. IX. P. 6-10. 1839 p. 12 nota.
Etymol. obscura.

Synon.: Cteniscus Cresson.
Exenterus Holmgren.
Ichneumon Gravenhorst.
Mesoleptus Gravenhorst.

abdominalis (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: United States.
Cteniscus abdominalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 264 n. 3, ♀.
Exyston abdominalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 239, ♀ ♂.

var. **rufinus** Davis — ♀ ♂ — Am.: New Hampshire, New York, Massachusetts.
Exyston abdominalis var. rufinus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 239, ♀ ♂.

articulatus Davis — ♀ ♂ — Am.: United States.
Exyston articulatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 239, ♀ ♂.

boreotis Davis — ♀ ♂ — Am.: Colorado, Hudsons Bay Terr.
Exyston boreotis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 238, ♀ ♂.

brevipetiolatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 21, ♀ ♂ [non Grav.].
Exenterus triangulatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Hand. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 235.
Exyston brevipetiolatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 883 n. 5.

calcaratus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Exyston calcaratus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 883 n. 4, ♀ ♂.

carinatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Exyston carinatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 882 n. 2, ♀ ♂.

cinctulus (Grav.) Schiödte — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Italia.
Ichneumon cinctulus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 359 n. 107, ♂.
Mesoleptus cinctulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 37 n. 23, ♂.
Mesoleptus cinctulus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 218 n. 20.
Exyston cinctulus Schiödte, Magas. de zool. IX. P. 6-10. 1839 p. 12 nota.

Exyston cinctulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 73 n. 1, ♀.
Exyston cinctulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 246 n. 1, ♀ ♂.
Exyston cinctulus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 99, ♀ ♂.
Exyston cinctulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 106, ♂.
Exyston cinctulus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 882 n. 1.

clavatus Cress. — ♀ ♂ — Am.: United States.
Ctenicus clavatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 284 n. 5, ♂.
Exyston clavatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 113, ♀ ♂.
Mesoleptus maculosus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 114.
Exyston clavatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 249 n. 2, ♀.
Exyston clavatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 407 n. 2, ♀.
Exyston abdominalis Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 197.
Exyston clavatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 238, ♂.

contractus Davis — ♂ — Am.: Nevada, Washington.
Exyston contracta Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 238, ♂.

excelsus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Colorado, Montana, California.
Ctenicus excelsus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 262 n. 1, ♀.
Exyston excelsus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 237, ♀ ♂.

flavens Davis — ♀ — Am.: Texas.
Exyston flavens Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 237, ♀.

genalis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Exyston genalis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 883 n. 3, ♀ ♂.

humeralis Davis — ♂ — Am.: Canada.
Exyston humeralis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 239, ♂.

marginatus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Exyston marginatum Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 99 n. 3, ♀.
Exyston marginatum Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 236, ♀.

nigreo Davis — ♂ — Am.: Colorado, Washington Terr.
Exyston nigreo Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 236, ♂.

nigroscutum Davis — ♂ — Am.: Colorado.
Exyston nigroscutum Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 237, ♂.

politus Davis — ♀ — Am.: California.
Exyston politus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 240, ♀.

speciosus Davis — ♂ — Am.: Washington Terr., Colorado.
Exyston speciosus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 237, ♂.

variatus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Exyston variatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 249 n. 1, ♀.
Exyston variatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 407 n. 1, ♀.
Exyston variatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 240, ♀ ♂.

variegatus Prov. — Am.: Canada.
Exyston variegatum Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 15.

venustus (Cress.) Davis — ♀ — Am.: Colorado.
Ctenicus venustus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 263 n. 2, ♀.
Exyston venustus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 240, ♀.

ANECPHYSIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 195 n. 9.
ἀ-priv.; ἔκφυσις, germinatio.

curvineura Davis — ♂ — Am.: New York, Illinois.
Anecphysis curvineura Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 234, ♂.

ANDERIS

Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 234.
ἄνδηρον, terra suggesta.

Synon.: Ctenisc us Walsh, Cresson, Provancher.

albilineata (Walsh) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, Michigan, Colorado, Illinois.
Ctenisous albilineatus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 107, ♂.
Ctenisous apicatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 263 n. 1, ♂.
Ctenisous apicatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 421 n. 1, ♂.
Anderis albilineatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 233, ♀ ♂.
californica (Cress.) Davis — ♂ — Am.: California.
Ctenisous Californicus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 374, ♂.
Anderis Californicus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 233, ♂.

EXCAVARUS

Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 227 & 233.
ex, cavus.

Synon.: Ctenisc us Cresson.

annulipes (Cress.) Davis — ♂ — Am.: Massachusetts, Illinois.
Ctenisous annulipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 112, ♂.
Excavarus annulipes Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 233, ♂.
vitticollis (Cress.) Davis — ♂ — Am.: Massachusetts.
Ctenisous vitticollis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 113, ♂.
Excavarus vitticollis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 233, ♂.

DIABORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 195 n. 8.
Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 882.
διαβόρος, permordens.

Synon.: Ctenisc us Haliday, Cresson, Brischke.
Exenterus Schiödte, Holmgren, Vollenhoven.
Ichneumon Linné & auct. ant.
Tryphon Gravenhorst & auct. plur.

dorsalis (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Ctenisous dorsalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 282 n. 2, ♂.
Diaborus dorsalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 232, ♀.
filipalpis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Diaborus filipalpis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 889 n. 4, ♀ ♂.
frontalis Thoms. — ♂ — Eur.: Suecia.
Diaborus frontalis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 889 n. 2, ♂.
ignipes Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, New Hampshire.
Diaborus ignipes Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 231, ♀ ♂.
lituratorius (L.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon lituratorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 400 n. 1594.
Ichneumon lituratorius Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 932 n. 17.

---

[1]) *Hymen.:* Dineura rufa, Nematus pavidus, Selandria spec. (Brischke).

Ichneumon lituratorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 848 n. 17.
Ichneumon lituratorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 153 n. 1780.
Ichneumon lituratorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 146 n. 35.
Ichneumon lituratorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2681 n. 17.
Ichneumon lituratorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 343.
Ichneumon lituratorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 173 n. 45.
Ichneumon lituratorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 285.
Ichneumon lituratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279.
Ichneumon lituratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 360.
Tryphon scalaris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 149 n. 96, ♂.
Tryphon sexlituratus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 159 n. 102, ♀.
Ichneumon lituratorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 948 n. 101.
Tryphon scalaris Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 235 n. 12.
Tryphon sexlituratus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 237 n. 19.
Tryphon lituratorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 389 n. 25, ♀.
Cteniscus sexlituratus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 113.
Exenterus scalaris Schiödte, Magas. de zool. IX. P. 6-10. 1839 p. 12 nota.
Exenterus sexlituratus Schiödte, Magas. de zool. IX. P. 6-10. 1839 p. 12 nota.
Tryphon sexlituratus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 117 n. 31.
Tryphon sexlituratus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 127 n. 47. [♀♂.
Exenterus lituratorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 228 n. 4,
Exenterus lituratorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 388.
Cteniscus lituratorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 97, ♀ ♂.
Cteniscus lituratorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 103, ♀♂.
Exenterus lituratorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 66; T. 42 F. 6.
Diaborus lituratorius Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 889 n. 1.

maculiventris Ashm. — ♀ ♂ — Am.: New Hampshire.
Diaborus maculiventris Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 197, ♂.
Diaborus maculiventris Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 230, ♀ ♂.

mediatus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, Illinois, Michigan.
Cteniscus mediatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 282 n. 1, ♂.
Cteniscus mediatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 263 n. 2, ♀.
Cteniscus mediatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 421 n. 2, ♀.
Diaborus mediatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 231, ♀ ♂.

nebraskensis Davis — ♂ — Am.: Nebraska.
Diaborus Nebraskensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 232, ♂.

nigrifrons Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Diaborus nigrifrons Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 889 n. 5, ♀ ♂.

nigrocephalus Davis — ♀ — Am.: Georgia.
Diaborus nigrocephalus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 232, ♀.

ornatus (Walsh) Davis — ♂ — Am.: Illinois, New Hampshire.
Exenteron ornatus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 105, ♂.
Diaborus ornatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 232, ♂.

palliditarsis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Diaborus pallitarsis Thomson, Opusc. Entom. P. 9. 1883 p. 889 n. 3, ♀ ♂.

sedulus Woldst. — ♂ — Eur.: Russia. [n. 10, ♂.
Cteniscus (Diaborus) sedulus Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXIII. 1877 p. 455

similis Davis — ♀ (♂) — Am.: Colorado, Montana.
Diaborus similis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 231, ♀ (♂).

PICROSCOPUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 195 n. 7.
Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 882.
πικρός, acerbus; σκοπέω, speculor.

Synon.: Exenterus Holmgren.
Tryphon Gravenhorst, Blanchard.

canadensis (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Exenterus Canadensis Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 9, ♀ ♂.
Exenterus Canadensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 796.
Picroscopus Canadensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 229, ♀ ♂.

hullensis (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Exenterus Hullensis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 104 n. 2, ♀ ♂.
Picroscopus Hullensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 230, ♂.

ictericus (Grav.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Tryphon ictericus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 208 n. 135, ♀.
Tryphon ictericus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 308 n. 8.
Exenterus ictericus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 72 n. 2, ♀.
Exenterus ictericus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 235
Picroscopus ictericus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 888 n. 1. [n. 22, ♀.

EXENTERUS

Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 270.
ἐξεντερίζω, viscera eximo.

Synon.: Ctenisсus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 113.
κτενίον, pectunculus.
Cryptus Fabricius.
Ichneumon Fabricius.
Tryphon Gravenhorst & auct.

adspersus Htg.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Exenterus adspersus Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. 2. 1838 p. 271 n. 3.
Exenterus adspersus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 108 n. 3.
Tryphon (Exenterus) adspersus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 112 n. 3.
Tryphon (Exenterus) adspersus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 121 n. 3.
Exenterus lepidus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 231 n. 10, ♀.
Ctenisсus adspersus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 97, ♀ ♂.
Ctenisсus lepidus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 104, ♀ ♂.

albicoxa (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ctenisсus albicoxa Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 891 n. 4, ♀.
Exenterus albicoxa m.

alpicola Holmgr.[2]) — ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 28, ♂.
Exenterus alpicola Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 237
Ctenisсus alpicola Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 106, ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Lophyrus pini, L. rufus (Hartig), L. pallidus (Brischke).
[2]) *Hymen.:* Tenthredo spec. (Brischke).

anceps (Steph.) D. T. — Eur.: Britannia.
Tryphon anceps Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 243 n. 34.
Ctenisous anceps Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 78 n. 17.
Exenterus anceps m.

antennatorius Schdte. — Eur.: Dania.
Exenterus antennatorius Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 11, nota.

approximatus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia, Belgia.
Exenterus approximatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 239 [n. 31, ♂.
Ctenisous approximatus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 107.

aurifluus (Hal.) D. T. — ♀ ♂ — Eur: Britannia.
Tryphon (Ctenisous) aurifluus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 113, ♀ ♂.
Exenterus aurifluus m.

autumnalis (Brischke) D. T.[1]) — ♂ — Eur.: Germania.
Ctenisous autumnalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 105, ♂.
Exenterus autumnalis m.

bimaculatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Exenterus bimaculatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 72 n. 3, ♂.
Exenterus bimaculatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 245 [n. 47, ♀ ♂.
Ctenisous bimaculatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 99, ♂.
Ctenisous bimaculatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 106, ♂.

bohemanii Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Batavia.
Exenterus Bohemani Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 226 [n. 1, ♀ ♂.
Exenterus Bohemani Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 388.
Exenterus Bohemani Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 66; T. 42 F. 4.

borealis Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Exenterus borealis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 236 [n. 23, ♀ ♂.
Ctenisous borealis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 98, ♀ ♂.

brevigena (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ctenisous brevigena Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 893 n. 13, ♀.
Exenterus brevigena m.

breviventris (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ctenisous breviventris Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 890 n. 1.
Exenterus breviventris m.

caudatus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Exenterus caudatus Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 11, ♀ ♂.
Exenterus caudatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 796, ♀ ♂.

cingulatorius Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Tryphon marginatorius var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 193, ♀.
Exenterus cingulatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 229 [n. 6, ♀.
Exenterus cingulatorius Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 887 n. 2, ♀ ♂.
Ctenisous cingulatorius Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 104.

claripennis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Exenterus claripennis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 887 n. 5, ♀ ♂.

clypeatus (Cress.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Oregon, Colorado, Hudson Bay Terr., New [Hampshire.
Ctenisous clypeatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 113, ♀.
Ctenisous clypeatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 264 n. 3, ♀.
Ctenisous clypeatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 422 n. 3.

---

[1]) *Hymen.:* Nematus spec. (Pinus Larix) (Brischke).

Ctenicus clypeatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 228, ♀ ♂.
Exenterus clypeatus m.

connatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 27, ♀ ♂.
Exenterus connatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 237

consobrinus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 15, ♀ ♂.
Exenterus consobrinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 232
Exenterus consobrinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 388.

consors (Cress.) D. T. — ♀ — Am.: Canada, Connecticut, New Hampshire, Toronto, Texas, [Nevada.
Tryphon frontalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 109, ♀.
Ctenicus consors Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 113, ♀.
Ctenicus concors Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 264 n. 4, ♀.
Ctenicus consors Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 422 n. 4.
Ctenicus consors Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 228, ♀.
Exenterus consors m.

crassipes (Prov.) D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Ctenicus crassipes Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 109 n. 7, ♀.
Exenterus crassipes m.

curtisii (Hal.) D. T. — ♀ — Eur.: Britannia.
Tryphon (Ctenicus) Curtisii Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 113, ♀.
Ctenicus Curtisii Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 57.
Exenterus Curtisii m.

dahlbomii Holmgr. — ♀ — Eur.: Britannia, Suecia. [n. 40, ♀.
Exenterus Dahlbomi Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 242

deletus (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ctenicus deletus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 894 n. 14, ♀.
Exenterus deletus m.

elegans (Steph.) D. T. — Eur.: Britannia.
Tryphon elegans Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 239 n. 24.
Ctenicus elegans Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 78 n. 11.
Exenterus elegans m.

erosus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Exenterus erosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 227 n. 3, ♀.
Ctenicus erosus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 97, ♀.
Ctenicus erosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 103, ♀.
Exenterus erosus Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 66; T. 42 F. 5.
Ctenicus erosus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 434.

exstirpatorius (Grav.) Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Gallia, Belgia.
Tryphon exstirpatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 213 n. 139, ♀ ♂.
Tryphon exstirpatorius Drewsen, Arch. f. Naturg. II. 1. 1836 p. 37 n. 3.
Tryphon extirpatorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 224 n. 16, ♀ ♂.
Ctenicus exstirpatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 98, ♀ ♂.
? Monoblastus exstirpatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 [p. 95, ♀ ♂.
Ctenicus exstirpatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 106, ♂.
Ctenicus exstirpatorius Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 107.

flavellus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Exenterus flavellus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 887 n. 6, ♀.

---

1) *Hymen.:* Nematus Wittewallii (Brischke).

flavicoxae (Cress.) Walsh — ♀ ♂ — Am: Canada, Delaware, Massachusetts, Illinois.
Cteniscus flavicoxae Cresson, Proc. Entom. Philadelphia III. 1864 p. 284 n. 4, ♀.
Exenteron flavicoxus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 105, ♂.
Cteniscus flavicoxae Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 109 n. 6, ♀.
Cteniscus flavicoxae Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 229, ♀ ♂.
flavilabris Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Exenterus flavilabris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 237 [n. 26, ♀ ♂.
Exenterus flavilabris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 388.
frigidus Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Exenterus frigidus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 239 [n. 33, ♀.
Cteniscus frigidus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 98, ♀ ♂.
Cteniscus frigidus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 106, ♀ ♂.
fulvipes Kriechb. — ♂ — Eur.: Belgia.
Exenterus fulvipes Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 369, ♂.
funebris Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Exenterus funebris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3 (Tryph.) p. 233 n. 17, ♂.
genalis (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cteniscus genalis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 894 n. 15, ♀ ♂.
Exenterus genalis m.
geniculosus Schiödte — ♀ — Eur.: Suecia, Dania, Germania.
Exenterus geniculosus Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 11 nota.
Exenterus geniculosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 241 [n. 36, ♀ ♂.
Cteniscus geniculosus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 98, ♀.
Cteniscus geniculosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 106, ♀.
gibbulus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Exenterus gibbulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 231 [n. 11, ♀ ♂.
gibbus Ratzbg.[2] — ♀ — Eur.: Germania.
Exenterus gibbus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 108 n. 5, ♀.
Tryphon (Exenterus) gibbus Ratzeburg, Ichnem. d. Forstinsect. II. 1848 p. 112 n. 5.
Tryphon (Exenterus) gibbus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 121 n. 5.
gnathoxanthus (Grav.) Schiödte[3] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Tryphon gnathoxanthus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 147 n. 94, ♀.
Cteniscus gnathoxanthus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 113.
Exenterus gnathoxanthus Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 12 nota.
Exenterus gnathoxanthus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 231 [n. 12, ♀ ♂.
Cteniscus gnathoxanthus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 98, ♀ ♂.
Cteniscus gnathoxanthus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 105, ♀ ♂.
Cteniscus gnathoxanthus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 105.
gracilis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Exenterus gracilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 233 n. 18, [♀ ♂.
hostilis Holmgr. — ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Exenterus hostilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 239 n. 32, ♂.
laricinus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Exenterus laricinus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1254 n. 1, ♀.
limbatellus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Exenterus limbatellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 241 [n. 38, ♀ ♂.

---

[1] *Hymen.:* Nematus fulvus, N. ventricosus (Brischke).
[2] *Hymen.:* Nematus spec. (Ratzeburg).
[3] *Hymen.:* Selandria pubescens (Brischke).

Cteniscus limbatellus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 99, ♀.
Cteniscus limbatellus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 106, ♀.
Cteniscus limbatellus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 434.
Cteniscus limbatellus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 62, ♀.
limbatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Tryphon mitigosus var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 259, ♀.
Exenterus limbatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 72 n. 4, ♀ ♂.
Exenterus limbatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 241 [n. 37, ♀ ♂.
Exenterus limbatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 389, ♀ ♂.
Cteniscus limbatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 98, ♀ ♂.
lineiger (Thoms.) D. T. — ♂ — Eur.: Suecia. [n. 30, ♂ [non Gravenhorst].
Exenterus exstirpatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 238
Cteniscus lineiger Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 894, ♂.
Exenterus lineiger m.
macrocephalus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia. [n. 42, ♂.
Exenterus macrocephalus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 243
marginatorius (Fabr.) Htg.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon marginatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 145 n. 48.
Ichneumon amictorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 80 T. 14.
Cryptus marginatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 76 n. 24.
Bassus amictorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 74.
Ichneumon amictorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♀.
Ichneumon marginatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110, ♂.
Ichneumon marginatorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284.
Ichneumon amictorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 285.
Ichneumon marginatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279.
Ichneumon marginatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 362.
Tryphon marginatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 191 n. 125 [excl. var. 2].
Cryptus marginatorius Trentepol, Isis 1829 p. 864 n. 39.
Tryphon marginatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 242 n. 33.
? Monoblastus mergator Hartig, Arch. f. Naturg. III. P. 1. 1837 p. 155.
Exenterus marginatorius Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. 2. 1838 p. 270 n. 1.
Exenterus marginatorius Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6–10. p. 12 nota.
Tryphon marginatorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 308 n. 7.
Tryphon (Exenterus) marginatorius Ratzeburg, Forstinsecten III. 1844 p. 26 n. 16; T. 6 F. 11.
Exenterus marginatorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1848 p. 107 n. 1; T. 1 F. 7 & [T. 6 F. 11.
Tryphon (Exenterus) marginatorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 112 n. 1.
Tryphon marginatorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 222 n. 13.
Tryphon (Exenterus) marginatorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 121 n. 1.
Exenterus marginatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 71 n. 1, ♂.
Exenterus marginatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 230 [n. 9, ♀ ♂.
Cteniscus marginatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 97, ♀ ♂.
Cteniscus marginatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 104, ♀ ♂
Exenterus marginatorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 66; T. 42 F. 8.
Exenterus marginatorius Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 887 n. 3.
Cteniscus marginatorius Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 105.

---

[1]) *Hymen.:* Lophyrus pini (Brischke).

marginatus (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ctenicus marginatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 892 n. 10, ♀ ♂.
Exenterus marginatus m.

mesoleptoides (Steph.) D. T. — ♀ — Eur.: Britannia.
Tryphon mesoleptoides Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 245 n. 38, ♀.
Ctenicus mesoleptoides Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 78 n. 4.
Exenterus mesoleptoides m.

merio Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Exenterus morio Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 233 n. 16, ♀ ♂.

nigricarpus Costa — ♀ — Eur.: Italia.
Tryphon nigricarpus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli I. 2. 1863 p. 39, ♀; T. 2 F. 12.
Cteniscus nigricarpus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 211 n. 4, ♀.
Exenterus nigricarpus A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli (2) II. 1888 p. 109.
Exenterus nigricarpus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 2. 1888 p. 12.

orbitalis (Cress.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Pennsylvania.
Cteniscus orbitalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 283 n. 3, ♂.
Cteniscus orbitalis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 110 n. 8, ♀.
Cteniscus orbitalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 229, ♀.
Exenterus orbitalis m.

oriolus Htg.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Exenterus oriolus Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. 2. 1838 p. 270 n. 2, ♀ ♂.
Tryphon (Exenterus) oriolus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 112 n. 2.
Tryphon (Exenterus) oriolus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 121 n. 2.
Cteniscus oriolus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 98, ♀ ♂.
Cteniscus oriolus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 104, ♀ ♂.
Exenterus oriolus Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 66; T. 42 F. 9.

pachysoma (Steph.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia, Germania.
Tryphon pachysoma Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VIII. 1835 p. 245 n. 39.
Tryphon colorator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 388 n. 23, ♀.
Exenterus colorator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 234 n. 20, ♀.
Cteniscus colorator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 105, ♂.
Cteniscus colorator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 61, ♀.
Exenterus pachysoma m.

phaeorrhoeus (Hal.) D. T. — ♂ — Eur.: Britannia.
Tryphon (Cteniscus) phaeorrhoeus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 113, ♂.
Exenterus phaeorrhoeus m.

pictus (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Dania, Germania.
Tryphon pictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 288 n. 192 (♀).
Exenterus similatorius Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 10 nota.
Exenterus pictus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 238 n. 29, ♀ ♂.
Cteniscus pictus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 98, ♀ ♂.
Cteniscus pictus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 892 n. 9.
Cteniscus pictus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 62, ♂.
Cteniscus pictus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 42, ♂.

praeustus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Exenterus praeustus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 242 [n. 39, ♀ ♂.
Cteniscus praeustus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 99, ♀.
Cteniscus praeustus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 42, ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Lophyrus pini, L. variegatus, L. frutetorum (Ratzeburg).

pratorum Woldst. — ♂ — Eur.: Fennia.
Exenterus pratorum Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur & Folk XXI. 1872 p. 52 n. 13, ♂.
pullus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀ ♂.
Exenterus pullus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 232 n. 14,
pumilio Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Exenterus pumilio Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 240 n. 34, ♀.
Cteniscus pumilio Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1255 n. 2.
pumilus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Exenterus pumilus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 240 n. 35, ♀.
Cteniscus pumilus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1255 n. 9.
punctipes (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ctenisous punctipes Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 892 n. 8, ♀ ♂.
Exenterus punctipes m.
punctipleuris (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ctenisous punctipleuris Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 893 n. 12, ♀.
Exenterus punctipleuris m.
quadrinotatus (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Ctenisous quadrinotatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 892 n. 6, ♀.
Exenterus quadrinotatus m.
quinquecinctus (Grav.) D. T. — ♂ — Eur.: Britannia, Belgia, Italia.
Ichneumon quinquecinctus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 372 n. 125, ♂.
Tryphon quinquecinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 165 n. 106, ♂.
Tryphon quinquecinctus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 239 n. 23.
Ctenisous quinquecinctus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 113.
Tryphon quinquecinctus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 219 n. 7, ♂.
Exenterus quinquecinctus m.
rufilabris Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia. [n. 25, ♂.
Exenterus rufilabris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 236
rufonotatus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia. [n. 41, ♀.
Exenterus rufonotatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 243
schiödtei Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [♀.
Exenterus Schiödtei Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 243 n. 43
Exenterus Zetterstedti Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 244
Ctenisous Schiödtei Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 892 n. 7. [n. 44, ♂.
sexcinctus (Grav.) Schiödte[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Tryphon sexcinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 164 n. 105, ♂?
Tryphon sexcinctus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 238 n. 22.
Ctenisous sexcinctus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 118.
Exenterus sexcinctus Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 12 nota.
Tryphon sexcinctus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 219 n. 6.
Exenterus sexcinctus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 229 n. 7, ♀.
Ctenisous sexcinctus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 97, ♀.
Ctenisous sexcinctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 104, ♀.
signifer (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ctenisous signifer Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 893 n. 11, ♀ ♂.
Exenterus signifer m.
similis Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Exenterus similis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 232 n. 13, ♀.

---

[1]) *Hymen.:* Dineura alni (Brischke).

simplex Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Exenterus simplex Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 887 n. 4, ♀.

subnitidus (Grav.) D. T. — ♂ — Eur.: Britannia.
Tryphon subnitidus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 144 n. 91, ♂.
Tryphon subnitidus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 234 n. 11.
Ctenisсus subnitidus Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 78 n. 10.
Exenterus subnitidus m.

succinctus (Grav.) Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Tryphon succinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 688.
Tryphon succinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 166 n. 107, ♂?
Tryphon marginellus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 167 n. 108, ♀.
Ctenisсus succinctus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 113.
Tryphon succinctus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 128 n. 9, ♂.
Tryphon succinctus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 116 n. 23.
Tryphon succinctus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 220 n. 8, ♂.
Tryphon succinctus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 220 n. 9, ♀.
Tryphon marginellus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 124 n. 30, ♀.
Exenterus succinctus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 230 n. 8, ♀.
Ctenisсus succinctus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 97, ♀ ♂.
Ctenisсus succinctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 104, ♀ ♂.
Ctenisсus succinctus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 891 n. 2.
Ctenisсus succinctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 61, ♀.
Ctenisсus succinctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 42, ♀.

t-nigrum (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ctenisсus T-nigrum Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 891 n. 5, ♀ ♂.
Exenterus T-nigrum m.

triangulatorius (Grav.) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Tryphon triangulatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 205 n. 133, ♂.
Ctenisсus triangulatorius Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 113.
Exenterus triangulatorius m.

umbellatarum Woldst. — ♀ — Eur.: Fennia.
Exenterus umbellatarum Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur & Folk XXI. 1872 p. 51 n. 10, ♀.

unicinctus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Exenterus unicinctus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 234 [n. 19, ♀ ♂.

ustulatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Exenterus ustulatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 236 n. 24, [♀ ♂.
Ctenisсus ustulatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 891 n. 3.

xanthostigma Rdw.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ctenisсus (Exenterus) xanthostigma Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 62 n. 13, ♀ ♂.

xanthostoma Rdw.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ctenisсus (Exenterus) xanthostoma Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 62 n. 14, ♀ ♂.

zonellus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Exenterus zonellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 244 n. 45, [♂.

---

1) *Hymen.:* Lophyrus pini, L. frutetorum (Ratzeburg), Nematus cheilon (Brischke).
2) *Lep.:* Lycaena spec. (Rudow).
3) *Hymen.:* Cimbex sericea (Rudow).

MICROPLECTRON

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 195 n. 5.
μικρός, parvus; *πλῆκτρον*, plectrum.

Synon.: Smicroplectron Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 882.
σμικρός, parvus; *πλῆκτρον*, plectrum.
Campoplex Bridgman.
Cteniscus Bridgman.
Exenterus Holmgren.

costulatum Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Lapponia.
Smicroplectrus costulatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 888 n. 2, ♀.
Campoplex costulatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVIII. 1885 p. 17, ♂.
Campoplex costulatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 346.

jucundum (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Belgia. [♀ ♂.
Exenterus jucundus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 227 n. 2,
Smicroplectrus jucundus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 888 n. 1.
Ctenisous jucundus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 434.
Ctenisous jucundus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 102.

ERIDOLIUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 195 n. 4.
Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 882.
ἐρι, valde; *δολόεις*, dolosus.

Synon.: Exenterus Holmgren.

pygmaeus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 46, ♀.
Exenterus pygmaeus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 245
Exenterus pygmaeus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 389.
Eridolius pygmaeus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 889 n. 1, ♀ ♂.

TRICAMPTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 194 n. 3.
Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 886.
τρεῖς, tres; *καμπτός*, flexus.

Synon.: Ctenisous Brischke.
Exenterus Schiödte, Holmgren, Vollenhoven.
Tryphon Gravenhorst, Stephens.

apiarius (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Dania, Germania, Belgia.
Tryphon apiarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 196 n. 126, ♀ ♂.
Tryphon apiarius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 242 n. 35, ♀ ♂.
Exenterus apiarius Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 12 nota. [♀ ♂.
Exenterus apiarius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 228 n. 5,
Ctenisous apiarius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 97, ♀.
Ctenisous apiarius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 104, ♀.
Exenterus apiarius Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 66; T. 42 F. 7.
Exenterus (Tricamptus) apiarius Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 886 n. 8 [recte 1].
Ctenisous apiarius Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 103.

ANISOCTENION

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 194 n. 2.
ἄνισος, inaequalis; *κτείνω*, interficio.

Species exstat.

ACROTOMUS

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 222.
ἄκρος, acer; τέμνω, seco.

Synon.: Delotomus (Holmgren) Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 884.
δέλος = δέλεαρ, esca; τομός, scindus.
Ctenisous Haliday.
Exenterus Schiödte, Ratzeburg.
Tryphon Gravenhorst, Stephens, Ratzeburg.

auriculatus (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Delotomus auriculatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 884 n. 2, ♀ ♂.
Acrotomus auriculatus m.

binotatus (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Oelandia.
Delotomus binotatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 886 n. 8, ♀ ♂.
Acrotomus binotatus m.

calcaratus (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Delotomus calcaratus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 885 n. 6, ♀.
Acrotomus calcaratus m.

cephalotes (Grav.) D. T.[1]) — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Tryphon cephalotes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 246 n. 159.
Tryphon cephalotes Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 250 n. 54.
Ctenisous cephalotes Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 113.
Exenterus cephalotes Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 12 nota.
Tryphon cephalotes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 115 n. 15, ♀ ♂.
Acrotomus orbitatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 223 [n. 3, ♀♂ [non Schiödte].
Delotomus cephalotes Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 885 n. 4, ♀.
Acrotomus cephalotes m.

coarctatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Acrotomus coarctatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 224 n. 5, [♀♂.
Delotomus coarctatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 885 n. 5, ♀.

insidiator Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Acrotomus insidiator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 224 [n. 4, ♀.
Acrotomus insidiator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 388.
Acrotomus insidiator Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 66; T. 42 F. 3.

laticeps (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Tryphon laticeps Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 214 n. 140 (♂).
Delotomus laticeps Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 884 n. 3, ♀ ♂.
Acrotomus laticeps m.

lucidulus (Grav.) Holmgr.[2]) — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Tryphon lucidulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 162 n. 104, ♀.
Tryphon lucidulus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 238 n. 21, ♀.
Ctenisous lucidulus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 113, ♀.
Exenterus lucidulus Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 12 nota.
Exenterus lucidulus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 108 n. 4, ♀.
Tryphon (Exenterus) lucidulus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 112 n. 4.
Exenterus lucidulus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 107.

---

[1]) *Hymen.:* Nematus ribesii (Rondani).
[2]) *Hymen.:* Cladius difformis, Cl. albipes (Brischke).

Tryphon (Exenterus) lucidulus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 121 n. 4.
Acrotomus lucidulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 222 [n. 1, ♀♂.
Acrotomus lucidulus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 96, ♀♂.
Acrotomus lucidulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 103, ♀♂.
Acrotomus lucidulus Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 66; T. 42 F. 1.
Delotomus lucidulus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 884 n. 1, ♀.

marginatus (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Oelandia.
Delotomus marginatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 885 n. 7, ♀ ♂.
Acrotomus marginatus m.

orbitatorius Schdte. — ♀ ♂ — Eur.: Dania, Germania.
Exenterus orbitatorius Schiödte, Magas. de zool. IX. P. 6-10. 1839 p. 11 nota.
Acrotomus orbitatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 97, ♀♂.
Acrotomus orbitatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 103, ♀♂.
Acrotomus orbitatorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 66; T. 42 F. 2.

parvulus (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Oelandia.
Delotomus parvulus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 886 n. 9, ♀ ♂.
Acrotomus parvulus m.

rufus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Cteniscus rufus Provancher, Natural. Canad. VIII. 1876 p. 318.
Cteniscus rufus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 265 n. 5, ♀.
Cteniscus rufus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 423 n. 5, ♀.
Acrotomus rufus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 190.
Delotomus rufus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 227, ♀.

xanthopus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Acrotomus xanthopus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 223 [n. 2, ♂.
Acrotomus xanthopus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 103, ♂.

22. *Subfam.* Mesoleptinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 144 & 197.

AMPHIBULUS

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 122.
ἀμφίβουλος, dubiosus.

gracilis Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Amphibulus gracilis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 122, ♂.

PSEUDOCRYPTUS

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 120.
ψευδής, mendax; Cryptus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Cryptus Gravenhorst, Stephens, Taschenberg, Bridgman & Fitch.

grisescens (Grav.) Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Cryptus grisescens Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 464 n. 29, ♂.
Cryptus grisescens Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 280 n. 10.
Cryptus grisescens Taschenberg, Zeitsch. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 78 n. 27, ♂.
Cryptus grisescens Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 278 n. 20, ♂.
Cryptus ? grisescens Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150, ♀ ♂.
Pseudocryptus grisescens Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1894 p. 120, ♀ ♂.

EURYPROCTUS

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 109.
εὐρύς, latus; πρωκτός, anus, nates.

Synon.: Ichneumon Geoffroy, Fourcroy, Gravenhorst.
Mesoleptus Gravenhorst, Stephens, Holmgren.
Tryphon Gravenhorst, Fonscolombe.

aberrans Woldst. — ♀ — Eur.: Germania.
Euryproctus aberrans Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 400 n. 30, ♀.

affinis Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleptus affinis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 66 n. 7, ♀.
Euryproctus affinis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 112 n. 10, ♀.

albipes Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 5, ♀ ♂.
Euryproctus albipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 110
Euryproctus tuberculatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 111
Euryproctus albipes Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 926 n. 1. [n. 6, ♀.
Euryproctus albipes Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1435 n. 3.
Euryproctus albipes Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1985 n. 4.

albocinctus Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Euryproctus albocinctus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 328, ♀.

albopictus (Grav.) Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Tryphon albopictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 255 n. 166, ♂.
Euryproctus albopictus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 114.
Euryproctus albopictus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 59.

albopunctus Davis — ♀ ♂ — Am.: New Hampshire.
Euryproctus albopunctus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 328, ♀ ♂.

alpinus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia. [n. 4, ♂.
Euryproctus alpinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 110
Euryproctus alpinus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 56.

annulatus (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia.
Mesoleptus annulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 11 n. 2, ♀.
? Mesoleptus annulator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 223 n. 33, ♀.
Euryproctus annulatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 109
[n. 1, ♀.
Euryproctus annulatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 377.
Euryproctus annulatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 68, ♂.
Euryproctus annulatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 69, ♀.
Euryproctus annulatus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 55,
Euryproctus annulatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 40 n. 1, ♀ ♂. [♀ ♂.
Euryproctus annulatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 60, ♀.
Euryproctus annulatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1985 n. 1.

arbustorum Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 13, ♀ ♂.
Euryproctus arbustorum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 113

bituminosus Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Euryproctus bituminosus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 328, ♀.

coxalis Costa — Eur.: Sardinia.
Euryproctus coxalis A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli (2) II. 1888 p. 106.
Euryproctus coxalis A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 2. 1888 p. 6; T. 2 F. 6.

crassicornis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Euryproctus crassicornis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1433 n. 1, ♀ ♂.
Euryproctus crassicornis Thomson, Opusc. entom. P 19. 1895 p. 1985 n. 2.

curvator Davis — ♂ — Am.: Canada, Hudson Bay Terr., New Hampshire.
Euryproctus curvator Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 329, ♂.
dakotaensis Davis — ♂ — Am.: Dakota.
Euryproctus Dakotaensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 330, ♂.
defectivus (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania, Belgia.
Ichneumon defectivus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 366 n. 114, ♀.
Mesoleptus defectivus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 77 n. 44, ♀.
Mesoleptus defectivus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 224 n. 36, ♀.
? Mesoleptus defectivus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 65 n. 6, ♂.
? Euryproctus defectivus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 112 [n. 11, ♂.
Euryproctus defectivus Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur & Folk XXI. 1872 p. 36 n. 5, ♀.
Euryproctus defectivus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 58.
Euryproctus defectivus Kriechbaumer, Termész. Füzet. XIX. 1895 p. 130, ♀ ♂.
exareolatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Euryproctus exareolatus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1435 n. 4, ♀ ♂.
Euryproctus exareolatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1985 n. 5, ♀ ♂.
foersteri Kriechb. — ♂ — Eur.: Patria ?
Euryproctus Foersteri Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII. 1897 p. 165, ♂.
inferus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Euryproctus inferus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1435 n. 6, ♀.
Euryproctus inferus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1985 n. 7.
luridator (Grav.) Marsh. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania, Italia.
Ichneumon luridator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 379 n. 119, ♀.
Mesoleptus luridator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 109 n. 59, ♀ ♂.
Mesoleptus luridator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 228 n. 48.
Euryproctus luridator Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1870 p. 68 n. 11.
Ctenopelma luridator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 71, ♂.
minutus Bridgm. — ♂ — Eur.: Britannia.
Euryproctus minutus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 358, ♂.
moyenii (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, New Hampshire.
Mesostenus longicornis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 300 [non Cresson].
Tryphon Moyeni Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 120.
Mesoleptus longipes Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 271.
Mesoleptus Moyeni Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 223 n. 3, ♀ ♂.
Mesoleptus Moyeni Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 796 n. 3, ♀ ♂.
Euryproctus Moyeni Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 329, ♀ ♂.
mundus (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia, Italia.
Ichneumon mundus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 367 n. 115, ♀ ♂.
Mesoleptus mundus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 78 n. 45, ♀ ♂.
Mesoleptus mundus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 224 n. 37.
Mesoleptus mundus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 65 n. 5, ♂.
Euryproctus mundus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 111 [n. 8, ♀.
Euryproctus bivinctus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 113 [n. 12, ♂.
Euryproctus mundus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 68, ♀ ♂.
Euryproctus mundus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 69, ♂.
Euryproctus mundus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 926 n. 2, ♀ ♂.
Euryproctus mundus Thomson, Opusc. entom. P. 13 1889 p. 1436 n. 7, ♀ ♂.

Euryproctus mundus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 57.
Euryproctus mundus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1985 n. 8.

nemoralis (Fourcr.) Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. insect. II. 1762 p. 350 n. 65.
Ichneumon nemoralis Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 416 n. 66.
Ichneumon nemoralis Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 285.
Ichneumon nemoralis Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 363 n. 113, ♂.
Mesoleptus nemoralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 70 n. 42, ♀ [excl. ♂].
Mesoleptus nemoralis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 222 n. 31, ♀ [excl. ♂].
Mesoleptus nemoralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 65 n. 4, ♀.
Euryproctus nemoralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 110 n. 3, ♀.
Euryproctus nemoralis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 68, ♀.
Euryproctus nemoralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 69, ♀.
Euryproctes nemoralis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1434 n. 2.
Euryproctus nemoralis Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 56.
Euryproctus nemoralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 60, ♀.
Euryproctus nemoralis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1985 n. 3, ♀ ♂.

var. **suborbitalis** Steph. — Eur.: Britannia.
Mesoleptus suborbitalis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 222 n. 32.
Euryproctus nemoralis var. suborbitalis Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1870 p. 68 n. 11.

nitidulus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Euryproctus nitidulus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1436 n. 9, ♀.
Euryproctus nitidulus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1985 n. 10.

notatus (Grav.) Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Tryphon notatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 690.
Tryphon notatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 261 n. 169, ♀ ♂.
Tryphon notatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 254 n. 66.
Polyblastus notatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 75 n. 6, ♂.
Euryproctus notatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 68, ♀ ♂.
Euryproctus notatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 70, ♀ ♂.
Euryproctus notatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 158.

parvulus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Euryproctus parvulus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 926 n. 3, ♀ ♂.
Euryproctus parvulus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1436 n. 8.
Euryproctus parvulus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1985 n. 9.

petiolatus Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Euryproctus petiolatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 328, ♀.

puritanicus Davis — ♀ — Am.: Massachusetts.
Euryproctus puritanicus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 330, ♀.

ramis Davis — ♀ — Am.: Colorado.
Euryproctus ramis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 329, ♀.

regenerator (Fabr.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Austria.
Cryptus regenerator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 83 n. 51.
Ichneumon regenerator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon regenerator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 299.
Mesoleptus regenerator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 75 n. 43, ♀.

---

[1]) *Hymen.:* Tenthredo scalaris (Brischke).

Ichneumon regenerator Trentepol, Isis 1829 p. 945 n. 59, ♀.
Mesoleptus regenerator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 224 n. 35, ♀.
Euryproctus regenerator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 111 [n. 7, ♀ ♂.
Euryproctus regenerator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 68, ♀.
Euryproctus regenerator Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1435 n. 5.
Euryproctus regenerator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1985 n. 5.

rufoniger (Grav.) Holmgr. — ♀ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia, Italia.
Ichneumon rufoniger Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 368 n. 116, ♀.
Mesoleptus rufoniger Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 684, ♀.
Mesoleptus rufoniger Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 80 n. 46, ♀.
Mesoleptus rufoniger Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 224 n. 38, ♀.
Euryproctus rufoniger Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 111 n. 9, ♀.
Euryproctus rufoniger Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 57.

rufopictus Davis — ♀ — Am.: Texas.
Euryproctus rufopictus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 330, ♀.

sessilis Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Euryproctus sessilis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 329, ♀.

sexannulatus Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Euryproctus sexannulatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 41 n. 2, ♀.

sinister Brischke[1]) — ♀ — Eur.: Germania.
Euryproctus sinister Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 68, ♀.
Euryproctus sinister Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 70, ♀.
Euryproctus sinister Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 357.

sintinis Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Euryproctus sintinis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 330, ♀.

socius Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Euryproctus socius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 109 n. 2, ♀.

vafer Woldst. — ♂ — Eur.: Fennia.
Euryproctus vafer Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur & Folk XXI. 1872 p. 35 n. 4, ♂.

waltonii (Curt.) Marsh. — ♂ — Eur.: Britannia.
Euryproctus Waltoni Curtis, Brit. Entom. XIV. 1837 p. 644, ♂; T. 644.
Euryproctus Waltonii Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 68 n. 5.

CLEPSIPORTHUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 200 n. 35.
Etymol. obscura.

Synon.: Mesoleius Cresson.
Mesoleptus Cresson.

assiduus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Massachusetts, Montana.
Mesoleptus assiduus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 97, ♂.
Clepsiporthus assiduus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 326, ♀ ♂.

flavidus Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Clepsiporthus flavidus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 326, ♀.

rubiginosus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: California, Washington, Moscow, Idaho, [Lawrence, Virginia, Kansas.
Mesoleius ? rubiginosus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 372, ♂.
Clepsiporthus rubiginosus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 326, ♀ ♂.

---

[1]) *Hymen.*: Eriocampa varipes (Bridgman).

truncatus Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, Montana.
Clepsiporthus truncatus Davis, Trans. Amer. Entom Soc. XXIV. 1897 p. 326, ♀ ♂.

ASYMMICTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 200 n. 34.
ἀ-priv.; σύμμικτος, commiscuus.

iridescens Davis — ♀ — Am.: Nevada.
Asymmictus iridescens Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 325, ♀.
nigrifrons Davis — ♀ — Am.: Michigan.
Asymmictus nigrofrons Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 325, ♀.

NELEOTHYMUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 200 n. 33.
νηλεής, immisericors; θύμος, thymus.

Species exstat.

DIEDRUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 200 n. 32.
δίεδρος, dissidens.

areolatus Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Diedrus areolatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 324, ♀.
labradorensis Davis — ♀ — Am.: Labrador.
Diedrus Labradorensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 324, ♀.

GENARCHES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 200 n. 31.
γένα, gentis auctor; ἀρχή, principium.

Species exstat.

HIMERTA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 200 n. 30.
ἱμερτός, desiderabilis.

Synon.: Himertus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 926.
Euryproctus Holmgren, Thomson.
Mesoleptus Holmgren, Jacobs & Tosquinet.
Tryphon Gravenhorst, Fonscolombe.

bisannulata Thoms. — ♂ — Eur.: Suecia.
? Mesoleptus defectivus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 65 n. 6, ♂.
? Euryproctus defectivus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 112 [n. 11, ♂.
Euryproctus (Himertus) bisannulatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 927 n. 4.
Himertus bisannulatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1985 n. 1.
varilcornis (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Gallia.
Tryphon varicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 325 n. 211, ♀.
Tryphon varicornis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 233 n. 29.
Euryproctus (Himertus) varicornis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 927 n. 5, ♀ ♂.
Mesoleptus varicornis Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 76, ♂.

TEROZOA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 200 n. 29.
Etymol. obscura.
Species exstat.

ZEMIODES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 200 n. 28.
ζημιώδης, damnosus.

Synon.: Mesoleptus Cresson.

coloradensis Davis — ♀ ♂ — Am.: Colorado.
Zemiodes Coloradensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 323, ♀ ♂.
flavifrons (Cress.) Davis — ♂ — Am.: New Jersey.
Mesoleptus flavifrons Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 269 n. 24, ♂.
Zemiodes flavifrons Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 324, ♂.
magnicornis Davis — ♂ — Am.: Washington Terr.
Zemiodes magnicornis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 324, ♂.

SYMPHOBUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 199 n. 27.
συν-, cum; φόβος, timor.

Synon.: Tryphon Cresson.

pleuralis (Cress.) Davis — ♀ — Am.: New Jersey.
Tryphon pleuralis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 275.
Symphobus pleuralis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 323, ♀.

OXYTORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 199 n. 26.
Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 910.
ὀξυτόρος, acutus.

Synon.: Mesoleptus Cresson.

antennatus (Cress.) Davis — ♂ — Am.: Delaware, Virginia, Louisiana.
Mesoleptus antennatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 272 n. 30, ♂.
Mesoleptus facetus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 100, ♂.
Oxytorus antennatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 323, ♂.
armatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Oxytorus armatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 910 n. 1, ♀ ♂.

ALEXETER

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 199 n. 25.
Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1884 n. 5.
ἀλεξήτηρ, defensor.

Synon.: Bassus Fabricius.
Ichneumon Fabricius, Gravenhorst.
Mesoleius Holmgren, Brischke, Thomson.
Mesoleptus Gravenhorst, Stephens, Holmgren, Brischke, Vollenhoven.
Paniscus Provancher.
Tryphon Gravenhorst, Stephens, Zetterstedt.

alacer (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Tryphon alacer Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 132 n. 78, ♂.
Tryphon alacer Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 233 n. 6, ♂.
Mesoleius alacer Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 150 n. 45, ♂.
Mesoleius alacer Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 49 n. 124, ♂.
Mesoleius (Alexeter) alacer Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2026 n. 26, ♀ ♂.
albilabris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius (Alexeter) albilabris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2025 n. 25, ♀ ♂.
antennatus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada, New Hampshire.
Mesoleius antennatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 260 n. 6, ♀.
Mesoleius antennatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 418 n. 6, ♀.
Alexeter antennatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 321, ♀.
canaliculatus (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Paniscus canaliculatus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 105.
Mesoleptus canaliculatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 230 n. 21, ♂.
Mesoleptus canaliculatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 403 n. 21, ♂.
Alexeter canaliculatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 322, ♀ ♂.
compos Davis — ♂ — Am.: Canada.
Alexeter compos Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 321, ♂.
fallax (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [♀♂.
Mesoleius fallax Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 168 n. 89,
Mesoleius fallax Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 82, ♂.
Mesoleius fallax Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 42 n. 106, ♀♂.
Mesoleius fallax Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 87, ♂.
Mesoleius (Alexeter) fallax Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2025 n. 24, ♀ ♂.
gracilentus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 3, ♀♂.
Mesoleptus gracilentus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 101
Mesoleius gracilentus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 49 n. 127, ♀♂.
Mesoleptus gracilentus Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 41; T. 26 F. 3.
Mesoleius (Alexeter) gracilentus Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1885 n. 23, ♀ ♂.
honestus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Mesoleptus honestus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 98, ♀ ♂.
Mesoleptus honestus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 227 n. 12, ♂.
Mesoleptus honestus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 400 n. 12, ♂.
Alexeter honestus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 321, ♀ ♂.
luteifrons (Cress.) Davis — ♂ — Am.: Slave Lake.
Mesoleptus luteifrons Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 99, ♂.
Alexeter luteifrons Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 322, ♂.
melanocephalus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Mesoleptus melanocephalus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 682.
Mesoleptus melanocephalus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 28 n. 16, ♂.
Mesoleptus melanocephalus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 216 n. 13.
Tryphon (Mesoleptus) melanocephalus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 387 n. 16, ♀♂.
Mesoleptus melanocephalus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.)
[p. 100 n. 1, ♀♂.
Mesoleptus melanocephalus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 65, ♀♂.
Mesoleius melanocephalus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 49
[n. 125, ♀♂.
Mesoleptus melanocephalus Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 41; T. 26 F. 1.
Mesoleptus melanocephalus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 65, ♀♂.

Mesoleius melanocephalus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 83.
Mesoleius (Alexeter) melanocephalus Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1884 n. 21, ♀♂.

notatus Davis — ♂ — Am.: Oregon.
Alexeter notatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 321, ♂.

ruficornis (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Mesoleptus ruficornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 43 n. 26, ♀ ♂.
Mesoleptus sordidus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 36 n. 13, ♂.
Mesoleptus ruficornis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 219 n. 22.
Mesoleptus ruficornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 67 n. 12, ♀.
Mesoleptus ruficornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 101 n. 4, ♀.
Mesoleptus ruficornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 65, ♀♂.
Mesoleptus lugubris Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur & Folk XXI. 1872 p. 31 n. 5, ♀.
Mesoleius ruficornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 50 n. 128, ♀♂.
Mesoleptus ruficornis Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 41; T. 26 F. 4.
Mesoleptus ruficornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 65, ♀♂.
Mesoleius ruficornis Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 85.
Mesoleius (Alexeter) ruficornis Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1885 n. 24, ♀ ♂.

var. **comptus** (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesoleius comptus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 165 n. 84, ♂.
Mesoleius comptus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 82, ♀ ♂.
Mesoleius comptus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 34, ♂.
Mesoleius (Alexeter) ruficornis var. comptus Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1886.

var. **mutator** (Zett.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Tryphon (Mesoleptus) mutator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 387 n. 15, ♀ ♂.
Mesoleptus ruficornis var. mutator Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 65 n. 3.
Alexeter ruficornis var. mutator m.

seminiger (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Paniscus seminiger Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 107.
Mesoleptus seminiger Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 230 n. 20, ♀ ♂.
Mesoleptus seminiger Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 403 n. 20.
Alexeter seminiger Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 322, ♀ ♂.

testaceus (Fabr.) Thoms.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon clavator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 156 n. 1820.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 67 n. 303.
? Ichneumon venosus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2709 n. 354.
Ichneumon testaceus Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 228 n. 189-190.
Ichneumon clavator Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 295 n. 2112, ♂.
Bassus testaceus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 101 n. 31.
Ichneumon testaceus Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 285.
Ichneumon testaceator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 260.
Ichneumon testaceator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 308.
Mesoleptus testaceus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 682.
Mesoleptus testaceus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 28 n. 17, ♀ ♂.
Mesoleptus testaceus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 216 n. 14.
Tryphon (Mesoleptus) testaceus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 387 n. 17, ♀ ♂.
Tryphon (Mesoleptus) testaceum Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 307 n. 2.
Mesoleptus testaceus Boie, Naturh. Tidsskr. III. 1841 p. 323 n. 10. [n. 2, ♀♂.
Mesoleptus testaceus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 101

---

[1]) *Lep.:* Eupithecia castigata (Bignell), E. absynthiata (Giraud). — *Hymen.:* Croesus septentrionalis (Ratzeburg), Tenthredo scalaris (Boie).

Mesoleius testaceus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XIII. P. 12. 1876 p. 49 n. 126, ♀♂.
Mesoleptus testaceus Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 41; T. 26 F. 2.
Mesoleptus testaceus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 65, ♂.
Mesoleius (Alexeter) testaceus Thomson, Opusc. entom. P. 17. 1892 p. 1885 n. 22, ♀ ♂.

HADRODACTYLUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 199 n. 24.
Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 918.
ἁδρός, maturus; δάκτυλος, digitus.

Synon.: Ichneumon Gravenhorst.
Mesoleptus Gravenhorst.
Perilissus Brischke.
Tryphon Zetterstedt.

albicoxa Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hadrodactylus albicoxa Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 921 n. 14, ♀.
Mesoleptus (Hadrodactylus) albicoxa Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1980 n. 16.
bidentulus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleptus typhae Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1043 n. 253 [p. p.].
Hadrodactylus bidentulus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 919 n. 1, ♀ ♂.
Mesoleptus (Hadrodactylus) bidentulus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1978 n. 1.
confusus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Tryphon vulneratus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 287 n. 18 [p. p.].
Mesoleptus confusus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 376 [n. 15-16, ♀♂.
Mesoleptus confusus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 68, ♀♂.
Hadrodactylus confusus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 921 n. 12.
Mesoleptus (Hadrodactylus) confusus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1980 n. 14.
elongatus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, Massachusetts, Michigan, Nevada.
Mesoleptus elongatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 96, ♀.
Tryphon annulatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 119.
Mesoleptus annulatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 224 n. 4, ♀.
Mesoleptus annulatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 397 n. 4, ♀.
Hadrodactylus elongatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 319, ♀ ♂.
var. **coxatus** Davis — ♀ ♂ — Am.: New York, Michigan, Dacota.
Hadrodactylus elongatus var. coxatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 320, [♀♂.
var. **femoratus** Davis — ♀ ♂ — Am.: New York, Michigan, Colorado, Idaho.
Hadrodactylus elongatus var. femoratus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 320, [♀♂.
erythropus Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleptus typhae var. 5 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1043 n. 253.
Hadrodactylus erythropus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 140, ♀ ♂.
femoralis (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ichneumon indefessus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 364 n. 111, ♀.
Mesoleptus typhae var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 64 n. 39, ♀.
Mesoleptus indefessus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 222 n. 30, ♀.
Mesoleptus femoralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 105 [n. 15, ♀♂.
Mesoleptus femoralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 376.
Mesoleptus femoralis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 66, ♀♂.
Mesoleptus femoralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 68, ♀.
Hadrodactylus femoralis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 920 n. 8.

Mesoleptus femoralis Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 50.
Mesoleptus (Hadrodactylus) femoralis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1979 n. 8.

fugax (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia.
Mesoleptus fugax Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 56 n. 34, ♂.
Mesoleptus fugax Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 220 n. 27, ♂.
Mesoleptus fugax Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 213 n. 3.
Mesoleptus fugax Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 104 n. 12, ♀ ♂.
Mesoleptus fugax Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 66, ♀ ♂.
Mesoleptus fugax Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 41; T. 26 F. 8.
Mesoleptus fugax Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 67, ♀ ♂.
Hadrodactylus fugax Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 921 n. 15.
Mesoleptus fugax Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 49.
Mesoleptus (Hadrodactylus) fugax Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1980 n. 17.

genalis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hadrodactylus genalis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 921 n. 10, ♀ ♂.
Mesoleptus (Hadrodactylus) genalis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1979 n. 12.

gracilipes Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleptus typhae Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1043 n. 253 [p. p.].
Hadrodactylus gracilipes Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 920 n. 5, ♀ ♂.
Mesoleptus (Hadrodactylus) gracilipes Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1978 n. 5.

gracilis (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Mesoleptus gracilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 66 n. 9, ♀ ♂.
Mesoleptus gracilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 103 n. 8, ♀ ♂.
Mesoleptus gracilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 375.
Mesoleptus gracilis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 66, ♀ ♂.
Hadrodactylus gracilis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 921 n. 9.
Mesoleptus gracilis Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 47.
Mesoleptus (Hadrodactylus) gracilis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1979 n. 11.

inceptus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Mesoleptus inceptus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 96, ♀ ♂.
Mesoleptus eximius Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 100, ♂.
Mesoleptus sanctihyacinthi Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 251.
Mesoleptus inceptus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 226 n. 8, ♀ ♂.
Mesoleptus inceptus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 399 n. 8, ♂.
Hadrodactylus inceptus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 319, ♀ ♂.

insignis Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Mesoleptus typhae var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1043 n. 253.
Hadrodactylus insignis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 141, ♂.

larvatus Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleptus typhae var. 3 & 4 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1043 n. 253.
Hadrodactylus larvatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 139, ♀ ♂.

laticeps Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleptus typhae Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1043 n. 253 [p. p.].
Hadrodactylus laticeps Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 920 n. 4, ♀ ♂.
Mesoleptus (Hadrodactylus) laticeps Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1978 n. 4.

longicornis (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Delaware, Massachusetts, Maine, Colorado.
Mesoleptus longicornis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 270 n. 26, ♂.
Hadrodactylus longicornis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 320, ♀ ♂.

nigricoxa Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleptus (Hadrodactylus) nigricoxa Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1979 n. 9, ♀ ♂.

nigrifemur Thoms. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Mesoleptus typhae Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1043 n. 253 [p. p.].
Hadrodactylus nigrifemur Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 920 n. 6, ♀.
Mesoleptus (Hadrodactylus) nigrifemur Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1978 n. 6.
paludicola (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesoleptus typhae var. 5 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 66, ♂.
Mesoleptus paludicola Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 68 n. 14, ♀ ♂.
Mesoleptus paludicola Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 105 [n. 13, ♀ ♂.
Mesoleptus paludicola Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 66, ♀ ♂.
Mesoleptus paludicola Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 67, ♀ ♂.
Hadrodactylus paludicola Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 920 n. 7.
Mesoleptus paludicola Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 5.
Mesoleptus (Hadrodactylus) paludicola Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1978 n. 7.
ruficornis Davis — ♀ — Am.: Montana, Colorado, Nevada.
Hadrodactylus ruficornis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 320, ♀.
seminiger (Grav.) Thoms. — ♀ — Eur.: Britannia, Suecia.
Mesoleptus seminiger Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 93 n. 56, ♀.
Mesoleptus seminiger Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 226 n. 43.
Perilissus seminiger Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 52; T. 33 F. 2.
Hadrodactylus seminiger Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 921 n. 11.
semirufus (Holmgr.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleptus seminiger var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 93 n. 56.
Mesoleptus semirufus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 3. (Tryph.) p. 376 [n. 13-14, ♀.
Mesoleptus (Hadrodactylus) semirufus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1980 n. 13.
tarsator Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleptus typhae Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1043 n. 253 [p. p.].
Hadrodactylus tarsator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 919 n. 2, ♀ ♂.
Mesoleptus (Hadrodactylus) tarsator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1978 n. 2.
typhae (Fourcr.) Kriechb.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 347 n. 58.
Ichneumon typhae Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 413 n. 59.
Ichneumon typhae Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 155 n. 62.
Ichneumon typhae Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 210 n. 22.
Mesoleptus typhae Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 62 n. 39, ♀ ♂ [excl. varr.].
Ichneumon typhae Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1043 n. 253.
Mesoleptus typhae Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 221 n. 29.
Mesoleptus typhae Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 214 n. 4.
Mesoleptus typhae Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 67 n. 13, ♀ ♂.
Mesoleptus typhae Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 104 n. 11, [♀ ♂.
Mesoleptus typhae Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 376; [T. 8 F. 1.
Mesoleptus typhae Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 66, ♀ ♂.
Mesoleptus typhae Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 41; T. 26 F. 6.

---

1) *Vide:* H. bidentulus (Thomson), H. erythropus (Kriechbaumer), H. femoralis (Holmgren), H. gracilipes (Thomson), H. insignis, H. larvatus, H. laticeps (Kriechbaumer), H. nigrifemur (Thomson), H. paludicola (Holmgren, Thomson), H. tarsatus, H. villosulus (Thomson).

Mesoleptus typhae Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 67, ♂.
Mesoleptus typhae Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 48.
Hadrodactylus typhae Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 133 n. 5, ♀ ♂.
Mesoleptus typhae Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 33, ♂.

varlicoxa Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleptus (Hadrodactylus) varicoxa Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1979 n. 10, ♀ ♂.

villosulus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleptus typhae Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1043 n. 253 [p. p.].
Hadrodactylus villosulus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 919 n. 3, ♀ ♂.
Mesoleptus (Hadrodactylus) villosulus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1978 n. 3.

vulneratus (Zett.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Lapponia, Suecia, Germania.
Tryphon (Mesoleptes) vulneratus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 387 n. 18, ♂.
Mesoleptus vulneratus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 102 [n. 6, ♂.
Mesoleptus curtus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 105 [n. 14, ♂.
Mesoleptus vulneratus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 375.
Mesoleptus vulneratus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 66, ♀.
Mesoleptes vulneratus Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 41; T. 26 F. 5.
Mesoleptus vulneratus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 66, ♀.
Hadrodactylus vulnerator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 921 n. 13.
Mesoleptus vulneratus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 32, ♀ ♂.
Mesoleptus (Hadrodactylus) vulnerator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1980 n. 15.

xanthostigma (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia.
Mesoleptus xanthostigma Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 55 n. 33, ♂.
Mesoleptus xanthostigma Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 220 n. 26, ♂.
Mesoleptus xanthostigma Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 64 n. 2, ♂.
Mesoleptus xanthostigma Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 102 [n. 5, ♀ ♂.
Mesoleptus xanthostigma Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 375.
Mesoleptus xanthostigma Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 66, ♂.
Mesoleptus xanthostigma Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 66, ♂.
Perilissus xanthostigma Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 72, ♂.
Hadrodactylus xanthostigma Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 922 n. 17.
Mesoleptus xanthostigma Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 46.
Mesoleptus (Hadrodactylus) xanthostigma Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1980 n. 18.

MESOLEPTUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 3 n. 1.
μέσος, medius; *λεπτός*, tenuis.

Synon.: Campoplex Provancher.
Ichneumon Gravenhorst.
Ischnus Gravenhorst.
Mesoleius Provancher, Cresson.
Mesostenus Provancher.
Paniscus Provancher.
Tryphon Gravenhorst, Stephens, Provancher.

affinis Cress. — ♂ — Am.: Illinois.
Mesoleptus affinis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 263 n. 12, ♂.

albicruris Grav. — ♀ — Eur.
Mesoleptus albicruris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 51 n. 29, ♀.
albifacies Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Mesostenus albifacies Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 362, ♀.
Mesoleptus albifacies Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 187.
albifrons Cress. — ♀ — Am.: Connecticut.
Mesoleptus albifrons Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 98, ♀.
Mesoleptus albifrons Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 316, ♀.
albitarsus Grav. — ♂ — Eur.
Tryphon (Mesoleptus) albitarsus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 10 n. 1, ♂.
albolineatus Grav. — Eur.: Britannia.
Ischnus moestus var. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 653.
Mesoleptus albolineatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 681 n. 15b.
Mesoleptus albolineatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 215 n. 12.
alpestris Cam. — ♂ — Am.: Mexico. [F. 24.
Mesoleptus alpestris Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 282 n. 9, ♂; T. 11
amoenus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 10, ♀ ♂.
Mesoleptus amoenus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 104
Mesoleptus amoenus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 922 n. 3.
Mesoleptus amoenus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1982 n. 4.
anguineus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesoleptus ? anguinea Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 391 n. 9, ♀.
angustus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Mesoleptus angustus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 96 n. 29, ♂.
annulatipes Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Mesoleptus annulatipes Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 96 n. 30, ♂.
annulipes Cam. — ♂ — As.: India or.
Mesoleptus annulipes Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIV. P. 5. 1900 N. 15. p. 103, ♂.
arridens Grav. — ♂ — Eur.: Britannia.
Mesoleptus arridens Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 683 n. 33b, ♂.
Mesoleptus arridens Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 221 n. 28, ♂.
aztecus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Mesoleptus Aztecus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 390 n. 2, ♂.
bardus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Mesoleptus bardus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 34 n. 3, ♂.
bicingulatus Grav. — ♀ ♂ — Eur.
Mesoleptus bicingulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 107 n. 65, ♀ ♂.
bicoloratus Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Mesoleptus bicoloratus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 166, ♂.
biguttulus Grav. — ♀ — Eur.
Mesoleptus biguttulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 89 n. 52, ♀.
bucephalus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Mesoleptus ? bucephalus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 36 n. 7, ♂.
calidus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Mesoleptus calidus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 33 n. 1, ♂.
cerinostomus Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleptus cerinostomus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 61 n. 38, ♂.
cingulatus Grav. [1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Mesoleptus cingulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 22 n. 13, ♂.

---

1) *Hymen.:* Tenthredo scalaris (Brischke).

Mesoleptus cingulatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 215 n.10, ♂.
Mesoleptus cingulatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 211 n. 1.
Mesoleptus cingulatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 67 n. 11, ♀♂.
Mesoleptus cingulatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 103 [n. 9, ♀ ♂.
Mesoleptus cingulatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 375.
Mesoleptus cingulatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 66, ♀ ♂.
Mesoleptus cingulatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 41; T. 26 F. 7.
Mesoleptus cingulatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 67, ♀.
Mesoleptus cingulatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 922 n. 1.
Mesoleptus cingulatus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 48.
Mesoleptus cingulatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 32, ♀♂.

comparatus Cam. — ♂ — Austr.
Mesoleptus comparatus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 P. 1. p. 33, ♂.

compressus Cress. — ♂ — Am.: Pennsylvania.
Mesoleptus compressus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 260 n. 7, ♂.

conjunctus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Mesoleptus conjunctus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 262 n. 10, ♀♂.

coxalis Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleptus coxalis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 65, ♂.
Mesoleptus coxalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 65, ♀ ♂.
Mesoleptus coxalis Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 46.

decens Davis — ♀ ♂ — Am.
Mesoleptus decens Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 316, ♀ ♂.

decipiens Grav. — ♀ — Eur.: Britannia.
Mesoleptus decipiens Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 116 & 848 n. 71, ♀.
Mesoleptus decipiens Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 230 n. 55.

decorosus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Mesoleptus decorosus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 35 n. 6, ♂.

delicatus Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Mesoleptus delicatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 166, ♂.

distinctus Cress. — ♀ — Am.: New Jersey.
Mesoleptus distinctus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 266 n. 17, ♀.

egregius Davis — ♂ — Am.: Washington Terr.
Mesoleptus egregius Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 317, ♂.

emaceratus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Mesoleptus emaceratus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 35 n. 5, ♂.

evanescens Ratzbg.[1]) — ♀ — Eur.: Germania.
Mesoleptus evanescens Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 131 n. 4, ♀.

evanialis Grav. — ♂ — Eur.: Britannia.
Mesoleptus evanialis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 16 n. 9, ♂.
Mesoleptus evanialis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 213 n. 6, ♂.

fasciatus Prov. — ♂ — Am.: Vancouvers Island.
Mesoleptus fasciatus Provancher, Canad. Entomol. XVII. 1885 p. 116, ♂.

flavicornis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Mesoleptus flavicornis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 228 n. 15, ♀.
Mesoleptus flavicornis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 401 n. 15, ♀.

flavovariegatus Luc. — ♂ — Afr.: Algeria.
Mesoleptus flavovariegatus Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 334 n. 400, ♂.

---

1) *Hymen.*: Lophyrus rufus (Klug).

fucatus Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Mesoleptus fucatus Cresson, Natural. Canad. VII. 1877 p. 271 & 331 n. 23, ♀ [non Cresson [1868].
Mesoleptus laetus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 231 n. 22, ♀.
Mesoleptus laetus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 404 n. 22, ♀ [non [Gravenhorst].
fulvipes Grav. — ♂ — Eur.
Mesoleptus fulvipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 57 n. 35, ♂.
fungicola Ashm. — ♂ — Am.: Ohio.
Mesoleptus fungicola Ashmead, Journ. Cincinnati Soc. XVII. 1895 p. 50 n. 8, ♂.
glacialis Woldst. — ♀ — Eur.: Fennia.
Mesoleptus glacialis Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur & Folk XXI. 1872 p. 33 n. 11, ♀.
gracilipes Curt. — Eur.: Britannia.
Mesoleptus gracilipes Curtis, Brit. Entom. XIV. 1837 p. 644 n. 10b.
gracilis Steph. — Eur.: Britannia.
Mesoleptus gracilis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 228 n. 49.
grisescens Grav. — ♂ — Eur.
Mesoleptus grisescens Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 101 n. 60, ♂.
guatemalensis Cam. — ♂ — Am.: Guatemala.
Mesoleptus Guatemalensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 283 n. 11, ♂.
hilarellus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Mesoleptus hilarellus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 377 [n. 16-17, ♀.
hilaris Grav.[1] — ♀ — Eur.
Mesoleptus hilaris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 91 n. 54, ♀.
Mesoleptus hilaris Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 51.
holmgrenii Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleptus Holmgreni Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1982 n. 3, ♀ ♂.
hostilis Cress. — ♂ — Am.: Illinois.
Mesoleptus hostilis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 267 n. 21, ♂.
ignotus Cress. — ♀ — Am.: Virginia.
Mesoleptus ? ignotus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 103, ♀.
imbecillis Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Mesoleptus imbecillis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 34 n. 4, ♂.
infernalis Grav. — ♀ — Eur.: Britannia.
Mesoleptus infernalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 16 n. 8, ♀.
Mesoleptus infernalis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 213 n. 5, ♀.
innoxius Cress. — ♀ ♂ — Am.: Columbia, Nevada, Washington Terr.
Mesoleptus innoxius Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 371, ♂.
Mesoleptus innoxius Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 317, ♀ ♂.
insidiosus Cress. — ♂ — Am.: Massachusetts.
Mesoleptus insidiosus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 98, ♂.
Mesoleptus insidiosus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 316, ♂.
insularis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Cuba.
Mesoleptus insularis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 15, ♀ ♂.
interruptus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Paniscus interruptus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 107.
Mesoleptus interruptus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 225 n. 7, ♀.
Mesoleptus interruptus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 398 n. 7, ♀.
intimatus Davis — ♂ — Am.: Montana, Colorado.
Mesoleptus intimatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 317, ♂.

---

[1]) *Lep.*: Leucania elymi (Gravenhorst).

khasianus Cam. — ♂ — As.: India or.
Mesoleptus Khasianus Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIV. P. 5. 1900 Nr. 15. p. 104, ♂.
laetus Grav. — Eur.: Britannia.
Mesoleptus laetus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 50 n. 28.
Mesoleptus laetus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 219 n. 24.
laurentianus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Tryphon Laurentianus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 118.
Mesoleptus Laurentianus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 228 n. 13, ♂.
Mesoleptus Laurentianus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 401 n. 13, ♂.
lucens Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Campoplex lucens Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 144.
Mesoleptus lucens Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 228 n. 14, ♂.
Mesoleptus lucens Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 401 n. 14, ♂.
macer Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Mesoleptus macer Cresson, Proc. entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 262 n. 3, ♀.
maderensis Woll. — ♂ — Afr.: Madeira.
Mesoleptus Maderensis Wollaston, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) I. 1858 p. 21, ♂; T. 4 F. 1.
marginatus Bridgm.[1]) — ♂ — Eur.: Britannia.
Mesoleptus marginatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 356, ♂.
maurus Grav. — ♀ — Eur.
Mesoleptus maurus Gravenhorst, Ichneum. Europ. 1829 p. 20 n. 11, ♀.
melanobasis Kriechb. — ♂ — Eur.: Belgia.
Mesoleptus melanobasis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 361, ♂.
melleus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Mesoleptus melleus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 34 n. 2, ♂.
mexicanus Cam. — ♂ — Am.: Mexico. [F. 22.
Mesoleptus Mexicanus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 281 n. 4, ♂; T. 11
mirabilis Steph. — ♀ — Eur.: Britannia.
Mesoleptus mirabilis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 223 n. 34, ♀.
montanus Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Mesoleptus montanus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 261 n. 2, ♀.
muelleri White[2]) — Austr.: New Zealand.
Mesoleptus Mülleri White, Butler: Voy. Erebus 1874 p. 27; T. 7 F. 2.
Mesoleptus Mülleri Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 122.
muliebris Cress. — ♂ — Am.: Virginia.
Mesoleptus ? muliebris Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 102, ♂.
Mesoleptus variabilis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 115.
Mesoleptus muliebris Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 227 n. 11, ♂.
Mesoleptus muliebris Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 400 n. 11, ♂.
narrator Grav. — ♂ — Eur.: Britannia.
Mesoleptus narrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 11 n. 3, ♂.
Mesoleptus narrator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 212 n. 1, ♂.
Mesoleptus narrator Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 57.
neglectus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia. [♂.
Mesoleptus neglectus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 103 n. 7,
Mesoleptus neglectus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 375.
Mesoleptus neglectus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 66, ♀.

---

1) *Hymen.:* Eriocampa varipes (Fletcher).
2) *Col.:* Cacoecia gallicola (White).

Mesoleptus neglectus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 47.
Mesoleptus neglectus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 32, ♀.

nigralis Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Mesoleptus nigralis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 314, ♀.

nigripes Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Mesoleptus nigripes Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 267 n. 20, ♀.

nigropleuralis Davis — ♂ — Am.: Nevada.
Mesoleptus nigropleuralis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 317, ♂.

pectoralis Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Mesoleptus pectoralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 21 n. 12, ♀ ♂.
Mesoleptus pectoralis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 214 n. 9.
Mesoleptus pectoralis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1981 n. 1.
Mesoleptus pectoralis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 129.

perditus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Mesoleptus perditus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 97 n. 31, ♂.

peregrinus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Connecticut, New Jersey.
Mesoleptus ? peregrinus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 102, ♀.
Mesoleptus peregrinus Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 7 n. 27, ♀ ♂.
Mesoleptus peregrinus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 794 n. 27, ♀♂.

persimilis Cam. — Am.: Mexico.
Mesoleptus persimilis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 283 n. 10; T. 11 [F. 25.

petiolaris Grav. — ♂ — Eur.
Mesoleptus petiolaris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 110 n. 68, ♂.

pictus Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, Colorado, New Hampshire.
Mesoleptus pictus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 315, ♀ ♂.

porrectus Cress. — ♀ — Am.: Delaware.
Mesoleptus porrectus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 266 n. 18, ♀.

prosoleucus Grav. — ♀ — Eur.: Italia.
Ichneumon prosoleucus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 363 n. 110, ♀.
Mesoleptus prosoleucus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 58 n. 36, ♀.

riparius Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, Michigan.
Mesoleptus riparius Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 315, ♀ ♂.

rufigaster Prov. — ♀ — Am.: Canada, Georgia.
Tryphon rufigaster Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 104 n. 14, ♀.
Mesoleptus rufigaster Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 318, ♀.

rufiventris Grav. — ♀ — Eur.
Mesoleptus rufiventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 90 n. 53, ♀.

rufocinctus Grav. — Eur.: Britannia.
Mesoleptus rufocinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 686 n. 68[b].
Mesoleptus rufocinctus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 229 n. 53.

rufomixtus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Mesoleptus rufomixtus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 97 n. 32, ♀ ♂.

scrupulosus Davis — ♂ — Am.: Nevada, Washington.
Mesoleptus scrupulosus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 318, ♂.

scutellatus Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Mesoleptus scutellatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 356, ♀.

silvaticus Woldst. — ♂ — Eur.: Fennia.
Mesoleptus sylvaticus Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur & Folk XXI. 1872 p. 32 n. 10, ♂.

similis Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Mesoleptus similis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 66, ♀ ♂.

speciosus Curt. — Eur.: Britannia.
Mesoleptus speciosus Curtis, Brit. Entom. XIV. 1837 p. 644 n. 23[b].
spheginus Grav. — ♂ — Eur.: Britannia.
Mesoleptus spheginus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 49 n. 27, ♂.
Mesoleptus spheginus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 219 n. 23.
stålii Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleptus Stålii Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 375 n. 9–10, ♀ ♂.
Mesoleptus Stålii Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 922 n. 2.
Mesoleptus Stålii Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1982 n. 2.
sternoleucus Grav. — ♂ — Eur.: Britannia.
Mesoleptus sternoleucus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 99 n. 58, ♂.
Mesoleptus sternoleucus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 227 n. 47.
stigmaterus Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Mesoleptus ? stigmaterus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 167, ♂.
stigmaticus Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleptus stigmaticus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 67, ♂.
striatus Davis — ♂ — Am.: Colorado.
Mesoleptus striatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 318, ♂.
stygius Walk. — ♂ — As.: Japonia.
Mesoleptus stygius Walker, Cistula entom. I. P. 11. 1874 p. 306 n. 13, ♂.
subcompressus Grav. — ♀ — Eur.: Britannia.
Mesoleptus subcompressus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 52 n. 30, ♀.
Mesoleptus subcompressus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 228 n. 50.
submarginatus Steph. — Eur.: Britannia.
Mesoleptus submarginatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 214 n. 8.
subtenuis Cress. — ♂ — Am.: Illinois.
Mesoleptus subtenuis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 267 n. 19, ♂.
sybarita Cam. — ♂ — Austr.
Mesoleptus sybarita Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. P. 1. 1898 p. 32, ♂.
tardus (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Tryphon tardus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 119.
Mesoleius tardus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 259 n. 5, ♀ ♂.
Mesoleius tardus Provancher, Faun. entom. Canda. Hymén. 1883 p. 417 n. 5, ♀ ♂.
Mesoleptus tardus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 314, ♀.
tener Grav. — ♀ ♂ — Eur.
Mesoleptus tener Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 108 n. 66, ♀ ♂.
teredo Htg.[1] — ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleptus Teredo Hartig, Ber. naturw. Ver. Harz 1847 p. 16 n. 3, ♂.
Mesoleptus Teredo Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 119 n. 3, ♂.
thoracicus (Steph.) Marsh. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Tryphon thoracicus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 241 n. 30, ♀ ♂.
Mesoleptus thoracicus Marshall, Catal. Brit. Hymen. III. 1872 p. 67 n. 37.
torpens Davis — ♀ ♂ — Am.: Washington, Colorado.
Mesoleptus torpens Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 318, ♀ ♂.
triangularis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Mesoleptus triangularis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 101, ♂.
Mesostenus pallipes Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 264.
Mesoleptus triangularis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 225 n. 6, ♀.
Mesoleptus triangularis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 398 n. 6, ♀.

---

1) *Col.:* Cerambyx spec. (Ratzeburg).

undecimnotatus Desv. — ♂ — Eur.: Britannia.
Tryphon (Mesoleptus) undecimnotatus Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 33 n. 22, ♂.
uniformis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Campoplex unicolor Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 144 [non Cresson].
Mesoleptus uniformis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 232 n. 25, ♀.
Mesoleptus uniformis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 405 n. 25, ♀.
valens Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Mesoleptus valens Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 261 n. 1, ♀.
vancouverensis D. T. — ♂ — Am.: Vancouvers Island.
Mesoleius? laetus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 372, ♂ [non Gravenhorst].
Mesoleptus laetus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 315, ♂.
Mesoleptus Vancouverensis m.
variabilis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Mesoleptus variabilis Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 7 n. 28, ♀.
Mesoleptus variabilis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 795 n. 28, ♀.
ventralis Curt. — ♂ — Eur.: Britannia.
Mesoleptus ventralis Curtis, Brit. Entom. XIV. 1837 p. 644 n. 7b, ♂.
Mesoleptus ventralis Parfitt, Rep. & Trans. Devon. Assoc. XIII. 1881 p. 274.
vitratorius Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Mesoleptus vitratorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 34 n. 21, ♂.
vividus Woldst. — ♀ — Eur.: Fennia.
Mesoleptus vividus Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur & Folk XXI. 1872 p. 32 n. 7, ♀.
vultus Cress. — ♂ — Am.: Delaware.
Mesoleptus vultus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 268 n. 23, ♂.
zebratus Davis — ♀ ♂ — Am.: New York.
Mesoleptus zebratus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 316, ♀ ♂.

IPOCTONUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 199 n. 22.
Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1432.
ἴψ, vermis; κτείνω, interficio.

Synon.: Euryproctus Holmgren, Brischke, Thomson, Jacobs & Tosquinet.
Ichneumon Gravenhorst.
Mesoleptus Gravenhorst, Holmgren.
Phobetes Thomson.
Tryphon Gravenhorst, Ratzeburg, Curtis.

atomator (Müll.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Ichneumon atomator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 158 n. 1842.
Mesoleptus atomator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 92 n. 55, ♀ ♂.
Euryproctus atomator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 114 [n.17, ♂.
Euryproctus atomator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 68, ♀ ♂.
Euryproctus atomator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 70, ♀ ♂.
Euryproctus (Ipoctonus) abdominator Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1432 n. 1.
Euryproctus atomator Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 58.
Phobetus (Ipoctonus) atomator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1987 n. 5.
chrysostomus (Grav.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon chrysostomus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 370 n. 120.

---

[1]) *Hymen.:* Taxonus agilis (Brischke).

Mesoleptus chrysostomus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 103 n. 62, ♀.
Mesoleptus chrysostomus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) [p. 377 n. 16–17, ♀.
Euryproctus chrysostomus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 68, ♀♂.
Euryproctus chrysostomus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 70, ♀♂.
Euryproctus (Ipoctonus) chrysostomus Thomson, Opusc. entom. P. 3. 1889 p. 1432 n. 3.
Euryproctus chrysostomus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 58.
Phobetus (Ipoctonus) chrysostomus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1987 n. 6.

depressus (Prov.) Davis — ♂ — Am.: Canada, Massachusetts.
Mesoleptus depressus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 114.
Mesoleptus depressus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 226 n. 9, ♂.
Mesoleptus depressus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 399 n. 9, ♂.
Ipoctonus depressus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 313, ♂.

fulviventris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phobetus (Ipoctonus) fulviventris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1987 n. 8, ♀♂.

latipes Thoms. — ♂ — Eur.: Suecia.
Phobetus (Ipoctonus) latipes Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1987 n. 10, ♂.

nigriceps (Grav.) Thoms.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Tryphon nigriceps Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 202 n. 130.
Tryphon nigriceps Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 126 n. 4, ♂.
Tryphon nigriceps Curtis, Trans. Entom. Soc. London (2) II. 1853 Proc. p. 136. [♀♂.
Euryproctus nigriceps Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 113 n. 14,
Euryproctus nigriceps Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 68, ♀♂.
Mesoleptus praetermissus Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur & Folk XXI. 1872 p. 30 n. 2, [♀♂.
Euryproctus nigriceps Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 69, ♀♂.
Euryproctus (Ipoctonus) nigriceps Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1432 n. 2.
Phobetus (Ipoctonus) nigriceps Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1987 n. 9.

rufipes Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phobetus (Ipoctonus) rufipes Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1987 n. 7, ♀♂.

CALLIDIOTES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 199 n. 21.
Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 910.
κάλλος, pulchritudo; δίωτος, duas aures habens.

Synon.: Delolytus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 189 n. 4.
δηλόω, monstro; λύω, solvo.
Atractodes Holmgren.
Mesoleptus Gravenhorst.

coxator (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesoleptus coxator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 109 n. 67, ♂.
Atractodes varicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 114 n. 8,
Callidiotus coxator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 910 n. 1. [♀♂.
Alsactodes varicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 104 n. 13, ♀♂ [[err. typogr.].

---

1) *Hymen.:* Trichiosoma betuleti (Ratzeburg), Clavellaria amerinae (Brischke, Mocsáry), Blennocampa betuleti (Bignell).

DIZEMON

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 199 n. 20.
Etymol. obscura.

regalis Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Dizemon regalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 312, ♀.

STIPHROSOMUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 198 n. 19.
Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 1972.
στιφρός, densus; *σῶμα*, corpus.

Synon.: Catoglyptus Holmgren, Brischke, Thomson, Jacobs & Tosquinet.
Ichneumon Gmelin.
Mesoleptus Gravenhorst, Stephens.

antilope (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia.
Mesoleptus Antilope Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 104 n. 63, ♀.
Mesoleptus Antilope Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 229 n. 52, ♀.
Catoglyptus pulchricornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 109 [n. 7, ♀.
Catoglyptus Antilope Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 68, ♂.
Catoglyptus Antilope Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 69, ♀.
Catoglyptus Antilope Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 923 n. 5, ♀ ♂.
Catoglyptus Antilope Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 54, ♂.
Catoglyptus (Stiphrosomus) Antilope Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1973 n. 6.

canaliculatus Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Catoglyptus (Stiphrosomus) canaliculatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1973 n. 5, ♀.

foveolator (Holmgr.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Belgia, Germania.
Mesoleptus nemoralis var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 70 n. 42, ♂.
Mesoleptus foveolator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 64 n. 3, ♀ ♂.
Catoglyptus foveolator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 108 [n. 4, ♀ ♂.
Catoglyptus foveolator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 67, ♀ ♂.
Catoglyptus foveolator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 68, ♀ ♂.
Catoglyptus foveolator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 923 n. 3, ♀ ♂.
Catoglyptus foveolator Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 53.
Catoglyptus (Stiphrosomus) foveolator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1973 n. 4.
Catoglyptus foveolator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1897 p. 122.

fuscicornis (Gmel.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Belgia, Germania.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 63 n. 233 & 246.
Ichneumon fuscicornis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2701 n. 295.
Mesoleptus nemoralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p 70 n. 42, ♂ [excl. ♀].
Mesoleptus fuscicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 87 n. 51, ♀.
Mesoleptus fuscicornis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 226 n. 42, ♀.
Catoglyptus fuscicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 108 [n. 5, ♀ ♂.
Catoglyptus fuscicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 377.
Catoglyptus fuscicornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 67, ♀ ♂.
Catoglyptus fuscicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 68, ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Tenthredo punctulata, T. scalaris (Brischke).

Catoglyptus fuscicornis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 923 n. 4, ♀ ♂.
Catoglyptus fuscicornis Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 53.
Catoglyptus (Stiphrosomus) fuscicornis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1973 n. 3.
Catoglyptus fuscicornis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII. 1897 p. 122.

montanus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesoleptus montanus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 82 n. 48, ♀. [n. 6, ♀ ♂.
Catoglyptus montanus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 108
Catoglyptus montanus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VI. P. 4. 1887 p. 87, ♂.
Catoglyptus (Stiphrosomus) montanus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1974 n. 7.

obesus Davis — ♀ — Am.: Virginia.
Stiphrosomus obesa Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 312, ♀.

sulcatus Thoms. — ♂ — Eur.: Suecia.
Catoglyptus (Stiphrosomus) sulcatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1974 n. 8, ♂.

GLYPTORHAESTUS

Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 1976.
γλυπτός, sculptus; Rhaestus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Rhaestus Thomson.

punctatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Rhaestus punctatus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1533 n. 1, ♀ ♂. [typogr.].
Rhaestus (Glyptorhaestus) punctus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1976 n. 5 [err.

wuestneii Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Rhaestus (Glyptorhaestus) Wüstnei Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1977 n. 6, ♀ ♂.

RHAESTES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 198 n. 18.
ῥαιστήρ, deletor.

Synon.: Rhaestus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 922.
Grypocentrus Holmgren.
Perilissus Brischke.
Tryphon Brischke.

difficilis Davis — ♂ — Am.: Colorado.
Rhaestes difficilis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 312, ♂.

femoralis Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Rhaestus femoralis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1976 n. 2, ♀.

heterocerus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Rhaestus heterocerus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2017 n. 1, ♀ ♂.

incessans Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Rhaestes incessans Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 311, ♀.

lativentris (Holmgr.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Grypocentrus lativentris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 384
Rhaestus lativentris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1976 n. 3. [n. 6-7, ♀.

ophthalmicus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [p. 195 n. 6, ♀ ♂.
Grypocentrus ophthalmicus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.)
Rhaestus ophthalmicus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1976 n. 4.

rufipes (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Grypocentrus rufipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 196 n. 7,
Rhaestus rufipes Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 924 n. 1, ♀ ♂. [♀ ♂.
Rhaestus rufipes Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1976 n. 1.

sericeus Brischke — ♀ — Eur.: Borussia. [p. 39, ♀.
Tryphon (Rhaestus?) sericeus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892

testaceipes Brischke — ♂ — Eur.: Germania. [p. 19, ♂.
Perilissus (Rhaestes) testaceipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892

HYPOCRYPTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 198 n. 17.

ὑπό, subtus; Cryptus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Mesoleptus Brischke.

testaceicornis Brischke — ♂ — Eur.: Germania. [P. 1. 1892 p. 33, ♂.
Mesoleptus (Hypocryptus) testaceicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII.

HOMALOMMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 198 n. 16.

ὁμαλός, planus; ὄμμα, oculus.

Species exstat.

PHOBETES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 198 n. 15.

φοβητής, qui terret.

Synon.: Phobetus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1930.
Euryproctus Holmgren, Brischke.
Ichneumon Gravenhorst.
Mesoleptus Gravenhorst.
Tryphon Holmgren.

albinopennis Davis — ♂ — Am.: Dakota.
Phobetes albinopennis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 311, ♂.

femorator Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Phobetus femorator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1986 n. 4, ♀ ♂.

fuscicornis (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Tryphon fuscicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 78 n. 8, ♂.
Euryproctus fuscicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 113 [n. 15, ♀ ♂.
Euryproctus fuscicornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 68, ♀.
Euryproctus fuscicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 70, ♀ ♂.
Euryproctus (Phobetus) fuscicornis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1431 n. 1.
Phobetus fuscicornis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1986 n. 1.

leptocerus (Grav.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia, Italia.
Ichneumon leptocerus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 365 n. 112, ♀.
Mesoleptus leptocerus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 68 n. 40, ♀.
Mesoleptus leptocerus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 5.
Phobetus leptocerus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1986 n. 3.

liopleuris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Euryproctus (Phobetus) liopleuris Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1431 n. 2, ♀ ♂.
Phobetus liopleuris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1986 n. 2.

LATHIPONUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 198 n. 14.
λαθίπονος, laborum oblitus.

Synon.: Mesoleius Thomson.

pulcherrimus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleius (Lathiponus) pulcherrimus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1261 n. 2, ♀ ♂.

GAUSOCENTRUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 198 n. 13.
Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 1980.
γαυσός, curvus; κέντρον, aculeus.

Synon.: Hadrodactylus Thomson.
Mesoleptus Gravenhorst, Holmgren, Brischke, Jacobs & Tosquinet.

gyrini Ashm.[1] — ♂ — Am.: Java.
Gausocentrus gyrini Ashmead, Canad. Entomol. 1894 p. 25 n. 1, ♂.
macrodactylus (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Mesoleptus macrodactylus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 68 n. 15, ♀ ♂.
Mesoleptus macrodactylus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 106 [n. 16, ♂.
Mesoleptus macrodactylus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 66, ♀ ♂.
Mesoleptus macrodactylus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N.F. IV. P. 3. 1879 p. 68, ♀ ♂.
Hadrodactylus macrodactylus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 922 n. 16.
Mesoleptus macrodactylus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 52.
Mesoleptus (Gausocentrus) macrodactylus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1981 n. 1.
sordidus (Grav.) Thoms. — ♂ — Eur.: Suecia, Belgia.
Mesoleptus sordidus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 36 n. 22, ♂.
Mesoleptus sordidus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXIV. 1890 p. 51.
Mesoleptus (Gausocentrus) sordidus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1981 n. 2.
strigosus (Cress.) Davis — ♂ — Am.: Texas.
Mesoleptes ? strigosus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 167, ♂.
Gausocentrus ? strigosus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 311, ♂.

BRISCHKEA

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII. 1897 p. 167.
Brischke, nom. propr.

parvula Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Brischkea parvula Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII. 1897 p. 167, ♀ ♂.

CATOGLYPTUS

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 106.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 198 n. 12!
κάτω, deorsum; γλυπτός, sculptus.

Synon.: Ctenopelma Holmgren.
Mesoleptus Gravenhorst & auct.

crassipes Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Catoglyptus crassipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 107 [n. 2, ♀ ♂.

[1]) *Col.:* Gyrinus spec. (Ashmead).

Catoglyptus grossipes Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 923 n. 2, ♀ ♂.
Catoglyptus crassipes Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 52.
Catoglyptus crassipes Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1972 n. 2.

clypeatus (Holmgr.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ctenopelma clypeata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 119 [n. 7, ♀.
Catoglyptus clypeatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 905.

femoratus Davis — ♀ ♂ — Am.: Colorado.
Catoglyptus femoratus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 310, ♀ ♂.

fortipes (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesoleptus fortipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 685, ♀.
Mesoleptus fortipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 85 n. 50, ♀ ♂.
Mesoleptus fortipes Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 225 n. 41.
Catoglyptus fortipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 106 n. 1, [♀ ♂; T. 8 F. 2 (♀).
Catoglyptus fortipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 67, ♀ ♂.
Catoglyptus fortipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 68, ♀ ♂.
Catoglyptus fortipes Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 923 n. 1, ♀ ♂.
Catoglyptus fortipes Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 52.
Catoglyptus fortipes Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1972 n. 1.

fucatus (Cress.) Davis — ♀ — Am.: Connecticut, Virginia.
Mesoleptus fucatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 99, ♀.
Mesoleptus erectus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 317.
Mesoleptus fucatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 331 n. 23, ♀.
Mesoleptus erectus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 331 n. 24, ♀.
Mesoleptus fucatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 404 n. 23, ♀.
Mesoleptus erectus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 404 n. 24, ♀.
Catoglyptus ? fucatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 310, ♀.

minor Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Catoglyptus minor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 107 [n. 3, ♀ ♂.

scaber Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Catoglyptus scaber Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 67, ♂ var.
Catoglyptus scaber Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 68, ♂.

schenckii Jaenn. — ♂ — Eur.: Germania.
Catoglyptus Schenckii Jännicke, Berlin. entom. Zeitschr. XI. 1867 p. 155, ♂.

ullrichii Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Catoglyptus Ullrichi Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 437 n. 1, ♀ ♂.

PROSMORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 198 n. 11.
Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 1983.
πρόσμορος, fatu subjectus.

Synon.: Prosmosus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 309 [sphalm.].
Notopygus Holmgren & auct.

cymbiformis Davis — ♀ — Am.: Illinois.
Prosmosus cymbaformus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 309, ♀.

elongatus Davis — ♀ — Am.: Texas.
Prosmosus elongatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 310, ♀.

punctifrons Davis — ♂ — Am.: Canada.
Prosmosus punctifrons Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 309, ♂.

resplendens (Holmgr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 4, ♀ ♂.
Notopygus resplendens Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 116
Notopygus resplendens Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 69, ♂.
Notopygus resplendens, Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 49; T. 31 F. 3.
Notopygus resplendens Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 70, ♂.
Notopygus resplendens Woldstedt, Horae soc. entom. Ross. XVI. 1881 p. 64.
Notopygus (Prosmorus) resplendens Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1983 n. 3.

ANOPLECTES

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 363.
ἀνωπλήκτης, sursum pungens.

multicolor Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Anoplectes multicolor Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXVI. 1896 p. 363, ♀.

POLYOMORUS

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 60.
πολύς, multum; ὅμορος, vicinus.

gagatinus Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania.
Polyomorus gagatinus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 60, ♀.

GRIPHODES

Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 57.
γριφωδής, aenigmaticus.

caligatus Kriechb. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Griphodes caligatus Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 57 n. 12, ♂.

ANTIPYGUS

Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 166.
ἀντί, adversus; πυγή, podex.

megerlei Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Antipygus Megerlei Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 539 n. 2, ♀ ♂.

NOTOPYGUS

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 115.
νῶτος, dorsum; πύγη, anus.

Synon.: Anomalon Jurine.
Ichneumon Gmelin, Fabricius & auct.
Mesoleptus Gravenhorst, Stephens.
Tryphon Blanchard.

americanus Harrgt. — ♀ — Am.: Canada.
Notopygus Americanus Harrington, Canad. Entomol. XXIV. 1892 p. 98, ♀.
cultus (Cress.) Davis — (♀) ♂ — Am.: New Jersey.
Mesoleptus cultus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 99, ♂.
Notopygus cultus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 309 (♀).
emarginatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Belgia. [n. 1, ♀ ♂.
Notopygus emarginatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 115
Notopygus emarginatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 49; T. 31 F. 1.

Notopygus emarginatus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 59.
Notopygus emarginatus Holmgren, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1983 n. 4.
excavatus Davis — ♀ — Am.: Nevada.
Notopygus excavatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 309, ♀.
flavicornis Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia. [n. 2, ♂.
Notopygus flavicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 115
insignis Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania.
Notopygus insignis (Förster) Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 251 n. 2, ♀.
minkii Vollenh. — ♂ — Eur.: Germania.
Notopygus Minki Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 49, ♂; T. 31 F. 4.
nigricornis Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania.
Notopygus nigricornis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 252 n. 3, ♀.
sponsorius (Fabr.) Marsh. — ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon sponsorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 425 n. 31.
Ichneumon sponsorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 262 n. 38.
Ichneumon sponsorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 150 n. 47.
Ichneumon sponsorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2682 n. 102.
Ichneumon sponsorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 175 n. 56.
Ichneumon sponsorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 148 n. 60.
Ichneumon sponsorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 64 n. 52.
Anomalon sponsorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 116, ♂.
Ichneumon sponsorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 362 n. 108.
Ichneumon sponsorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277.
Ichneumon sponsorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 354.
Mesoleptus sponsorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 41 n. 24, ♂.
Mesoleptus sponsorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 218 n. 21.
Tryphon (Mesoleptes) sponsorium Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 307 n. 3.
Notopygus sponsorius Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 69 n. 1.
subrufus (Gmel.) Marsh. — ♂ — Eur.: Britannia.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 69 n. 321.
Ichneumon subrufus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2718 n. 367.
Tryphon subrufus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 280 n. 186, ♂.
Notopygus subrufus Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 69 n. 2.
xanthocerus Kriechb. — ♀ — Eur.: Russia?
Notopygus xanthocerus (Förster) Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 251 n. 1, ♀!

HOMASPIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 198 n. 9.
Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 1983.
ὅμοιος, par; *ἄσπις*, scutum.

Synon.: Ctenopelma Brischke.
Mesoleptus Gravenhorst.
Notopygus Holmgren, Thomson.

albipes Davis — ♀ — Am.: New York.
Homaspis albipes Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 308, ♀.
analis (Holmgr.) Thoms. — ♂ — Eur.: Suecia.
Notopygus analis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 116 n. 3, ♂.
Notopygus (Homaspis) analis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1984 n. 5.
rhadina Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Homaspis rhadinus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 308, ♀.

robusta Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Notopygus (Homaspis) robustus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1984 n. 7, ♀.
rufina (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Russia.
Mesoleptus rufinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 69 n. 41, ♂.
Ctenopelma rufina Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 69, ♂?
Notopygus rufinus Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 49; T. 31 F. 2.
Ctenopelma rufina Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 71, ♀ ♂.
Notopygus rufinus Woldstedt, Horae soc. entom. Ross. XVI. 1881 p. 64.
Notopygus rufinus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 925 n. 3.
Notopygus (Homaspis) rufinus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1984 n. 6.
variicolor Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Notopygus (Homaspis) varicolor Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1984 n. 8, ♀.

POLYCINETIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 198 n. 8.
πολύς, multum; κίνησις, motio.

Synon.: Polycinetus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 1983.
πολύς, multum; κινετός, mobilis.
Exetastes Gravenhorst, Zetterstedt, Ratzeburg.
Ichneumon Ratzeburg.
Notopygus Holmgren & auct.
Tryphon Zetterstedt.

fulvipes (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia, Germania.
Exetastes fulvipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 401 n. 9, ♀.
Tryphon (Exetastes) fulvipes Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 386 n. 12, ♀.
Ichneumon (Exetastes) fulvipes Ratzeburg, Forstinsecten III. 1844 p. 26 n. 17; T. 6 F. 13.
Exetastes fulvipes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 107 n. 1, ♀ ♂.
Notopygus fulvipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 378 n. 5, ♀.
Notopygus fulvipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 69, ♀ ♂.
Notopygus fulvipes Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 52; T. 31 F. 5.
Notopygus fulvipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 70, ♂.
Notopygus fulvipes Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 925 n. 2, ♀ ♂.
Notopygus (Polycinetus) fulvipes Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1983 n. 1.
limata (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Delaware, New York, Montana.
Tryphon? limatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 274 n. 3, ♂.
Polycinetus limatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 307, ♀ ♂.
mordax Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Notopygus mordax Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 925 n. 1, ♀.
Notopygus (Polycinetus) mordax Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 1983 n. 2.
solitaria Davis — ♀ — Am.: Michigan.
Polycinetus solitarius Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 307, ♀.

PERILISSUS

(Förster) Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 121.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 197 n. 7.
περί, circum; λισσός, laevis.

Synon.: Ichneumon Gmelin.
Mesoleptus Gravenhorst, Drewsen, Ratzeburg, Holmgren.
Tryphon Gravenhorst, Stephens, Blanchard.

abdominalis Brischke[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Perilissus abdominalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 74, ♀ ♂.
bellatorius Tosqu. — ♂ — Afr.: Algeria.
Perilissus bellatorius Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 348, ♂.
bicolor Brischke[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Perilissus bicolor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 75, ♀ ♂.
bipunctatus (Grav.) Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Mesoleptus bipunctatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 54 n. 32, ♂.
Mesoleptus bipunctatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 220 n. 25.
Perilissus bipunctatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 70, ♀.
Perilissus bipunctatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 72, ♀ ♂.
brischkei D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Perilissus sericeus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 72, ♂ [non Gravenhorst].
Perilissus Brischkei m.
buccatus Kriechb. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Perilissus buccatus Kriechbaumer, Termész. Füzet. XIX. 1896 p. 133 n. 9, ♂.
cingulatus Brischke[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Perilissus cingulatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 1. 1888 p. 9 n. 2, ♀ ♂.
citreus Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Perilissus citreus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 75, ♀ ♂.
discedens Woldst. — ♀ — Eur.: Fennia.
Perilissus discedens Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur & Folk XXI. 1872 p. 37 n. 6, ♀.
dissimilis Woldst. — ♂ — Eur.: Russia.
Perilissus dissimilis Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXIII. 1877 p. 458 n. 2, ♂.
dubius Jac. & Tosqu. — ♀ ♂ — Eur.: Belgia.
Perilissus dubius (Wesmael) Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 66, ♀ ♂.
fenellae Brischke[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Perilissus fenellae Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 1. 1888 p. 9 n. 1, ♀ ♂.
foersteri Woldst. — ♂ — Eur.: Germania.
Perilissus Foersteri Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 400 n. 29, ♂.
fumatus Bridgm.[5]) — Eur.: Britannia.
Perilissus fumatus Bridgman, Entomologist XIII. 1880 p. 54.
limitaris (Grav.) Holmgr.[6]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 61 n. 200.
? Ichneumon naevius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2699 n. 269.
Mesoleptus limitaris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 14 n. 7, ♀.
? Tryphon naevius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 152 n. 98, ♀ ♂.
Mesoleptus limitaris Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 213 n. 4, ♀.
? Tryphon naevius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 236 n. 15, ♀ ♂.
Mesoleptus limitaris Drewsen, Arch. f. Naturg. II. 1. 1836 p. 36 n. 1, ♂.
Tryphon (Mesoleptes) limitaris Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 307 n. 1.
Mesoleptus limitaris Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 119 n. 2, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Fenusa rubi (Brischke).
2) *Hymen.:* Fenusa betulae (Brischke).
3) *Hymen.:* Fenella agrimoniae (Brischke).
4) *Hymen.:* Fenella agrimoniae (Brischke).
5) *Hymen.:* Tryphon scotopterus (Bridgman).
6) *Hymen.:* Nematus ribesii (Ratzeburg).

[Gmelin].
Mesoleius naevius Holmgren, Svensk.Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 70 n. 4, ♀ ♂ [non
Perilissus limitaris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 124 n. 8, ♀ ♂.
Perilissus limitaris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 379.
Perilissus limitaris Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 71, ♀ ♂.
Perilissus naevius Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 70 n. 10.
Perilissus limitaris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 73, ♀ ♂.
Perilissus limitaris Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 913 n. 11.

longicornis Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Perilissus longicornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 72, ♂.
Perilissus longicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 72, ♂.

lucidulus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Perilissus lucidulus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 127 n. 14, ♀.

luteocephalus Gir.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Perilissus luteocephalus Giraud, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 p. 397 n. 7, ♀ ♂.

minutus Bridgm. — ♂ — Eur.: Britannia.
Perilissus minutus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1887 p. 370, ♂.

nigropunctatus Brischke — ♀ — Eur.: Germania. [1892 p. 37, ♀.
Perilissus (Synoditis?) nigropunctatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1.

rhodocerae Rond. — Eur.: Italia.
Perilissus rhodocerae Rondani, Bull. soc. entom. Ital. VI. 1874 p. 136 n. 37 [s. descr.].
Tryphon (Perilissus) rhodocerae Rondani, Bull. soc. entom. Ital. IX. 1877 p. 202 n. 78.

sericeus (Grav.) Rogh. & Kohl — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Belgia, Germania, Austria.
Mesoleptus sericeus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 14 n. 6, ♂.
Mesoleptus sericeus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 212 n. 3.
? Perilissus sericeus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 72, ♂.
Perilissus sericeus Rogenhofer & Kohl, Becker: Hernstein 1885 Hymen. p. 22.
Perilissus sericeus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 66, ♀.
Perilissus sericeus Kriechbaumer, Act. soc. hist. nat. Españ. XXVII. 1898 p. 169, ♂.

singularis Voll. — Eur.: Batavia.
Perilissus singularis Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 52; T. 32 F. 8.

spilonotus (Steph.) Marsh. — Eur.: Britannia.
Mesoleptus spilonotus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 227 n. 44.
Perilissus spilonotus Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 70 n. 7.

spiniger Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Perilissus spiniger Tnomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 912 n. 5, ♀ ♂.

stigmaticus Woldst. — ♀ — Eur.: Fennia.
Perilissus stigmaticus Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur & Folk XXI. 1872 p. 38 n. 7, ♀.

triangulatus Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Perilissus triangulatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 362, ♀ ♂.

variator (Müll.) Marsh. — ♂ — Eur.: Britannia, Dania.
Ichneumon variator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 157 n. 1828.
Ichneumon variator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 369 n. 118, ♂.
Mesoleptus filicornis var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 95.
Mesoleptus variator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 227 n. 46.
Perilissus variator Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 69 n. 2.

verticalis Brischke[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Perilissus verticalis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 71, ♀ ♂.
Perilissus verticalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 73, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Selandria micans (Giraud).
2) *Hymen.:* Foenusa betulae (Brischke).

vollenhovenii Grib. — ♂ — Eur.: Calabria.
Perilissus Vollenhoveni Gribodo, Bull. soc. entom. Ital. XII. 1880 p. 8.
Perilissus Vollenhoveni Gribodo, Bull. soc. entom. Ital. XIII. 1881 p. 58 n. 47, ♂.

LAPHYROSCOPUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 197 n. 6.
λάφυρον, spolium; σκοπέω, exploro.

Synon.: Luphyroscopus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 915 [sphalm.?].
Perilissus Holmgren, Brischke, Vollenhoven, Thomson.
Tryphon Ratzeburg, Gorski.

capitatus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Pennsylvania, New Hampshire, Texas, Georgia.
Tryphon capitatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 281 n. 16, ♂.
Laphyroscopus capitatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 307, ♀ ♂.
gorskii (Ratzbg.) Thoms.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Belgia, Germania, Russia.
Tryphon Gorskii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 126 n. 42, ♂; Fig.
Tryphon Gorskii (Ratzeburg) Gorski, Anal. ad entomogr. 1852 p. 200, ♀ ♂; T. 3 F. 4.
Perilissus Gorskii Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 125 n. 10, ♂.
Perilissus Gorskii Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 379, ♀.
Perilissus Gorskii Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 71, ♀ ♂.
Perilissus Gorskii Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 52; T. 32 F. 6.
Perilissus Gorskii Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 73, ♀ ♂.
Perilissus (Luphyroscopus) Gorskii Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 915 n. 20, ♀ ♂.
Perilissus Gorskii Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 64.
nigricollis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Perilissus (Luphyroscopus) nigricollis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 915 n. 22, ♀ ♂.
pictilis (Holmgr.) Thoms.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Perilissus pictilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 125 n. 11, ♀ ♂.
Perilissus pictilis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 71, ♀ ♂.
Perilissus pictilis Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 52; T. 33 F. 6.
Perilissus pictilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 73, ♀ ♂.
Perilissus (Luphyroscopus) pictilis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 915 n. 21.

LOPHYROPLECTUS

Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 915.
Lophyrus, nom. propr. Hymen.; πλήκτης, percussor.

Synon.: Paniscus Hartig, Ratzeburg.
Perilissus Brischke, Thomson.

oblongopunctatus (Htg.) Thoms.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Paniscus oblongopunctatus Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. 2. 1838 p. 272 n. 12, ♀ ♂.
Paniscus oblongopunctatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 100 n. 2, ♀ ♂.
Paniscus oblongopunctatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 80 n. 3.
Perilissus oblongopunctatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 [p. 72, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Tenthredo adumbrata (Ratzeburg), Selandria annulipes, Schizocera geminata (Brischke), Phyllotoma vagans (Fletcher), Eriocampa limacina (Rondani).
2) *Hymen.:* Phyllotoma microcephala (Brischke).
3) *Hymen.:* Lophyrus rufus (Hartig).

Perilissus oblongopunctatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 73, ♀ ♂.
Perilissus (Lophyroplectus) oblongopunctatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 915 n. 19.

SYCHNOLETER

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 195 n. 5.
Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1430 & P. 19. 1894 p. 1998.
συχνός, frequens; *λητήρ*, sacerdos publicus.

Synon.: Euryproctus Holmgren, Brischke.
Mesoleptus Gravenhorst, Stephens, Holmgren.

americanus Ashm. — ♂ — Am.: Florida.
Sychnoleter Americanus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 196, ♂.
geniculosus (Grav.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Mesoleptus geniculosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 686, ♂.
Mesoleptus geniculosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 102 n. 61, ♂ [excl. var.].
Mesoleptus geniculosus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 229 n. 51, ♂.
Mesoleptus geniculosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 66 n. 8, ♀ ♂.
Euryproctus geniculatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 114 [n. 16, ♀ ♂.
Euryproctus geniculosus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 68, ♀ ♂.
Euryproctus geniculosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 70, ♀ ♂.
Euryproctus (Sychnoleter) geniculosus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1430.
Euryproctus geniculosus Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 58.
spatiosus Davis — ♀ — Am.: Canada.
Sychnoleter spatiosus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 306, ♀.

POLYONCUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 197 n. 4.
Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 912.
πολύς, multum; *ὄγκος*, unguis.

Synon.; Perilissus Holmgren, Thomson.
Tryphon Gravenhorst.

buccinator (Holmgr.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Perilissus buccinator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 122 [n. 4, ♀.
Perilissus (Polyoncus) buccinator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 913 n. 9.
erythrocephalus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Tryphon erythrocephalus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 220 n. 144, ♂.
Perilissus erythrocephalus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 122 [n. 3, ♀ ♂.
Perilissus erythrocephalus Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 52; T. 32 F. 7.
Perilissus (Polyoncus) erythrocephalus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 913 n. 8.
grandiceps Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Perilissus (Polyoncus) grandiceps Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 913 n. 10, ♀ ♂.
mentalis Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Polyoncus mentalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 306, ♀.
platynus Davis — ♂ — Am.: Michigan.
Polyoncus platynus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 306, ♂.
suburbis Davis — ♀ — Am.: Wisconsin.
Polyoncus suburbe Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 306, ♀.

---

1) *Hymen.:* Selandria serva (Fabricius).

unicus Davis — ♀ — Am.: Michigan.
Polyoncus unicus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 306, ♀.

ICHNAEOPS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 197 n. 3.
ἰχναῖος, vestigium sequens; ὤψ, oculus.
Species exstat.

ECLYTUS

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 127.
ἐκλυτός, exsolutus.

Synon.: Mesoleptus Cresson, Provancher.
Orthocentrus Provancher.

decens (Cress.) Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Connecticut, Virginia, New Hampshire, Michigan, [Washington Terr.
Mesoleptus decens Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 101, ♂.
Orthocenthus pleuralis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 328.
Mesoleptus decens Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 223 n. 2, ♀.
Eclytus pleuralis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 250 n. 1, ♀.
Mesoleptus decens Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 396 n. 2, ♀.
Eclytus pleuralis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 408 n. 1, ♀.
Eclytus pleuralis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 305, ♀ ♂.
exornatus (Grav.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Mesoleptus exornatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 23 n. 14, ♀ ♂.
Mesoleptus exornatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 215 n. 11, ♀ ♂.
Mesoleptus exornatus Drewsen, Arch. f. Naturg. II. 1. 1836 p. 37 n. 2, ♀ ♂.
Mesoleptus exornatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 118 n. 1, ♀ ♂.
Eclytus exornatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 916 n. 1.
lutatus Scudd. — Am.: Green River.
Eclytus lutatus Scudder, Tert. Insects N.-Amer. II. 1890 p. 614; T. 10 F. 24.
perennis Davis — ♀ ♂ — Am.: New York, New Hampshire.
Eclytus perennis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 305, ♀ ♂.
robustus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Eclytus robustus Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 11 n. 2, ♀.
Eclytus robustus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 795 n. 2, ♀.
semiluctuosus Vollenh. — As.: Batavia.
Eclytus semiluctuosus Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 51; T. 32 F. 5.

SPANOTECNUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 197 n. 1.
Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 911.
σπάνιος, parcus; τέκνον, infans.

Synon.: Cteniscus Provancher.
Ichneumon Gravenhorst.
Mesoleptus Gravenhorst & auct. plur.
Perilissus Holmgren & auct. recent.
Prionopoda Ashmead.
Tryphon Gravenhorst & auct. plur.

---

[1] *Hymen.:* Nematus pini, N. abietum, N. compressus (Ratzeburg).

coloradensis (Ashm.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Colorado, Montana, Oregon.
Prionopoda Coloradensis Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 198, ♀ ♂.
Spanotecnus Coloradensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 303, ♀ ♂.
concolor (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Mesoleptus concolor Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 270 n. 27, ♀.
Ctenicus concolor Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 139.
Mesoleptus concolor Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 230 n. 19, ♀ ♂.
Mesoleptus concolor Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 403 n. 19, ♀ ♂.
Spanotecnus concolor Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 304, ♀ ♂.
coxalis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Perilissus (Spanotecnus) coxalis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 912 n. 4, ♀ ♂.
decoloratus (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Mesoleptus decoloratus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 265 n. 16, ♂.
Perilissus Southwicki Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 196.
Spanotecnus decoloratus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 304, ♀ ♂.
discolor (Cress.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada, Delaware, Colorado.
Mesoleptus discolor Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 271 n. 29, ♂.
Mesoleptus discolor Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 229 n. 17, ♀ ♂.
Mesoleptus discolor Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 402 n. 17, ♀ ♂.
Spanotecnus discolor Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 303, ♀ ♂.
filicornis (Grav.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon filicornis Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 368 n. 117, ♂ [excl. var.].
Mesoleptus filicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 94 n. 57, ♀ ♂ [excl. var.].
Mesoleptus filicornis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 227 n. 45, ♀ ♂.
Tryphon (Mesoleptus) filicornis Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 308 n. 5.
Mesoleptus filicornis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 215 n. 6, ♂.
Perilissus filicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 63 n. 1, ♀ ♂.
Perilissus filicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 121 [n. 1, ♀ ♂.
Perilissus filicornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 69, ♀ ♂.
Perilissus filicornis Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 52; T. 33 F. 1.
Perilissus filicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 71, ♀ ♂.
Perilissus (Spanotecnus) filicornis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 911 n. 1.
iladus Davis — ♂ — Am.: New York.
Spanotecnus iladus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 303, ♂.
lutescens (Holmgr.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Perilissus lutescens Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 125 n. 9. [♀ ♂.
Perilissus lutescens Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 379.
Perilissus lutescens Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 71, ♀ ♂.
Perilissus lutescens Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 73, ♀ ♂.
Perilissus (Spanotecnus) lutescens Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 212 n. 3.
niger Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Spanotecnus niger Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 104 n. 12, ♂.
obscurellus Davis — ♀ — Am.: Connecticut.
Spanotecnus obscurellus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 304, ♀.
vernalis (Grav.) Thoms.[3] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon vernalis Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 380 n. 133, ♀ ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Nematus latipes, N. appendiculatus (Brischke).
[2]) *Hymen.:* Athalia spinarum, Nematus Erichsonii (Brischke).
[3]) *Hymen.:* Tenthredo spec. (Brischke).

Tryphon vernalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 294 n. 197, ♀ ♂.
Tryphon vernalis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 260 n. 84.
Tryphon vernalis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 231 n. 26, ♀ ♂.
Perilissus vernalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 122 [n. 2, ♀ ♂.
Perilissus vernalis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 70, ♀ ♂.
Perilissus vernalis Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 52; T. 33 F. 3.
Perilissus vernalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 71, ♀ ♂.
Perilissus (Spanotecnus) vernalis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 911 n. 2.

Sect. C. **Pimploidae** m.

23. *Subfam.* **Xoridinae**

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 1859 p. 6.

POEMENIA

Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 130 n. 20.
ποιμένιος, pastoralis.

insularis Cress. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Poemenia insularis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 380, ♀.
notata Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Poemenia notata Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 130 n. 20.
Poemenia notata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 66 n. 1, ♀ ♂.
Poemenia notata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 444.
Poemenia notata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 337, ♀.

XORIDES

Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 4 n. 439.
Derivatio?

Synon.: Bassus Zetterstedt.

aegyptius Walk. — ♀ — Afr.: Aegyptus.
Xorides Aegyptius Walker, List of Hymen. in Egypt 1871 p. 3 n. 8, ♀.
albitarsus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Xorides albitarsus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 849 n. 15, ♀.
Xorides albitarsus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 66 n. 5, ♂.
Xorides albitarsus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 301 n. 1, ♀ ♂.
Xorides albitarsus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 127, ♀.
borealis Cress. — ♀ — Am.: Canada, Hudsons Bay.
Xorides borealis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 167, ♀.
Xorides borealis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 18, ♀.
Xorides borealis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 450, ♀.
caryae Harrgt.[1] — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Xorides caryae Harrington, Canad. Entomol. XXIII. 1891 p. 132, ♀ ♂.
collaris Grav.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia.
Xorides collaris Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 848 n. 14, ♀ ♂.

---

1) *Col.:* Saperda discoidea aut Dorchaschema nigrum (Harrington).
2) *Col.:* Isarthron luridum (Taschenberg).

Bassus (Xorides) collaris Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 383 n. 26, ♀ ♂.
Xorides collaris Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 105 n. 1, ♀ ♂.
Xorides collaris Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 130 n. 19.
Xorides collaris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 65 n. 2, ♀♂.
Xorides collaris Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 302 n. 2, ♀ ♂.

erosus Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Xorides erosus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 278 n. 9, ♀ ♂.

nitens Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Xorides nitens Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 847 n. 13, ♀ ♂.
Xorides nitens Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 328 n. 3.
Xorides nitens Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 61.
Xorides nitens Latreille, Cuvier: Règne anim. 1849; T. 110 F. 7.
Xorides nitens Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 65 n. 1, ♀.
Xorides nitens Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 302 n. 3, ♀ ♂.
Xorides nitens Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 774 n. 1, ♀ ♂.

occidentalis Cress. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Xorides occidentalis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 380, ♀.

scutellaris Desv. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Xorides scutellaris Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 113 n. 3, ♀ ♂.

variipes Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Xorides varipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 66 n. 4, ♂.

vittifrons Cress.[1]) — Am.
Xorides vittifrons Cresson, Canad. Entomol. I. 1868 p. 37.

wahlbergii Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Xorides Wahlbergi Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 65 n. 3, ♂.
Xorides Wahlbergi Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 197, ♀ ♂.
Xorides Wahlbergi Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 774 n. 2, ♀ ♂.
Xorides Wahlbergi Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 127, ♀ ♂.

RHADINA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 170 n. 12.

ῥαδινός, gracilis.

Synon.: Xorides Ratzeburg.
Xylonomus Gravenhorst.

atra (Grav.) Schmkn.[2]) — ♀ ♂ — Eur.
Xylonomus ater Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 827 n. 5, ♀ ♂.
Xorides (Xylonomus) ater Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 105 n. 5, ♀ ♂.
Xylonomus ater Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 71 n. 9, ♀ ♂.
Xylonomus ater Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 300 n. 5, ♀.
Xylonomus ater Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 198, ♀ ♂.
Rhadina ater Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 443.
Xylonomus ater Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 78, ♀.

---

1) *Col.:* Dicerca divaricata, — *Hymen.:* Xiphydia albicornis, Tremex columba (Harrington).

2) *Col.:* Isarthron luridum, Criocephalus rusticus (Ratzeburg).

SICHELIA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 169 n. 11.

Dr. J. Sichel, nom. propr.

Synon.: Ichneumon Ratzeburg.
Xorides Ratzeburg.
Xylonomus Gravenhorst & auct.

filiformis (Grav.) Schmkn.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Xylonomus filiformis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 830 n. 7, ♀ ♂.
Ichneumon (Xylonomus) filiformis Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 27 n. 23; T. 6 F. 12.
Xylonomus filiformis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 123 n. 1.
Xorides (Xylonomus) filiformis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 105 n. 2.
Xylonomus filiformis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 68 n. 1, ♀.
Xylonomus filiformis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 300 n. 1, ♀ ♂.
Xylonomus filiformis Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 775 n. 1, ♀.
Xylonomus filiformis Fallou, Ann. soc. entom. France (6) III. 1883 Bull. p. CXXXVI.
Sichelia filiformis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 443.

gracilicornis (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Xylonomus gracilicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 832 n. 8, ♀ ♂.
Xylonomus gracilicornis Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 131 n. 21.
Xylonomus gracilicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 68 n. 2, ♀ ♂.
Xylonomus gracilicornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 300 n. 2, ♀ ♂.
Sichelia gracilicornis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 443.

hungarica Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Sichelia Hungarica Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 20 & 38 n. 95, ♀.

MOEROPHORA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 169 n. 10.

μοῖρα, sors; *φέρω*, fero.

Synon.: Xorides Blanchard.
Xylonomus Gravenhorst & auct.

rufipes (Grav.) Woldst.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Russia.
Xylonomus rufipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 823 n. 1, ♀.
Ichneumon (Xorides) rufipes Blanchard, Cuvier: Règn. anim. Ed. 3ª Insect. II. 1849; T. 110 F. 7.
Xylonomus rufipes Kawall, Stettin. entom. Zeitg. XXXI. 1870 p. 108 n. 3, ♂.
Xylonomus rufipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 127, ♀ ♂.
Xylonomus (Moerophora) rufipes Woldstedt, Horae soc. entom. Ross. XVI. 1881 p. 61.
Moerophora rufipes Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 443.

PERISSOCERUS

Smith, Proc. Zool. Soc. London 1877 p. 412.

περισσός, nimius; *κέρας*, cornu.

plumicornis Smith — ♀ — Am.: Brasilia.
Perissocerus plumicornis Smith, Proc. Zool. Soc. London 1877 p. 412, ♀; T. 44 F. 3 & 3ª.

---

1) *Col.:* Callidium variabile, Astynomus aedilis, Rhagium inquisitor, Ergates faber (Ratzeburg), Callidium sanguineum (Mocsáry).

2) *Col.:* Rhagium indagator (Brischke).

XYLONOMUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 819 n. 1.
ξύλον, lignum; νέμω, habito.

Synon.: Acoenitus Say.
Anomalon Say, Leconte.
Bassus Zetterstedt.
Cryptus Fabricius.
Hemiteles Ratzeburg.
Ichneumon Fabricius & auct.
Xorides Latreille & auct.

albopictus Cress. — ♀ — Am.: Canada, New York.
Xylonomus albopictus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 168 n. 6, ♀.
Xylonomus albopictus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 158, ♀.
Xorides Canadensis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 248 & 339.
Xylonomus albopictus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 101 n. 4, ♀.
Xylonomus albopictus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 489 n. 4, ♀.
annulatus Grav. — Eur.: Austria inf.
Xylonomus annulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 825 n. 3.
australis Cress. — ♀ — Am.: Louisiana, Texas.
Xylonomus australis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 167 n. 1, ♀.
brachylabris Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.
Xylonomus ater Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 105 n. 5, ♀ ♂.
Xylonomus ater Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 71 n. 9, ♀ [p. p.].
Xylonomus brachylabis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 75 n. 25, ♀ ♂.
calidus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Xylonomus calidus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 119 n. 5, ♀.
californicus Cress. — ♀ — Am.: California.
Xylonomus Californicus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 380, ♀.
caligatus Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Xylonomus caligatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 828 n. 6, ♂.
Xorides (Xylonomus) caligatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 106 n. 6, ♂.
canadensis Harrgt. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Xylonomus Canadensis Harrington, Canad. Entomol. XXIII. 1891 p. 134, ♀ ♂.
catomus Davis — ♀ — Am.: Idaho.
Xylonomus catomus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 372, ♀.
cincticornis Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Xylonomus cincticornis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 288, ♀.
clavicornis Kriechb. — ♀ — Eur.: Litorale.
Xylonomus clavicornis Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXIII. 1879 [p. 168, ♀.
corcyrensis Kriechb. — ♀ — Eur.: Corfu.
Xylonomus Corcyrensis Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894 p. 22, ♀.
depressus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Xylonomus depressus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 70 n. 6, ♀.
Xylonomus depressus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 127, ♀ ♂.
distinguendus Magr. — ♀ — Eur.: Italia.
Xylonomus distinguendus Magretti, Bull. soc. entom. Ital. XVI. 1884 p. 102 n. 19, ♀.
elizabethae Bingh. — As.: Sikkim.
Xylonomus Elizabethae Bingham, Journ. Bombay Soc. XII. 1898 p. 116.
ephialtoides Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania.
Xylonomus ephialtoides Kriechbaumer, Termész. Füzet. VI. 1882 p. 151 n. 15, ♀.

fasciipennis Kriechb. — ♀ — Eur.: Litorale.
Xylonomus fasciipennis Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymn. Pola 1894 p. 22, ♀.
ferrugatus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Xylonomus ferrugatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 840 n. 11, ♀.
Xylonomus ferrugatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 70 n. 7, ♀.
Xylonomus ferrugatus Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 775 n. 5, ♂.
flavifrons Smith — ♀ — As.: Gililo.
Xylonomus flavifrons Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 64 n. 1, ♀.
floridanus Ashm. — ♀ — Am.: Florida.
Xylonomus Floridanus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 451, ♀.
fracticornis Smith — ♀ — As.: Batchian.
Xylonomus fracticornis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 142 n. 1, ♀.
frigidus Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Xylonomus frigidus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 168 n. 5, ♀.
Xylonomus frigidus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 101 n. 3, ♀.
Xylonomus frigidus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 489 n. 3, ♀.
fulgidipennis Smith — ♀ — As.: Borneo.
Xylonomus fulgidipennis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 122 n. 1, ♀.
glyptus Thoms. — ♂ — Eur.: Suecia.
Xylonomus glyptus Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 776 n. 6, ♂.
gravenhorstii Curt. — ♀ — Eur.: Britannia.
Xylonomus Gravenhorsti Curtis, Brit. Entom. VIII. 1831 p. 353 n. 2, ♀.
humeralis (Say) Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Anomalon humerale Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 74 n. 2, ♀.
Xorides humeralis Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 223, ♂.
Anomalon humerale Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 378 n. 2, ♀.
Xorides humeralis Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 682, ♂.
Xylonomus Lavalensis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 59, ♀.
Xylonomus humeralis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 100 n. 1, ♀ ♂.
Xylonomus humeralis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 488 n. 1, ♀ ♂.
indicatorius (Latr.) Blanch. — ♀ — Eur.
Ichneumon indicatorius Latreille, Gen. Crust. & Insect. I. 1806; T. 12 F. 3.
Xorides indicatorius Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 5.
Xorides indicator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 135 n. 1.
Xorides indicatorius Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 791 n. 1, ♀.
Xorides indicatorius Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2a IV. 1835 p. 347 n. 1.
Xorides (Xylonomus) indicatorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 328 n. 1.
investigator Smith — ♀ — As.: Japonia.
Xylonomus investigator Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 397 n. 1, ♀.
irrigator (Fabr.) Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon irrigator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 152 n. 79.
Bassus irrigator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 97 n. 15, ♀.
Ichneumon irrigator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110, ♀.
Bassus irrigator Gravenhorst, Magaz. f. Entom. IV. 1821 p. 273 n. 10, ♀.
Ichneumon irrigator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
Ichneumon irrigator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 297.
Xylonomus irrigator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 837 n. 10, ♀ ♂.
Bassus (Xylonomus) irrigator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 382 n. 24, ♀ ♂.

---

1) *Col.:* Rhagium indagator, — *Lep.:* Liparis monacha (Ratzeburg).

Xylonomus irrigator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. 1844 p. 123 n. 2.
Xorides (Xylonomus) irrigator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 105 n. 3.
Xylonomus irrigator Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 131 n. 21.
Xylonomus irrigator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 69 n. 3, ♀ ♂.
Xylonomus irrigator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 302 n. 3, ♀ ♂.
Xylonomus irrigator Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 775 n. 2, ♀ ♂.
Xylonomus irrigator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 443.

maudae Davis — ♀ — Am.: Washington Terr.
Xylonomus Maudae Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 32, ♀.

praecatorius (Fabr.) Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 340 n. 45.
Ichneumon articulatus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 408 n. 46.
Ichneumon falsatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 169 n. 27.
Ichneumon praecatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 139 n. 27.
Ichneumon falsatorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 52 n. 19.
Cryptus praecatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 72 n. 11.
Ichneumon praecatorius Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 179 n. 2.
Xorides ? praecatorius Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 5.
Xorides praecatorius Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 135 n. 2.
Cryptus praecatorius Gravenhorst, Magaz. f. Entom. IV. 1821 p. 274 n. 11, ♀.
Ichneumon praecatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 254.
Ichneumon praecatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 290.
Xorides praecatorius Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 791 n. 2.
Xylonomus parvulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 825 n. 4, ♂.
Xylonomus praecatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 841 n. 12, ♀.
Ichneumon articulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 883 n. 15, ♀.
Anomalon praecatorius Trentepol, Isis 1829 p. 954 n. 70, ♀.
Xorides praecatorius Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2a IV. 1835 p. 347 n. 2.
Xorides (Xylonomus) praecatorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 328 n. 2.
Xylonomus praecatorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 123 n. 3, ♀ ♂.
Xorides (Xylonomus) praecatorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 115 n. 4.
Xylonomus praecatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 70 n. 8, ♀.
Xylonomus praecatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 300 n. 6, ♀ ♂.
Xylonomus praecatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 198, ♀ ♂.
Xylonomus praecatorius Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 775 n. 4, ♀ ♂.
Xylonomus praecatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 128, ♀ ♂.
Xylonomus praecatorius Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 443.

propinquus Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Xylonomus propinquus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 279 n. 10, ♀ ♂.

pulcher Ashm. — ♀ — Am.: Missouri.
Xylonomus pulcher Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 450, ♀.

rileyi Ashm. — ♀ — Am.: Missouri.
Xylonomus Rileyi Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 450, ♀.

rusticus Desv. — Eur.: Britannia.
Xorides (Xylonomus) rusticus Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 112 n. 2.

scaber Grav. — ♀ — Eur.
Xylonomus scaber Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 824 n. 2, ♀.

---

[1] *Col.:* Callidium variabile (Brischke), C. sanguineum, Isarthron luridum (Ratzeburg).

securicornis Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Xylonomus securicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 69 n. 5, ♀.
Xylonomus securicornis Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXIII. 1879 [p. 167-169.
sepulchralis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Xylonomus sepulchralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 71 n. 10, [♀♂.
stigmapterus (Say) Cress. — ♀ — Am.: Canada, United States.
Acoenitus stigmapterus Say, Keating's Narrat. Exped. II. 1824 App. p. 325, ♀.
Acoenitus stigmapterus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 218, ♀.
Xylonomus stigmapterus Cresson, Walsh: Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 153 & [165, ♀.
Xylonomus stigmapterus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 101 n. 2, ♀.
Xylonomus stigmapterus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 488 n. 2, ♀.

GONOPHONUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 169 n. 8.
γόνος, soboles; *φόνος*, homicidium.
Species exstat.

STEROTRICHUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 169 n. 7.
στέροψ, fulgurans; *θρίξ*, capillus.

Synon.: Xorides Schummel.
Xylonomus Gravenhorst & auct.

pilicornis (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Belgia, Germania.
Xylonomus pilicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 833 n. 9, ♀ ♂.
Xylonomus pilicornis Curtis, Brit. Entom. VIII. 1831 p. 353 n. 1, ♂; T. 353.
Xorides pilicornis Schummel, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1835 1836 p. 82.
Xylonomus pilicornis Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 61.
Xylonomus pilicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 69 n. 4, ♀♂.
Xylonomus pilicornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 300 n. 4, ♀♂.
Xylonomus pilicornis Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 775 n. 3, ♀ ♂.
Xylonomus pilicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 127, ♂.
Sterotrichus pilicornis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 443.

MOANSA

Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 344.
Etymol. obscura.

praestans Tosqu. — ♀ — Afr.: Caffraria.
Moansa praestans Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 345, ♀.

GABUNIA

Kriechbaumer, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig XIX/XXI. 1892-94. 1895 p. 130.
Gabun, nom. propr.

caerulea Kriechb. — ♀ — Afr.: Gaboon.
Gabunia caerulea Kriechbaumer, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig XIX/XXI. 1892-94. 1895 p. 133 [n. 3, ♀.
flavitarsis Kriechb. — ♀ — Afr.: Gaboon.
Gabunia flavitarsis Kriechbaumer, Sitzber. naturf. Ges. Leips. XIX/XXI. 1892-94. 1895 p. 131 [n. 1, ♀.
ruficoxis Kriechb. — ♀ ♂ — Afr.: Gaboon.
Gabunia ruficoxis Kriechbaumer, Sitzber. naturf. Ges. Leips. XIX/XXI. 1892-94. 1895 p. 132 [n. 2, ♀ ♂.

XYLOPHRURUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 169 n. 6.
ξύλον, lignum; φρουρός, custos.

Synon.: Macrocryptus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 470.
μακρός, longus; Cryptus, nom. propr. Hymen.
Cryptus Gravenhorst.
Echthrus Gravenhorst.

brevicornis (Brischke) D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Macrocryptus brevicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 2. 1881 p. 333, ♀.
Xylophrurus brevicornis m.
coroebi (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Macrocryptus coroebi (Regimbert) Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 19 n. 2,
Xylophrurus coroebi m. [♀ ♂.
lancifer (Grav.) Schmkn.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Cryptus spiralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 454 n. 23, ♂ [excl. ♀].
Echthrus lancifer Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 867 n. 22, ♀.
Echthrus lancifer Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 303 n. 2, ♀.
Cryptus dentatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 73 n. 14, ♂.
Macrocryptus lancifer Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 487 n. 1.
Echthrus lancifer Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 128, ♂.
Xylophrurus lancifer Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 442.
Cryptus dentatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 226, ♀ ♂.
Macrocryptus lancifer Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1897 p. 2354 n. 1 & p. 2377, ♂.

ACHOROCEPHALUS

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 295.
ἀχώρ, manans capitis ulcus; κεφαλή, caput.

cinctipes Kriechb. — ♀ — As. minor.
Achorocephalus cinctipes Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 296, ♀.

PEROSIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 169 n. 3.
πήρωσις, mutilatio.

Synon.: Echthrus Gravenhorst, Brischke.
Ichneumon Taschenberg.
Phygadeuon Gravenhorst, Taschenberg, Brischke.
Xylonomus Brischke.

albopicta Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania ?
Perosis albopicta Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 214 n. 1, ♀.
annulatus (Brischke) Kriechb.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Xylonomus annulatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 198, ♀.
Echthrus annulatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 128, ♀ ♂.
Perosis annulata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 217 n. 3, ♀ ♂.

---

1) *Col.:* Saperda populnea (Mocsáry.)
2) *Lep.:* Sesia spheciformis, S. formicaeformis (Brischke).

armata (Grav.) Schmkn.[1] — ♀ (♂) — Eur.: Germania.
? Phygadeuon semiorbitulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 682 n. 175, ♂.
Echthrus armatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 867 n. 21, ♀.
Ichneumon armatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 303, nota, ♀.
? Phygadeuon semiorbitulus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 53 [n. 90, ♂.
Echthrus armatus Brischke, Deutsch. entom. Zeitschr. XXI. 1877 p. 286.
? Phygadeuon semiorbitulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1/2. 1881 [p. 341, ♂.
Perosis armata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 441.
cingulipes Schmkn. — Eur.: Germania ?
Perosis cingulipes (Förster) Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 442.
gracilis Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania.
Perosis gracilis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 216 n. 2, ♀.

CALLICLISIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 169 n. 4.
κάλλος, pulchritudo; *κλίσις*, inclinatio.

Synon.: Euchorides Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 167.
εὖ, bene; Xorides, nom. propr. Hymen.
Phthinodes Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 272.
φθίνω, hebesco; *εἶδος*, forma.
Ephialtes Gravenhorst.
Ichneumon Gmelin.
Poemenia Holmgren.

americana (Cress.) D. T. — ♀ — Am.: Texas, Connecticut, Pennsylvania.
Euxorides Americanus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 167, ♀.
Euxorides Americanus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 116, ♀.
Calliclisis Americana m.
brachyura (Holmgr.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Suecia.
Poemenia brachyura Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 67 n. 3, ♀.
Calliclisis brachyura Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 440.
hectica (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 63 n. 237.
Ephialtus hecticus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 248 n. 111, ♂.
Poemenia tipularia Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 67 n. 2, ♀.
Phthinodes hecticus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 272 n. 4, ♀ ♂.
Poemenia tipularia Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 105 n. 14, ♂.
Calliclisis hectica Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 440.
vancouveriensis (Prov.) D. T. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Euxorides Vancouveriensis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 369, ♀.
Calliclisis Vancouveriensis m.

EPIXORIDES

Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 62.
ἐπί, ad; Xorides, nom. propr. Hymen.

chalybeator Smith — ♂ — As.: Ceram.
Epixorides chalybeator Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 64 n. 1, ♂.

---

[1]) *Lep.*: Leucania obsoleta (Brischke).

MISCHOXORIDES

Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 368.
μίσχος, pediculus; Xorides, nom. propr. Hymen.

Synon.: Clepticus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 116 [non Cuvier 1829].
κλεπτικός, furto addictus.
Cryptus Haliday.

comes (Hal.) D. T. — ♀ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Clepticus) comes Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 116, ♀.
Mischoxorides comes m.
paganus (Hal.) D. T. — ♀ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Clepticus) paganus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 116, ♀.
Mischoxorides paganus m.
praetor (Hal.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Clepticus) praetor Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 116, ♀ ♂.
Clepticus praetor Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 61.
Mischoxorides praetor m.
socius (Hal.) D. T. — ♀ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Clepticus) socius Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 116, ♀.
Mischoxorides socius m.

ISCHNOCERUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 949 n. 9.
ἰσχνός, gracilis; κέρας, cornu.

Synon.: Mitroboris Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 131 n. 23.
μίτρα, vinculum; βορός, edax.
Bracon Fabricius.
Cryptus Gravenhorst.
Hemiteles Provancher.
Ichneumon Fourcroy & auct.
Ischnus Gravenhorst.
Odontomerus Ratzeburg.
Phytodietus Blanchard.
Xorides Ratzeburg.

abdominalis Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Ischnocerus abdominalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 25, ♀.
bicinctus Walk. — ♀ — As.: Japonia.
Ischnocerus bicinctus Walker, Cistula entom. I. P. 11. 1874 p. 303 n. 5, ♀.
caelebs Holmgr. — ♀ ♂ — Afr.: Cap.
Ischnocerus coelebs Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 402 n. 24, ♀ ♂.
cancellatus Brullé — ♀ — As.: Java.
Ischnoceros ? cancellatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 262 n. 4, ♀.
dimidiatus Brullé — ♀ — Austr.: New Guinea.
Ischnoceros ? dimidiatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 262 n. 3, ♀; T. 42 F. 1.
ferrugineus Holmgr. — ♀ — Afr.: Cap.
Ischnocerus ? ferrugineus Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 402 n. 23, ♀.
filicornis Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon rusticus Fourcroy & auct. [p. p.]. [p. 164, ♀ ♂.
Ischnocerus filicornis Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXIII. 1879

maculipennis Brullé — ♀ — Eur.: Gallia.
Ischnocerus maculipennis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 261 n. 2, ♀.
marchicus Htg.[1]) — Eur.: Germania.
Ischnocerus Marchicus Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. 2. 1838 p. 255.
Ischnocerus Marchicus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 149 n. 1.
Ischnocerus Marchicus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 122.
microcephalus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ischnocerus microcephalus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 954 n. 328, ♀ ♂.
Ischnocerus microcephalus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 139 n. 2, [♀♂.
montanus Ashm. — ♀ — Am.: Colorado.
Ischnocerus montanus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 418, ♀.
purgator (Fabr.) Brullé[2]) — ♀ ♂ — Eur. mer.
Ichneumon purgator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 156 n. 94.
Ichneumon purgator Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. I. 1799 p. 18; T. 4 F. 3.
Ichneumon purgator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 58 n. 47.
Bracon purgator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 104 n. 10.
Ichneumon purgator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 113, ♀.
Ichneumon purgator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 261.
Ichneumon purgator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 310.
Ischnoceros purgator Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 260 n. 1, ♀.
Ischnocerus purgator Sichel, Ann. soc. entom. France (3) VIII. 1860 p. 758, ♀ ♂.
rusticus (Fourcr.) Grav.[3]) — ♀ ♂ — Eur. centr.
Ichneumon rusticus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 426 n. 95.
Ichneumon rusticus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 190 n. 176.
Cryptus rusticus Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 289.
Ischnocerus rusticus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 951 n. 327, ♀ ♂.
Phytodietus (Ischnocerus) rusticus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 316 n. 2.
Xorides (Odontomerus) cornutus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 108 n. 14.
Mitroboris cornutus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 131 n. 23.
Mitroboris cornuta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 72 n. 1, ♀♂.
Mitroboris cornuta Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 303, ♀ ♂.
Mitroboris cornuta Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 200, ♀ ♂.
Ischnocerus rusticus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 139 n. 1, ♀♂.
Ischnocerus rusticus Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 60, ♀ ♂.
Ischnocerus rusticus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N.F. IV. P.4. 1880 p. 129, ♀♂.
semirufus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Hemiteles semirufus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 332.
Hemiteles semirufus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 123 n. 7, ♀.
Hemiteles semirufus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 326 n. 7, ♀.
Ischnocerus semirufus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 188.
seticornis Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia.
Ichneumon rusticus Fourcroy & auct. [p. p.]. [p. 165, ♀♂.
Ischnocerus seticornis Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXIII. 1879
smithii D. T. — ♀ — As.: Celebes.
Ischnocerus maculipennis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 62 n. 1, ♀.
Ischnocerus Smithii m.

---

1) *Lep.:* Gastropacha pini (Hartig).
2) *Lep.:* Psyche muscellae (Sichel).
3) *Col.:* Aromia moschata, Rhagium mordax (Brischke). — *Hymen.:* Odynerus levipes (Giraud).

ANODONTOMERUS

Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 61.
ἀ(ν)-Odontomerus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Haplomerus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 119 [Aplomerus, ἁπλοῦς, simplex; μέρος, pars. [nec Aplomera Nacq.].
Platysoma Provancher, Canad. Entomol. XVII. 1885 p. 115 [nec Latreille 1817 & πλατύς, latus; σῶμα, corpus. [auct. al.].

nasonii (Davis) D. T. — ♂ — Am.: Illinois.
Aplomerus Nasonii Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 32, ♂.
Anodontomerus Nasonii m.

tibialis (Prov.) Ashm. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Platysoma tibialis Provancher, Canad. Entomol. XVII. 1885 p. 115, ♀.
Aplomerus tibialis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 120, ♀.
Aplomerus tibialis Harrington, Canad. Entomol. XXIX. 1897 p. 46.
Anodontomerus tibialis Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 61.

ODONTOMERUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 851 n. 3.
ὀδούς, dens; μηρός, lumbus.

Synon.: Anomalon Jurine, Say.
Bassus Zetterstedt.
Exochus Cresson.
Ichneumon Geoffroy & auct ant.
Xorides Gravenhorst & auct.

abdominalis Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Odontomerus abdominalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 289 n. 2, ♀.

aethiops Cress. — ♀ ♂ — Am.: Colorado.
Odontomerus aethiops Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 289 n. 1, ♀ ♂.

appendiculatus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Odontomerus appendiculatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 853 n. 16, ♀.
Bassus (Odontomerus) appendiculatus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 383 n. 27, ♀ ♂.
Xorides (Odontomerus) appendiculatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 108
Odontomerus appendiculatus Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 777 n. 6. [n. 13.

bicolor Cress. — ♀ — Am.: Canada, Pennsylvania.
Odontomerus bicolor Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 169 n. 4, ♀.
Odontomerus bicolor Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 102 n. 3, ♀.
Odontomerus bicolor Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 490 n. 3, ♀.

canadensis Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Exochus propinquus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 114, ♂ [excl. ♀].
Odontomerus Canadensis Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 16.
Odontomerus Canadensis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 102 n. 2, ♀ ♂.
Odontomerus Canadensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 490 n. 2, ♀ ♂.

dentipes (Gmel.) Zett.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 326 n. 12.
? Ichneumon ruspator Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 326 n. 12.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 70 n. 339.
Ichneumon dentipes Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2719 n. 384, ♂.

---

1) *Lep.:* Liparis monacha (Ratzeburg). — *Col.:* Attagenus pellio (Doumerc).

Anomalon ruspator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 116, ♀.
Odontomerus dentipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 854 n. 17, ♀ ♂.
Xorides dentipes Gravenhorst, Beitr. z. Entom. Schles. I. 1829 p. 15 n. 7, ♀♂; T. 1 F. 2.
Bassus (Odontomerus) dentipes Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 383 n. 28, ♀.
Xorides (Odontomerus) dentipes Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 328 n. 4.
Odontomerus dentipes Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 61.
Xorides (Odontomerus) dentipes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 107 n. 11, ♀♂.
Ichneumon (Odontomerus) ruspator Doumerc, Ann. soc. entom. France (3) VII. 1859 Bull. [p. CLXXII-CLXXIII.
Odontomerus dentipes Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 132 n. 24.
Odontomerus dentipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 73 n. 1, ♀♂.
Odontomerus dentipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 304, ♀ ♂.
Odontomerus dentipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 200, ♀.
Odontomerus dentipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 129, ♀♂.
Odontomerus dentipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 47, ♂

geniculatus Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia, Germania.
Odontomerus geniculatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 73 n. 22, ♀ ♂.

glandarius Rond.[1]) — Eur.: Italia.
Odontomerus glandarius Rondani, Bull. soc. entom. Ital. IX. 1877 p. 189 n. 53.

melanarius Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Odontomerus melanarius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 73 n. 2, ♀.
Odontomerus melanarius Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 777 n. 2, ♀.

mellipes (Say) Walsh — ♀ ♂ — Am.: Canada, Indiana, Illinois.
Anomalon mellipes Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 75 n. 3.
Anomalon mellipes Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 242 n. 3.
Anomalon mellipes Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 378 n. 3.
Anomalon mellipes Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 697 n. 3, ♀ ♂.
Odontomerus mellipes Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 164, ♀.
Odontomerus mellipes Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 102 n. 1, ♀.
Odontomerus mellipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 490 n. 1, ♀.

pinetorum Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Odontomerus pinetorum Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 777 n. 1, ♀ ♂.

punctulatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Odontomerus punctulatus Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 777 n. 3, ♀.
Odontomerus punctulatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 76 n. 23, ♀ ♂.

quercinus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Helvetia.
Odontomerus quercinus Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 777 n. 5, ♀ ♂.
Odontomerus quercinus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 74 n. 24, ♀ ♂.

rufiventris Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Odontomerus rufiventris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 73 n. 3, ♀.
Odontomerus rufiventris Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 777 n. 4, ♂.
Odontomerus rufiventris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 47, ♀.
Odontomerus rufiventris Szépligeti, Térmesz. Füzet. XXIII. 1900 p. 20 & 38 n. 94, ♀.

spinipes Grav.[2]) — ♀ — Eur.: Germania.
Xorides spinipes Gravenhorst, Beitr. z. Entom. Schles. I. 1828 p. 18 n. 8, ♀.
Odontomerus spinipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 859 n. 18, ♀.
Xorides (Odontomerus) spinipes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 108 n. 12.

---

1) *Col.:* Balaninus glandium (Rondani).
2) *Lep.:* Eupithecia debilitata, — *Col.:* Pogonochoerus hispidus (Giraud).

striatus Brullé — ♀ — Eur.: Gallia.
Odontomerus striatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 123 n. 1, ♀.
vicinus Cress. — ♂ — Am.: Massachusetts.
Odontomerus vicinus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 168 n. 2, ♂.

MICROTRITUS

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 307.
μικρός, parvus; *τρίτος*, tertius.

apicalis Kriechb. — ♀ — Am.: Cayenne.
Microtritus apicalis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 308, ♀.

DYSEIDOPUS

Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 489.
δύς, aegre; *εἶδος*, visus; *ποῦς*, pes.

sericeus Kriechb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Dyseidopus sericeus Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 490, ♀.

CUBOCEPHALUS

Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 121.
κύβος, cubus; *κεφαλή*, caput.
Vide genus Lampronota.

HELCOSTIZUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 186 n. 1.
ἕλκος, ulcus; Stizus, nom. propr Hymen.

Synon.: Brachycentrus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 106.
βραχύς, brevis; *κέντρον*, aculeus.
Cyrtocryptus Marshall, Catal. Brit. Hymen, III. 1872 p. 41 [s. descr.].
Marshall, Trans. Entom. Soc. London 1872 p. 259.
κυρτός, curvus; Cryptus, nom. propr. Hymen.
Heterocryptus Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur & Folk XXI. 1873 p. 73.
ἕτερος, alter; Cryptus, nom. propr. Hymen.
Mesocryptus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 519 & P. 6. 1874 p. 591.
μέσος, medius; Cryptus, nom. propr. Hymen.
Pezoporus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 181 n. 2.
πεζός, pedes; *πόρος*, transitus.
Aptesis Förster.
Cryptus Gravenhorst, Ratzeburg.
Ichneumon Schrank.
Mutilla Schrank.
Pezomachus Gravenhorst, Blanchard.
Phygadeuon Gravenhorst & auct.
Plectocryptus Thomson.

brachycentrus (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Cryptus brachycentrus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 457 n. 25, ♀ ♂.
Cryptus brachycentrus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 278 n. 5, ♀♂.
Brachycentrus pimplarius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 106, ♀♂.
Cyrtocryptus brachycentrus Marshall, Trans. Entom. Soc. London 1872 p. 41.

Heterocryptus brachycentrus Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur & Folk XXI. 1873 p. 73
Mesocryptus brachycentrus Thomson, Opusc. entom. P. 6. 1874 p. 592, ♀ ♂. [n. 1.
Cyrtocryptus brachycentrus Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 65; T. 41 F. 5.
Cyrtocryptus brachycentrus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 37, ♀ ♂.
Brachycentrus pimplarius Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 441.
Helcostizus brachycentrus m.

curvus (Schrk.) D. T.[1]) — ♀ ♂ — Eur. tota.
Ichneumon curvus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 282 n. 2087, ♀.
Phygadeuon curvus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 706, ♀.
Cryptus rufipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 453 n. 22, ♂.
Phygadeuon curvus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 679 n. 173, ♀.
Cryptus (Phygadeuon) curvus Bouché, Naturg. d. Insect. 1834 p. 144 n. 13, ♀.
Phygadeuon curvus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 299 n. 8, ♀.
Phygadeuon curvus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 146 n. 6, ♀.
Phygadeuon curvus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 42 n. 58, ♀.
Cryptus rufipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 71 n. 6, ♂.
Plectocryptus curvus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 521.
Plectocryptus curvus Thomson, Opusc. entom. P. 6. 1874 p. 599 n. 1, ♀ ♂.
Phygadeuon curvus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 226 n. 45, ♀.
Cryptus rufipes Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 277 n. 5, ♂.
Microcryptus curvus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 854 n. 7, ♀ ♂.
Plectocryptus curvus Borries, Entom. Meddels. 1888 p. 207-209.
Phygadeuon ? rufipes Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
Mesocryptus curvus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1897 p. 2383 n. 7, ♂.
Helcostizus curvus m.

echthroides (Ratzbg.) D. T.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus echthroides Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 138 n. 26, ♀ ♂.
Cyrtocryptus echthroides Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 65; T. 41 F. 6.
Helcostizus echthroides m.

fasciatus (Ashm.) D. T. — ♀ — Am.: Texas.
Brachycentrus fasciatus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 413, ♀.
Helcostizus fasciatus m.

maculatus (Woldst.) D. T. — ♀ — Eur.: Fennia.
Heterocryptus maculatus Woldstedt, Bidr. Kaenn. Finl. Natur & Folk XXI. 1873 p. 73
Helcostizus maculatus m. [n. 2, ♀.

nigrocinctus (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon XCVI Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. III. 1779; T. 246 F. 3 [non Fabricius].
? Mutilla acarorum Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 416 n. 840, ♀.
? Ichneumon maculatus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 340; T. 33 F. 7.
? Ichneumon pedicularis Panzer, Faun. Insect. German. VII. P. 81. 1801; T. 13.
Ichneumon nigrocinctus Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 35 n. 7, ♀.
? Phygadeuon flaveolatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 655 n. 158, ♂.
Phygadeuon jucundus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 658 n. 161, ♂.
Pezomachus nigrocinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 880 n. 293, ♀.
Ichneumon bimaculatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 941 n. 94, ♀.
Phygadeuon jucundus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 297 n. 3, ♂.
Pezomachus nigrocinctus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 314 n. 1.
Aptesis nigrocincta Förster, Arch. f. Naturg. XVI. 1. 1850 p. 85 n. 2, ♀.

---

1) *Lep.:* Geometra piniaria (Bouché), Fidonia curva, Philobia lituraria (Rondani).
2) *Col.:* Magdalis violaceus (Vollenhoven).

? Phygadeuon flaveolatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 44, ♂.
Phygadeuon jucundus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N.F. V. P. 1-2. 1881 p. 341, ♂.
Phygadeuon jucundus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 224 n. 51, ♂.
Aptesis nigrocincta Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 157 n. 1, ♀.
Microcryptus nigrocinctus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 857 n. 16, ♀ ♂.
Mesocryptus nigrocinctus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1897 p. 2383 n. 16.
Pezoporus nigrocinctus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 27.
Helcostizus nigrocinctus m.

nigriventris (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesocryptus nigriventris Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1897 p. 2384 n. 32b, ♀ ♂.
Helcostizus nigriventris m.

ochrostomus (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesocryptus ochrostomus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1897 p. 2384 n. 37b, ♀ ♂.
Helcostizus ochrostomus m.

opaculus (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Microcryptus opaculus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 851 n. 2, ♀.
Mesocryptus opaculus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1897 p. 2383 n. 2, ♀ ♂.
Helcostizus opaculus m.

triannulatus (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Phygadeuon triannulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 657 n. 160, ♀ ♂.
Phygadeuon triannulatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 43 n. 63, ♀.
Microcryptus triannulatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 858 n. 17, ♀ ♂.
Mesocryptus triannulatus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1897 p. 2384 n. 17.
Helcostizus triannulatus m.

tricinctus (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Cryptus tricinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 570 n. 100, ♂.
Microcryptus areolaris Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 858 n. 18, ♀ ♂.
Phygadeuon tricinctus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
Mesocryptus areolaris Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1897 p. 2384 n. 18.
Helcostizus tricinctus m.

ECHTHRUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 861 n. 4.
ἐχθρός, invisus.

Synon.: Sphaetes Bremi, Stettin. entom. Zeitg. X. 1849 p. 95.
Etymol. obscura.

Bassus Klug.
Cryptus Fabricius, Panzer, Trentepol.
Ichneumon Linné & auct. ant.
Lissonota Gravenhorst.
Mesochorus Provancher.
Phygadeuon Gravenhorst, Taschenberg, Brischke.
Tryphon Zetterstedt.
Xorides Gravenhorst, Ratzeburg.

abdominalis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Echthrus abdominalis Cresson, Canad. Entomol. I. 1868 p. 37.
Mesochorus Saintcyri Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 299.
Echthrus abdominalis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 99 n. 6, ♀.
Echthrus abdominalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 487 n. 6, ♀.
Echthrus abdominalis Harrington, Canad. Entomol. XXV. 1893 p. 32, ♀ ♂.

adillae Davis — ♂ — Am.: Washington Terr.
Echthrus adillae Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 p. 32, ♂.
annulicornis Walsh — ♀ — Am.: Illinois.
Echthrus annulicornis Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 159, ♀.
Echthrus annulicornis Harrington, Canad. Entomol. XXV. 1893 p. 32, ♀.
atrator Walk. — ♀ — As.: Japonia.
Echthrus atrator Walker, Cistula entom. I. P. 11. 1874 p. 306 n. 12, ♀.
brevicornis Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Echthrus brevicornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 199, ♀.
canadensis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Mesochorus Canadensis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 299.
Echthrus Canadensis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 98 n. 3, ♀.
Echthrus Canadensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 486 n. 3, ♀.
Echthrus Canadensis Harrington, Canad. Entomol. XXV. 1893 p. 32, ♀.
crassipes Htg. — ♀ — Eur.: Germania.
Echthrus crassipes Hartig, Ber. naturw. Ver. Harz 1847 p. 16 n. 2, ♀.
Xorides (Echthrus) crassipes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 106 n. 7, ♀.
Xorides (Echthrus) crassipes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 115 n. 7.
Echthrus crassipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 128, ♀.
cryptiformis Ratzbg. — ♀ — Eur.: Germania.
Xorides (Echthrus) cryptiformis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 106 n. 9, ♀.
hercynianus Htg. — ♀ — Eur.: Germania.
Echthrus Hercynianus Hartig, Ber. naturw. Ver. Harz 1847 p. 16 n. 1, ♀.
Xorides (Echthrus) Hercynianus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 106 n. 8, ♀.
longicornis Ratzbg. — ♀ — Eur.: Germania.
Xorides (Echthrus) longicornis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 107 n. 10, ♀.
luctuosus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Mesochorus luctuosus Provancher, Natural Canad. VI. 1874 p. 299.
Echthrus luctuosus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 98 n. 2, ♀.
Echthrus luctuosus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 486 n. 2, ♀.
Echthrus luctuosus Harrington, Canad. Entomol. XXV. 1893 p. 31, ♀.
maurus Cress. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Echthrus ? maurus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 381, ♀.
Echthrus maurus Harrington, Canad. Entomol. XXV. 1893 p. 31, ♀.
niger Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Echthrus niger Cresson, Canad. Entomol. I. 1868 p. 37.
Echthrus niger Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 97 n. 1, ♀.
Echthrus niger Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 485 n. 1, ♀.
Echthrus niger Harrington, Canad. Entomol. XXV. 1893 p. 32, ♀ ♂.
nubeculatus Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Echthrus nubeculatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 866 n. 20, ♀ ♂.
Echthrus nubeculatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 199, ♀ ♂.
nubilipennis (Cress.) Harrgt. — ♀ — Am.: Rocky Mountains.
Cryptus nubilipennis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 291, ♀.
Echthrus nubilipennis Harrington, Canad. Entomol. XXV. 1893 p. 31, ♀.
populneus Gir.[2] — ♀ — Eur.: Gallia.
Echthrus populneus Giraud, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 p. 407 n. 14, ♀.

---

1) *Col.:* Saperda populnea (Giraud).
2) *Col.:* Saperda populnea (Giraud).

provancheri Prov.[1]) — ♀ ♂ — Am.: Vancouvers Island.
Echthrus Provancheri (Brodie) Provancher, Canad. Entomol. XVII. 1885 p. 116, ♀ ♂.
Echthrus Provancheri Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 118 n. 8, ♀ ♂.
Echthrus Provancheri Harrington, Canad. Entomol. XXV. 1893 p. 32, ♀.
reluctator (L.) Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon reluctator Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 563 n. 26, ♀.
Ichneumon reluctator Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 402 n. 1603, ♀.
Ichneumon usurpator Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 283 n. 743; T. 40 F. 743.
Ichneumon reluctator Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 933 n. 27, ♀.
Ichneumon reluctator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 333 n. 33, ♀.
Ichneumon reluctator Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 850 n. 27, ♀.
Ichneumon obex O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 154 n. 1794, ♀.
Ichneumon reluctator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 426 n. 35, ♀.
Ichneumon reluctator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 263 n. 43, ♀.
Ichneumon reluctator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 160 n. 77, ♀ [non 71].
Ichneumon usurpator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 161 n. 78.
Ichneumon reluctator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2686 n. 27, ♀.
Ichneumon usurpator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 353.
Ichneumon rubiginosus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 353; T. 36 F. 2.
Ichneumon reluctator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 355, ♀.
Ichneumon reluctator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 176 n. 62, ♀.
Ichneumon usurpator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 212 n. 30, ♀.
Ichneumon reluctator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 150 n. 69, ♀.
Ichneumon reluctator Panzer, Faun. Insect. German. VI. 1799 P. 71 T. 13 (♀).
Ichneumon reluctator Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 278 n. 2078, ♀.
Ichneumon reluctator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 56 n. 35, ♀.
Cryptus reluctator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 79 n. 35, ♀.
Cryptus reluctator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 70, ♀.
Ichneumon reluctator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110, ♀.
Bassus reluctator Klug, Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. 1807 p. 73 n. 13, ♀.
Ichneumon reluctator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 138 n. 5, ♀.
Xorides reluctator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 298, ♀.
Ichneumon reluctator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257, ♀.
Ichneumon reluctator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 299.
Echthrus reluctator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 863 n. 19, ♀ ♂.
Cryptus reluctator Trentepol, Isis 1829 p. 867 n. 41, ♀.
Ichneumon reluctator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª IV. 1835 p. 350 n. 5.
Tryphon reluctator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 383 n. 1, ♀.
Xorides (Echthrus) reluctator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 329 n. 5.
Echthrus reluctator Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 61.
Sphaetes crassicrus Bremi, Stettin. entom. Zeitg. X. 1849 p. 95 n. 7, ♀.
Echthrus reluctator Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 131 n. 72.
Echthrus reluctator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 72 n. 1, ♀ ♂.
Echthrus reluctator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 302 n. 1, ♀ ♂.
Sphaetes crassicrus Kriechbaumer, Stettin. entom. Zeitg. XXXIII. 1872 p. 9, ♀.
Echthrus reluctator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 128, ♀.
Echthrus reluctator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 442.
Echthrus usurpator Xambeu, Naturaliste 1895 p. 78.
Echthrus usurpator Xambeu, Naturaliste 1899 p. 128.

[1]) = ? Cryptus nuncius Say.

rubripes Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Echthrus rubripes Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 15 n. 7, ♀.
Echthrus rubripes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 803 n. 7, ♀.
Echthrus rubripes Harrington, Canad. Entomol. XXV. 1893 p. 32, ♀.

rufopedibus Harrgt. — ♀ — Am.: Canada.
Echthrus rufopedibus Harrington, Canad. Entomol. XXV. 1893 p. 31, ♀.

NYXEOPHILUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 187 n. 8.
Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 18.
νύξις, εως, punctio; *φιλέω*, amo.

Synon.: Caenocryptus Thomson.
Cryptus Dalman & auct.
Ichneumon Dufour & Perris.

augustus (Dalm.) D. T.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Cryptus augustus Dalman, Anal. entom. 1823 p. 97 n. 10, ♀.
Cryptus bimaculatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 634 n. 144, ♀.
Ichneumon odynericidus Dufour & Perris, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 45 n. 23, ♀.
Cryptus bimaculatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 134 n. 3, ♀.
Cryptus bimaculatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 87 n. 52, ♀.
Cryptus bimaculatus Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 480 n. 30, ♀ ♂.
Caenocryptus apum Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 497 n. 5.
Cryptus bimaculatus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXVII. 1873 p. 26
Cryptus bimaculatus S. S. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1875 Proc. p. XVII. [n. 2, ♀.
Conocryptus apum Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXI. 1878 Versl. p. XVIII.
Cryptus haematorius A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. 1883 p. 99, ♀.
Cryptus haematorius A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1884 p. 337.
Nyxeophilus bimaculatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 18.
Caenocryptus apum Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1237 n. 1.
Coenocryptus bimaculatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 118, ♀.
Coenocryptus bimaculatus Verhoeff, Zool. Jahrb. VI. 1892 Syst. p. 692-696.
Cryptus (Caenocryptus) apum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892
Nyxeophilus apum Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1897 p. 2363. [p. 47, ♀.
Nyxeophilus augustus m.

nigricornis Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Nyxeophilus nigricornis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 18 n. 1, ♀.

XYLOPHYLAX

Kriechbaumer, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 210.
ξύλον, lignum; *φύλαξ*, custos.

Species exstat.

---

1) *Hymen.:* Odynerus levipes, Osmia leucomelaena (Giraud).

24. *Subfam.* Pimplinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 142 & 162.

ZAGLYPTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 166 n. 33.
ζα-, valde; *γλυπτός*, sculptus.

Synon.: Polysphincta Gravenhorst & auct.

kincaidii Ashm.[1]) — ♀ ♂ — Am.: Washington.
Zaglyptus Kincaidii Ashmead, Insect Life VI. 1894 p. 260, ♀ ♂.
koebelei How.[2]) — ♀ — Am.: California.
Polysphincta (Zaglyptus) Koebelei Howard, Proc. Entom. Soc. Washington 1892 p. 293 n. 9, ♀.
multicolor (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Polysphincta multicolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 119 n. 65, ♀ ♂.
Polysphincta multicolor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 271 n. 2, ♀ ♂.
Polysphincta multicolor Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XVI. 1873 p. 214.
Polysphincta multicolor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 114, ♀.
Zaglyptus multicolor Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 433.
variipes (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Gallia.
Polysphincta varipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 117 n. 64, ♀.
Polysphincta varipes Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 516 n. 28, ♀.
Polysphincta varipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 90 n. 3, ♀.
Polysphincta varipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 29 n. 1, ♀ ♂.
Polysphincta varipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 271 n. 1, ♀ ♂.
Polysphincta varipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 185, ♀ ♂.
Polysphincta varipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 114, ♂.
Polysphincta varipes Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1250 n. 1.
Zaglyptus varipes Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 433.
Polysphincta varipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 64, ♀.

POLYSPHINCTA

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 112 n. 3.
πολύς, multum; *σφιγκτός*, contractus.

Synon.: Cryptus Holmgren.
Ichneumon Gravenhorst.
Pimpla Laboulbène, Blanchard.
Tryphon Gravenhorst, Stephens, Holmgren.

acuta Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Polysphincta acuta Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 44 n. 2, ♀.
Polysphincta acuta Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 465 n. 2, ♀.
albipes Cress. — ♂ — Am.: Florida.
Polysphincta albipes Cresson, Comstock: Rep. Entomol. U. St. f. 1879. 1880 p. 208, ♂.
anomala Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Polysphincta anomala Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 34 n. 13, ♀.
Polysphincta anomala Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 433.

---

1) *Arachn.:* Tetragnathus spec. (Ashmead).
2) *Arachn.:* Epeira strix aut E. scolopetaria (Howard).

areolaris Ratzbg.[1]) — ♂ — Eur.: Germania.
Polysphincta areolaris Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 120 n. 2, ♂.
Polysphincta areolaris Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 111 n. 7.
bicarinata Davis — ♀ — Am.: Idaho.
Polysphincta bicarinata Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 369, ♀.
bohemanii Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cryptus Bohemanni Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 54 n. 16, ♀ ♂.
Polysphincta Bohemani Holmgren, Svensk. Vet.-Akadl. III. 2. 1860 P. 10. p. 30 n. 3, ♀.
Polysphincta Bohemanni Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1253 n. 10.
Polysphincta Bohemani Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 433.
Polysphincta Bohemani Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2128.
boops Tschek[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Polysphincta boops Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 274 n. 6, ♀.
Polysphincta boops Brischke, Deutsch. entom. Zeitschr. XXI. 1877 p. 285, ♂.
brunetii Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Polysphincta Brunetii Provancher, Natural. Canad. V. 1873 p. 471, ♀.
Polysphincta Bruneti Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 45 n. 5, ♀.
Polysphincta Brunetii Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 466 n. 6, ♀.
burgessii Cress. — ♀ ♂ — Am.: Massachusetts.
Polysphincta Burgessi Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 150 n. 2, ♂.
Polysphincta Burgessii Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 43 n. 1, ♀ ♂.
Polysphincta Burgessii Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 464 n. 1, ♀ ♂.
caudata Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Polysphincta caudata Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1253 n. 8, ♀.
ceylonica Ashm. — ♀ — As.: Ceylon.
Polysphincta Ceylonica Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XVIII. 1896 p. 645, ♀.
cingulata Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Polysphincta cingulata Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 141.
Polysphincta cingulata Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 45 n. 7, ♀.
Polysphincta cingulata Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 466 n. 7, ♀.
clypeata Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Polysphincta clypeata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 32 n. 7, ♀ ♂.
Polysphincta clypeata Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 185, ♀.
Polysphincta clypealis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1252 n. 6.
Polysphincta clypeata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 433.
dichroa Marsh. — ♀ — Am.: Venezuela.
Polysphincta dichroa Marshall, Ann. soc. entom. France LXI. 1892 p. 67 n. 59, ♀.
dictynae Ril.[3]) — ♂ — Am.: Massachusetts.
Polysphincta Dictynae Howard, Insect Life I. 1888 p. 107, ♂; Fig. 21.
discolor Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Polysphincta discolor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 33 n. 12, ♂.
Polysphincta thoracica Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 185, ♀ ♂.
Polysphincta discolor Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 757 n. 1, ♀ ♂.
Polysphincta discolor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 114, ♀ ♂.
Polysphincta discolor Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1254 n. 11.
Polysphincta discolor Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 433.

---

1) *Hymen.:* Trichiocampus viminalis, Croesus septentrionalis, C. salicis, C. viminalis (Ratzeburg).

2) *Arachn.:* Theridium spec. (Brischke).

3) *Arachn.:* Dictyna volupis (Riley).

drewsenii Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.

Polysphincta Drewseni Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 30 n. 2, ♀.

Polysphincta Drewsenii Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 433.

elegans Ratzbg.[1]) — ♀ — Eur.: Germania.

Polysphincta elegans Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 101 n, 1, ♀.

fairmairi (Lab.) Fitch[2]) — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.

Pimpla Fairmairii Laboulbène, Ann. soc. entom. France (3) VI. 1858 p. 807; T. 17 II. F. 1-11, ♀.

Polysphineta Fairmairii Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 172.

granulosa Davis — ♀ — Am.: Michigan.

Polysphincta granulosa Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 369, ♀.

latistriata Ratzb. — ♂ — Eur.: Germania.

Polysphincta latistriata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 120 n. 3, ♂.

limata Cress. — ♀ — Am.: Massachusetts.

Polysphincta limata Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 150 n. 3, ♀.

Polysphincta rufipectus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 140.

Polysphincta limata Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 45 n. 6, ♀.

Polysphincta limata Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 466 n. 6, ♀.

minuta Davis — ♀ — Am.: Michigan.

Polysphincta minuta Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 369, ♀.

nigriceps Walsh — ♀ ♂ — Am.: Illinois.

Polysphincta nigriceps Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 144, ♀ ♂.

nigrita Walsh — ♂ — Am.: Illinois.

Polysphincta nigrita Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 144, ♂.

picticollis Thoms.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.

? Polysphincta percontatoria var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 121 n. 66, ♀.

Polysphincta picticollis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1254 n. 12, ♀ ♂.

Polysphincta picticollis Karsch, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 348.

pimploides Walsh — ♀ — Am.: Illinois.

Polysphincta pimploides Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 145, ♀.

pulchrator Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.

Polysphincta pulchrator Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 757 n. 2, ♀ ♂.

Polysphincta pulchrator Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1253 n. 9.

Polysphincta pulchrator Karsch, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 348.

pusilla Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.

Polysphincta pusilla Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 516 n. 29, ♂.

quadrisculpta (Grav.) Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Italia.

Ichneumon quadrisculptus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 378 n. 130, ♂.

Tryphon quadrisculptus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 250 n. 162, ♂.

Tryphon quadrisculptus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 252 n. 58, ♂.

Tryphon quadrisculptus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 191 [n. 18, ♀.

Polysphincta quadrisculpta Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 115, ♂.

ribesii Ratzbg.[4]) — Eur.: Germania.

Polysphincta Ribesii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 110 n. 1.

rubricapensis Prov. — ♀. — Am.: Canada.

Polysphincta rubricapensis Provancher, Natural. Canad. V. 1873 p. 470, ♀.

---

[1]) *Col.:* Ptilinus pectinicornis, Anobium spec. (Ratzeburg).

[2]) *Arachn.:* Clubiona holoserica (Laboulbène).

[3]) *Arachn.:* Theridium formosum (Karsch).

[4]) *Hymen.:* Nematus ribesii (Ratzeburg).

Polysphincta rubricapensis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 44 n. 4, ♀.
Polysphincta rubricapensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 465 n. 4, ♀.
rufigastra Ashm. — ♀ — Am.: Texas.
Polysphincta rufigaster Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 447, ♀.
rufipes Grav. — ♀ ♂ — Eur.
Polysphincta rufipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 116 n. 63, ♀.
Polysphincta rufipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 89 n. 1, ♀.
Polysphincta rufipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 31 n. 4, ♀.
Polysphincta rufipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 271 n. 4, ♀.
Polysphincta rufipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 114, ♂.
Polysphincta rufipes Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 433.
slossonae Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Polysphincta Slossonae Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 368, ♀.
soror Ratzbg.[1] — ♀ — Eur.: Germania.
Polysphincta soror Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 101 n. 2, ♀.
spinosa Davis — ♀ — Am.: Patria?
Polysphincta spinosa Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 369, ♀.
subrufa Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Polysphincta subrufa Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1887 p. 377, ♀.
taschenbergii Woldst. — ♀ — Eur.: Germania.
Polysphincta Taschenbergi Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 396 [n. 17, ♀.
texana Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Texas.
Polysphincta Texana Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 149 n. 1, ♀.
Polysphincta vicina Provancher, Natural. Canad. V. 1873 p. 471, ♂.
Polysphincta vicina Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 44 n. 3, ♂.
Polysphincta vicina Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 465 n. 3, ♂.
theridii How. — ♂ — Am.: Maine.
Polysphincta Theridii Howard, Proc. Entom. Soc. Washington II. 1892 p. 292 n. 8, ♂.
tuberosa Grav.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Polysphincta tuberosa Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 115 n. 62, ♀.
Pimpla (Polysphincta) tuberosa Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 318 n. 5.
Polysphincta tuberosa Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 59.
Polysphincta tuberosa Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 31 n. 5, ♀ ♂.
Polysphincta tuberosa Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 271 n. 3, ♀.
Polysphincta tuberosa Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 169; Fig.
Polysphincta tuberosa Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1252 n. 5.
Polysphincta tuberosa Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 433.
velata Htg.[3] — ♀ — Eur.: Germania.
Polysphincta velata Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 262, ♀.
Polysphincta velata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 120 n. 1.

SISYROSTOLUS

Kriechbaumer, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1892-94. 1895 p. 133.
σισύρα, pellis; στέλλω, vestio.

brevicornis Kriechb. — ♀ — Afr.: Gaboon.
Sisyrostolus brevicornis Kriechbaumer, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1892-94. 1895 p. 133, ♀.

---

1) *Col.:* Anobium spec. (Ratzeburg).
2) *Arachn.:* Epeira cucurbitina (Bignell).
3) *Lep.:* Fidonia piniaria (Hartig).

RHYNCHOTHYREUS

Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 368.
ῥύγχος, rostrum; Thyreus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Zarhynchus Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 59 [nec Oberholzer 1899].
ζα-, valde; ῥύγχος, rostrum.
Campothreptus Davis.
Mesoleptus Cresson.
Tryphon Cresson.

nasutus (Cress.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Pennsylvania, Illinois.
Mesoleptus nasutus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 103, ♀ ♂.
Tryphon ? nasutus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 107, ♀.
Campothreptus nasutus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 247, ♀ ♂.
Zarhynchus nasutus Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 59.
Rhynchothyreus nasutus m.

ZATYPOTA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 166 n. 31.
ζα-, valde; τυπωτός, expressus.

Synon.: Cryptus Haliday.
Ichneumon Müller.
Pimpla Taschenberg.
Polysphincta Gravenhorst, Holmgren.

gracilis (Holmgr.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Polysphincta gracilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 32 n. 8, ♀ ♂.
Zatypota gracilis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 433.
nigricornis (Holmgr.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Polysphincta nigricornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 33 n. 11, ♀.
Polysphincta nigricornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 114, ♂.
Zatypota nigricornis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 431.
pallidipes (Thoms.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Polysphincta pallipes Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1252 n. 7, ♀ ♂.
Zatypota pallipes Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 433.
praecontatoria (Müll.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Dania.
Ichneumon percontatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 154 n. 1787.
Polysphincta percontatoria Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 120 n. 66, ♀.
Pimpla percontatoria Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 272 n. 6, ♀.
Zatypota percontatoria Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 433.
var. **phaenicea** (Hal.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Plectiscus) phaenicea Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 116, ♀ ♂.
Polysphincta percontatoria var. phaenicea Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 88 n. 1.
Zatypota percontatoria var. phaenicea m.
scutellaris (Holmgr.) Schmkn. — ♂ — Eur.: Suecia.
Polysphincta scutellaris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 33 n. 9, ♂.
Zatypota scutellaris Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 433.
strigis How.[1]) — ♀ — Am.: Long Island.
Polysphincta (Zatypota) strigis Howard, Proc. Entom. Soc. Washington II. 1892 p. 291 n. 3, ♀.

---

[1]) *Arachn.:* Epeira strix (Howard).

ACRODACTYLA

Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 117.
ἄκρος, acutus; δάκτυλος, digitus.

Synon.: Barypus Haliday, Curtis: Guide Arrang. Brit. Insects Ed. 2ª 1837 p. 94 n. 490ᵇ [s. descr.].
βαρύς, gravis; πούς, pes.
Oxyrrhexis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 166 n. 30.
ὀξύς, acer; ῥῆξις, fissio.

Cryptus Gravenhorst, Haliday.
Ephialtes Boie.
Euceros Haliday, Marshall.
Eumesius Marshall.
Pimpla Gravenhorst, Taschenberg.
Polysphincta Gravenhorst, Boie, Ratzeburg, Holmgren.
Porizon Haliday.

carbonator (Grav.) D. T.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Cryptus carbonator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 264 n. 3772.
Pimpla carbonator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 290.
Polysphincta carbonator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 123 n. 67, ♀ ♂.
Polysphincta carbonator Boie, Stettin. entom. Zeitg. VII. 1846 p. 292.
Polysphincta carbonator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 110 n. 3, ♀.
Polysphincta carbonator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 90 n. 2, ♀ ♂.
Ephialtes carbonator Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 103 n. 41, ♀ ♂.
Polysphincta carbonator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 31 n. 6, ♀ ♂.
Pimpla carbonator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 272 n. 5, ♀ ♂.
Polysphincta carbonator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 114, ♀.
Polysphincta carbonator Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1251 n. 4.
Oxyrrhexis carbonator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 432.
Polysphincta carbonator Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 298.
Acrodactyla carbonator m.

degener Hal.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Acrodactyla) degener Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 117, ♀ ♂.
Acrodactyla degener Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 57.
Acrodactyla degener Parfitt, Rep. & Trans. Devon. Assoc. XIII. 1881 p. 281.
Acrodactyla degener Cambridge, Proc. Zool. Soc. London 1881 p. 259.

linguaria Hal. — ♀ — Eur.: Britannia.
Porizon (Acrodactyla) linguarius Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 117, ♀.

madida Hal. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Acrodactyla) madidus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 117, ♀ ♂.

serricornis Hal. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Euceros (Acrodactyla) serricornis Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 117, ♀ ♂.
Eumesius serricornis Marshall, Catal. Brit. Ichneum. 1870 p. 18.
Euceros serricornis Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 76 n. 3.

---

[1]) *Lep.:* Steatoda borealis (Howard).
[2]) *Arachn.:* Linyphia obscura (Bignell).

CLISTOPYGA

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 132 n. 5.
κλειστός, clausus; *πυγή*, anus.

Synon.: Ichneumon Fabricius, Thunberg.
Pimpla Fabricius, Gravenhorst.

alborhombaria Davis — ♀ — Am.: Florida.
Clistopyga alborhombaria Davis, Entom. News VI. 1895 p. 198, ♀.
annulipes Cress. — ♀ — Am.: Massachusetts.
Clistopyga annulipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 150, ♀.
canadensis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Clistopyga Canadensis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 46, ♀.
Clistopyga Canadensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 467, ♀.
erythraea Fonsc. — ♀ — Eur.: Gallia.
Clistopyga erythraea Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 519 n. 33, ♀.
incitator (Fabr.) Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon incitator Fabricius, Entom. System II. 1793 p. 172 n. 163.
Pimpla incitator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 117 n. 24.
Pimpla incitator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 291.
Ichneumon incitator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 274.
Ichneumon incitator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 348.
Clistopyga incitator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 134 n. 72, ♀.
Pimpla (Clistopyga) incitator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 318 n. 7.
Clistopyga incitator Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 59.
Clistopyga incitator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 94 n. 1, ♀.
Clistopyga incitator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 35 n. 1, ♀ ♂.
Clistopyga incitator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 273, ♀ ♂.
Clistopyga incitator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 186, ♀ ♂.
Clistopyga incitator Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 21, ♀; T. 13 F. 8.
Clistopyga incitator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 115, ♀ ♂.
Clistopyga incitator Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 299.
var. **haemorrhoidalis** Grav. — ♀ — Eur.: Britannia, Gallia.
Clistopyga haemorrhoidalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 135 n. 73, ♀.
Clistopyga haemorrhoidalis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 517 n. 31, ♀.
Clistopyga incitator var. haemorrhoidalis Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 89 n. 1.
lateralis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Cuba.
Clistopyga? lateralis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 34, ♀ ♂.
nigrocephala Davis — ♂ — Am.: Illinois.
Clistopyga nigrocephala Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 369, ♂.
pleuralis Ashm.[2]) — ♂ — Am.: Montana.
Clistopyga pleuralis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 448, ♂.
pulchripicta Ashm. — ♀ — Am.: Texas.
Clistopyga pulchripicta Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 448, ♀.
rufator Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Clistopyga rufator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 95 n. 2, ♀ ♂.
Clistopyga rufator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 35 n. 2.
Clistopyga rufata Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 186, ♀.

---

1) *Lep.:* Retinia resinana (Brischke).
2) *Lep.:* Gelechia robiniaefoliella (Ashmead).

Clistopyga rufator Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 21, ♀; T. 13 F. 7.
Clistopyga rufator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 115, ♀.

rufescens Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Clistopyga rufescens Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 518 n. 32, ♂.

sauberi Brauns — ♀ — Eur.: Germania.
Clistopyga Sauberi Brauns, Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklenburg LI. 1898 p. 70, ♀.

truncata Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Clistopyga truncata Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 14 n. 2, ♀.
Clistopyga truncata Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 801 n. 2, ♀.

zonata Davis — ♀ — Am.: Illinois.
Clistopyga zonata Davis, Entom. News VI. 1895 p. 198, ♀.

POLYSPHINCTOMORPHA

Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 59.
Polysphinctus, nom. propr. Hymen.; *μορφή*, forma.

luggeri Ashm. — Patria?
Polysphinctomorpha Luggeri Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 59 [s. descr.].

PANTELES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 165 n. 28.
παντελής, integer.
Species exstat.

DIBLASTOMORPHA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 165 n. 27.
δίς, bis; *βλαστός*, germen; *μορφή*, forma.
Species exstat.

CONOBLASTA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 165 n. 26.
κῶνος, conus; *βλάστη*, folium.

Synon.: Glypta Gravenhorst & auct.
Pimpla Gravenhorst.

ceratites (Grav.) Brischke[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Pimpla ceratites Gravenhorst, Beitr. z. Entom. Schles. I. 1829 p. 21 n. 12, ♀ ♂.
Glypta ceratites Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 18 n. 8, ♀ ♂.
Glypta ceratites Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 499 n. 4, ♂.
Glypta ceratites Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 96 n. 4, ♀ ♂.
Glypta ceratites Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 38 n. 5, ♀ ♂.
Glypta ceratites Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 275 n. 1, ♀ ♂.
Glypta ceratites Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 21; T. 13 F. 4 [♂].
Glypta (Conoblasta) ceratites Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 115, [♀ ♂.
Glypta ceratites Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 366.
Conoplasta ceratites Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 431.
Glypta ceratites Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1325 & 1336 n. 14, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Euchromia flammeana (Bridgman, Fletcher), Nephopteryx vacciniella (Brischke), Ephippiphora nigricostana (Bignell).

Glypta ceratites Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXI. 1895 p. 39.
Glypta ceratites Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 299.

fronticornis (Grav.) Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pimpla fronticornis Gravenhorst, Beitr. z. Entom. Schles. I. 1829 p. 20 n. 11, ♂; T. 1 F. 10.
Glypta fronticornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 17 n. 7, ♂.
Glypta fronticornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 96 n. 3, ♀.
Glypta fronticornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 38 n. 4, ♀ ♂.
Glypta fronticornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 275 n. 2, ♀ ♂.
Glypta fronticornis Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 21, ♀; T. 13 F. 5. [p. 115, ♀ ♂.
Glypta (Conoblasta) fronticornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880
Conoplasta fronticornis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 431.
Glypta fronticornis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1326 & 1338 n. 17, ♀ ♂.

monoceros (Grav.) Brischke[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pimpla monocera Gravenhorst, Beitr. z. Entom. Schles. I. 1829 p. 19 n. 10, ♂; T. 1 F. 8 & 9.
Glypta monoceros Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 16 n. 6, ♂.
Glypta monocerus Boie, Stettin. entom. Zeitg. XI. 1850 p. 215 n. 12, ♀ ♂.
Glypta monoceros Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 37 n. 3, ♀ ♂.
Glypta monoceros Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 275 n. 3, ♀ ♂.
Glypta (Conoblasta) monoceros Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880
Conoplasta monoceros Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 431. [p. 115, ♂.
Glypta monoceros Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1326 & 1338 n. 18, ♀ ♂.

nigricornis (Thoms.) Szépl. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Glypta ceratites var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 18 n. 8.
Glypta nigricornis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1328 & 1353 n. 45, ♀ ♂.
Conoblasta nigriventris Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 94, ♂.

GLYPTA

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 3 n. 1.
γλυπτός, sculptus.

Synon.: Anomalon Cresson.
Cryptus Desvignes.
Ichneumon Fabricius & auct.
Lissonota Gravenhorst.
Pimpla Fabricius & auct.

albicoxa Walk. — ♀ — As.: Japonia.
Glypta albicoxa Walker, Cistula entom. I. P. 11. 1874 p. 305 n. 9, ♀.

albifrons Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Glypta albifrons Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 95 n. 2, ♂.

albiscutellaris Walsh — ♂ — Am.: Illinois.
Glypta albiscutellaris Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 127, ♂.

albomarginata Cress. — ♀ — Am.: Maine.
Glypta albomarginata Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 157 n. 18, ♀.

albopicta Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Glypta albopicta Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 405 n. 2, ♂.

aldrichii Davis — ♀ ♂ — Am.: Idaho.
Glypta Aldrichii Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 370, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Tortrix costana (Bignell).

animosa Cress.[1]) — ♀ — Am.: New York.
Glypta animosa Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 154 n. 7, ♀.

annulata Bridgm. — Eur.: Britannia.
Glypta annulata Bridgman, Trans. Norwich Soc. V. 1890 p. 71.

bicornis Boie — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Glypta bicornis Boie, Stettin. entom. Zeitg. XI. 1850 p. 216 n. 13, ♀ ♂.
Cryptus (Glypta) bicornis Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 74 n. 6, ♂. [♀♂.
Glypta corniculata (Sieboldt) Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 186,
Glypta (Diblastomorpha) corniculata (Sieboldt) Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. [IV. P. 4. 1880 p. 115, ♀♂.
Glypta bicornis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1324 & 1330 n. 3.

bifoveolata Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Glypta bifoveolata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 25 n. 12, ♀ ♂ [excl. var. 2].
Glypta bifoveolata Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 500 n. 6, ♀ ♂.
Glypta bifoveolata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 97 n. 6, ♀ ♂.
Glypta bifoveolata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 41 n. 11, ♀.
Glypta bifoveolata Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 277 n. 11, ♀♂.
Glypta bifoveolata Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 188, ♀.
Glypta bifoveolata Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 21, ♀; T. 13 F. 6.
Glypta bifoveolata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 116, ♀♂.
Glypta bifoveolata Biró, Rovart. Lapok I. 1884 p. 209.
Glypta bifoveolata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1327 & 1342 n. 25, ♀ ♂.
Glypta bifoveolata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 46, ♀.
Glypta bifoveolata Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 301.

· **borealis** Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Glypta borealis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 158 n. 20, ♂.
Glypta borealis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 67 n. 4, ♀ ♂.
Glypta borealis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 471 n. 4, ♀ ♂.

brevicornis Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Glypta brevicornis Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 234 n. 3, ♀ ♂.

brevipetiolata Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Glypta brevipetiolata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1327 & 1344 n. 27, ♀ ♂.

breviventris Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Glypta breviventris Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1327 & 1347 n. 32, ♀.

brischkei D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Glypta rufipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 188, ♂ [nec Spinola].
Glypta rufipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 117, ♂.
Glypta Brischkei m.

californica Prov. — ♀ — Am.: California.
Glypta Californica Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 117, ♀.

canadensis Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Glypta Canadensis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 157 n. 16, ♀.
Glypta Canadensis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 67 n. 3, ♀.
Glypta Canadensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 471 n. 3, ♀.

caudata Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Glypta caudata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1326 & 1337 n. 16, ♀.

---

1) *Lep.:* Paedisca scudderiana (Clemens).
2) *Lep.:* Steatoda castanea (Mocsáry).

cicatricosa Ratzbg.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Glypta cicatricosa Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 103 n. 4.
Glypta cicatricosa Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1325 & 1333 n. 7, ♀ ♂.
Glypta cicatricosa Bridgman, Entom. M. Magaz. XXVI. 1890 p. 208.
coloradensis Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Glypta Coloradensis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 158 n. 22, ♂.
concolor Ratzbg.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Glypta concolor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 121 n. 4, ♀ ♂.
Glypta concolor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 176.
cornuta Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Glypta cornuta Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 187, ♀.
crassitarsis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Glypta crassitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1327 & 1346 n. 30, ♀ ♂.
crenulata Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Glypta crenulata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1325 & 1334 n. 10.
cyclostoma Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Glypta cyclostoma Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 95, ♂.
dacota Cress. — ♀ — Am.: Dakota.
Glypta Dacota Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 158 n. 20, ♀.
davisii D. T. — ♀ — Am.: Idaho.
Glypta longicauda Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 370, ♀ [non Hartig].
Glypta Davisii m.
decolorata Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Glypta decolorata Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 406 n. 3, ♂.
dentifera Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Glypta dentifera Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1350, ♀ ♂.
diversipes Walsh — ♀ — Am.: Illinois.
Glypta diversipes Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1873 p. 125, ♀.
dubia Ratzbg.[3] — ♂ — Eur.: Germania.
Glypta dubia Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 112 n. 9, ♂.
Glypta dubia Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 117, ♂.
ecostata Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Glypta ecostata Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 95, ♀.
elegans Voll. — ♂ — Eur.: Batavia.
Glypta elegans Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XVI. 1873 p. 214 n. 2, ♂; T. 9 F. 2.
Glypta elegans Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 21, ♂; T. 13 F. 2.
elongata Holmgr.[4] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Glypta elongata Holmgren, Svensk. Vet-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 38 n. 6, ♀.
Glypta elongata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1326 & 1339 n. 19, ♀ ♂.
ephippigera Kriechb. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Glypta ephippigera Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. IX. P. 5. 1895 p. 262, ♂.
erratica Cress.[5] — ♀ ♂ — Am.: United States.
Glypta erratica Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 152 n. 2, ♀ ♂.
Glypta erratica Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 66 n. 2, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Tortrix viridana (Ratzeburg).
2) *Col.:* Magdalinus violaceus (Ratzeburg).
3) *Lep.:* Tortrix heparana (Ratzeburg).
4) *Lep.:* Bactra lanceolana (Fletcher).
5) *Lep.:* Polygonia comma (Howard).

Glypta erratica Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 470 n. 2, ♀ ♂.
Glypta erratica Howard, Scudder: Butterflies U. S. 1889 p. 1885, ♀ ♂; T. 88 F. 7.
erythrogastra Luc. — ♂ — Afr.: Algeria.
Glypta erythrogaster Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 324 n. 379, ♀ ♂.
evanescens Ratzbg.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Glypta evanescens Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 103 n. 5.
Glypta evanescens Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1325 & 1333 n. 8, ♀ ♂.
Glypta evanescens Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 436.
Glypta evanescens Bridgman, Entom. M. Magaz. XXVI. 1890 p. 208.
exophthalma Krchb. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Glypta exophthalmus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 85 n. 5, ♀.
extincta Ratzbg.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Glypta extincta Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 112 n. 8, ♀.
Glypta extincta Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 187, ♀ ♂.
Glypta extincta Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 116, ♀ ♂.
femorator Desv. — ♂ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Glypta) femorator Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 73 n. 5, ♂.
filicornis Thoms. — ♀ ♂ — Eur. centr.
Glypta filicornis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1328 & 1351 n. 41, ♀ ♂.
flavipes Desv. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Glypta) flavipes Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 75 n. 16, ♂.
Glypta flavipes Bridgman, Entom. M. Magaz. XXVI. 1890 p. 208, ♀ ♂.
flavolineata Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia, Germania.
Glypta flavolineata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 27 n. 13, ♀ ♂.
Pimpla (Glypta) flavolineata Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 376 n. 15, ♀ ♂.
Glypta flavolineata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 121 n. 2, ♀ ♂.
Glypta flavolineata Ratzeburg, Ichenum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 103 n. 3.
Glypta flavolineata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 95 n. 1.
Glypta flavolineata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 39 n. 7, ♀ ♂.
Glypta flavolineata Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 277 n. 13.
Glypta flavolineata Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 187, ♀ ♂.
Glypta flavolineata Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 21, ♂; T. 13 F. 3.
Glypta flavolineata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1325 & 1332 n. 6, ♀ ♂.
Glypta flavolineata Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 300.
fracticornis Smith — ♀ — As.: Mysol.
Glypta fracticornis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 10 n. 1, ♀.
fractigena Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Gallia.
Glypta fractigena Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1325 & 1334 n. 9, ♀ ♂.
genalis Möll.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Glypta genalis Möller, Entom. Tidskr. IV. 1883 p. 95, ♀ ♂.
Glypta genalis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1325 & 1331 n. 5, ♀ ♂.
Glypta genalis Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 95, ♀.
haesitator Grav.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Glypta haesitator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 12 n. 4, ♀ ♂.
Glypta haesitator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 96 n. 5, ♀.
Glypta haesitator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 42 n. 15, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Halias quercana, H. prasinana (Ratzeburg), Antithesia capreana (Ratzeburg).
2) *Lep.:* Tortrix laevigana (Ratzeburg).
3) *Lep.:* Tortrix viburnana (Atmore, Bridgman).
4) *Lep.:* Grapholitha tenebrosana (Brischke), Spilonota ocellana (Bignell).

Glypta haesitator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 276 n. 5, ♀ ♂.
Glypta haesitator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 188, ♀ ♂.
Glypta haesitator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 117, ♀ ♂.
Glypta haesitator Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1328 & 1351 n. 40, ♀ ♂.

heterocera Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Bavaria.
Glypta heterocera Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1326 & 1337 n. 15, ♀ ♂.

humilis Spin. — ♀ ♂ — Am.: Chile.
Glypta humilis Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1881 p. 509 n. 3, ♀ ♂.

idahoensis Davis — ♀ — Am.: Idaho.
Glypta Idahoensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 370, ♀.

impressa Davis — ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Glypta impressa Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 371, ♀ ♂.

incisa Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. centr.
Glypta incisa Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 23 n. 10, ♀ ♂.
Glypta incisa Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 500 n. 5, ♀ ♂.
Glypta incisa Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 277 n. 10, ♀ ♂.
Glypta incisa Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 188, ♀ ♂.
Glypta incisa Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 116, ♀ ♂.
Glypta incisa Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1327 & 1343 n. 26, ♀ ♂.
Glypta incisa Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 302.

inversa Cress. — ♀ — Am.: Massachusetts.
Glypta inversa Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 153 n. 4, ♀.

iridipennis Smith — ♀ — As.: Celebes.
Glypta iridipennis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 63 n. 2, ♀.

leucozonata Ashm.[2]) — ♂ — Am.: Missouri.
Glypta leucozonata Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 449, ♂.

lineata Desv. — ♀ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Glypta) lineata Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 76 n. 18, ♀.
Glypta lineata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1328 & 1352 n. 42, ♀.

longicauda Htg.[3]) — ♀ — Eur.: Germania.
Glypta longicauda Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 261.
Glypta longicauda Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 121 n. 1, ♀.

longispina (Gmel.) D. T. — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 61 n. 211.
Ichneumon longispinus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2699 n. 277.
Ichneumon longispinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1035 n. 233.
Glypta provincialis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 498 n. 2, ♀.
Glypta longispina m.

longiventris Cress. — ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Glypta longiventris (Walsh) Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 154 n. 9, ♂.
Glypta longiventris Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 128, ♀ ♂.

longula Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Glypta longula Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 405 n. 1, ♀.

lycorinoides Costa — ♀ ♂ — Eur.: Sardinia.
Glypta lycorinoides A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 8. 1886 p. 33, ♀ ♂.
Glypta lycorinoides A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 119.

---

1) *Lep.:* Tinea resinella (Brischke).
2) *Lep.:* Grapholitha interstinctana (Ashmead).
3) *Lep.:* Fidonia piniaria (Hartig).

macra Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Glypta macra Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 158 n. 19, ♀.
Glypta ruficornis Provancher, Natural. Canad. V. 1873 p. 473, ♂.
Glypta macra Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 68 n. 6, ♀ ♂.
Glypta macra Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 472 n. 6, ♀ ♂.

maculipennis Smith — ♀ — As.: Celebes.
Glypta maculipennis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. V. 1860 Suppl. p. 62 n. 1, ♀.

mediana Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Glypta mediana Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 96, ♀.

mensurator (Fabr.) Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon mensurator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 338 n. 65.
Ichneumon mensurator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 433 n. 84.
Ichneumon mensurator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 267 n. 100.
Ichneumon mensurator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 177 n. 129.
Ichneumon mensurator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2694 n. 155.
Ichneumon mensurator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 361.
Ichneumon mensurator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 191 n. 138.
Ichneumon mensurator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 170 n. 155.
Ichneumon mensurator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 116 n. 16.
Ichneumon mensurator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 290.
Ichneumon mensurator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 267.
Ichneumon mensurator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 329.
Glypta mensurator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 21 n. 9, ♀ ♂.
Glypta bifoveolata var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 26, ♀.
Pimpla (Glypta) mensurator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 317 n. 2.
Glypta lugubrina Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 41 n. 12, ♀ ♂.
Glypta mensurator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 277 n. 9, ♀ ♂.
Glypta mensurator Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 396 n. 16, ♂.
Glypta mensurator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 117, ♀ ♂.
Glypta mensurator Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1328 & 1349 n. 37, ♀ ♂.

microcera Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Glypta consimilis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 276 n. 6, ♀ ♂ [non Holmgren].
Glypta microcera Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1328 & 1350 n. 38, ♀.
Glypta consimilis Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 303.

militaris Cress.[1] — ♀ — Am.: Illinois.
Glypta militaris Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 154 n. 10, ♀.

monita Cress.[2] — ♀ — Am.: Virginia occ.
Glypta monita Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 155 n. 11, ♀.

nigrina Desv. — ♀ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Glypta) nigrina Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 74 n. 8, ♀.

nigripectus Brullé — ♀ ♂ — Afr. mer.
Glypta nigripectus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 108 n. 1, ♀ ♂.

nigriventris Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Glypta nigriventris Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1325 & 1336 n. 13, ♀.

nigromarginata Pérez — Eur.: Palma.
Glypta nigromarginata Pérez, Ann. soc. entom. France 1895 p. 200.

nigroplica Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Glypta nigroplica Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1326 & 1341 n. 23, ♀.

---

1) *Lep.:* Proteoteras aesculana (Riley).
2) *Lep.:* Gelechia juncidella (Riley).

nomene Davis — ♀ — Am.: Colorado.
Glypta Nomene Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 370, ♀.
notata Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Glypta notatus Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 95, ♀.
parva Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Glypta ? parva Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 155 n. 12, ♀.
parvicaudata Bridgm.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Glypta parvicaudata Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 435, ♀ ♂.
parvicornuta Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Glypta parvicornuta Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 367, ♀.
pedata Desv. — ♀ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Glypta) pedata Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 74 n. 7.
Glypta pedator Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1328 & 1348 n. 35, ♀.
phoxopteridis Weed[2]) — ♀ — Am. bor.
Glypta phoxopteridis Weed, Entom. Amer. IV. 1888 p. 157, ♀.
pictipes Taschbg.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Glypta pictipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 276 n. 7, ♀.
Glypta pictipes Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1327 & 1347 n. 33, ♀ ♂.
pulchripes Cress. — ♀ — Am.
? Anomalon divaricatus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 244 n. 7.
? Anomalon divaricatus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 699 n. 7.
Glypta pulchripes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 135 n. 5, ♀.
quadrincisa Spin. — ♂ — Am.: Chile.
Glypta quadriincisa Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 508 n. 2, ♂.
resinana Htg.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Glypta resinana Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 268, ♀ ♂.
Ichneumon (Glypta) Resinanae Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 27 n. 21; T. 9 F. 9.
Glypta Resinanae Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 121 n. 3, ♀♂; T. 1 F. 20.
Glypta consimilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 40 n. 9, ♀ ♂.
Glypta Resinanae Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 277 n. 12, ♀ ♂.
Glypta consimilis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 187, ♀.
Glypta Resinanae Kawall, Stettin. entom. Zeitg. XXVIII. 1867 p. 122.
Glypta consimilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 116, ♀.
Glypta Resinanae Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1326 & 1340 n. 22, ♀ ♂.
rostrata Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Glypta rostrata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 39 n. 8, ♀ ♂.
Glypta rostrata Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 21, ♀; T. 13 F. 1.
Glypta rostrata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1325 & 1330 n. 4.
rubicunda Bridgm.[5]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Glypta rubicunda Bridgman, Entom. M. Magaz. XXVI. 1890 p. 209, ♀ ♂.
Glypta rubicunda Bridgman, Trans. Norw. Soc. V. 1890 p. 70.
rubripes Cress.[6]) — ♀ ♂ — Am. bor.
Glypta rubripes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 156 n. 15, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Hypsipetes ruberata (Bridgman).
2) *Lep.:* Phoxopteris comptana (Weed).
3) *Lep.:* Diurnea flagellae (Bridgman).
4) *Lep.:* Coccyx resinanae (Hartig).
5) *Lep.:* Argyrolepia maritimana (Bridgman).
6) *Lep.:* Eccopsis Footiana (Fernald).

rufata Bridgm.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Glypta rufata Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1887 p. 378, ♀ ♂.
rufescens Tosq. — ♂ — Afr.: Togo.
Glypta rufescens Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 330, ♂.
ruficeps Desv. — ♀ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Glypta) ruficeps Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 76 n. 17, ♀.
ruficornis Walsh — ♂ — Am.: Illinois.
Glypta ruficornis Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 129, ♂.
rufipes Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Glypta rufipes Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 507 n. 1, ♀.
rufipleuralis Walsh — ♂ — Eur.: Illinois.
Glypta rufipleuralis Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 125, ♂.
rufiscutellaris Cress.[2]) — ♀ ♂ — Am.: Connecticut, Illinois, New Jersey.
Glypta rufiscutellaris (Walsh) Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 153 n. 6, ♀♂.
Glypta rufiscutellaris Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 126, ♀ ♂.
rufiventris Kriechb. — ♀ — Eur.: Mallorca.
Glypta rufiventris Kriechbaumer, Anal. soc. hist. nat. Españ. XXIII. 1894 p. 249 n. 26, ♀.
rufofasciata Cress. — ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Glypta rufofasciata Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 158 n. 21, ♂.
Glypta rufofasciata Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 68 p. 5, ♀ ♂.
Glypta rufofasciata Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 471 n. 5, ♀ ♂.
rufomarginata Cam. — ♀ — Am.: Mexico. [F. 18.
Glypta rufomarginata Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 271 n. 2, ♀; T. 11
rugulosa Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Glypta rugulosa Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 14 n. 7, ♂.
Glypta rugulosa Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 801 n. 7, ♂.
salicis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Glypta salicis (Hartig) Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1328 & 1348 n. 36, ♀ ♂.
sardoa Costa — ♀ ♂ — Eur.: Sardinia.
Glypta sardoa A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli XXV. 1886 p. 53, ♀ ♂.
scalaris Grav.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Glypta scalaris Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 24 n. 11, ♀.
Pimpla (Glypta) scalaris Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 376 n. 16, ♀.
Glypta scalaris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 42 n. 13, ♀♂.
Glypta scalaris Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 188, ♀ ♂.
Glypta scalaris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 117, ♀ ♂.
Glypta scalaris Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1327 & 1345 n. 29, ♀ ♂.
Glypta scalaris Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 302.
schneideri Krieg. — ♀ ♂ — Eur.: Borkum ins.
Glypta Schneideri Krieger, Entom. Nachr. XXIII. 1897 p. 9, ♀ ♂.
scitula Cress. — ♀ — Am.: New York.
Glypta scitula Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 155 n. 13, ♀.
Glypta scitula Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 129, ♀.
sculpturata Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Britannia.
Glypta sculpturata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 7 n. 1, ♂.
Glypta sculpturata Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 58.
Glypta sculpturata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1326 & 1342 n. 24, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Eupoecilia notulana (Fletcher).
2) *Lep.:* Prototeras aesculana (Riley).
3) *Lep.:* Nephopteryx vacciniella (Brischke).

scutellaris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Glypta scutellaris Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1327 & 1344 n. 28, ♀ ♂.
similis Bridgm.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Glypta similis Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 367, ♀ ♂.
simplicipes Cress.[2]) — ♀ — Am.: United States.
Glypta simplicipes (Walsh) Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 156 n. 14, ♀.
Glypta simplicipes Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 123, ♀.
subcornuta Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Gallia.
Pimpla subcornuta Gravenhorst, Beitr. z. Entom. Schles. I. 1829 p. 18 n. 9, ♀ ♂.
Glypta subcornuta Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 15 n. 5, ♀ ♂.
Glypta subcornuta Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 498 n. 3, ♀ ♂.
szépligetii D. T. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Glypta ruficornis Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 96, ♂ [non Walsh].
Glypta Szépligetii m.
tegularis Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Glypta tegularis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1325 & 1335 n. 12, ♀.
tenuicornis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Glypta tenuicornis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1326 & 1340 n. 21, ♀.
tenuitarsis Thoms. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Glypta tenuitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1327 & 1346 n. 31, ♀.
teres Grav.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Glypta teres Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 8 n. 2, ♀ ♂.
Pimpla teres Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 377 n. 17, ♀.
Glypta teres Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 102 n. 2, ♀ ♂.
Glypta teres Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 111 n. 2, ♂.
Glypta teres Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 497 n. 1, ♀ ♂.
Glypta teres Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 40 n. 10, ♀ ♂.
Glypta teres Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 277 n. 8, ♀ ♂.
Glypta teres Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 116, ♂.
Glypta teres Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1326 & 1339 n. 20, ♀.
Glypta teres Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 300. [non Brischke].
thomsonii D. T. — ♀ — Eur.: Oelandia.
Glypta rufipes Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1328 & 1353 n. 44, ♀ [non Spinola.
Glypta Thomsonii m.
transversalis Scudd. — Am.: Green River.
Glypta transversalis Scudder, Tert. Insects N. Amer. II. 1890 p. 613; T. 10 F. 25.
tricincta Prov. — Am.: Canada.
Glypta tricincta Provancher, Natural. Canad. XIX. 1890 p. 248.
trochanterata Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Glypta trochanterata Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 368, ♀ ♂.
Glypta trochanterata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1328 & 1352 n. 43, ♀ ♂.
tuberculifrons Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Illinois.
Glypta tuberculifrons (Walsh) Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 152 n. 1, ♀ ♂.
Glypta tuberculifrons Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 124, ♀ ♂.
Glypta tuberculifrons Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 66 n. 1, ♀ ♂.
Glypta tuberculifrons Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 470 n. 1, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Ephippiphora scutellana (Fletcher).
2) *Lep.:* Teras minuta, Cacaecia rosaceana, Tortrix cinderella, Notodonta ulmi (Weed).
3) *Lep.:* Tinea populella — *Col.:* Saperda populnea (Ratzeburg).

variicoxa Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Glypta varicoxa Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1328 & 1348 n. 34, ♀ ♂.
variipes Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Glypta varipes Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 267, ♀.
virginiensis Cress. — ♀ — Am.: Virginia.
Glypta Virginiensis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 157 n. 17, ♀.
vulgaris Cress.[1]) — ♀ ♂ — Am.: United States.
Glypta vulgaris Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 154 n. 8, ♀ ♂.
vulnerator Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Glypta vulnerator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 11 n. 3, ♀ ♂.
Pimpla (Glypta) vulnerator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 317 n. 1.
Glypta vulnerator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 42 n. 14, ♀ ♂.
Glypta vulnerator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 276 n. 4, ♀ ♂.
Glypta vulnerator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 117, ♀.
Glypta vulnerator Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1328 & 1350 n. 39, ♀ ♂.
xanthognatha Thoms.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Bavaria.
Glypta xanthognatha Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1325 & 1335 n. 11, ♀ ♂.
xanthozonata Ashm. — ♂ — Am.: Missouri.
Glypta xanthozonata Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 449, ♂.

CTENOCHIRA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XII. 1855 p. 226.
κτείς, pecten; *χείρ*, manus.

bisinuata Först. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Ctenochira bisinuata Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XII. 1855 p. 226 n. 1, ♀.
Ctenochira bisinuata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 430.
rhenana Schmkn. — Eur.: Germania.
Ctenochira Rhenana (Förster) Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 430 [s. descr.].

CAMPTOTYPUS

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 311.
καμπτός, curvatus; *τύπος*, impressio.

bicolor Kriechb. — ♀ — Austr.
Camptotypus bicolor Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 311 n. 2, ♀.
sellatus Kriechb. — ♀ — Austr.
Camptotypus sellatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 311 n. 1, ♀.

COLPOMERIA

Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 127 n. 12.
κόλπος, sinus; *μέρος*, pars.

Synon.: Polysphincta Thomson.

levigata Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Colpomeria laevigata Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 127 n. 12.
Colpomeria laevigata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 44 n. 1, ♀ ♂.
Colpomeria laevigata Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 189, ♂.

---

1) *Lep.:* Botys inaequalis (Weed), Margarodes quadristigmalis (Riley).
2) *Lep.:* Cochylis hilerana (Giraud).
3) *Lep.:* Tortrix Mygindana (Kriechbaumer).

Colpomeria laevigata Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 64, ♀ ♂.
Colpomeria laevigata Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 33, ♀; T. 21 F. 1.
Polysphincta (Colpomeria) laevigata Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1251 n. 2.
Colpomeria laevigata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 430.

litoralis Davis — ♂ — Am.: New York, Canada.
Colpomeria litoralis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 367, ♂.

LYCORINA

Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 126 n. 11.
Etymol. obscura.

Synon.: Toxophorides Cresson, (Mscr.) Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 406.
τοξοφόρος, sagittarius.

apicalis Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Lycorina ? apicalis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 407 n. 1, ♀.

triangulifera Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Lycorina triangulifera Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 126 n. 11.
Lycorina triangulifera Holmgren, Svensk.Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 43 n. 1, ♀♂.
Lycorina triangulifera Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 34; T. 21 F. 2 (♂) & 3 (♀).
Lycorina triangulifera Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 430.

EREMOCHILA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 165 n. 21.
ἐρῆμος, desertus; *χεῖλος*, labium.
Vide genus Pimpla.

ITOPLECTIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 164 n. 20.
Etymol. obscura.
Vide genus Pimpla.

EPIURUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 164 n. 19.
ἐπίουρος, custos.
Vide genus Pimpla.

ISEROPUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 164 n. 18.
ἰσήρης, aequalis; *ποῦς*, pes.
Vide genus Pimpla.

EXERISTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 164 n. 17.
ἐξεριστής, litigator.
Vide genus Pimpla.

---

[1]) *Lep.:* Gelechia populella (Vollenhoven).

APECHTIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 164 n. 16.
ἀπέχθης, invisus.
Vide genus Pimpla.

NOTOPIMPLA

Krieger, Ber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 106.
νῶτος, dorsum; Pimpla, nom. propr. Hymen.

Synon.: Pimpla Brullé.

terminalis (Brullé) Krieg. — ♀ — Austr.
Pimpla terminalis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 96 n. 16, ♀ [non Cresson].
Notopimpla terminalis Krieger, Ber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 107 n. 1, ♀.

PIMPLA

Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 112 n. 14.
Pimpla, Nom. propr. Hymen.

Synon.: Bassus Provancher.
Cryptus Zetterstedt, Say, Leconte.
Ephialtes Gravenhorst, Brischke.
Ichneumon Geoffroy & auct. ant.
Meniscus Provancher.

Subg.: Apechtis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 164 n. 16.
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 448.
ἀπέχθης, invisus.

Aphanorhoptra Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 736 [non Förster].
ἀφανής, obscurus, rostrum.

Delomerista Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 164 n. 12.
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 448.
δῆλος, manifestus; *μεριστής*, divisor.

Epiurus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 164 n. 19.
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 448.
ἐπίουρος, custos.

Eremochila Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 165 n. 21.
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 449.
ἐρῆμος, desertus; *χεῖλος*, labium.

Exeristus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 164 n. 17.
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 448.
ἐξεριστής, litigator.

Ictoplectis Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 213.
Itoplectis, nom. propr. Hymen. (sphalm.).

Iseropus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 164 n. 18.
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 448.
ἰσήρης, aequalis; *πούς*, pes.

Itoplectis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 164 n. 20.
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 449.
Etymol. obscura.

Subg.: Tromatobia Förster, Verh. naturh. Verh. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 164 n. 13.
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 448.
τρῶμα, vulnus; *βιόω*, vivo.
Tromera Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 164 n. 14.
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 448.
τρομερός, tremulus.

abdominalis Brullé — ♀ ♂ — Afr.: Aegyptus, Port Said.
Pimpla abdominalis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 99 n. 22, ♂.
Pimpla abdominalis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 305, ♀.
accurata Tosqu. — ♀ — Afr.: Delagoa Bay, Scioa.
Pimpla accurata Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 306 n. 12, ♀.
aegyptiaca Schmkn. — ♀ ♂ — Afr.: Aegyptus.
Pimpla Aegyptiaca Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 510 & 633, ♀ ♂.
aequalis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Pimpla aequalis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 36 n. 4, ♀.
Pimpla aequalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 457 n. 4, ♀.
albipes Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Pimpla albipes Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 399 n. 6, ♀.
albomarginata Cam. — ♀ — Am.: Mexico. [F. 15.
Pimpla albomarginata Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 267 n. 11, ♀; T. 11
albopicta Walk. — ♀ — As.: Ceylon.
Pimpla albopicta Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) V. 1860 p. 306, ♀.
alboricta Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Pennsylvania.
Pimpla alboricta Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 147 n. 16, ♂.
Pimpla alboricta Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 143, ♂.
Pimpla alboricta Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 39 n. 11, ♀ ♂.
Pimpla alboricta Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 461 n. 11, ♀ ♂.
alternans Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 352 n. 68.
? Ichneumon plaesseus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 417 n. 69.
? Ichneumon scanicus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 190 n. 174, ♀.
Pimpla alternans Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 201 n. 97, ♀ ♂.
Pimpla alternans Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 374 n. 7, ♀.
Pimpla alternans Audouin, Hist. nat. Insect. nuis. 1842 p. 180, ♀ ♂; T. 17 F. 2 (♀) & 2* (♂).
Pimpla alternans Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 92 n. 17, ♂.
Pimpla alternans Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 98 n. 20, ♀.
Pimpla scanica var. Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 21 n. 8, ♀ ♂.
Pimpla alternans Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 56, ♀ ♂.
Pimpla alternans Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 13; T. 9 F. 8.
Pimpla tricincta Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 748 n. 8, ♀ ♂.
Pimpla alternans Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 113 n. 6.
Pimpla (Itoplectis) alternans Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 491 n. 25, ♀ ♂.
Pimpla (Itoplectis) tricincta Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1408 n. 2.
Pimpla alternans Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 511, ♀ ♂.

1) *Hymen.:* Fenusa pumila, Lophyrus pini, Selandria bipunctata (Brischke), Nematus viminalis, N. salicis (Ratzeburg). — *Lep.:* Abraxas grossulariata, Cidaria juniperata, Gelechia spec. (Brischke), Oenophyra pilleriana, Elachista saportella (Ratzeburg), Coleophora Giraudi (Giraud). — *Col.:* Orchestes quercus (Ratzeburg), Saperda populnea (Giraud). — *Dipt.:* Asphondylia genistae (Rondani).

amoena Rdw.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla amoena Rudow, Entom. Nachr. VII. 1881 p. 310 n. 6, ♀ ♂.
angens Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Pimpla angens Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 162 n. 81, ♀ ♂.
Pimpla angens Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 101 n. 36, ♂.
Pimpla angens Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 22 n. 10, ♀ ♂.
Pimpla angens Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 60 & 265 n. 16, ♀ ♂.
Pimpla angens Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 183, ♀ ♂.
Pimpla angens Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 752 n. 17, ♀ ♂.
Pimpla angens Poujade, Ann. soc. entom. France (5) VIII. 1878 Bull. p. XXXIX.
Pimpla angens Telesphore, Pet. nouv. entom. II. 1878 p. 266.
Pimpla angens Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 112, ♀.
Pimpla angens Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 497 n. 29, ♀ ♂.
Pimpla (Tromatobia) angens Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1412 n. 3.
Pimpla angens Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 542, ♀ ♂.
animosa Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Pimpla animosa Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 165, ♀.
annulicornis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Pennsylvania.
Pimpla annulicornis (Walsh) Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 147 n. 12, ♀ ♂.
Pimpla annulicornis Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 135, ♀ ♂.
Pimpla annulicornis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 37 n. 6, ♀ ♂.
Pimpla annulicornis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 458 n. 6, ♀ ♂.
annulipes Brullé[3]) — ♀ ♂ — Am. mer.
Pimpla annulipes Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 102 n. 30, ♀.
Pimpla annulipes Riley, 4th Ann. Rep. Insect. Missouri 1872 p. 43 nota.
Pimpla annulipes Riley, 5th Ann. Rep. Insect. Missouri 1873 p. 49, ♀; Fig. 26.
Pimpla annulipes Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 133, ♀ ♂.
Pimpla annulipes Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 36 n. 3, ♀ ♂.
Meniscus marginatus Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 15 n. 4, ♀.
Pimpla annulipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 457 n. 3, ♀ ♂.
Meniscus marginatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 802 n. 4, ♀.
Pimpla annulipes Riley, IV. Rep. U. St. Entom. Comm. 1885 p. 111.
Bassus cylindricus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 111 n. 19, ♂.
Pimpla annulipes Riley, Rep. Entomol. f. 1887 p. 95; T. 2 F. 7.
Meniscus Ashmeadii Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 430 n. 5, ♀.
Pimpla annulipes Howard, Scudder: Butterflies U. S. 1889 p. 1884, ♀ ♂; T. 88 F. 6.
Pimpla annulipes Koebele, Bull. U. S. Dep. Agricult. Entom. XXII. 1890 p. 90.
antinori Grib. — ♀ — Afr. or.
Pimpla? Antinorii Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 345 n. 10, ♀.
Pimpla? Antinorii Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 256 n. 1, ♀.
Pimpla Antinorii Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 328 n. 24, ♀.

---

1) *Hymen.:* Tenthredinidae spec. (Rudow).

2) *Hymen.:* Lophyrus frutetorum, Nematus septentrionalis, — *Lep.:* Ennomos alniaria (Ratzeburg), Bombyx processionea, — *Arachn.:* Lathrodectus tredecimguttatus (Telesphore).

3) *Lep.:* Acrobasis juglandis, Carpocapsa pomonella, Phycita nebulo, Papilio Ajax, Datana ministra, Tortrix quercifoliana, Teras oxycoccana, Heterocampa marthesia, Gelechia gallae astarella (Riley), Chlorippe Clyton?, Iphiclides ajax (Howard), Crambus exsiccatus (Weed).

antiqua Sauss. — Eur.: Gallia.
Pimpla antiqua Saussure, Rev. & mag. zool. (2) IV. 1852 p. 579; T. 23 F. 5 & 6.
antiqua Heer — Eur.: Croatia.
Pimpla antiqua Heer, Neu. Denkschr. schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 36 n. 78^{b}; T. 3 F. 18.
apicalis Brullé — ♂ — Afr.: Cap.
Pimpla apicalis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 97 n. 19, ♂.
apicina Costa — ♀ — Am.: Brasilia.
Pimpla apicina A. Costa, Ann. mus. zool. Napoli II. (1862) 1864 p. 69 n. 2001, ♀.
apicipennis Cam. — ♀ — As.: India.
Pimpla apicipennis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 161, ♀.
aplopappi Ashm. — ♂ — Am.: California.
Pimpla aplopappi Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 446, ♂.
appendicularis Cam. — ♀ — As.: India.
Pimpla appendicularis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 p. 160, ♀.
apricaria Costa — ♀ — Eur.: Sardinia.
Pimpla apricaria A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli 1884 p. 171, ♀.
Pimpla apricaria A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 13. 1885 p. 25, ♀.
Pimpla apricaria A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1888 p. 23.
Pimpla apricaria Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 509 n. 42, ♀.
Pimpla apricaria Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 575, ♀.
aquilonia Cress. — ♂ — Am.: Maine.
Pimpla aquilonia Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 145 n. 7, ♂.
arctica Zett.[1]) — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
? Pimpla spuria Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 179 n. 88, ♀.
Cryptus Lapponicus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 370 n. 12, ♀ ♂.
Pimpla arctica Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 375 n. 8, ♂.
Pimpla arctica Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 19 n. 3, ♀ ♂.
? Pimpla spuria Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 53, ♀.
Pimpla arctica Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 13; T. 9 F. 2.
Pimpla Lapponica Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 746 n. 2.
? Pimpla spuria Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 111, ♀.
? Pimpla spuria Bridgman, Entomologist XVI. 1883 p. 251-253.
Pimpla arctica Nerén, Entom. Tidsskr. VI. 1885 p. 169.
Pimpla spuria Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 477 n. 9, ♀ ♂ [p. p.].
Pimpla arctica Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1408 n. 2.
Pimpla arctica Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2125 n. 2.
Pimpla arctica Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 509, ♀ ♂.
argentifrons Cam. — ♀ — Am.: Guatemala.
Pimpla argentifrons Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 269 n. 23, ♀; T. 11 (F. 17.
argiopes Marsh. — ♀ — Am.: Venezuela.
Pimpla argiopes Marshall, Ann. soc. entom. France LXI. 1892 p. 65 n. 57, ♀.
ariana Cam. — ♀ — As.: India.
Pimpla Ariana Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 157, ♀.
arrogans Smith — ♀ — As.: Ceram.
Pimpla arrogans Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 8 n. 2, ♀.
arundinator Fabr.[2]) — ♀ ♂ — Eur. centr.
Pimpla arundinator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 916 n. 15.
Ichneumon arundinator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 269, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Charaeas graminis (Nerén), Depressaria heracleana (Bridgman).
[2]) *Dipt.:* Lipara lucens, L. tomentosa (Giraud).

Ichneumon arundinator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 331.
Ephialtes inanis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 247 n. 110, ♂ [excl. ♀].
Pimpla arundinator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 177 n. 86, ♀.
Pimpla arundinator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 26 n. 18, ♀.
Pimpla arundinator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 59 & 265 n. 17, ♀.
Pimpla arundinator Giraud, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 1266 n. 1, ♀ ♂.
Pimpla arundinator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 184, ♀.
Pimpla arundinator Giraud, Ann. soc. entom. France (5) II. 1872 p. 506 n. 1, ♂.
Pimpla arundinator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 113, ♀.
Pimpla arundinator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 500 n. 32, ♀.
Pimpla arundinator Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 572.

aterrima Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
? Ichneumon corruscator Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 563 n. 29 [non Fabricius.]
? Pimpla aethiops Curtis, Brit. Entom. V. 1828 p. 214 n. 9, ♀; T. 214.
Pimpla aterrima Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 719.
Pimpla aterrima Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 215 n. 102, ♀ ♂.
Pimpla aterrima Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 62 & 262 n. 3, ♀ ♂.
Pimpla aterrima Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 473 n. 4, ♀ ♂.
Pimpla aterrima Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 511, ♀.

atriceps Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Pimpla atriceps Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 404 n. 17, ♂.

atricoxalis Cress. — ♀ — Am.: Hudsons Bay.
Pimpla atricoxalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 146 n. 2, ♀.

azteca Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Pimpla Azteca Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 401 n. 9, ♀.

balearica Kriechb. — ♀ — Eur.: Mallorca.
Pimpla (Epiurus) Balearica Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 248 [n. 24, ♀.
Pimpla Balearica Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 620, ♀.

barbator Fabr. — Patria?
Ichneumon barbator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 171 n. 159.
Pimpla barbator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 116 n. 19.
Ichneumon barbator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 270.
Ichneumon barbator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 336.

basalis Vollenh. — ♂ — As.: Sumatra.
Pimpla basalis Vollenhoven, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 148 n. 6, ♂.

batchiana D. T. — ♀ — As.: Batchian.
Pimpla flaviceps Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 139 n. 2, ♀ [nec Brullé].
Pimpla Batchiana m.

behrensii Cress. — ♀ ♂ — Am.: California.
Pimpla Behrensii Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 377, ♀ ♂.

bernuthii Htg.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla Bernuthii Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 253, ♀ ♂.
Pimpla Bernuthii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 113 n. 2, ♀ ♂.
Pimpla Bernuthii Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 266 n. 20, ♀.
Pimpla Bernuthii Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 112, ♀ ♂.
Pimpla Bernuthi Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 505 n. 36, ♀ ♂.
Pimpla Bernuthi Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 573, ♀ ♂.

bicarinata Cam. — ♀ — As.: India.
Pimpla bicarinata Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 171, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Gastropacha pini (Hartig).

bicincta Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Pimpla bicincta Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 38, ♀.
bicolor Brullé — ♀ — Afr.: Cap.
Pimpla bicolor Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 98 n. 20, ♀.
bilineata Brullé — ♀ — Afr.: Algeria.
Pimpla bilineata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 98 n. 21, ♀.
Pimpla bilineata Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 323 n. 376; T. 19 F. 3.
Pimpla bilineata Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 284 n. 1, ♀.
blattifera Tosqu. — ♀ — Afr.: Marocco.
Pimpla blattifera Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 310 n. 14, ♀.
brachycera Thoms. — Eur.: Istria.
Pimpla brachycera Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2126 n. 21c.
Pimpla brachycera Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 572.
braconoides Spin. — ♀ ♂ — Am.: Chile.
Pimpla braconoides Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 501 n. 2, ♀ ♂.
brasiliensis D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Pimpla tricolor Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 106 n. 37, ♀ [nec Spinola].
Pimpla Brasiliensis m.
brassicariae (Poda) Rogh. & D. T.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Rösel, Insectenbelustigung II. 1749 Wespen p. 55; T. 12 F. 2-3.
Ichneumon brassicariae Poda, Insect. mus. Graec. 1761 p. 105 n. 7.
Ichneumon cunctator Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 285 n. 752; T. 41 F. 752.
Ichneumon spec. Schaeffer, Elem. entom. 1766; T. 72 F. 2.
? Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 59 n. 165.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 61 n. 201, p. 67 n. 294 & 302.
Ichneumon cunctatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 149 n. 42.
? Ichneumon rufatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2684 n. 240.
Ichneumon cylindricus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2712 n. 270.
Ichneumon melanoxanthus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2708 n. 345.
Ichneumon annulosus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2709 n. 353.
Ichneumon cunctator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 357.
Ichneumon cunctator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 213 n. 35.
Ichneumon varicornis Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 180 n. 193, ♂.
Pimpla varicornis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 119 n. 31. [n.15.
Ichneumon cunctator Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 961
Ichneumon varicornis Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀ ♂.
Pimpla varicornis Panzer, Faun. Insect. German. X. 1812 P. 109 T. 13 (♂).
Pimpla varicornis Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 291
Ichneumon varicator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 274.
Ichneumon varicator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 345.
Ichneumon rufata var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 166, ♀ ♂.
Pimpla varicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 167 n. 83, ♀ ♂.
Pimpla varicornis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 375 n. 11, ♀ ♂.
Ichneumon (Pimpla) varicornis Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 27.
Pimpla varicornis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 117 n. 19, ♀ ♂.
Pimpla varicornis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 101 n. 33.

---

[1]) *Lep.:* Vanessa urticae, Pieris brassicae, Aporia crataegi, Limenitis camilla, Sphinx ligustri, Scoliopteryx libatrix, Liparis salicis, Botys verticalis, Tortrix viridana, Gelechia populella, Eurycreon verticalis (Schmiedeknecht), Psyche viciella (Mocsáry).

? Pimpla rufata Nördlinger, Die kleinen Feinde 1855 p. 432.
Pimpla rufata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. (Pimpl.) p. 20 n. 6, ♀ ♂.
Pimpla varicornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 54 & 263 n. 8, ♀ ♂.
Pimpla rufata Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 181, ♀ ♂.
Pimpla rufata Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 13; T. 9 F. 4.
Pimpla ousata Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 749 n. 10 [err. typogr.].
Pimpla (Apechtis) rufata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 111, ♀ ♂.
Pimpla brassicariae Rogenhofer & Dalla Torre, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXI. 1881 p. 597.
Pimpla brassicariae Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 117 n. 7.
Pimpla (Apechtis) brassicariae Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 482 n. 14, ♀ ♂.
Pimpla (Apechtis) rufata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1411 n. 1.
Pimpla brassicariae Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 526, ♀ ♂.
Pimpla varicornis Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 287.

brevicornis Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Pimpla brevicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 211 n. 100, ♀ ♂.
Pimpla brevicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 24 n. 14, ♀ ♂.
Pimpla brevicornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 60, ♀ ♂ & 268 n. 30, ♀.
Pimpla brevicornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 183, ♀ ♂.
Pimpla brevicornis Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 755 n. 28, ♀ ♂.
Pimpla (Epiurus) brevicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 114, [♀ ♂.
Pimpla (Epiurus) brevicornis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 522 n. 54, ♀ ♂.
Pimpla (Epiurus) brevicornis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1414 n. 9.
Pimpla brevicornis Verhoeff, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 271 n. 2, ♀.
Pimpla brevicornis Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 619, ♀ ♂
Pimpla brevicornis Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 124, ♀.

bridgmanii Bign.[2] — ♀ — Eur.: Britannia.
Pimpla Bridgmani Bignell, Entom. M. Magaz. 1894 p. 255, ♀.

brischkei D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla albipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 63, ♂ [non Cresson].
Pimpla Brischkei m.

brullei D. T. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Pimpla alternans Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 105 n. 36, ♀ ♂ [non Grav.].
Pimpla Brullei m.

brunea Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Tirolia.
Pimpla graminellae var. 3 & 4 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 181 n. 91, ♀.
Pimpla brunnea Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 112, ♀.
Pimpla brunnea Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 507 n. 40, ♀ ♂.
Pimpla brunnea Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 574, ♀ ♂.

buoliana Htg.![3] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pimpla Buoliana Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 267.
Pimpla Buolianae Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 114 n. 4, ♀ ♂.
Pimpla Buoliana Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 754.
Pimpla Buolianae Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 535 n. 1, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Microgaster congestus, Selandria bipunctata, — *Col.:* Pissodes notatus, Gymnetron campanulae (Brischke), Dianthoecia cucubalia (Bignell). — *Lep.:* Tortrix laevigana, Retinia resinana, Gelechia spec, Conchylis posterana, Laverna spec., Nephropteryx abietella, Tischeria complanella (Brischke).

2) *Arachn.:* Drassus lapidicolens (Bignell).

3) *Lep.:* Tortrix buoliana (Hartig).

caerulea Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Pimpla coerulea Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 101 n. 26, ♀.
caeruleata Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Pimpla coeruleata Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 397 n. 1, ♀ ♂.
caligata Vollenh. — Eur.: Batavia.
Pimpla caligata Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 34; T. 21 F. 8.
calobata Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Pimpla calobata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 176 n. 85, ♀ ♂.
Pimpla nucum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 115 n. 9.
Pimpla nucum Ratzeburg, Ichneum d. Forstinsect. II. 1848 p. 90 n. 11.
Pimpla calobata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 104 n. 46, ♀ ♂.
Pimpla nucum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 25 n. 15, ♀.
Pimpla calobata Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 58 & 267 n. 28, ♀.
Pimpla calobata Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 184, ♀.
Pimpla nucum Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 447, ♀ ♂.
? Pimpla punctiventris Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 756 n. 29, ♀ ♂.
Pimpla nucum Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 33; T. 21 F. 9.
Pimpla calobata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 113, ♀.
? Pimpla cingulatella A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli 1883 p. 171.
? Pimpla cingulatella A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 13. 1885 p. 25, ♀ ♂.
? Pimpla cingulatella A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p. 23.
Pimpla calobata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 510 n. 43, ♀ ♂.
Pimpla (Epiurus) calobata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1413 n. 5.
? Pimpla (Epiurus) punctiventris Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1414 n. 10.
Pimpla cingulatella A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 117.
Pimpla nucum Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2127 n. 24c.
Pimpla calobata Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2127 n. 24d.
Pimpla calobata Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 574, ♀ ♂.
Pimpla calobata Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 123, ♀.
caloptera Perty — Am.: Brasilia.
Pimpla caloptera Perty, Delect. anim. artic. Brasil. 1833 p. 133; T. 26 F. 12.
cameronii D. T. — ♂ — As.: India. [Walsh].
Pimpla vidua Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3 p. 180, ♂ [non Pimpla Cameronii m.
capulifera Kriechb.[2] — ♀ — Eur.: Suecia, Bavaria.
Pimpla capulifera Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 119 n. 8, ♀.
Pimpla capulifera Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 485 n. 18, ♀.
Pimpla capulifera Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2125 n. 12b.
Pimpla capulifera Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 526, ♀.
carinifrons Cam. — ♀ — As.: India.
Pimpla carinifrons Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 172, ♀.
castanea Brullé — ♀ — Am.: Cayenne.
Pimpla castanea Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 105 n. 35, ♀.
castaneiventris Kriechb. — ♀ — Afr.: Teneriffa.
Pimpla castaneiventris Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 51 n. 13, ♀.
cercopithecus Costa — ♀ — Eur.: Sardinia.
Pimpla cercopithecus A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli 1885 p. 170, ♀.

---

1) *Lep.*: Carpocapsa splendana (Ratzeburg), Grapholitha tripunctatana (Giraud), Dianthoecia spec. in: Lychnis diurna (Bignell). — *Col.*: Balaninus nucum (Ratzeburg).

2) *Lep.*: Limenitis populi (Moscáry).

Pimpla cercopithecus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 13. 1885 p. 25, ♀.
Pimpla cercopithecus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli II. P. 7. 1889 p. 23.
Pimpla cercopithecus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 506 n. 39, ♀.
Pimpla cercopithecus Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 573.

ceylonica Cam. — As.: Ceylon.
Pimpla Ceylonica Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3 p. 165.

cheloniae Gir.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Pimpla Cheloniae Giraud, Ann. soc. entom. France (4) IX. 1869 p. 149, ♀, ♂.
Pimpla Cheloniae Fallou, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 Bull. p. XXI.

chichimea Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Pimpla ? chichimea Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 402 n. 13, ♂.

cinctator Guér. — ♀ — Austr.
Pimpla cinctator Guérin, Duperry: Voy. Coquille. Zool. II. P. 2. 1830 p. 198; T. 8 F. 5.
Pimpla cinctator Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 88 n. 3, ♀.

cincticarpus Kriechb. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Pimpla cincticarpus Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. IX. 1895 p. 260, ♀.
Pimpla cincticarpus Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 589, ♀.

cingulata Kriechb. — ♂ — Eur.: Mallorca.
Pimpla cingulata Kriechbaumer, Ann. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 249 n. 25, ♂.

cingulata Ratzbg.![2] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla cingulata Ratzeburg, Ichneum d. Forstinsect. III. 1852 p. 96 n. 12.
Pimpla cingulata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 114.
Pimpla cingulata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 538 n. 14, ♀.

cingulatella Costa — ♀ ♂ — Eur.: Sardinia.
Pimpla cingulatella A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli 1883 p. 171.
Pimpla cingulatella A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 13. 1885 p. 25, ♀ ♂.
Pimpla cingulatella A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p. 23.
Pimpla cingulatella Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 574.

clavicornis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Pimpla (Itoplectis) clavicornis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1409 n. 4, ♀.
Pimpla clavicornis Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 540, ♀.

cleopatra Schmkn. — ♀ ♂ — Afr.: Aegyptus.
Pimpla Cleopatra Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. II. 1897 p. 539 & 634, ♀ ♂.

cognata Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Togo.
Pimpla cognata Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 299 n. 8, ♀ ♂.

colorata Rdw. — ♀ — Eur.: Gallia.
Pimpla colorata Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 237 n. 9, ♀.

componotus Davis — ♂ — Am.: Idaho.
Pimpla componotus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 367, ♂.

conchyliata Tosqu. — ♀ — Afr.: Scioa.
Pimpla conchyliata Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 288 n. 3, ♀.

concolor Brullé — ♀ — Afr.: Cap.
Pimpla concolor Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 97 n. 18, ♀.
Pimpla concolor Gerstaecker, Peters: Reise n. Mossambique. Zool. V. 1862 p. 520.
Pimpla concolor Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 323 n. 21, ♀.

concors Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Dalmatia.
Pimpla concors Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 482, ♀ ♂.

---

1) *Lep.*: Chelonia cervini (Giraud).
2) *Lep.*: Anacampsis populella (Ratzeburg).

caerulea Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Pimpla coerulea Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 101 n. 26, ♀.
caeruleata Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Pimpla coeruleata Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 397 n. 1, ♀ ♂.
caligata Vollenh. — Eur.: Batavia.
Pimpla caligata Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 34; T. 21 F. 8.
calobata Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Pimpla calobata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 176 n. 85, ♀ ♂.
Pimpla nucum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 115 n. 9.
Pimpla nucum Ratzeburg, Ichneum d. Forstinsect. II. 1848 p. 90 n. 11.
Pimpla calobata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 104 n. 46, ♀ ♂.
Pimpla nucum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 25 n. 15, ♀.
Pimpla calobata Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 58 & 267 n. 28, ♀.
Pimpla calobata Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 184, ♀.
Pimpla nucum Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 447, ♀ ♂.
? Pimpla punctiventris Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 756 n. 29, ♀ ♂.
Pimpla nucum Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 33; T. 21 F. 9.
Pimpla calobata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 113, ♀.
? Pimpla cingulatella A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli 1883 p. 171.
? Pimpla cingulatella A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 13. 1885 p. 25, ♀ ♂.
? Pimpla cingulatella A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p. 23.
Pimpla calobata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 510 n. 43, ♀ ♂.
Pimpla (Epiurus) calobata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1413 n. 5.
? Pimpla (Epiurus) punctiventris Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1414 n. 10.
Pimpla cingulatella A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 117.
Pimpla nucum Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2127 n. 24[c].
Pimpla calobata Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2127 n. 24[d].
Pimpla calobata Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 574, ♀ ♂.
Pimpla calobata Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 123, ♀.
caloptera Perty — Am.: Brasilia.
Pimpla caloptera Perty, Delect. anim. artic. Brasil. 1833 p. 133; T. 26 F. 12.
cameronii D. T. — ♂ — As.: India. [Walsh].
Pimpla vidua Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3 p. 180, ♂ [non Pimpla Cameronii m.
capulifera Kriechb.[2] — ♀ — Eur.: Suecia, Bavaria.
Pimpla capulifera Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 119 n. 8, ♀.
Pimpla capulifera Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 485 n. 18, ♀.
Pimpla capulifera Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2125 n. 12[b].
Pimpla capulifera Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 526, ♀.
carinifrons Cam. — ♀ — As.: India.
Pimpla carinifrons Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 172, ♀.
castanea Brullé — ♀ — Am.: Cayenne.
Pimpla castanea Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 105 n. 35, ♀.
castaneiventris Kriechb. — ♀ — Afr.: Teneriffa.
Pimpla castaneiventris Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 51 n. 13, ♀.
cercopithecus Costa — ♀ — Eur.: Sardinia.
Pimpla cercopithecus A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli 1885 p. 170, ♀.

---

[1]) *Lep.*: Carpocapsa splendana (Ratzeburg), Grapholitha tripunctatana (Giraud), Dianthoecia spec. in: Lychnis diurna (Bignell). — *Col.:* Balaninus nucum (Ratzeburg).
[2]) *Lep.*: Limenitis populi (Moscáry).

Pimpla cercopithecus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 13. 1885 p. 25, ♀.
Pimpla cercopithecus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli II. P. 7. 1889 p. 23.
Pimpla cercopithecus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 506 n. 39, ♀.
Pimpla cercopithecus Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 573.

ceylonica Cam. — As.: Ceylon.
Pimpla Ceylonica Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3 p. 165.

cheloniae Gir.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Pimpla Cheloniae Giraud, Ann. soc. entom. France (4) IX. 1869 p. 149, ♀, ♂.
Pimpla Cheloniae Fallou, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 Bull. p. XXI.

chichimea Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Pimpla ? chichimea Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 402 n. 13, ♂.

cinctator Guér. — ♀ — Austr.
Pimpla cinctator Guérin, Duperry: Voy. Coquille. Zool. II. P. 2. 1830 p. 198; T. 8 F. 5.
Pimpla cinctator Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 88 n. 3, ♀.

cincticarpus Kriechb. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Pimpla cincticarpus Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. IX. 1895 p. 260, ♀.
Pimpla cincticarpus Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 589, ♀.

cingulata Kriechb. — ♂ — Eur.: Mallorca.
Pimpla cingulata Kriechbaumer, Ann. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 249 n. 25, ♂.

cingulata Ratzbg.![2] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla cingulata Ratzeburg, Ichneum d. Forstinsect. III. 1852 p. 96 n. 12.
Pimpla cingulata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 114.
Pimpla cingulata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 538 n. 14, ♀.

cingulatella Costa — ♀ ♂ — Eur.: Sardinia.
Pimpla cingulatella A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli 1883 p. 171.
Pimpla cingulatella A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 13. 1885 p. 25, ♀ ♂.
Pimpla cingulatella A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p. 23.
Pimpla cingulatella Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 574.

clavicornis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Pimpla (Itoplectis) clavicornis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1409 n. 4, ♀.
Pimpla clavicornis Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 540, ♀.

cleopatra Schmkn. — ♀ ♂ — Afr.: Aegyptus.
Pimpla Cleopatra Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. II. 1897 p. 539 & 634, ♀ ♂.

cognata Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Togo.
Pimpla cognata Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 299 n. 8, ♀ ♂.

colorata Rdw. — ♀ — Eur.: Gallia.
Pimpla colorata Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 237 n. 9, ♀.

componotus Davis — ♂ — Am.: Idaho.
Pimpla componotus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 367, ♂.

conchyliata Tosqu. — ♀ — Afr.: Scioa.
Pimpla conchyliata Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 288 n. 3, ♀.

concolor Brullé — ♀ — Afr.: Cap.
Pimpla concolor Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 97 n. 18, ♀.
Pimpla concolor Gerstaecker, Peters: Reise n. Mossambique. Zool. V. 1862 p. 520.
Pimpla concolor Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 323 n. 21, ♀.

concors Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Dalmatia.
Pimpla concors Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 482, ♀ ♂.

---

[1] *Lep.*: Chelonia cervini (Giraud).
[2] *Lep.*: Anacampsis populella (Ratzeburg).

conquisitor (Say) Ril.[1] — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Cryptus conquisitor Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 232 n. 3, ♀.
Cryptus pleurivinctus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 235 n. 9, ♀ ♂.
Cryptus conquisitor Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 689 n. 3.
Cryptus pleurivinctus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 691 n. 9, ♀ ♂.
Pimpla conquisitor Riley, 4th Ann. Rep. Insect. Missouri 1872 p. 72 nota.
Pimpla conquisitor Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 137, ♀.
Pimpla conquisitor C. Thomas, 7th State Entomol. Illinois f. 1877. 1878 p. 119.
Pimpla conquisitor Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 42 n. 16, ♀.
Pimpla conquisitor Lintner, 1st Ann. Rep. Insects New York 1882 p. 85.
Pimpla conquisitor Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 463 n. 16, ♀.
Pimpla conquisitor Riley, IV. Rep. U. St. Entom. Comm. 1885 p. 111.
Pimpla conquisitor Packard, Rep. U. S. Entom. Commiss. V. 1890 p. 261; Fig. 100.

coxata Smith — ♀ — Am.: Costa Rica.
Pimpla coxata Smith, Descr. New Spec. Hymen. 1879 p. 229 n. 2, ♀.
Pimpla coxata Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 267 n. 10, ♀; T. 11 F. 14.
Pimpla coxator Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 267 n. 10, ♀; T. 11 F. 14.

coxator Ruthe — ♀ — Eur.: Islandia.
Pimpla coxator Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 371 n. 54, ♀.

crassicauda Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Pimpla crassicauda Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 399 n. 5, ♀.

crassicornis Zett. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Pimpla crassicornis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 376 n. 12, ♀.

crenator Fabr. — Am.: New Cambria.
Pimpla crenator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 114 n. 9.
Ichneumon crenator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon crenator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 339.

cressonii Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Pimpla braconoides Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 404 n. 16, ♀ [non Spinola, non Smith].
Pimpla Cressoni Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 269 n. 21.

crocata Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Pimpla crocata Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 301 n. 9, ♀.

croceipes Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Pimpla croceipes Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 398 n. 2, ♀ ♂.
Pimpla molesta Smith, Descr. New Spec. Hymen. 1879 p. 229 n. 3, ♀.
Pimpla croceipes Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 266 n. 3, ♀ ♂; T. 11 F. 12 (♀).

cruentata Rdw.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla cruentata Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 235 n. 6, ♀ ♂.

cryptocampi Boie[3] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla cryptocampi Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVIII. 1857 p. 199 n. 18, ♀ ♂.

cubensis Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Pimpla Cubensis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 35, ♀.

curticauda Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania.
Pimpla curticauda Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 120 n. 10, ♀.

---

1) *Lep.:* Aletia xylina, Clisiocampa americana, Thyridiopteryx ephemeraeformis, Phycita nebulo, Phacellura hyalinitalis (Riley), Phryganidea californica, Orgyia leucostigma, Phycis indiginella (Weed).

2) *Lep.:* Bombyx pudibunda (Rudow).

3) *Hymen.:* Cryptocampus spec. (Boie).

Pimpla curticauda Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 488 n. 23, ♀.
Pimpla curticauda Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 527, ♀.

curvimaculata Cam. — ♂ — As.: India.
Pimpla curvimaculata Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 158, ♂.

cyanipennis Brullé — ♀ — Am.: Uruguay.
Pimpla cyanipennis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 101 n. 27, ♀.

decessa Scudd. — Am.: Canada.
Pimpla decessa Scudder, Rep. Progr. Geol. Surv. Canada 1877 p. 269.
Pimpla decessa Scudder, Fossil Insects N. Amer. II. 1890 p. 612; T. 3 F. 27.

defensator Davis — ♀ — Am.: Michigan.
Pimpla defensator Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 367, ♀.

dentator Fabr. — ♀ ♂ — Eur.: Moravia.
Pimpla dentator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 114 n. 7.
Ichneumon tentator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273.
Ichneumon tentator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 342.
Pimpla dentator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 999 n. 175, ♀ ♂.

destructor Smith — ♀ — As.: Mysol.
Pimpla destructor Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 9 n. 5, ♀.

detrita Holmgr.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Pimpla graminellae Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 181 n. 91, ♀ [p. p.].
Pimpla detrita Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 23 n. 11, ♀ ♂.
Pimpla Gravenhorstii Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 266 n. 22, ♀ [p. p.].
Pimpla detrita Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 183, ♀.
Pimpla detrita Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 753 n. 22, ♀ ♂.
Pimpla detrita Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 112, ♀.
Pimpla (Epiurus) detrita Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 514 n. 46, ♀ ♂.
Pimpla (Epiurus) detrita Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1413 n. 2.
Pimpla detrita Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 590, ♀ ♂.

didyma Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Pimpla didyma Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 178 n. 87, ♀.
Pimpla didyma Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 114 n. 5, ♀ ♂.
Pimpla didyma Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 24 n. 13, ♀.
Pimpla didyma Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 58 & 267 n. 26, ♀ ♂.
Pimpla didyma Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 183, ♀ ♂.
Pimpla didyma Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 112, ♀ ♂.
Pimpla (Epiurus) didyma Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 518 n. 49, ♀ ♂.
Pimpla didyma Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 590, ♀ ♂.

diligens Smith — ♀ — As.: Morty.
Pimpla diligens Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 64 n. 7, ♀.

diluta Ratzbg.[3]) — ♀ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Pimpla diluta Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 102 n. 37, ♀.
Pimpla diluta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 28 n. 23, ♀.
Pimpla diluta Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 166, ♀.
Pimpla diluta Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 487 n. 21, ♀.
Pimpla diluta Verhoeff, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 271 n. 3, ♀.
Pimpla diluta Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 528.

---

1) *Lep.:* Sesia formicaeformis, Lipara lucens (Brischke), Chilo phragmitellus (Bignell).
2) *Lep.:* Lasiocampa pini L. (Hartig).
3) *Lep.:* Tortrix resinana (Ratzeburg).

conquisitor (Say) Ril.[1] — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Cryptus conquisitor Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 232 n. 3, ♀.
Cryptus pleurivinctus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 235 n. 9, ♀ ♂.
Cryptus conquisitor Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 689 n. 3.
Cryptus pleurivinctus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 691 n. 9, ♀ ♂.
Pimpla conquisitor Riley, 4th Ann. Rep. Insect. Missouri 1872 p. 72 nota.
Pimpla conquisitor Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 137, ♀.
Pimpla conquisitor C. Thomas, 7th State Entomol. Illinois f. 1877. 1878 p. 119.
Pimpla conquisitor Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 42 n. 16, ♀.
Pimpla conquisitor Lintner, 1st Ann. Rep. Insects New York 1882 p. 85.
Pimpla conquisitor Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 463 n. 16, ♀.
Pimpla conquisitor Riley, IV. Rep. U. St. Entom. Comm. 1885 p. 111.
Pimpla conquisitor Packard, Rep. U. S. Entom. Commiss. V. 1890 p. 261; Fig. 100.

coxata Smith — ♀ — Am.: Costa Rica.
Pimpla coxata Smith, Descr. New Spec. Hymen. 1879 p. 229 n. 2, ♀.
Pimpla coxata Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 267 n. 10, ♀; T. 11 F. 14.
Pimpla coxator Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 267 n. 10, ♀; T. 11 F. 14.

coxator Ruthe — ♀ — Eur.: Islandia.
Pimpla coxator Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 371 n. 54, ♀.

crassicauda Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Pimpla crassicauda Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 399 n. 5, ♀.

crassicornis Zett. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Pimpla crassicornis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 376 n. 12, ♀.

crenator Fabr. — Am.: New Cambria.
Pimpla crenator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 114 n. 9.
Ichneumon crenator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon crenator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 339.

cressonii Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Pimpla braconoides Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 404 n. 16, ♀ [non Spinola, non Smith].
Pimpla Cressoni Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 269 n. 21.

crocata Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Pimpla crocata Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 301 n. 9, ♀.

croceipes Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Pimpla croceipes Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 398 n. 2, ♀ ♂.
Pimpla molesta Smith, Descr. New Spec. Hymen. 1879 p. 229 n. 3, ♀.
Pimpla croceipes Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 266 n. 3, ♀ ♂; T. 11 F. 12 (♀).

cruentata Rdw.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla cruentata Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 235 n. 6, ♀ ♂.

cryptocampi Boie[3] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla cryptocampi Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVIII. 1857 p. 199 n. 18, ♀ ♂.

cubensis Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Pimpla Cubensis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 35, ♀.

curticauda Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania.
Pimpla curticauda Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 120 n. 10, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Aletia xylina, Clisiocampa americana, Thyridiopteryx ephemeraeformis, Phycita nebulo, Phacellura hyalinitalis (Riley), Phryganidea californica, Orgyia leucostigma, Phycis indiginella (Weed).

[2]) *Lep.:* Bombyx pudibunda (Rudow).

[3]) *Hymen.:* Cryptocampus spec. (Boie).

Pimpla curticauda Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 488 n. 23, ♀.
Pimpla curticauda Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 527, ♀.
curvimaculata Cam. — ♂ — As.: India.
Pimpla curvimaculata Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 158, ♂.
cyanipennis Brullé — ♀ — Am.: Uruguay.
Pimpla cyanipennis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 101 n. 27, ♀.
decessa Scudd. — Am.: Canada.
Pimpla decessa Scudder, Rep. Progr. Geol. Surv. Canada 1877 p. 269.
Pimpla decessa Scudder, Fossil Insects N. Amer. II. 1890 p. 612; T. 3 F. 27.
defensator Davis — ♀ — Am.: Michigan.
Pimpla defensator Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 367, ♀.
dentator Fabr. — ♀ ♂ — Eur.: Moravia.
Pimpla dentator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 114 n. 7.
Ichneumon tentator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273.
Ichneumon tentator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 342.
Pimpla dentator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 999 n. 175, ♀ ♂.
destructor Smith — ♀ — As.: Mysol.
Pimpla destructor Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 9 n. 5, ♀.
detrita Holmgr.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Pimpla graminellae Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 181 n. 91, ♀ [p. p.].
Pimpla detrita Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 23 n. 11, ♀ ♂.
Pimpla Gravenhorstii Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 266 n. 22, ♀ [p. p.].
Pimpla detrita Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 183, ♀.
Pimpla detrita Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 753 n. 22, ♀ ♂.
Pimpla detrita Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 112, ♀.
Pimpla (Epiurus) detrita Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 514 n. 46, ♀ ♂.
Pimpla (Epiurus) detrita Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1413 n. 2.
Pimpla detrita Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 590, ♀ ♂.
didyma Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Pimpla didyma Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 178 n. 87, ♀.
Pimpla didyma Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 114 n. 5, ♀ ♂.
Pimpla didyma Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 24 n. 13, ♀.
Pimpla didyma Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 58 & 267 n. 26, ♀ ♂.
Pimpla didyma Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 183, ♀ ♂.
Pimpla didyma Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 112, ♀ ♂.
Pimpla (Epiurus) didyma Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 518 n. 49, ♀ ♂.
Pimpla didyma Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 590, ♀ ♂.
diligens Smith — ♀ — As.: Morty.
Pimpla diligens Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 64 n. 7, ♀.
diluta Ratzbg.[3]) — ♀ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Pimpla diluta Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 102 n. 37, ♀.
Pimpla diluta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 28 n. 23, ♀.
Pimpla diluta Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 166, ♀.
Pimpla diluta Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 487 n. 21, ♀.
Pimpla diluta Verhoeff, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 271 n. 3, ♀.
Pimpla diluta Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 528.

---

1) *Lep.:* Sesia formicaeformis, Lipara lucens (Brischke), Chilo phragmitellus (Bignell).
2) *Lep.:* Lasiocampa pini L. (Hartig).
3) *Lep.:* Tortrix resinana (Ratzeburg).

var. **brunea** Verh. — ♀ — Eur.: Germania.
Pimpla diluta var. brunea Verhoeff, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 272, ♀.
var. **media** Verh. — ♀ — Eur.: Germania.
Pimpla diluta var. media Verhoeff, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 272, ♀.
diversipes Tosq. — ♀ — Afr.: Togo.
Pimpla diversipes Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 304 n. 11, ♀.
divisa Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Pimpla divisa Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 302 n. 10, ♀.
dohrni Ratzbg. — Eur.: Germania.
Pimpla Dohrni Ratzeburg, Stettin. entom. Zeitg. VIII. 1847 p. 59 n. 4.
dorsigera Brullé — ♀ — Eur.: Gallia.
Pimpla dorsigera Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 93 n. 12, ♀.
dubitata Pérez — ♀ — Afr.: Teneriffa.
Pimpla dubitata Pérez, Ann. soc. entom. France 1895 p. 199 n. 24, ♀.
elegans Vollenh. — ♀ — As.: Java.
Pimpla elegans Vollenhoven, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 1879 p. 147 n. 5, ♀.
ellopiae Harrgt.[1]) — ♀ ♂ — Am.: British Columbia.
Pimpla ellopiae Harrigton, Canad. Entomol. XXIV. 1892 p. 99, ♀ ♂.
ephippium Brullé — ♂ — Afr.: Aegyptus.
Pimpla ephippium Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 99 n. 23, ♂.
ephippium Rdw.! — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla ephippium Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 237 n. 8, ♀ ♂.
erebus Cam. — ♀ — As.: India.
Pimpla erebus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1889 P. 3. p. 184, ♀.
erythronota Kriechb. — ♀ — Eur.: Mallorca. [n. 23, ♀.
Pimpla (Epiurus) erythronota Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 248
Pimpla erythronota Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 573, ♀.
erythrosoma Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla erythrosoma Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 236 n. 7, ♀ ♂.
euurae Ashm. — ♀ — Am.: California.
Pimpla euurae Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 447, ♀.
examinanda Ratzbg.! — ♀ — Eur.: Germania.
Pimpla examinanda Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 98 n. 21, ♀.
Pimpla examinanda Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 539 n. 16, ♀.
examinator (Fabr.) Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Frisch, Naturgesch. Insect. Teutschland II. 1721 p. 23 & 24; T. 4 F. 4.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 327 n. 13.
Ichneumon geniculatus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 397 n. 13.
Ichneumon variegatus Schrank, Neu. Magaz. Liebh. Entom. II. 1785 p. 327 n. 91.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 62 n. 228.
Ichneumon geniculatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 108 n. 167.
Ichneumon rufescens Gmélin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2701 n. 290.
Ichneumon geniculatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 207 n. 5.

---

[1]) *Lep.:* Ellopia somniaria (Harrington, Fletcher).
[2]) *Col.:* Anthonomus pomorum (Brischke). — *Lep.:* Hyponomeuta padella, H. evonymella, Nephopteryx vacciniella, Gnophria quadrum, Euprepia fuliginosa, Psyche hirsutella, Ps. stettinensis, Liparis monacha, Gastropacha processionaria, G. neustria, Harpya vinula, Abraxas grossulariata, Tortrix buoliana (Ratzeburg), Gastropacha trifolii, Portesia chrysorrhoea, Cucullia argentea, Hyponomeuta malinella (Brischke), Tortrix viridana (Bignell), Pieris napi (Meldola).

? Ichneumon variegatus Schrank, Fauna Boica II. P. 2. 1802 p. 287 n. 2096, ♀.
Cryptus examinator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 85 n. 62, ♀.
Pimpla examinator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 291.
Ichneumon examinator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 275.
Ichneumon examinator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 348.
Pimpla examinator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 207 n. 99, ♀ ♂.
Cryptus examinator Trentepol, Isis 1829 p. 835 n. 15, ♀.
Ichneumon variegatus Schrank, Gistl: Faunus N. F. I. 1837 p. 14.
Pimpla examinator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 375 n. 10, ♀ ♂.
Ichneumon (Pimpla) examinator Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 26.
Pimpla examinator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 116 n. 13, ♀ ♂.
Pimpla examinator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 93 n. 19.
Pimpla examinator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 99 n. 23.
Pimpla examinator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 19 n. 4, ♀ ♂.
Pimpla examinator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 52 & 262 n. 3, ♀ ♂.
Pimpla examinator Sichel, Ann. soc. entom. France (4) IV. 1864 p. 687.
Pimpla examinator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 181, ♀ ♂.
Pimpla examinator Kawall, Stettin. entom. Zeitg. XXXI. 1870 p. 108 n. 2, ♀ ♂.
Pimpla examinator Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 13, ♀ ♂; T. 9 F. 5.
Pimpla examinator Meldola, Trans. Entom. Soc. London 1876 Proc. p. XXXV.
Pimpla examinator Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 746 n. 4, ♀ ♂.
Pimpla examinator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 111, ♀ ♂.
Pimpla examinator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 474 n. 6, ♀ ♂.
Pimpla examinator Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1408 n. 4.
Pimpla examinator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 46, ♂.
Pimpla examinator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2125 n. 4.
Pimpla examinator Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 510, ♀ ♂.
Pimpla examinator Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique LXI. 1897 p. 284.

excelsa Costa — ♀ — Austr.
Pimpla excelsa A. Costa, Ann. mus. zool. Napoli II. (1862) 1864 p. 69 n. 1999, ♀.

fasciata Brullé — ♀ ♂ — Am.: Peru.
Pimpla fasciata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 100 n. 25, ♀.
Pimpla fasciata Spinola, Mem. accad. sc. Torino (2) XIII. 1851 p. 41 n. 22, ♀ ♂.

fatua Dest. — ♀ ♂ — Eur.: Sicilia.
Pimpla fatua Destefani, Natural. Sicil. VI. 1887 p. 88, ♀ ♂.
Pimpla (Polysphincta) fatua Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 539, ♀ ♂.

feralis Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Pimpla feralis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 399 n. 4, ♂.

ferruginea Smith — ♀ — As.: Key.
Pimpla ferruginea Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 173 n. 4, ♀.

flaviceps Brullé — ♀ — Austr.: New Guinea.
Pimpla flaviceps Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 93 n. 11, ♀.

flavicoxis Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pimpla flavicoxis Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 747 n. 6, ♀ ♂.
Pimpla flavicoxis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 476 n. 8, ♀ ♂.
Pimpla flavicoxis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1408 n. 7.
Pimpla flavicoxis Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 509, ♀ ♂.

flavipalpis Cam. — ♀ ♂ — As.: India.
Pimpla flavipalpis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 174, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Tortrix viridana (Bignell).

flavipennis Rdw. — ♀ — Eur.: Germania.
Pimpla flavipennis Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 234 n. 4, ♀.
fulva Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Pimpla fulva Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 122, ♀.
fulvescens Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Pimpla fulvescens Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 268 n. 3, ♂.
furcifera Bingh. — As.: Philippines.
Pimpla (Euxorides ?) furcifera Bingham, Ann. & Mag. Nat. Hist. XVI. 1895 p. 445.
fuscicornis Brullé — ♂ — Am.: Guadeloupe.
Pimpla fuscicornis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 104 n. 33, ♂.
fuscipennis Spin. — ♀ ♂ — Am.: Chile.
Pimpla fuscipennis Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 500 n. 1, ♀ ♂.
fuscipes Brullé — ♂ — Am.: Chile.
Pimpla fuscipes Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 102 n. 29, ♂.
gallicola Gir.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Pimpla stercorator var. 3 & 4 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 186 n. 92, ♀ ♂.
Pimpla gallicola Giraud, Ann. soc. entom. France (5) II. 1872 p. 506 n. 2, ♂.
gayi Spin. — ♀ ♂ — Am.: Chile.
Pimpla Gayi Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 502 n. 3, ♀ ♂; T. 4 F. 2.
ghilianii Spin. — ♀ — Eur.: Hispania.
Pimpla Ghilianii Spinola, Ann. soc. entom. France (2) I. 1843 p. 119 n. 9, ♀.
glandaria Costa — ♀ — Eur.: Sardinia.
Pimpla glandaria A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p. 21.
Pimpla glandaria Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 512 n. 44.
Pimpla glandaria A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 116.
Pimpla glandaria Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 575, ♀.
gossypii Ashm. — ♀ — Am.: Alabama.
Pimpla gossypii Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 445, ♀.
graminellae (Schrk.) Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon inanis Schrank, Fauna Boica II. P. 1. 1802 p. 293 n. 2107.
Ichneumon Rayellae Schrank, Fauna Boica II. P. 1. 1802 p. 295 n. 2114, ♂.
Ichneumon graminellae Schrank, Fauna Boica II. P. 1. 1802 p. 301 n. 2128, ♀.
Pimpla graminellae Gravenhorst, Ichneum Europ. III. 1829 p. 181 n. 91, ♀ [excl. var. & ♂].
Pimpla stercorator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 186, ♂ [excl. ♀].
Ephialtes inanis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 247 n. 110, ♀ [excl. ♂].
Pimpla (Scambus) inanis Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 267.
Pimpla graminellae Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 323 n. 377.
Pimpla graminellae Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 91 n. 15, ♀ ♂.
Pimpla graminellae Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 97 n. 16.
Pimpla graminellae Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 88 n. 8, ♀.
Pimpla graminellae Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 22 n. 9, ♀ ♂
Pimpla graminellae Goureau, Ann. soc. entom. France (4) I. 1861 Bull. p. VII.
Pimpla graminellae Giraud, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 1290, ♀; T. 22 F. 2a.
Pimpla graminellae Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 59, ♀.

---

1) *Hymen.:* Cynips Kollari, C. medusae, C. cerricola, Andricus glandium, Nematus gallarum (Giraud).

2) *Lep.:* Grapholitha servilla, Olindia ulmana (Giraud), Tortrix viridana, T. laevigana, Anacampsis populella, Anthonomus pomorum, Ochthiphila polystigma (Rondani).

Pimpla graminellae Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 266 n. 21, ♂ [excl. ♀].
Ephialtes inanis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 178, ♂.
Pimpla graminellae Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 183, ♀ ♂.
Pimpla graminellae Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1868 p. 446.
Pimpla graminellae Giraud, Ann. soc. entom. France (5) II. 1872 p. 506 n. 3, ♂.
Pimpla graminellae Cameron, Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow III. 1876 p. 84.
Pimpla graminellae Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 752 n. 20, ♀ ♂.
Pimpla inanis Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 754 n. 24, ♀ ♂.
Ephialtes inanis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 109, ♀ ♂.
Pimpla graminellae Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 112, ♀ ♂.
Pimpla graminellae Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 83 n. 3, ♀.
Pimpla Ratzeburgi Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 84.
Pimpla (Iseropus) Holmgreni Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 502 n. 34, ♀ ♂.
Pimpla (Epiurus) graminellae Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1413 n. 1.
Pimpla (Epiurus) inanis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1413 n. 4.
Pimpla graminellae Bignell, Entom. M. Magaz. XXVII. 1891 p. 131.
Pimpla Holmgreni Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 572, ♀ ♂.

grapholithae Cress.[1]) — ♀ ♂ — Am.: Missouri.
Pimpla grapholithae Cresson, Entom. News I. 1890 p. 50, ♀ ♂.

gymnetri Ratzbg.[2]) — Eur.: Germania.
Pimpla gymnetri Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 96.
Pimpla gymnetri Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 103 n. 39.

hawaiiensis Cam. — Austr.: Ins. Hawaienses.
Pimpla Hawaiiensis Cameron, Mem. Manchester Lit. & Philos. Soc. (3) X. 1886 p. 239 n. 66.

heraclei Boie[3]) — ♀ — Eur.: Germania.
Pimpla heraclii Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 103 n. 39, ♀.

himalayensis Cam. — ♂ — As.: India.
Pimpla Himalayensis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1899 P. 3. p. 178, ♂.

hirticauda Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Pimpla hirticauda Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 116 n. 18, ♀.

honorata Cam. — ♀ — As.: India.
Pimpla honorata Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 170, ♀.

japonica D. T. — ♀ ♂ — As.: Japonia.
Pimpla destructor Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 394 n. 1, ♀ ♂ [non 1863].
Pimpla Japonica m.

jason Cam. — ♀ ♂ — Am.: Columbia.
Pimpla Jason Cameron, Mem. Manchester Philos. Soc. (4) I. 1888 p. 176, ♀ ♂.

ichneumoniformis Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Pimpla ichneumoniformis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 403 n. 14, ♂.

illecebrator (Vill.) Grav.[4]) — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Ichneumon illecebrator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 194 n. 192.
Ichneumon illecebrator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 216 n. 58.
Ichneumon illecebrator Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 119 n. 260; T. 6 Fig. H & I.
Pimpla illecebrator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 291.

---

1) *Lep.:* Grapholitha caryana (Hamilton).
2) *Col.:* Gymnetron teter (Ratzeburg, Rondani).
3) *Lep.:* Hemilis heracliella (Boie, Rondani).
4) *Lep.:* Dicranura erminea (Taschenberg), Deilephila elpenor, Mania maura (Mocsáry).

Pimpla illecebrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 223 n. 104, ♀ ♂.
Pimpla illecebrator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 52 & 262 n. 2, ♀ ♂.
Pimpla illecebrator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 473 n. 3, ♀ ♂.
Pimpla illecebrator Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 511, ♀ ♂.
Pimpla illecebrator Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 284.

incisa Smith — ♀ — As.: Ceram.
Pimpla incisa Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 9 n. 6, ♀.

incompleta Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Pimpla incompleta Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 147 n. 14, ♀.

indagatrix Cress.[1]) — ♀ ♂ — Am.: Canada, Pennsylvania.
Pimpla indagatrix (Walsh) Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 147 n. 11, ♂.
Pimpla indagatrix Riley, 4th Ann. Rep. Insect. Missouri 1872 p. 43 nota.
Pimpla ? indagatrix Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p, 141, ♂.
Pimpla indagatrix Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 39 n. 10, ♀ ♂.
Pimpla indagatrix Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 460 n. 10, ♀ ♂.

indra Cam. — ♀ — As.: India.
Pimpla Indra Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 179, ♀.

indubia Cam. — ♀ — As.: India.
Pimpla indubia Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 166, ♀.

inquisitor (Scop.) Schmkn.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Fritsch, Naturgesch. Insect. Teutschl. II. 1721 p. 23 & 24; T. 4 F. 3, 5 & 6.
? Ichneumon visitator Poda, Insect. mus. Graec. 1761 p. 105 n. 5.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 351 n. 67.
? Ichneumon visitator Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 285 n. 750.
Ichneumon inquisitor Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 286 n. 754; T. 41 F. 745 [recte 754].
Ichneumon scanicus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 416 n. 68.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 62 n. 223 & 227 & p. 63 n. 242 & 245.
? Ichneumon visitator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 184 n. 154.
Ichneumon inquisitor Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 185 n. 157.
Ichneumon albipes Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2701 n. 287.
Ichneumon variegatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2701 n. 289.
Ichneumon aurifrons Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2702 n. 299.
Ichneumon annulatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2702 n. 302.
? Ichneumon visitator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 367.
Ichneumon inquisitor Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 367.
? Ichneumon visitator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 213 n. 34.
Ichneumon perquisitor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 213 n. 37.
? Ichneumon pennator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 171 n. 156.
Ichneumon stercorator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 172 n. 162, ♀.
? Pimpla pennator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 116 n. 17.
Pimpla stercorator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 117 n. 22.
? Ichneumon pennator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Tortrix incertana, Coleophora cinerella, Acrobasis juglandis (Riley).

2) *Lep.:* Eupithecia linariata (Bignell), Gastropacha neustria, Lasiocampa potatoria, Psilura monacha, Hylophila prasinana, Gnophria quadra, Nephopteryx vacciniella, Orgyia antiqua, Clisiocampa neustria, Liparis salicis, Hyponomeuta cognatella, Mylois cribrella, Tortrix prasinana, T. viridana, T. laevigana, Coccyx Buoliana, Trachea piniperda — *Hymen.:* Cephus compressus (Rondani). — *Col.:* Apoderus coryli, Rhynchites betuleti, Anobium striatum (Rondani).

Ichneumon stercorator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀ ♂.
? Ichneumon pennator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 138 n. 7.
? Pimpla pennator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 291.
Ichneumon stercorator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 274.
? Ichneumon pinnator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 274.
Ichneumon stercorator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 345.
? Ichneumon pinnator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 348.
Pimpla stercorator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 186 n. 92, ♀ [excl. ♂].
Pimpla flavipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 197 n. 94, ♂.
Pimpla stercorator Bouché, Naturg. d. Insect. 1834 p. 146 n. 17.
? Ichneumon pennator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª. IV. 1835 p. 350 n. 7.
Pimpla stercorator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 376 n. 13, ♀.
Pimpla stercorator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 319 n. 9.
Pimpla stercorator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 115 n. 8, ♀ ♂.
Pimpla flavipes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 115 n. 11.
Pimpla stercorator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 90 n. 10, ♀.
Pimpla flavipes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 90 n. 14.
Pimpla stercorator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 96 n. 10.
Pimpla flavipes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 97 n. 15, ♀ ♂.
Pimpla flavipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 88 n. 6, ♂.
Pimpla stercorator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 23 n. 12, ♀ ♂.
Pimpla stercorator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 58 & 268 n. 29, ♀ ♂.
Pimpla stercorator Giraud, Ann. soc. entom. France (5) II. 1872 p. 506.
Pimpla stercorator Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 13, ♀; T. 9 F. 9.
Pimpla stercorator Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 754 n. 25, ♀ ♂. [♀ ♂.
Pimpla (Epiurus) stercorator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 112,
Pimpla (Epiurus) inquisitor Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 520 n. 51, ♀ ♂.
Pimpla (Epiurus) stercorator Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1414 n. 6.
Pimpla inquisitor Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 618, ♀ ♂

inquisitoriella D. T.[1]) — ♀ ♂ — Am. bor. [Scopoli].
Ichneumon inquisitor Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 71 n. 5 [nec
Cryptus inquisitor Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 233 n. 6.
Ichneumon inquisitor Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 375 n. 5.
Cryptus inquisitor Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 690 n. 6.
Cryptus inquisitor Riley, 1st Ann. Rep. Insect. Missouri 1869 p. 150.
Pimpla inquisitor Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 138, ♀ ♂.
Pimpla coelebs Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 141, ♂.
Pimpla inquisitor Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 40 n. 12, ♀ ♂.
Pimpla inquisitor Lintner, 1st Ann. Rep. Insects New York 1882 p. 84.
Pimpla inquisitor Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 461 n. 12, ♀ ♂.
Pimpla inquisitor Weed, Insect Life III. 1891 p. 275-276.
Pimpla inquisitor Hamilton, Entom. News V. 1894 p. 288.
Pimpla inquisitor Howard, Bull. Dep. Agric. Entom. Techn. V. 1897 p. 8-17.
Pimpla inquisitoriella m.

insidiator Smith — ♀ — As.: Mysol.
Pimpla insidiator Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 9 n. 4, ♀.

insolens Smith — ♀ — As.: Celebes.
Pimpla insolens Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 64 n. 3, ♀.

---

1) *Lep.:* Orgyia leucostigma, Gelechia gallae-solidaginis, Grapholitha olivaceana, Coleophora cinerella, Clisiocampa californica, Phycita juglandis (Riley).

instigator (Fabr.) Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.

—— Mouffet, Insect. theatr. 1634 p. 63.
—— Réaumur, Mém. hist. Insect. II. 1736 p. ?; T. 35 F. 23.
? —— Degeer, Mém. hist. Insect. I. 1752 p. 332 & 580; T. 23 F. 16.
? Ichneumon compunctor Linné, Syst. nat. Ed. 10a I. 1758 p. 564 n. 31.
? Ichneumon compunctor Linné, Fauna Suec. Ed. 2. 1761 p. 403 n. 1609.
? Ichneumon compunctator Poda, Insect. mus. Graec. 1761 p. 106 n. 9.
? Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 325 n. 8 & p. 327 n. 14.
? Ichneumon punctator O. F. Müller, Mélang. soc. roy. Turin III. 1766 p. 196 n. 9.
? Ichneumon IX Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1766; T. 20 F. 7.
? Ichneumon compunctor Linné, Syt. nat. Ed. 12a I. 2. 1767 p. 934 n. 33.
? Ichneumon LIV Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768, ♂; T. 105 F. 5.
? —— Degeer, Mém. hist. Insect II. 1771 p. 845 n. 2; T. 29 F. 6-8.
? Ichneumon compunctor Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 336 n. 52.
? Ichneumon compunctor Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 851 n. 33; [T. 26 F. 5.
? Ichneumon punctator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 157 n. 1831.
? —— Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. I. 2. 1778 p. 91 & 4. 1778 p. 30; T. 23 F. 16.
? Ichneumon compunctor Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 431 n. 65.
? Ichneumon compunctator Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 357 n. 721, ♀.
? Ichneumon hypochondriacus Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 67 n. 267.
? Ichneumon compunctor Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 395 n. 8.
? Ichneumon inguinalis Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 397 n. 14.
? Ichneumon compunctor Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 266 n. 77.
? Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 61 n. 194 & 195.
? Ichneumon inguinalis Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 154 n. 58.
? Ichneumon compunctor Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 167 n. 99 & p. 187 n. 164.
? Ichneumon compunctator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 180 n. 138.
? Ichneumon compunctor Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2691 n. 53.
? Ichneumon compunctator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2696 n. 162.
? Ichneumon bisulcus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2698 n. 263.
? Ichneumon impressus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2698 n. 264.
? Ichneumon fornicator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 44 n. 766.
? Ichneumon faber Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 364; T. 38 F. 3.
? Ichneumon compunctor Oliver, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 186 n. 118.
? Ichneumon fornicator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 189 n. 126.
? Ichneumon inguinalis Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 207 n. 6.
? Ichneumon compunctator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 220 n. 87.
? Ichneumon compunctor Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 163 n. 121.
? Ichneumon instigator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 164 n. 126, ♀.
? Ichneumon punctator Schrank, Sammlg. naturh. & physik. Aufs. 1796 p. 126.
? Ichneumon compunctor Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 160 n. 494.
? Ichneumon punctor Schrank, Fauna Boica II. P. 2. 1802 p. 299 n. 2122.
? Ichneumon resinellae Schrank, Fauna Boica II. P. 2. 1802 p. 300 n. 2126, ♀.
? Ichneumon compunctor Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 60 n. 55.

---

[1]) *Hymen.:* Nematus perspicillaris (Brischke). — *Lep.:* Selenia lunaria (Bairstow), Spilosoma mendica, Cosmia abluta, Dasychira fascellina (Mocsáry), Pieris brassicae, Orgyia gonostigma, O. pudibunda, O. antiqua, Liparis dispar, L. monacha, L. chrysorrhoea, L. auriflua, Gastropacha processionea, G. neustria, G. pini, Harpyia erminea, Panolis piniperda, Scoliopteryx libatrix, Psyche viciella, Phalera bucephala, Aporia crataegi (Schmiedeknecht). — *Col.:* Pissodes notatus (Rondani).

? Cryptus compunctor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 84 n. 58.
Cryptus instigator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 85 n. 61.
? Ichneumon compunctor Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 182 n. 11.
Cryptus instigator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. Syst. 1807 p. 3765 [em.].
? Ichneumon compunctor C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- u. Baumhölzer II. 6. 1807 p. 307.
? Ichneumon fornicator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 66 n. 766, ♀.
Ichneumon instigator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀ ♂.
? Ichneumon compunctor Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀.
? Cryptus conjunctus Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 289.
Pimpla instigator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 291.
? Ichneumon compunctor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273.
Ichneumon instigator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 275.
? Ichneumon compunctor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 343.
Ichneumon instigator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 349.
Pimpla instigator Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 129 n. 4, ♀ ♂.
? Pimpla compunctor Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 129 n. 6.
? Ichneumon compunctor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 130 n. 76, ♀ ♂.
Pimpla instigator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 216 n. 103, ♀ ♂.
? Cryptus compunctor Trentepol, Isis 1829 p. 831 n. 12, ♀.
Cryptus instigator Trentepol, Isis 1829 p. 832 n. 13, ♀.
Pimpla instigator Bouché, Naturg. d. Insect. 1834 p. 146 n. 18. [n. 12.
? Ichneumon compunctor (Marshall) Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 131
Pimpla instigator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 374 n. 6, ♀ ♂.
Pimpla instigator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 319 n. 11.
Pimpla instigator Audouin, Hist. nat. Insect. nuis. 1842 p. 179, ♀ ♂; T. 17 F. 3 (♂) & 3* (♀).
Pimpla instigator Schiödte, Naturh. Tidsskr. IV. 1843 p. 106 n. 5.
Ichneumon (Pimpla) instigator Ratzeburg, Forstinsecten III. 1844 p. 26 n. 19, ♀ ♂; T. 6 F. 1.
Pimpla instigator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 116 n. 12, ♀ ♂.
Pimpla instigator Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 322 n. 375.
Pimpla instigator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 93 n. 18, ♀.
Pimpla instigator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 99 n. 22.
Pimpla instigator Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 103 n. 40, ♂.
Pimpla instigator Kawall, Stettin. entom. Zeitg. XIX. 1858 p. 67 n. 43, ♂.
Pimpla instigator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 18 n. 1, ♀ ♂.
Pimpla instigator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 52, ♀ ♂.
Pimpla instigator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 261 n. 1, ♀ ♂.
Pimpla instigator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 2. 1864 p. 168, ♀ ♂ var.
Pimpla instigator Marshall, Entom. Annual f. 1874 p. 127.
Pimpla instigator Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 13, ♀; T. 9 F. 1.
Pimpla instigator Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 746 n. 1.
Pimpla instigator Fabricius, Bairstow: Entom. M. Mag. XVI. 1879 p. 36.
Pimpla instigator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 111, ♀ ♂.
Pimpla instigator Segvelt, Feuille jeun. natural. XII. 1881 p. 11.
Pimpla instigator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 470 n. 1, ♀ ♂.
Pimpla instigator Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1408 n. 1.
Pimpla instigator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 57.
Pimpla instigator Buysson, Revue d'entom. XL. 1892 p. 258; T. 1 F. 3.
Pimpla instigator Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 282.
Pimpla instigator Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 510, ♀ ♂.
var. **intermedia** Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pimpla intermedia Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 19 n. 2, ♀ ♂.

Pimpla instigator var. intermedia Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 746 n. 1.
Pimpla intermedia Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 472 n. 2, ♀ ♂. [p. 510.
Pimpla instigator var. intermedia Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897
var. **processioneae** Ratzbg.[1]) — ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla processioneae Ratzeburg, Stettin. entom. Zeitg. X. 1849 p. 133 n. 2, ♂.
Pimpla processioneae Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 101 n. 35, ♂.
Pimpla instigator var. processioneae Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 470, ♂.
interceptor Smith — ♀ — Austr.: New Guinea.
Pimpla interceptor Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 65 n. 10, ♀.
interrupta Tosqu. — ♀ — Afr.
Pimpla interrupta Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 286 n. 2, ♀.
investigatrix Walsh — ♀ — Am.: Illinois.
Pimpla investigatrix Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 142, ♀.
khasiana Cam. — ♀ — As.: India.
Pimpla Khasiana Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 168, ♀.
kolthoffii Aur. — ♀ ♂ — Am.: Groenlandia. [n. 6, ♀ ♂.
Pimpla (Itoplectis) Kolthoffi Aurivillius, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. XV. P. 4. 1893 p. 29
Pimpla Kolthoffi Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 540, ♀ ♂.
kriechbaumeri D. T. — ♂ — Eur.: Mallorca.
Pimpla tricolor Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 248 n. 22, ♂ [nec
Pimpla Kriechbaumeri m. [Spinola, nec Brullé].
laetiventris Cam. — ♀ — As.: India.
Pimpla laetiventris Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 183, ♀.
laothoe Cam. — ♀ — As.: Missouri.
Pimpla Laothoe Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 22, ♀.
laticeps Ratzbg.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla laticeps Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 94 n. 24, ♂.
Pimpla laticeps Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 100 n. 28, ♀.
Pimpla laticeps Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 538 n. 10.
latifoveata Cam. — ♂ — As.: India.
Pimpla latifoveata Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 181, ♂.
lativentris Rdw.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla lativentris Rudow, Entom. Nachr. VII. 1881 p. 311 n. 7, ♀ ♂.
lepecha Cam. — As.: India.
Pimpla lepecha Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 163.
levidorsum Voll. — ♀ — Eur.: Batavia.
Pimpla laevidorsum Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XVI. 1873 p. 213 n. 6, ♀.
levifrons Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pimpla laevifrons Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 750 n. 14, ♀ ♂.
Pimpla laevifrons Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 534 n. 60, ♀ ♂.
Pimpla (Delomerista) laevifrons Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1412 n. 2.
Pimpla laevifrons Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 621, ♀ ♂.
levigata Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Pimpla laevigata Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 273 n. 5, ♀ ♂.
Pimpla laevigata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 529 n. 52, ♀ ♂.
Pimpla laevigata Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 620, ♀ ♂.
Pimpla laevigata Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 295.

---

1) *Lep.:* Cnethocampa processionea (Ratzeburg).
2) *Col.:* Pissodes notatus (Ratzeburg).
3) *Hymen.:* Tenthredinid. spec. (Rudow).

levis Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Pimpla laevis Gravenhorst, Ichneum. d. Europ. III. 1829 p. 180 n. 89, ♀.
Pimpla laevis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 61 & 269 n. 31, ♀.
Pimpla laevis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 532 n. 58, ♀.
Pimpla laevis Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 621, ♀.
lignicola Ratzbg.[1] — ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla lignicola Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 98 n. 19, ♂.
Pimpla lignicola Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 539 n. 15, ♂.
limbata Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Cap.
Pimpla limbata Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 295 n. 6, ♀ ♂.
linearis Ratzbg.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla linearis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 117 n. 16, ♀ ♂.
Pimpla linearis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 93 n. 22.
Pimpla linearis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 99 n. 26, ♂.
Pimpla linearis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg, V. 1864 p. 185, ♀ ♂.
Pimpla linearis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 114, ♀ ♂.
? Pimpla linearis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 536 n. 3, ♀ ♂.
lithocollethidis Ashm. — ♂ — Am.: California.
Pimpla lithocollethidis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 447, ♂.
longicauda Brullé — ♀ — Eur.: Graecia.
Pimpla longicauda Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 479 n. 834, ♀; T. 51 F. 10.
longiventris Ratzbg.[3] — ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla longiventris Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 94 n. 27, ♂.
Pimpla (Scambus) longiventris Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 538 n. 11.
lucens Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Pimpla lucens Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 122, ♂.
luctuosa Smith — ♀ — As.: Japonia.
Pimpla luctuosa Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 394 n. 2, ♀.
maculator (Fabr.) Grav.[4] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 352 n. 68.
Ichneumon maculator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 337 n. 59, ♀.
Ichneumon maculator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 432 n. 75.
Ichneumon plaessus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1783 p. 417 n. 69.
Ichneumon arlequinatus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 427 n. 101.
Ichneumon maculator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 267 n. 91.
Ichneumon maculator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 177 n. 126.
? Ichneumon scanicus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 190 n. 174.
Ichneumon arlequinatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 191 n. 179.
Ichneumon maculator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2693 n. 152.
Ichneumon maculator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 361.
Ichneumon maculator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 189 n. 129.

---

1) *Col.:* Dasytes coeruleus (Ratzeburg).

2) *Hymen.:* Fenusa pumila (Brischke). — *Lep.:* Coccyx resinana, C. buoliana, Tischeria complanella. — *Col.:* Magdalinus violaceus, Pissodes notatus, Buprestis punctatus (Ratzeburg).

3) *Col.:* Apoderus coryli (Ratzeburg).

4) *Lep.:* Coccyx resinana (Rondani), Tortrix viridana, T. chlorana, T. laevigana, T. piceana, T. rileana, Coleophora tiliella, Hyponomeuta padella, Psyche nitidella, Nephopteryx vacciniella, Gelechia epilobiella, Depressaria intermediella (Bignell). — *Hymen.:* Microgaster spec. — *Arachn.:* spec. indeterm. (Schmiedeknecht).

Ichneumon maculator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 168 n. 147.
Cryptus maculator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 87 n. 71.
Pimpla maculator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 291.
Ichneumon maculator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 270.
Ichneumon maculator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 336.
Pimpla scanica Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 204 n. 98, ♀ ♂.
Cryptus maculator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1058 n. 280.
Cryptus maculatorius Trentepol, Isis 1829 p. 850 n. 26, ♀.
Pimpla scanica Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 375 n. 9, ♀ ♂.
Pimpla scanica Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 116 n. 14, ♀ ♂.
Pimpla scanica Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 93 n. 20.
Pimpla scanica Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 99 n. 24.
Pimpla tricolor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 100 n. 32, ♀.
Pimpla scanica Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 21 n. 8, ♀ ♂.
Pimpla scanica Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 57 & 264 n. 12, ♀ ♂.
Pimpla scanica Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 182, ♀ ♂ var.
Pimpla scanica Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 13, ♀; T. 9 F. 6.
Pimpla scanica Brischke, Entom. Monatsbl. I. 1876 p. 159.
Pimpla scanica Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 748 n. 7, ♀ ♂.
Pimpla (Itoplectis) scanica Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N.F. IV. P. 4. 1880 p. 111, ♀ ♂.
Pimpla scanica Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 113 n. 6.
Pimpla scanica Bignell, Entomol. XXI. 1888 p. 140.
Pimpla (Itoplectis) maculator Smiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 489 n. 24, ♀ ♂.
Pimpla (Itoplectis) scanica Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1408 n. 1.
Pimpla maculator Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. IX. 1890 p. 139.
Pimpla maculator Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 541, ♀ ♂.
Pimpla scanica Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 288.

mahalensis Grib. — ♀ — Afr.: Shoa.
Pimpla Mahalensis Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 345 n. 11, ♀.
Pimpla Mahalensis Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 257.
Pimpla Mahalensis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 290 n. 4, ♀.

mandibularis (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Pimpla mandibularis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 180 n. 90, ♀.
Pimpla mandibularis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 27 n. 21, ♀ ♂.
Pimpla mandibularis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 62, ♀ & p. 269 [n. 32, ♀ ♂.
Pimpla mandibularis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 184, ♀.
Pimpla mandibularis Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 750 n. 13, ♀ ♂.
Pimpla mandibularis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N.F. IV. P. 4. 1880 p. 113, ♀ ♂.
Pimpla mandibularis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 533 n. 59, ♀ ♂.
Pimpla (Delomerista) mandibularis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1412 n. 1.
Pimpla mandibularis Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entomol. II. 1897 p. 621, ♀ ♂.

marginellatoria Duf. & Perr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Pimpla marginellatoria Dufour & Perris, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 48 n. 26, ♀ ♂.

marginipennis Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Pimpla marginipennis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 401 n. 10, ♀.

maura Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Pimpla maura Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 145 n. 1, ♀.

---

[1]) *Hymen.:* Trypoxylon figulus (Rondani).

melanocephala Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pimpla melanocephala Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 149 n. 75, ♀.
Pimpla bicolor Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 102 n. 38, ♀.
Pimpla bicolor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 27 n. 22, ♀.
Pimpla melanocephala Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 56 & 264 n. 11, ♀.
Pimpla melanocephala Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 486 n. 20, ♀.
Pimpla melanocephala Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 540, ♀ ♂.
melanopyga Grav. — ♀ — Eur. mer., Hungaria.
Pimpla melanopyga Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 149 n. 76, ♀.
Pimpla melanopyga Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 60 & 266 n. 23, ♀.
Pimpla melanopyga Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 33, ♀; T. 21 F. 4.
Pimpla melanopyga Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 508 n. 41, ♀.
Pimpla melanopyga Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 575, ♀.
meliorator Fabr. — Am. mer.
Pimpla meliorator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 118 n. 27.
Ichneumon meliorator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 272.
Ichneumon meliorator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 341.
meridionalis Kriechb.[2]) — ♀ — Eur.: Hispania.
Pimpla meridonalis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 120 n. 9, ♀.
Pimpla meridionalis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 486 n. 19, ♀.
Pimpla meridionalis Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 526, ♀.
mexicana Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Pimpla Mexicana Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 266 n. 6, ♀.
minuta Weed — Am.: Illinois.
Pimpla minuta Weed, Bull. Illinois Nat. Hist. III. 1890 p. 41.
mixta Ratzbg.[3]) — ♀ — Eur.: Germania.
Pimpla mixta Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 97 n. 33, ♀.
Pimpla mixta Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 538 n. 13, ♀.
montezuma Cam. — Am.: Mexico.
Pimpla Montezuma Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46 1886 Hymen. I. p. 266 n. 5.
moraguesii Schmkn. — ♀ — Eur.: Mallorca.
Pimpla Moraguesi Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 479 n. 12, ♀.
Pimpla Moraguesi Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 508, ♀.
mussii Htg.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla Mussii Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. 2. 1838 p. 253, ♀ ♂.
Ichneumon (Pimpla) Mussii Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 27.
Pimpla Mussii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 113 n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon Mussii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 131 n. 4, ♂.
Pimpla Mussii Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 265 n. 19, ♀.
Pimpla Mussii Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 112, ♀ ♂.
Pimpla Mussii Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 504 n. 35, ♀ ♂.
Pimpla Mussii Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 573, ♀ ♂.
necator Fabr. — Am. mer.
Pimpla necator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 118 n. 26.
Ichneumon lanator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 261.
Ichneumon laniator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 312.

---

1) *Lep.:* Leucania impura (Mocsáry), L. obsoleta (Boie).
2) *Lep.:* Lasiocampa repanda (Kriechbaumer).
3) *Lep.:* Thecla quercus, Tinea turionella (Ratzeburg).
4) *Lep.:* Gastropacha pini (Hartig).

nepe Cam. — As.: Mussoori.
Pimpla Nepe Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 23; T. 3 F. 4.
nigricans Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pimpla nigricans Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 754 n. 23, ♀ ♂.
Pimpla detrita var. nigricans Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 515.
Pimpla (Epiurus) nigricans Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1413 n. 3.
Pimpla nigricans Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 590, ♀ ♂.
nigriceps Brullé — ♂ — Am.: Chile.
Pimpla nigriceps Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 103 n. 32, ♂.
nigricornis Smith — ♂ — Austr.: New Guinea.
Pimpla nigricornis Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 64 n. 9, ♂.
nigriscaposa Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pimpla nigriscaposa Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 755 n. 27, ♀ ♂.
Pimpla nigriscaposa Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 522 n. 53, ♀ ♂.
Pimpla (Epiurus) nigriscaposa Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1414 n. 8.
Pimpla nigriscaposa Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 591, ♀ ♂.
nigrolineata Luc. — Afr.: Algeria.
Pimpla ? nigrolineata Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 323 n. 378.
nitida Brauns — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla (Epiurus) nitida Brauns, Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklenburg LI. 1898 p. 64, ♀ ♂.
nodosa Rdw. — ♀ — Eur.: Germania.
Pimpla nodosa Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 235 n. 5, ♀.
nordenskiöldii Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.
Pimpla Nordenskiöldi Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXIX. P. 6. 1872 p. 97, ♀.
Pimpla longiceps Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 746 n. 3, ♀ ♂.
Pimpla longiceps Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 474 n. 5, ♀ ♂.
Pimpla longiceps Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1408 n. 3.
Pimpla Nordenskiöldi Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 511, ♀ ♂.
notanda Cress.[1] — ♀ ♂ — Am.: Pennsylvania.
Pimpla notanda Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 148 n. 19, ♀ ♂.
notator Fabr. — Am. mer.
Pimpla notator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 115 n. 12.
Ichneumon notator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon notator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 314.
novita Cress.[2] — ♀ — Am.: Massachusetts.
Pimpla novita Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 147 n. 10, ♀.
Pimpla novita Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 39 n. 9, ♀.
Pimpla novita Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 460 n. 9, ♀.
nubecula Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Pimpla terminalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 36, ♀ [non Brullé].
Pimpla nubecula Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 196.
nubecularia Dew. — ♂ — Am.: Puerto Rico.
Pimpla nubecularia Dewitz, Berlin. entom. Zeitschr. XXV. 1881 p. 206, ♂; T. 5 F. 10.
obnoxia Smith — ♀ — As.: Morty.
Pimpla obnoxia Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 64 n. 6, ♀.
obscurata Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Pimpla obscurata Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 36, ♀.

---

1) *Lep.:* Gelechia gallae-solidagenis, G. gallae-astrella, Papilio troilus, Proteoteras aesculana (Riley, Weed).

2) *Lep.:* Grapholitha olivaceana (Riley), Thalpochares carmelitae (Mor.).

oculatoria (Fabr.) Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur.
? Ichneumon lineatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 157 n. 69.
? Ichneumon lineatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 175 n. 53.
Ichneumon oculatorius Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 211 n. 57-58.
Ichneumon oculatorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 55 n. 30.
Cryptus oculatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 78 n. 30.
Pimpla oculatorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 291.
Ichneumon oculatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 280.
Ichneumon oculatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 363.
Pimpla oculatoria Hartlieb, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1826. 1827 p. 23.
Pimpla oculatoria Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 154 n. 79, ♀ ♂.
Cryptus oculatorius Trentepol, Isis 1829 p. 841 n. 20, ♂ & p. 869 n. 42, ♀.
Pimpla oculatoria Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 89 n. 12, ♀ ♂.
Pimpla oculatoria Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 26 n. 19, ♀ ♂.
Pimpla oculatoria Goureau, Ann. soc. entom. France (4) II. 1862 Bull. p. II, ♀.
Pimpla oculatoria Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 61 & 264 n. 14, ♀ ♂.
Pimpla oculatoria Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 184, ♀ ♂.
Pimpla osculatoria Rogers, Trans. Entom. Soc. London (3) V. 1866 Proc. p. VII.
Pimpla oculatoria Laboulbène, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 p. 444, ♀.
Pimpla oculatoria Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 33; T. 21 F. 7.
Pimpla oculatoria Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 751 n. 15.
Pimpla oculatoria Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 113, ♀ ♂.
Pimpla oculatoria A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1888 p. 22.
Pimpla (Tromatobia) oculatoria Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 498 n. 30, ♀ ♂.
Pimpla (Tromatobia) oculatoria Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1412 n. 1.
Pimpla oculatoria Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 541, ♀ ♂.

var. **rubella** Costa — Eur.: Sardinia.
Pimpla oculatoria var. rubella A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p. 22.
Pimpla oculatoria var. rubella A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 117.

ogovensis D. T. — Austr.: Ogové.
Pimpla nigricornis Kirby, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) XVIII. 1896 p. 263; T. 12 F. 2 [non Pimpla Ogovensis m. [Smith].

olinthia Cam. — ♀ — As.: India.
Pimpla Olynthia Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 156, ♀.

ontario Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Pimpla Ontario Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 146 n. 8, ♂.
Pimpla Ontario Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 37 n. 5, ♀ ♂.
Pimpla Ontario Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 458 n. 5, ♀ ♂.

opacellata Desv.[2] — ♀ — Eur.: Britannia.
Pimpla opacellata Desvignes, Entom. M. Magaz. IV. 1868 p. 174, ♀.

orbitalis Ratzbg.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla orbitalis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 103 n. 44, ♀ ♂.

orgyiae Ashm.[4] — ♀ ♂ — Am.: California.
Pimpla (Ictoplectis) Orgyiae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 213, ♀ ♂.

---

[1]) *Arachn.:* Epeira diadema (Laboulbène).
[2]) *Lep.:* Psyche opacellata (Desvignes).
[3]) *Lep.:* Coccyx buoliana, C. resinana (Ratzeburg).
[4]) *Lep.:* Orgyia gulosa (Ashmead).

ornata Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pimpla ornata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 158 n. 80, ♀.
Pimpla ornata Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 61 & 265 n. 15, ♀.
Pimpla ornata Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 184, ♀ ♂.
Pimpla ornata Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 752 n. 19.
Pimpla ornata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 113, ♀ ♂.
Pimpla ornata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 499 n. 31, ♀ ♂.
Pimpla (Tromatobia) ornata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1412 n. 5.
Pimpla ornata Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 542, ♀ ♂.

ovalis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Pimpla ovalis Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 748 n. 9, ♀.
Pimpla ovalis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 494 n. 26, ♀.
Pimpla (Itoplectis) ovalis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1409 n. 3.
Pimpla ovalis Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 510, ♀.

ovivora Boh.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pimpla ovivora Boheman, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XLII. 1821 p. 335; T. 4 F. 1.
Pimpla ovivora Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 26 n. 20, ♀ ♂.
Pimpla ovivora Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 184, ♂.
Pimpla ovivora Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 33, ♀ ♂; T. 21 F. 6.
Pimpla ovivora Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 113, ♀ ♂.
Pimpla (Trematobia) ovivora Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 495 n. 28, ♀ ♂.

parallela Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pimpla parallela Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 752 n. 19, ♀ ♂.
Pimpla (Tromatobia) parallela Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1412 n. 4, ♀ ♂.
Pimpla parallela Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 542.

pedalis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Colorado.
Pimpla pedalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 268 n. 2, ♂.
Pimpla pedalis Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 134, ♀ ♂.
Pimpla pedalis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 35 n. 1, ♀ ♂.
Pimpla pedalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 456 n. 1, ♀ ♂.

perezii Kriechb. — ♀ — Eur.: Hispania.
Pimpla Perezi Kriechbaumer, Act. soc. Españ. hist. nat. 1898 p. 170, ♀.

petiolata Say — Am.: Indiana.
Pimpla ? petiolatus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 224 n. 2.
Pimpla petiolatus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 683 n. 2.

petulca Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Pimpla Petulca Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 165, ♀.

picticornis Cress. — ♂ — Am.: New Jersey.
Pimpla picticornis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 147 n. 9, ♂.
Pimpla picticornis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 38 n. 7, ♂.
Pimpla picticornis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 459 n. 7, ♂.

pictifrons Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pimpla pictifrons Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 757 n. 31, ♀ ♂.
Pimpla pictifrons Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 488 n. 22, ♀ ♂.
Pimpla pictifrons Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 540, ♀.

pictipes Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla pictipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 198 n. 95, ♂.
Pimpla pictipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 63, ♀.

---

1) *Lep.:* Gastropacha neustria (Brischke).
2) *Arachn.:* Theridium spec. (Brischke).

Pimpla Gravenhorstii Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 266 n. 22, ♀ [p. p.].
Pimpla pictipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 184, ♂.
Pimpla pictipes Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 38, ♀ ♂.
Pimpla pictipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 113, ♂.
Pimpla pictipes Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 515 n. 47, ♀ ♂.
Pimpla pictipes Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 590, ♀ ♂.

pini Htg.[1]) — ♀ ♂ — Eur.
Pimpla pini Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 253, ♀ ♂.

placida Smith — ♀ — As.: Batchian.
Pimpla placida Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 140 n. 4, ♀.

pleuralis Buyss. — Afr.: Transvaal.
Pimpla pleuralis Buysson, Ann. soc. entom. France 1897 p. 352.

poesia Cam. — ♀ — As.: India.
Pimpla Poesia Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 p. 176, ♀.

pomorum Ratzbg.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla pomorum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 96 n. 32, ♀ ♂.
Pimpla pomorum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 103 n. 41.
Pimpla pomorum Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 267 n. 25, ♀.
Pimpla (Tromera) pomorum Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 506 n. 38, ♀ ♂.
Pimpla pomorum Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 3127 n. 30b.
Pimpla pomorum Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 574, ♀ ♂.

producta Tosqu. — ♀ — Afr.: Togo.
Pimpla producta Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 317 n. 18, ♀.

properata Tosqu. — ♀ — Afr.: Caffraria.
Pimpla properata Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 293 n. 5, ♀.

pterelas (Say) Walsh[3]) — ♀ — Am. bor.
Ichneumon (Pimpla) pterelas Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 71 n. 6.
Ichneumon pterelas Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 376 n. 6.
Pimpla pterelas Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 133, ♀.
Pimpla pterelas Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 41 n. 15, ♀.
Pimpla pterelas Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 462 n. 15, ♀.
Pimpla pterelas Hamilton, Entom. News V. 1894 p. 288.

pterophori Ashm. — ♀ — Am.: California.
Pimpla pterophori Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 445, ♀.

pudibundae Ratzbg.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla pudibundae Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 114 n. 7, ♀.
Pimpla pudibundae Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 263.
Pimpla pudibundae Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 479 n. 11, ♀.
Pimpla pudibundae Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 508, ♀ ♂.

pulchrimaculata Cam. — ♀ — As.: Ceylon.
Pimpla pulchrimaculata Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1897 P. 4. p. 20, ♀.

punctata Thoms. — Eur.: Styria, Istria.
Pimpla punctata Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2126 n. 21b.
Pimpla punctata Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 571.

---

1) *Lep.:* Gastropacha pini (Hartig).
2) *Col.:* Anthonomus pomorum (Ratzeburg, Bridgman).
3) *Lep.:* Paedisca scudderiana, Gelechia gallae-solidaginis (Riley).
4) *Lep.:* Orgyia pudibunda (Rondani).

punctiventris Thoms.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pimpla punctiventris Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 756 n. 29, ♀ ♂.
Pimpla (Epiurus) punctiventris Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1414 n. 10.

puniceipes Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Pimpla punicipes Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 398 n. 3, ♀.
Pimpla punicipes Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 266 n. 4, ♀; T. 11 F. 6.

quadricingulata Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Pimpla quadricingulatus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 38 n. 8, ♀.
Pimpla quadricingulatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 459 n. 8, ♀.

quadricolor Kriechb. — ♀ — Afr.: Teneriffa.
Pimpla quadricolor Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 52 n. 14, ♀.

quadridentata Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pimpla quadridentata Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 749 n. 12, ♀ ♂.
Pimpla quadridentata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 483 n. 15.
Pimpla (Apechtis) quadridentata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1411 n. 3.
Pimpla quadridentata Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 526, ♀♂.

ragusae Dest. — ♂ — Eur.: Sicilia.
Pimpla Ragusae Destefani, Natural. Sicil. IV. 1885 p. 188 n. 7, ♂.
Pimpla Ragusae Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 540, ♂.

resinellae (L.) Fabr.![2]) — ♂ — Eur.
—— Degeer, Mém. hist. Insect. I. 1752 p. ?; T. 33 F. 1-3.
Ichneumon resinellae Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 565 n. 39.
Ichneumon resinellae Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 405 n. 1618.
Ichneumon resinellae Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 936 n. 43.
Ichneumon resinellae Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 338 n. 62.
Ichneumon resinellae Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 854 n. 43.
Ichneumon resinellae O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 156 n. 1816.
—— Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. I. 4. 1778 p. 38; T. 33 F. 1-3.
Ichneumon resinellae Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 433 n. 81.
Ichneumon resinellae Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 267 n. 97.
Ichneumon resinellae Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 170 n. 108.
Ichneumon resinellae Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2694 n. 43.
Ichneumon resinellae Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 373.
Ichneumon resinellae Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 190 n. 135.
Ichneumon resinellae Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 119 n. 262.
Ichneumon resinellae Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 171 n. 157.
Ichneumon resinellae Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 162 n. 500.
Ichneumon resinellae Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 61 n. 62.
Pimpla resinellae Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 116 n. 18.
Ichneumon resinellae Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 959 [n. 10.
Ichneumon resinellae C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- u. Baumhölzer I. 4. 1807 p. 132.
Ichneumon resinellae Bechstein, Forstinsectol. 1818 p. 144 n. 292 & p. 493 n. 6.
Ichneumon resinator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 275.
Ichneumon resinator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 349.
Ichneumon resinellae Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 983 n. 141, ♂.

---

1) = ? P. calobata Grav. (Schmiedeknecht).
2) *Lep.:* Coccyx resinana (Linné).

roborator Fabr.[1]) — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon roborator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 170 n. 153.
Ichneumon roborator Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 50; T. 11 F. 10.
Pimpla roborator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 116 n. 14.
Pimpla roborator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 291.
Ichneumon roborator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 270.
Ichneumon roborator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 336.
Pimpla roborator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 173 n. 84, ♀ ♂.
Pimpla cicatricosa Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 89 n. 7, ♀.
? Pimpla caudata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 92 n. 16, ♀ ♂.
Pimpla cicatricosa Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 96 n. 7.
Pimpla caudata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 97 n. 17.
Pimpla roborator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 103 n. 45, ♂.
Pimpla roborator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 25 n. 16, ♀.
Ephialtes extensor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 255 n. 7, ♀ ♂.
Pimpla roborator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 55 & 263 n. 9, ♀ ♂.
Pimpla cicatricosa Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 265 n. 18, ♀.
Pimpla roborator Vollenhoven, Pinacogr. P. 5. 1877 p. 33, ♀; T. 21 F. 5.
Ephialtes extensor Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 743 n. 13, ♀ ♂.
Pimpla roborator Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 753 n. 21, ♀ ♂.
Pimpla cicatricosa Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 112, ♀ ♂.
Pimpla (Exeristes) roborator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 483 n. 16, ♀ ♂.
Pimpla caudata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 537 n. 8.
Pimpla roborator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2126 n. 21.
Pimpla roborator Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 543, ♀ ♂.

robusta Rdw. — ♀ — Eur.: Germania.
Pimpla robusta Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 238 n. 11, ♀.

rubripes Holmgr. — ♀ — Afr.: Cap.
Pimpla rubripes Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 405 n. 30, ♀.

rufata (Gmel.) Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 59 n. 165.
Ichneumon rufatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2684 n. 240.
Pimpla rufata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 164 n. 82, ♀ ♂ [excl. var. 1].
Pimpla rufata Bouché, Naturg. d. Insect. 1834 p. 145 n. 16.
Pimpla rufata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 118 n. 20.
Pimpla rufata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 95 n. 29.
Pimpla rufata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 101 n. 34.
Pimpla rufata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 87 n. 5, ♀ ♂.
Pimpla rufata Nördlinger, Die kleinen Feinde 1855 p. 432. [♀ ♂.
Pimpla flavonotata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. (Pimpl.) p. 19 n. 5,
Pimpla rufata Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 54 & 263 n. 7, ♀ ♂.
Pimpla flavonotata Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 181, ♀ ♂ var.
Pimpla rufata Perris, Ann. soc. entom. France (5) III. 1873 p. 83.

---

[1]) *Lep.:* Sesia formicaeformis, S. spheciformis (Brischke), Coccyx turionana (Ratzeburg). — *Col.:* Cryptorhynchus lapathi (Ratzeburg). — *Hymen.:* Nematus gallarum = intercus (Ratzeburg).

[2]) *Lep.:* Psilura monacha, Spilosoma menthastri, Rhodocera rhamni, Pieris napi, Tortrix viridana (Bignell), Gastropacha neustria, Drepana falcula, Psyche viciella, Abraxas grossulariata, Nephopteryx vacciniella. — *Hymen.:* Lophyrus spec. (Schmiedeknecht).

Pimpla flavonotata Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 13, ♀; T. 9 F. 3.
Pimpla flavonotata Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 749 n. 11.
Pimpla rufata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 117 n. 7.
Pimpla (Apechtis) rufata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 480 n. 13, ♀ ♂.
Pimpla (Apechtis) flavonotata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1411 n. 2.
Pimpla rufata Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 526, ♀ ♂.

ruficollis Grav.[1]) — ♀ — Eur: Britannia, Germania, Austria.
Pimpla ruficollis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 153 n. 78, ♀.
? Pimpla variegata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 118 n. 21, ♀.
? Pimpla variegata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 95 n. 30.
? Pimpla variegeta Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinseet. III. 1852 p. 103 n. 38.
Pimpla ruficollis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 57 & 264 n. 13, ♀.
Pimpla ruficollis Desvignes, Entom. M. Magaz. IV. 1868 p. 174.
? Pimpla variegata Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 14, ♀; T. 9 F. 10.
Pimpla (Eremochila) ruficollis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 494 n. 27, ♀.
Pimpla ruficollis Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 482, ♀.
Aphanoroptra ruficornis Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 736 n. 1 [err. typogr.].
Pimpla ruficollis Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894 p. 21, ♀.
Pimpla ruficollis Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 540, ♀.

rufipes Brullé — ♀ ♂ — Am. mer.
Pimpla rufipes Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 102 n. 28, ♀ ♂.

rufipes Rdw.! — ♀ — Eur.: Germania.
Pimpla rufipes Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 238 n. 10, ♀.

rufipleura Bridgm.[2]) — Eur.: Britannia.
Pimpla rufipleura Bignell, Proc. Entom. Soc. London 1889 p. 15.

rufonigra Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Pimpla rufoniger Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 35, ♀.

rufopectus Cress. — ♀ — Am.: Canada, Pennsylvania.
Pimpla rufopectus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 147 n. 17, ♀.
Pimpla rufopectus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 40 n. 13, ♀.
Pimpla rufopectus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 461 n. 13, ♀.

rufovariegata Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Pennsylvania.
Pimpla rufovariegata Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 148 n. 21, ♀.
Pimpla rufovariegata Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 42 n. 17, ♀ ♂.
Pimpla rufovariegata Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 463 n. 17, ♀ ♂.

sagrae Vollh. — ♀ ♂ — As.: India.
Pimpla Sagrae Vollenhoven, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 149 n. 9, ♀ ♂.

sanguinipes Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Pimpla sanguinipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 165, ♀.

saussurei Heer — Eur.: Helvetia.
Pimpla Saussurei Heer, Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich I. P. 1. 1856.

saxea Scudd. — Am.: Canada.
Pimpla saxea Scudder, Rep. Progr. Geol. Surv. Canada 1877 p. 268.
Pimpla saxea Scudder, Fossil Insects N.-Amer. II. 1890 p. 610; T. 3 F. 23.

---

[1]) *Lep.:* Tortrix nördlingeriana, T. multantiana (Ratzeburg), Grapholitha tripunctata, Retinia Buoliana, R. resinana (Bignell). — *Hymen.:* Cynips terricola, Andricus spec. (Giraud). — *Col.:* Gymnetron teter.

[2]) *Lep.:* Pygaera curtula (Bignell).

schmiedeknechtii Kriechb. — ♀ — Eur.: Corfu.
Pimpla Schmiedeknechti Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 339, ♀.
Pimpla Schmiedeknechti Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 542, ♀.
scriptifrons Cress.[1]) — ♀ ♂ — Am: Canada, Delaware.
Pimpla scriptifrons Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 148 n. 18, ♀.
Pimpla scriptifrons Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 139, ♀.
Pimpla scriptifrons Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 40 n. 14, ♀ ♂.
Pimpla scriptifrons Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 462 n. 14, ♀ ♂.
sedula Cam. — ♀ — Am.: Panama.
Pimpla sedula Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 265 n. 1, ♀; T. 11 F. 10.
semirufa Brullé — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Pimpla semirufa Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 103 n. 31, ♀ ♂.
semisanguinea Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Pimpla semisanguinea Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 400 n. 7, ♀.
semivaria Kriechb. — ♀ — Eur.: Mallorca.
Pimpla semivaria Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 247 n. 21, ♀.
senecta Scudd. — Am.: Canada.
Pimpla senecta Scudder, Rep. Progr. Geol. Surv. Canada. 1877 p. 268.
Pimpla senecta Scudder, Fossil Insects N.-Amer. II. 1890 p. 611; T. 3 F. 29-31.
sericata Kriechb. — ♀ — Afr.: Delagoa Bay.
Pimpla sericata Kriechbaumer, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1893/94. 1895 p. 135, ♀.
sexcincta Ashm. — ♂ — Am.: Colorado.
Pimpla sexcincta Ashmead, Bull. Colorado Biol. Assoc. I. 1890 p. 24, ♂.
sexpunctata Pérez — ♀ — Afr.: Ins. Canarienses.
Pimpla sexpunctata Pérez, Ann. soc. entom. France 1895 p. 200 n. 25, ♀.
similis Bridgm.[2]) — ♀ — Eur.: Britannia.
Pimpla similis Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1884 p. 433, ♀.
Pimpla similis Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 591, ♀.
simonis Marsh. — ♀ — Am.: Venezuela.
Pimpla Simonis Marshall, Ann. soc. entom. France LXI. 1892 p. 67 n. 58, ♀.
smithii D. T. — ♀ — As.: Key.
Pimpla braconoides Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 172 n. 2, ♀ [non Spinola].
Pimpla Smithii m.
sodalis Ruthe — ♀ ♂ — Eur.: Islandia.
Pimpla sodalis Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 371 n. 55, ♀ ♂.
sodomitica Ell. — As.: Palaestina.
Pimpla Sodomitica Elliot, Trans. Entom. Soc. London II. 1. 1837 p. 17; T. 3 F. 5.
sordidella Holmgr. — ♂ — Austr.: Tahiti.
Pimpla sordidella Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 406 n. 32, ♂.
sponsa Hal. — ♀ — Am.: Chile.
Pimpla sponsa Haliday, Trans. Linn. Soc. London XVII. 3. 1836 p. 318 n. 7, ♀.
spuria Grav. — ♀ ♂ — Eur. centr.
Pimpla spuria Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 179 n. 88, ♀.
Pimpla spuria Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 53, ♀.
Pimpla spuria Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 111, ♀.
Pimpla spuria Bridgman, Entomologist XVI. 1883 p. 251-253.
Pimpla spuria Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 477 n. 9, ♀ ♂ [p. p.].
Pimpla spuria Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 509, ♀ ♂.

---

1) *Arachn.:* Epeira riparia (Riley).
2) *Lep.:* Ephippiphora scutulana (Bridgman).

stenostigma Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pimpla stenostigma Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 755 n. 26.
Pimpla stenostigma Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 521 n. 52.
Pimpla (Epiurus) stenostigma Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1414 n. 7.
Pimpla stenostigma Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 576, ♀.
Pimpla stenostigma Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 124, ♂.
stramentaria Kriechb. — ♀ — Patria?
Pimpla stramentaria Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 483, ♀.
strigipleuris Thoms. 1) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Pimpla strigipleuris Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 747 n. 5, ♀ ♂.
Pimpla spuria Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 477 n. 9 [excl. synon.].
Pimpla strigipleuris Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 478 n. 10.
Pimpla strigipleuris Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1408 n. 6.
Pimpla strigipleuris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2125 n. 5.
Pimpla strigipleuris Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 509.
strobilellae (L.) Fabr.! 2) — ♀ — Eur.
—— Linné, Acta Ups. 1736 p. 125 n. 5.
—— Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 971.
Ichneumon strobilellae Linné, Syst. nat. Ed. 10a I. 1758 p. 564 n. 37.
Ichneumon strobilellae Linné, Fauna Suec. Ed. 2a 1761 p. 404 n. 1616.
Ichneumon strobilellae Linné, Syst. nat. Ed. 12a I. 2. 1767 p. 936 n. 41.
Ichneumon strobilellae Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 853 n. 41.
Ichneumon strobilellae Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 433 n. 77.
Ichneumon strobilellae Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 267 n. 93.
Ichneumon strobilellae Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 170 n. 106.
Ichneumon strobilellae Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2693 n. 41.
Ichneumon strobilellae Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 373.
Ichneumon strobilellae Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 190 n. 131.
Ichneumon strobilellae Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 169 n. 150.
Ichneumon strobilellae Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 161 n. 499.
Ichneumon strobilellae Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 61 n. 61.
Pimpla strobilellae Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 115 n. 13. [n. 8.
Ichneumon strobilellae Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 958
Ichneumon strobilellae C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- u. Baumhölzer I. 4. 1807 p. 140.
Ichneumon strobilellae Bechstein, Forstinsectol. 1818 p. 144 n. 291 & p. 493 n. 5.
Ophion strobinellae Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 297.
Ichneumon strobulator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 270.
Ichneumon strobilator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 335.
Ichneumon strobilellae Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 981 n. 140, ♀.
stultor Davis — ♂ — Am.: Canada.
Pimpla stultor Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 367, ♂.
suada Tosqu. — ♂ — Afr.: Scioa.
Pimpla suada Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 313 n. 16, ♂.
succini Gieb. — Eur. (Succinum).
Pimpla succini Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 181.
Pimpla succini Menge, Progr. Petrischule Danzig 1856 p. ?
sumichrastii Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Pimpla Sumichrasti Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 400 n. 8, ♀.

---

1) *Lep.:* Depressaria heracliana (Bridgman).
2) *Lep.:* Phycis abietella (Rondani).

taprobanae Cam. — ♀ — As.: Ceylon.
Pimpla Taprobanae Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 21, ♀.
taschenbergii D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Pimpla nigriceps Taschenberg, Ztschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 266 n. 24, ♀ [non Brullé].
Pimpla nigriceps Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 505 n. 37, ♀.
Pimpla nigriceps Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 573, ♀.
Pimpla Taschenbergii m.
tenuicornis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Colorado.
Pimpla tenuicornis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 267 n. 1, ♀.
Pimpla tenuicornis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 35 n. 2, ♀ ♂.
Pimpla tenuicornis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 457 n. 2, ♀ ♂.
terebrans Ratzbg.[1] — ♀ — Eur.: Germania.
Pimpla terebrans Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 114 n. 6.
? Pimpla punctulata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 90 n. 12.
Pimpla terebrans Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 89 n. 6, ♀.
Pimpla terebrans Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 96 n. 6.
? Pimpla punctulata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 96 n. 13.
Pimpla terebrans Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 267 n. 27, ♀.
Pimpla terebrans Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 513 n. 45, ♀.
Pimpla terebrans Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 575.
texana Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Pimpla Texana Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 145 n. 4, ♀.
tosquinetii D. T. — ♂ — Afr.: Cap.
Pimpla atriceps Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 312 n. 15, ♂ [nec Cresson].
Pimpla Tosquinetii m.
transgressa Holmgr. — ♀ — Am.: California.
Pimpla transgressa Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 405 n. 31, ♀.
triangularis Verh. — ♀ — Eur.: Germania.
Pimpla triangularis Verhoeff, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 331 n. 11, ♀.
Pimpla triangularis Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 619, ♀.
tricincta Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Pimpla tricincta Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 37, ♀.
tricolor Spin. — ♂ — Am. mer.
Pimpla tricolor Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 141 n. 6, ♂.
trilineata Brullé — Austr.
Pimpla trilineata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 90 n. 6.
tuberata Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Pimpla tuberata Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 315 n. 17, ♀.
turionellae (L.) Grav.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Degeer, Mém. hist. Insect. I. 1752 p. ?; T. 22 F. 28.
Ichneumon turionellae Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 564 n. 36, ♀.
Ichneumon turionellae Brünnich, Prodr. insectol. Siælland. 1761 p. 18, ♀.
Ichneumon turionellae Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 404 n. 1615.
Ichneumon turionellae Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 935 n. 40.

---

1) *Col.:* Pissodes abietis, P. hercyniae, Pogonochoerus spec. (Ratzeburg). — *Lep.:* Coccyx resinana (Ratzeburg, Rondani).

2) *Lep.:* Lasiocampa pini, Aspidia cynobana, Coccyx Buoliana, Coleophora lariciella (Ratzeburg), Epichnopteryx bombycella (Mocsáry), Rhodophae consociella, Xylopoda fabriciana (Bignell).

stenostigma Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pimpla stenostigma Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 755 n. 26.
Pimpla stenostigma Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 521 n. 52.
Pimpla (Epiurus) stenostigma Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1414 n. 7.
Pimpla stenostigma Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 576, ♀.
Pimpla stenostigma Szépligeti, Rovart. Lapok V. 1898 p. 124, ♂.
stramentaria Kriechb. — ♀ — Patria?
Pimpla stramentaria Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 483, ♀.
strigipleuris Thoms.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Pimpla strigipleuris Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 747 n. 5, ♀ ♂.
Pimpla spuria Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 477 n. 9 [excl. synon.].
Pimpla strigipleuris Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 478 n. 10.
Pimpla strigipleuris Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1408 n. 6.
Pimpla strigipleuris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2125 n. 5.
Pimpla strigipleuris Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 509.
strobilellae (L.) Fabr.![2]) — ♀ — Eur.
—— Linné, Acta Ups. 1736 p. 125 n. 5.
—— Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 971.
Ichneumon strobilellae Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 564 n. 37.
Ichneumon strobilellae Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 404 n. 1616.
Ichneumon strobilellae Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 936 n. 41.
Ichneumon strobilellae Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 853 n. 41.
Ichneumon strobilellae Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 433 n. 77.
Ichneumon strobilellae Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 267 n. 93.
Ichneumon strobilellae Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 170 n. 106.
Ichneumon strobilellae Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2693 n. 41.
Ichneumon strobilellae Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 373.
Ichneumon strobilellae Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 190 n. 131.
Ichneumon strobilellae Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 169 n. 150.
Ichneumon strobilellae Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 161 n. 499.
Ichneumon strobilellae Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 61 n. 61.
Pimpla strobilellae Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 115 n. 13. [n. 8.
Ichneumon strobilellae Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 958
Ichneumon strobilellae C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- u. Baumhölzer I. 4. 1807 p. 140.
Ichneumon strobilellae Bechstein, Forstinsectol. 1818 p. 144 n. 291 & p. 493 n. 5.
Ophion strobinellae Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 297.
Ichneumon strobulator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 270.
Ichneumon strobilator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 335.
Ichneumon strobilellae Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 981 n. 140, ♀.
stultor Davis — ♂ — Am.: Canada.
Pimpla stultor Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 367, ♂.
suada Tosqu. — ♂ — Afr.: Scioa.
Pimpla suada Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 313 n. 16, ♂.
succini Gieb. — Eur. (Succinum).
Pimpla succini Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1. 1856 p. 181.
Pimpla succini Menge, Progr. Petrischule Danzig 1856 p. ?
sumichrastii Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Pimpla Sumichrasti Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 400 n. 8, ♀.

---

1) *Lep.:* Depressaria heracliana (Bridgman).
2) *Lep.:* Phycis abietella (Rondani).

taprobanae Cam. — ♀ — As.: Ceylon.
Pimpla Taprobanae Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 21, ♀.
taschenbergii D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Pimpla nigriceps Taschenberg, Ztschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 266 n. 24, ♀ [non Brullé].
Pimpla nigriceps Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 505 n. 37, ♀.
Pimpla nigriceps Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 573, ♀.
Pimpla Taschenbergii m.
tenuicornis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Colorado.
Pimpla tenuicornis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 267 n. 1, ♀.
Pimpla tenuicornis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 35 n. 2, ♀ ♂.
Pimpla tenuicornis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 457 n. 2, ♀ ♂.
terebrans Ratzbg.[1]) — ♀ — Eur.: Germania.
Pimpla terebrans Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 114 n. 6.
? Pimpla punctulata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 90 n. 12.
Pimpla terebrans Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 89 n. 6, ♀.
Pimpla terebrans Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 96 n. 6.
? Pimpla punctulata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 96 n. 13.
Pimpla terebrans Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 267 n. 27, ♀.
Pimpla terebrans Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 513 n. 45, ♀.
Pimpla terebrans Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 575.
texana Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Pimpla Texana Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 145 n. 4, ♀.
tosquinetii D. T. — ♂ — Afr.: Cap.
Pimpla atriceps Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 312 n. 15, ♂ [nec Cresson].
Pimpla Tosquinetii m.
transgressa Holmgr. — ♀ — Am.: California.
Pimpla transgressa Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 405 n. 31, ♀.
triangularis Verh. — ♀ — Eur.: Germania.
Pimpla triangularis Verhoeff, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 331 n. 11, ♀.
Pimpla triangularis Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 619, ♀.
tricincta Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Pimpla tricincta Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 37, ♀.
tricolor Spin. — ♂ — Am. mer.
Pimpla tricolor Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 141 n. 6, ♂.
trilineata Brullé — Austr.
Pimpla trilineata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 90 n. 6.
tuberata Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Pimpla tuberata Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 315 n. 17, ♀.
turionellae (L.) Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Degeer, Mém. hist. Insect. I. 1752 p. ?; T. 22 F. 28.
Ichneumon turionellae Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 564 n. 36, ♀.
Ichneumon turionellae Brünnich, Prodr. insectol. Siellandl. 1761 p. 18, ♀.
Ichneumon turionellae Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 404 n. 1615.
Ichneumon turionellae Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 935 n. 40.

---

1) *Col.:* Pissodes abietis, P. hercyniae, Pogonochoerus spec. (Ratzeburg). — *Lep.:* Coccyx resinana (Ratzeburg, Rondani).

2) *Lep.:* Lasiocampa pini, Aspidia cynobana, Coccyx Buoliana, Coleophora lariciella (Ratzeburg), Epichnopteryx bombycella (Mocsáry), Rhodophae consociella, Xylopoda fabriciana (Bignell).

Ichneumon turionellae Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 338 n. 60.
Ichneumon turionellae Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 853 n. 40.
Ichneumon turionellae O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 156 n. 1814.
Ichneumon contemplator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 158 n. 1838.
—— Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. I. 4. 1778 p. 38; T. 22 F. 28.
Ichneumon turionellae Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 432 n. 76.
Ichneumon fuscicornis Schrank, Neu. Magas. Liebh. Entom. II. 1785 p. 327 n. 92 [non 91].
Ichneumon turionellae Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 267 n. 92.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 63 n. 246 & p. 66 n. 279.
Ichneumon turionellae Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 169 n. 105.
Ichneumon turionellae Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2693 n. 40.
Ichneumon fuscicornis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2701 n. 295.
Ichneumon leucogonos Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2705 n. 331.
Ichneumon turionellae Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 372.
Ichneumon turionellae Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 119 n. 261.
Ichneumon turionellae Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 189 n. 130.
Ichneumon turionellae Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 169 n. 148.
Ichneumon turionellae Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 161 n. 498.
Ichneumon turionellae Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 61 n. 60.
Cryptus turionellae Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 87 n. 72. [n. 7.
Ichneumon turionellae Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 958
Ichneumon turionellae C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- u. Baumhölzer I. 4. 1807 p. 132.
Ichneumon turionellae Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀ ♂.
Cryptus insignatorius Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. Syst. 1807 p. 264 n. 3766.
Ichneumon turionellae Bechstein, Forstinsectol. 1818 p. 143 n. 290 & p. 492 n. 4.
Pimpla turionellae Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 291.
Ichneumon turionator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 275.
Ichneumon turionator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 348.
Pimpla turionellae Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 129 n. 5.
Pimpla turionellae Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 192 n. 93, ♀ ♂.
Cryptus turionellae Trentepol, Isis 1829 p. 836 n. 16, ♀.
Ichneumon fuscicornis Schrank, Gistl: Faunus N. F. I. 1837 p. 14.
Pimpla turionellae Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 376 n. 14, ♀.
Pimpla turionellae Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 319 n. 10.
Pimpla turionellae Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 113 n. 3, ♀.
Pimpla spuria Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 88 n. 10, ♀.
Pimpla turionellae Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 21 n. 7, ♀ ♂.
Pimpla turionellae Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 53 & p. 262 n. 5, ♀ ♂.
Pimpla turionellae Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 182, ♀ ♂ var.
Pimpla turionellae Radoszkowski, Horae Soc. entom. Ross. VII. Bull. 1869 p. XXI.
Pimpla turionellae Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 13; T. 9 F. 7.
Pimpla turionellae Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 747 n. 5, ♀ ♂. [p. 111, ♀ ♂.
Pimpla (Apechthis) turionellae Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880
Pimpla turionellae A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. 7. 1886 p. 22.
Pimpla turionellae A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. 7. 1888 p. 22.
Pimpla turionellae Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 475 n. 7, ♀ ♂.
Pimpla turionellae Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1408 n. 5.
Pimpla turionellae A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 117.
Pimpla turionellae Verhoeff, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 272, ♀.
Pimpla turionellae Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 509, ♀ ♂.
Pimpla turionellae Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 285.

variabilis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pimpla variabilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 88 n. 11, ♀ ♂.
Pimpla variabilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl III. 2. 1860 P. 10. p. 25 n. 17, ♀ ♂.
Pimpla variabilis Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 751 n. 16, ♀ ♂.
Pimpla (Tromatobia) variabilis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 501 n. 33, ♀ ♂.
Pimpla (Tromatobia) variabilis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1412 n. 2.
Pimpla variabilis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2126 n. 16.
Pimpla variabilis Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 572, ♀ ♂.
varíicauda Capr. — ♀ — Eur.: Britannia.
Pimpla varicauda Capron, Entom. M. Magaz. XXIV. 1888 p. 217, ♀.
variegata Ratzbg.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla variegata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 118 n. 21, ♀.
Pimpla variegata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 95 n. 30.
Pimpla variegata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 103 n. 38.
Pimpla variegata Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 14, ♀; T. 9 F. 10.
Pimpla variegata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 537 n. 6, ♀ ♂.
ventricosa Tschek — ♀ — Eur.: Austria inf.
Pimpla ventricosa Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 40, ♀.
Pimpla ventricosa Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 517 n. 48, ♀.
Pimpla ventricosa Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 591, ♀.
vesicaria Ratzbg.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pimpla vesicaria Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 115 n. 10.
Pimpla vesicaria Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 90 n. 13, ♀ ♂.
Pimpla vesicaria Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 96 n. 14.
Pimpla vesicaria Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 184, ♀ ♂.
Pimpla vesicaria Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 756 n. 30, ♀ ♂.
Pimpla vesicaria Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 114, ♀ ♂.
Pimpla vesicaria Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 519 n. 50, ♀ ♂.
Pimpla (Epiurus) vesicariae Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1414 n. 11.
Pimpla vesicaria Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 618, ♀ ♂.
vidua Walsh — ♀ — Am.: Illinois.
Pimpla vidua Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 140, ♀.
viduata Grav.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla viduata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 214 n. 101, ♂.
Pimpla viduata Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 55, ♂ & 264 n. 10, ♀ ♂.
Pimpla viduata Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 181, ♀ ♂.
Pimpla viduata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 111, ♀ ♂.
Pimpla viduata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 484 n. 17, ♀ ♂.
Pimpla viduata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 46, ♀.
Pimpla viduata Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 526, ♀ ♂.
vincta Vollenh. — ♀ — Eur.: Batavia.
Pimpla vincta Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XVI. 1873 p. 213 n. 5, ♀.
vipioides Brullé — ♀ ♂ — Afr.: Senegal, Cap.
Pimpla vipioides Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 96 n. 17, ♀.
Pimpla vipioides Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 404 n. 28, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Coccyx buoliana, C. resinana, Halias quercana (Ratzeburg).

[2]) *Hymen.:* Nematus Vallisnierii, N. viminalis, N. vesicator, Cryptocampus medullarius, C. venustus, — *Lep.:* Tortrix Bergmanniana, Tischeria complanella (Brischke).

[3]) *Lep.:* Psyche viciella, Sesia spheciformis, Tortrix spec. (Brischke), Orgyia ericae var. intermedia, Psyche Ecksteini (Mocsáry).

viridipennis Smith — ♂ — As.: Celebes.
Pimpla viridipennis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 64 n. 5, ♂.
vitellina Tosqu. — ♂ — Afr.: Cap.
Pimpla vitellina Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 325 n. 22, ♂.
walshii D. T. — ♀ — Am.: Illinois.
Pimpla pictipes Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 135, ♀ [nec Gravenhorst].
Pimpla Walshii m.
xanthostigma Cam. — ♀ — Am.: Panama. [F. 9.
Pimpla xanthostigma Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 269 n. 20, ♀; T. 11
yukonensis Ashm. — ♀ — Am.: Alaska.
Pimpla Yukonensis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 445, ♀.
zapoteca Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Pimpla zapoteca Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 402 n. 12, ♀ ♂.
zonata Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Pimpla zonata Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 401 n. 11, ♀.

CAENOPIMPLA

Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIV. P. 5. 1900 No. 15. p. 99.
κοινός, cavus; Pimpla, nom. propr. Hymen.

ruficollis Cam. — ♂ — As.: India or.
Coenopimpla ruficollis Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIV. P. 5. 1900 No. 15. p. 99, ♂.

ODONTOPIMPLA

Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 272.
ὀδούς, dens; Pimpla, nom. propr. Hymen.

Synon.: Pimpla Cresson, Smith.

pulcherrima (Cress.) Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Pimpla ? pulcherrima Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 404 n. 15, ♀.
Pimpla laevigata Smith, Descr. New Spec. Hymen. 1879 p. 229 n. 1, ♀. [T. 11 F. 11.
Odontopimpla pulcherrima Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 272 n. 1, ♀;

SYENE

Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXI. 1878 Versl. p. LXXVI.
Συήνη, nom. propr. urbis.

Species exstat.

HABROPIMPLA

Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIV. P. 5. 1900 No. 15. p. 96.
ἁβρός, splendidus; Pimpla, nom. propr. Hymen.

bilineata Cam. — ♂ — As.: India or.
Habropimpla bilineata Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIV. P. 5. 1900 No. 15. p. 97, ♂.

CHRYSOPIMPLA

Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 185.
χρυσός, aureus; Pimpla, nom. propr. Hymen.

ornatipes Cam. — ♀ ♂ — As.: India.
Chrysopimpla ornatipes Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 186, ♀ ♂.

persimilis Camer. — ♀ — As.: India.
Chrysopimpla persimilis Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 188, ♀.

ECHTHROMORPHA

Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 406.
Echthrus, nom. propr. Hymen.; μορφή, forma.

Synon.: Polyhamma Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 304 [Poly-πολύς, multus; ἅμμα, nexus. [amma].
Rhynchopimpla Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 50. ῥυγχός, rostrum; Pimpla, nom. propr. Hymen.
Cryptus Fabricius, Trentepol.
Ichneumon Thunberg, Smith, Hutton.
Pimpla Guillon, Erichson, Brullé, Smith, Vollenhoven.

atrata Holmgr. — ♀ — Afr.: St. Helena.
Echthromorpha maculipennis Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868; T. 8 F. 3.
Echthromorpha atrata Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 406 n. 34, ♀; T. 8 F. 3.
continua (Brullé) Krieg. — ♀ ♂ — As.: Java, Sumatra; Afr. or.
Pimpla continua Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 92 n. 10.
Pimpla continua Vollenhoven, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 149 n. 7.
Polyamma continua Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 304 n. 13, ♀♂.
Echthromorpha continua Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 57 n. 2, ♀♂.
flavoorbitalis Cam. — Austr.: Ins. Hawaienses. [n. 65.
Echthromorpha flavoorbitalis Cameron, Mem. Manchester Lit. & Philos. Soc. (3) X. 1886 p. 239
formosa (Smith) Krieg. — ♀ — As.: Batchian.
Pimpla formosa Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 139 n. 1, ♀.
Echthromorpha? formosa Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 53.
insidiator (Smith) Krieg. — ♀ ♂ — As.: Archipel. malaicus.
Ichneumon insidiator Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 476, ♂.
Pimpla insidiator Vollenhoven, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 149 n. 8.
Ichneumon insidiator Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 119, ♂.
Echthromorpha insidiator Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 51 n. 1, ♀♂;
interrupta (Brullé) Krieg. — ♀ — Afr. or. & Austr. [Tab. Fig. 2, 6 & 7.
Pimpla interrupta Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 91 n. 8, ♀.
Rhynchopimpla interrupta Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 50 n. 12, ♀.
Echthromorpha interrupta Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 53.
intricatoria (Fabr.) Krieg. — ♀ ♂ — Am.: New Cambria, New Zealand.
Cryptus intricatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 77 n. 25.
Ichneumon intricatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Ichneumon intricatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 356.
Cryptus intricatorius Trentepol, Isis 1829 p. 847 n. 24, ♀.
Pimpla excavata Guillon, Ann. soc. entom. France X. 1841 p. 302 n. 2, ♀.
Pimpla excavata Guillon, Rev. zool. 1841 p. 322, ♀.
Pimpla intricator Erichson, Arch. f. Naturg. VIII. P. 1. 1841 p. 254.
Pimpla intricatoria Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 90 n. 7, ♀ ♂.
Echthromorpha intricatoria Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 59 n. 3, ♀♂.
macula (Brullé) Krieg. — ♀ — Afr.: Bourbon.
Pimpla macula Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 89 n. 4, ♀.
Pimpla macula Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 308 n. 13, ♀.
Echthromorpha macula Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 53.

maculipennis Holmgr. — ♀ ♂ — Austr.: Honolulu.
Echthromorpha maculipennis Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 406 n. 33, ♀ ♂.
mixta Holmgr. — ♂ — Austr.: Ascension.
Echthromorpha mixta Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 407 n. 35, ♂.
plagiata (Smith) Krieg. — ♀ — As.: Aru.
Pimpla plagiata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 173 n. 5, ♀.
Echthromopha plagiata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 53.
punctum (Brullé) Krieg. — ♂ — As.: Manilla.
Pimpla punctum Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 87 n. 1, ♂.
Echthromorpha punctum Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 53.
variegata (Brullé) Krieg. — ♀ — Afr.: Nubia.
Pimpla variegata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 91 n. 9, ♀.
Echthromorpha variegata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 53.
vittata (Brullé) Krieg. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Pimpla vittata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 89 n. 5, ♀ ♂.
Echthromorpha vittata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 53.
walkeri Cam. — Austr.: Tahiti. [p. 265.
Echthromorpha Walkeri Cameron, Proc. & Trans. Nat. Hist. Soc. Glasgow (2) I. P. 3. 1885/86

TROMERA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 164 n. 14.
τρομερός, tremulus.
Vide genus Pimpla.

GLYPTOGASTRA

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 57.
γλυπτός, sculptus; γαστήρ, venter.

hawaiiensis Ashm. — Austr.: Ins. Hawaienses.
Glyptogastra Hawaiiensis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 57 [s. descr.].

TROMATOBIA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 164 n. 13.
τρῶμα, vulnus; βιόω, vivo.
Vide genus Pimpla.

ERYTHROPIMPLA

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 57.
ἐρυθρός, rubicundus; Pimpla, nom. propr. Hymen.

abbottii Ashm. — Patria?
Erythropimpla Abbottii Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 57 [s. descr.].

XANTHOPIMPLA

Saussure, Grandidier: Hist. Madagascar 1892; T. 13 [s. descr.].
ξανθός, flavus; Pimpla, nom. propr. Hymen.

Synon.: Ichneumon Linné & auct ant.
Pimpla Fabricius, Brullé, Smith, Vollenhoven, Tosquinet.

apicalis (Smith) Krieg. — ♂ — As.: Ceram.
Pimpla apicalis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 9 n. 3, ♂.
Xanthopimpla apicalis Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 65.

arealis Krieg. — ♀ — Austr.: New South Wales.
Xanthopimpla arealis Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 93 n. 18, ♀.
australis Krieg. — ♀ — Austr.
Xanthopimpla australis Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 102 n. 25, ♀.
brullei Krieg. — ♂ — As.: Amboina, Java.
Xanthopimpla Brullei Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 88 n. 15, ♂.
caudata (Smith) Krieg. — ♀ — As.: Mysol.
Pimpla caudata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 10 n. 8, ♀.
Xanthopimpla caudata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 65.
citrina (Holmgr.) Krieg. — ♀ ♂ — Afr.: Mauritius.
Pimpla citrina Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 404 n. 29, ♀ ♂.
Xanthopimpla ? citrina Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 65.
concolor Krieg. — ♀ ♂ — Austr.: New Guinea.
Xanthopimpla concolor Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 99 n. 23, ♀ ♂.
var. **obscura** Krieg. — ♀ — As.: Ins. Kei. [p. 100, ♀.
Xanthopimpla concolor var. obscura Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899
crassa Krieg. — ♀ ♂ — Austr.: New Guinea.
Xanthopimpla crassa Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 97 n. 21, ♀ ♂.
crassipes (Brullé) Krieg. — ♀ — Austr.: New Guinea.
Pimpla crassipes Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 95 p. 15, ♀.
Theronia crassipes Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 305.
Xanthopimpla crassipes Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 65.
ecaudata Krieg. — ♀ ♂ — As.: Ins. Kei.
Xanthopimpla ecaudata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 71 n. 3, ♀ ♂.
fasciata Krieg. — ♀ ♂ — As.: Assam.
Xanthopimpla fasciata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 92 n. 17, ♀ ♂.
fusconotata (Tosqu.) Krieg. — ♀ ♂ — Afr.: Delagoa Bay.
Pimpla fusconotata Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 321 n. 20, ♀ ♂.
Xanthopimpla fusconotata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 65.
gabunensis Krieg. — ♀ — Afr.: Gabun.
Xanthopimpla Gabunensis Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 80 n. 9, ♀.
gracilis Krieg. — ♂ — Austr.: New Guinea.
Xanthopimpla gracilis Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 74 n. 5, ♂.
hispida Krieg. — ♀ — As.: Perak.
Xanthopimpla hispida Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 70 n. 2, ♀.
japonica Krieg. — ♀ — As.: Japonia.
Xanthopimpla Japonica Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 81 n. 10, ♀.
infirma (Smith) Krieg. — ♀ — As.: Celebes.
Pimpla infirma Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 63 n. 1, ♀.
Xanthopimpla infirma Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 65.
inimica (Smith) Krieg. — ♀ — As.: Mysol.
Pimpla inimica Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 10 n. 7, ♀.
Xanthopimpla inimica Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 65.
integrata (Smith) Krieg. — ♀ — As.: Batchian.
Pimpla integrata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 140 n. 3, ♀.
Xanthopimpla integrata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 65.
konowii Krieg. — ♀ — As.: Japonia (?).
Xanthopimpla Konowi Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 87 n. 14, ♀.
luteola (Tosqu.) Krieg. — ♀ — Afr.: Delagoa Bay.
Pimpla luteola Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 326 n. 23, ♀.
Xanthopimpla luteola Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 65.

macholitzii Krieg. — ♀ ♂ — Austr.: New Guinea.
Xanthopimpla Micholitzi Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 98 n. 22, ♀ ♂.
maculosa (Tosqu.) Krieg. — ♀ — Afr.: Guinea, Senegal.
Pimpla maculosa Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 319 n. 19, ♀.
Xanthopimpla maculosa Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 65.
minor Krieg. — ♂ — Austr.: New Guinea.
Xanthopimpla minor Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 73 n. 4, ♂.
modesta (Smith) Krieg. — ♀ — As.: Celebes.
Pimpla modesta Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 64 n. 4, ♀.
Xanthopimpla modesta Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 65.
occidentalis Krieg. — ♀ — Afr.: Sierra Leone.
Xanthopimpla occidentalis Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 79 n. 8, ♀.
ochracea (Smith) Krieg. — ♀ — As.: Aru.
Pimpla ochracea Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 172 n. 1, ♀.
Xanthopimpla ochracea Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 65.
octonotata Krieg. — ♀ — Afr.: Gabun.
Xanthopimpla octonotata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 78 n. 7, ♀.
pardalis Krieg. — ♂ — As.: Assam.
Xanthopimpla pardalis Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 90 n. 16, ♂.
parva Krieg. — ♂ — As.: Ins. Kei.
Xanthopimpla parva Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 96 n. 20, ♂.
penetrans (Smith) Krieg. — ♀ ♂ — As.: Aru.
Pimpla penetrans Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 173 n. 3, ♀ ♂.
Xanthopimpla penetrans Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 65.
punctator (L.) Krieg.[1] — ♀ ♂ — As.: Ins. Malay.
Ichneumon punctator Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 935 n. 38.
Ichneumon pedator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 828 n. 44-45.
Ichneumon punctator Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 852 n. 38.
Ichneumon pedator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 429 n. 52.
Ichneumon punctator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 437 n. 104.
Ichneumon pedator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 264 n. 62.
Ichneumon punctatus Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 269 n. 122.
Ichneumon punctator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2693 n. 38.
Ichneumon pedator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2698 n. 131.
Ichneumon punctatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2710 n. 184.
Ichneumon pedator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 364.
Ichneumon punctator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 372.
Ichneumon pedator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 183 n. 96.
Ichneumon punctatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 198 n. 168.
Ichneumon pedator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 157 n. 100.
Ichneumon punctatus Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 181 n. 200.
Pimpla pedator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 114 n. 6.
Pimpla punctator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 119 n. 32.
Ichneumon pedator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 137 n. 3.
Ichneumon multipunctor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon punctator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon multipunctor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 313.
Ichneumon punctator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 313.
Ichneumon pedator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª IV. 1835 p. 349 n. 3.

---

[1]) *Lep.:* Papilio Pammon (Vollenhoven), Cricula trifenestrata (Cotes).

Pimpla punctata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 94 n. 13, ♀ ♂.
Pimpla pedator Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 94 n. 14, ♀ ♂.
Pimpla punctator Vollenhoven, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 143 n. 2.
Pimpla punctata Vollenhoven, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 146.
Pimpla punctator Cameron, Mém. & Proc. Manchester Soc. (4) IV. 1891 p. 186 n. 1.
Xanthopimpla punctata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 101 n. 24.

ruficornis Krieg. — ♂ — As.: Ins. Kei.
Xanthopimpla ruficornis Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 103 n. 27, ♂.

scabra Krieg. — ♂ — As.: Celebes.
Xanthopimpla scabra Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 84 n. 12, ♂.

scutata Krieg. — ♀ — As.: Kaulun Ins.
Xanthopimpla scutata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 85 n. 13, ♀.

similis Krieg. — ♀ — Austr.: Queensland.
Xanthopimpla similis Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 103 n. 26, ♀.

soleata Krieg. — ♀ — As.: Assam. [F. 3, 8, 9, 14.
Xanthopimpla soleata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 82 n. 11, ♀; Tab.

splendens Krieg. — ♀ — Austr.: New Guinea.
Xanthopimpla splendens Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 69 n. 1, ♀.

thoracalis Krieg. — ♀ — As.: Ins. Kei.
Xanthopimpla thoracalis Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 95 n. 19, ♀.

tigris Krieg. — ♀ ♂ — As.: Assam.
Xanthopimpla tigris Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 75 n. 6, ♀ ♂.

transversalis (Voll.) Krieg. — ♀ ♂ — As.: Tibet, Sumatra, Borneo, Timor.
Pimpla transversalis Vollenhoven, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 146 n. 3, ♀ ♂.
Xanthopimpla transversalis Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 65.

trifasciata (Smith) Krieg. — ♀ — Austr.: New Guinea.
Pimpla trifasciata Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 64 n. 8, ♀.
Xanthopimpla trifasciata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 65.

trimaculata (Smith) Krieg. — ♀ — As.: Celebes.
Pimpla trimaculata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 24 n. 2, ♀.
Xanthopimpla trimaculata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 65.

trisignata Krieg. — ♀ — As.: Sumbawa Ins.
Xanthopimpla trisignata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 105 n. 28, ♀.

unicolor (Smith) Krieg. — ♀ — As.: Celebes.
Pimpla unicolor Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 63 n. 2, ♀.
Xanthopimpla unicolor Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 65.

DELOMERISTA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 164 n. 12.
δῆλος, manifestus; μεριστής, divisor.
Vide genus Pimpla.

TELEUTAEA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 164 n. 11.
τελευταῖος, finalis.

Synon.: Teleutea Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1329.
Glypta Holmgren, Taschenberg, Brischke, Thomson.
Lissonota Gravenhorst.

striata (Grav.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Lissonota striata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 70 n. 38, ♀.

Glypta striata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 36 n. 1, ♀.
Glypta striata Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 277 n. 14, ♀.
Glypta striata Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 186, ♀.
Glypta striata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 115, ♀.
Teleutaea striata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 431.
Glypta (Teleutea) striata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1324 & 1329 n. 1, ♀.

HOPLITOPHRYS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 164 n. 10.
ὁπλίτης, armatus; ὀφρύς, supercilium.

Synon.: Glypta Holmgren, Thomson.
Teleutea Thomson.

brischkei (Holmgr.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Glypta Brischkei Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 37 n. 2, ♀ ♂.
Hoplitophrys Brischkei Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 431.
Glypta (Teleutea) Brischkei Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1324 & 1329 n. 2.
Glypta Brischkei Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2128.

DYSPETES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 201 n. 10.
δυςπετέω, indignor.

Synon.: Dyspetus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 895.
Bassus Fabricius.
Ichneumon Linné & auct. ant.
Mesoleius Vollenhoven.
Tryphon Gravenhorst, Stephens, Blanchard.

praerogator (L.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon praerogator Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 565 n. 40.
Ichneumon praerogator Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 405 n. 1619.
Ichneumon praerogator Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 936 n. 44.
Ichneumon praerogator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 338 n. 63.
Ichneumon praerogator Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 854 n. 44.
Ichneumon praerogator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 156 n. 1817.
Ichneumon praerogator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 433 n. 82.
Ichneumon praerogator Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 366 n. 739, ♀.
Ichneumon praerogator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 267 n. 98.
Ichneumon praerogator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 171 n. 109.
Ichneumon praerogator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2694 n. 44.
Ichneumon praerogator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 44 n. 768, ♂.
Ichneumon praerogator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 373.
Ichneumon praerogator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 191 n. 136.
Ichneumon praerogator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 171 n. 158.
Ichneumon praerogator Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 162 n. 501.
Ichneumon praerogator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 61 n. 63.
Ichneumon praerogator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 99 n. 23.
Ichneumon praerogator Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 [p. 959 n. 11.
Ichneumon praerogator C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- u. Baumhölzer I. 2-3. 1805 p. 106.
Ichneumon praerogator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 67 n. 768.
Ichneumon praerogator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀.

Ichneumon praerogator Bechstein, Forstinsectol. 1818 p. 144 n. 293 & p. 493 n. 7.
Ichneumon praerogator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 285.
Ichneumon mandibulator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273.
Ichneumon praerogator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 275.
Ichneumon mandibulator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 343.
Ichneumon praerogator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 349.
Tryphon praerogator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 687, ♂.
Tryphon praerogator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 127 n. 73, ♀ ♂.
Tryphon praerogator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 232 n. 2.
Tryphon praerogator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 308 n. 6.
Mesoleius praerogator Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XX. 1877 p. 64.
Dyspetus praerogator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 899 n. 1, ♀ ♂.
Dyspetes praerogator Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XXXIV. 1890 p. 93.

ODINOPHORA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 163 n. 9.
ὠδίς, dolor parturientis; φέρω, fero.
Species exstat.

NEOPIMPLA

Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 56.
νέος, novus; Pimpla, nom. propr. Hymen.

abbottii Ashm. — Patria?
Neopimpla Abbottii Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 56 [s. descr.].

HEMIPIMPLA

Saussure, Distant: Natural. Transvaal 1892 p. 227; T. 13 F. 4.
ἥμι, semi; Pimpla, nom. propr. Hymen.

caffra Sauss. — Afr.: Transvaal.
Hemipimpla caffra Saussure, Distant: Natural. Transvaal 1892 p. 227.
calliptera Sauss. — Afr.: Transvaal.
Hemipimpla calliptera Saussure, Distant: Natural. Transvaal 1892 p. 228.

SCHIZOPYGA

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 125 n. 4.
σχίζω, findo; πυγή, anus.

Synon.: Anomalon Jurine.
Bassus Panzer.
Ichneumon Panzer, Thunberg, Gravenhorst.
Pimpla Blanchard.

atra Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Schizopyga tricingulata var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 129 n. 69, ♂.
Schizopyga atra Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 87, ♀ ♂.
circulator (Panz.) Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ichneumon circulator Panzer, Faun. Insect. German. VII. P. 79 1801; T. 12.
Bassus circulator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 75.
Anomalon circulator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 116, ♀.
Ichneumon circulator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.

Ichneumon circulator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 297.
Schizopyga tricingulata var. (2) 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 129 n. 69, ♂.
Schizopyga analis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 130 n. 70, ♀.
Ichneumon circulator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1059 n. 282 [non 232].
Schizopyga analis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Suppl. 1846 p. 1, ♀; T. 39 F. 2.
Schizopyga analis Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIII. 1856 p. 70 n. 2, ♀.
Schizopyga analis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 46 n. 4, ♀.
Schizopyga circulator Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 373, ♀ ♂.

flavifrons Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Schizopyga flavifrons Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIII. 1856 p. 71 n. 4, ♀.
Schizopyga flavifrons Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 45 n. 3, ♀.
Schizopyga flavifrons Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 118, ♀ ♂.

frigida Cress. — ♀ — Am.: Hudsons Bay.
Schizopyga frigida Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 159, ♀.

minuta Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Schizopyga minuta Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 131 n. 71, ♀.

podagrica Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Schizopyga podagrica Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 127 n. 68, ♀ ♂.
Pimpla (Schizopyga) podagrica Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 318 n. 6.
Schizopyga podagrica Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 59.
Schizopyga podagrica Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIII. 1856 p. 70 n. 1, ♀ ♂.
Schizopyga podagrica Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 127 n. 13.
Schizopyga podagrica Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 45 n. 1, ♀ ♂.
Schizopyga podagrica Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 189, ♂.
Schizopyga podagrica Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 118, ♂.
Schizopyga podagrica Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 47, ♀.

tricingulata Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania, Gallia.
Schizopyga tricingulata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 129 n. 69, ♂ [excl. var. 2-3].
Schizopyga tricingulata Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835; T. 39 F. 2.
Schizopyga tricingulata Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 517 n. 30, ♂.
Schizopyga tricingulata Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 189, ♀ ♂.
Schizopyga tricingulata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 118, ♂.
Schizopyga tricingulata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 87 n. 5, ♂.

variipes Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Schizopyga varipes Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XIII. 1856 p. 71 n. 3, ♀ ♂.
Schizopyga varipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 45 n. 2, ♀ ♂.

STILBOPS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 163 n. 7.

στιλβός, splendidus; ὄψ, visus.

Synon.: Phytodietus Gravenhorst, Dalla Torre.
Pimpla Gravenhorst, Taschenberg.

limneriaeformis Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Hungaria.
Stilbops (Pimpla) limneriaeformis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 531 n. 57, ♀.
Stilbops limneriaeformis Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 621, ♀.
Stilbops limneriaeformis Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 11 & 30 n. 66, ♂.

vetula (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Phytodietus chrysostomus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 940 n. 323, ♀.
Pimpla vetula Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 201 n. 96, ♂.

Pimpla vetula Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 63, ♂ & 270 n. 33, ♀♂.
Stilbops vetula Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1428 n. 1, ♀ ♂.
Phytodietus chrysostomus Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. IX. 1890 p. 139, ♀ ♂.
Stilbops (Pimpla) vetula Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 530 n. 56, ♀ ♂.
Stilbops vetula Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 620, ♀ ♂.

ALLOTHERONIA

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 55.
ἄλλος, alius; Theronia, nom. propr. Hymen.

duodecimguttata Ashm. — Patria?
Allotheronia duodecimguttata Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 55 [s. descr.].

NEOTHERONIA

Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/1898. 1899 p. 119.
νεός, novus; Theronia, nom. propr. Hymen.

Synon.: Pimpla Cresson.
Theronia Cresson.

consimilis (Cress.) Krieg. — ♀ — Am.: Cuba.
Pimpla consimilis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1862 p. 37, ♀.
Theronia consimilis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 397 n. 5, ♀.
Neotheronia consimilis Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 120.
mellosa (Cress.) Krieg. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Theronia mellosa Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 396 n. 3, ♀ ♂.
Neotheronia mellosa Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 120.
montezuma (Cress.) Krieg. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Theronia Montezuma Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 395 n. 1, ♀ ♂.
Neotheronia Montezuma Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 120.
nigrolineata (Brullé) Krieg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Pimpla nigrolineata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymen. IV 1846 p. 104 n. 34, ♀.
Neotheronia nigrolineata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 120.
tacubaya (Cress.) Krieg. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Theronia Tacubaya Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 397 n. 4, ♀ ♂.
Neotheronia Tacubaya Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 120.
tolteca (Cress.) Krieg. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Theronia Tolteca Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 396 n. 2, ♀ ♂.
Neotheronia Tolteca Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 120.

THERONIA

Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 123 n. 6.
θήρ, fera.

Synon.: Cryptus Fabricius & auct.
Pimpla Fabricius & auct.

areolata Cam. — ♀ — As.: India.
Theronia areolata Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 152, ♀.
atalantae (Poda) Krieg.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon atalantae Poda, Insect. mus. Graec. 1761 p. 106 n. 8.

---

[1]) *Lep.:* Eurycreon verticalis (Brischke), Pionea forficalis, Gastropacha neustria, Abraxas grossulariata (Rondani), Ocneria dispar (Ratzeburg), Lasiocampa pini, Clisiocampa

Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 333 n. 28.
Ichneumon speculator Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 286 n. 753; T. 41 F. 753.
Ichneumon XXXIV Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 61 F. 10.
Ichneumon LXXXIII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 2. 1769; T. 198 F. 3.
Ichneumon acuminator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 157 n. 1821.
Ichneumon melanops Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 372 n. 752, ♂.
Ichneumon nigroculus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 372 n. 753, ♀.
Ichneumon quadripunctatus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 373 n. 754, ♂.
Ichneumon vinctus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 373 n. 755, ♂.
Ichneumon scutellatus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 402 n. 28.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 67 n. 269 & 301.
Ichneumon scutellatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 155 n. 59.
Ichneumon speculator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 185 n. 156.
Ichneumon melanops Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 201 n. 217.
Ichneumon nigroculus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 202 n. 218.
Ichneumon quadripunctatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 202 n. 219.
Ichneumon vinctus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 202 n. 220.
Ichneumon albiscutatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2708 n. 347.
Ichneumon incisus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2708 n. 352.
Ichneumon melanops Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2711 n. 189.
Ichneumon nigroculus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2711 n. 190.
Ichneumon quadripunctatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2711 n. 191
Ichneumon vinctus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2711 n. 192.
Ichneumon crassipes Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 52 n. 787; T. 2 F. 15.
Ichneumon superbus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 357; T. 37 F. 1.
Ichneumon vulpes Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 358; T. 38 F. 3.
Ichneumon speculator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 367.
Ichneumon speculator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 213 n. 36.
Ichneumon melanops Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 223 n. 100.
Ichneumon nigroculus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 223 n. 101.
Ichneumon quadripunctatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 223 n. 102.
Ichneumon varius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 197 n. 166.
Ichneumon crassipes Olivier, Encycl. méthod. VII. 1792 p. 198 n. 170.
Ichneumon crassipes Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 124 n. 272.
Ichneumon flavicans Fabricius, Entom. System II. 1793 p. 182 n. 202.
Ichneumon speculator Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 281 n. 2085.
Ichneumon melanops Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 284 n. 2091, ♀.
Ichneumon scutellatus Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 63 n. 70.
Ichneumon crassipes Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 63 n. 72.
Cryptus variatorius Fabricus, Syst. Piez. 1804 p. 78 n. 31.
Pimpla flavicans Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 119 n. 33.
Pimpla flavicans Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 965 [n. 20ᵇ.
Cryptus varius Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 264 n. 3767.
Ichneumon crassipes Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 76; T. 2 F. 15.
Ichneumon flavicans Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109.
Pimpla flavicans Panzer, Fauna Insect. German. X. 1812 P. 109 T. 14.
Pimpla flavicans Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. XX. 1818 p. 291.

---

neustria, Liparis chrysorrhoea, Tortrix viridana, Coccyx resinana (Rondani), Agrotis fimbria, Cymatophora octogesima (Mocsáry). — *Hymen.:* Limneria tricolor (Brischke).

Ichneumon colonator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon variatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 276.
Ichneumon colonator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 313.
Ichneumon variatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 350.
Pimpla flavicans Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 129 n. 7, ♀ ♂.
Pimpla flavicans Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 141 n. 74, ♀ ♂.
Pimpla flavicans Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 318 n. 8.
Pimpla flavicans Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 59.
Ichneumon (Pimpla) flavicans Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 27.
Pimpla flavicans Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 118 n. 22.
Pimpla flavicans Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 97 n. 34.
Pimpla flavicans Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 103 n. 43.
Theronia flavicans Holmgren, Öfvers Svensk. Vet.-Akad. Forhandl. XVI. 1859 p. 123 n. 6.
Theronia flavicans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 16 n. 1, ♂.
Pimpla flavicans Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 52, ♀ ♂.
Theronia flavicans Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 256, ♀ ♂.
Theronia flavicans Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 63, ♀ ♂.
Pimpla (Theronia) flavicans Brischke, Entom. Monatsbl. I. 1876 p. 159.
Theronia flavicans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 110.
Theronia flavicans Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 428.
Theronia atalantae Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 113 n. 2.

cephalotes Krieger — ♀ — As.: Celebes.
Theronia cephalotes Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 116 n. 5, ♀.

chiriquensis Cam. — Am.: Panama. [T. 11 F. 6.
Theronia Chiriquensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I p. 264 n. 4;

clathrata Krieger — ♀ — As.: Assam.
Theronia clathrata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 111 n. 1, ♀.

fumata Krieger — ♀ ♂ — Austr.: Nova Guinea.
Theronia fumata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 118 n. 6, ♀ ♂.

gracilis Cam. — ♀ — As.: India.
Theronia gracilis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 154, ♀.

lineata (Smith) Cam. — ♀ — Am.: Costa Rica.
Pimpla lineata Smith, Descr. New Spec. Hymen. 1879 p. 229 n. 4, ♀.
Theronia lineata Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 264 n. 2; T. 11 F. 4.

lurida Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Delagoa Bay.
Theronia lurida Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 282 n. 2, ♀ ♂.

melanocephala (Brullé) Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Pimpla melanocephala Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 99 n. 24, ♀.
Pimpla melanocephala Riley, 3th Ann. Rep. Insect. Missouri 1871 p. 129.
Pimpla melanocephala Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 131, ♀ ♂.
Theronia melanocephala Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 114, ♀.

melanocera Holmgr. — ♀ ♂ — Afr.: Cap.
Theronia melanocera Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 404 n. 27, ♂.
Theronia melanocera Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 282 n. 1, ♀.

nigrobalteata Cam. — ♀ — As.: India.
Theronia nigrobalteata Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 153, ♀.

octopunctata Kriechb. — ♀ — Afr.: Natal.
Theronia octopunctata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 304 n. 14, ♀.

trivittata Krieg. — ♂ — Afr.: Sierra Leone.
Theronia trivittata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 113 n. 3, ♂.

zebra (Vollenh.) Krieg.[1] — ♀ — As.: Java.
Pimpla zebra Vollenhoven: Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 147 n. 4, ♀.
Pimpla zebra Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. (4) IV. 1891 p. 166 n. 2.
Theronia zebra Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 114 n. 4, ♀.

LISSOPIMPLA

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 309.
λισσός, levis; Pimpla, nom. propr. Hymen.

Synon.: Xenopimpla Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 P. 1. p. 28.
ξενός, peregrinus; Pimpla, nom. propr. Hymen.
Rhyssa W. F. Kirby.

decemnotata Kriechb. — ♂ — Austr.
Lissopimpla decemnotata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 310 n. 2, ♂.
haemorrhoidalis Kriechb. — ♀ — Austr.
Lissopimpla haemorrhoidalis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 310 n. 3, ♀.
octoguttata Kriechb. — ♀ — Austr.
Lissopimpla octoguttatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 310 n. 1, ♀.
scutata Krieger — ♀ ♂ — Austr. [Tab. Fig. 4 & 5.
Lissopimpla scutata Krieger, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1897/98. 1899 p. 50, ♀ ♂;
semipunctata (Kby.) D. T. — ♀ ♂ — Austr.: New Zealand.
Rhyssa semipunctata W. F. Kirby, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 202.
Xenopimpla semipunctata Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 p. 26, ♀ ♂.
Lissopimpla semipunctata m.

IDIOGRAMMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 163 n. 6.
ἴδιος, proprius; γράμμα, lettera.

euryops Schmkn. — Eur.: Germania?
Idiogramma euryops (Förster) Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 429 [s. descr.].

ZONOPIMPLA

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 55.
ζώνη, balteus; Pimpla, nom. propr. Hymen.

albicincta Ashm. — Patria?
Zenopimpla albicincta Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 55 [s. descr.].

PSEUDEUGALTA

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 55.
ψευδής, falsus; Eugalta, nom. propr. Hymen.

Synon.: Eugalta Cameron.

spinosa (Cam.) Ashm. — ♀ — As.: India.
Eugalta spinosa Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 139, ♀.
Pseudeugalta spinosa Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 55.

---

[1]) *Lep.:* Cricula trifenestrata (Vollenhoven).

EUGALTA

Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 135.

Etymol. obscura.

albitarsis Cam. — ♀ — As.: India.
Eugalta albitarsis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 138, ♀.
nigricollis Cam. — ♀ — As.: India.
Eugalta nigricollis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 141, ♀.
punctulata Cam. — As.: India.
Eugalta punctulata Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 142.
strigosa Cam. — ♀ — As.: India.
Eugalta strigosa Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 136, ♀.

EPIMECIS

(Lepeletier) Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 112.

ἐπιμήκης, oblongus.

atriceps Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Epimecis atriceps Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 34, ♀.
bicolor Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Epimecis bicolor Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 113 n. 1, ♀.
Epimecis bicolor Marshall, Ann. soc. entom. France LXI. 1892 p. 65 n. 56; T. 3 F. 6.
fasciata Brullé — ♀ — Am. mer.
Epimecis fasciata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 114 n. 2, ♀.
Epimecis tibialis var.? fasciata Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 271.
Epimecis fasciata Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 490, ♀.
fascilpennis Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Epimecis fascipennis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 33, ♀.
ferruginosa Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Epimecis ferruginosa Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 33, ♀.
fuscipennis Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Epimecis fuscipennis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 34, ♂.
heteropus Kriechb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Epimecis heteropus Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 491, ♀.
mexicana Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Epimecis Mexicana Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 271 n. 3, ♀.
thoracicus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Epimecis? thoracicus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 395 n. 1, ♀.
tibialis Cam. — ♀ ♂ — Am.: Mexico, Guatemala, Panama. [T. 12 F. 1 (♀).
Epimecis tibialis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 270 n. 2 ♀ ♂;
wiltii Cress. — ♀ — Am.: Ohio.
Epimecis Wiltii Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 143, ♀.

OPISORHYSSA

Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 488.

ὀπίσω, retrorsum; ῥυσσός, rugosus.

flavopicta Kriechb. — ♀ — Am. bor.
Opisorhyssa flavopicta Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 488, ♀.

PERITHOUS

Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 123 n. 5.
Nom. propr.

Synon.: Cryptus Halliday.
Ephialtes Gravenhorst & auct.
Ichneumon Rossi, Panzer, Illiger, Jurine.
Pimpla Gravenhorst, Lepeletier, Dufour & Perris.
Plectiscus Haliday.

albicinctus (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ephialtes albicinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 259 n. 116, ♀.
Ephialtes albicinctus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 108 n. 4, ♀.
Perithous albicinctus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 123 n. 5, ♀.
Perithous albicinctus Holmgren, Svensk. Vet. Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 15 n. 1, ♀.
Ephialtes albicinctus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 255 n. 9, ♀.
Ephialtes albicinctus Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 63, ♀ ♂.

divinator (Rossi) Marsh.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon divinator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 48 n. 776.
Ichneumon histrio Panzer, Faun. Insect. German. VIII. 1805 P. 92; T. 7.
Pimpla histrio Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 83.
Ichneumon divinator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a. II. 1807 p. 71 n. 776.
Pimpla histrio Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 292.
Ephialtes divinator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 252 n. 113, ♀, ♂.
Pimpla ephippiatoria Dufour & Perris, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 47 n. 25, ♀ ♂.
Ephialtes divinator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 108 n. 3.
Ephialtes divinator Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 486 n. 35, ♀ ♂.
Perithous divinator Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 86 n. 3.
Ephialtes divinator Verhoeff, Zool. Jahrb. VI. 1892 Syst. p. 741.
Ephialtes divinator Verhoeff, Berlin. Entom. Zeitschr. XXXVII. 1893 p. 480.

mediator (Fabr.) Holmgr.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon LXV Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768; T. 126 F. 8.
Pimpla mediator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 117 n. 23, ♀.
Ichneumon scurra Panzer, Fauna Insect. German. VIII. 1805 P. 92; T. 6.
Pimpla mediator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 82.
Ichneumon mediator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♀.
Pimpla mediator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. XX. 1818 p. 292.
Pimpla scurra Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. XX. 1818 p. 292.
Ichneumon modulator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon modulator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 340.
Pimpla mediatoria Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 129 n. 3, ♀ ♂.
Ephialtes mediator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 256 n. 115, ♀ ♂.
Pimpla (Ephialtes) mediator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 374 n. 5, ♀ ♂.
Ephialtes mediator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 119 n. 3, ♀ ♂.
Ephialtes mediator Bouché, Stettin. entom. Zeitg. VIII. 1847 p. 164.

---

[1]) *Hymen.:* Elampus auratus (Verhoeff), Cemonus unicolor, Pemphredon lugubris (Giraud).

[2]) *Col.:* Aromia moschata (Bouché). — *Hymen.:* Trypoxylon figulus, Cemonus unicolor (Ratzeburg); Stignus pendulus, Psen atratus, Pterochilus laevipes, Xiphydria camelus (Verhoeff), Cynips argentea (Mocsáry).

Ephialtes mediator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 100 n. 6.
Perithous mediator Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 123 n 5.
Perithous mediator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 15 n. 2, ♀ ♂.
Ephialtes mediator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 256 n. 10, ♀ ♂.
Ephialtes mediator Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 487 n. 36, ♀.
Perithous mediator Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 744 n. 1.
Ephialtes mediator Verhoeff, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XLVIII. 1891 p. 17 n. 14.
Ephialtes mediator Verhoeff, Zool. Jahrb. VI. 1892 Syst. p. 741.
Perithous mediator Borries, Vidensk. Meddel. 1897 p. 153-158.

pleuralis Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Perithous pleuralis Cresson, Canad. Entomol. I. 1868 p. 36.
Perithous pleuralis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 22, ♀.
Perithous pleuralis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 452, ♀.

senator (Hal.) Marsh. — ♀ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Plectiscus) senator Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 116, ♀.
Perithous senator Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 86 n. 4.

varius (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Belgia.
Ephialtes varius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 254 n. 114, ♀ ♂.
Pimpla decorata Ratzeburg, Ichneum d. Forstinsect. II. 1848 p. 96 n. 31.
Perithous varius Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. 1859 P. 16. p. 123 n. 5.
Perithous varius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 16 n. 3, ♀ ♂.
Ephialtes varius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 256 n. 11, ♀ ♂.
Ephialtes varius Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 63, ♀ ♂.
Perithous varius Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 745 n. 2.
Pimpla decorata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 538 n. 12.

CALLIEPHIALTES

Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 54.
καλός, pulcher; Ephialtes, nom. propr. Hymen.

Synon.: Pimpla Ashmead.

xanthothorax Ashm.[1] — ♀ — Am.: Missouri.
Pimpla xanthothorax Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XII. 1890 p. 446, ♀.
Calliephialtes xanthothorax Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 54.

CLOSTEROCERUS

Hartig, Ber. naturw. Ver. Harz 1847 p. 18.
κλωστήρ, filum; *κέρας*, cornu.

sericeus Htg. — ♂ — Eur.: Germania.
Closteroceros sericeus Hartig, Ber. naturw. Ver. Harz 1847 p. 18, ♂.

EPHIALTES

Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 316.
Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 224.
ἐφιάλτης, incubo.

Synon.: Cryptus Desvignes.
Ichneumon Linné & auct.
Pimpla Gravenhorst, Ratzeburg.
Sphex Degeer.

---

[1] *Hymen.:* Euura salicis-nodus (Ashmead).

abbreviatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ephialtes abbreviatus Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 740 n. 8, ♀ ♂.
albicrus Rond.[1] — Eur.: Italia.
Ephialtes albicrus Rondani, Bull. soc. entom. Ital. VI. 1874 p. 132 n. 13.
Ephialtes albicrus Rondani, Bull. soc. entom. Ital. IX. 1877 p. 175 n. 24.
albipes Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, New Jersey.
Ephialtes albipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 143, ♀.
Ephialtes albipes Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 21 n. 4, ♀ ♂.
Ephialtes albipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 452 n. 4, ♀ ♂.
annulatus Brullé — ♀ — Austr.: Tasmania.
Ephialtes annulatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 86 n. 10, ♀.
annulicornis Cam. — Am.: Guatemala.
Ephialtes annulicornis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 262 n. 2; T. 11 F. 1.
antefurcalis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ephialtes antefurcalis Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 741 n. 10, ♀ ♂.
arundinis Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Ephialtes arundinis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 253 n. 16, ♀ ♂.
ascaniae Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ephialtes ascaniae Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 233 n. 2, ♀ ♂.
atratus Rdw. — ♀ — Eur.: Germania.
Ephialtes atratus Rudow, Entom. Nachr. VII. 1881 p. 309 n. 2, ♀.
atriceps Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ephialtes atriceps Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 394 n. 1, ♀.
balanini Rdw.[2] — ♂ — Eur.: Germania.
Ephialtes balanini Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 232 n. 1, ♂.
bicolor Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Ephialtes bicolor Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 82 n. 3, ♀.
brevicornis Tschek — ♀ — Eur.: Austria inf.
Ephialtes brevicornis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 271 n. 3, ♀.
brischkei D. T.[3] — ♂ — Eur.: Germania.
Ephialtes pectoralis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 178, ♂ [non Ephialtes Brischkei m. Brullé].
carbonarius (Christ) Grav.[4] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
? Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 62 n. 214, 226.
? Ichneumon extricator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 193 n. 188.
? Ichneumon leucopalpus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2700 n. 279.
Ichneumon carbonarius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 365; T. 38 F. 5.
Ichneumon extricator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 216 n. 54.
Pimpla manifestator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 266 n. 783.
Pimpla carbonaria Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 292.
Ephialtes carbonarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 242 n. 108, ♀ ♂ [excl. var. 1].
Ephialtes carbonarius? Curtis, Descr. Insects Cl. Ross. 2o Voy. 1831 App. p. LXI, ♀.
Ephialter carbonarius? Curtis, Arch. f. Naturg. II. P. 1. 1836 p. 287 n. 4.
? Pimpla (Ephialtes) gracilis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 373 n. 3, ♂.
Ephialtes carbonarius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 119 n. 2.

---

1) *Lep.:* Pempelia spartiella (Rondani).
2) *Col.:* Balaninus nucum (Rudow).
3) *Lep.:* Coccyx resinana (Brischke).
4) *Col.:* Saperda populnea, S. oculata, Hammatricherus heros, Pissodes spec. (Ratzeburg).

Ephialtes carbonarius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 99 n. 2.
Ephialtes carbonarius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 109 n. 2.
Ephialtes carbonarius Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 122 n. 4.
Ephialtes carbonarius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 14 n. 6, ♀ ♂.
Ephialtes carbonarius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 255 n. 6, ♀ ♂.
Ephialtes carbonarius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 178, ♀ ♂ var.
Ephialtes carbonarius Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 63, ♀ ♂.
Ephialtes carbonarius Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 742 n. 11, ♀ ♂.
Ephialtes carbonarius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 109, ♀ ♂.
Ephialtes carbonarius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2124 n. 11.

cephalotes Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Ephialtes cephalotes Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 122 n. 4.
Ephialtes cephalotes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 13 n. 5, ♀.
Ephialtes cephalotes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 178, ♀ ♂.
Ephialtes cephalotes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 109, ♀.

comstockii Cress.[1] — ♀ — Am.: New York.
Ephialtes Comstocki Cresson, Comstock: Rep. Entomol. U. St. f. 1879. 1880 p. 235, ♀.

continuus Ratzbg.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ephialtes continuus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 100 n. 3, ♂.
Ephialtes continuus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 109 n. 3.
Ephialtes continuus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 178, ♀ ♂.
Ephialtes continuus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 110, ♀ ♂.

crassiceps Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ephialtes crassiceps Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 739 n. 4, ♀ ♂.

crassiseta Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ephialtes crassiseta Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 743 n. 14, ♀ ♂.

cressonii Dew. — Am.: Portorico.
Ephialtes Cressoni Dewitz, Berlin. entom. Zeitschr. XXV. 1881 p. 205; T. 5 F. 9.

desvignii Marsh. — Eur.: Britannia.
Ephialtes albicinctus Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (3.) I. 3. 1862 p. 226, ♂ [nec Gravenhorst].
Ephialtes Desvignii Marshall, Ichneum. Britann. Catal. 1870 p. 20.

discolor Brisch.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ephialtes discolor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 110, ♀ ♂.
Ephialtes discolor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig VIII. P. 1. 1892 p. 46, ♀.

dux Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Ephialtes dux Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 270 n. 2, ♀ ♂.

elongator Zett. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Pimpla (Ephialtes) elongator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 373 n. 2, ♀.

exilis Brullé — ♂ — Am.: Uruguay.
Ephialtes exilis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 83 n. 4, ♂.

facialis Desv. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Ephialtes facialis Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 3. 1862 p. 226, ♂.
? Ephialtes facialis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 179, ♂.

geniculatus Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria, Helvetia, Hispania, Corfu, Hungaria.
Ephialtes geniculatus Kriechbaumer, Termész. Füzet. XIX. 1896 p. 135 n. 11, ♀ [non Brischke].

gigas Walsh — ♀ — Am.: Canada, Illinois.
Ephialtes gigas Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 110, ♀.

---

1) *Lep.:* Retinia Comstockiana (Cresson).
2) *Hymen.:* Nematus laricis (Hartig). — *Col.:* Saperda spec. (Ratzeburg).
3) *Hymen.:* Exenterus balteatus? — *Col.:* Dasytes coerulea? (Brischke).

Ephialtes manifestator var. gigas Cresson, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 110.
Ephialtes gigas Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 19 n. 2, ♀.
Ephialtes gigas Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 451 n. 2, ♀.

glabratus Ratzbg.[1] — ♂ — Eur.: Germania.
Ephialtes glabratus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 109 n. 6, ♂.

gnathaulax Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ephialtes gnathaulax Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 739 n. 5, ♀ ♂.

gracilis (Schrk.) Grav.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon gracilis Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 289 n. 2102, ♂.
Ephialtes gracilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 245 n. 109, ♂.
? Pimpla (Ephialtes) gracilis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 373 n. 3, ♂.
Ephialtes gracilis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 109 n. 7, ♂.
Ephialtes gracilis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 178, ♂.
Ephialtes gracilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 109, ♂.

haemorrhoidalis Tschek — ♀ — Eur.: Austria.
Ephialtes haemorrhoidalis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 37, ♀.

heteropus Thoms.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ephialtes heteropus Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1888 p. 1249 n. 4, ♀ ♂.

irritator (Fabr.) Brullé[4] — ♀ ♂ — Am. bor.
Ichneumon irritator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 336 n. 53.
Ichneumon irritator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 431 n. 66.
Ichneumon irritator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 266 n. 78.
Ichneumon irritator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2691 n. 143.
Ichneumon irritator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 360.
Ichneumon irritator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 186 n. 116.
Ichneumon irritator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 164 n. 127.
Pimpla irritator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 115 n. 10.
Ichneumon irritator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 268.
Ichneumon irritator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 329.
Ephialtes irritator Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 81 n. 2, ♀.
Ephialtes irritator Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 112, ♀.
Ephialtes irritator Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 21 n. 6, ♀.
Ephialtes irritator Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 453 n. 6, ♀.
Ephialtes irritator Chittenden, Insect Life V. 1893 p. 247.

lateralis Woll. — ♀ — Afr.: Madeira.
Ephialtes lateralis Wollaston, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) I. 1858 p. 22, ♀; T. 4 F. 3.

linearis Woll. — ♀ ♂ — Afr.: Madeira.
Ephialtes linearis Wollaston, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) I. 1858 p. 22, ♀ ♂.

lineatus Woll. — ♀ — Afr.: Madeira.
Ephialtes lineatus Wollaston, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) I. 1858 p. 22, ♀; T. 4 F. 4.

longicauda Mocs. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Ephialtes longicauda Mocsáry, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 644 n. 2, ♀.

longiseta (Ratzbg.) Schmkn.[5] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla longiseta Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 117 n. 15, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Tortricidae spec. — *Col.:* Anobium spec. (Ratzeburg).
2) *Col.:* Strangalia cruciata (Rondani).
3) *Col.:* Aromia moschata (Thomson).
4) *Col.:* Liopus variegatus (Chittenden).
5) *Lep.:* Ephippiphora dorsana (Rondani).

Pimpla longiseta Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 93 n. 21.
Pimpla (Ephialtes) longiseta Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 535 n. 2, ♀ ♂.
luteipes Thoms.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ephialtes luteipes Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 740 n. 6, ♀ ♂.
macer Cress. — ♂ — Am.: Canada.
Ephialtes macer Cresson, Canad. Entomol. I. 1868 p. 35.
Ephialtes variatipes Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 114 n. 7, ♂.
macrocentrus Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania, Bavaria, Hungaria.
Ephialtes macrocentrus Kriechbaumer, Termész. Füzet. XIX. 1896 p. 134 n. 10, ♀.
macrurus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ephialtes macrurus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2123 n. 3^b, ♀ ♂.
manifestator (L.) Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Rajus, Hist. Insect. 1710 p. 256 n. 19, ♂ & p. 261 n. 1, ♀.
—— Reaumur, Mém. hist. nat. Insect. VI. 2. 1742 p. ?; T. 29 F. 16.
—— Linné, Acta Upsal. 1736 p. 125 n. 3, ♀ & p. 126 n. 20, ♂.
—— Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 959.
—— Degeer, Mém. hist. nat. Insect. I. 1752 p. ?; T. 36 F. 9.
Ichneumon manifestator Linné, Syst. nat. Ed. 10^a I. 1758 p. 564 n. 30.
Ichneumon manifestator Linné, Fauna Suec. Ed. 2^a 1761 p. 403 n. 1608.
Ichneumon manifestator Poda, Insect. mus. Graec. 1761 p. 105 n. 3.
Ichneumon manifestator Sulzer, Kennz. d. Insect. 1761 p. 48; T. 18 F. 117.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 323 n. 5.
Ichneumon spec. Gronov, Acta Helvet. V. 1762 p. 152 n. 388.
Ichneumon manifestator Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 285 n. 751; T. 41 F. 751.
Ichneumon manifestator O. F. Müller, Fauna Insect. Fridrichsdal 1764 p. 70 n. 615.
Ichneumon manifestator Ström, Trondhiemske selsk. Skrift. III. 1765 p. 378 & 420 n. 45.
Ichneumon manifestator Linné, Syst. nat. Ed. 12^a I. 2. 1767 p. 934 n. 32.
Ichneumon LVI Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768; T. 110 F. 3.
Ichneumon manifestator Berkenhout, Outlin. Nat. Hist. Gr. Britain I. 1769 p. 165 n. 6.
Ichneumon manifestator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 336 n. 51. [T. 26 F. 4.
Ichneumon manifestator Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 851 n. 32;
Ichneumon manifestator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 156 n. 1809.
—— Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. I. 4. 1778 p. 24; T. 36 F. 9.
Ichneumon manifestator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 430 n. 62.
Ichneumon manifestator Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 356 n. 719, ♀.
Ichneumon manifestator Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 394 n. 5.
Ichneumon manifestator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 265 n. 74.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 61 n. 198 & p. 62 n. 215, ♂ & 220, ♀.
Ichneumon manifestator Razoumowski, Hist. nat. Jorat. I. 1789 p. 215 n. 248.
Ichneumon manifestator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 166 n. 98.
Ichneumon adulterator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 192 n. 187.
Ichneumon manifestator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2691 n. 32.
Ichneumon gracilis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2699 n. 267 (♂).
Ichneumon melanopus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2700 n. 280.
Ichneumon manifestator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 43 n. 763.
Ichneumon manifestator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 361; T. 38 F. 1.

---

1) *Col.:* Saperda populnea (Mocsáry).
2) *Col.:* Chalcophora spec., Callidium spec. (Ratzeburg). — *Lep.:* Sesia sphegiformis (Brischke).

Ichneumon compunctator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 368, ♀♂; T. 39 F. 1 [excl. Synon.].
Ichneumon manifestator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 186 n. 112.
Ichneumon adulterator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 216 n. 53.
Ichneumon manifestator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 162 n. 117.
Ichneumon manifestator Panzer, Faun. Insect. German. II. 1794; T. 21 F. 19.
Ichneumon manifestator Marsham, Trans. Linn. Soc. London III. 1797 p. 23; T. 4.
Ichneumon manifestator Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 160 n. 493.
Ichneumon manifestator Dwigubsky, Prim. faun. Mosquens. 1802 p. 165 n. 575.
Ichneumon manifestator Schrökenstein, Verz. d. Halbkäfer etc. 1802 p. 26 n. 79.
Ichneumon manifestator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 59 n. 54.
Ichneumon compunctor Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 316 n. 2067 A.
Pimpla manifestator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 113 n. 3.
Ichneumon manifestator Latreille, Dict. hist. nat. XI. 1804 p. 537.
Ichneumon manifestator Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 181 n. 10; T. 100 F. 2.
Ichneumon manifestator Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 [p. 956 n. 4.
Ichneumon manifestator C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- u. Baumhölzer I. 1. 1805 p. 26.
Pimpla manifestator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 83.
Ichneumon manifestator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 65 n. 763, ♀♂.
Ichneumon manifestator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀ ♂.
Ichneumon (Pimpla) manifestator Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 7.
Ichneumon manifestator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 137 n. 2.
Ichneumon manifestator Bechstein, Forstinsectol. 1818 p. 143 n. 289 & p. 402 n. 3.
Pimpla manifestator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 292.
Ichneumon manifestator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 275.
Ichneumon manifestator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 349.
Pimpla manifestator Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 129 n. 2.
Ephialtes manifestator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 232 n. 107, ♀ ♂.
Ichneumon adulterator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 903 n. 39, ♀ ♂.
Ichneumon manifestator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª IV. 1835 p. 349 n. 2.
Pimpla (Ephialtes) manifestator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 373 n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon (Ephialtes) manifestator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 319 n. 12.
Ephialtes manifestator Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 59.
Ichneumon (Ephialtes) manifestator Ratzeburg, Forstinsect. 1844 p. 27 n. 20; T. 6 F. 6.
Ephialtes manifestator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 119 n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon (Pimpla) manifestator Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3ª Insect. II. 1849; [T. 110 F. 8.
Ephialtes imperator Kriechbaumer, Stettin. entom. Zeitg. XV. 1854 p. 156, ♀ ♂.
Ephialtes manifestator Lespes, Ann. sc. nat. Zool. (4) IX. 1858 p. 241.
Ephialtes imperator Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 122 n. 4.
Ephialtes imperator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 12 n. 1, ♀♂.
Ichneumon manifestator Dumeril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 891 n. 6.
Ephialtes imperator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 254 n. 4, ♀ ♂.
Pimpla manifestator Disconzi, Entom. Vicent. 1865 p. 136; T. 9 F. 156.
Ephialtes manifestator Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 63, ♀ ♂.
Ephialtes imperator Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 738 n. 1.
Ephialtes manifestator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 109, ♀ ♂.
Ephialtes manifestator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 251 n. 15.

marginellus (Brullé) Pérez — ♀ — Am.: Cuba.
Pimpla marginella Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 107 n. 38, ♀.
Ephialtes marginellus Pérez, Act. soc. Bordeaux XLVII. 1895 p. 233.

melanomerus Voll. — ♀ — As.: Java.
Ephialtes melanomerus (Haahn) Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXI. 1878 p. 48, ♀.
Ephialtes melanomerus Vollenhoven, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 141.
mesocentrus Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ephialtes mesocentrus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 249 n. 112, ♂.
Pimpla mesocentrus Gravenhorst, Beitr. z. Entom. Schles. I. 1829 p. 25 n. 14, ♂; T. 1 F. 3.
Ephialtes rex Kriechbaumer, Stettin. entom. Zeitg. XV. 1854 p. 156, ♀ ♂.
Ephialtes mesocentrus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 122 n. 4.
Ephialtes rex Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 122 n. 4.
Ephialtes rex Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 12 n. 2, ♀.
Ephialtes mesocentrus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 13 n. 3, ♀ ♂.
Ephialtes mesocentrus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 254 n. 2, ♀ ♂.
Ephialtes rex Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 255 n. 5, ♀ ♂.
Ephialtes rex Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 738 n. 2.
Ephialtes mesocentrus Kriechbaumer, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 193 & 194, ♀.
Ephialtes mesocentrus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 251 n. 15, ♀.
Ephialtes rex Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 251 n. 15.
Ephialtes rex Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1249 n. 2.
messor Grav.[2] — ♀ — Eur.: Germania.
Ephialtes messor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 232 n. 106, ♀.
Ephialtes messor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 254 n. 1, ♀.
minutus Brullé — ♀ — Am.: Uruguay.
Ephialtes minutus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 83 n. 5, ♀.
navus Tosqu. — ♀ — Afr.: Sierra Leone.
Ephialtes navus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 280 n. 2, ♀.
nigricans Cam. — ♀ — Am.: Guatemala.
Ephialtes nigricans Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 263 n. 3, ♀; T. 11 F. 5.
nigriceps Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Ephialtes nigriceps Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 83 n. 6, ♀.
nigritarsis Cam. — ♂ — As.: India.
Ephialtes nigritarsis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 148, ♂.
nigromaculatus Cam. — ♀ — As.: India. [p. 150, ♀.
Ephialtes nigromaculatus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3.
notanda Ril.! — Am.: Missouri.
Ephialtes notanda Riley, 9th Ann. Rep. Insect. Missouri 1877 p. 98.
occidentalis Cress. — ♀ — Am.: Canada, Colorado.
Ephialtes occidentalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 269, ♀.
Ephialtes occidentalis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 19 n. 1, ♀.
Ephialtes occidentalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 451 n. 1, ♀.
oculatus Brullé — ♀ — Afr. mer.
Ephialtes oculatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 81 n. 1, ♀.
Ephialtes oculatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 279 n. 1, ♀.
pacificus Harrgt. — ♀ ♂ — Am.: Vancouvers Island.
Ephialtes pacificus Harrington, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 248, ♀ ♂.
parallelus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ephialtes parallelus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1248 n. 1, ♀.
pectoralis Brullé — ♂ — Afr. mer.
Ephialtes pectoralis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 84 n. 7, ♂.

---

1) *Lep.:* Coccyx resinana (Rondani).
2) *Lep.:* Tinea melionella (Gravenhorst).

perlongus Cress. — ♂ — Am.: Massachusetts.
Ephialtes perlongus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 143, ♂.
planifrons Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia.
Ephialtes planifrons Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 741 n. 9.
Ephialtes planifrons Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2123 n. 9, ♀ ♂.
pleuralis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Ephialtes pleuralis Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 744 n. 15, ♀ ♂.
populneus Ratzbg.[1]) — ♂ — Eur.: Germania.
Ephialtes populneus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 100 n. 4, ♂.
Ephialtes populneus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 109 n. 4.
pusillus Ratzbg.[2]) — ♂ — Eur.: Germania.
Ephialtes pusillus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 110 n. 8, ♂.
pusio Walsh — ♀ — Am.: Illinois.
Ephialtes pusio Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 111, ♀.
pygmaeus Walsh[3]) — ♀ — Am.: Canada, Illinois.
Ephialtes pygmaeus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 111, ♀.
Ephialtes pygmaeus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 20 n. 3, ♀.
Ephialtes pygmaeus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 452 n. 3, ♀.
reissigii (Ratzbg.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pimpla Reissigii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 89 n. 8, ♀ ♂.
Ephialtes Reissigii Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 537 n. 7.
rufescens Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Ephialtes rufescens Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 38, ♀.
ruficollis Rdw.! — ♀ — Eur.: Germania.
Ephialtes ruficollis Rudow, Entom. Nachr. VII. 1881 p. 309 n. 1, ♀ [non Desvignes].
ruficollis Desv. — ♀ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Ephialtes) ruficollis Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 88 n. 11, ♀.
Ephialtes ruficollis Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1887 p. 376.
rugosus (Deg.) Grav.! — As.: India.
Sphex rugosus Degeer, Mém. hist. nat. Insect. III. 1773 p. 597 n. 3; T. 30 F. 18 & 19.
Sphex rugosus Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. III. 1780 p. 387 n. 3; T. 30 F. 18 & 19.
Ichneumon rugosus Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 67 n. 265.
Ichneumon vacillator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 180 n. 85.
Ephialtes rugosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1019.
scutellaris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ephialtes scutellaris Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 738 n. 3, ♀ ♂.
Ephialtes scutellaris Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1249 n. 3, ♀ ♂.
Ephialtes scutellaris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2123 n. 3, ♀ ♂.
strobilorum (Ratzbg.) Taschbg.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pimpla strobilorum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 94 n. 23.
Pimpla strobilorum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 100 n. 27.
Ephialtes strobilorum Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 254 n. 3, ♀ ♂.
Ephialtes strobilorum Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 744 n. 16.
Ephialtes strobilorum Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 538 n. 9.
Ephialtes strobilorum Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2124 n. 16.

---

1) *Col.:* Saperda populnea, — *Lep.:* Sesia spec. (Rondani).
2) *Col.:* Molorchus umbellatarum (Ratzeburg).
3) *Lep.:* Gelechia gallae-solidaginis (Riley).
4) *Lep.:* Coccyx strobilorum (Bignell).

tenuiventris Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Ephialtes carbonarius var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 242 n. 108.
Ephialtes tenuiventris Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 122 n. 4.
Ephialtes tenuiventris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 14 n. 7, ♀ ♂.
Ephialtes geniculatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 179, ♂.
Ephialtes tenuiventris Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 396 n. 14, ♂.
Ephialtes tenuiventris Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 742 n. 12.
Ephialtes tenuiventris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 109, ♂.
Ephialtes tenuiventris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2124 n. 12.

thoracicus Cress. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Ephialtes thoracicus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 377, ♀.

tinctipennis Cam. — ♂ — As.: India.
Ephialtes tinctipennis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 151, ♂.

tricolor Brullé — ♀ — Am.: Columbia.
Ephialtes tricolor Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 85 n. 9, ♀.

tuberculatus (Fourcr.) Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 324 n. 7.
Ichneumon tuberculatus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 395 n. 7.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 61 n. 205 & p. 62 n. 221.
Ichneumon tuberculator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 187 n. 163.
Ichneumon leucopterus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2699 n. 273.
Ichneumon hyalinus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2700 n. 285.
Ichneumon crispus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 364; T. 38 F. 2.
Ichneumon fluctuans Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 365; T. 38 F. 4.
Ichneumon instigator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 181 n. 86 [non Fabr.].
Ichneumon tuberculatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 206 n. 2.
Ichneumon manifestator var. Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 [p. 956 n. 4.
Pimpla tuberculata Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 292.
Ephialtes tuberculatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 228 n. 105, ♀ ♂.
Pimpla (Ephialtes) tuberculata Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 374 n. 4, ♀.
Ephialtes tuberculatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 100 n. 5, ♀ ♂.
Ephialtes tuberculatus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 122 n. 4.
Ephialtes tuberculatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 13 n. 4, ♀ ♂.
Ephialtes tuberculatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 255 n. 8, ♀.
Ephialtes tuberculatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 178, ♀.
Ephialtes tuberculatus Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 63, ♀ ♂.
Ephialtes tuberculatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 164.
Ephialtes tuberculatus Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 740 n. 7.
Ephialtes tuberculatus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 21 n. 5, ♀.
Ephialtes tuberculatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 453 n. 5, ♀.
Ephialtes submaculatus Fallou, Ann. soc. entom. France (6) III. 1883 Bull. p. CXXXVI.
Ephialtes tuberculatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1884 p. 109, ♀ ♂.
Ephialtes tuberculatus Amelang, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 198.

vancouverensis Harrgt. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Ephialtes Vancouverensis Harrington, Canad. Entomol. 1894 n. 249, ♀.

violaceus Kriechb. — ♀ — Afr.: Caffraria.
Ephialtes violaceus Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 488, ♀.

---

[1]) *Col.:* Pissodes notatus, Rhagium mordax, Cryphorhynchus lapathi (Ratzeburg), Saperda populnea (Giraud). — *Lep.:* Liparis monacha, Hyponomeuta cognatella (Ratzeburg), Sesia sphegiformis (Amelang).

xanthomelas Brullé — ♀ — Afr.: Bourbon.
Ephialtes xanthomelas Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 84 n. 8, ♀.

SCAMBUS

Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 267 nota.
σκαμβός, curvus.

Synon.: Liogaster (Hartig) Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894 p. 22 nota
λεῖος, levis; γαστήρ, venter. [[nec Perty, nec Löw].
Liotryphon Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1890 p. 368.
λεῖος, levis; Tryphon, nom. propr. Hymen.
Pimpla Hartig, Ratzeburg, Kawall, Thomson, Brischke, Schmiede-
Rhyssa Gravenhorst & auct. [knecht.
Thalessa Holmgren, Brischke, Kriechbaumer, Thomson.

curvipes (Grav.) D. T.[1] — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Rhyssa curvipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 265 n. 117b.
Rhyssa curvipes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 104 n. 3, ♂.
Rhyssa curvipes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 113 n. 4.
Rhyssa curvipes Giraud, Verh. zool. bot. Ver. Wien IV. 1854 p. 606 n. 2, ♀ ♂.
Rhyssa curvipes Kawall, Stettin. entom. Zeitg. XIX. 1858 p. 68 n. 45, ♀ ♂.
Rhyssa (Thalessa) curvipes Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 122 n. 3.
Thalessa curvipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 10 n. 1, ♀ ♂.
Rhyssa curvipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 251 n. 4, ♀ ♂.
Rhyssa curvipes Kawall, Stettin. entom. Zeitg. XXXI. 1870 p. 109 n. 9, ♂.
Rhyssa curvipes Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 17, ♀; T. 11 F. 7.
Thalessa curvipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 109, ♀ ♂.
Rhyssa (Thalessa) curvipes Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 246 n. 12, ♂.
Liogaster curvipes Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894 p. 22.
Thalessa curvipes Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2122 n. 1.
Scambus curvipes m.

longulus (Kriechb.) D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Liogaster longulus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 297, ♀.
Scambus longulus m.

planata Htg.[2] — ♀ ♂ — Eur.
Pimpla (Scambus) planata Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. 2. 1838 p. 267, ♀.
Pimpla planata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 117 n. 18.
Pimpla planata Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 754.
Pimpla planata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 536 n. 5, ♀ ♂.

sagax Htg.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pimpla (Scambus) sagax Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 267, ♀ ♂.
Pimpla sagax Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 117 n. 17, ♀ ♂.
Pimpla sagax Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 94 n. 25, ♀.
Pimpla sagax Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 100 n. 29.
Pimpla sagax Kawall, Stettin. entom. Zeitg. XXVIII. 1867 p. 122.
Pimpla sagax Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 754.

---

1) *Hymen.:* Xiphydria camelus, X. dromedarius, Xyela pusilla (Ratzeburg).
2) *Lep.:* Coccyx buoliana (Hartig, Ratzeburg).
3) *Lep.:* Tortrix resinana, T. cosmophorana (Ratzeburg), Tischeria complanella, Cochylis pastorana — *Col.:* Anthonomus pomorum (Brischke).

Pimpla sagax Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 113, ♀ ♂.
Pimpla sagax Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 536 n. 4, ♀ ♂.
Pimpla sagax Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2126 n. 24[b].
Pimpla sagax Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 619, ♀ ♂.

ATRACTOGASTER

Kriechbaumer, Stettin. entom. Zeitg. XXXIII. 1872 p. 6.
ἄτρακτος, fusus; *γαστήρ*, venter.

semisculpta Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia.
Atractogaster semisculptus Kriechbaumer, Stettin. entom. Zeitg. XXXIII. 1872 p. 6-10, ♀.
Atractogaster semisculptus Kriechbaumer, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 195, ♀.
Atractogaster semisculptus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 250 n. 14, ♂.
Atractogaster semisculptus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 428.

TROCTOCERUS

Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 396.
τρωκτός, corrosus; *κέρας*, cornu.

elegans Woldst. — ♂ — Eur.: Germania.
Troctocerus elegans Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 396 n. 15, ♂.
Troctocerus elegans Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 427, ♂.

LYTARMES

Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 144.
Etymol. obscura.

hyalinipennis Cam. — ♂ — As.: India.
Lytarmes hyalinipennis Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 146, ♂.
maculipennis Cam. — ♀ — As.: India.
Lytarmes maculipennis Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 145, ♀.

MEGARHYSSA

Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 368 [non Adams 1858].
μέγας, grandis; Rhyssa, nom. propr. Hymen.

Synon.: Thalessa Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 122.
θάλλω, floreo.
Ichneumon Schrank & auct.
Ophion Fabricius.
Pimpla Dalman & auct.
Rhyssa Brullé & auct.

atrata (Fabr.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon atratus Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 436 n. 98.
Ichneumon atratus Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 268 n. 116.
Ichneumon atratus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13[a] I. 5. 1790 p. 2707 n. 180.
Ichneumon atratus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 196 n. 159.
Ichneumon atratus Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 179 n. 191.
Ophion atratus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 132 n. 5.
Ichneumon tenebrator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 266.
Ichneumon tenebrator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 322.
Pimpla atrata Dalman, Svensk. Vet.-Akad. Handl. XLVI. 1825 p. 188; T. 1.
Pimpla atrata Guérin, Magas. de zool. I. 1831 (1830) p. 28, ♀; T. 28.

Pimpla atrata Th. W. Harris, Rep. Insect. Massach. 1841 p. 391.
Rhyssa atrata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 77 n. 1, ♀; T. 40 F. 1.
Rhyssa laevigata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 78 n. 3, ♂; T. 40 F. 2.
? Rhyssa necator D'Urban, Entom. M. Magaz. II. 1865 p. 71.
Pimpla atrata Walsh & Riley, Amer. Entomol. I. 1868 p. 77.
Thalessa atrata Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 13 n. 1, ♀ ♂.
Rhyssa atrata Harrington, Canad. Entomol. XIV. 1882 p. 81.
Thalessa atrata Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 445 n. 1, ♀ ♂.
Thalessa atrata Harrington, Canad. Entomol. XIX. 1887 p. 206.
Megarhyssa atrata m.

citraria (Ol.) D. T.[1] — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
? Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 335 n. 32.
? Ichneumon citratus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 403 n. 32.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 58 n. 156b.
Ichneumon citrarius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 176 n. 61.
? Ichneumon citratus Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 55 n. 34.
Rhyssa superba Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 277 n. 122, ♀ ♂.
Rhyssa superba Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 114 n. 8, ♀ ♂.
Rhyssa (Thalessa) superba Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 122 n. 3.
Thalessa superba Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 10 n. 2, ♀.
Rhyssa superba Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 251 n. 7, ♀ ♂.
Rhyssa superba Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 18, ♀ ♂; T. 11 F. 3 (♀) & 4 (♂).
Thalessa citraria Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 163.
Thalessa superba Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2122 n. 2.
Thalessa superba Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 278.
Megarhyssa citraria m.

flavonotata (Kriechb.) D. T. — ♂ — Eur.: Norvegia.
Thalessa flavonotata Kriechbaumer, Termész. Füzet. XIX. 1896 p. 135 n. 12, ♂.
Megarhyssa flavonotata m.

histrio (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: White Mountains.
Thalessa ? histrio Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 487, ♂.
Megarhyssa histrio m.

leucographa (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Rhyssa leucographa Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 274 n. 120, ♀.
Pimpla leucographa Schummel, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1829. 1830 p. 54.
Pimpla leucographa Rotermund, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1834. 1835 [p. 91.
Rhyssa leucographa Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 114 n. 7.
Rhyssa (Thalessa) emarginata Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 [p. 122 n. 3.
Thalessa emarginata (Gyllenhall) Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. [p. 11 n. 4, ♂.
Rhyssa leucographa & leucogaster Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 251 [n. 5, ♀ [err. typogr.].
Rhyssa leucographa Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 63, ♀ ♂.
Thalessa Austriaca Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 269 n. 1, ♂.
Rhyssa (Thalessa) Austriaca Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 245 n. 11.
Thalessa emarginata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 140 n. 27.
Thalessa leucographa Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2123 n. 4.
Megarhyssa leucographa m.

---

[1]) *Hymen.:* Tremex magnus f. var. alchemista (Mocsáry).

lunator (Fabr.) D. T.[1] — ♀ ♂ — Am.
Ichneumon lunator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 430 n. 64.
Ichneumon lunator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 265 n. 76.
Ichneumon lunator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2691 n. 142.
Ichneumon lunator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 186 n. 114.
Ichneumon lunator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 162 n. 120.
Pimpla lunator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 114 n. 5.
Ichneumon lunator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 139 n. 13.
Ichneumon lunator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2a IV. 1835 p. 351 n. 13.
Pimpla lunator Th. W. Harris, Rep. Insect. Massach. 1841 p. 391.
Rhyssa lunator Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 78 n. 2, ♀.
Rhyssa lunator D'Urban, Entom. M. Magaz. II. 1865 p. 71.
Thalessa lunator Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 164.
Rhyssa lunator Westcott, Canad. Entomol. XI. 1879 p. 140.
Thalessa lunator Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 14 n. 4, ♀.
Rhyssa lunator Harrington, Canad. Entomol. XIV. 1882 p. 81-84.
Thalessa lunator Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 446 n. 4, ♀.
Pimpla (Rhyssa) lunator Gade, Bull. Brooklyn Soc. VII. 1884 p. 103.
Rhyssa lunator Anonym, Bull. Brooklyn Soc. VII. 1885 p. 123.
Thalessa lunator Harrington, Canad. Entomol. XIX. 1887 p. 206.
Thalessa lunator Riley, Insect Life I. 1888 p. 168-179; Fig. 36-39.
Thalessa lunator Harrington, Rep. Entom. Soc. Ontario XVIII. 1888 p. 25-27.
Thalessa lunator Lintner, 4th Rep. New York State Entomol. 1889 p. 35-42.
Megarhyssa lunator m.

nitida (Cress.) D. T. — ♂ — Am.: Canada, Virginia.
Rhyssa nitida Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 319 n. 3, ♂.
Thalessa nitida Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 11 n. 2, ♂.
Thalessa nitida Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 445 n. 2, ♂.
Megarhyssa nitida m.

nortonii (Cress.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Colorado.
Rhyssa Nortoni Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 317 n. 1, ♀.
Thalessa Nortoni Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 13 n. 3, ♀ ♂.
Thalessa Nortoni Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 445 n. 3, ♀ ♂.
Megarhyssa Nortonii m.

quebecensis (Prov.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Thalessa Quebecensis Provancher, Natural. Canad. V. 1873 p. 447, ♀ ♂.
Megarhyssa Quebecensis m.

superba (Schrk.) D. T. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon XLIII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 81 F. 4.
Ichneumon superbus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 350 n. 707, ♀.
Ichneumon superbus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 153 n. 56.
Ichneumon superbus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2683 n. 108.
Ichneumon perlatus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 356; T. 36 F. 6.
Ichneumon histrio Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 356; T. 36 F. 7.
Ichneumon vagatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 146 n. 50, ♂.
Ichneumon clavatus Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 227 n. 189-190, ♀.
Ichneumon superbus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 269 n. 2066.
Pimpla vagatoria Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 112 n. 2.
Pimpla clavata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 118 n. 29, ♀.

[1]) *Hymen.:* Tremex columba (Riley).

Ichneumon geminatorius Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 94.
Pimpla perlata Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 292.
Ichneumon obovator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon vagatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Ichneumon obovator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 314.
Ichneumon vagatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 356.
Rhyssa clavata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 280 n. 123, ♀ ♂.
Pimpla vagatoria Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 956 n. 111.
Ichneumon histrio Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1093 n. 339.
Rhyssa clavata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 114 n. 9, ♀ ♂.
Rhyssa (Thalessa) clavata Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 122 n. 3.
Thalessa clavata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 11 n. 3, ♀.
Rhyssa clavata Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 251 n. 8, ♀ ♂.
Thalessa clavata Ghiliani, Bull. soc. entom. Ital. IV. 1872 p. 352-356.
Thalessa clavata Ghiliani, Bull. soc. entom. Ital. V. 1873 p. 237-243, ♀.
Rhyssa clavata Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 18, ♀ ♂; T. 11 F. 1 (♂) & 2 (♀).
Rhyssa superba Brauns, Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklenburg XXXII. 1879 p. 76.
Thalessa superba Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 163.
Thalessa clavata Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2122 n. 3.
Megarhyssa superba m.

var. **ghilianii** Griff. — Eur.: Italia.
Rhyssa clavata subsp. Ghilianii Griffini, Miscell. entom. IV. 1896 p. 6-12.
Megarhyssa superba var. Ghilianii m.

RHYSSA

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 260 n. 8.
ῥυσσός, rugosus.

Synon.: Ichneumon Linné & auct.
Pimpla Fabricius & auct.

Subg.: Pararhyssa Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 109.
παρά, ad; Rhyssa, nom. propr. Hymen.

amoena Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Rhyssa amoena Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 266 n. 118, ♀ ♂.
Rhyssa amoena Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 104 n. 2, ♂.
Rhyssa amoena Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 113 n. 1, ♀.
Rhyssa amoena Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 251 n. 2, ♀ ♂.

approximator (Fabr.) Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon approximator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 162 n. 118.
Pimpla approximator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 113 n. 4.
Ichneumon approximator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♂.
Pimpla approximator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 290.
Ichneumon approximator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273.
Ichneumon approximator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 344.
Rhyssa approximator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 264 n. 117, ♂.
Rhyssa approximator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 113 n. 2, ♂.
Rhyssa approximator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 251 n. 1, ♂.
Rhyssa approximator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 82 n. 2, ♀ & p. 249 n. 13.

var. **alpestris** Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Alpes.
Rhyssa alpestris Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 122 n. 3.
Rhyssa alpestris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 9 n. 2, ♀.

Rhyssa alpestris Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 737.
Rhyssa approximator var. alpestris Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 318 n. 3, ♀ ♂.
var. **maculicoxis** Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Rhyssa approximator var. maculicoxis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 318 n. 1, ♀ ♂.
var. **ruficoxis** Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Rhyssa approximator var. ruficoxis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 250, ♀.
Rhyssa approximator var. ruficoxis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 318 n. 3, ♀ ♂.
bernsteinii Vollenh. — ♀ — Austr.: Salawatti?, Waigeou?
Rhyssa Bernsteini Vollenhoven, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 138 n. 2, ♀.
bipartita (Brullé) Vollenh. — ♀ ♂ — As.: India.
Pimpla bipartita Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 88 n. 2, ♀.
Rhyssa bipartita Vollenhoven, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 142 n. 2 [recte 1].
Pimpla bipartita Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 297 n. 7, ♀ ♂.
canadensis Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Rhyssa Canadensis Cresson, Canad. Entomol. I. 1868 p. 35.
Rhyssa Canadensis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 17 n. 2, ♀.
Rhyssa Canadensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 449 n. 2, ♀.
carinifrons Cam. — ♀ — Am.: Nicaragua.
Rhyssa carinifrons Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 261 n. 2, ♀.
clavula Colenso — Austr.
Rhyssa clavula Colenso, Trans. New Zealand Instit. XVII. 1885 p. 158.
doreica Vollenh. — ♀ — Austr.: New Guinea.
Rhyssa Doreica Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XVI. 1873 p. 69, ♀; T. 4 F. 3.
fasciata Smith — ♂ — As.: Aru.
Rhyssa maculipennis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 173 n. 1, ♂ [non 1857].
Rhyssa fasciata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 140 n. 1.
flaviceps Vollenh. — ♀ — As.: Aru.
Rhyssa flaviceps Vollenhoven, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 139 n. 3, ♀.
fractinervis Vollenh. — ♀ ♂ — Austr.: New Zealand.
Rhyssa fractinervis Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XVI. 1873 p. 67, ♀; T. 4 F. 1.
Rhyssa antipodum Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 479, ♀; T. 4 F. 4.
Rhyssa antipodum Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 128, ♀ ♂.
fulva Vollenh. — ♂ — As.: Obi.
Rhyssa fulva Vollenhoven, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 136 n. 1, ♂.
fulvipennis Cam. — ♀ — As.: India.
Rhyssa fulvipennis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 p. 127, ♀.
humida (Say) Walsh[1] — ♀ ♂ — Am.: Indiana, Illinois.
Pimpla humida Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 224 n. 1.
Pimpla humida Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 683 n. 1.
Rhyssa (Pararhyssa) humida Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 109, ♀ ♂.
Rhyssa humida Patton, Canad. Entomol. XI. 1879 p. 15, ♀.
insignis Jarosch. — Eur.: Russia.
Rhyssa insignis Jaroschewsky, Trudy Kharkoff Univ. XXIII. 1890 p. 369.
instigator Smith — ♀ — Austr.: New Guinea.
Rhyssa instigator Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 65 n. 1, ♀.
juvenis Scudd. — Am.: Green River.
Rhyssa juvenis Scudder, Tert. Insects N. Amer. II. 1890 p. 609; T. 10 F. 19.
laniaria Vollenh. — ♀ — As.: Amboina.
Rhyssa laniaria Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XVI. 1873 p. 68, ♀; T. 4 F. 2.

---

1) *Hymen.:* Xiphydria attenuata (Patton).

lineolata Kriechb. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Rhyssa lineolata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 81 n. 1, ♀.
maculipennis Smith — ♀ — As.: Singapore, Borneo.
Rhyssa maculipennis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 120 n. 2, ♀.
marginalis Brullé — ♀ — Patria?
Rhyssa marginalis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 79 n. 4, ♀.
mirabilis Smith — ♀ — As.: Borneo.
Rhyssa mirabilis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 120 n. 1, ♀.
muelleri Vollenh. — ♀ — As.: Java.
Rhyssa Mülleri Vollenhoven, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 140 n. 4, ♀.
nigricornis Ratzbg.[1] — ♀ — Eur.: Germania.
Rhyssa nigricornis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 113 n. 3, ♀.
nigritarsis Cam. — ♀ — Am.: Panama.
Rhyssa nigritarsis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 260 n. 1, ♀; T. 11 F. 3.
nobilitator Smith — ♀ ♂ — As.: Celebes.
Rhyssa nobilitator Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 63 n. 1, ♀ ♂.
obliterata Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Rhyssa obliterata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 275 n. 121, ♀.
Rhyssa obliterata Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 114 n. 6, ♀.
Rhyssa obliterata Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 251 n. 6, ♀.
Rhyssa obliterata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 245 n. 12, ♂.
persuasoria (L.) Grav.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota; Am. bor.
—— Linné, Acta Upsal. 1836 p. 125 n. 19.
—— Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 964.
—— Degeer, Mém. hist. Insect. I. 1752 p. ?; T. 36 F. 8.
Ichneumon persuasorius Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 562 n. 17.
Ichneumon persuasorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 400 n. 1593.
Ichneumon persuasorius Sulzer, Kennz. d. Insect. 1761 p. 48; T. 18 F. 116.
Ichneumon (Sirex) camelus Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 282 n. 742; T. 40 F. 742.
Ichneumon persuasorius Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 932 n. 16.
Ichneumon XLI & LXII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 80 F. 2 & 3.
Ichneumon LII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768; T. 103 F. 1.
Ichneumon persuasorius Ström, Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768 p. ? n. 67.
Ichneumon persuasorius Berkenhout, Outlin. Nat. Hist. Gr. Britain I. 1769 p. 164 n. 2.
Ichneumon persuasorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 331 n. 22.
Ichneumon persuasorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 847 n. 16.
Ichneumon persuasorius Sulzer, Abgek. Gesch. Insect. I. 1776 p. 189, ♀♂; T. 26 F. 12 (♀) [& 13 (♂).
—— Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. I. 4. 1778 p. 23; T. 36 F. 8.
Ichneumon persuasorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 424 n. 22.
Ichneumon persuasorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 262 n. 28.
Ichneumon persuasorius Razoumowski, Hist. nat. Jorat. I. 1789 p. 214 n. 245.
Ichneumon persuasorius Römer, Gen. Insect. 1789 p. 58, ♀ ♂; T. 26 F. 12 (♀) & 13 (♂).
Ichneumon persuasorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 145 n. 34.
Ichneumon persuasorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2681 n. 16.
Ichneumon persuasoria Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 337, ♀ ♂; T. 33 F. 1 (♀) & 2 (♂).
Ichneumon persuasorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 172 n. 42.
Ichneumon persuasorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 145 n. 49.

---

1) *Hymen.:* Siricidae spec. (Ratzeburg).

2) *Hymen.:* Sirex gigas (Bignell), S. spectrum (Ratzeburg). — *Col.:* Monochammus scutellator, M. confusor (Provancher), Serropalpus spec. (Erné).

Ichneumon persuasorius Panzer, Faun. Insect. German. II. 1794 P. 19 T. 18.
Ichneumon persuasorius Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 158 n. 486.
Ichneumon persuasorius Lamarck, Syst. anim. s. vert. 1801 p. 265 n. 119.
Ichneumon persuasorius Dwigubsky, Prim. faun. Mosquens. 1802 p. 165 n. 572.
Ichneumon persuasorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 54 n. 27.
Pimpla persuasoria Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 112 n. 1.
Ichneumon persuasorius C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- u. Baumhölzer I. 1. 1805 p. 32.
Ichneumon persuasorius Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 181 n. 9.
Pimpla persuasoria Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 82.
Pimpla persuasoria Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 216 n. 3782.
Ichneumon persuasorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♀ ♂.
Ichneumon persuasorius Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 137 n. 1.
Pimpla persuasoria Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 292.
Ichneumon persuasorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Ichneumon persuasorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 356.
Pimpla persuasoria Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 129 n. 1.
Rhyssa persuasoria Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 267 n. 119, ♀ ♂.
Ichneumon persuasorius Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª IV. 1835 p. 349 n. 1.
Rhyssa persuasoria Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835; T. 39 F. 1.
Pimpla (Rhyssa) persuasoria Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 320 n. 13.
Rhyssa persuasoria Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 59.
Rhyssa persuasoria Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 121 n. 1.
Rhyssa persuasoria Stephens, Illustr. Brit. Entom. Suppl. 1846 p. 2, ♂; T. 39 F. 1.
Rhyssa persuasoria Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 104 n. 1.
Rhyssa persuasoria Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 113 n. 5, ♀ ♂.
Rhyssa persuasoria Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXVI. 1859 p. 122 n. 3.
Rhyssa persuasoria Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 9 n. 1, ♀ ♂.
Rhyssa persuasoria Vollenhoven, Tijdschr. nederl. entom. Vereen. IV. 1861 p. 176; T. 12.
Rhyssa persuasoria Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 251 n. 3, ♀ ♂.
Rhyssa persuasoria Dorville, Entom. M. Magaz. I. 1865 p. 262.
Rhyssa persuasoria Bond, Entom. M. Magaz. I. 1865 p. 278.
Rhyssa persuasoria Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 73, ♀ ♂.
Rhyssa persuasoria Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) V. 1867 Proc. p. LXXXV.
● Rhyssa (Pararhyssa) persuasoria Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 109, ♀ ♂.
Rhyssa persuasoria Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 18, ♀ ♂; T. 11 F. 5 (♀) & 6 (♂).
Rhyssa persuasoria Erné, Mittheil. schweiz. entom. Ges. IV. P. 9. 1876 p. 518.
Rhyssa persuasoria Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 15 n. 1, ♀ ♂.
Rhyssa persuasoria Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 109, ♀ ♂.
Rhyssa persuasoria Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 447 n. 1, ♀ ♂.

vestigator Smith — ♂ — As.: Aru.
Rhyssa vestigator Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 174 n. 2, ♂.

viator Smith — ♂ — As.
Rhyssa viator Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 10 n. 2, ♂.

CERTONOTUS

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 308.

κήριον, favus; *νῶτος*, dorsum.

varius Kriechb. — ♀ — Austr.
Certonotus varius Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 308, ♀.

APECHONEURA

Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 485.
ἀπέχω, arceo; νεῦρον, nervus.

Synon.: Rhyssa Brullé.

brevicauda Kriechb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Apechoneura brevicauda Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 487, ♀.
longicauda Kriechb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Apechoneura longicauda Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 486, ♀.
terminalis (Brullé) Kriechb. — ♀ — Am.: Chile.
Rhyssa terminalis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 80 n. 5, ♀.
Apechoneura terminalis Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 486, ♀.

EPIRHYSSA

Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 39.
ἐπί, apud; Rhyssa, nom. propr. Hymen.

Synon.: Rhyssonota Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. V. 1890 p. 489.
ῥυσσός, rugosus; νῶτος, dorsum.
Pararhyssa Walsh.
Rhyssa Cresson.

albomaculata (Cress.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Rhyssa albomaculata Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 318 n. 2, ♀.
Rhyssa (Pararhyssa) albimaculata Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 109, ♀ ♂.
Epirhyssa Crevieri Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 17 n. 1, ♂.
Epirhyssa Crevieri Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 449 n. 1, ♂.
Epirhyssa albomaculata m.
alternata Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Epirhyssa alternata Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 40, ♂.
annulicornis Cam. — ♀ — As.: India.
Epirhyssa annulicornis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 133, ♀.
carinifrons Cam. — ♂ — As.: India.
Epirhyssa carinifrons Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 131, ♂.
clavata Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Epirhyssa clavata Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 115 n. 2, ♀.
flavobalteata Cam. — ♀ — As.: India.
Epirhyssa flavobalteata Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 129, ♀.
japonica Cam. — As.: Japonia.
Epirhyssa Japonica Cameron, Proc. & Trans. Nat. Hist. Soc. Glasgow (2) I. 3. 1885/86 p. 276.
maculicornis Cam. — ♀ — As.: India.
Epirhyssa maculicornis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 132, ♀.
mexicana Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Epirhyssa Mexicana Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 394 n. 1, ♂.
speciosa Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Epirhyssa speciosa Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 39, ♀.
tristis (Kriech.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Rhyssonata tristis Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 489, ♀.
Epirhyssa tristis m.

25. *Subfam.* Lissonotinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 142 & 166.

HARRIMANIELLA

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 52.
Harriman, nom. propr. (?)

yukakensis Ashm. — Patria?
Harrimaniella Yukakensis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 52 [s. descr.].

MEYVA

Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 191.
Etymol. obscura.

villosa Cam. — ♂ — As.: India.
Meyva villosa Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 192, ♂.

STENOLABIS

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 59.
στενός, angustus; *λαβίς*, ansa.

cingulata Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania.
Stenolabis cingulata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 59, ♀.
Stenolabis cingulata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 332 n. 1, ♀.

PIMPLOPTERUS

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 52.
Pimpla, nom. propr. Hymen.; *πτερόν*, ala.

alaskensis Ashm. — Am.: Alaska.
Pimplopterus Alaskensis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 52 [s. descr.].

EPIMECOIDEUS

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 52.
Epimecus, nom. propr. Hymen.; *εἴδης*, forma.

apicalis Ashm. — Patria?
Epimecoideus apicalis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 52 [s. descr.].

CTENOPIPMLA

Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 189.
κτείς, pecten; Pimpla, nom. propr. Hymen.

albomaculata Cam. — ♀ — As.: India.
Ctenopimpla albomaculata Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 190, ♀.

ALLOPLASTA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 167 n. 15.
ἄλλος, alter; *πλαστός*, fictus.

Vide genus Meniscus.

BATHYCETES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 167 n. 14.

βαθυκήτης, profundissimus.

Vide genus Meniscus.

PHIDIAS

Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXI. 1878 p. 164.

Nom. propr.

aciculatus Vollenh. — ♀ — Eur.: Britannia.
Phidias aciculatus Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXI. 1878 p. 165 n. 11, ♀; T. 10 F. 2 & 2a.

MENISCUS

Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 11 nota.

μηνίσκος, lunula.

Synon.: Alloplasta Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 167 n. 15.
ἄλλος, alter; πλαστός, fictus.
Amersibia Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 167 n. 13.
Etymol. obscura.
Bathycetes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 167 n. 14.
βαθυκήτης, profundissimus.
Bathynophrys Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 166 n. 6.
βαθύνω, excavo; ὀφρύς, supercilium.

Exetastes Gravenhorst.
Ichneumon Geoffroy & auct.
Lampronota Westwood, Cresson, Walsh.
Lissonota Gravenhorst, Herrich-Schaeffer, Holmgren, Thomson.
Pimpla Gravenhorst, Bouché, Blanchard.
Tryphon Zetterstedt.

aberrans Tosqu. — ♂ — Afr.: Cap.
Meniscus aberrans Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 335, ♂.
agnatus (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. bor & centr.
Lissonota agnata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 44 n. 22, ♀.
Lissonata agnata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 92 n. 1, ♀.
Meniscus agnatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 61 n. 3, ♀.
Meniscus agnatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 288 n. 2, ♀ ♂.
Meniscus agnatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 195, ♀ ♂.
Meniscus agnatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 22; T. 14 F. 8.
Lissonota agnata Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 763 n. 15.
Meniscus agnatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 125, ♀ ♂.
Lissonota agnata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1419 n. 14.
Meniscus agnatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 65, ♂.
Meniscus agnatus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 355 n. 5, ♀ ♂.
alternatus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Meniscus alternatus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 410 n. 3, ♂.
bethunei Cress. — ♀ — Am.: Ontario.
Meniscus Bethunei Cresson, Canad. Entomol. I. 1869 p. 105, ♀.

bilineatus (Grav.) Marsh.[1] — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Lissonota bilineata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 41 n. 20, ♂.
Lissonota impressor var. 1 & 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 50, ♀.
Tryphon pimplator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 384 n. 3, ♀.
Meniscus pimplator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 62 n. 4, ♀.
Meniscus pimplator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 288 n. 4, ♀ ♂.
Meniscus bilineatus Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 93 n. 5.
Meniscus pimplator Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 22, ♀; T. 14 F. 7.
Lissonota pimplator Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 763 n. 16, ♀.
Meniscus pimplator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 125, ♀ ♂.
Lissonota pimplator Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1419 n. 15.
Lissonota pimplator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2128.
Meniscus bilineatus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 356 n. 7, ♀ ♂.

canaliculatus Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Meniscus canaliculatus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 19 & 37 n. 69, ♀.
Meniscus canaliculatus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 356 n. 8, ♀.

catenator (Panz.) Schiödte[2] — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon XII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1766; T. 20 F. 10.
? Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 62 n. 229.
? Ichneumon linearis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2701 n. 291.
Ichneumon catenator Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 29 n. 10.
Pimpla catenator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 290.
Lissonota catenator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 45 n. 23, ♀.
Tryphon excavator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 384 n. 2, ♀.
Meniscus catanator Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 11, nota.
Lissonota catenator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 107 n. 9, ♀.
Meniscus catenator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 61 n. 2, ♀ ♂.
Meniscus catenator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 288, ♀ ♂.
Meniscus catenator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 195, ♀ ♂.
Meniscus catenator Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 22, ♀; T. 14 F. 6.
Lissonota catenator Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 763 n. 13.
Meniscus catenator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 125, ♀ ♂.
Bathycetes catenator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 439.
Lissonota catenator Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1419 n. 16.
Meniscus catenator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 354 n. 4, ♀ ♂.

comptus Davis — ♀ — Am.: Michigan.
Meniscus comptus Davis, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 322, ♀.

crassitarsis Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Meniscus crassitarsis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 409 n. 1, ♀.

dacrumae Ashm. — ♀ — Am.: California.
Meniscus Dakrumae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXVII. 1897 p. 212, ♀.

elector (Grav.) Taschbg. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Lissonota elector (Ziegler) Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 73 n. 40, ♀ ♂.
Meniscus elector Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 289 n. 7, ♀ ♂.
Lissonota elector Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 764 n. 17, ♀ ♂.
Lissonota elector Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1420 n. 18.
Meniscus elector Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 353 n. 1, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Sesia formicaeformis, S. spheciformis, S. hylaeiformis (Brischke).
2) *Col.:* Buprestidae (Rondani).

elegans Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada.

Meniscus elegans Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 165 n. 1, ♀.
Meniscus elegans Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 79 n. 3, ♀ ♂.
Meniscus elegans Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 482 n. 3, ♀ ♂.

fumipennis Rdw.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.

Meniscus fumipennis Rudow, Entom. Nachr. VII. 1881 p. 311 n. 9, ♀ ♂.

griseus (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.

Lissonota grisea Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 43 n. 21, ♂.
Lissonota tomentosa Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 46 n. 24, ♀.
Meniscus tomentosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 289 n. 5, ♀ ♂.
Meniscus griseus m.

impressifrons (Thoms.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Gallia.

Lissonota impressifrons Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1419, ♀.
Meniscus impressifrons Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 357 n. 10, ♀.

impressor (Grav.) Taschbg.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.

Lissonota impressor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 50 n. 27, ♀ ♂ [excl. var. 1 & 2].
Tryphon impressor Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 385 n. 8, ♀.
Lissonota impressor Fonscolombe, Ann. soc. entom France (3) II. 1854 p. 501 n. 8, ♀ ♂.
? Lissonota impressor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 59 n. 30, ♀ (♂).
Meniscus impressor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 289 n. 6, ♀ ♂.
Lissonota impressor Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 194, ♀ ♂.
Lissonota impressor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 122, ♀ ♂.
Lissonota impressor Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1247 n. 1.
Lissonota impressor Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1419 n. 13.
Lissonota (Meniscus) impressor Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2128 n. 1.
Meniscus impressor Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 356 n. 9, ♀ ♂.

var. **suborbitalis** (Grav.) Marsh. — ♂ — Eur.

Lissonota suborbitalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 42 n. 20b, ♂.
Meniscus impressor var. suborbitalis Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 93 n. 4.

johnsonii Davis — ♀ — Am.: New Jersey.

Meniscus? Johnsonii Davis, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 323, ♀.

mexicanus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.

Meniscus Mexicanus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 410 n. 2, ♀.

michiganensis Davis — ♀ — Am.: Michigan.

Meniscus Michiganensis Davis, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 323, ♀.

minutus Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.

Meniscus minutus Rudow, Entom. Nachr. VII. 1881 p. 312 n. 10, ♀ ♂.

mirabilis Cress. — ♀ — Am.: Massachusetts.

Meniscus mirabilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 166 n. 2, ♀.

murinus (Grav.) Schiödte[3]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.

Lissonota murina Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 99 n. 54, ♀.
? Exetastes albitarsis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 430 n. 27, ♀ ♂.
Lissonota murina Herrich-Schaeffer, Faun. Insect. German. 1830 P. 116; T. 23 (♀).
? Tryphon albitarsorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 385 n. 7, ♀ ♂.
Meniscus murinus Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 11, nota.

---

[1]) *Hymen.:* Xiphydria dromedarius (Rudow).

[2]) *Lep.:* Sesia formicaeformis, S. spheciformis, Tapinostola elymi (Brischke), Bombyx quercus (Giraud), Carpocapsa complana (Rondani).

[3]) *Lep.:* Noctua gothica (Boie). — *Hymen.:* Chrysis neglecta ad Odynerus spinipes (Bignell).

Lissonota murina Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 511 n. 21, ♀.
Lissonota murina Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 92 n. 3, ♀.
Meniscus murinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 62 n.5, ♀ ♂.
Meniscus murinus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 289 n. 8, ♀ ♂.
Lissonota murina Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 763 n. 14.
Alloplasta murina Schmiedeknecht, Zool Jahrb. III. 1888 p. 440.
Lissonota murina Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1419 n. 17.
Meniscus (Amersibia) variipes Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 18 & 36 n. 88, ♀.
Meniscus murinus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 353 n. 2, ♀ ♂.

orbitalis Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Meniscus orbitalis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1875 p. 114 n. 4, ♀.

ostentator Davis — ♀ — Am.: Michigan.
Meniscus ostentator Davis, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 321, ♀.

quadricinctus Ashm. — ♂ — Am.: Ohio.
Meniscus quadricinctus Ashmead, Journ. Cincinnati Soc. XVII. 1895 p. 50 n. 9, ♂.

scapularis Kriechb. — ♀ — Eur.: Hungaria.
? Lissonota impressor var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 50 n. 27, ♀.
Meniscus scapularis Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 483, ♀.
Meniscus scapularis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 357 n. 11, ♀.

scutellaris (Cress.) Prov.[1] — ♀ — Am.: Canada, Virginia, Florida.
Lampronota scutellaris Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 161 n. 2, ♀.
Lampronota scutellaris Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 116, ♀.
Meniscus Crevieri Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 29, ♀.
Meniscus scutellatus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 79 n. 2, ♀.
Meniscus scutellatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 482 n. 2, ♀.

setosus (Fourcr.) Holmgr.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 324 n. 6.
Ichneumon setosus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 395 n. 6.
Ichneumon setosus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 206 n. 1.
Pimpla setosa Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 290.
Lissonota setosa Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 35 n. 14, ♀ ♂.
Pimpla (Lissonota) setosa Bouché, Naturg. d. Insect. 1834 p. 244 n. 15; T. 7 F. 12 & 13.
Pimpla (Lissonota) setosa Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 317 n. 3.
Lampronota setosus Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 59.
Ichneumon (Lissonota) setosa Ratzeburg, Forstinsecten III. 1844 p. 26 n. 18; T. 6 F. 7.
Lissonota setosa Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 109 n. 1; T. 6 F. 7.
Lissonota setosa Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 501 n. 7, ♀ ♂.
Meniscus setosus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 129 n. 17.
Meniscus setosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 61 n. 1, ♀ ♂.
Meniscus setosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 288 n. 1, ♀ ♂.
Meniscus setosus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 195, ♀ ♂.
Meniscus setosus Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 22, ♀; T. 14 F. 5.
Lissonota setosa Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 763 n. 12.
Lissonota setosta Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1419 n. 12.
Meniscus setosus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 354 n. 3, ♀ ♂.

signatus Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Meniscus signatus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 19 & 37 n. 90, ♀.
Meniscus signatus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 355 n. 6, ♀.

---

1) *Lep.:* Gelechia pseudacaciella (Chambers).
2) *Lep.:* Cossus ligniperda (Bouché).

slossonae Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Meniscus Slossonae Davis, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 322, ♀.
subflavus Davis — ♀ ♂ — Am.: Texas.
Meniscus subflavus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 371, ♀ ♂.
superbus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Meniscus superbus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 30, ♀.
Meniscus superbus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 78 n. 1, ♀.
Meniscus superbus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 482 n. 1, ♀.

SIBIRIAKOFFIA

Holmgren, Nov. spec. Insect. 1881 p. 13.
Sibiriakoff, nom. propr.

arctica Holmgr. — ♀ ♂ — As.: Novaja Semlia.
Sibiriakoffia arctica Holmgren, Nov. spec. Insect. 1881 p. 14.
Sibiriakoffia arctica Holmgren, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 160 n. 42, ♀ ♂.

LISSONOTA

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 30 n. 2.
λισσός, laevis; *νῶτος*, dorsum.

Synon.: Asphragis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 166 n. 1.
ἀ-priv.; *σφραγίς*, sigillum.
Ensimus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 167 n. 8.
ἔνσιμος, paullulum incurvus.
Eusimus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 212.
Ensimus, nom. propr. Hymen. [err. typogr.].
Cryptus Desvignes.
Ichneumon Fabricius & auct. ant.
Pimpla Fabricius, Gravenhorst.
Tryphon Gravenhorst, Stephens, Zetterstedt.

accusator (Fabr.) Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon accusator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 172 n. 161, ♀.
Pimpla accusator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 117 n. 21.
Ichneumon accusator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♀.
Pimpla accusator Panzer, Faun. Insect. German. X. 1812 P. 109; T. 12.
Ichneumon accusator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon accusator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 340.
Lissonota accusator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 101 n. 57, ♀.
Lissonota accusator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. X. 1863 p. 290, ♀ nota.
Lissonota accusator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 124, ♀.
Asphragis accusator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 434.
Lissonota accusator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 389 n. 65, ♀.
acrobasidis (Ashm.) D. T.[1]) — ♂ — Am.: Ohio.
Eusimus acrobasidis Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 212, ♂.
Lissonota acrobasidis m.
affinis Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Lissonota affinis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 191, ♀ ♂.

[1]) *Lep.:* Acrobasis indiginella (Ashmead).

albicoxis Kriechb.[1]) — ♀ — Eur.: Austria inf.
Lissonota albicoxis Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 35, ♀.
Lissonota albicoxis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 359 n. 3, ♀.
albipicta Smith — ♀ ♂ — Austr.: New Zealand.
Lissonota albopicta Smith, Trans. Entom. Soc. London 1878 p. 4, ♀ ♂.
Lissonota albopicta Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 129.
albispina Cam. — ♀ — Am.: Panama.
Lissonota albispina Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 273 n. 1, ♀; T. 11 F. 19.
angusta Taschbg. — ♀ — Eur.: Germania.
Lissonota angusta Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 285 n. 20, ♀.
Lissonota angusta Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 372 n. 29, ♀.
annulata Brullé — ♀ ♂ — Afr.: Cap.
Lissonota annulata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 109 n. 1, ♀ ♂.
antennalis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Lissonota antennalis Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 765 n. 20, ♀.
Lissonota antennalis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1423 n. 32.
Lissonota antennalis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 376 n. 38, ♀.
argiola Grav. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Lissonota argiola Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 83 n. 45, ♂.
Lissonota linearis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 105.
Lissonota argiola Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 93 n. 5, ♂.
Lissonota bellator var. argiola Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 92 n. 13.
Lissonota argiola Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 365 n. 14, ♂.
artemisiae Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria.
Lissonota artemisiae Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 41, ♀ ♂.
Lissonota artemisiae Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 383 n. 54, ♀ ♂.
assimilis Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Lissonota assimilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 124, ♂.
Lissonota assimilis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 392 n. 10, ♂.
atropos Schmkn. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Lissonota atropos Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 360 n. 6, ♀.
basalis Brischke[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Lissonota basalis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 192, ♀ ♂.
Lissonota basalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 123, ♀ ♂.
Lissonota basalis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 359 n. 4, ♀ ♂.
bellator Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 65 n. 262.
? Ichneumon coracinus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2704 n. 317.
Ichneumon bellator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 258 n. 3743.
Lissonota bellator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 106 n. 60, ♀ ♂ [p. p.].
Lissonota bellator Herrich-Schaeffer, Faun. Insect. German. 1830 P. 117; T. 12 (♂).
Lissonota bellator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 384 n. 4, ♀ [p. p.].
Lissonota bellator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 513 n. 24, ♀ ♂.
Lissonota bellator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 49 n. 3, ♀ ♂ var.
Lissonota bellator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 284 n. 14, ♀ ♂.
Lissonota bellator Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 765 n. 21, ♀ ♂.
Lissonota bellator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 118, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.*: Eupithecia actaeata (Kriechbaumer).
[2]) *Lep.*: Hadena suffuruncula, Tapinostola elymi (Brischke).

Lissonota bellator Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1421 n. 21.
Lissonota bellator Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 309.
Lissonota bellator Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 16 & 34 n. 82, ♂.
Lissonota bellator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 365 n. 15, ♀ ♂.

var. **arvicola** Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Lissonota arvicola Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 49 n. 26, ♂.
Lissonota arvicola Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect I. 1844 p. 98 n. 5, ♀ ♂.
Lissonota bellator var. arvicola Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 366, ♂.

bifasciata Brullé — ♀ — Am. mer.
Lissonota bifasciata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 110 n. 3, ♀.

biguttata Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Lissonota biguttata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 55 n. 19, ♀.
Lissonota biguttata Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 767 n. 26, ♀ ♂.
Lissonota biguttata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1422 n. 27.
Lissonota biguttata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 378 n. 43, ♀.

bilineata (Ashm.) D. T. — ♀ — Am.: Grenada.
Asphragis bilineata Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 269 n. 175, ♀.
Lissonota bilineata m.

bipartita Costa — ♂ — Eur.: Sardinia.
Lissonota bipartita A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p. 19, ♂.
Lissonota bipartita A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 115, ♂.

bistrigata Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Italia.
Lissonota bistrigata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 54 n. 17, ♀.
Lissonota bistrigata A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p. 20, ♂.
Lissonota bistrigata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 378 n. 42, ♀.

bivittata Grav. — ♀ — Eur.: Italia.
Lissonota bivittata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 77 n. 41, ♀.
Lissonota bivittata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 391 n. 6, ♀.

breviseta Ratzbg.[2]) — ♀ — Eur.: Germania.
Lissonota breviseta Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 106 n. 5, ♀.

buolianae Htg.[3]) — ♀ — Eur.: Germania.
Lissonota Buolianae Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. 1838 p. 267, ♀.
Lissonota Buolianae Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 109 n. 2, ♀.
Lissonota Buolianae Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 105 n. 2.

capensis Holmgr. — ♀ — Afr.: Cap.
Lissonota Capensis Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 408 n. 37, ♀.

carbonaria Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Lissonota carbonaria Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 54 n. 15, ♀.
Lissonota carbonaria Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 192, ♀ ♂.
Lissonota carbonaria Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 397 n. 18, ♀.
Lissonota carbonaria Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. XIII. 1900 p. 381 n. 50, ♀.

carinifrons Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Lissonota carinifrons Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 768 n. 28, ♀ ♂.
Lissonota carinifrons Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1425 n. 40.
Lissonota carinifrons Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 385 n. 58, ♀ ♂.

catagrapha Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Lissonota catagrapha Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 331 n. 1, ♀.

---

1) *Col.:* Anobium (Ratzeburg).
2) *Hymen.:* Lophyrus pini — *Hymen.:* Tortrix cerasana (Ratzeburg).
3) *Lep.:* Coccyx buoliana (Ratzeburg).

clypealis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Lissonota clypealis Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 769 n. 32, ♀.
Lissonota clypealis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1423 n. 30.
Lissonota clypealis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 375 n. 35, ♀ ♂.
clypearis Costa — ♀ — Eur.: Sardinia.
Lissonota clypearis A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p. 20, ♀.
Lissonota clypearis A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 116, ♀.
cognata Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Lissonota cognata Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 515 n. 27, ♂.
commixta Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Lissonota bellator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 106 [p. p.].
Lissonota commixta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 50 n. 4, ♀ ♂ var.
Lissonota commixta Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 766 n. 22, ♀.
Lissonota commixta Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 118, ♀ ♂.
Lissonota commixta Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1421 n. 23.
Lissonota commixta Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 364 n. 13, ♀ ♂.
Lissonota commixta Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 309.
compar Fonsc. — ♀ — Eur.: Gallia.
Lissonota compar Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 510 n. 20, ♀.
crassipes Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Lissonota crassipes Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 772 n. 38, ♀.
Lissonota crassipes Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1418 n. 11.
Lissonota crassipes Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 358 n. 2, ♀.
cribrosa Kriechb. — ♀ — Afr. occ.
Lissonota cribrosa Kriechbaumer, Berlin. deutsch. entom. Zeitschr. XXXVIII. 1894 p. 52 n. 15, ♀.
cruenta Vollenh. — Eur.: Batavia.
Lissonota cruenta Vollenhoven, Herklots Bouwstoffen II. 3. 1858 p. 281 n. 269.
culiciformis Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Lissonota culiciformis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 66 n. 35, ♂.
Lissonota lateralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 73 n. 39, ♀.
Lissonota culiciformis Bouché, Stettin. entom. Zeitg. VIII. 1847 p. 164.
Lissonota culiciformis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 60 n. 31, ♂.
Lissonota culiciformis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 282 n. 4, ♂.
Lissonota lateralis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 283 n. 8, ♀.
Lissonota culiciformis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 195, ♂.
Lissonota lateralis Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 397 n. 19, ♂.
Lissonota lateralis Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 766 n. 24, ♀ ♂.
Lissonota lateralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 121, ♀.
Lissonota culiciformis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 124, ♂.
Lissonota lateralis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1422 n. 24.
Lissonota lateralis Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 17 & 36 n. 83, ♂.
Lissonota culiciformis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 370 n. 26, ♀ ♂.
cylindrator (Fabr.) Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon cylindrator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 267 n. 101.
Ichneumon cylindrator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 180 n. 136.
Ichneumon cylindrator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2694 n. 156.
Ichneumon cylindrator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 191 n. 139.

---

[1]) *Lep.:* Penthina ocellana (Rondani).
[2]) *Lep.:* Tapinostola elymi (Brischke), Eubolia mensuraria (Rondani). — *Dipt.:* Noctua airae, Tachina viridis (Boie).

Ichneumon cylindrator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 171 n. 160.
Pimpla cylindrator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 117 n. 20.
Pimpla cylindrator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 290.
Ichneumon cylindrator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 268.
Ichneumon cylindrator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 329.
Lissonota cylindrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 102 n. 58, ♀ ♂.
Lissonota cylindrator Herrich-Schaeffer, Faun. Insect. German. 1830 P. 116; T. 22 (♀).
Lissonota cylindrator Boie, Stettin. entom. Zeitg. XI. 1850 p. 359 n. 16, ♀.
Lissonota cylindrator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 512 n. 23, ♀♂.
Lissonota cylindrator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 93 n. 6, ♀♂.
Lissonota cylindrator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 51 n. 5, ♀♂.
Lissonota cylindrator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 284 n. 15, ♀♂.
Lissonota cylindrator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 190, ♀♂.
Lissonota cylindrator Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 762 n. 11.
Lissonota cylindrator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 119, ♀♂.
Lissonota cylindrator Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1416 n. 10.
Lissonota cylindrator Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 13 & 32 n. 76, ♂.
Lissonota cylindrator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 361 n. 7, ♀ ♂.

deversor Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Lissonota deversor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 59 n. 32, ♀ ♂.
Lissonota deversor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 283 n. 9, ♀♂.
Lissonota deversor Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 193, ♀♂.
Lissonota deversor Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 163, ♀ ♂.
Lissonota deversor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 19, ♀.
Lissonota deversor Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 386 n. 59, ♀ ♂.

distincta Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Lissonota distincta Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 437, ♀.
Lissonota distincta Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 381 n. 49, ♀.

dorsalis Grav. — ♀ — Eur.: Gallia.
Lissonota dorsalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 78 n. 42, ♀.
Lissonota dorsalis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 505 n. 12, ♀.
Lissonota dorsalis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 392 n. 7, ♀.

dorsata D. T. — ♂ — Afr.: Madeira.
Lissonota dorsalis Wollaston, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) I. 1858 p. 23, ♂; T. 4 F. 5 [non Grav.].
Lissonota dorsata m.

dubia Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Lissonota dubia Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 94 n. 12, ♂.
Lissonota dubia Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 58 n. 28, ♀ ♂.
Lissonota dubia Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 194, ♀ ♂.
Lissonota dubia Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 770 n. 34, ♀ ♂.
Lissonota dubia Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1424 n. 37.
Ensimus dubia Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 438.
Lissonota dubia Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 380 n. 47, ♀ ♂.

electa Tosqu. — ♀ — Afr.: Scioa.
Lissonota electa Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 333 n. 2, ♀.

errabunda Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Lissonota errabunda Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 58 n. 27, ♀.
Lissonota errabunda Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 194, ♂.
Lissonota errabunda Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 761 n. 7.
Lissonota errabunda Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 122, ♂.
Lissonota errabunda Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1247 n. 2.

Ensimus errabunda Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 438.
Lissonota errabunda Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1416 n. 1.
Lissonota errabunda Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 18 & 36 n. 87, ♀.
Lissonota errabunda Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 382 n. 53, ♀ ♂.

erythrina Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Lissonota erythrina Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 52 n. 10, ♀.
Lissonota erythrina Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 191, ♀.
Lissonota erythrina Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 367 n. 19, ♀.

erythropoda Cam. — ♀ — Am.: Guatemala.
Lissonota erythropoda Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 274 n. 3, ♀.

excelsa Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Lissonota excelsa Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 376 n. 39, ♀.

exsculpta Fonsc. — ♀ — Eur.: Gallia.
Lissonota exsculpta Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 509 n. 18, ♀.

femorata Holmgr. — ♀ — Eur.: Britannia, Suecia.
Lissonota femorata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 55 n. 20, ♀.
Lissonota femorata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 358 n. 1, ♀.

fissa Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Lissonota fissa Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 194, ♂.

flavipes Luc. — ♂ — Afr.: Algeria.
Lissonota flavipes Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 325 n. 380, ♂.

flavopicta Smith — ♀ ♂ — Austr.: New Zealand.
Lissonota flavopicta Smith, Trans. Amer. Entom. Soc. London 1878 p. 4, ♂.
Lissonota flavopicta Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 129, ♀ ♂.

fletcheri Bridgm.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Lissonota Fletcheri Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 163, ♀ ♂.
Lissonota Fletcheri Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 380 n. 46, ♀ ♂.

folii Thoms.[2]) — ♀ — Eur.: Suecia.
Lissonota folii Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 771 n. 37, ♀.
Lissonota folii Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1425 n. 42.
Lissonota folii Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 387 n. 60, ♀.

formosa Bridgm.[3]) — ♀ — Eur.: Britannia.
Lissonota formosa Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1887 p. 378, ♀.
Lissonota formosa Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 369 n. 23, ♀.

fracta Taschbg. — ♀ — Eur.: Germania.
Lissonota fracta Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 285 n. 18, ♀.
Lissonota fracta Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 314.

frontalis Desv. — ♂ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Lissonota) frontalis Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 78 n. 11, ♂.

fulvipes Desv. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Lissonota) fulvipes Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 78 n. 10, ♀ ♂.

gracilenta Holmgr. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Lissonota gracilenta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 57 n. 26, ♀.
Lissonota gracilenta Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 382 n. 52, ♀.

---

1) *Lep.:* Gelechia lentiginosella (Fletcher).
2) *Hymen.:* Cynips quercus folii (Thomson).
3) *Lep.:* Rhodophaea consociella?, Nephopteryx genistella? (Porritt).

gracilipes Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Lissonota gracilipes Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 770 n. 33, ♀.
Lissonota gracilipes Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1423 n. 31.
Lissonota gracilipes Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 375 n. 36, ♀.
halidayi Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Lissonota Halidayi Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 59 n. 29, ♀.
Lissonota Halidayi Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 368 n. 20, ♀.
heterodoxa Fonsc. — ♀ — Eur.: Gallia.
Lissonota heterodoxa Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 511 n. 22, ♀.
hortorum Grav.[1]) — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
—— Degeer, Mém. hist. Insect. II. 1. 1771 p. 884 n. 1.
—— Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 165 n. 1.
? Ichneumon resinosus Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 67 n. 264.
? Ichneumon ventrifascius Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 288 n. 2098, ♀.
Lissonota hortorum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 47 n. 25, ♀.
Lissonota hortorum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 109 n. 3, ♀.
Lissonota hortorum Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 93 n. 9, ♀.
Lissonota hortorum Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 390 n. 2, ♀.
humerella Thoms. — ♀ — Eur.: Oelandia.
Lissonota humerella Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 771 n. 36.
Lissonota humerella Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1425 n. 41.
Lissonota humerella Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 388 n. 63, ♀.
hungarica Schmkn. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Lissonota Hungarica Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 375 n. 37, ♀.
inaequalis Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Lissonota inaequalis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 507 n. 16, ♂.
insignita Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Lissonota insignata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 84 n. 46, ♂.
Lissonota verberans Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 93 n. 50, ♀.
Lissonota insignita Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 507 n. 15, ♂.
Lissonota verberans Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 508 n. 17, ♀.
Lissonota verberans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 51 n. 7, ♀.
Lissonota insignita Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 282 n. 6, ♂.
Lissonota verberans Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 285 n. 16, ♀.
Lissonota verberans Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 764 n. 19, ♀ ♂.
Lissonota verberans Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1420 n. 20.
Lissonota verberans Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 71 n. 10, ♀ ♂.
Lissonota verberans Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 13 & 32 n. 73, ♀ ♂.
Lissonota insignita Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 363 n. 10, ♀ ♂.
irrigua Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Lissonota irrigua Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1248 n. 3, ♀ ♂.
Lissonota irrigua Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1421 n. 22.
Lissonota irrigua Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 367 n. 17, ♀ ♂.
lapponica Holmgr. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Lissonota Lapponica Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 51 n. 6, ♀.
Lissonota Lapponica Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 364 n. 12, ♀.
leptogaster Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [excl. ♂].
? Lissonota caligata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 53 n. 13, ♀

1) *Lep.:* Coccyx resinana (Ratzeburg).

Lissonota leptogaster Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 55 n. 18, ♂.
Lissonota leptogaster Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 369.
Lissonota leptogaster Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1417 n. 6.

leucogona Grav. — ♀ — Eur.: Britannia.
Lissonota leucogona Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 100 n. 55, ♀.
Lissonota leucogona Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 167.
Lissonota leucogona Bloomfield, Entom. M. Magaz. XVII. 1881 p. 258.
Lissonota leucogona Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 391 n. 5, ♀.

leucopoda Cam. — ♀ ♂ — Am.: Panama. [T. 11 F. 20.
Lissonota leucopoda Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 275 n. 5, ♀♂;

leucozona Cam. — ♀ — Am.: Guatemala.
Lissonota leucozona Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 273 n. 2, ♀.

linearis Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Lissonota linearis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 105 n. 59, ♀.
Lissonota linearis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 119, ♀.
Lissonota linearis Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 162, ♀.
Asphragis linearis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 434.
Lissonota bicincta Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 18 & 36 n. 85, ♀.
Lissonota linearis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 388 n. 64, ♀ ♂.

lineata Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Gallia, Belgia.
Lissonota lineata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 82 n. 44, ♂.
Lissonota lineata Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 505 n. 13, ♂.
Lissonota lineata Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 189, ♀.
Lissonota lineata Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 372, ♀.
Lissonota lineata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1420.
Lissonota lineata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 363 n. 11, ♀ ♂.

maculata Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Lissonota maculata Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 190, ♂.
Lissonota maculata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 119, ♀.
Lissonota maculata Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 311.
Lissonota maculata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 379 n. 45, ♀.

maculipes Cam. — Am.: Brasilia.
Lissonota maculipes Cameron, Proc. Manchester Philos. Soc. XXVI. 1888 p. 131.

marginalis (Fourcr.) D. T.! — ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 348 n. 60.
Ichneumon marginalis Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 414 n. 61.
Ichneumon limbarius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 172 n. 38.
Ichneumon limbarius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 54 n. 26.
Ichneumon limbarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 944 n. 97.
Lissonota limbaria Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 504 n. 11, ♂.
Lissonota marginalis m.

marginella Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Lissonota marginella Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 41 n. 19, ♂.
Lissonota marginella Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 122, ♂.
Lissonota marginella Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 390 n. 1, ♂.

melania Holmgr.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Lissonota melania Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 54 n. 16, ♀.

---

[1] *Lep.:* Crambus contaminellus (Fletcher, Porritt).
[2] *Lep.:* Tortrix spec. (Brischke).

Lissonota melania Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 192, ♀ ♂.
Lissonota melania Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 771 n. 35, ♀.
Lissonota melania Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 121, ♀ ♂.
Lissonota melania Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1425 n. 39.
Lissonota melania Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 382 n. 51, ♀.

multicolor Col. — Austr.
Lissonota multicolor Colenso, Trans. New Zealand Instit. XVII. 1885 p. 159.

mutanda Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Lissonota basalis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1424 n. 34, ♀ ♂ [non **Brischke**].
Lissonota mutanda Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 377 n. 41, ♀ ♂.

nigra Brischke[1]) — ♀ — Eur.: Germania.
Lissonota nigra Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 123, ♀.
Lissonota nigra Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 381 n. 48, ♀.

nigridens Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Lissonota nigridens Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1425 n. 38, ♀ ♂.
Lissonota nigridens Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 385 n. 57, ♀ ♂.

nitida Bridgm.[2]) — ♀ — Eur.: Britannia.
Lissonota nitida Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 371, ♀.
Lissonota nitida Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 367 n. 18, ♀.

notabilis Desv. — ♂ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Lissonota) notabilis Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 79 n. 16, ♂.

obsoleta Bridgm.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Lissonota obsoleta Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 436, ♀ ♂.
Lissonota obsoleta Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 378 n. 44, ♀ ♂.

occupator Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Lissonota occupator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 100 n. 56, ♀.
Echthrus occupator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 200.
Asphragis occupator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 434.
Lissonota occupator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 390 n. 66, ♂.

opacula Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Lissonota opacula Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 15 & 34 n. 81, ♂.

pallidipes Grav. — ♂ — Eur.
Lissonota pallipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 55 n. 29, ♂.
Lissonota pallipes Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 391 n. 3, ♂.

palpalis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Lissonota palpalis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1422 n. 29, ♀.
Lissonota palpalis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 373 n. 31, ♀.

parallela Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Lissonota parallela Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 79 n. 43, ♀ ♂.
Lissonota parallela Herrich-Schaeffer, Faun. Insect. German. 1830 P. 116 T. 18 (♂) & 19 (♀).
Lissonota parallela Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 92 n. 4, ♀ ♂.
Lissonota parallela Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 49 n. 2, ♀ ♂.
Lissonota parallela Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 282 n. 5, ♀ ♂.
Lissonota parallela Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 189, ♀ ♂ var.
Lissonota parallela Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 764 n. 18, ♀ ♂.
Lissonota parallela Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 118, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Coccyx buoliana (Rondani), Sesia spheciformis (Brischke).
[2]) *Lep.:* Botys asinalis (Bridgman).
[3]) *Lep.:* Psyche intermediella (Bridgman).

Lissonota parallela Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1420 n. 19.
Lissonota parallela Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 13 & 31 n. 72, ♂.
Lissonota parallela Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 362 n. 9, ♀ ♂.

var. **perspicillator** Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia, Germania.
Lissonota perspicillator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 86 n. 47, ♀ ♂.
Lissonota perspicillator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 506 n. 14, ♀ ♂.
Lissonota parallela var. perspicillator Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 92 n. 9.
Lissonota perspicillator Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 308.
Lissonota intermedia Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 13 & 32 n. 74, ♀ ♂.

picta Boie — ♀ — Eur.: Germania.
Lissonota picta Boie, Stettin. entom. Zeitg. XI. 1850 p. 359 n. 15, ♀.

picticoxis Schmkn. — ♀ — Eur.
? Lissonota lateralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 56 n. 22, ♀.
Lissonota picticoxis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 369 n. 24, ♀.

pleuralis Brische — ♀ — Eur.: Germania.
Lissonota pleuralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 120, ♀.

proxima Fonsc. — Eur.: Gallia.
Lissonota proxima Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 514 n. 25.

puberula Kriechb. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Lissonota puberula Kriechbaumer, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. IX. P. 5. 1895 p. 263, ♂.
Lissonota puberula Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 361 n. 8, ♂.

pubescens Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Lissonota pubescens Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 514 n. 26, ♂.

pulcherrima (Ashm.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: New Hampshire.
Asphargis pulcherrimus Ashmead, Proc. Entom. Soc. Washington IV. P. 2. 1897 p. 170
Lissonota pulcherrima m. [n. 69, ♀ ♂.

pulchra Cam. — Am.: Mexico.
Lissonota pulchra Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 274 n. 4.

punctiventris Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Lissonota punctiventris Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 769 n. 31 [excl. synon.].
Lissonota punctiventris Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1424 n. 36.
Lissonota punctiventris Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 384 n. 56, ♀.

punctulata Szépl. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Lissonota punctulata Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 14 & 32 n. 77, ♀ ♂.

quadrata Szépl. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Lissonota quadrata Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 14 & 33 n. 78, ♀ ♂.

quadrilineata (Grav.) Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Tryphon quadrilineatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 320 n. 207, ♀ ♂.
Tryphon quadrilineatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 263 n. 92.
Lissonota quadrilineatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 190, ♂.

quadrinotata Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Lissonota quadrinotata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 58 n. 31, ♀.
Lissonota quadrinotata Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 282 n. 7, ♀.
Lissonota quadrinotata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 391 n. 4, ♀.

quinqueangularis Brischke[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
? Lissonota quinqueangularis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 106 n. 8, ♀.
Lissonota quinqueangularis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 195, ♀ ♂.
Lissonota quinqueangularis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 122, [♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Anacampsis populella (Ratzeburg).

rimator Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Lissonota rimator Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 762 n. 9, ♀ ♂.
Lissonota rimator Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1418 n. 8.

robusta Ratzbg.[1]) — ♀ — Eur.: Germania.
Lissonota robusta Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 107 n. 10, ♀.

rubricosa Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Lissonota rubricosa Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 119, ♀.
Lissonota rubricosa Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 368 n. 21, ♀.

rufescens Boie — Eur.: Germania.
Lissonota rufescens Boie, Stettin. entom. Zeitg. XI. 1850 p. 216 n. 14.

ruficornis Grav. — ♀ — Eur.
Lissonota ruficornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 98 n. 53, ♀.
Lissonota ruficornis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 392 n. 8, ♀.

rufina Costa — ♀ — Eur.: Sardinia.
Lissonota rufina A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p. 21, ♀.
Lissonota rufina A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 116.

rufipes Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Lissonota rufipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 192, ♀.
Lissonota rufipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 120, ♀.
Lissonota rufipes Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 373 n. 30, ♀.

rufitarsis Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Lissonota rufitarsis Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 18 & 36 n. 86, ♀.
Lissonota rufitarsis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 393 n. 13, ♀.

rufomedia Bridgm.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Lissonota rufomedia Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 370, ♀ ♂.

scabra Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Lissonota scabra Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 123, ♂.
Lissonota scabra Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 392 n. 9, ♂.

segmentator (Fabr.) Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia, Germania.
Ichneumon segmentator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 163 n. 124, ♀.
Pimpla segmentator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 114 n. 8, ♀.
Pimpla segmentator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 290.
Ichneumon sector Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 267 [sec. typ.].
Ichneumon segmentator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon sector Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 328 [sec. typ.].
Ichneumon segmentator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 340.
Lissonota segmentator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 52 n. 28, ♀ ♂ [excl. varr.].
Tryphon segmentator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 384 n. 5, ♀ ♂.
Lissonota segmentator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 57 n. 24, ♀ ♂.
Lissonota segmentator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 285 n. 17, ♀ ♂.
Lissonota segmentator Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 397 n. 20, ♀.
Lissonota segmentator Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 769 n. 30, ♀ ♂.
Lissonota segmentator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 121, ♀ ♂.
Ensimus segmentator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 438.
Lissonota segmentator Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1424 n. 35.
Lissonota segmentator Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 314
Lissonota segmentator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 384 n. 55, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Coccyx buoliana (Ratzeburg).
2) *Lep.:* Eudora murana, E. mercurella, Crambus contaminellus (Fletcher).

semirufa Desv. — ♀ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Lissonota) semirufa Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 81 n. 24, ♀.
Lissonota semirufa Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 93 n. 24.
semistriata Walk. — ♀ — As.: Japonia.
Lissonota semistriata Walker, Cistula entom. I. P. 11. 1874 p. 305 n. 10, ♀.
sternalis Costa — ♂ — Eur.: Sardinia.
Lissonota pectoralis A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli 1885 p. 171, ♂ [non Gravenhorst].
Lissonota pectoralis A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 13. 1885 p. 26, ♂.
Lissonota sternalis A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p. 20.
strigifrons Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Lissonota strigifrons Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 370 n. 25, ♀.
subaciculata Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Lissonota subaciculata Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 372, ♀.
Lissonota subaciculata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 366 n. 16, ♀.
sulphurifera Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Lissonota sulphurifera Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 39 n. 18, ♀ ♂.
Lissonota sulphurifera Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 53 n. 14, ♀♂.
Lissonota sulphurifera Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 286 n. 23, ♀♂.
Lissonota sulphurifera Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 192, ♀♂.
Lissonota sulphurifera Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 762 n. 10, ♀ ♂.
Lissonota sulphurifera Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 120, ♀♂.
Lissonota sulphurifera Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1418 n. 9.
Lissonota sulphurifera Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 312.
Lissonota sulphurifera Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 13 & 32 n. 75, ♀.
Meniscus caudatus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 19 & 37 n. 91, ♀.
Meniscus affinis Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 19 & 37 n. 92, ♂.
Lissonota sulphurifera Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 359 n. 5, ♀ ♂.
szépligetii D. T. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Lissonota annulata Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 14 & 33 n. 79, ♀ [non Brullé].
Lissonota annulata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 393 n. 11, ♀.
Lissonota Szépligetii m.
tenerrima Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia. [non Gravenhorst].
Lissonota impressor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 59 n. 3, ♀ (♂?)
Lissonota tenerrima Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 766 n. 23, ♀.
Lissonota tenerrima Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1422 n. 26.
Lissonota tenerrima Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 372 n. 28, ♀.
thomsonii Schmkn. — ♀ — Eur.: Suecia.
Lissonota unicincta Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 767 n. 27, ♀ [non Holmgren].
Lissonota unicincta Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1422 n. 28, ♀.
Lissonota Thomsoni Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 373 n. 32, ♀.
thoracica Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Lissonota thoracica Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 109 n. 2, ♀.
tinctipennis Cam. — ♀ — Austr.
Lissonota tinctipennis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 P. 1. p. 28, ♀.
tongana Kriechb. — ♀ — Afr.: Tonga.
Lissonota Tongana Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 n. 305 n. 17, ♀.
transversa Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Lissonota transversa Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 438, ♀.
Lissonota transversa Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 387 n. 61, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Hadena suffuruncula (Brischke).

tristis Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Lissonota tristis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 1. 1888 p. 57, ♂.

trochanteralis D. T. — ♀ — Eur.: Britannia.
Lissonota trochanterata Bridgmann, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 438, ♀ [non Holmgr.].
Lissonota trochanterata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 374 n. 34, ♀.
Lissonota trochanteralis m.

trochanterata Holmgr. — ♀ — Afr.: Cap.
Lissonota trochanterata Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 407 n. 36, ♀.

unicincta Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Lissonota unicincta Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 56 n. 23, ♀.
Lissonota unicincta Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 193, ♀.
Lissonota unicincta Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 17 & 36 n. 84, ♀.
Lissonota unicincta Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 374 n. 33, ♀.

vaga Szépl. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Lissonota vaga Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 15 & 33 n. 80, ♂.
Lissonota vaga Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 393 n. 12, ♂.

variabilis Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Lissonota lateralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 94 n. 11, ♀ [non Gravenhorst].
Lissonota variabilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 56 n. 21, ♀ ♂.
Lissonota variabilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 121, ♀♂.
Lissonota variabilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VI. P. 2. 1885 p. 23.
Lissonota variabilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 1. 1888 p. 57, ♂.
Lissonota variabilis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 371 n. 27, ♀ ♂.

variegata Fonsc. — ♀ — Eur.: Gallia.
Lissonota variegata Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 503 n. 10, ♀.

varilcoxa Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Lissonota varicoxa Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 768 n. 29, ♀.
Lissonota varicoxa Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1425 n. 43, ♀.
Lissonota varicoxa Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 388 n. 62, ♀ ♂.

varilpes Desv. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Lissonota) varipes Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 81 n. 25, ♀ ♂.

versicolor Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Lissonota versicolor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 60 n. 32, ♀.
Lissonota versicolor Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 767 n. 25, ♀.
Lissonota versicolor Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1422 n. 25.
Lissonota versicolor Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 369 n. 22, ♀.

vicina Holmgr.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Lissonota vicina Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 57 n. 25, ♀.
Lissonota vicina Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 122, ♀♂.
Lissonota vicina Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 438.
Lissonota vicina Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1423 n. 33, ♀ ♂.
Lissonota vicina Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 377 n. 40, ♀ ♂.

xanthopyga Holmgr. — ♂ — Am.: Patagonia.
Lissonota xanthopyga Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 408 n. 38, ♂.

---

1) *Lep.:* Earias chlorana (Brischke).
2) *Lep.:* Tortrix spec. (Brischke).

SYZEUCTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 167 n. 9.
συζεύγνυμι, conjungo.

Synon.: Syzeucta Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1415.
Bassus Fabricius, Gravenhorst.
Ichneumon Fabricius & auct.
Lissonota Gravenhorst & auct.
Pimpla Blanchard.

apicalis (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Lissonota apicalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 88 n. 48, ♂.
Lissonota petiolaris Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 110 n. 61, ♀.
Lissonota petiolaris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 52 n. 9, ♀.
Lissonota petiolaris Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 283 n. 10, ♀♂.
Lissonota petiolaris Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 759 n. 2, ♀.
Lissonota (Syzeucta) petiolaris Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1415 n. 2.
Syzeuctus apicalis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 351 n. 13, ♀ ♂.

bicolor Szépl. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Syzeuctus bicolor Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 12 & 31 n. 70, ♀ ♂.
Syzeuctus bicolor Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 350 n. 11.

braunsii Szépl. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Lissonota lunigera Brauns, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VIII. P. 1. 1888 p. 2, ♀ [excl. ♂].
Syzeuctus Braunsii Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 12 & 31 n. 71, ♀ ♂.
Syzeuctus Braunsii Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 348 n. 7, ♀ ♂.

decoratus (Costa) Schmkn. — ♀ — As.: Armenia.
Lissonota decorata A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli (2) IV. 1890 p. 174.
Lissonota decorata A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) IV. P. 5. 1890 p. 17; T. 3 F. 8.
Syzeuctus decoratus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 350 n. 12, ♀.

elegans Szépl. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Syzeuctus elegans Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 12 & 30 n. 69, ♀.
Syzeuctus elegans Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 349 n. 9, ♀.

heluanensis Schmkn. — ♀ — Afr.: Aegyptus.
Syzeuctus Heluanensis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 345 n. 3, ♀.

irrisorius (Rossi) Schmkn.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Italia.
Ichneumon irrisoria Rossi, Mant. Insect. II. 1794 App. p. 82.
Lissonota irrisoria Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 65 n. 34, ♀ ♂.
Lissonota irrisoria Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 281 n. 2, ♀♂.
Lissonota irrisoria Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 189, ♀ ♂.
Lissonota irrisoria Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 118, ♀♂.
Syzeuctus irrisorius Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 349 n. 10, ♀ ♂.

luniger (Brauns) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia; As.: Armenia.
Lissonota lunigera Brauns, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VIII. P. 1. 1888 p. 2, ♀ [excl. ♂].
Lissonota ducalis A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli (2) IV. 1890 p. 174.
Lissonota ducalis A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) IV. P. 5. 1890 p. 16; T. 3 F. 7.
Syzeuctus luniger Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 347 n. 6, ♀ ♂.

maculatorius (Fabr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon maculatorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 261 n. 25.
Ichneumon maculatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 152 n. 51.

---

[1]) *Lep.:* Talpochares pannonica, Sesia cynipiformis (Mocsáry).

Ichneumon maculatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2681 n. 95.
Ichneumon maculatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 172 n. 39.
Ichneumon maculatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 144 n. 44.
Bassus maculatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 96 n. 9.
Ichneumon maculatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♀.
Bassus maculatorius Gravenhorst, Magaz. f. Entom. IV. 1821 p. 266 n. 6, ♀ ♂.
Ichneumon maculatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Ichneumon maculatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 359.
Lissonota maculatoria Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 60 n. 33, ♀ ♂.
Lissonota maculatoria Herrich-Schaeffer, Faun. Insect. German. 1830 P. 116; T. 24 (♂).
Pimpla (Lissonota) maculatoria Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 317 n. 4.
Lissonota maculatoria Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 501 n. 9, ♀ ♂.
Lissonota maculatoria Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 281 n. 1, ♀ ♂.
Lissonota maculatoria Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 759 n. 1.
Lissonota maculatoria Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 118, ♀ ♂.
Syzeuctus maculatorius Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 439.
Lissonota (Syzeucta) maculatoria Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1415 n. 1.
Lissonota (Syzeucta) maculatoria Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2128 n. 1.
Syzeuctus maculatorius Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 12 & 30 n. 68, ♀.
Syzeuctus maculatorius Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 344 n. 1, ♀ ♂.

maculipennis (Costa) Schmkn. — ♀ — Eur.: Sardinia.
Lissonota maculipennis A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. 1883 p. 101, ♀.
Lissonota maculipennis A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1884 p. 338.
Syzeuctus maculipennis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 349 n. 8, ♀.

multipictus (Kriechb.) Schmkn. — (♀) ♂ — Eur.: Helvetia.
Lissonota multipicta Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. IX. P. 5. 1895 p. 264, ♀ ♂.
Syzeuctus multipictus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 346 n. 4, (♀) ♂.

punctiventris Thoms. — ♀ — Eur.: Germania, Litorale.
Lissonota (Syzeucta) maculatoria var. Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2128 n. 1.
Lissonota (Syzeucta) punctiventris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2128 n. 2, ♀.
Syzeuctus tenuifasciatus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 345 n. 2, ♀.

steckii (Brauns) Schmkn. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Lissonota Steckii Brauns, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VIII. P. 1. 1888 p. 1, ♀.
Syzeuctus Stecki Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 347 n. 5, ♀.

ENSIMUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 167 n. 8.
ἔνσιμος, paullulum incurvus.
Vide genus Lissonota.

DICERATOPS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 167 n. 7.
δίκερος, bicornis; *ὄψ*, visus.

Synon.: Lissonota Gravenhorst & auct.
Pimpla Gravenhorst.
Syzeucta Thomson.

bicornis (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Pimpla bicornis Gravenhorst, Beitr. z. Entom. Schles. I. 1829 p. 23 n. 13, ♀ ♂; T. 1 F. 14.
Lissonota bicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 91 n. 49, ♀ ♂.
Lissonota bicornis Herrich-Schaeffer, Faun. Insect. German. 1830 P. 116; T. 20 (♂) & 21 (♀).

Lissonota bicornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 283 n. 11, ♀ ♂.
Lissonota bicornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 190, ♂.
Lissonota bicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 119, ♀ ♂.
Diceratops bicornis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 438.
Lissonota (Syzeucta) bicornis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1415 n. 3, ♀.
Diceratops bicornis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 351 n. 1, ♀ ♂.

CRYPTOPIMPLA

Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 292 n. 12.
κρύπτω, abscondo; Pimpla, nom. propr. Hymen.

Synon.: Aphanodon Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 166 n. 4.
ἀφανής, obscurus; ὀδοῦς, dens.
Lissonota Brischke.
Phytodietus Gravenhorst.

anomala (Holmgr.) Schmkn.[1] — ♀ — Eur.: Britannia, Suecia.
Lissonota anomala Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 52 n. 11, ♀.
? Lissonota anomala Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 162, ♀.
Cryptopimpla anomala Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 338 n. 6, ♀.

blanda (Grav.) Taschbg. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Phytodietus blandus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 932 n. 315, ♀.
Lissonota altipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 53 n. 12, ♀.
Cryptopimpla blanda Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 294 n. 3, ♀.
Lissonota altipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 191, ♀.
Phytodietus blandus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 197, ♀.
Cryptopimpla blanda Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 66.
Lissonota subfumata Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 760 n. 5.
Lissonota altipes Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 761 n. 6.
Lissonota altipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 119, ♀.
Phytodietus blandus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 126, ♀.
Cryptopimpla blanda Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 438.
Lissonota subfumata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1416 n. 2, ♀ ♂.
Lissonota altipes Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1416 n. 3.
Cryptopimpla blanda Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 320.
Cryptopimpla blanda Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 337 n. 5, ♀ ♂.

brachycentra (Grav.) Schmkn.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Austria inf.
Lissonota brachycentra Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 56 n. 30, ♀.
Lissonota brachycentra Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 285 n. 19, ♀.
Lissonota brachycentra Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 123, ♀.
Lissonota brachycentra Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 369.
Cryptopimpla brachycentra Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 336 n. 2, ♀.

calceolata (Grav.) Taschbg. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Phytodietus calceolatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 937 n. 321, ♀.
Cryptopimpla calceolata Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 294 n. 4, ♀.
Cryptopimpla calceolata Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 66.
Lissonota calceolata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 120, ♀.
Cryptopimpla calceolata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 438.
Cryptopimpla calceolata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 336 n. 3, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Larentia ruficinctata (Bignell).
2) *Lep.:* Anticlea badiata (Bignell).

errabunda (Grav.) Taschbg. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Phytodietus errabundus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 933 n. 316, ♀.
Cryptopimpla errabunda Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 293 n. 2, ♀.
Phytodietus errabundus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 197, ♀♂.
Cryptopimpla errabunda Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 66.
Phytodietus errabundus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 126, ♀♂.
Aphanodon errabundus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 436.
Xenacis Hungarica Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 11 & 30 n. 67, ♀.
Cryptopimpla errabunda Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 335 n. 1, ♀ (♂).

genalis (Thoms.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Suecia.
Lissonota genalis Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 760 n. 4, ♀.
Lissonota genalis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1417 n. 4.
Cryptopimpla genalis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 337 n. 4, ♀.

XENOCORNIA

Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 305 n. 7.
ξένος, peregrinus; cornu (vox hybrida).

solitaria Schmkn. — ♀ — Eur.: Thuringia.
Xenocornia solitaria Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 335 n. 1, ♀.

XENACIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 167 n. 10.
ξεναγός, ductor hospitum.

Synon.: Lissonota Gravenhorst & auct.

caligata (Grav.) Schmkn.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Lissonota caligata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 38 n. 16, ♂.
Lissonota caligata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 53 n. 13, (♀) ♂.
Lissonota caligata Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 286 n. 22, ♀♂.
Lissonota caligata Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 192, ♀.
Lissonota caligata Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 760 n. 3.
Lissonota caligata Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 167.
Xenacis caligata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 437.
Lissonota caligata Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1417 n. 5.
Xenacis caligata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 333 n. 1, ♀ ♂.

TREVORIA

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 50.
Trevor Kincaid, nom. propr.

yukatatensis Ashm. — Am.: Yukatan.
Trevoria Yukatatensis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 50 [s. descr.].

NADIA

Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 337.
Etymol. obscura.

cyanea Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Cameroon, Congo.
Nadia cyanea Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 340 n. 2, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Anticlea badiata (Bignell).

fasciipennis Tosqu. — ♀ — Afr.: Togo.
Nadia fasciipennis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 337 n. 1, ♀.
formosa Tosqu. — ♀ — Afr.: Cameroon.
Nadia formosa Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 342 n. 3, ♀.

APHANODON

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 166 n. 4.
ἀφανής, obscurus; *ὀδοῦς*, dens.
Vide genus Cryptopimpla.

EUCTENOPUS

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 50.
εὖ, bene; *κτείς*, pecten; *πούς*, pes.

zealandicus Ashm. — Austr.: Nova Zealandia.
Euctenopus Zealandicus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 50 [s. descr.].

CAMPOCINETA

Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 306 n. 10.
κάμπη, eruca; *κινητός*, mobilis.

Synon.: Lissonota Thomson.

nigridens (Thoms.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Lissonota nigridens Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1888 p. 1425 n. 38, ♀ ♂.
Campocineta ? nigridens Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 344.
variicornis Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Campocineta varicornis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 343 n. 1, ♀ ♂.

NELIOPISTHUS

Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 907.
νηλεής, immisericors; *ὀπίσθος*, postremus.

Synon.: Phytodietus Ruthe.

elegans (Ruthe) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Phytodietus elegans Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 83.
Neliopisthus elegans Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 908 n. 1, ♀ ♂.

PHYTODIETUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 928 n. 8.
φυτόν, planta; *δίαιτα*, vita.

Synon.: Cryptus Desvignes.
Ichneumon Forster, Gmelin.
Lampronota Cresson.
Lissonota Gravenhorst, Taschenberg, Ratzeburg.
Mesoleius Provancher.
Mesoleptus Cresson.
Mesostenus Provancher.
Pimpla Gravenhorst, Taschenberg.

albipes Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Phytodietus albipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 91 n. 2, ♀.

Phytodietus albipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 63 n. 3, ♀.
Phytodietus albipes Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 773 n. 3, ♀.
Phytodietus albipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 1. 1888 p. 57, ♂.
Phytodietus albipes Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 340 n. 6, ♀.

astutus Grav. — ♀ (♂) — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Phytodietus astutus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 939 n. 322, ♀.
Phytodietus astutus Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 58.
Phytodietus astutus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 292 n. 4, ♀.
Phytodietus continuus Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 773 n. 2, (♂).
Phytodietus astutus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 342 n. 11, ♀.

aztecus (Cress.) Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Lampronota Azteca Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 408 n. 2, ♀.
Phytodietus Aztecus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 276 n. 6.

bellus (Cress.) Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Lampronota bella Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 408 n. 3, ♀.
Phytodietus bellus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 277 n. 7.

californicus Cress. — ♀ — Am.: California.
Phytodietus Californicus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 380, ♀.

corvinus Grav.! — ♀ — Eur.: Britannia.
Phytodietus corvinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 937 n. 320, ♀.
Phytodietus corvinus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 315 n. 1.
Phytodietus corvinus Seurat, Bull. mus. Paris 1898 p. 270.

coryphaeus Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
? Ichneumon acutorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 158 n. 71.
? Ichneumon acutorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 215 n. 50.
Phytodietus coryphaeus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 945 n. 326, ♀ [excl. var. 3].
? Ichneumon acutorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 926 n. 73.
Phytodietus coryphaeus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 129 n. 18.
Phytodietus coryphaeus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 62 n. 1, ♀.
Phytodietus coryphaeus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 292 n. 2, ♀.
Phytodietus coryphaeus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 196, ♀.
Phytodietus coryphaeus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 125, ♀.
Phytodietus coryphaeus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 340 n. 5, ♀ ♂.

crassitarsis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Phytodietus crassitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 774 n. 6.
Phytodietus crassitarsis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 340 n. 3, ♀.

cressonii Cam. — ♀ — Am.: Panama.
Phytodietus Cressoni Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 276 n. 1, ♀.

distinctus Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Phytodietus distinctus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 166, ♀.
Phytodietus distinctus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 156, ♀.
Phytodietus distinctus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 80 n. 2, ♀.
Phytodietus distinctus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 484 n. 2, ♀.

elegans Prov. — ♀ — Am.: Trinidad.
Phytodietus elegans Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 431 n. 6, ♀.

exareolatus Vollenh.! — ♀ — Eur.: Batavia.
Phytodietus exareolatus Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXI. 1878 p. 163 n. 10, ♀; T. 9 F. 5.

---

[1]) *Lep.:* Tortrix viridana (Bignell), Penthina salicana, Grapholitha roborana (Brischke).

femoralis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phytodietus femoralis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 64 n. 6, ♀ ♂.
Phytodietus femoralis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 342 n. 9, ♀ ♂.
geniculatus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Phytodietus geniculatus Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 774 n. 7.
Phytodietus geniculatus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 340 n. 4, ♀.
gracilicornis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Phytodietus gracilicornis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 411 n. 1, ♀ ♂.
grandis Fonsc.! — Eur.: Gallia.
Phytodietus? grandis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 434 n. 1; T. 8 IV F. 1.
guatemalensis Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [T. 11 F. 21.
Phytodietus Guatemalensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 276 n. 2, ♀;
jucundus (Cress.) Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Lampronota ? jucunda Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 409 n. 5, ♀.
Phytodietus ? jucunda Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 277 n. 9.
maritimus Boie![1]) — ♀ — Eur.: Germania.
Phytodietus maritimus Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVIII. 1857 p. 198 n. 17, ♀.
mexicanus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Phytodietus Mexicanus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 412 n. 2, ♀.
nobilis (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Mesostenus nobilis Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 363 n. 7, ♀.
Mesostenus nobilis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 785 n. 7, ♀.
Phytodietus nobilis Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 187.
obscurellus Cress. — ♀ — Am.: California.
Phytodietus obscurellus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 379, ♀.
obscurus Desv. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Cryptus (Phytodietus) obscurus Desvignes, Cat. Brit. Ichneum. 1856 p. 69 n. 10, ♀ ♂.
Phytodietus obscurus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 64 n. 5, ♀ ♂.
Phytodietus obscurus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 341 n. 8, ♀ ♂.
orbitalis (Cress.) Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Lampronota orbitalis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 408 n. 4, ♀.
Phytodietus orbitalis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 277 n. 8.
orizabensis Cam. — ♀ ♂ — Am.: Mexico. [p. 412].
Lampronota Mexicana Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 407 n. 1, ♀ ♂ [non
Phytodietus Orizabensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 46. 1886 Hymen. I. p. 276 n. 5.
ornatus Prov. — ♀ — Am.: Trinidad.
Phytodietus ornatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 431 n. 7, ♀.
ornatus Desv.! — Eur.: Britannia.
Cryptus (Phytodietus) ornatus Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 69 n. 11.
plantarius Grav. — ♀ — Eur.: Germania, Austria.
Phytodietus plantarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 941 n. 324, ♀.
Phytodietus plantarius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 292 n. 3, ♀.
Phytodietus plantarius Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 342 n. 10, ♀.
pleuralis Cress.[2]) — ♂ — Am.: Colorado.
Phytodietus pleuralis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 266, ♂.
pulcherrimus (Cress.) Prov. — ♂ — Am.: Connecticut.
Mesoleptus pulcherrimus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 101, ♂.

---

1) *Dipt.:* Scatophaga fucorum? an Sc. litorea? (Boie).
2) *Lep.:* Eudemis botrana (Schiffermüller).

Phytodietus pulcherrimus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 81 n. 4, ♂.
Phytodietus pulcherrimus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 484 n. 4, ♂.
rubricosus Thoms. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Phytodietus rubricosus Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 773 n. 4, ♀ ♂.
Phytodietus rufipictus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 126, ♀.
Phytodietus rubricosus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 339 n. 1, ♀ ♂.
rufipes Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
? Lissonota obscura Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 106 n. 6, ♀.
Phytodietus rufipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 63 n. 2, ♀.
Phytodietus rufipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 196, ♀ ♂.
Phytodietus rufipes Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 772 n. 1, ♀ ♂.
Phytodietus rufipes Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 341 n. 7, ♀ ♂.
segmentator Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon polyzonius Forster, Nov. spec. Insect. 1771 p. 85 n. 85.
? Ichneumon polyzonius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2712 n. 195.
Phytodietus segmentator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 944 n. 325, ♀ ♂.
Phytodietus coryphaeus var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 945 n. 326, ♀.
Lissonota polyzonias Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 68 n. 36, ♂.
Lissonota pectoralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 69 n. 37, ♂.
Phytodietus segmentatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 1, ♀; T. 39 F. 3.
Phytodietus segmentator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Suppl. 1846 p. 1; T. 39 F. 3.
Lissonota pectoralis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 97 n. 4, ♀.
Lissonota pectoralis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 105 n. 4.
Phytodietus segmentator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 90 n. 1, ♀ ♂.
Phytodietus segmentator Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 129 n. 18.
Phytodietus segmentator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 63 n. 4, ♀ ♂.
Lissonota polyzonias Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 281 n. 3, ♀ ♂.
Lissonota pectoralis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 282.
Phytodietus segmentator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 291 n. 1, ♀ ♂.
Phytodietus segmentator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 196.
Phytodietus polyzonias Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 196, ♂.
Phytodietus segmentator Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 773 n. 5, ♀ ♂.
Phytodietus segmentator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 125, ♀ ♂.
Phytodietus polyzonius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 126, ♀ ♂.
Phytodietus segmentator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 339 n. 2, ♀ ♂.
superbus Prov. — ♀ — Am.: Trinidad.
Phytodietus superbus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 430 n. 5, ♀.
truncatus Davis — ♀ — Am.: Dakota.
Phytodietus ? truncatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 371, ♀.
vulgaris Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Phytodietus vulgaris Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 166 n. 1, ♀ ♂.
Phytodietus vulgaris Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 154, ♀ ♂.
Phytodietus vulgaris Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 80 n. 3, ♀.
Phytodietus vulgaris Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 484 n. 3, ♀.
Mesoleius annulatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 106 n. 9, ♀.
zonatus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phytodietus zonatus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 79, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Tortrix laevigana, T. ribeana, Grapholitha roborana, Cidaria galiaria (Brischke), Peronea hastiana, Tortrix viridana (Bignell), T. laevigana, T. cerasana (Ratzeburg).

Phytodietus zonatus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 80 n. 1, ♀.
Phytodietus zonatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 483 n. 1, ♀.
Mesoleius telarius Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 106 n. 10, ♀.

ARENETRA

Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 127 n. 14.
ἄρρην, masculus; *αἴθρα*, aether?

Synon.: Lasiops Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 68 [nec Meigen 1838].
λάσιος, hispidus; *ὄψ*, oculus.
Banchus Gravenhorst.
Exetastes Cresson.
Lampronota Walsh.
Lissonota Taschenberg.
Phytodietus Giraud.
Tryphon Gravenhorst.

canadensis Cress. — Am. bor.
Arenetra Canadensis Cresson, Canad. Entomol. I. 1868 p. 36.

nigrita Cress. — ♀ ♂ — Am.: Connecticut.
Arenetra nigrita (Walsh) Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 159 n. 2, ♀ ♂.
Lampronota nigrita Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 122, ♀ ♂.
Arenetra nigrita (Cresson) Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 123.
Arenetra nigrita Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 15 & 302, ♀ ♂.

pallidipes Harrgt. — ♂ — Am.: Vancouvers Island.
Arenetra pallipes Harrington, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 250, ♂.

pilosella (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Tryphon pilosellus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 125 n. 73, ♂.
Lasiops pilosella Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 69 n. 1, ♀ ♂.
Arenetra pilosella Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 128 n. 14.
Arenetra pilosella Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 46 n. 1, ♀ ♂.
Lissonota pilosella Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 286 n. 21, ♀ ♂.
Phytodietus pilosellus Giraud, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 p. 412 n. 17, ♀ ♂.
Arenetra pilosella Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 22, ♂; T. 14 F. 1.
Arenetra pilosella Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 352 n. 1, ♀ ♂.

rufipes Cress. — ♀ — Am.: Canada, Colorado.
Exetastes niger Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 275 n. 1, ♀ [excl. ♂].
Arenetra rufipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 159 n. 3, ♀.
Arenetra rufipes Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 77 n. 1, ♀.
Arenetra rufipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 481 n. 1, ♀.

tomentosa (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Banchus tomentosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 376 n. 1, ♀.
Arenetra tomentosa Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 128 n. 14.
A ♀ netra tomentosa Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 46 n. 2, ♀ ♂.
Arenetra tomentosa Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 118, ♀.

ventralis Cress. — ♂ — Am.: New York.
Arenetra ventralis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 160 n. 4, ♂.

HIMERTOSOMA

Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 306 n. 16.
ἱμερτός, suavis; *σῶμα*, corpus.

superbum Schmkn. — ♀ — Eur.
Himertosoma superba Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 394, ♀.

LAMPRONOTA

(Haliday) Curtis, Brit. Entom. IX. 1832 p. 407.
λαμπρός, splendidus; νῶτος, dorsum.

Synon.: Chalinocerus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 130 n. 25.
χαλινός, frenum; κέρας, cornu.
Cylloceria Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 20.
κυλλός, curvus; κεραία, prominentia.
Arenetra Provancher.
Asphragis Schmiedeknecht.
Bassus Zetterstedt, Provancher.
Cubocephalus Ratzeburg.
Ichneumon Gravenhorst.
Lissonota Gravenhorst, Cresson.
Mesoleius Provancher.
Phytodietus Gravenhorst.
Polyblastus Provancher.
Tryphon Gravenhorst, Provancher.

agilis Cress. — ♀ — Am.: New York, Texas.
Lampronota agilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 164 n. 18, ♀.
Lampronota agilis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 76 n. 15, ♀.
Lampronota agilis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 480 n. 15, ♀.
albomaculata Ashm. — ♀ — Am.: St. Vincent.
Lampronota albomaculata Ashmead, Journ. Linn. Soc. Zool. XXV. 1894 p. 142, ♀.
americana Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Lampronota Americana Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 164 n. 15, ♀.
Lampronota Americana Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 121, ♀.
Lampronota Americana Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 76 n. 14, ♀.
Lampronota Americana Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 14 n. 14, ♂.
Lampronota Americana Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 479 & 802 p. 14, [♀♂.
amphimelaena Walsh — ♂ — Am.: Illinois.
? Lampronota varia Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 164 n. 13, ♂.
Lampronota amphimelaena Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 117, ♂.
angusta Davis — ♀ — Am.: Michigan.
Lampronota angusta Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XVII. 1891 p. 30, ♀.
annulata Davis — ♂ — Am.: Michigan.
Lampronota annulata Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXI. 1895 p. 31, ♂.
bibrevicincta Davis — ♀ — Am.: Michigan.
Lampronota bibrevicincta Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXI. 1895 p. 31, ♀.
breviventris Walsh — ♀ — Am.: Illinois.
Lampronota breviventris Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 120, ♀.
brunea (Cress.) Prov.[1] — ♀ — Am.: Canada.
Lissonota brunnea Cresson, Canad. Entomol. I. 1868 p. 37.
Lampronota brunnea Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 76 n. 13, ♀.
Lampronota brunnea Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 479 n. 13, ♀.
bullata Davis — ♀ — Am.: Washington.
Lampronota bullata Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXI. 1895 p. 30, ♀.

---

1) *Lep.:* Caloptenus spretus (Thomson).

caligata (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
? Tryphon silvestris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 138, ♂.
Phytodietus caligatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 936 n. 319, ♀ ♂.
Lampronota crenicornis Curtis, Brit. Entom. IX. 1832 p. 407; T. 407.
Bassus nuntiator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 381 n. 22, ♀ ♂.
Lampronota crenicornis Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 121, ♀ ♂.
Cylloceria caligata Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 25 n. 2, ♀♂; T. 10 F. 1 (♂).
Cylloceria caligata Schiödte, Naturh. Tidsskr. III. 1847 p. 99 n. 14, ♀ ♂.
Cylloceria caligata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 92 n. 2, ♀ ♂.
? Chalinocerus mancus Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 82 n. 2, ♀ ♂.
Lampronota caligata Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 128 n. 15.
Lampronota caligata Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 48 n. 3, ♀ ♂.
Lampronota caligata Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 295 n. 2, ♀ ♂.
Lampronota caligata Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 22, ♂; T. 14 F. 4.
Lampronota caligata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 395 n. 2, ♀ ♂.

coloradensis Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Lampronota Coloradensis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 165 n. 22, ♀.

decorata (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Polyblastus decoratus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 107 n. 6, ♀.
Lampronota ? decorata Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 189.

errans D. T — ♀ ♂ — Am.: Canada, Illinois, Connecticut.
Cylloceria occidentalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 160, ♀♂ [non p. 161].
Cylloceria occidentalis Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 114, ♀.
Cylloceria occidentalis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 47 n. 1, ♀ ♂.
Cylloceria occidentalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 468 n. 1, ♀ ♂.
Lampronota errans m.

exigua Cress. — ♀ — Am.: Virginia.
Lampronota exigua Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 164 n. 17, ♀.

exilis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Massachusetts, California, Connecticut.
Lampronota exilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 165 n. 19, ♀ ♂.
Lampronota exilis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 77 n. 17, ♀ ♂.
Lampronota exilis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 480 n. 17, ♀ ♂.

fissa (Prov.) Davis — ♂ — Am.: Canada.
Mesoleius fissus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 257 n. 1, ♂.
Mesoleius fissus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 415 n. 1, ♂.
Lampronota ? fissus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 189.

fracta (Prov.) Davis — ♂ — Am.: Canada.
Tryphon fractus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 101 n. 1, ♂.
Lampronota fracta Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 189.

frigida (Cress.) Walsh[1]) — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Lissonota frigida Cresson, Canad. Entomol. I. 1868 p. 36.
Lampronota frigida Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 118, ♂.
Lampronota frigida Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 74 n. 10, ♀.
Lampronota frigida Lintner, 1st Ann. Rep. Insects New York 1882 p. 145; Fig. 35-36.
Lampronota frigida Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 478 n. 10, ♀.

fuscolina (Davis) D. T. — ♂ — Am.: Colorado.
Cyllocera fuscolina Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 371, ♂.
Lampronota fuscolina m.

---

1) *Lep.:* Crambus vulgivagellus (Cresson).

gelida Cress. — ♂ — Am.: Columbia.

Lampronota gelida Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 377, ♂.

germari (Ratzbg.) D. T.[1]) — ♀ — Eur.: Germania.

Cubocephalus Germari Ratzeburg, Stettin. entom. Zeitg. X. 1849 p. 131 n. 1, ♀.
Cubocephalus Germari Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 133 n. 2, ♀; Fig.
Lampronota Germari m.

hilaris Cress. — ♀ — Am.: California.

Lampronota hilaris Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 378, ♀.

humeralis Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.

Lampronota humeralis Provancher, Natural. Canad. V. 1873 p. 476, ♂.
Lampronota humeralis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 76 n. 12, ♂.
Lampronota humeralis Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 14 n. 12, ♀ ♂.
Lampronota humeralis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 479 & 802 n. 12, ♂.

imitatrix Walsh — ♀ — Am.: Illinois.

Lampronota imitatrix Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 121, ♀.

inornata (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.

Polyblastus inornatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 108 n. 8, ♀.
Lampronota inornatus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 190.

insita Cress. — ♀ — Am.: Canada.

Lampronota insita Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 162 n. 7, ♀.
Lampronota insita Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 72 n. 3, ♀.
Lampronota insita Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 475 n. 3, ♀.

interpellata Walsh — ♂ — Am.: Illinois.

Lampronota interpellata Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 118, ♂.

jocosa Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Illinois.

Lampronota ? jocosa Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 162 n. 6, ♂.
Lampronota jocosa Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 71 n. 2, ♀ ♂.
Lampronota jocosa Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 14 n. 2, ♀.
Lampronota jocosa Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 475 & 801 n. 2, ♀.

lemoinei (Prov.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Canada.

Cylloceria Lemoinei Provancher, Natural. Canad. V. 1873 p. 471, ♂.
Cylloceria Lemoinei Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 47 n. 2, ♀ ♂.
Cylloceria Lemoinei Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 468 n. 2, ♀ ♂.
Lampronota Lemoinei m.

levigata Cress. — ♀ — Am.: Canada.

Lampronota laevigata Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 162 n. 5.
Lampronota laevigata Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 117 n. 18, ♀.

lugubris Cress. — ♀ — Am.: Columbia.

Lampronota ? lugubris Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 379, ♀.

marginata Prov. — ♀ — Am.: Canada.

Lampronota marginata Provancher, Natural. Canad. V. 1873 p. 474, ♀.
Lampronota marginata Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 73 n. 6, ♀.
Lampronota marginata Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 477 n. 6, ♀.

marginator (Schiödte) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Dania, Germania.

Cylloceria marginator Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 24 n. 2, ♀ ♂; T. 9 F. 1 (♀).
? Lampronota denticornis Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 121, ♀ ♂.
Cylloceria marginator Schiödte, Naturh. Tidsskr. III. 1847 p. 99 n. 13.
Lampronota marginator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 47 n. 2, ♀ ♂.
Lampronota marginator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 189.

---

[1]) *Lep.:* Cnethocampa processionea (Ratzeburg).

Lampronota marginator Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 22, ♀; T. 14 F. 3.
Lampronota marginator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 118, ♂.
Lampronota marginator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 396 n. 3, ♀ ♂.

melancholica (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ichneumon melancholicus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 372 n. 123, ♂.
Tryphon melancholicus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 135 n. 81, ♂.
Phytodietus niger Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 935 n. 318, ♀.
? Lissonota defectiva Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 38 n. 15, ♀.
Bassus affinis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 382 n. 23, ♀ ♂.
Lampronota fracticornis Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 121, ♀ ♂.
Cylloceria nigra Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10. p. 23 n. 1, ♀ ♂.
Cylloceria nigra Schiödte, Naturh. Tidsskr. III. 1847 p. 99 n. 12.
Chalinocerus longicornis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 130, ♂; Fig.
Cylloceria nigra Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 91 n. 1, ♀ ♂.
? Chalinocerus defectivus Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 80 n. 1, ♂.
Lampronota nigra Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 128 n. 15.
Lampronota nigra Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 47 n. 1, ♀ ♂.
? Lissonota defectiva Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 290 nota, ♀ [non [Gravenhorst].
Lampronota nigra Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 294 n. 1, ♀ ♂.
Lampronota nigra Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 22, ♀; T. 14 F. 2.
Asphragis defectiva Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 434.
Lampronota melancholica Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 395 n. 1, ♀ ♂.

montana Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Lampronota montana Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 267, ♀.

nigricornis Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Lampronota nigricornis Provancher, Natural. Canad. V. 1873 p. 476, ♀.
Lampronota nigricornis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 73 n. 8, ♀.
Lampronota nigricornis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 477 n. 8, ♀.
Lampronota nigricornis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 117 n. 8, ♂.

nigripes Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Lampronota nigripes Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 118 n. 19, ♀.

nigropicta Davis — ♂ — Am.: Michigan.
Lampronota nigropicta Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXI. 1895 p. 31, ♂.

occidentatis Cress. — ♀ — Am.: Pennsylvania.
Lampronota occidentalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 161 n. 1, ♀.

pallorana Davis — ♀ — Am.: Pennsylvania.
Lampronota pallorana Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXI. 1895 p. 31, ♀.

parva Cress. — ♀ — Am.: Canada, Delaware, Virginia.
Lampronota parva Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 163 n. 8, ♀.
Lampronota parva Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 72 n. 4, ♀.
Lampronota parva Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 476 n. 4, ♀.

pictiventris Walsh — ♂ — Am.: Illinois.
Lampronota pictiventris Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 n. 119, ♂.

pleuralis Cress.[1]) — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Lampronota pleuralis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 161 n. 3, ♀ ♂.
Lampronota albifacies Provancher, Natural. Canad. V. 1873 p. 475, ♂.
Lampronota pleuralis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 72 n. 5, ♂.
Lampronota pleuralis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 476 n. 5, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Tortrix incertana (Cresson).

provancheri D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Lampronota rufipes Provancher, Natural. Canad. V. 1873 p. 476, ♀.
Lampronota rufipes Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 73 n. 7, ♀.
Lampronota rufipes Provancher, Faun. entom. Canad. Hymén. 1883 p. 477 n. 7, ♀.
Lampronota Provancheri m.

pulchella Cress. — ♂ — Am.: New Jersey.
Lampronota pulchella Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 162 n. 4, ♂.

punctulata Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Massachusetts, Connecticut, Virginia.
Lampronota punctulata Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 163 n. 9, ♀.
Lampronota scutellaris Provancher, Natural. Canad. V. 1873 p. 474, ♀.
Bassus areolatus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 58.
Lampronota punctulata Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 71 n. 1, ♀ ♂.
Lampronota punctulata Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 475 n. 1, ♀♂.

puritana Ashm. — ♀ — Am.: New Hampshire.
Lampronota puritana Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 450, ♀.

rubrica Cress. — ♀ — Am.: Canada, Massachusetts.
Lampronota rubrica Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 165 n. 20, ♀.
Lampronota rubrica Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 122, ♀.
Lampronota rubrica Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 76 n. 16, ♀.
Lampronota rubrica Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 480 n. 16, ♀.

rufipes Cress. — Am.: Canada.
Lissonota rufipes Cresson, Canad. Entomol. I. 1868 p. 36.
Lampronota rufipes Cresson, Synops. Hymen. North America 1887 p. 219.

rufithorax Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Lampronota rufithorax Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 40, ♂.

segnis Cress. — ♂ — Am.: Vancouvers Island.
Lampronota segnis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 378, ♂.

sexcarinata Davis — ♀ — Am.: Michigan.
Lampronota sexcarinata Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. 1895 p. 30, ♀.

tegularis Cress. — ♂ — Am.: Pennsylvania, Canada, Delaware, Illinois.
Lampronota tegularis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 163 n. 10, ♂.
Lampronota tegularis Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 116, ♂.
Arenetra Quebecensis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 141.
Lampronota tegularis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 74 n. 9, ♂.
Lampronota tegularis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 478 n. 9, ♂.

varia Cress. — ♂ — Am.: Massachusetts, Canada, Connecticut, Virginia.
Lampronota varia Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 164 n. 13, ♂.
Lampronota varia Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 74 n. 11, ♂.
Lampronota varia Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 478 n. 11, ♂.

vivida Cress. — ♂ — Am.: Vancouvers Island.
Lampronota vivida Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 378, ♂.

ASPHRAGIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 166 n. 1.

ἀ-priv.; *σφραγίς*, sigillum.

Vide genus Lissonota.

TASCHENBERGIA

Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 437.
Taschenberg, nom. propr.

Synon.: Cryptopimpla Taschenberg, Thomson.
Ctenopelma Brischke.
Mesoleptus Gravenhorst, Tschek.
Phytodietus Gravenhorst, Brischke.

modesta (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Mesoleptus modestus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 53 n. 31, ♂.
Phytodietus microtamius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 933 n. 317, ♀.
Cryptopimpla microtamia Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 293 n. 1, ♀.
Cryptopimpla microtamia Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 66.
Ctenopelma modesta Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 69, ♂.
Mesoleptus modestus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 42, ♀ ♂.
Phytodietus microtamius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 126, ♀ ♂.
Taschenbergia modesta Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 437, ♀ ♂.
Cryptopimpla microtamia Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1426 n. 1.
Taschenbergia modesta Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 331 n. 1, ♀ ♂.

ATROPHA

Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 306.
ἄτροφος, impastus.

quadriannulata Kriechb. — ♀ — Afr.: Natal.
Atropha quadriannulata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 306, ♀.

PSEUDACOENITES

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 219.
ψευδής, mendax; Acoenites, nom. propr. Hymen.

moravicus Kriechb. — ♀ — Eur.: Moravia.
Pseudacoenites Moravicus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 219, ♀.

HYBOPHANES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 166 n. 2.
ὕβος, gibbus; φαίνω, in lucem edo.

Synon.: Oedemopsis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 276.
οἴδημα, tumor; ὄψις, visus.
Bassus Zetterstedt.
Eclytus Holmgren, Brischke.
Phytodietus Bridgman.
Tryphon Zetterstedt.
Xylonomus Zetterstedt.

dorsatus (Zett.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Bassus (Tryphon) dorsatus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 381 n. 20, ♂.
Bassus (Xylonomus) pulcher Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 382 n. 25, ♀.
Oedemopsis dorsatus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXIX. 1872 P. 2. p. 144.
Hybophanes dorsatus m.

fontinalis (Holmgr.) D. T.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Eclytus fontinalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 128 n. 2, ♀ ♂.
Eclytus fontinalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 76, ♂.
Oedemopsis fontinalis Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 51, ♀; T. 32 F. 4.
Eclytus fontinalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 38, ♀ ♂.
Hybophanes fontinalis m.

limbatus (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Oedemopsis limbata Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 907 n. 2, ♀.
Hybophanes limbata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 435.
Hybophanes limbatus m.

ornatus (Holmgr.) D. T.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Eclytus ornatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 1855 P. 3. (Tryph.) p. 127 n. 1, ♀ ♂.
Eclytus ornatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 76, ♀.
Oedemopsis ornatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 51; T. 32 F. 2 & 3.
Hybophanes ornatus m.

scabriculus (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Tryphon scabriculus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 180 n. 119, ♂. [F. 1-6.
Oedemopsis Rogenhoferi Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 277 n. 8, ♀; T. 2 B
Oedemopsis Rogenhoferi Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 429, ♀ ♂.
Oedemopsis Rogenhoferi Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXIX. 1872 P. 2. p. 143.
Oedemopsis scabriculus Brischke, Deutsch. entom. Zeitschr. XXI. 1877 p. 285, ♀ ♂.
Oedemopsis scabriculus Vollenhoven, Pinacogr. P. 7. 1878 p. 51, ♀; T. 32 F. 1.
Phytodietus scabriculus Bridgman, Entomologist XI. 1878 p. 36, ♀.
Oedemopsis scabriculus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 76, ♂.
Tryphon scabriculus Bridgman, Entomologist XII. 1879 p. 129-130.
Oedemopsis scabricula Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 907 n. 1, ♀ ♂.
Hybophanes scabricula Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 435.

ANARTHRONOTA

Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 305 n. 3.
ἀ-priv.; ἄρθρον, artus; νῶτος, dorsum.

Synon.: Lissonota Brauns.

manca (Brauns) Schmkn. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Lissonota manca Brauns, Termész. Füzet. XIX. 1896 p. 275, ♀.
Anarthronota manca Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 330 n. 2, ♀.

thuringiaca Schmkn. — ♀ — Eur.: Thuringia.
Anarthronota Thuringiaca Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 330 n. 1, ♀.

ECHTHRODOCA

Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 303 n. 2.
ἐχθρός, odiosus; δόκος, opinio.

Synon.: Lissonota Gravenhorst, Holmgren, Thomson.

conflagrata (Grav.) Schmkn. — ♀ — Eur. centr.
Lissonota conflagrata Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 95 n. 51, ♀.
Lissonota conflagrata Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 284 n. 12, ♀.
Echthrodoca conflagrata Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 329 n. 1, ♀.

---

1) *Lep.:* Paedisca solandriana (Fletcher).
2) *Lep.:* Tortrix heparana (Bignell).

hians (Thoms.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [[non Gravenhorst].
Lissonota decimator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 51 n. 8, ♀ ♂
Lissonota hians Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 762 n. 8, ♀ ♂.
Lissonota hians Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1418 n. 7.
Echthrodoca hians Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 329 n. 2, ♀ ♂.

PROCINETUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 167 n. 1.
πρό, antea; κινητός, motus.

Synon.: Heterolabis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 18.
ἕτερος, alter; λαβίς, petiolus.
Lissonota Gravenhorst & auct.

aberrans (Kriechb.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania mer., Austria.
Heterolabis aberrans Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 21 n. 2, ♀.
Procinetus aberrans Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 326 n. 2, ♀.
crassulus (Kriechb.) Schmkn.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria, Helvetia, Istria.
Heterolabis crassula Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 19 n. 1, ♀ ♂.
Procinetus crassulus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 326 n. 1, ♀ ♂.
crudelis (Kriechb.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Sicilia; Afr.: Algeria.
Heterolabis crudelis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 372, ♂.
Procinetus crudelis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 328 n. 5, ♀ ♂.
decimator (Grav.) Schmkn.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Gallia.
Lissonota decimator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 96 n. 52, ♀ ♂.
Lissonota decimator Herrich-Schaeffer, Faun. Insect. German. 1830 P. 117; T. 13 (♀).
Lissonota decimator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (3) II. 1854 p. 509 n. 19, ♀ ♂.
Lissonota decimator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 284 n. 13, ♀ ♂.
Procinetus decimator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 423.
frauenfeldii (Tschek) Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania, Austria.
Lissonota Frauenfeldii Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. 1868 p. 275 n. 7, ♀.
Heterolabis petiolata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 22 n. 3, ♀.
Procinetus Frauenfeldi Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 327 n. 3, ♀.
marginatus (Kriechb.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Heterolabis marginata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 23 n. 4, ♀.
Procinetus marginatus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. Syst. XIII. 1900 p. 327 n. 4, ♀.

26. *Subfam.* Labeninae

Ashmead, Smith: Insects of New Jersey 1900 p. 571.

GROTEA

Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 397.
A. R. Grote, nom. propr.

anguinea Cress. — ♀ ♂ — Am.: New Jersey, New York.
Grotea anguinea Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 398, ♀ ♂.
californica Cress. — ♀ — Am.: California.
Grotea Californica Cresson, Proc. Acad. Sc. Philadelphia 1878 p. 370, ♀.

---

[1]) ? *Col.:* Oberea erythrocephala (Schmiedeknecht).
[2]) *Lep.:* Gortyna flavago (Bignell).

fulva Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Grotea fulva Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 50. 1886 Hymen. I. p. 309 n. 2, ♀; T. 12 F. 27.
mexicana Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Grotea Mexicana Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 413 n. 1, ♀ ♂.

NONNUS

Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 386.
νόννος, monachus.

antennatus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Nonnus antennatus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 387 n. 2, ♀ ♂.
Nonnus antennatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 50. 1886 Hymen. I. p. 309 n. 2, ♀ ♂; T. 12 F. 9.
Nonus antennatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 50. 1886 Hymen. I. p. 309 n. 2, ♀ ♂; T. 12 F. 9.
atratus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Nonnus atratus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 387 n. 1, ♀.
Nonnus atratus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 50. 1886 Hymen. I. p. 309 n. 1, ♀; T. 12 F. 8.
Nonus niger Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 50. 1886 Hymen. I. p. 309 n. 1, ♀; T. 12 F. 8.

LABENA

Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 399.
Etymol. obscura.

Synon.: Cryptus Say.
Mesochorus Brullé.

apicalis Cress.[1] — ♂ — Am.: Delaware.
Labena apicalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 402, ♂.
gloriosa Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Labena gloriosa Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 412 n. 1, ♀.
grallator (Say) Cress.[2] — ♀ ♂ — Am.: Indiana.
Cryptus grallator Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 236 n. 10.
Mesochorus fuscipennis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 250 n. 2, ♀ [non Grav.].
Cryptus grallator Leconte, Writ. of Th. Say II. Entom. 1859 p. 692 n. 10.
Labena grallator Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 399, ♀ ♂.
Labena grallator Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 166, ♀ ♂.
Labena grallator Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 162, ♀ ♂.
trilineata Ashm. — ♂ — Am.: Grenada.
Labena trilineata Ashmead, Proc. Zool. Soc. London 1895 p. 781, ♂.

27. *Subfam.* Acoenitinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 142 & 167.

ASTHENOMERIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 168 n. 9.
ἀσθενής, invalidus; *μερίς*, portio.

nigricoxis Schmkn. — Eur.
Asthenomeris nigricoxis (Förster) Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 426 [s. descr.].

---

1) *Col.:* Chrysobothris femorata (Riley & Howard).
2) *Col.:* Cerasphorus cinctus (Walsh).

ACRONUS

Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 269.
ἄκρον, apex.

extrilidus Tosqu. — ♀ — Afr.: Togo.
Acronus extrilidus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 269 n. 2, ♀.
fulviventris Tosqu. — ♂ — Afr.: Cameroon.
Acronus fulviventris Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 276 n. 4, ♂.
maximus Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Acronus maximus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 270 n. 1, ♀.
testaceicornis Tosqu. — ♀ — Afr.: Delagoa Bay.
Acronus testaceicornis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 275 n. 3, ♀.

ACOENITUS

Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 9.
ἄκαινα, spina.

Synon.: Acoenites Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 810 n. 3.
Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 426.
ἄκαινος, non communis.
Anomalon Jurine, Trentepol.
Cryptus Fabricius, Panzer.
Ichneumon Schaeffer & auct. ant.

ater Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Acoenites ater Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 253 n. 1, ♀.
canadensis Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Acoenites Canadensis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 10 n. 2, ♂.
Acoenites Canadensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 442 n. 2, ♂.
capensis Holmgr. — ♀ — Afr.: Cap.
Acoenites Capensis Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 403 n. 26, ♀.
cunctator Tosqu. — ♀ — Afr.: Delagoa Bay.
Acoenites cunctator Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 254 n. 2, ♀.
dapsilis Tosqu. — ♀ — Afr.: Sierra Leone.
Acoenites Dapsis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 259 n. 4, ♀.
dubitator (Panz.) Latr. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon LXXXI Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 2. 1769; T. 187 F. 1.
Ichneumon dubitator Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 78 T. 14.
Cryptus dubitator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 86 n. 64.
Ichneumon dubitator Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 180 n. 5.
Cryptus dubitator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 71.
Anomalon dubitator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 116, ♀.
Acoenitus dubitator Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 9.
Ichneumon dubitator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 138 n. 6.
Ichneumon dubitator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 266.
Ichneumon dubitator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 322.
Acoenites dubitator Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 37 n. 1.
Acoenites dubitator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 810 n. 3, ♀.
Anomalon dubitator Trentepol, Isis 1829 p. 953 n. 69, ♀.
Ichneumon dubitator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª IV. 1835 p. 350 n. 6.
Acoenites dubitator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 327.
Acoenites dubitator Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 61.

Acoenites dubitator Latreille, Cuvier: Règne anim. Ed. Masson 1849; T. 112 F. 2.
Ichneumon (Acoenites) dubitator Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3a Insect. II. 1849; [T. 112 F. 2.
Acoenites dubitator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 298 n. 2, ♀ ♂.
Acoenites dubitator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 108, ♀ ♂.
Acoenites dubitator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 426.
Acoenites dubitator Jacobs & Tosquinet, Ann. soc. entom. Belgique XLI. 1897 p. 276.

fenestratus Kriechb. — ♀ — Afr.: Gaboon.
Acoenites fenestratus Kriechbaumer, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1893/94 p. 136, ♀.

flavipes Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Acoenites flavipes Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 80.
Acoenites flavipes Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 10 n. 1, ♀.
Acoenites flavipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 441 n. 1, ♀.

germanus Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Cap.
Acoenites Germanus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 262 n. 6, ♀ ♂.

incisurator Lep. — ♀ — Eur.: Gallia.
Acoenites incisurator Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 38 n. 2, ♀.

lividus Heer — Eur.: Croatia (Succinum).
Acoenitus lividus Heer, Neu. Denkschr. schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 169 n. 77; T. 13 [F. 14.
Acoenites lividus Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 647.
Acoenites lividus Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1856 p. 156.

luteus Holmgr. — ♀ — Afr.: Cap.
Acoenitens luteus Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 403 n. 25, ♀.

macrodactylus Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Sierra Leone.
Acoenites macrodactylus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 256 n. 3, ♀ ♂.

melleus Say — ♀ — Am.: Indiana.
Acoenitus melleus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 249 n. 2, ♀.
Acoenitus melleus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 703 n. 2.

rupinsulensis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Acoenites rupinsulensis (Walsh) Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. III. 1870 p. 143, ♀.
Acoenites rupinsulensis Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 152, ♀ ♂.

trimaculatus Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Acoenites trimaculatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 261 n. 5, ♀.

HIEROCERYX

Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 267.
ἱερός, sacer; *κῆρυξ*, praeco.

glomiger Tosqu. — ♂ — Afr.: Sierra Leone, Togo.
Hieroceryx glomiger Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 267, ♂.

CHORISCHIZUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 168 n. 7.
χώρισις, separatio; *σχίζω*, findo.

Synon.: Acoenites Gravenhorst, Vollenhoven.

nigripennis (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Acoenites nigripennis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 815 n. 6, ♀ ♂.
Acoenites nigripennis Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXI. 1878 p. 165 n. 12; T. 10 F. 3.
Chorischizus nigripennis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 426.

rusticus Kriechb. — ♀ — Afr.: Algeria.
Acoenites (Chorischizus) rusticus Kriechbaumer, Termész. Füzet. XIX. 1896 p. 136 n. 13, ♀.

COLLYRIA

Schiödte, Magas. de zool. IX. 1839 P. 6-10, nota.
κολλύρα, collyra.

Synon.: Pachymerus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 721 n. 7 [non Lepeletier].
παχύς, crassus; μηρός, lumbus.
Bassus Gravenhorst.
Ichneumon Villers, Olivier.

armata Luc. — ♂ — Afr.: Algeria.
Collyria armata Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 328 n. 388, ♂.

calcitrator (Grav.) Schiödte[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 330 n. 19.
? Ichneumon falcatus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 399 n. 19.
? Ichneumon coxator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 193 n. 190.
? Ichneumon arcuatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 208 n. 9.
? Ichneumon coxator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 216 n. 56.
Bassus calcitrator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 266 n. 3780.
Pachymerus calcitrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 727 n. 150, ♀ ♂.
Pachymerus calcitrator Stephens, Illustr. Brit. Insect. Mandib. VII. 1835 p. 37; F. 2.
Pachymerus calcitrator Curtis, Brit. Entom. XIII. 1836 p. 624.
Collyria calcitrator Schiödte, Magas. de zool. 1839 P. 6-10, nota.
Pachymerus calcitrator Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 60.
Pachymerus calcitrator Curtis, Farm Insects 1860 p. 253 & 257; Tab. I F. 6.
Pachymerus calcitrator Boheman, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XX. 1863 p. 78 n. 16, ♀ ♂.
Pachymerus calcitrator Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 74, ♀ ♂.
Collyria calcitrator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 426.

erythrogastra Luc. — ♂ — Afr.: Algeria.
Collyria erythrogaster Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 328 n. 387, ♂; T. 19 F. 7.

fuscipennis (Kriechb.) D. T. — ♂ — As.: China.
Pachymerus fuscipennis Kriechbaumer, Sickmann: Zool. Jahrb. System. VIII. 1894 p. 197, ♂.
Collyria fuscipennis m.

gracilipes (Motsch.) D. T. — As.: Ceylon.
Pachymerus gracilipes Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXVI. P. 3. 1863 p. 30.
Collyria gracilipes m.

nigrolineata Brullé — ♀ — Am.: Guyana.
Collyria nigrolineata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 178 n. 1, ♀.

puncticeps (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pachymerus calcitrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 727 n. 150, ♀ ♂ [p. p.].
Pachymerus puncticeps Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 734 n. 2, ♀ ♂.
Collyria puncticeps m.

trichophthalma (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pachymerus calcitrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 727 n. 150, ♀ ♂ [p. p.].
Pachymerus trichophthalmus Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 734 n. 1, ♀ ♂.
Collyria trichophthalma m.

unifasciata (Motsch.) D. T. — As.: Ceylon.
Pachymerus unifasciatus Motschulsky, Bull. soc. natural. Moscou XXXII. P. 3. 1863 p. 29.
Collyria unifasciata m.

---

[1]) *Vide:* C. puncticeps Thoms. & C. trichophthalmus Thoms. — *Hymen.:* Cephus pygmaeus (Curtis).

PHAENOLOBUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 168 n. 5.
φαίνω, in lucem edo; λοβός, ansa.

Synon.: Acoenitus Latreille & auct.
Ichneumon Rossi & auct.

arator (Rossi) Schmkn.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon terebrator Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 285 n. 749; T. 40 F. 749.
? Ichneumon terebrator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 184 n. 153.
Ichneumon arator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 49 n. 778.
? Ichneumon terebrator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 366.
? Ichneumon terebrator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 212 n. 33.
Ichneumon arator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 73 n. 778.
Acoenitus arator Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 9.
Acoenitus arator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 297.
Acoenites arator Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 37.
Acoenites atrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 813 n. 5, ♀ ♂.
Acoenites arator Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 409; T. 66 F. 1.
Acoenites arator Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 121 n. 2.
Acoenites arator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 8 n. 1, ♀ ♂.
Acoenites arator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 298 n. 3, ♀.
Acoenites arator Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 733 n. 1.
Phaenolobus arator Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 425.

fulvicornis (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur. centr.
Acoenites fulvicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 809 n. 2, ♀ ♂.
Acoenites fulvicornis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 338, ♀ ♂.
Phaenolobus fuscicornis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 425.
Phaenolobus fulvicornis m.

saltans (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Acoenites saltans Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 806 n. 1, ♀ ♂.
Acoenites saltans Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 297 n. 1, ♀ ♂.
Acoenites saltans Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 733 n. 2, ♀ ♂.
Acoenites saltans Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 338, ♀ ♂.
Phaenolobus saltans Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 425.

tristis (Grav.) Schmkn. — ♂ — Eur.
Acoenites tristis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 816 n. 7, ♂.
Phaenolobus tristis Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 425.

AROTES

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 446 n. 6.
ἀρότης, arator.

Synon.: Sphaleros Kriechbaumer, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 43.
σφαλερός, lubricus.
Acoenitus Say.
Banchus Blanchard.
Tropistes Provancher.

albicinctus Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Arotes albicinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 448 n. 34, ♀ (♂?).

---

[1]) *Lep.:* Sesia formicaeformis (Brischke).

[2]) *Col.:* Clytus arcuatus (Giraud).

Arotes albicinctus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835, ♀; T. 36 F. 4.
Banchus (Arotes) albicinctus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 323 n. 7.
Arotes albicinctus Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 60.
Arotes albicinctus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Suppl. 1846 p. 2; T. 39 F. 4.
Arotes albicinctus Smith, Entomol. Annual f. 1859 p. 112.
Sphalerus bifasciatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 43, ♂.
Arotes albicinctus Kriechbaumer, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 251 n. 3, ♀ ♂.

amoenus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Arotes amoenus Cresson, Canad. Entomol. I. 1868 p. 34.
Arotes amoenus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1869 p. 260 n. 4, ♀ ♂.
Arotes amoenus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 151, ♂.
Tropistes elegans Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 80.
Arotes amoenus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 11 n. 3, ♀ ♂.
Arotes amoenus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 443 n. 3, ♀ ♂.

annulicornis Kriechb. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Arotes annulicornis Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 55 n. 10, ♀.

apicatus Davis — ♀ — Am.: Michigan.
Arotes apicatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 366, ♀.

decorus (Say) Cress. — ♀ ♂ — Am.: Indiana.
Acoenitus decorus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 248 n. 1, ♀ ♂.
Acoenitus decorus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 702 n. 1.
Arotes decorus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 164.
Arotes decorus (Cresson) Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 149 & 153, ♀.
Arotes decorus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1869 p. 260 n. 5, ♀ ♂.

formosus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Arotes formosus Cresson, Canad. Entomol. I. 1868 p. 34.
Arotes formosus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1869 p. 260 n. 1, ♀ ♂.
Arotes formosus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 11 n. 1, ♀.
Arotes formosus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 442 n. 1, ♀.

ustulatus Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Arotes ustulatus Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 56 n. 11, ♀ ♂.

venustus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Massachusetts, Virginia.
Arotes venustus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1869 p. 260 n. 3, ♀ ♂.

vicinus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Massachusetts.
Arotes vicinus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1869 p. 260 n. 2, ♂.
Arotes superbus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 81.
Arotes vicinus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 11 n. 2, ♀ ♂.
Arotes vicinus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 443 n. 2, ♀ ♂.

ENCARDIA

Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 264.

Etymol. obscura.

picta Tosqu. — ♀ — Afr.: Congo.
Encardia picta Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 264, ♀.

ENDURUS

Rondani, Bull. soc. entom. Ital. VIII. 1896 p. 66.
ἔνδον, intus; οὐρά, cauda.

Synon.: Crypturus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 655 n. 4 [non Illiger 1818].
κρύπτω, abscondo; οὐρά, cauda.
Ichneumon Rossi & auct. ant.
Tryphon Costa.

albomaculatus (Ashm.) D. T. — ♂ — Am.: Michigan.
Crypturus albomaculatus Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XII. 1890 p. 414, ♂.
Endurus albomaculatus m.

argiolus (Rossi) D. T. 1) — ♀ ♂ — Eur. mer.
Ichneumon argiolus Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 52 n. 789.
Ichneumon argiolus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 198 n. 172.
Ichneumon argiolus Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 78 n. 789.
Ichneumon argiolus Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 286.
Ichneumon argiolus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 386 n. 139, ♀ ♂.
Ichneumon (Crypturus) argiolus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 657 n. 286, ♀ ♂.
Ichneumon (Crypturus) argiolus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 306 n. 20.
Crypturus argiolus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 419 n. 1, ♀.
Crypturus argiolus Giraud, Verh. zool. bot. Ges. Wien VIII. 1858 p. 445 n. 1.
Tryphon flavitarsis A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli I. P. 2. 1863 p. 38, ♂; T. 2 F. 11.
Crypturus argiolus Destefani, Natural. Sicil. II. 1883 p. 280.
Crypturus argiolus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) V. P. 14. 1893 p. 17 n. 139.
Crypturus argiolus Kriechbaumer, Progr. Gymnas. Pola 1895 p. 36.
Crypturus argiolus Destefani, Natural. Sicil. (2) II. 1898 p. 252.
Endurus argiolus m.

niger (Vollenh.) D. T. — ♂ — Eur.: Gallia.
Crypturus niger Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXI. 1878 p. 158 n. 6, ♂; T. 9 F. 3.
Endurus niger m.

siculus (Costa) D. T. — Eur.: Italia.
Crypturus Siculus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 10. 1887 p. 7; T. 1 F. 6.
Endurus Siculus m.

APHANORRHOPTRUM

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 168 n. 3 [Aphanoroptrum].
ἀφανής, obscurus; ῥόπτρον, clava.

Synon.: Aphanoroptra Thomson, Opusc. entom. P. 8. 1877 p. 736.
Pimpla Gravenhorst, Taschenberg, Brischke, Bridgman & Fitch.

abdominalis (Grav.) Schmkn. 2) — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pimpla abdominalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 150 n. 77, ♀.
Pimpla abdominalis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 62, ♀.
Pimpla (Panteles ?) abdominalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 [p. 114, ♀.
Pimpla nematorum Rudow, Entom. Nachr. VII. 1881 p. 311 n. 8, ♀ ♂.

1) *Hymen.:* Polistes diadema (Giraud).
2) *Hymen.:* Nematus turgidus (Rudow).

Pimpla abdominalis Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 166, ♀.
Aphanoroptrum abdominale Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 424.
Aphanoroptrum abdominale Schmiedeknecht, Illustr. Wochenschr. f. Entom. II. 1897 p. 620.

MESOCLISTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 168 n. 2.
μέσος, medius; *κλιστός*, clausus.

Synon.: Acoenites Gravenhorst, Kriechbaumer.

rufipes (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Austria, Volhynia.
Acoenites rufipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 812 n. 4, ♀ ♂.
Acoenites rufipes Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 339, ♀ ♂.
Mesoclistus rufipes Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 424.
Mesoclistus rufipes Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 20 & 38 n. 93, ♀.

COLEOCENTRUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 437 n. 4.
κολεός, culeus; *κέντρον*, aculeus.

Synon.: Macrocoleus Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 1. 1850 p. 12.
μακρός, longus; *κώλεος*, vagina.
Macrus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 707 n. 5.
μακρός, longus.
Banchus Blanchard.
Ichneumon Poda & auct. ant.
Lampronota Cresson.
Ophion Blanchard.
Pimpla Panzer.

abiae Vollenh. — ♂ — Eur.: Batavia.
Coleocentrus abiae Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XVI. 1873 p. 215 n. 8, ♂; T. 9 F. 3.
apicifer (Walk.) D. T. — ♀ — As.: Japonia.
Macrus apicifer Walker, Cistula entom. I. P. 11. 1874 p. 304 n. 11, ♀.
Coleocentrus apicifer m.
caligatus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Coleocentrus caligatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 440 n. 32, ♀.
Coleocentrus caligatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 633 n. 2, ♀.
Coleocentrus caligatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 94 n. 2.
Coleocentrus caligatus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 121 n. 2.
Coleocentrus caligatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 7 n. 2, ♀ ♂.
Coleocentrus caligatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 296 n. 1, ♀ ♂.
Coleocentrus caligatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 177, ♀.
Coleocentrus caligatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 108, ♀.
Coleocentrus caligatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2121 n. 1, ♀ ♂.
canadensis Harrgt. — ♀ — Am.: Canada.
Coleocentrus Canadensis Harrington, Canad. Entomol. XXV. 1892 p. 29, ♀.
croceicornis (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Macrus croceicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 710 n. 146, ♂.
Coleocentrus excitator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. 1. 1849 p. 633 n. 1, ♂ [excl. ♀].
Macrocoleus croceicornis Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 1. 1850 p. 12.
Coleocentrus croceicornis Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 121 n. 3.

Coleocentrus croceicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 8 n. 3, ♂.
Coleocentrus croceicornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 296 n. 3, ♂.
Coleocentrus croceicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 108, ♀.
Coleocentrus croceicornis Brauns, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VIII. P. 1. 1888 p. 8, ♀.

exareolatus Kriechb. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Coleocentrus exareolatus Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 59 n. 14, ♀.

excitator (Poda) Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon excitator Poda, Insect. mus. Graec. 1761 p. 105 n. 4.
Ichneumon excitator Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 284 n. 748; T. 40 F. 748.
Ichneumon excitator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 185 n. 155.
Ichneumon excitator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 366.
Ichneumon excitator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 212 n. 22.
Ichneumon excitator Panzer, Faun. Insect. German. VIII. 1805 P. 92 T. 5.
Pimpla excitator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 83.
Ichneumon excitator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♀.
Coleocentrus excitator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 439 n. 31, ♀.
Macrus longiventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 709 n. 145, ♂.
Banchus (Coleocentrus) excitator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 325 n. 5.
Coleocentrus excitator Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 60.
Coleocentrus excitator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 633 n. 1, ♀ [excl. ♂].
Macrocoleus longiventris Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 1. 1850 p. 12.
Coleocentrus excitator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 94 n. 1, ♀.
Coleocentrus excitator Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XVI. 1859 p. 121 n. 1.
Coleocentrus excitator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. III. 2. 1860 P. 10. p. 7 n. 1, ♀ ♂.
Coleocentrus excitator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXI. 1863 p. 296 n. 2, ♀ ♂.
Coleocentrus excitator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 177, ♀.
Coleocentrus excitator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 109, ♀.
Coleocentrus excitator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2121 n. 2.

filiventris (Grav.) D. T. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Macrus filiventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 709 n. 144, ♀.
Ophion (Macrus) filiventris Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 325 n. 9.
Macrocoleus filiventris Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 1. 1850 p. 12, ♀.
Macrus filiventris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. 1881 p. 349, ♀.
Coleocentrus filiventris m.

heteropus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Coleocentrus heteropus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2122 n. 3, ♀ ♂.

maximus Rdw.[1]) — Eur.: Germania.
Coleocentrus maximus Rudow, Entom. Nachr. VII. 1881 p. 310 n. 4.

mellipes Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Coleocentrus mellipes Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 113 n. 3, ♂.
Coleocentrus mellipes Provancher, Canad. Entomol. XXV. 1893 p. 30.

molleri Bingh. — As.: India.
Coleocentrus Molleri Bingham, Journ. Bombay Soc. XII. 1898 p. 116.

occidentalis Cress. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Coleocentrus occidentalis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 376, ♀.
Coleocentrus occidentalis Harrington, Canad. Entomol. XXV. 1893 p. 31.

pettitii Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Coleocentrus Pettiti Cresson, Canad. Entomol. I. 1868 p. 35.

---

1) *Hymen.:* Sirex gigas (Rudow).

Coleocentrus Quebecensis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 79.
Coleocentrus Pettitii Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 8 n. 1, ♀.
Coleocentrus Pettiti Provancher, Faun. entom. Canad. Hymén. 1883 p. 440 n. 1, ♀.
Coleocentrus Pettiti Harrington, Canad. Entomol. XXV. 1893 p. 30, ♀ ♂.

ruficornis Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Coleocentrus ruficornis Rudow, Entom. Nachr. VII. 1881 p. 309 n. 3, ♀ ♂.

rufiventris (Brullé) D. T. — ♀ — Austr.: Tasmania.
Macrus ? rufiventris Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 164 n. 1, ♀; T. 42 F. 4.
Coleocentrus rufiventris m.

rufus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Coleocentrus rufus Provancher, Natural. Canad. VIII. 1876 p. 316.
Lampronota Edwardsii Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 379, ♀.
Coleocentrus rufus Provancher, Natural. Canada. XII. 1880 p. 9 n. 2, ♀.
Coleocentrus rufus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 441 n. 2, ♀.
Coleocentrus rufus Harrington, Canad. Entomol. XXV. 1893 p. 30.

scutellaris Rdw.[1] — ♀ — Eur.: Germania.
Coleocentrus scutellaris Rudow, Entom. Nachr. VII. 1881 p. 310 n. 5, ♀.

sixii Vollenh. — ♂ — Eur.: Batavia.
Coleocentrus Sixii Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XVI. 1873 p. 216 n. 9, ♂; T. 9 F. 4.

soleatus (Grav.) D. T. — ♂ — Eur.: Britannia.
Macrus soleatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 711 n. 147, ♂.
Macrocoleus soleatus Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 1. 1850 p. 12.
Coleocentrus soleatus m.

texanus Ashm. — ♀ — Am.: Texas, Columbia.
Coleocentrus Texanus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 444, ♀.

LEPTOBATOPSIS

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 47.
Leptobatus, nom. propr. Hymen.; ὄψ, visus.

australiensis Ashm. — Austr.
Leptobatopsis Australiensis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 47 [s. descr.].

LEPTOBATUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 432 n. 3.
λεπτός, tenuis; βατός, pervius.

Synon.: Banchus Blanchard.
Ichneumon Gmelin.

degener Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Volhynia.
Leptobatus degener Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 436 n. 30, ♀ ♂.
Leptobatus degener Thomson, Opusc. entom. P. 22. 1897 p. 2418 n. 1, ♀.

gracilis Brauns — ♂ — Eur.: Hungaria.
Leptobatus gracilis Brauns, Termész. Füzet. XIX. 1896 p. 272, ♂.

illinoiensis Walsh — ♀ — Am.: Illinois.
Leptobatus Illinoiensis Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. 1. 1873 p. 148, ♀.

rufipes (Gmel.) Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 58 n. 158.
Ichneumon rufipes Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2683 n. 112 & 234.

---

1) *Col.:* Saperda scalaris (Rudow).

Leptobatus rufipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 435 n. 29, ♀ ♂.
Leptobatus rufipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 198, ♀.
ziegleri Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Leptobatus Ziegleri Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 434 n. 28, ♀.
Banchus (Leptobatus) Ziegleri Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 322 n. 4.

Sect. D. **Cryptoidae** m.

28. *Subfam.* **Mesosteninae**

Ashmead, Smith: Insects of New Jersey 1900 p. 570.

POLYAENUS

Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 149.
πολύαινος, multum laudatus.

Synon.: Mesostenus Cresson.

ablutus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus (Polyaenus) ablutus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 149 n. 2, ♀.
basimaculus Cam. — ♀ ♂ — Am.: Guatemala. [T. 9 F. 24 (♀) & 25 (♂).
Polyaenus basimaculus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 246 n. 6, ♀ ♂;
championii Cam. — ♀ — Am.: Panama. [F. 23.
Polyaenus Championi Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 244 n. 3, ♀; T. 9
ectypus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus (Polyaenus) ectypus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 149 n. 1, ♀.
nitidiusculus Cam. — Am.: Guatemala.
Polyaenus nitidiusculus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 245 n. 4.
orizabensis Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Polyaenus Orizabensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 246 n. 5, ♀.
volcanicus Cam. — Am.: Panama.
Polyaenus volcanicus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 247 n. 7.

LISTROGNATHUS

Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 153.
λιστρόω, perpolire; γνάθος, maxilla.

Synon.: Mesostenus Gravenhorst & auct.

compressicornis (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Mesostenus compressicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 776 n. 227, ♀.
Mesostenus compressicornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 109 n. 1, ♀.
Mesostenus compressicornis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2117 n. 1, ♀ ♂.
Mesostenus (Listrognathus) compressicornis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1897 p. 2380 n. 2,
cornutus Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria. [♀ ♂.
Listrognathus cornutus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 154 n. 51, ♀ ♂.
pygostolus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Fennia, Germania.
Mesostenus pygostolus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 758 n. 220, ♀.
Mesostenus niveatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 759 n. 221, ♂.
Mesostenus pygostolus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 111 n. 9, ♀.

Mesostenus niveatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 112 n. 10, ♂.
Mesostenus pygostolus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 516 n. 3, ♀ ♂.
Mesostenus niveatus Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 398 n. 22, ♂.
Mesostenus pygostolus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1-2. 1881 p. 337, ♀.
Mesostenus (Listrognathus) pygostolus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1897 p. 2380 n. 1, ♀ ♂.
tricolor Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria.
Listrognathus tricolor Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 251 n. 25, ♀ ♂.

POLYCYRTUS

Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 154.
πολύς, multum; κυρτός, curvus.

Synon.; Cryptus Fabricius, Trentepol.
Ichneumon Thunberg.
Mesostenus Brullé.

accuratus Cress. — ♀ — Am.: Mexico. [n. 11, ♀.
Mesostenus (Polycyrtus) accurator Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 147
acerbus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus (Polycyrtus) acerbus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 144 n. 4, ♀.
alboannularis Ashm. — ♀ — Am.: California.
Polycyrtus alboannularis Ashmead, Proc. Californ. Acad. V. 1895 p. 550 n. 24, ♀.
atriceps Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus (Polycyrtus) atriceps Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 148 n. 15, ♀.
blanditus Cam. — Am.: Guatemala.
Polycyrtus blanditus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 235 n. 11; T. 9 F. 21.
canaliculatus Cam. — ♂ — Am.: Guatemala. [T. 10 F. 7.
Polycyrtus canaliculatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 234 n. 10, ♂;
capitator (Fabr.) Spin. — ♀ ♂ — Am. mer.
Cryptus capitator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 82 n. 44.
Ichneumon cephalator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258.
Ichneumon cephalator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg XI. 1824 p. 303.
Cryptus capitator Trentepol, Isis 1829 p. 842 n. 21, ♀.
Polycyrtus capitator Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 159 n. 16.
Mesostenus (Polycyrtus) capitator Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 214 n. 14, ♂.
chiriquensis Cam. — ♀ — Am.: Panama.
Polycyrtus Chiriquensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 242 n. 31, ♀.
chontalensis Cam. — ♂ — Am.: Nicaragua. [T. 10 F. 8.
Polycyrtus Chontalensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 236 n. 14, ♂;
collinus Cam. — ♀ — Am.: Guatemala.
Polycyrtus collinus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 231 n. 3, ♀; T. 10 F. 2.
confirmatus Cam. — Am.: Guatemala.
Polycyrtus confirmatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 232 n. 4; T. 10 F. 3.
copiosus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico. [♀ ♂.
Mesostenus (Polycyrtus) copiosus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 146 n. 10,
cruciatus Cam. — ♀ — Am.: Mexico. [F. 4.
Polycyrtus cruciatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 232 n. 7, ♀; T. 10
curvispina Cam. — Am.: Costa Rica.
Polycyrtus curvispina Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 244 n. 34.
curviventris Cam. — ♀ — Am.: Panama. [F. 28.
Polycyrtus curviventris Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 243 n. 32, ♀; T. 10

emarginatus Brullé — ♂ — Am. mer.
Mesostenus (Polycyrtus) emarginatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 210 n. 9, ♂.
erythrosternus Cam. — Am.: Panama. [F. 20.
Polycyrtus erythrosternus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 241 n. 28; T. 9
femoratus Spin. — ♀ — Am. mer.
Polycyrtus femoratus Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 160 n. 17, ♀.
ferox Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus (Polycyrtus) ferox Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 143 n. 2, ♀.
fulvipes Cam. — ♂ — Am.: Guatemala. [F. 11.
Polycyrtus fulvipes Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 238 n. 20, ♂; T. 10
fulvofemoratus Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [T. 9 F. 22.
Polycyrtus fulvofemoratus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 233 n. 8, ♀;
furvus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Mesostenus (Polycyrtus) furvus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 147 n. 12, ♂.
guatemalensis Cam. — ♂ — Am.: Guatemala. [T. 10 F. 9.
Polycyrtus Guatemalensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 237 n. 17, ♂;
histrio Spin. — ♀ ♂ — Am. mer.
Polycyrtus histrio Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 154 n. 13, ♀ ♂; T. 7 F. III.
Mesostenus (Polycyrtus) histrio Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 214 n. 15, ♀ ♂.
Mesostenus (Polycyrtus) histrio Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 77
junceus Cress. — ♂ — Am.: Mexico. [n. 4, ♀.
Mesostenus (Polycyrtus) junceus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 145 n. 8, ♂.
leprieuri Spin. — ♂ — Am.
Polycyrtus Leprieurii Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 157 n. 14, ♂.
leucopus Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus (Polycyrtus) leucopus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 205 n. 2, ♀.
leucostomus Taschbg. — ♂ — Am.: Brasilia. [p. 76 n. 2, ♂.
Mesostenus (Polycyrtus) leucostomus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876
lituratus Brullé — ♀ ♂ — Am.: Cuba.
Mesostenus (Polycyrtus) lituratus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 208 n. 6, ♀ ♂.
lucidator Er. — Am.: Guiana.
Polycyrtus lucidator Erichson, Schomburgk: Reisen in Guiana III. 1848 p. 587.
macer Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Mesostenus (Polycyrtus) macer Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 144 n. 5, ♀ ♂.
major Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus (Polycyrtus) major Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 143 n. 3, ♀.
mancus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico. [♀ ♂.
Mesostenus (Polycyrtus) mancus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 145 n. 6,
melanoleucus Brullé — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Mesostenus (Polycyrtus) melanoleucus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 204 n. 1, ♀.
Mesostenus (Polycyrtus) melanoleucus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 142
montezuma Cam. — ♂ — Am.: Mexico. [n. 1, ♀ ♂.
Polycyrtus Montezuma Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 234 n. 9, ♂;
nigriceps Brullé — ♂ — Am.: Brasilia. [T. 10 F. 6.
Mesostenus (Polycyrtus) nigriceps Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 212 n. 12, ♂.
nigritibialis Cam. — ♂ — Am.: Panama. [T. 10 F. 10.
Polycyrtus nigritibialis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 238 n. 18, ♂;
nigroscutellatus Brullé — Am.: Brasilia.
Mesostenus (Polycyrtus) nigroscutellatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 208 n. 5.

obtusispina Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [T. 10 F. 1.
Polycyrtus obtusispina Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 230 n. 1, ♀;

pallidibalteatus Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Polycyrtus pallidibalteatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 240 n. 27, ♀.

pallidus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Mesostenus (Polycyrtus) pallidus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 148 n. 14, ♂.

paululus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus (Polycyrtus) paululus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 145 n. 7, ♀.

quadrisulcatus Spin. — Am. mer.
Polycyrtus quadrisulcatus Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 162 n. 19; T. 7 F. 4.

reliquus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Mesostenus (Polycyrtus) reliquus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 146 n. 9, ♂.
Polycyrtus reliquus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 239 n. 21, ♂.

rufiventris Spin. — ♀ ♂ — Am. mer.
Polycyrtus rufiventris Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 161 n. 18, ♀.
Mesostenus (Polycyrtus) rufiventris Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 212 n. 11, ♀ ♂.

sartor (Fabr.) Spin. — ♀ — Am. mer.
Cryptus sartor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 80 n. 39.
Ichneumon sartor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon sartor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 306.
Cryptus sartor Trentepol, Isis 1829 p. 854 n. 30, ♀.
Polycyrtus sartor Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 158 n. 15, ♀.
Mesostenus sartor Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 217 n. 20, ♀.

suturalis Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus (Polycyrtus) suturalis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 211 n. 10, ♀.

testaceus Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia. [p. 76 n. 1, ♀.
Mesostenus (Polycyrtus) testaceus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876

tinctipennis Cam. — ♀ ♂ — Am.: Panama. [T. 9 F. 19.
Polycyrtus tinctipennis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 241 n. 30, ♀ ♂;

tricolor Brullé — ♀ — Am.: Cuba.
Mesostenus (Polycyrtus) tricolor Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 209 n. 7, ♀.
Mesostenus tricolor Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 29, ♀.

trilineatus Brullé — ♀ ♂ — Am.: Haiti, Cayenne.
Mesostenus (Polycyrtus) trilineatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 207 n. 4, ♀ ♂.

tuberculatus Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus (Polycyrtus) tuberculatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 206 n. 3, ♀.

univittatus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico. [n. 13, ♀ ♂.
Mesostenus (Polycyrtus) univittatus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 148

xanthopus Brullé — ♂ — Am.: Panama.
Mesostenus (Polycyrtus) xanthopus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 210 n. 8, ♂.

xanthothorax Brullé — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Mesostenus (Polycyrtus) xanthothorax Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 213 n. 13, ♂.
Mesostenus (Polycyrtus) xanthothorax Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 [p. 77 n. 3, ♀.
Polycyrtus xanthothorax Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 243 n. 33, ♀; [T. 10 F. 12.

CRYPTUROPSIS

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 45.
Crypturus, nom. propr. Hymen.; ὄψ, visus.

Synon.: Crypturus Ashmead [non Gravenhorst].

dyari (Ashm.) D. T.[1]) — ♀ ♂ — Am.
Crypturus Dyari Ashmead, Canad. Entomol. XXIX. 1897 p. 113, ♀ ♂.
Crypturus Dyari Dyar, Journ. New York Entom. Soc. V. 1897 p. 126.
Crypturopsis Dyari m.

texanus Ashm. — ♂ — Am.: Texas.
Crypturus Texanus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 413, ♂.
Crypturopsis Texanus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 45.

BRACHYCORYPHUS

Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 46.
βραχύς, brevis; κορυφή, vertex.

braunsii Kriechb. — ♀ — Afr. occ.
Brachycoryphus Braunsii Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p.47 n.6, ♀.

calabaricus Kriechb. — ♀ — Afr.: Calabar. [n. 5, ♀.
Brachycoryphus Calabaricus Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 47

mesoleucus Kriechb. — ♀ — Afr. occ. [n. 8, ♀.
Brachycoryphus mesoleucus Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 48

tricolor Kriechb. — ♀ — Afr. occ.
Brachycoryphus tricolor Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 47 n. 7, ♀.

CRYPTANURA

Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 242.
κρύπτω, abscondo; οὐρά, cauda.

acolhua Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Cryptanura Acolhua Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 167 n. 3, ♀.

detecta Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Cryptanura detecta Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 167 n. 2, ♀.

hyalina Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Cryptanura hyalina Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 244 n. 3, ♀.

incauta Cam. — ♀ — Am.: Panama.
Cryptanura incauta Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 251 n. 4, ♀.

laticarinata Cam. — Am.: Panama.
Cryptanura laticarinata Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 252 n. 5.

nigripes Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Cryptanura nigripes Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 245 n. 4, ♀; T. 41 F. 6.

pachymenae Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Cryptanura? pachymenae Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 168 n. 4, ♀ ♂.

pedicata Cam. — ♂ — Am.: Mexico.
Cryptanura pedicata Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 252 n. 6, ♂.

rugosa Brullé — ♀ — Am.: Guiana.
Cryptanura rugosa Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 244 n. 2, ♀.

striata Brullé — ♀ — Am.: Guiana.
Cryptanura striata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 243 n. 1, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Eupoeya slossonae (Ashmead).

sumichrastii Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Cryptanura Sumichrasti Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 166 n. 1, ♀ ♂.

CHRISTOLIA

Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 246.
Christol, nom. propr.

Synon.: Mesostenus Cresson.

abdominalis Cress. — ♀ — Am.: Mexico. [n. 6, ♀.
Mesostenus (Christolia) abdominalis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 165
calcarata Cress. — ♂ — Am.: Mexico. [n. 2, ♂.
Mesostenus (Christolia) calcarata Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 164
graciliventris Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Christolia graciliventris Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 249 n. 8, ♀.
menticula Cam. — ♀ ♂ — Am.: Mexico, Guatemala, Panama. [T. 10 F. 29.
Christolia menticula Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 248 n. 4, ♀ ♂;
mirabilis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico. [n. 4, ♀ ♂.
Mesostenus (Christolia) mirabilis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 165
miranda Cress. — ♀ — Am.: Mexico. [n. 5, ♀.
Mesostenus (Christolia) mirandus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 165
nubecula Cress. — ♀ — Am.: Mexico. [n. 1, ♀.
Mesostenus (Christolia) nubecula Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 163
panamensis Cam. — ♀ ♂ — Am.: Panama. [T. 10 F. 27.
Christolia Panamensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 247 n. 2, ♀ ♂;
pulchripes Cam. — ♂ — Am.: Guatemala.
Christolia pulchripes Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 250 n. 10, ♂.
punctata Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Christolia punctata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 247 n. 1, ♀; T. 41 F. 5.
tarsoleucos Cam. — ♂ — Am.: Guatemala.
Christolia tarsoleucos Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 250 n. 9, ♂.
zapotecus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico. [n. 3, ♀ ♂.
Mesostenus (Christolia) Zapotecus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 164

MESOSTENOIDEUS

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 45.
Mesostenus, nom. propr. Hymen.; εἶδος, forma.

Synon.: Mesostenus Cresson.

albomaculatus (Cress.) Ashm. — ♀ — Am.: Pennsylvania.
Mesostenus albomaculatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 313 n. 2, ♀.
Mesostenoideus albomaculatus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 45.

MESOSTENUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 750 n. 4.
μέσος, medius; *στένος*, angustus.

Synon.: Barycerus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 777 n. 5.
βαρύς, gravis; *κέρας*, cornu.
Cryptus Gravenhorst.
Exetastes Provancher.
Ichneumon Scopoli & auct.

abactus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus Abactus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 160 n. 20, ♀.

absolutus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus absolutus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 158 n. 16, ♀.
acceptus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus acceptus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 154 n. 6, ♀.
accolens Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus accolens Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 159 n. 17, ♀.
admirandus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus admirandus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 155 n. 10, ♀.
admonitus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Mesostenus admonitus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 160 n. 21, ♂.
Mesostenus admonitus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 217 n. 6.
admotus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus admotus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 156 n. 12, ♀.
agilis Smith — ♀ — As.: Aru.
Mesostenus agilis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 171 n. 2, ♀.
agnatus Tosqu. — ♂ — Afr.: Delagoa Bay.
Mesostenus agnatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 239 n. 16, ♂.
albimaculatus Taschbg. — ♂ — Am.: Brasilia.
Mesostenus albimaculatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 86 n. 14, ♂.
albipes Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus albipes Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 218 n. 22, ♀.
albispinis Brullé — ♀ — Am.: Guiana.
Mesostenus albispinis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 222 n. 27, ♀.
albopictus Smith — ♀ ♂ — As.: Key.
Mesostenus albopictus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 172 n. 3, ♀ ♂.
albospinosus Smith — ♀ — As.: Celebes.
Mesostenus albospinosus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 23 n. 1, ♀.
americanus Cress. — ♀ — Am.: Maine, Virginia.
Mesostenus Americanus Cresson, Canad. Entomol. X. 1878 p. 209, ♀.
animatus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus animatus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 161 n. 23, ♀.
annulipes Brullé — ♀ — As.: Java.
Mesostenus annulipes Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 233 n. 43, ♀.
annulitarsis Cam. — ♀ — Am.: Panama. [T. 10 F. 15.
Mesostenus annulitarsis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 215 n. 4, ♀;
apertus Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus apertus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 90 n. 20, ♀.
arctus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Mesostenus arctus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 162 n. 26, ♂.
Mesostenus arctus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 215 n. 3.
arcuatus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus arcuatus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 156 n. 11, ♀.
areolatus Taschbg. — ♀ — Am. mer.
Mesostenus areolatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 81 n. 8, ♀.
argiolus Rdw. — Eur.: Germania.
Mesostenus argiolus Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1881 p. 33.
arrogans Smith — ♀ — Austr.: New Guinea.
Mesostenus arrogans Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 63 n. 2, ♀.
arvalis Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Mesostenus arvalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 163, ♀.

ater Ratzbg.[1]) — ♂ — Eur.: Germania.
Mesostenus ater Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 142 n. 4, ♂.
audax Cress. — ♀ — Am.: Georgia.
Mesostenus audax Cresson, Canad. Entomol. X. 1878 p. 207, ♀.
aztecus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus Aztecus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 152 n. 1, ♀.
bilineatus Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus bilineatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 216 n. 18, ♀.
bipartitus Brullé — ♀ — Am.: Guiana.
Mesostenus bipartitus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 220 n. 25, ♀.
brachycentrus Ratzbg.[2]) — ♀ — Eur.: Germania.
Mesostenus brachycentrus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 142 n. 3, ♀.
brachygaster Cam. — Am. centr.
Mesostenus brachygaster Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 219 n. 15.
callosus Taschbg. — ♂ — Am.: Brasilia.
Mesostenus callosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 80 n. 7, ♂.
candidus Cress. — ♂ — Am.: New York.
Mesostenus candidus Cresson, Canad. Entomol. X. 1878 p. 206, ♂.
chichimecus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus Chichimecus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 155 n. 9, ♀.
chiriquensis Cam. — ♀ — Am.: Panama.
Mesostenus Chiriquensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 218 n. 13, ♀.
cingulatellus Costa — ♀ ♂ — Eur.: Sardinia.
Mesostenus cingulatellus A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli XXIV. 1886 p. 323.
Mesostenus cingulatellus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p. 15.
Mesostenus cingulatellus A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 113.
cingulatus Kriechb. — ♀ — Afr.
Mesostenus cingulatus Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXVIII. 1894 p. 48 n. 9, ♀.
collaris Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Mesostenus collaris Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 162 n. 25, ♂.
communis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Mesostenus communis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 154 n. 8, ♀♂.
compactus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus compactus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 153 n. 3, ♀.
contractus Tosqu. — ♀ — Afr.: Gambia.
Mesostenus contractus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 231 n. 12, ♀.
corpulentus Cam. — Am.: Mexico.
Mesostenus corpulentus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 223 n. 24.
costaricensis Cam. — ♀ — Am.: Costa Rica.
Mesostenus Costaricensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 225 n. 31, ♀.
Mesostenus Nicaraguensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 225 n. 31, ♀; [T. 10 F. 13.
crassicornis Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus crassicornis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 218 n. 21, ♀.
crassipes Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus crassipes Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 237 n. 48, ♀.
cressonii D. T. — ♀ — Am.: Louisiana.
Mesostenus laticinctus Cresson, Canad. Entomol. X. 1878 p. 208, ♀ [nec Walker].
Mesostenus Cressonii m.

---

1) *Col.:* Melandrya spec. (Ratzeburg).
2) *Col.:* Hylesinus crenatus (Ratzeburg).

cruentator Klug — ♀ — Eur.: Lusitania.
Mesostenus cruentator Klug, Waltl: Reise d. Tirol etc. 1835 P. 2. p. 89, ♀.
cryptoides Spin. — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus cryptoides Spinola, Mem. accad. sc. Torino (2) XIII. 1851 p. 40 n. 20, ♀.
curvipes Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus curvipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 88 n. 16, ♀.
debilis Ratzbg. — ♂ — Eur.: Germania.
Mesostenus debilis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 143 n. 5, ♂.
decoratus Smith — ♀ — Austr.: Gilolo.
Mesostenus decoratus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. VI. 1861 p. 63 n. 1, ♀.
dejectus Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Mesostenus dejectus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 163, ♀.
delawarensis D. T. — ♂ — Am.: Delaware.
Mesostenus albopictus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 312 n. 1, ♂ [non Smith 1858].
Mesostenus Delawarensis m.
denticulatus Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus denticulatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 93 n. 23, ♀.
diligens Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Mesostenus diligens Cresson, Canad. Entomol. X. 1878 p. 207, ♀.
dimidiatus Brullé — ♂ — Am. mer.
Mesostenus dimidiatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 234 n. 44, ♂.
discoidalis Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Mesostenus discoidalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 162, ♀.
discus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus discus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 153 n. 4, ♀.
dorsalis Brullé — ♀ — Afr.: Cap.
Mesostenus dorsalis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 230 n. 39, ♀.
dorsostriatus Spin. — ♀ — Am. mer.
Mesostenus dorsostriatus Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 152 n. 11, ♀.
eisenii Ashm. — Am.: California.
Mesostenus Eisenii Ashmead, Proc. Californ. Acad. IV. 1894 p. 129.
erythrogaster Ashm. — ♂ — Am.: Wisconsin.
Mesostenus erythrogaster Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 406, ♂.
euryaspis Cam. — Am.: Mexico.
Mesostenus euryaspis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 226 n. 33.
exaptus Cress. — ♀ — Am.: Massachusetts.
Mesostenus exaptus Cresson, Canad. Entomol. X. 1878 p. 208, ♀.
exitialis Tosqu. — ♀ — Afr.: Guinea, Togo, Delagoa Bay.
Mesostenus exitialis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 217 n. 4, ♀.
facialis Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus facialis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 153 n. 5, ♀.
ferrugineus Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus ferrugineus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 232 n. 42, ♀.
ferrumequinum Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus ferrumequinum Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 219 n. 23, ♀.
festivus Tosqu. — ♂ — Afr.: Cap.
Mesostenus festivus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 230 n. 11, ♂.
flavescens Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Mesostenus flavescens Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 31, ♀.
flavofasciatus Spin. — ♀ — Am. mer.
Mesostenus flavofasciatus Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 153 n. 12, ♀.

fortis Cress. — ♀ — Am.: New York.
Mesostenus fortis Cresson, Canad. Entomol. X. 1878 p. 206, ♀.
fraternus Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus fraternus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 220 n. 18, ♀.
fulvaster Tosqu. — ♀ — Afr.: Guinea.
Mesostenus fulvaster Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 215 n. 3, ♀.
fulvus Cress. — ♂ — Am.: Delaware.
Mesostenus ? fulvus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 316 n. 5, ♂.
funebris Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Mesostenus funebris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 775 n. 226, ♀.
Mesostenus funebris Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 109 n. 2, ♀.
Mesostenus funebris Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXVII. 1873 [p. 27 n. 3, ♀ ♂.
furax Tschek — ♀ ♂ — Eur.
Mesostenus furax Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 152 n. 50, ♀ ♂.
geniculatus Brullé — ♀ — As.: India.
Mesostenus geniculatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 225 n. 32, ♀.
gladiator (Scop.) Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Mouffet, Insect. Theatr. 1634 p. 64.
—— Réaumur, Mém. hist. Insect. VI. 1742 p. 302; T. 39 F. 1-10.
—— Kratzenstein, Erzeugg. d. Würmer 1748 p. 26; Tab. 1.
? Ichneumon domator Poda, Insect. mus. Graec. 1761 p. 105 n. 6.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 340 n. 44.
Ichneumon gladiator Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 283 n. 744; T. 40 F. 744.
Ichneumon XXII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1. 1766; T. 49 F. 4.
Ichneumon compunctor Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 357 n. 720, ♀.
Ichneumon tarsosus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 408 n. 45.
Ichneumon comitator Borowsky, Naturgesch. d. Thiere VIII. 1787 p. 33 n. 5,
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 60 n. 179.
Ichneumon gladiator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 161 n. 79.
? Ichneumon insignitor Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 164 n. 90.
Ichneumon macrourus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2687 n. 252.
Ichneumon gladiator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 42 n. 759.
Ichneumon gladiator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 354.
Ichneumon comitator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 177 n. 66.
Ichneumon incubitor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 179 n. 74.
? Ichneumon gladiator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 180 n. 79.
Ichneumon tarsosus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 210 n. 21.
Ichneumon enervator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 163 n. 125.
Ichneumon enervator Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 160 n. 495.
Ichneumon compunctor Schrank, Fauna Boica II. 1. 1802 p. 296 n. 2067.
Pimpla enervator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 85 n. 60.
Cryptus enervator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 263 n. 3764.
Ichneumon enervator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀.
Ichneumon gladiator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 64 n. 759, ♀.
Cryptus gladiator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 288.
Cryptus enervator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 288.
Ichneumon renovator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon gladiator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273.

---

[1]) *Hymen.:* Pelopoeus spirifex (Ratzeburg), Osmia Spinolae (Vollenhoven), Eumenes pomiformis (Friese).

Ichneumon cryptator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 275.
Ichneumon renovator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 301.
Ichneumon gladiator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 343.
Ichneumon cryptator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 348.
Cryptus enervator Trentepol, Isis 1829 p. 834 n. 14, ♀.
Mesostenus gladiator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 765 n. 225, ♀ ♂.
? Ichneumon insignitor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 901 n. 35, ♀ ♂.
Cryptus (Mesostenus) gladiator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 313 n. 11.
Ichneumon (Mesostenus) gladiator Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 28 n. 29; T. 6 F. 9.
Mesostenus gladiator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 146 n. 1, ♀ ♂.
Mesostenus gladiator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 126 n. 1.
Mesostenus gladiator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 31 n. 4, ♀ ♂.
Mesostenus gladiator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 109 n. 3, ♀ ♂.
Mesostenus gladiator Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 57, ♀ ♂.
Mesostenus gladiator Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 65; T. 41 F. 3.
Mesostenus gladiator Friese, Entom. Nachr. XXI. 1895 p. 123.

gracilipes Cress. — ♀ — Am.: California.
Mesostenus gracilipes Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 365, ♀.

gracilis Cress.[1] — ♂ — Am.: Virginia.
Mesostenus gracilis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 315 n. 4, ♂.

grammicus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Fennia, Germania, Gallia.
Mesostenus grammicus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 757 n. 219, ♀.
Mesostenus grammicus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 30 n. 3, ♀.
Mesostenus grammicus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 110 n. 4, ♀.
Mesostenus grammicus Woldstedt, Horae soc. entom. Ross. XVI. 1881 p. 61, ♂.

gravenhorstii Spin. — ♀ — Am. mer.
Mesostenus Gravenhorstii Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 147 n. 9, ♀.

grenadensis Ashm. — ♀ — Am.: Grenada.
Mesostenus Grenadensis Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 268 n. 173, ♀.

grossipes Brullé — ♀ — Am.: Guiana.
Menostenus grossipes Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 237 n. 49, ♀.

guttatus (Grav.) Taschbg. — Am. mer.
Barycerus guttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 779 n. 228.
Brachyceros guttatus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 314.
Brachyceros guttatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 2.
Baryceros guttatus Kriechbaumer, Stettin. entom. Zeitg. XXXVI. 1875 p. 39.
Mesostenus guttatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 83.

hilarulus Tosqu. — ♂ — Afr.: Aegyptus.
Mesostenus hilarulus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 224 n. 8, ♂.

humilis Kriechb. — ♀ — Afr.: Natal.
Mesostenus humilis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 302 n. 10, ♀.

incertus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Mesostenus incertus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 161 n. 22, ♀ ♂.

infirmus Tosqu. — ♂ — Afr.: Togo.
Mesostenus infirmus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 219 n. 5, ♂.

inflatus Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus inflatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 239 n. 51, ♀.

ingenuus Tosqu. — ♂ — Afr.: Aegyptus.
Mesostenus ingenuus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 212 n. 1, ♂.

---

1) *Lep.:* Dakruma coccidivora (Comstock).

insidiator Smith — ♀ — As.: Celebes.
Mesostenus insidiator Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 60 n. 1, ♀.
insularis Ashm. — ♀ ♂ — Am.: St. Vincent.
Mesostenus insularis Ashmead, Journ. Linn. Soc. Zool. XXV. 1894 p. 138, ♀ ♂.
introitus Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Mesostenus introitus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 162, ♂.
intrudens Smith — ♀ — Am.: Costa Rica.
Mesostenus intrudens Smith, Descr. New Spec. Hymen. 1879 p. 232 n. 2, ♀.
Mesostenus intrudens Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 217 n. 7; T. 10 [F. 16.
jocosus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Mesostenus jocosus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 300.
Mesostenus jocosus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 112[b] n. 4, ♀; Fig. 2[fg].
Mesostenus jocosus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 346 n. 4, ♀; Fig. 35[fg].
juvenilis Tosqu. — ♀ — Afr.: Algeria.
Mesostenus juvenilis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 214 n. 2, ♀.
lamentarius Cam. — ♀ — Am.: Panama.
Mesostenus lamentarius Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 219 n. 14, ♀; [T. 10 F. 14.
lassatus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Mesostenus lassatus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 157 n. 14, ♂.
laticinctus Walk. — ♂ — As.: Japonia.
Mesostenus ? laticinctus Walker, Cistula entom. I. P. 11. 1874 p. 304 n. 8, ♂.
leucocoxa Ashm. — ♂ — Am.: Missouri.
Mesostenus leucocoxa Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 407, ♂.
leucopus Ashm. — ♂ — Am.: Illinois.
Mesostenus leucopus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 406, ♂.
leucopygus Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus leucopygus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 89 n. 18, ♀.
leucozonus Brullé — ♀ — Afr.: New Guinea.
Mesostenus leucozonus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 231 n. 40, ♀.
ligator Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
? Ichneumon zonator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 151 n. 73.
? Bassus zonator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 97 n. 14.
? Ichneumon zonator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 112, ♀.
? Ichneumon zonator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
? Ichneumon zonator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 296.
Mesostenus ligator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 760 n. 22, ♀ ♂.
? Ichneumon zonator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 907 n. 44.
Mesostenus ligator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 147 n. 2, ♀ ♂.
Mesostenus ligator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 111 n. 8, ♀ ♂.
Mesostenus ligator Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 515 n. 1, ♀ ♂.
Mesostenus ligator Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 65, ♀ ♂; T. 41 F. 1 (♂) & 2 (♀).
Mesostenus ligator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1/2. 1881 p. 337, ♂.
Mesostenus ligator Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 37 n. 3, ♀ ♂.
Mesostenus ligator Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1897 p. 2378 n. 1.
lituratus Brullé — ♀ ♂ — Am.: Indiana, Philadelphia.
Mesostenus lituratus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 223 n. 29, ♀ ♂.
Mesostenus lituratus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 28, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Clisiocampa neustria (Ratzeburg), Zygaena trifolii, Acronycta rumicis (Brischke). — *Hymen.:* Clavellaria amerinae (Brischke).

longicauda Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus longicauda Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 229 n. 37, ♀.
longipes Cam. — Am.: Costa Rica.
Mesostenus longipes Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 225 n. 32.
luctuosus Brullé — ♂ — Austr.
Mesostenus luctuosus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 226 n. 33, ♂.
luridus Tosqu. — ♂ — Afr.: Togo.
Mesostenus luridus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 223 n. 7, ♂.
luxuriosus Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus luxuriosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 94 n. 24, ♀.
macilentus Cress. — ♂ — Am.: United States.
Mesostenus macilentus Cresson, Canad. Entom. X. 1878 p. 210, ♂.
macrurus D. T. — ♀ — Am.: Texas.
Mesostenus longicaudis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 164, ♀ [non Brullé].
Mesostenus macrurus m.
maculicollis Spin. — ♀ — Am. mer.
Mesostenus maculicollis Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 150 n. 10, ♀.
maculipennis Taschbg. — ♂ — Am.: Brasilia.
Mesostenus maculipennis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 78 n. 5, ♂.
marginatus Brullé — ♀ — As.: Bengal, Philippines.
Mesostenus marginatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 224 n. 30, ♀.
maurus Marsh. — ♀ — Eur.: Britannia.
Mesostenus maurus Marshall, Entom. M. Magaz. IX. 1873 p. 241.
Mesostenus maurus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 37, ♀.
megapoda Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [T. 10 F. 19.
Mesostenus megapoda Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 224 n. 30, ♀;
mexicanus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Mesostenus Mexicanus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 157 n. 13, ♀ ♂.
mirus Tosqu. — ♀ — Afr.: Senegambia.
Mesostenus mirus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 228 n. 10, ♀.
modicus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus modicus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 154 n. 7, ♀.
molestus Smith — ♀ — As.: Batchian.
Mesostenus molestus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 138 n. 1, ♀.
montezuma Cam. — Am.: Mexico.
Mesostenus Montezuma Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 221 n. 19.
moratus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Mesostenus moratus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 158 n. 15, ♀ ♂.
multipictus Smith — ♀ — As.: Mysol.
Mesostenus multipictus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 8 n. 1, ♀.
nigerrimus Smith — ♀ — Am.: Costa Rica.
Mesostenus nigerrimus Smith, Descr. New Spec. Hymen. 1879 p. 231 n. 1, ♀.
Mesostenus nigerrimus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 215 n. 2; T. 10
nigrolineatus Taschbg. — ♂ — Am.: Brasilia. [F. 20
Mesostenus nigrolineatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 79 n. 6, ♂.
nigrospinus Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus nigrispina Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 223 n. 25, ♀.
notatus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Italia.
Mesostenus notatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 764 n. 224, ♀ ♂.
Mesostenus notatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 110 n. 6, ♀ ♂.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

CATALOGUS HYMENOPTERORUM

hucusque descriptorum

systematicus et synonymicus

Auctore

Dr. C. G. DE DALLA TORRE

Professore Oenipontano.

Volumen III:

Trigonalidae, Megalyridae, Stephanidae, Ichneumonidae, Agriotypidae, Evaniidae, Pelecinidae.

Pars II (signatura 35—72).

LIPSIAE

Sumptibus Guilelmi Engelmann

MDCCCCI, MDCCCCII.

novatus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus novatus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 159 n. 18, ♀.
novozealandicus D. T. — ♀ ♂ — New Zealand. [Smith 1858, nec Cresson].
Mesostenus albopictus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 477, ♀♂; T. 4 F. 1 (♀) [non
Mesostenus albopictus Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 123, ♀ ♂.
Mesostenus Novozealandicus m.
nubeculator Gir. — ♀ — Eur.: Austria, Hungaria.
Mesostenus nubeculator Giraud, Verh zool. bot. Ver. Wien VII. 1857 p. 170, ♀; T. 3 F. 6.
nubilipennis Cress. — Am.: Georgia.
Mesostenus nubilipennis Cresson, Canad. Entomol. X. 1878 p. 205.
obesus Tosqu. — ♀ — Afr.: Sierra Leone.
Mesostenus obesus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 235 n. 14, ♀.
obnoxius Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Mesostenus obnoxius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 763 n. 223, ♀ ♂.
Mesostenus obnoxius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 111 n. 7, ♀♂.
Mesostenus obnoxius Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 65; T. 41 F. 4.
Mesostenus obnoxius Bignell, Entomologist XIII. 1880 p. 16.
Mesostenus obnoxius Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 17.
Mesostenus obnoxius Bridgman, Entomologist XIII. 1880 p. 18.
Mesostenus obnoxius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 337, ♂.
Mesostenus obnoxius Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 37 n. 2, ♀ ♂.
Mesostenus obnoxius Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1897 p. 2378 n. 2.
ochropus Brullé — ♀ — As.: India.
Mesostenus ochropus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 232 n. 41, ♀.
ornatifrons Cam. — ♀ — Am.: Mexico, Costa Rica. [T. 10 F. 17.
Mesostenus ornatifrons Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 221 n. 22, ♀;
pallidus Kriechb. — ♀ ♂ — Afr.: Kamerun.
Mesostenus pallidus Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXVIII. 1894 p. 50 n. 11, ♀♂.
paludatus Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Mesostenus paludatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 162, ♂.
parvituberculatus Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [♀; T. 20 F. 21.
Mesostenus parvituberculatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 228 n. 42,
pertenuis Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Mesostenus pertenuis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 162 n. 24, ♂.
pertinax Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Mesostenus pertinax Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 163, ♀.
physocnemis Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus physocnemis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 236 n. 47, ♀.
physoscelus Brullé — ♀ — Austr.
Mesostenus physoscelus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 240 n. 52, ♀.
pictus Smith — ♀ — As.: Aru.
Mesostenus pictus Smith, Journ. Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 171 n. 1, ♀.
pilosus Taschbg. — ♀ — Am.: Venezuela.
Mesostenus pilosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 87 n. 15, ♀.
platyurus Brullé — ♀ — Am.: Columbia.
Mesostenus platyurus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 221 n. 26, ♀.
pompiliformis Cam. — ♀ — Am.: Guatemala.
Mesostenus pompiliformis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 214 n. 1, ♀.

[1] *Lep.:* Zygaena filipendulae (Bignell), Z. trifolii, Z. ephialtes, Z. peucedani, Z. onobrychis, Z. carniolica (Brischke).

posticus Brullé — ♂ — Am.: Brasilia.
Mesostenus posticus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 220 n. 24, ♂.
promptus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Illinois.
Mesostenus promptus Cresson, Canad. Entom. X. 1878 p. 209.
Exetastes brevipennis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 213 n. 6, ♀ ♂.
Mesostenus promptus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 363 n. 6.
Mesostenus brevipennis Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 7.
Mesostenus promptus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 785 n. 6.
Mesostenus brevipennis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 386 n. 6, ♀ ♂.
Mesostenus brevipennis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 794.
propinquus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Mesostenus propinquus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 152 n. 2, ♀ ♂.
protervus Tosqu. — ♀ — Afr.: Delagoa Bay.
Mesostenus protervus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 237 n. 15, ♀.
provancheri D. T. — ♂ — Am.: Canada.
Mesostenus ruficoxus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 266, ♂ [non **Brullé**].
Mesostenus Provancheri m.
pulcherrimus Smith — ♀ — As.: Waigiou.
Mesostenus pulcherrimus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 8 n. 2, ♀.
pusillus Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Mesostenus pusillus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 31, ♀.
quadrilineatus Brullé — ♀ — Am.: Guyana.
Mesostenus quadrilineatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 217 n. 19, ♀.
robustus Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Mesostenus robustus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 25, ♀.
ruficollis Rdw. — Eur.: Germania.
Mesostenus ruficollis Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1881 p. 33.
ruficoxis Brullé — ♀ — Patria?
Mesostenus ruficoxis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 215 n. 16, ♀.
ruficrus Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus ruficrus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 85 n. 12, ♀.
rufithorax Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus rufithorax Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 92 n. 22, ♀.
rufotinctus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Mesostenus rufotinctus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 301, ♂.
sagax Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Mesostenus sagax Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 112b n. 3, ♀; F. 2e.
Mesostenus sagax Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 345 n. 3, ♀; F. 35e.
sanctus D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus robustus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 84 n. 11, ♀ [non Cresson].
Mesostenus sanctus m.
sanguineus Taschbg. — Am.: Brasilia.
Mesostenus sanguineus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 89 n. 17.
saundersii Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Mesostenus Saundersi Cresson, Canad. Entomol. X. 1878 p. 208, ♀.
seductor (Fabr.) Brullé — ♀ — Am. mer.
Cryptus seductor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 82 n. 45.
Ichneumon seductor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon seductor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 307.
Ichneumon seductor Trentepol, Isis 1829 p. 937 n. 52, ♀.
Mesostenus seductor Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 230 n. 38, ♀.

semialbus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Cuba.
Mesostenus semialbus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 30, ♀ ♂.
seminiger Kriechb. — ♀ — Afr.: Congo.
Mesostenus seminiger Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXVIII. 1894 p. 49 n. 10, ♀.
semirufus Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus semirufus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 228 n. 36, ♀.
sericeus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Mesostenus sericeus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 264, ♂ [p. p.].
Mesostenus sericeus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 111 n. 2, ♀; F. 2[d].
Mesostenus sericeus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 345 n. 2; F. 2[d].
Mesostenus sericeus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 362.
simonis Marsh. — ♀ — Am.: Venezuela.
Mesostenus Simonis Marshall, Ann. soc. entom. France LXI. 1892 p. 61 n. 50, ♀; T. 1 F. 4.
somaliensis Magr. — ♀ — Afr. or.
Mesostenus Somaliensis Kriechbaumer, Magretti: Ann. mus. civ. Genova XXXV. 1895 p. 171 [n. 29, ♀.
sordidus Tosqu. — ♀ — Afr.: Sierra Leone.
Mesostenus sordidus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 221 n. 6, ♀.
spinarius Brullé — ♀ — Am.: Carolina.
Mesostenus spinarius (Bosc) Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 227 n. 34, ♀.
spinifrons Brullé — ♀ — Afr.: Cap.
Mesostenus spinifrons Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 224 n. 31, ♀.
stramineus Taschbg. — ♀ — Am.: Venezuela.
Mesostenus stramineus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 83 n. 10.
strenuus Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Mesostenus strenuus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 26, ♂.
striatifrons Cam. — ♀ — Am.: British Honduras.
Mesostenus striatifrons Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 222 n. 23, ♀.
stupidus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Mesostenus stupidus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 159 n. 19, ♀.
subcircularis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesostenus subcircularis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1897 p. 2379 n. 4, ♀ ♂.
subovalis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesostenus subovalis Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 516 n. 2.
Mesostenus subovalis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1237 n. 1.
Mesostenus subovalis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2379 n. 3, ♀ ♂.
subtenuis Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Mesostenus subtenuis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 29, ♂.
tarsatus Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Mesostenus tarsatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 27, ♀.
taschenbergii D. T. — ♂ — Am.: Brasilia.
Mesostenus propinquus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 90 n. 19, ♂
Mesostenus Taschenbergii m. [non Cresson].
terminalis Brullé — ♀ — Afr.: Senegal.
Mesostenus terminalis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 234 n. 45, ♀.
thoracicus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Mesostenus thoracicus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 314 n. 3, ♀ ♂.
Mesostenus thoracicus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 266.
Mesostenus thoracicus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 113[b] n. 5, ♀ ♂; F. 2[b].
Mesostenus thoracicus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 346 n. 5; F. 35[b].
tibialis Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus tibialis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 241 n. 54, ♀.

transversostriatus Spin. — ♂ — Am.: Brasilia.
Mesostenus transversostriatus Spinola, Mem. accad. sc. Torino (2) XIII. 1851 p. 39 n. 19, ♂.
trichromus Spin. — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus trichromus Spinola, Mem. accad. sc. Torino (2) XIII. 1851 p. 38 n. 18, ♀.
tripartitus Brullé — ♀ — Afr.: Senegal.
Mesostenus tripartitus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 222 n. 28, ♀.
Mesostenus tripartitus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 241 n. 17, ♀.
v-album Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus V-album Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 86 n. 13, ♀.
variegatus Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus variegatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 227 n. 35, ♀; T. 40 F. 3.
variipes Brullé — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Mesostenus varipes Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 238 n. 50, ♀ ♂.
varus Brullé — ♀ — Am.: Guyana.
Mesostenus varus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 235 n. 46, ♀.
veraepacis Cam. — Am.: Guatemala.
Mesostenus veraepacis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 42. 1885 Hymen. I. p. 220 n. 17.
vesiculosus Brullé — ♀ — As.: Java.
Mesostenus vesiculosus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 240 n. 53, ♀.
vicinus Tosq. — ♀ — Afr.: Senegal.
Mesostenus vicinus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 233 n. 13, ♀.
violascens Taschbg. — ♀ — Am.: Panama.
Mesostenus violascens Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 91 n. 21, ♀.
vividus Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [F. 18.
Mesostenus vividus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 216 n. 5, ♀; T. 10
vulpio Tosqu. — ♂ — Afr.: Delagoa Bay.
Mesostenus vulpio Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 226 n. 9, ♂.
xanthomelas Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Mesostenus xanthomelas Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 215 n. 17, ♀.
zebra Taschbg. — ♂ — Am.: Brasilia.
Mesostenus zebra Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 82 n. 9, ♂.
zonatus Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Mesostenus zonatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 28, ♀.

STENARAEUS

Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2380.
στενός, angustus; *ἀραιός*, tenuis.

Synon.: Mesostenus Grav. & auct.

albinotatus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Gallia.
Mesostenus albinotatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 756 n. 218, ♀ ♂.
Mesostenus albinotatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 30 n. 2, ♀.
Mesostenus albinotatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 110 n. 5, ♀ ♂.
Mesostenus albinotatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 337, ♂.
Mesostenus albinotatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 37 n. 1, ♀ ♂.
Mesostenus albinotatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2117 n. 2, ♀ ♂.
Mesostenus (Stenaraeus) albinotatus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2382 n. 4, ♀ ♂.
crassifemur Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesostenus crassifemur Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1237 n. 2, ♀.
Mesostenus (Stenaraeus) crassifemur Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1897 p. 2381 n. 2, ♀ ♂.

dentifer Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesostenus (Stenaraeus) dentifer Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1897 p. 2381 n. 3, ♀ ♂.
transfuga (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Gallia.
Bassus irrigator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 265 n. 3779.
Mesostenus transfuaga Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 752 n. 217, ♀ ♂.
Mesostenus transfuga Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 58.
Mesostenus transfuga Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 29 n. 1, ♂.
Mesostenus transfuga Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 516 n. 4, ♀ ♂.
Mesostenus transfuga Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 337, ♀ ♂.
Mesostenus (Stenaraeus) transfuga Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2381 n. 1, ♀ ♂.

NEMATOPODIUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 955 n. 10.
νῆμα, filum; πόδιον, pediculus.

Synon.: Phytodietus Blanchard.

formosus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Nematopodius formosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 957 n. 329, ♀.
Phytodietus (Nematopodius) formosus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 316 n. 3.
Nematopodius formosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 112, ♀ ♂.
Nematopodius formosus Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 58, ♀ ♂.
Nematopodius formosus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 38 n. 1, ♀ ♂.
linearis Grav. — ♂ — Eur.: Italia.
Nematopodius linearis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 958 n. 330, ♂.
orbitalis Ashm. — ♀ — Am.: Colorado.
Nematopodius orbitalis Ashmead, Bull. Colorado Biol. Assoc. I. 1890 p. 21, ♀.
texanus Ashm. — ♂ — Am.: Texas.
Nematopodius Texanus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 414, ♂.

29. *Subfam.* Cryptinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 144 & 186.

AGROTHEREUTES

Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 79.
ἀγρός, ager; θηρευτής, venator.

Synon.: Cryptus Fabricius, Trentepol.
Ichneumon Fabricius, Jurine, Gravenhorst.
Ophion Fabricius, Olivier.
Pezomachus Gravenhorst, Curtis.

abbreviator (Fabr.) Först. — ♀ — Eur. centr.
? Ichneumon abbreviator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 153 n. 83, ♀.
? Ichneumon abbreviator Fabricius, Entom. System. IV. 1794 p. 56 n. 89-90.
Ichneumon abbreviator Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 222 n. 89-90 [nec Panzer].
Cryptus abbreviator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 84 n. 55.
? Ophion abbreviator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 134 n. 18.
? Ichneumon abbreviator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110 & 111, ♀.
? Ophion abbreviator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 512 n. 24.
Ichneumon abbreviator Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 28 n. 3, ♀.

? Ichneumon abbreviator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 138 n. 9.
? Ichneumon abbreviator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
? Ichneumon abbreviator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 298.
Pezomachus abbreviator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 878 n. 291, ♀.
? Ichneumon abbreviator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 913 n. 55, ♀.
Cryptus abbreviator Trentepol, Isis 1829 p. 822 n. 1, ♀.
? Ichneumon abbreviator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª IV. 1835 p. 350 n. 9.
Agrothereutes abbreviator Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 81 n. 1, ♀.
Agrothereutes abbreviator Marshall, Entom. M. Magaz. VIII. 1871 p. 162.
Agrothereutes abbreviator Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 58, ♀; T. 37 F. 3.
Agrothereutes abbreviator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1/2. 1881 p. 349, ♀.
Agrothereutes abbreviator Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 156 n. 1, ♀.

batavus Vollenh. — ♀ — Eur.: Britannia, Suecia, Batavia.
Ichneumon incubitor Ström, Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768 p. ?
Agrothereutes Batavus Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XVI. 1873 p. 209 n. 1, ♀; T. 9 F. 1.
Agrothereutes Batavus Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 58, ♀; T. 37 F. 2.
Agrothereutes Batavus Bloomfield, Entom. M. Magaz. XVII. 1881 p. 258.
Agrothereutes Batavus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 156, ♀.

destitutus Vollenh. — ♀ — Eur.: Batavia.
Agrothereutes destitutus Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 58, ♀; T. 37 F. 4.

hopei (Grav.) Först.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus Hopei Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 715 n. 291b, ♀.
Pezomachus Hopei Curtis, Brit. Entom. XII. 1835 p. 536, ♀; T. 536.
Agrothereutes Hopei Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 82 n. 2, ♀.
Agrothereutes Hopei Marshall, Entom. M. Magaz. IX. 1872 p. 120.
Agrothereutes Hopei Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 2. 1877 p. 2 n. 1, ♀ ♂.
Agrothereutes Hopei Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 58, ♀; T. 37 F. 1.
Agrothereutes Hopei Bidgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 156 n. 2, ♀.
Pezomachus (Agrothereutes) Hopei Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 [p. 71, ♀.

GAMBRUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 188 n. 14.
Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2374.
γαμβρός, affinis.

Synon.: Kaltenbachia Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 187 n. 11.
J. H. Kaltenbach, nom. propr.
Cryptus Gravenhorst & auct.
Spilocryptus Thomson & auct.

inferus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Gambrus inferus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2375 n. 2, ♀ ♂.

maculatus Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Gambrus (Cryptus) maculatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 1. 1888 [p. 106, ♂.

ornatulus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Spilocryptus ornatulus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 507 n. 10, ♀.
Spilocryptus ornatulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1/2. 1881 p. 335, ♂.
Spilocryptus ornatulus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 132, ♀.
Gambrus ornatulus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2375 n. 3, ♀ ♂.

---

[1]) = ? Spilocryptus pygoleucus (Gravenhorst). — *Lep.:* Psyche viciella, Ps. calvella (Brischke).

ornatus (Grav.) Thoms.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Austria.
Cryptus ornatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 620 n. 132, ♀.
Cryptus ornatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 293 n. 45, ♀.
Cryptus ornatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 386 n. 37, ♀.
Cryptus ornatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 53 n. 11, ♀ ♂.
Cryptus ornatus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 248 n. 21, ♂.
Spilocryptus ornatus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 506 n. 8, ♀ ♂.
Cryptus ornatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 281 n. 48, ♂. [p.68, ♀.
Cryptus (Kaltenbachia) ornatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 1. 1888
Spilocryptus ornatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 132, ♀ & 135, ♂.
Spilocryptus ornatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 105 n. 15, ♀.
Gambrus ornatus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2374 n. 1, ♀ ♂.

superus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Gambrus superus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2375 n. 4, ♀ ♂.

tricolor (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Cryptus tricolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 514 n. 64, ♀.
Cryptus tricolor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 100 n. 84, ♀.
Spilocryptus tricolor Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 506 n. 9, ♀ ♂.
Spilocryptus tricolor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1/2. 1881 p. 336, ♀.
Cryptus tricolor Parfitt, Rep. & Trans. Devon Assoc. XIII. 1881 p. 258.
Cryptus tricolor Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 281 n. 48, ♀ ♂.
Spilocryptus tricolor Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 131, ♀ & 134, ♂.
Gambrus tricolor Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2375 n. 5, ♀ ♂.

varians Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus (Gambrus) varians Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 68, ♀.

HIDRYTA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 187 n. 13.
ἱδρυτός, firmatus.

Synon.: Brachycryptus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 471.
βραχύς, brevis; Cryptus, nom. propr. Hymen.
Cryptus Tschek.

erythrocera (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
? Cryptus sordidus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 409 n. 6, ♀.
Brachycryptus erythrocerus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 488 n. 1, ♀.
Brachycryptus erythrocerus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 113.
Brachycryptus erythrocerus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2355 n. 1, ♀ ♂.
Hidryta erythrocera m.

fusiventris (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Brachycryptus fusiventris Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 489 n. 3, ♀.
Brachycryptus fusiventris Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 113.
Brachycryptus fusiventris Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2355 n. 3, ♀ ♂.
Hidryta fusiventris m.

simplex (Thoms.) D. T. — ♂ — Eur.: Suecia.
? Cryptus simplex Tschek, Verh. zool. bot. Ges. XX. 1870 p. 127 n. 16, ♂.
Brachycryptus simplex Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2356 n. 4, ♂.
Hidryta simplex m.

---

[1]) *Lep.:* Simyra venosa, Odonestis potatoria (Bignell), Zygaena peucedani, Clisiocampa neustria (Rondani), Sesia formicaeformis (Brischke).

sordidula (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Brachycryptus sordidulus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 488 n. 2, ♀.
Brachycryptus sordidulus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 113.
Brachycryptus sordidulus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2355 n. 2, ♀ ♂.
Hidryta sordidula m.

PYCNOCRYPTUS

Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 471.
πυκνός, densus; Cryptus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Cryptus Gravenhorst & auct.
Ichneumon Linné & auct. ant.

corcyraeus Schmkn. — ♀ — Eur.: Corcyra.
Pycnocryptus Corcyraeus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 123, ♀.

peregrinator (L.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon peregrinator Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 563 n. 24.
Ichneumon peregrinator Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 402 n. 1601.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 343 n. 51.
Ichneumon peregrinator Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 933 n. 25.
Ichneumon peregrinus Berkenhout, Outlin. Nat. Hist. Gr. Britain I. 1769 p. 165 n. 4.
Ichneumon peregrinator Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 850 n. 25.
Ichneumon peregrinator Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 411 n. 52.
Ichneumon peregrinator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 160 n. 75.
Ichneumon peregrinator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2686 n. 25.
Ichneumon incubitor Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 355.
Ichneumon peregrinator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 356.
Ichneumon peregrinator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 178 n. 70.
Ichneumon peregrinator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 56 n. 38.
Ichneumon peregrinator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon peregrinator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 299.
Cryptus peregrinator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 705, ♀.
Cryptus analis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 560 n. 97, ♂ [excl. ♀].
Cryptus peregrinator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 605 n. 123, ♀.
Cryptus peregrinator Bouché, Naturg. d. Insect. 1834 p. 142 n. 11.
Cryptus peregrinator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 292 n. 43.
Cryptus peregrinator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 313 n. 8.
Cryptus analis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 91 n. 62, ♂ [excl. ♀].
Cryptus peregrinator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 99 n. 81, ♀.
Cryptus peregrinator Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 132 n. 22, ♀ ♂.
Pycnocryptus peregrinator Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 500 n. 1, ♀ (♂).
Cryptus varipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 332, ♂.
Pycnocryptus peregrinator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 334, [♀ (♂)].
Cryptus peregrinator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 280 n. 47, ♀ (♂).
Pycnocryptus peregrinator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 123.
Pycnocryptus peregrinator Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2365 n. 1, ♀ ♂.

CHAERETYMMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 187 n. 12.
χαίρω, gaudeo; τύμμα, ictus.

Synon.: Cratocryptus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 520.
κάρα, caput; Cryptus, nom. propr. Hymen.
Cryptus Gravenhorst, Stephens, Zetterstedt, Taschenberg, Bridgman & Fitch.
Ichneumon Geoffroy & auct.

anatorium (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
? Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 339 n. 41.
? Ichneumon dumetorum Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 406 n. 41.
? Ichneumon dumetorum Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 164 n. 92.
? Ichneumon dumetorum Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1792 p. 210 n. 19.
? Ichneumon dumetorum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 901 n. 34, ♀.
Cryptus anatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 699.
Cryptus anatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 460 n. 27, ♀.
Cryptus anatorius Trentepol, Isis 1829 p. 840 n. 19, ♂.
Cryptus anatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 279 n. 7, ♂.
Cryptus anatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 75 n. 16, ♀.
Cratocryptus anatorius Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1877 p. 524 n. 4, ♀ ♂.
Cratocryptus anatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 339, ♀.
Cryptus anatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 277 n. 14, ♀.
Chaeretymma anatorius Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 117 & 150.
Cryptus anatorius Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 227.

annulitarse (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cratocryptus annulitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 526 n. 9, ♀ ♂.
Chaeretymma annulitarse m.

ashmeadii Harrgt. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Chaeretymma Ashmeadii Harrington, Canad. Entomol. 1894 p. 212, ♀.

erythropus (Grav.) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus erythropus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 469 n. 34, ♂.
Cryptus erythropus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 75 n. 18, ♂.
Cratocryptus erythropus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
Chaeretymma erythropus m.

femorale (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cratocryptus femoralis Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 527 n. 10, ♀ ♂.
Cratocryptus femoralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 339, ♀.
Chaeretymma femorale m.

furcator (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Cryptus furcator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 462 n. 28, ♀.
Cryptus furcator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 279 n. 8, ♀.
Cryptus furcator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 75 n. 17, ♀.
Cratocryptus furcator Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 523 n. 1, ♀ ♂.
Cryptus furcator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 277 n. 15, ♀.
Chaeretymma furcator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
Chaeretymma furcator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 227, ♀.
Cratocryptus furcator Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2382 n. 1, ♀ ♂.

opacum (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Dania.
? Cryptus tricinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 570 n. 100, ♂.
? Cryptus tricinctus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 88 n. 54, ♀ ♂.

Cryptus (Cratocryptus) opacus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 523 n. 3, ♀.
? Cratocryptus tricinctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 338, ♂.
Chaeretymma opacum m.

parvulum (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Cryptus parvulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 459 n. 26, ♀ [excl. ♂].
Cryptus parvulus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 279 n. 6, ♀ [excl. ♂].
Cryptus parvulus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 368 n. 6, ♀ [excl. ♂].
Cryptus parvulus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 74 n. 15, ♀ [excl. ♂].
Cratocryptus parvulus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 526 n. 7, ♀ ♂.
Cratocryptus parvulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 339, ♀ ♂.
Cryptus parvulus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 277 n. 13, ♀ ♂.
Chaeretymma parvulus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.

pleurale (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cratocryptus pleuralis Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 526 n. 8, ♀ ♂.
Chaeretymma pleurale m.

ruficoxe (Thoms.) D. T.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cratocryptus ruficoxis Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 525 n. 5, ♀ ♂.
Cratocryptus ruficoxis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 339, ♀ ♂.
Cryptus stomaticus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 227, ♀ ♂.
Chaeretymma ruficoxe m.

sternocerum (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cratocryptus sternocerus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 523 n. 2, ♀ ♂.
Cratocryptus sternocerus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 227, ♀.
Cratocryptus sternocerus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2382 n. 2, ♀ ♂.
Chaeretymma sternocerum m.

stomaticum (Grav.) D. T. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Cryptus stomaticus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 466 n. 31, ♂.
Cryptus stomaticus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 77 n. 23, ♂.
Cryptus stomaticus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 278 n. 17, ♂.
Cratocryptus stomaticus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
Cryptus stomaticus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 227, ♀ ♂.
Chaeretymma stomaticum m.

subpetiolatum (Grav.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Cryptus subpetiolatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 699 n. 28^{b}, ♀.
Cryptus subpetiolatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 280 n. 9.
Cryptus subpetiolatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 73 n. 12, ♀.
Cratocryptus subpetiolatus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 525 n. 6, ♀.
Cryptus subpetiolatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 277 n. 12, ♀.
Chaeretymma subpetiolatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.

tenebrosum (Brischke) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Cratocryptus tenebrosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 339, ♂.
Chaeretymma tenebrosum m.

tricinctum (Grav.) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus tricinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 570 n. 100.
Cryptus tricinctus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 88 n. 54, ♂.
Cratocryptus tricinctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 338, ♂.
Chaeretymma tricinctum m.

---

[1]) *Lep.:* Sesia spheciformis (Brischke).

CAENOCRYPTUS

Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 471 & 494.
καινός, novus; Cryptus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Cryptus Gravenhorst & auct.
Ichneumon Jurine, Gravenhorst.

antennatus Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Caenocryptus antennatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 155, ♀; T. 8 F. 10.
Cryptus antennatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 280, ♀.

dentatus (Taschbg.) Schmkn. — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus spiralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 454 n. 23, ♂ [excl. ♀].
Cryptus spiralis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 278 n. 4, ♂ [excl. ♀].
Cryptus dentatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 73 n. 11, ♂.
Caenocryptus dentatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 118, ♂.

dentifer Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Caenocryptus dentifer Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2362 n. 4[e], ♀.

gratiosus (Tschek) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Cryptus gratiosus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 122 n. 10, ♀ ♂.
Cryptus gratiosus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 101, ♀ & 106, ♂.
Caenocryptus gratiosus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2360.

inflatus Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Caenocryptus inflatus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 497 n. 4 [recte 3], ♀.
Caenocryptus inflatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 334, ♀.
Caenocryptus inflatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 118, ♀.
Caenocryptus inflatus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2361 n. 4, ♀ ♂.

laticrus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
? Cryptus remex Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 137 n. 28, ♀ [excl. var. ♂].
Caenocryptus laticrus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2362 n. 4[c], ♀ ♂.

nubifer Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Caenocryptus nubifer Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2361 n. 4[b], ♀ ♂.

pubiventris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Caenocryptus pubiventris Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 497 n. 3 [recte 4], ♀ ♂.
Caenocryptus pubiventris Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 118, ♀ & 119, ♂.
Caenocryptus pubiventris Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2361 n. 3, ♀ ♂.

rufiventris (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Cryptus rufiventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 497 n. 51, ♀.
Cryptus rufiventris Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 282 n. 16, ♀.
Cryptus rufiventris Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 138 n. 17, ♀.
Cryptus rufiventris Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 92 n. 63, ♀.
Cryptus rufiventris Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 130 n. 20, ♀ ♂.
Caenocryptus rufiventris Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 495 n. 1, ♀ ♂.
Cryptus rufiventris Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 279 n. 38, ♀.
Caenocryptus rufiventris Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 118, ♀, 119 & 134, ♂.
Caenocryptus rufiventris Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2360 n. 1, ♀ ♂.

striolatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
? Cryptus remex Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 137 n. 28, ♂ [excl. ♀]
Caenocryptus striolatus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2362[d], ♀ ♂.

---

1) *Lep.*: Sesia hylaeiformis (Brischke).

tener Thoms.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Caenocryptus tener Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 496 n. 2, ♀ ♂.
Caenocryptus tener Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 334, ♀ ♂.
Caenocryptus tener Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 118, ♀ & 119, ♂.
Caenocryptus tener Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2361 n. 2, ♀ ♂.

vittatorius (Jur.) D. T. — ♀ ♂ — Eur. centr.
Ichneumon vittatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀; T. 8 F. 1.
Cryptus sexannulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 470 n. 36, ♀.
Ichneumon vittatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 893 n. 26, ♀.
Cryptus sexannulatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 70 n. 1, ♀.
Cryptus sexannulatus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 246 n. 17, ♂.
Cryptus sexannulatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 98, ♀ & 104, ♂.
Caenocryptus sexannulatus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2360.
Caenocryptus vittatorius m.

CALLICRYPTUS

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 43.

καλλός, pulcher; Cryptus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Cryptus Brullé.

fuscofasciatus (Brullé) Ashm. — ♀ — Am.: Lima.
Cryptus fuscofasciatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 194 n. 14, ♀.
Callicryptus fasciatus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 43 [err. typogr.].

COMPSOCRYPTUS

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 43.

κομψός, scitus; Cryptus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Cryptus Say, Cresson, Provancher.

calipterus (Say) Ashm. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Mexico.
Cryptus calipterus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 234 n. 7.
Cryptus calipterus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 690 n. 7.
Cryptus calipterus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 158, ♀ ♂.
Cryptus calipterus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 362, ♀.
Cryptus Fletcheri Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 361 n. 58, ♀.
Cryptus calipterus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 438.
Compsocryptus calipterus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 43.

CRYPTOPTERYX

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 42.

Cryptus, nom. propr. Hymen.; *πτέρυξ*, ala.

columbianus Ashm. — Am.: Columbia.
Cryptopteryx Columbianus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 42 [s. descr.].

---

[1]) *Col.:* Exocentrus balteatus (Brischke).

CRYPTOIDEUS

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 42.
Cryptus, nom. propr. Hymen.; εἶδος, forma.

Synon.: Cryptus Cresson.

purpuripennis (Cress.) Ashm. — ♀ — Am.: California.
Cryptus purpuripennis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 364, ♀.
Cryptoideus purpuripennis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 42.

KALTENBACHIA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 187 n. 11.
J. H. Kaltenbach, nom. propr.
Vide genus Gambrus.

IDIOLISPA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 188 n. 16.
ἴδιος, proprius; λίσπη = λίσπος, laevis.

Synon.: Liocryptus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 471.
λεῖος, levis; Cryptus, nom. propr. Hymèn.
Bassus Gravenhorst.
Cryptus Gravenhorst.
Ichneumon Ratzeburg.

analis (Grav.) Schmkn.[1] — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Bassus analis Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 266 n. 3781.
Cryptus analis Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 287.
Cryptus analis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 560 n. 97, ♀ [excl. ♂].
Cryptus nubeculatus var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 611 n. 125, ♀ [excl. ♂].
Cryptus analis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 289 n. 33, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon monotonus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 133 n. 12, ♂.
Ichneumon monotonus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 133 n. 14.
Cryptus analis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 378 n. 25, ♂.
Cryptus analis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 140 n. 31.
Cryptus analis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 91 n. 62, ♀ [excl. ♂].
Cryptus analis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 126 n. 14, ♀ ♂.
Liocryptus analis Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 490 n. 1, ♀ ♂.
Liocryptus analis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 333, ♀ ♂.
Cryptus analis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 279 n. 37, ♀ ♂.
Idiolispa analis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 117.
Liocryptus analis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2356 n. 1, ♂.

atripes (Grav.) D. T. — ♀ — Eur.: Italia.
Cryptus atripes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 615 n. 127, ♀.
Cryptus atripes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 79 n. 30, ♀.
Cryptus atripes Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 99 & 102, ♀.
Liocryptus atripes Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2356.
Idiolispa atripes m.

bistrigata Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus (Idiolispa) bistrigatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 [p. 68, ♂.

[1]) *Col.:* Saperda populnea (Giraud). — *Lep.:* Liparis salicis (Ratzeburg).

genalis Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus (Idiolispa) genalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 69, ♂.
obfuscator (Vill.) D. T. — ♀ — Eur.: Britannia, Gallia, Germania.
? Ichneumon XXXVIII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 73 F. 1.
Ichneumon obfuscator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 197 n. 204.
Ichneumon obfuscator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 218 n. 71.
? Ichneumon ambustor Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 88.
Cryptus obfuscator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 569 n. 99, ♀.
? Ichneumon ambustor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1032 n. 229.
Cryptus obfuscator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 290 n. 35, ♀.
Cryptus obfuscator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 80 n. 35, ♀.
Cryptus obfuscator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 278 n. 23, ♀.
Liocryptus obfuscator Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2356.
Idiolispa obfuscator m.
obovata (Tschek) Schmkn. — ♀ — Eur.: Austria inf.
Cryptus obovatus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 127 n. 15, ♀.
Idiolispa obovata Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 117.
tenuicornis (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Liocryptus tenuicornis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2356 n. 2, ♀ ♂.
Idiolispa tenuicornis m.

CHROMOCRYPTUS

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 41.
χρῶμα, color; Cryptus, nom. propr. Hymen.

albopictus Ashm. — Patria?
Chromocryptus albopictus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 41 [s. descr.].

ITAMOPLEX

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 188 n. 15.
ἰταμός, temerarius; πλίξ, gradus.
Species exstat.

CRYPTUS

Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 70 n. 10.
κρυπτός, absconditus.

Synon.: Alomyia Perty.
Echthrus Provancher.
Goniocryptus Brischke.
Hoplismenus Provancher.
Ichneumon Fabricius & auct. ant.
Ischnus Cresson, Provancher.
Mesostenus Provancher.
Nematopodius Provancher.
Phygadeuon Provancher.
Platylabus Provancher.

abscissus Ratzbg.[1]) — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus abscissus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 136 n. 13, ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Lophyrus pini (Ratzeburg).

acilatus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Platylabus acilatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 37 n. 11, ♀.
Cryptus acilatus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 186.
aculeatus Rdw. — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus aculeatus Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 242 n. 17, ♀.
adstrictus Tosqu. — ♂ — Afr.: Marocco.
Cryptus adstrictus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 157 n. 16, ♂.
aetnensis Rdw. — ♀ ♂ — Eur. mer.
Cryptus Aetnensis Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 240 n. 14, ♀ ♂.
affabilis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Cryptus alacris Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 205, ♀ [non Cresson].
Cryptus affabilis Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 13.
Cryptus affabilis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 142 n. 29, ♀.
Cryptus affabilis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 341 n. 29, ♀.
affinis Fabr.! — Eur.: Germania.
Ichneumon affinis Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 183 n. 206.
Cryptus affinis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 89 n. 82.
Ichneumon affinator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 260.
Ichneumon affinator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 309.
Cryptus affinis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1079 n. 316.
alacer Tosqu. — ♀ — Afr.: Senegambia, Gabon, Togo.
Cryptus alacer Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 136 n. 5, ♀.
alamedensis Ashm. — ♀ — Am.: California.
Cryptus Alamedensis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 409, ♀.
albatorius (Vill.) Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Ichneumon albatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 156 n. 63.
Ichneumon albatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 214 n. 44.
Cryptus albatorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 287.
Ichneumon albatorius Trentepol, Isis 1826 p. 77 n. 20, ♀.
Cryptus albatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 700 & 702.
Cryptus albatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 536 n. 82, ♂.
Cryptus albatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 285 n. 25.
Cryptus albatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 82 n. 39, ♂.
Cryptus albatorius Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 117 n. 4, ♀ ♂.
Cryptus albatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 280 n. 25, ♂.
Cryptus albatorius Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 100, ♀ & 106, ♂.
albicollaris Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Cryptus albicollaris Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 158, ♀.
albisoletus Walsh — ♂ — Am.: Illinois.
Cryptus ? albisoletus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 80, ♂.
albitarsis Cress. — ♂ — Am.: Delaware.
Cryptus albitarsis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 300 n. 15, ♂.
Cryptus albitarsis Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 76, ♂.
var. **albicaligatus** Walsh — ♂ — Am.: Illinois.
Cryptus albicaligatus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 82, ♂.
Cryptus albitarsis var. albicaligatus Cresson, Walsh: Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. [1873 p. 82.
albomarginatus Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Cryptus albomarginatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 62 n. 2, ♀.
albonotatus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus albonotatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 75 n. 54, ♂.

albopictus Smith — ♀ — As.: Celebes.
Cryptus albopictus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 61 n. 3, ♀.
albus Taschbg. — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus albus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 97 n. 78, ♀.
alluaudii Pérez — Afr.: Ins. Canarienses.
Cryptus Alluaudi Pérez, Ann. soc. entom. France 1895 p. 203.
alternator Trent. — ♂ — Eur.
Cryptus alternator Trentepol, Isis 1829 p. 857, ♂.
altonii D. T. — ♀ — Am.: Colorado. [Fonscolombe].
Cryptus proximus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 290 n. 2, ♀ [nec
Cryptus proximus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 265 n. 2, ♀.
Cryptus proximus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 359, ♀.
Cryptus proximus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 131 n. 1, ♀.
Cryptus proximus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 330 n. 1, ♀.
Cryptus Altonii m.
var. **perplexus** Cress. — ♀ — Am.: California.
Cryptus proximus var. perplexus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 359, ♀.
Cryptus Altonii var. perplexus m.
amblytelarius Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Cryptus amblytelarius Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 70 n. 41, ♀.
ambulator Smith — ♀ — As.: China.
Cryptus ambulator Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 392 n. 1, ♀.
americanus Cress.[1]) — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States. [p. 300 n. 15].
Ischnus albitarsis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 194 n. 12, ♂ [non
Cryptus Americanus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 297 n. 11, ♀.
Cryptus Americanus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 79, ♀.
Mesostenus tarsatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 265.
? Nematopodius Canadensis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 268.
Nematopodius coxatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 269.
Cryptus albitarsis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 204.
Cryptus Americanus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 135 n. 11, ♀ ♂.
? Cryptus Canadensis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 138 n. 18, ♂.
Cryptus Americanus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 333 n. 11, ♀♂.
? Cryptus Canadensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 337 n. 18, ♂.
andalusicus Spin. — ♀ — Eur.: Hispania.
Cryptus Andalusicus Spinola, Ann. soc. entom. France (2) I. 1843 p. 120 n. 10, ♀.
angulatus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Cryptus angulatus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 136 n. 7, ♀.
annulator Fabr.! — Eur.: Austria.
Cryptus annulator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 79 n. 36.
Ichneumon annulator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 906 n. 43.
annulatus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Phygadeuon annulatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 179.
Cryptus annulatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 140 p. 23, ♀ ♂.
Cryptus annulatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 339 n. 23.
annulicornis Luc. — ♀ — Afr.: Algeria.
Cryptus annulicornis Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 331 n. 393, ♀.
annulipes Taschbg. — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus annulipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 100 n. 85, ♀.

---

1) *Lep.:* Pyrrharctia isabella Abb. & Sm., Grapta comma Harr. (Cresson).

annulitarsis Rdw. — ♂ — Eur.
Cryptus annulitarsis Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 285 n. 11, ♂.
antiquus Heer — Eur.: Helvetia.
Cryptus antiquus Heer, Neu. Denkschr.schweiz.Ges.Naturw. XI. 1850 p. 168 n. 75; T. 13 F. 13.
Cryptus antiquus Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 647.
Cryptus antiquus Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1856 p. 155.
apicatus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Cryptus apicatus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 204.
Cryptns apicatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 137 n. 16, ♀.
Cryptus apicatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 336 n. 16, ♀.
apparitorius (Vill.) Grav. — ♀ — Eur. centr. & mer.
Ichneumon apparitorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 143 n. 29.
Ichneumon apparitorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 169 n. 26.
Ichneumon apparitorius Rossi, Mant. Insect. 1792 p. ? n. 81.
Ichneumon apparitorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 52 n. 18.
Cryptus apparitorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 499 n. 52, ♀.
Cryptus apparitorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 283 n. 17, ♀.
Cryptus apparitorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 312 n. 5.
Cryptus apparitorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 83 n. 42, ♀.
Cryptus apparitorius Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 279 n. 27, ♀.
Cryptus apparitorius Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 101, ♀.
arcticus Schiödte — ♀ ♂ — Am.: Groenlandia.
Cryptus arcticus Schiödte, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 144, ♀ ♂.
Cryptus arcticus Mac Lachlan, Journ. Linn. Soc. Zool. XIV. 1877 p. 107, ♀.
Cryptus arcticus Aurivillius, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. XV. P. 4. 1893 p. 31 n. 14; T. 3 [F. 10 & 10a.
arcuatus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Cryptus arcuatus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 135 n. 5, ♀.
arenicola Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cryptus arenicola Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 484 n. 14, ♀ ♂.
Cryptus arenicola Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 9, ♂; T. 6 F. 8.
Cryptus arenicola Holmgren, Entom. Tidskr. VII. 1886 p. 25 n. 15.
Cryptus arenicola Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 102, ♀ & 107, ♂.
Cryptus arenicola Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2353 n. 14, ♀ ♂.
argentifrons Cam. — Am.: Mexico.
Cryptus argentifrons Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 304 n. 5.
ariolator (L.) Fabr.! — ♀ ♂ — Am. mer.
Ichneumon ariolator Linné, Syst. nat. Ed. 10a I. 1758 p. 563 n. 22.
Ichneumon ariolator Linné, Syst. nat. Ed. 12a I. 2. 1767 p. 933 n. 23.
Sphex spinosus Degeer, Mém. hist. Insect. III. 1773 p. 596 n. 2; T. 30 F. 16-17.
Ichneumon ariolator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 334 n. 42.
Ichneumon ariolator Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 849 n. 23.
Sphex spinosus Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. III. 1780 p. 386 n. 2; T. 30 F. 16-17.
Ichneumon ariolator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 428 n. 48.
Ichneumon spinosus Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 67 n. 266.
Ichneumon ariolator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 264 n. 57.
Ichneumon ariolator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2688 n. 23.
Ichneumon ariolator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 355.
Ichneumon ariolator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 182 n. 90.
Ichneumon ariolator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 156 n. 96.
Cryptus ariolator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 84 n. 56.
Ichneumon ariolator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 263.

Ichneumon ariolator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 316.
Cryptus ariolator Trentepol, Isis 1829 p. 860 n. 35, ♀ ♂.

armator Fabr.! — ♀ — Eur.
Cryptus armator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 86 n. 69.
Cryptus armator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 265 n. 3774.
Ichneumon armator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 112, ♀.
Ichneumon armator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 264.
Ichneumon armator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 317.
Ichneumon armator Trentepol, Isis 1829 p. 941 n. 55, ♀.
Cryptus armator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1012 n. 197, ♀.

armatorius Fabr.! — ♀ — Eur.
Ichneumon armatorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 260 n. 14.
Ichneumon armatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 140 n. 16.
Ichneumon armatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2676 n. 82.
Ichneumon armatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 167 n. 16.
Ichneumon armatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 134 n. 11.
Cryptus armatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 71 n. 3.
Ichneumon armatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 254.
Ichneumon armatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 292.
Ichneumon armatorius Trentepol, Isis 1829 p. 942 n. 56, ♀.
Cryptus armatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 502 n. 54, ♀.
Cryptus armatorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 369 n. 11, ♀.

armatus Luc. — ♀ — Afr.: Algeria.
Cryptus armatus Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 330 n. 392, ♀.
Cryptus armatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 142 n. 8, ♀.

arundinis Boie[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus arundinis Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 99 n. 30, ♀ ♂.

asemus Tosqu. — ♂ — Afr.: Togo.
Cryptus asemus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 192 n. 34, ♂.

ashmeadii D. T. — ♂ — Am.: Texas.
Cryptus armatus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 411, ♂ [nec Lucas].
Cryptus Ashmeadii m.

astus Tosqu. — ♀ — Afr.: Togo.
Cryptus astus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 173 n. 24. ♀.

aterrimus Grav. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Cryptus aterrimus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 472 n. 38, ♀.
Cryptus aterrimus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 72, ♀.
Cryptus aterrimus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 277 n. 11, ♀.

atriceps Cress. — ♀ — Am.: Utah.
Cryptus atriceps Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 361, ♀.

atricollaris Walsh — ♀ ♂ — Am.: Canada, Illinois.
Cryptus atricollaris Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 72, ♀ ♂.
Cryptus varius Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 200.
Cryptus atricollaris Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 142 n. 28, ♀.
Cryptus atricollaris Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 341 n. 28, ♀.

attentorius (Panz.) Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Ichneumon LXXV Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 2. 1769; T. 175 F. 7.
Ichneumon attentorius Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 158.
Cryptus attentorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 492 n. 47, ♀.

---

1) *Lep.:* Cossus arundinis (Boie).

Cryptus attentorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 79 n. 32, ♀ [excl. ♂].
Cryptus attentorius Tscheck, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 125 n. 13, ♂.
Cryptus attentorius Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 279 n. 21, ♀ ♂.
Cryptus attentorius Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 99, ♀ & 107, ♂.

australis Guér. — Afr.: Abyssinia.
Cryptus australis Guérin, Lefebure: Voy. Abyssinie VI. 1848 P. 4. p. 348; T. 7 F. 3.

avidus Woldst. — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus avidus Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 398 n. 23, ♀.

aztecus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Cryptus Aztecus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 133 n. 1, ♀.

baldaufii D. T. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus scutellatus Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 12 [nec Smith].
Cryptus scutellatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 133 n. 7, ♂.
Cryptus scutellatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 332 n. 7, ♂.
Cryptus Baldaufii m.

balearicus Kriechb. — ♀ — Eur.: Mallorca.
Cryptus Balearicus Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 242 n. 10, ♀.

basalis Smith — ♀ — As.: Japonia.
Cryptus basalis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 392 n. 3, ♀.

bellicosus Hal. — ♀ — Am. mer.
Cryptus bellicosus Haliday, Trans. Linn. Soc. London XVII. P. 3. 1836 p. 318 n. 6, ♀.
Cryptus bellicosus Thwaites, Trans. Entom. Soc. London IV. P. 1. 1845 Proc. p. LVII.

bellus (Grav.) Wesm.[1] — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Ichneumon bellus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 571 n. 241b, ♀.
Ichneumon bellus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 200 n. 200, ♀.
Cryptus bellus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique 8⁰ VIII. 1859 [Rem.] p. 68 n. 241b, ♀.
Cryptus bellus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 278 n. 60, ♀.

bicingulatus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Cryptus bicingulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 482 n. 44, ♂.
Cryptus bicingulatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 70 n. 3, ♂.
Cryptus bicingulatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 278 n. 2, ♀ ♂.

bicolor Rdw.! — ♀ — Eur.
Cryptus bicolor Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 282 n. 5, ♀.

bicolor Luc. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Cryptus bicolor Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 330 n. 391, ♀ ♂.
Cryptus bicolor Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 140 n. 7, ♀.

blanditus Tosqu. — ♀ — Afr.: Caffraria.
Cryptus blanditus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 203 n. 40, ♀.

bolivari Kriechb. — ♀ — Eur.: Hispania.
Cryptus Bolivari Kriechbaumer, Act. soc. Españ. hist. nat. XXVII. 1898 p. 168, ♀.

bombycis Boud.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Cryptus bombycis Boudier, Ann. soc. entom. France V. 1836 p. 357, ♀ ♂; T. 8 Fig. A-O.

borealis Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Cryptus borealis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 369 n. 11, ♂.

bovei Brullé — ♀ ♂ — Afr.: Aegyptus.
Cryptus Bovei Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 199 n. 21, ♀ ♂.
Cryptus Bovei Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 179 n. 27, ♂.

---

1) *Rhynch.:* Tolype vellida (Wesmael).
2) *Lep.:* Gastropacha quercus (Boudier).

brevicauda Ashm. — ♀ — Am.: Montana.
Cryptus brevicauda Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 412, ♀.
brevicornis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Cryptus brevicornis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 67 n. 34, ♀.
brevipennis Marsh. — ♂ — Eur.: Britannia.
Cryptus brevipennis (Desvignes) Marshall, Entom. M. Magaz. III. 1867 p. 190, ♂.
Cryptus brevipennis Marshall, Entomol. Annual f. 1874 p. 128.
brookeanus Cam. — ♀ — As.: Borneo.
Cryptus Brookeanus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 13. p. 11, ♀.
brunneiventris Ratzbg.[1]) — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon brunniventris Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 133 n. 16, ♂.
Cryptus brunniventris Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 140 n. 30.
buccatus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Texas.
Cryptus buccatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 159, ♀ ♂.
bucculentus Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Cryptus bucculentus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 406 n. 3, ♀.
Cryptus bucculentus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 241 n. 10, ♂.
Cryptus bucculentus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 103, ♀ & 107, ♂.
caeruleipennis Brullé — ♂ — Am.: Chile.
Cryptus coeruleipennis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 193 n. 11, ♂.
calescens Grav. — ♀ — Eur.: Italia.
Cryptus calescens Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 548 n. 90, ♀.
Cryptus calescens Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 80 n. 33, ♀.
Cryptus calescens Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 99, ♀.
californicus Ashm. — ♀ — Am.: California.
Cryptus Californicus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 411, ♀.
calumniator Fabr. — ♀ — Am. mer.
Cryptus calumniator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 83 n. 49.
Ichneumon calumniator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 261.
Ichneumon calumniator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 306.
Cryptus calumniator Trentepol, Isis 1829 p. 866 n. 40, ♀.
cameronii D. T. — Am.: Mexico.
Cryptus nivalis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 203 n. 4 [non Zetterstedt].
Cryptus Cameronii m.
canadensis Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Nematopodius Canadensis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 268.
Cyptus albitarsis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 204.
Cryptus Canadensis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 138 n. 18, ♂.
Cryptus Canadensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 337 n. 18, ♂.
canaliculatus (Grav.) Wesm. — ♂ — Eur.: Britannia.
Ichneumon canaliculatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 141 n. 19, ♂ [excl. var.].
Ichneumon canaliculatus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 11 n. 13.
Ichneumon canaliculatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 135 n. 24, ♂.
Cryptus canaliculatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Bélgique VIII. 1859 [Rem]. p. 18 n. 19, ♂.
Ichneumon canaliculatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 247 n. 19, ♂.
Cryptus canaliculatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 277 n. 7, ♂.
capensis Brullé — ♀ — Am.: Chile.
Cryptus Capensis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 188 n. 2, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Sphinx pinastri (Ratzeburg).

caperatus Tosqu. — ♀ — Afr.: Togo.
Cryptus caperatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 196 n. 22, ♀.
capitalis (Prov.) Davis — ♂ — Am.: Canada.
Phygadeuon capitalis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 57 n. 61, ♂.
Cryptus ? capitalis Davis, Canad. Entomol. XXVII. 1895 p. 287.
carbonarius Smith — ♀ — As.: Japonia.
Cryptus carbonarius Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 392 n. 2, ♀.
carpocapsae Ashm.[1]) — ♀ — Am.: Mexico.
Cryptus? carpocapsae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1896 p. 212, ♀.
caudator Fabr. — Austr.
Ichneumon caudator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 333 n. 36.
Ichneumon caudator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 427 n. 40.
Ichneumon caudator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 263 n. 48.
Ichneumon caudator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2685 n. 114.
Ichneumon caudator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 354.
Ichneumon caudator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 177 n. 67.
Ichneumon caudator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 152 n. 77.
Cryptus caudator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 82 n. 46.
Ichneumon caudator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon caudator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 300.
celaya Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Cryptus Celaya Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 135 n. 4, ♀.
celer Tosqu. — ♀ — Afr.: Senegal.
Cryptus celer Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 161 n. 18, ♀.
cestus Say — Am.: Indiana.
Cryptus cestus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 234 n. 8.
Cryptus cestus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 691 n. 8.
chalybaeus Taschbg. — ♀ — Am.: Paraguay.
Cryptus chalybaeus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 63 n. 3, ♀.
cincticornis (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Platylabus cincticornis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 38 n. 12, ♀.
Cryptus cincticornis Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 186.
cinctipes Walsh — ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Cryptus cinctipes Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 74, ♀ ♂.
cinctus (L.) Fabr.! — ♀ — Eur.
—— Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 984.
Ichneumon cinctus Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 566 n. 55.
Ichneumon cinctus Brünnich, Prodr. insectol. Siaelland. 1761 p. 18.
Ichneumon cinctus Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 408 n. 1632.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 359 n. 85.
Ichneumon cinctus Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 938 n. 60.
Ichneumon cinctus Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 858 n. 60; T. 26 F. 8.
Ichneumon cinctus Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 342 n. 83.
Ichneumon cincturator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 156 n. 1819.
Ichneumon cinctus Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 437 n. 107.
Ichneumon cinctus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 368 n. 745, ♀.
Ichneumon cinctus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 423 n. 86.
Ichneumon cinctus Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 269 n. 125.
Ichneumon cinctus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 199 n. 210.

---

[1]) *Lep.:* Carpocapsa salitans (Ashmead).

Ichneumon cinctus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2710 n. 60.
Ichneumon cinctus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 360.
Ichneumon cinctus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 199 n. 176.
Ichneumon cinctus Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 123 n. 271.
Ichneumon cinctus Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 183 n. 208.
Ichneumon cinctus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 303 n. 2135, ♀.
Ichneumon cinctus Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 62 n. 69.
Cryptus cinctus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 89 n. 86.
Ichneumon cinctus Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀.
Cryptus cinctus Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 289.
Ichneumon cinctor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon cinctor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 337.
Ichneumon cinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1068 n. 293.

cinctus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus cinctus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 175.
Cryptus cinctus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 137 n. 17, ♂.
Cryptus cinctus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 336 n. 17, ♂.

circumcinctus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus circumcinctus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 132 n. 5, ♂.
Cryptus circumcinctus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 331 n. 5, ♂.

citus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Cryptus citus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 137 n. 8, ♀.

coarctatus Grav. — ♂ — Eur.: Italia.
Cryptus coarctatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 571 n. 102, ♂.
Cryptus coarctatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 94 n. 68, ♂.

cognatus Fonsc. — ♀ — Eur.: Gallia.
Cryptus cognatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 367 n. 8, ♀.

collaris Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus collaris Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 71 n. 43, ♂.

collaris Rdw.! — Eur.: Germania.
Cryptus collaris Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 243 n. 20.

collinus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Mesostenus collinus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 111b n. 1, ♂; Fig. 2c.
Cryptus eburneifrons Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 133 n. 6, ♂.
Cryptus eburneifrons Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 332 n. 6, ♂.
Mesostenus collinus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 344; Fig.

coloradensis Ashm. — ♀ — Am.: Colorado.
Cryptus Coloradensis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 408, ♀.

comalensis Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Cryptus Comalensis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 159, ♀.

compactus Rdw. — ♀ — Eur.
Cryptus compactus Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 283 n. 7, ♀.

concinnus Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Cryptus concinnus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 200 n. 23, ♀.

concolor (Gmel.) Grav.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 65 n. 267 & 269.
Ichneumon concolor Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2704 n. 322.
Cryptus concolor Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 288.

constrictorius (L.) Trent.! — Eur.
Ichneumon constrictorius Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 561 n. 10.
Ichneumon constrictorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 398 n. 1585.

Ichneumon constrictorius Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 931 n. 8.
Ichneumon constrictorius Linné, Pand. Rybyens. 1771 p. 86.
Ichneumon constrictorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 845 n. 8.
Ichneumon constrictorius Linné, Amoen. acad. VIII. 1785 p. 86.
Ichneumon constrictorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 137 n. 8.
Ichneumon constrictorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2676 n. 8.
Ichneumon constrictorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 352.
Ichneumon constrictorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 167 n. 14..
Ichneumon constrictorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255.
Ichneumon constrictorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 293.
Ichneumon constrictorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 878 n. 9.
Cryptus constrictorius Trentepol, Isis 1829 p. 871 n. 44.

contiguus Cress. — ♂ — Am.: Canada, Maryland.
Ischnus contiguus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 190 n. 7, ♂.
Cryptus contiguus Cresson, Synops. Hymen. Amer. 1877 p. 195.
Cryptus contiguus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 134 n. 9, ♂.
Cryptus contiguus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 333 n. 9, ♂.

corpulentus Tosqu. — ♀ — Afr.: Togo.
Cryptus corpulentus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 146 n. 10, ♀.

coxalis Rdw. — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus coxalis Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 107, ♀.

crassicornis Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus crassicornis Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 243 n. 19, ♀ ♂.

crenulatus Brauns — ♀ — Eur.: Hungaria, Helvetia.
Cryptus crenulatus Brauns, Termész. Füzet. XIX. 1896 p. 271 n. 2, ♀.

crocator Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Cryptus crocator Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 189 n. 32, ♀.

croceipes Smith — ♀ — As.: Borneo.
Cryptus croceipes Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 118 n. 1, ♀.

crotchii Cress. — ♀ ♂ — Am.: California.
Cryptus Crotchii Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 362, ♀ ♂.

cubensis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Cuba.
Cryptus Cubensis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 21, ♀ ♂.

curvicauda Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Cryptus curvicauda Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2350 n. 5, ♀.

cyanator Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
—— Roesel, Insectenbelust. II. 1749 Wesp. p. 26; T. 26 F. 3-5.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 64 n. 255.
? Ichneumon fuscescens Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2703 n. 311.
? Ichneumon Röseli Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 975 [n. 40.
Cryptus cyanator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 442 n. 16, ♀ ♂.
Cryptus cyanator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 276 n. 1, ♀ ♂.
Cryptus cyanator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 139 n. 1, ♀ ♂.
Cryptus cyanator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 363 n. 1, ♀ ♂.
Cryptus cyanator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 50 n. 1, ♀ ♂.
Cryptus cyanator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 72 n. 9, ♀ ♂.
Cryptus cyanator Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 477 n. 1, ♀ ♂.
Cryptus cyanator Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 9; T. 6 F. 2.
Cryptus cyanator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 277 n. 10, ♀ ♂.

[1]) *Lep.:* Cosmia abluta (Mocsáry).

Cryptus cyanator Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 19 n. 1.
Cryptus cyanator Schmiedekndcht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 97, ♀ & 104, ♂.
Cryptus cyanator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2115 n. 1.
Cryptus cyanator Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2349 n. 1, ♂.

decoratorius Fabr. — Austr.: New Zealand.
Ichneumon decoratorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 333 n. 32.
Ichneumon decoratorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 426 n. 34.
Ichneumon decoratorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 263 n. 42.
Ichneumon decoratorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2683 n. 106.
Ichneumon decoratorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 176 n. 60.
Ichneumon decoratorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 150 n. 67.
Cryptus decoratorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 78 n. 34.
Ichneumon decoratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277.
Ichneumon decoratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 354.
Cryptus decoratorius Stutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 123.

dentatorius Fabr.! — ♀ ♂ — Am. mer.
Cryptus dentatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 74 n. 17.
Ichneumon dentatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♀.
Ichneumon dentatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 254.
Ichneumon dentatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 290.
Cryptus dentatorius Trentepol, Isis 1829 p. 859 n. 34, ♀ ♂.

destructorius Fabr.! — ♂ — Eur.
Ichneumon destructorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 135 n. 13.
Cryptus destructorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 71 n. 5.
Ichneumon destructorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255.
Ichneumon destructorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 294.
Ichneumon destructorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 896 n. 30.
Cryptus destructorius Trentepol, Isis 1829 p. 863 n. 38, ♂.

dianae Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Cryptus stenogaster Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 529 n. 77, ♂.
Cryptus Dianae Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 545 n. 88, ♀ ♂.
Cryptus Dianae Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 287 n. 29, ♀ ♂.
Cryptus Dianae Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 375 n. 21, ♂.
Cryptus Dianae Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 84 n. 45, ♀ ♂.
Cryptus Dianae Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 482 n. 10, ♀ ♂.
Cryptus Dianae Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 332, ♀ ♂.
Cryptus Dianae Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 279 n. 29, ♀ ♂.
Cryptus Dianae Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 24 n. 12.
Cryptus Dianae Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 102, ♀ & 107, ♂.
Cryptus Dianae Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2352 n. 10, ♀ ♂.

var. **gracilicornis** Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus gracilicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 553 n. 92, ♀.
Cryptus Dianae var. gracilicornis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 103, ♀ & [107, ♂.

difficilis Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Cryptus difficilis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 117 n. 5, ♀ ♂.
Cryptus difficilis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 100, ♀ & 106, ♂.
Cryptus obscurus var. difficilis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2352 n. 8.

dimidiatus Taschbg. — ♀ — Am. mer.
Cryptus dimidiatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 68 n. 10, ♀.

dineurae Rdw. — ♀ — Eur.
Cryptus dineurae Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 289 n. 18, ♀.

dirus Cress. — ♀ — Am.: California.
Cryptus dirus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 359, ♀.

discitergus Say — Am.: Indiana.
Cryptus discitergus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 231 n. 2.
Cryptus discitergus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 689 n. 2.

disjunctus Tosq. — ♀ — Afr.: Algeria.
Cryptus disjunctus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 138 n. 6, ♀.

divisorius Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Austria inf. [n. 4, ♂.
Cryptus divisorius (Kriechbaumer) Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 235
Cryptus divisorius Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 97, ♀ & 104, ♂.

dubitorius Fabr.! — Austr.
Ichneumon dubitorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 321 n. 25.
Ichneumon dubitorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 424 n. 25.
Ichneumon dubitorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 262 n. 31.
Ichneumon dubitorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 340.
Ichneumon dubitorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 173 n. 46.
Ichneumon dubitorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 146 n. 53.
Cryptus dubitorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 77 n. 27.
Ichneumon dubitatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 276.
Ichneumon dubitatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 352.

dubius Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus dubius Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 71 n. 44, ♂.

ducalis Smith — ♀ — As.: Morty.
Cryptus ducalis Smith, Journ. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 63 n. 3, ♀.

ductilis Say — Am.: Indiana.
Cryptus ductilis Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 233 n. 4.
Cryptus ductilis Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 690 n. 4.

eborinus Ratzbg. — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus eborinus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 137 n. 16, ♀.

edwardsii Cress. — ♀ — Am.: California.
Cryptus Edwardsii Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 363, ♀.

eggeri D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Cryptus bicolor Smith, Descr. New Spec. Hymen. 1879 p. 231 n. 2, ♀ [non Lucas].
Cryptus bicolor Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 202; T. 9 F. 12.
Cryptus Eggeri m.

eichwaldii Kaw. — ♂ — Eur.: Russia. [n. 8, ♂.
Ichneumon (Cryptus ?) Eichwaldi Kawall, Bull. soc. natural. Moscou XLI. P. 4. 1868 p. 509

elegans Smith — ♀ — As.: Borneo.
Cryptus elegans Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 118 n. 2, ♀.

elegantorius Fabr.! — ♀ ♂ — Am. mer.
Cryptus elegantorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 75 n. 19.
Ichneumon elegantorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 254.
Ichneumon elegantorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 290.
Cryptus elegantorius Trentepol, Isis 1829 p. 858 n. 33, ♀ ♂.

elegantulus Brullé — ♀ — As.: Java.
Cryptus elegantulus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 198 n. 19, ♀.

elevatus Zett. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Cryptus elevatus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 370 n. 14, ♀.

elongatus Rdw.![1]) — ♀ — Eur.
Cryptus elongatus Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 282 n. 6, ♀.
Cryptus elongatus Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 244 n. 21, ♀.
elongatus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus elongatus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 362 n. 32, ♂.
Cryptus elongatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 784 n. 32, ♂.
emphytorum Bouché[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus emphytorum Bouché, Naturg. d. Insect. 1834 p. 143 n. 12, ♀ ♂.
ephippium Rdw. — Eur.: Alpes.
Cryptus ephippium Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 98.
erberi Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Cryptus Erberi Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. 1871 p. 43, ♀ ♂.
Cryptus Erberi Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 99, ♀ & 104, ♂.
erro Tschek — ♀ — Eur.: Austria inf.
Cryptus erro Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 407 n. 4, ♀.
Cryptus erro Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 103, ♀.
erythrogaster Holmgr. — ♀ ♂ — Afr.: Cap.
Cryptus erythrogaster Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 397 n. 14, ♀ ♂.
erythronotus Rdw. — ♀ ♂ — Eur.
Cryptus erythronotus Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1881 p. 287 n. 15, ♀ ♂.
erythropygus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Cryptus erythropygus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 69 n. 40, ♀.
erythrosoma Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus erythrosoma Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 281 n. 4, ♀ ♂.
eugeneus Tosqu. — ♀ — Afr.: Togo.
Cryptus eugeneus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 153 n. 14, ♀.
excelsus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Colorado.
Cryptus excelsus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 293 n. 7, ♀ ♂.
exhortator (Fabr.) Grav.! — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon exhortator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 264 n. 45.
Ichneumon exhortator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 162 n. 84.
Ichneumon exhortator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2686 n. 119.
Ichneumon exhortator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 179 n. 75.
Ichneumon exhortator Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 117 n. 257.
Ichneumon exhortator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 154 n. 88.
Ophion exhortator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 134 n. 19.
Ichneumon exhortator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 111, ♀.
Ophion exhortator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 512 n. 25.
Cryptus exhortator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 287.
Ichneumon exhortator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon exhortator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 306.
Ichneumon exhortator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 918 n. 62.
exilis Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Ischnus exilis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 111.
Cryptus exilis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 133 n. 8, ♂.
Cryptus exilis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 332 n. 8, ♂.
exstinctor Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Cryptus exstinctor Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 124 n. 12, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Lophyrus frutetorum (Rudow).
2) *Hymen.:* Emphytus cinctus (Bouché).

Cryptus exstinctor Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 239 n. 8, ♀ ♂.
Cryptus exstinctor Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 103, ♀ & 105, ♂.
exulans Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Cryptus exulans Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 157, ♂.
fabricii Schiödte — ♀ ♂ — Am.: Groenlandia.
Ichneumon moderator O. Fabricius, Fauna Grönland. 1780 p. 198 n. 154 [non Linné].
Ichneumon moderator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 992 n. 157, ♀ ♂.
Cryptus Fabricii Schiödte, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 147, ♀ ♂. [T. 3 F. 9.
Cryptus Fabricii Aurivillius, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. XV. P. 4. 1893 p. 31 n. 15, ♂;
fasciipennis Brullé — ♀ ♂ — Am.: Cuba.
Cryptus fasciipennis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 191 n. 9, ♀ ♂.
feriatus Tosqu. — ♂ — Afr.: Cap.
Cryptus feriatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 205 n. 41, ♂.
ferrugatorius Fabr.! — ♀ — Afr.: Guinea.
Ichneumon ferrugatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 140 n. 32.
Cryptus ferrugatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 76 n. 22.
Ichneumon ferrugatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon ferrugatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 289.
Cryptus ferrugatorius Trentepol, Isis 1829 p. 827 n. 10, ♀.
ferrugineus Smith — ♀ — As.: Celebes.
Cryptus ferrugineus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 63 n. 2, ♀.
fervens Tosqu. — ♂ — Afr.: Guinea.
Cryptus fervens Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 165 n. 20, ♂.
fervidus Tosqu. — ♂ — Afr.: Togo.
Cryptus fervidus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 152 n. 13, ♂.
filiformis Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Cryptus filiformis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 380 n. 27, ♂.
filiformis Rdw.! — ♀ — Eur.: Helvetia.
Cryptus filiformis Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 107, ♀.
filipendulae Boie [1]) — Eur.: Germania.
Cryptus filipendulae Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 98 n. 27.
firmator Fabr.! — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon firmator Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 226 n. 135-6.
Cryptus firmator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 86 n. 66.
Ichneumon firmator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 268.
Ichneumon firmator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 330.
Cryptus firmator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1065 n. 291.
Cryptus firmator Trentepol, Isis 1829 p. 925 n. 45, ♀.
flavilabris Htg. [2]) — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus flavilabris Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 273 n. 18, ♂.
Cryptus flavilabris Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 143 n. 13, ♂.
flavipes Harrgt. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Cryptus flavipes Harrington, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 212, ♀.
flavocinctus Brullé — ♀ — Austr.
Cryptus flavocinctus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 198 n. 20, ♀.
flavopictus Rdw. — ♂ — Eur.
Cryptus flavopictus Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 241 n. 15, ♂.

---

1) *Lep.*: Zygaena filipendulae (Boie).
2) *Hymen.*: Lophyrus pini (Hartig).

formicatus (L.) Fabr.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon formicatus Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 938 n. 61.
Ichneumon formicatus Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 342 n. 81.
Ichneumon formicatus Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 437 n. 105.
Ichneumon formicatus Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 269 n. 123.
Ichneumon formicatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 200 n. 211.
Ichneumon formicatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2711 n. 61.
Ichneumon formicatus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 360.
Ichneumon formicatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 199 n. 174.
Ichneumon formicatus Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 183 n. 204.
Cryptus formicatus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 88 n. 80.
Ichneumon formicator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 274.
Ichneumon formicator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 348.
Ichneumon formicatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1067 n. 292.

formosellus Spin. — ♂ — Am. mer.
Cryptus formosellus Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 142 n. 7, ♂.

formosus Brullé — ♀ ♂ — Afr.: Cap.
Cryptus formosus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 187 n. 1, ♀; T. 41 F. 3.
Cryptus formosus Desmarest, Chenu: Encycl. hist. nat. Annelles 1860 p. 171, ♀; Fig. 143.
Cryptus formosus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1878 Proc. p. XLII.
Cryptus formosus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 150 n. 12, ♂.

frater Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Cryptus frater Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 303 n. 19, ♀.
Cryptus frater Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 80, ♀.

fraterculus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon fraterculus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 55 n. 57, ♀.
Cryptus fraterculus Davis, Canad. Entomol. XXVIII. 1895 p. 287.

fraternus Cam. — Am.: Mexico.
Cryptus fraternus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 208 n. 21.

fulginipennis Costa — ♀ — Eur.: Sardinia.
Cryptus fulginipennis A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 13. 1885 p. 24, ♀.

fulvipes Magr. — ♂ — Eur.: Italia.
Cryptus fulvipes (Kriechbaumer) Magretti, Bull. soc. entom. Ital. XVI. 1884 p. 3 n. 7, ♂.

fulvus Taschbg. — ♂ — Am.: Mexico.
Cryptus fulvus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 66 n. 7, ♂.

fuscator Fabr.! — Austr.: Ins. Sandwich.
Ichneumon fuscator Fabricius, Entom. System. 1793 p. 163 n. 123.
Cryptus fuscator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 85 n. 59.
Ichneumon fuscator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 274.
Ichneumon fuscator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 348.

fuscatus Fabr.! — ♀ — Eur.
Ichneumon fuscatus Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 437 n. 108.
Ichneumon fuscatus Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 269 n. 126.
Ichneumon fuscatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 200 n. 214.
Ichneumon fuscatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2711 n. 185.
Ichneumon fuscatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 199 n. 177.
Ichneumon fuscatus Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 184 n. 209.
Ichneumon fuscatus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 303 n. 2134, ♀.
Cryptus fuscatus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 89 n. 87.
Ichneumon junctor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.

Ichneumon junctor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 337.
Cryptus fuscatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1060 n. 283.

gallarum Rdw.![1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus gallarum Rudow, Entom. Nachr. VII. 1881 p. 79 n. 1, ♀.
Cryptus gallarum Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 286 n. 13, ♀ ♂.

geiri D. T. — Austr.: New Zealand.
Cryptus penetrator Smith, Trans. Entom. Soc. London 1878 p. 2 [nec 1874].
Cryptus penetrator Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 124.
Cryptus Geiri m.

genelinii D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Mesoleptus filiformis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 98 n. 33, ♀ [non Fonscolombe].
Cryptus filiformis Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 189.
Cryptus Genelinii m.

genialis Tschek — ♀ — Eur.: Austria inf.
Cryptus genialis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 240 n. 9, ♀.
Cryptus genialis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 100 & 101, ♀.

geniculatorius Fabr.! — ♀ — As.: Sumatra.
Cryptus geniculatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 72 n. 12.
Ichneumon geniculatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♀.
Ichneumon geniculatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279.
Ichneumon geniculatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 359.
Cryptus geniculatorius Trentepol, Isis 1829 p. 852 n. 28, ♀.

genucinctus Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus genucinctus Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 99, ♀ ♂.

germari Taschbg. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cryptus Germari Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 83 n. 43, ♀.
Cryptus Germari Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 486 n. 17.
Cryptus Germari Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 101 & 103, ♀.
Cryptus Germari Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2354 n. 17, ♀ ♂.

gogorzae Kriechb. — ♂ — Eur.: Hispania.
Cryptus Gogorzae Kriechbaumer, Act. soc. Españ. nat. hist. XXVII. 1898 p. 168, ♂.

gracilis Prov.[2]) — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus gracilis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 74 n. 52, ♂.

graminellae Boie[3]) — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus graminellae Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 100 n. 31, ♀.

gravenhorstii Fonsc. — ♀ — Eur.: Gallia.
Cryptus Gravenhorstii Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 382 n. 30, ♀.

guatemalensis Cam. — ♀ — Am.: Guatemala.
Cryptus Guatemalensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 209 n. 22, ♀.

gyrator (Duf. & Perr.) Gir.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon gyrator Dufour & Perris, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 40 n. 21, ♀ ♂; T. 3 [F. 47-51.
Cryptus gyrator Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 478 n. 28, ♀ ♂.

haematodus Grav. — ♂ — Eur.: Italia.
Cryptus haematodus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 628 n. 138, ♂.

hebes Tosqu. — ♂ — Afr.: Guinea.
Cryptus hebes Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 175 n. 25, ♂.

---

1) *Hymen.:* Nematus viminalis (Rudow).
2) = ? Cr. rectus Prov.
3) *Lep.:* Psyche graminella (Boie).
4) *Hymen.:* Trypoxylon figulus (Giraud).

hebetis Cam. — ♀ — Am.: Panama.
Cryptus hebetis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 208 n. 20, ♀; T. 9 F. 13.
hechfellneri D. T. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus pubescens Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 72 n. 46, ♂ [non Fonscolombe].
Cryptus pubescens Davis, Canad. Entomol. XXVII. 1895 p. 287.
Cryptus Hechfellneri m.
hector Fabr.! — ♂ — Am. mer.
Cryptus Hector Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 80 n. 41.
Ichneumon Hector Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon Hector Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 307.
Cryptus Hector Trentepol, Isis 1829 p. 853 n. 29, ♂.
heiglii D. T. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus rectus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 75 n. 53, ♂ [nec 1875].
Cryptus Heiglii m.
hellenicus Schmkn. — ♀ — Eur.: Corfu.
Cryptus Hellenicus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 100, ♀.
heraldicus Kriechb. — ♂ — Eur.: Litorale.
Cryptus heraldicus Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894 p. 12, ♂.
hirtae Millière[1]) — ♂ — Eur.: Gallia.
Cryptus ? hirtae Millière, Ann. soc. Linn. Lyon N. S. IX. 1862 p. 277, ♂; T. 4 F. 10 [s. descr.].
hirticornis Er. — ♂ — As.: Sibiria.
Cryptus hirticornis Erichson, Middendorff: Reise in Sibirien II. 1. 1851 p. 64 n. 128, ♂.
histrionicus Rdw. — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus histrionicus Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 286 n. 12, ♂.
hoensbroechii D. T. — ♀ — Afr.: Scioa.
Cryptus picticornis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 187 n. 31, ♀ [non Ruthe].
Cryptus Hoensbroechii m.
hueberi D. T. — ♂ — Eur.
Cryptus melanopus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 94 n. 69, ♂ [nec Fonscolombe].
Cryptus Hueberi m.
humeralis Rdw — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus humeralis Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 279 n. 1, ♀.
hylotomadum Rdw.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus hylotomadum Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 239 n. 13, ♀ ♂.
ichneumonoides Rdw. — ♀ — Eur. mer.
Cryptus ichneumonoides Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 242 n. 18, ♀.
ignotus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus ignotus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 73 n. 49, ♂.
illustris Rdw. — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus illustris Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 288 n. 17, ♀.
imitator Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Cryptus imitator Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 13.
Cryptus imitator Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 140 n. 24, ♀.
Cryptus imitator Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 339 n. 24, ♀.
imitatorius Fabr.! — ♀ — Am. mer.
Cryptus imitatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 73 n. 14.
Ichneumon imitatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon imitatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 286.
Ichneumon imitatorius Trentepol, Isis 1829 p. 936 n. 51, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Heliophobus hirta (Millière).
[2]) *Hymen.:* Hylotoma cyanocrocea (Rudow).

immitis Tschek — ♀ — Eur.: Austria inf.
Cryptus immitis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 118 n. 6.
Cryptus immitis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 102, ♀.
impar (Prov.) Davis — ♂ — Am.: Canada.
Hoplismenus impar Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 3, ♂.
Hoplismenus impar Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 292 n. 3, ♂.
Cryptus impar Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 185.
incertus Ratzbg.[1]) — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus incertus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 136 n. 11, ♂.
incisus Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Cryptus incisus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 121 n. 9, ♂.
? Cryptus incisus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 404 n. 1, ♀.
? Cryptus incisus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 237 n. 6, ♀.
? Cryptus pseudonymus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 238 n. 7, ♀.
Cryptus incisus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 101, ♀ & 105, ♂.
incognatus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus incognatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 70 n. 42, ♂.
incubator Ratzbg.[2]) — Eur.: Germania.
Cryptus incubator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 138 n. 22.
indicus Cam. — ♂ — As.: India.
Cryptus Indicus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 p. 15, ♂.
indistinctus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Phaeogenes indistinctus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 43 n. 13, ♂.
Cryptus indistinctus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 186.
infernalis Cam. — As.: India.
Cryptus infernalis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 p. 14.
infimus Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Cryptus infimus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 381 n. 28, ♂.
infumatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Dania.
? Cryptus difficilis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 117 n. 5, ♀ [excl. ♂].
Cryptus infumatus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 481 n. 9, ♀ ♂.
Cryptus infumatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 9, ♀; T. 6 F. 7.
Cryptus infumatus Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 23 n. 10.
Cryptus infumatus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2352 n. 9, ♀ ♂.
insidiator Smith — ♀ — As.: Kashmir.
Cryptus insidiator Smith, Scient. Res. 2d Yarkand Miss. 1878 p. 21 n. 58, ♀.
Cryptus insidiator Waterhouse, Aid Ident. Insects P. 25. 1885; T. 162 F. 1.
insinuator Grav. — ♂ — Eur.: Austria, Gallia.
Cryptus insinuator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 525 n. 71, ♂.
Cryptus insinuator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 371 n. 15, ♂.
Cryptus insinuator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 82 n. 38, ♂.
Cryptus insinuator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 105, ♂.
insolitus Tosqu. — ♀ — Afr.: Senegambia.
Cryptus insolitus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 185 n. 30, ♀.
intermedius Ratzbg.[3]) — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus intermedius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 134 n. 2, ♀.

---

1) *Hymen.:* Lophyrus pini (Ratzeburg).
2) *Hymen.:* Lophyrus pini (Ratzeburg).
3) *Lep.:* Trachea piniperda (Ratzeburg).

intricator Fonsc. — Eur.: Gallia.
Cryptus intricator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 371 n. 16.
investigator Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Cryptus investigator Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 123 n. 11, ♀ ♂.
Cryptus investigator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 103, ♀.
iridescens Cress. — ♂ — Am.: Delaware, Illinois.
Ischnus iridescens Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 193 n. 11, ♂.
Cryptus iridescens Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 296 n. 9, ♂.
Cryptus iridescens Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 77, ♂.
irroratorius Fabr.! — Am. ins.
Ichneumon irroratorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 328 n. 8.
Ichneumon irroratorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 422 n. 8.
Ichneumon irroratorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 260 n. 9.
Ichneumon irroratorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2676 n. 80.
Ichneumon irroratorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 350.
Ichneumon irroratorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 166 n. 9.
Ichneumon irroratorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 138 n. 23.
Cryptus irroratorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 72 n. 10.
Ichneumon irroratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253.
Ichneumon irroratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 290.
italicus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Italia, Gallia.
Cryptus Italicus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 559 n. 96, ♀ ♂.
Cryptus Italicus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 378 n. 24, ♀♂.
Cryptus Italicus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 81 n. 37, ♀ ♂.
Cryptus Italicus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 102, ♀ & 105, ♂.
junceus Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Cryptus junceus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 29 n. 8, ♀.
Cryptus junceus Walsh & Riley, Amer. Entomol. I. 1869 p. 137; Fig. 109.
Cryptus junceus Riley, Amer. Entomol. III. 1880 p. 154; Fig. 60.
kinbergii Holmgr. — ♀ ♂ — Am.: Argentinia.
Cryptus Kinbergi Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 397 n. 13, ♀ ♂.
lateritius Taschbg. — ♂ — Am.: Brasilia.
Cryptus lateritius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 65 n. 6, ♂.
laticeps Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Cryptus laticeps Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 157, ♂.
laticinctus Brullé — ♀ — Eur.: Graecia.
Cryptus laticinctus Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 379 n. 835, ♀; T. 51 F. 11.
latitarsis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cryptus obscurus var. Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 114 n. 1, ♀ ♂.
Cryptus latitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 483 n. 12, ♀ ♂.
Cryptus latitarsis Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 24 n. 14.
Cryptus latitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2353 n. 12, ♂.
lavoglerl D. T. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Mesostenus nigricornis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 264 (nec Brullé).
Echthrus nigricornis Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 99 n. 4, ♂.
Echthrus nigricornis Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 15 n. 4, ♀.
Echthrus nigricornis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 486 & 803 n. 4, ♀.
Echthrus nigricornis Harrington, Canad. Entomol. XXV. 1893 p. 32, ♀ ♂.
Cryptus ? nigricornis Davis. Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 190.
Cryptus Lavogleri m.

lavoiei (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon Lavoiei Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 353 n. 29, ♀.
Phygadeuon Lavoiei Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 776 n. 29, ♀.
Cryptus Lavoiei Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 187.
lentus Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Cryptus lentus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 202 n. 39, ♀.
lepidus Smith — ♀ — As.: Borneo.
Cryptus lepidus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 119 n. 3, ♀.
leucocheir Ratzbg.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon leucocheir Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 133 n. 4, ♂.
Cryptus leucocheir Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 135 n. 9.
Cryptus leucocheir Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 120 n. 8, ♀ ♂.
Cryptus leucocheir Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 332, ♀.
Cryptus leucocheir Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 100, 102, ♀ & 106, ♂.
leucomelas Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Cryptus leucomelas Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 201 n. 24, ♀.
leucoproctus Grav. — ♂ — Eur.: Italia.
Cryptus leucoproctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 587 n. 115, ♂.
Cryptus leucoproctus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 103 n. 93, ♂.
Cryptus ? leucoproctus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
leucopsis Grav. — ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia.
Ichneumon canaliculatus var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 142, ♂.
Cryptus leucopsis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 467 n. 32, ♂.
Cryptus leucopsis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 52 n. 8, ♂.
Cryptus leucopsis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 [Rém.] p. 16 n. 19, ♂.
Cryptus leucopsis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 77 n. 24, ♂.
Cryptus leucopsis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 278 n. 18, ♂.
leucopus Ashm. — ♂ — Am.: Colorado.
Cryptus leucopus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 409, ♂.
leucopygus Walk. — ♀ — Afr.: Aegyptus.
Cryptus leucopygus Walker, List of Hymen. in Egypt 1871 p. 1 n. 2, ♀.
leucosticticus Htg.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus leucosticticus Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 273 n. 17, ♀ ♂.
Cryptus leucosticticus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 140 n. 4, ♀ ♂.
Cryptus leucosticticus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 135 n. 8.
leucotarsus Grav. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Cryptus leucotarsus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 524 n. 70, ♂.
Cryptus leucotarsus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 285 n. 23, ♂.
Cryptus leucotarsus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 93 n. 65, ♂.
Cryptus leucotarsus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 280 n. 40, ♂.
Cryptus leucotarsus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
leucotomus Ratzbg.[3]) — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon leucotomus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 133 n. 5, ♂.
Cryptus leucotomus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 135 n. 5.
leucozonatus Costa — ♀ — Eur.: Sardinia; Afr. bor.
Cryptus leucozonatus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 2. 1883 p. 99, ♀.
Cryptus leucozonatus A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1884 p. 337.
Cryptus leucozonatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 183 n. 29, ♀.

---

1) *Hymen.:* Clavellaria amerinae (Ratzeburg, Brischke, Mocsáry).
2) *Hymen.:* Lophyrus pini (Hartig), L. frutetorum (Ratzeburg).
3) *Hymen.:* Cimbex variabilis (Ratzeburg).

leucozonius Rdw.! — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus leucozonius Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 288 n. 16, ♀ ♂.
levaillantii Luc. — ♀ — Afr.: Algeria.
Cryptus Levaillantii Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 329 n. 390, ♀; T. 18 F. 10.
limatus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Delaware, Pennsylvania.
Cryptus limatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 298 n. 13, ♀.
Cryptus limatus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 81, ♂.
Ischnus lentus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 110.
Cryptus limatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 135 n. 12, ♀ ♂; Fig. 2.
Cryptus limatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 334 n. 12, ♀♂; Fig. 55.
linearis Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus linearis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 72 n. 47, ♂.
lippensis Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus Lippensis Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 244 n. 22, ♀ ♂.
longicauda Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Istria.
Cryptus longicauda Kriechbaumer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXIII. 1873 p. 49 n. 1, ♀♂.
var. **obscuratus** Kriechb. — Eur.: Istria. [p. 51.
Cryptus longicauda var. obscurata Kriechbaumer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXIII. 1873
longipes Htg.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus longipes Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 261, ♂.
Cryptus longipes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 140 n. 5, ♀ ♂.
longiseta Rdw.! — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus longiseta Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 280 n. 2, ♀.
longiseta Taschbg. — ♀ — Am.: Chile.
Cryptus longiseta Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVIII. 1871 p. 42 n. 3.
Cryptus longiseta Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 62 n. 1, ♀.
lophyri Nort.[2]) — ♀ ♂ — Am.: Connecticut.
Cryptus Lophyri Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1869 p. 326 nota n. 1, ♀ ♂.
lucidator Fabr.! — Eur.: Selandia.
Ichneumon lucidator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 170 n. 152.
Cryptus lucidator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 88 n. 75.
Ichneumon lucidator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 261.
Ichneumon lucidator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 312.
Cryptus lucidator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1009 n. 194.
luctuosus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Colorado.
Cryptus luctuosus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 291 n. 3, ♀.
Cryptus luctuosus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 71 n. 5, ♂.
ludius Tosqu. — ♀ — Afr.: Zanzibar.
Cryptus ludius Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 171 n. 23, ♀.
lugubris Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Cryptus lugubris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 456 n. 24, ♀.
Cryptus lugubris Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 71 n. 4, ♀.
Cryptus lugubris Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 277 n. 3, ♀.
Cryptus lugubris Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 21 n. 6.
Cryptus lugubris Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 98, ♀.
Cryptus lugubris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2115 n. 3^b.
Cryptus lugubris Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2349 n. 3^b, ♂.

---

1) *Lep.:* Bombyx piniperda (Hartig).
2) *Hymen.:* Lophyrus abietis (Norton).

lutescens Tschek — ♀ — Eur.: Austria inf.
Cryptus lutescens Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 234 n. 3, ♀.
Cryptus lutescens Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 100, ♀.
macellus Tschek — ♀ — Eur.: Austria inf.
Cryptus macellus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 406 n. 2, ♀.
Cryptus macellus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 103, ♀.
mactator Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Cryptus mactator Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 128 n. 17, ♀.
Cryptus mactator Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 241 n. 11, ♀ ♂.
Cryptus mactator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 97, ♀ & 104, ♂.
maculipes Smith — ♀ — As.: Japonia.
Cryptus maculipes Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 393 n. 6, ♀.
Cryptus maculipes (Smith) Walker, Cistula entom. I. P. 11. 1874 p. 304 n. 7, ♀.
maerens (Perty) Taschbg. — Am. mer.
Alomyia moerens Perty, Delect. anim. artic. Brasil. 1833 p. 133; T. 26 F. 14.
Cryptus moerens Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 67 n. 8.
marginellus Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus marginellus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 571 n. 101, ♂.
Cryptus marginellus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 94 n. 67, ♂.
melanopus Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Cryptus melanopus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 375 n. 20, ♂.
melanosoma Rdw. — ♀ ♂ — Eur.
Cryptus melanosoma Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 284 n. 10, ♀ ♂.
melanostigma Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Cryptus melanostigma Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 191 n. 8, ♀.
mellicoxus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus mellicoxus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 75 n. 55, ♂.
mesoxanthus Brullé — ♀ — As.: Java.
Cryptus mesoxanthus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 196 n. 17, ♀.
micropterus Say [1]) — Am.: Pennsylvania.
Cryptus micropterus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 238 n. 13.
Cryptus micropterus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 694 n. 13.
minator Grav. [2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Cryptus minator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 704, ♂.
Cryptus minator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 556 n. 94, ♀ ♂.
Cryptus minator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 288 n. 32.
Cryptus minator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 81 n. 36, ♀ ♂.
Cryptus minator Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 485 n. 15, ♀ ♂.
Cryptus minator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 279 n. 24, ♀ ♂.
Cryptus minator Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 25 n. 16.
Cryptus minator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 102, ♀ & 107, ♂.
Cryptus minator Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2353 n. 15, ♀ ♂.
minutor Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Cryptus minutor Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 368 n. 4, ♂.
montezuma Cam. — Am.: Mexico.
Cryptus Montezuma Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 203 n. 2.
monticola Cam. — Am.: Mexico.
Cryptus monticola Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 203 n. 3.

---

1) *Hymen.:* Nematus ventricornis (Say).
2) *Col.:* Hylotrupes bajulus (Rondani).

moschator (Fabr.) Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 339 n. 41.
? Ichneumon dumetorum Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 406 n. 41.
Ichneumon moschator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 266 n. 84.
? Ichneumon dumetorum Villers, Linnaei Entom. III. 1789 p. 164 n. 92.
Ichneumon moschator Villers, Linnaei Entom. III. 1789 p. 179 n. 135.
Ichneumon moschator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2692 n. 148.
Ichneumon moschator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 188 n. 112.
? Ichneumon dumetorum Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 210 n. 19.
Ichneumon moschator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 166 n. 134.
Ichneumon moschator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 67 n. 75, ♂.
Ichneumon moschator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♂.
Cryptus moschator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 287.
Ichneumon moschator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 275.
Ichneumon moschator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 348.
Ichneumon moschator Trentepol, Revis. crit. gen. Ichneumon. 1825 p. 24 n. 13.
Ichneumon moschator Trentopol, Isis 1826 p. 71 n. 13.
Cryptus moschator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 451 n. 21, ♀ ♂.
? Ichneumon dumetorum Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 901 n. 34, ♀.
Cryptus moschator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 277 n. 3.
Cryptus moschator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 367 n. 2, ♀ ♂.
Cryptus moschator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 312 n. 3; T. 2 F. 5.
Cryptus moschator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 72 n. 8, ♀ ♂.
Cryptus moschator Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 478 n. 3, ♀ ♂.
Cryptus moschator Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 9; T. 6 F. 4.
Cryptus moschator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 277 n. 9, ♀ ♂.
Cryptus moschator Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 19 n. 3.
Cryptus moschator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 98, ♀ & 104, ♂.
Cryptus moschator Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2349 n. 3.

mundus Prov.[1]) — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus mundus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 203.
Cryptus mundus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 137 n. 15, ♂.
Cryptus mundus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 337 n. 15, ♂.

muricatus Tosqu. — ♀ — Afr.: Caffraria.
Cryptus muricatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 135 n. 4, ♀.

murorum Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Alpes.
Cryptus cyanator var. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 442 n. 16, ♀ ♂.
Cryptus murorum Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 234 n. 2, ♀ ♂.
Cryptus serratus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 478 n. 2, ♀ ♂.
Cryptus serratus Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 19 n. 2.
Cryptus murorum Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 97, ♀ & 104, ♂.
Cryptus serratus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2349 n. 2, ♀ ♂.

myrmecoleontidum Boud.[2]) — ♀ — Eur.: Gallia.
Cryptus myrmeleonidum Boudier, Ann. soc. entom. France III. 1834 p. 332, ♀; T. 4 F. 1.

myrmeleontis Rdw.! — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Helvetia.
Cryptus myrmeleontis Rudow, Soc. entom. III. 1888 p. 137, ♀ ♂.

napiformis Rdw. — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus napiformis Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 285 n. 12, ♀.

---

1) *Lep.:* Crambus vulgivagellus (Clement).
2) *Neur.:* Myrmeleon spec. (Boudier).

narratorius Fabr.! — ♀ — Am. mer.
Cryptus narratorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 76 n. 21.
Ichneumon narratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253.
Ichneumon narratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 288.
Cryptus narratorius Trentepol, Isis 1829 p. 861 n. 36, ♀.
nebraskensis Ashm. — ♀ — Am.: Nebraska.
Cryptus Nebraskensis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 412, ♀.
nigerrimus Fonsc. — ♀ — Eur.: Gallia.
Cryptus nigerrimus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 366 n. 6, ♀.
nigrator Steph. — Eur.: Britannia.
Cryptus nigrator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 291 n. 41.
nigricalceatus Walsh — ♂ — Am.: Illinois.
Cryptus nigricalceatus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 77, ♂.
nigricornis Brullé — ♀ ♂ — Am.: Chile.
Cryptus nigricornis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 193 n. 12, ♀ ♂.
nigricoxus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus nigricoxus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 361 n. 56, ♂.
nigripennis Ashm. — ♀ — Am.: New Jersey.
Cryptus nigripennis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 411, ♀.
nigritarsis Kriechb. — ♂ — Afr.: Teneriffa.
Cryptus nigritarsis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 45 n. 4, ♂.
nitidipennis Brullé — ♀ — Am.: Chile.
Cryptus nitidipennis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 188 n. 3, ♀.
nitschei D. T. — ♀ ♂ — Am.: Colorado.
Cryptus violaceipennis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 408, ♀ ♂ [nec Brullé].
Cryptus Nitschei m.
nivalis Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Cryptus nivalis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 369 n. 9, ♂.
notatus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus notatus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 202.
Cryptus notatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 141 n. 25, ♂.
Cryptus notatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 340 n. 25, ♂.
notulatorius (Fabr.) Trent.! — ♀ — As.: Tranquebar.
Ichneumon notulatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 77 n. 28.
Ichneumon notulatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279.
Ichneumon notulatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 362.
Cryptus notulatorius Trentepol, Isis 1829 p. 849 n. 25, ♀.
nubilipennis Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Cryptus nubilipennis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 291 n. 4, ♀.
nuncius Say [1]) — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Cryptus nuncius Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 237 n. 11.
Cryptus nuncius Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 693 n. 11.
Cryptus extrematis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 304 n. 21.
Cryptus nuncius Riley, Amer. Entomol. II. 1870 p. 100; Fig. 63-64.
Cryptus nuncius Riley, 4th Ann. Rep. Insect. Missouri 1872 p. 110-111 & 123.
Cryptus extrematis Riley, 4th Ann. Rep. Insect. Missouri 1872 p. 110-111 & 123; Fig. 40 & 41.
Cryptus Belangeri Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 201.
Cryptus nuncius Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 141 n. 26, ♀.
Cryptus extrematis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 141 n. 27, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Platysamia cecropia, Callosamia promethea, Aletia xylina (Riley).

Cryptus nuncius Riley, General-Index Rep. Insect. Missouri 1881 p. 52.
Cryptus nuncius Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 340 n. 26, ♀.
Cryptus extrematis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 340 n. 27, ♀ ♂.
Cryptus nuncius Riley, IV. Rep. U. St. Entom. Comm. 1885 p. 111.
? Echthrus Provancheri (Brodie) Provancher, Canad. Entomol. XVII. 1885 p. 116, ♀ ♂.
Cryptus sordidus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 67 n. 35, ♀.
? Echthrus Provancheri Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 118 n. 8, ♀ ♂.
? Echthrus Provancheri Harrington, Canad. Entomol. XXV. 1893 p. 32, ♀.

nuncupator Panz.! — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon nuncupator Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 79 T. 13.
Cryptus nuncupator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 72.
Ichneumon nuncupator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 111, ♀.
Ichneumon nuncupator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1089 n. 333.

nutatorius Fabr.! — ♀ — Austr.
Ichneumon nutatorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 328 n. 7.
Ichneumon nutatorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 422 n. 7.
Ichneumon nutatorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 260 n. 7.
Ichneumon nutatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2675 n. 78.
Ichneumon nutatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 169 n. 7.
Ichneumon nutatorius Fabricius, Entom. System. 1793 p. 136 n. 19.
Cryptus nutatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 71 n. 7.
Ichneumon nutatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 254.
Ichneumon nutatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 290.
Cryptus nutatorius Trentepol, Isis 1829 p. 862 n. 37, ♀.

objurgator Fabr.! — Afr. aequinoct.
Ichneumon objurgator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 426 n. 36.
Ichneumon objurgator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 263 n. 44.
Ichneumon objurgator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2686 n. 120.
Ichneumon objurgator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 177 n. 63.
Ichneumon objurgator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 150 n. 70.
Cryptus objurgator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 79 n. 37.
Ichneumon objurgator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon objurgator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 307.

obscuratus Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Scioa.
Cryptus obscuratus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 194 n. 35, ♀ ♂.

obscuripes Zett. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Cryptus obscuripes Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 369 n. 8, ♂.
Cryptus borealis Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 484 n. 13 [non Zetterstedt].
Cryptus obscuripes Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 23 n. 11.
Cryptus borealis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 99, ♀, 106, ♂ & 150.
Cryptus borealis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2353 n. 13, ♀ ♂.

obscurus (Gmel.) Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 64 n. 260.
Ichneumon obscurus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1798 p. 2704 n. 315.
Cryptus obscurus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 548 n. 91, ♀ ♂.
Cryptus obscurus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 287 n. 30.
Cryptus obscurus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 141 n. 9, ♀ ♂.
Cryptus obscurus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 123.

---

[1]) *Lep.:* Brotolomia meticulosa, Chariptera viridana (Walsh), Plusia asclepiadis (Mocsáry), Bombyx quercus (Tschek), Smerinthus populi (Bignell).

Cryptus obscurus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 376 n. 22, ♀ ♂.
Cryptus obscurus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 51 n. 3, ♀.
Cryptus obscurus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 86 n. 48, ♀ ♂.
Cryptus obscurus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 114 n. 1, ♀ ♂ [excl. var.].
? Cryptus albatorius Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 117 n. 4, ♀ ♂.
Cryptus obscurus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 481 n. 8, ♀ ♂.
Cryptus obscurus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 332, ♀.
Cryptus obscurus Parfitt, Rep. & Trans. Devon Assoc. XIII. 1881 p. 258.
Cryptus obscurus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 279 n. 31, ♀ ♂.
Cryptus obscurus Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 22 n. 9.
Cryptus obscurus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 99, ♀ & 106, ♂.
Cryptus obscurus Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894 p. 12, ♀.
Cryptus obscurus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2351 n. 8.

ocellator Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Cryptus ocellator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 369 n. 10, ♂.

odoriferator (Duf. & Perr.) Gir.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon odoriferator Dufour & Perris, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 44 n. 22, ♀ ♂.
Cryptus odoriferator Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 479 n. 29, ♀ ♂.

olitorius Fabr.! — Eur.: Germania.
Ichneumon olitorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 137 n. 20.
Cryptus olitorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 71 n. 8.
Ichneumon olitorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon olitorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 289.

olivieri Brullé — ♀ — As.: Arabia.
Cryptus Olivieri Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 200 n. 22, ♀.

onustus Walk. — ♀ — As.: Ceylon.
Cryptus? onustus Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) V. 1860 p. 306, ♀.

opacorufus Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Cryptus opacorufus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 64 n. 5, ♀.

opacus Smith — ♀ — As.: Celebes.
Cryptus opacus Smith, Journ. Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 60 n. 1, ♀.

orbus Say — Am.: Indiana.
Cryptus orbus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 231 n. 1.
Cryptus orbus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 688 n. 1.

orientalis Cam. — ♀ — As.: India.
Cryptus orientalis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. P. 4. 1897 p. 16, ♀.

oriicus Dest. — ♀ — Eur.: Sicilia.
Cryptus oriicus Destefani, Natural. Sicil. V. 1886 p. 184 n. 195, ♀.

ornatipennis Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Cryptus? ornatipennis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 24, ♀; Fig. 4.

osculatus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus osculatus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 178.
Cryptus osculatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 132 n. 4, ♂.
Cryptus osculatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 331 n. 4, ♂.

pacificus Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Cryptus pacificus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 361, ♂.

pallidus Cress. — ♀ — Am.: Delaware.
Cryptus pallidus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 307 n. 25, ♀.

---

[1]) *Hymen.:* Trypoxylon figulus (Giraud).

pectinitarsis Rdw. — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus pectinitarsis Rudow, Entomol. Nachr. VIII. 1882 p. 281 n. 3, ♀.
penetrator Smith — ♀ — As.: Japonia.
Cryptus penetrator Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 392 n. 4, ♀.
pentagonalis Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Cryptus pentagonalis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 66 n. 33, ♀ ♂.
perditor Fabr.! — ♂ — Am. mer.
Cryptus perditor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 81 n. 43.
Ichneumon perditor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon perditor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 306.
Cryptus perditor Trentepol, Isis 1829 p. 856 n. 32, ♂.
pernix Tosqu. — ♀ — Afr.: Togo.
Cryptus pernix Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 163 n. 19, ♀.
perpulcher Cam. — ♂ — As.: Borneo.
Cryptus perpulcher Cameron, Mem.&Proc. Manchester Soc. XLI. P.13. 1897 p.9, ♂; T.16 F.7.
persimilis Cress. — ♀ — Am.: Delaware.
Cryptus persimilis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 298 n. 12, ♀.
Cryptus persimilis Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 79, ♀.
Cryptus persimilis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 136 n. 14, ♀.
Cryptus persimilis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 334 n. 14, ♀.
petiolatus Smith — ♀ — As.: Celebes.
Cryptus petiolatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 62 n. 5, ♀.
picticornis Ruthe — ♂ — Eur.: Islandia.
Cryptus picticornis Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 365 n. 45, ♂.
picticornis Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus picticornis Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 287 n. 14, ♀ ♂.
picticoxis Walsh — ♂ — Am.: Illinois.
Cryptus picticornis Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 82, ♂.
pictifrons Cress. — ♂ — Am.: Wyoming Terr.
Cryptus pictifrons Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 360, ♂.
pictipennis Tosqu. — ♂ — Afr.: Caffaria.
Cryptus pictipennis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 155 n. 15, ♂.
pinguis (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Phaeogenes pinguis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 43 n. 16, ♀.
Cryptus pinguis Davis, Canad. Entomol. XXVII. 1895 p. 287.
poecilopus Rdw.[1] — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus poecilopus Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 239 n. 12, ♀.
praepes Bingh. — As.: Philippines.
Cryptus praepes Bingham, Ann. & Mag. Nat. Hist. XVI. 1895 p. 445.
properus Tosqu. — ♀ — Afr.: Togo.
Cryptus properus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 159 n. 17, ♀.
proximus Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Cryptus proximus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 374 n. 19, ♂.
pseudonymus Tschek[2] — ♀ — Eur.: Austria inf.
? Cryptus incisus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 404 n. 1, ♀.
? Cryptus incisus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 237 n. 6, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Cheimatobia brumata (Rudow).
[2]) *Lep.:* Cirrhoidia ambusta (Mocsáry).

Cryptus pseudonymus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 238 n. 7, ♀.
Cryptus pseudonymus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 100, ♀.

pubescens Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Cryptus pubescens Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 364 n. 4, ♂.

pulchripes Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Cryptus pulchripes Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 137 n. 9, ♀.

pullulator Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Cryptus pullulator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 367 n. 3, ♂.

pumilus Cress. — ♀ — Am.: Canada, Delaware.
Cryptus pumilus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 301 n. 16, ♀.

punctator Smith — ♀ — As.: Japonia.
Cryptus punctator Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 393 n. 5, ♀.

punctatorius Fabr.! — ♀ — Am. mer.
Cryptus punctatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 73 n. 15.
Ichneumon punctatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon punctatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 285.
Ichneumon punctatorius Trentepol, Isis 1829 p. 935 n. 50, ♀.

punctatus Ratzbg.[1]) — Eur.: Germania.
Cryptus punctatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 141 n. 6.

punctorius Fabr.! — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon punctorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 263 n. 40.
Ichneumon punctorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 153 n. 54.
Ichneumon punctorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2682 n. 104.
Ichneumon punctorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 176 n. 58.
Ichneumon punctorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 149 n. 65.
Cryptus punctorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 78 n. 32.
Ichneumon punctorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277.
Ichneumon punctorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 355.
Cryptus punctorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 964 n. 121, ♀.

pungens Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus pungens Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 505 n. 56, ♀.

punicus Cress. — ♀ ♂ — Am.: California, Washington, Vancouvers Island.
Cryptus punicus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 364, ♀ ♂.

purneri D. T. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus nigricornis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 201 [nec Brullé].
Cryptus nigricornis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 139 n. 21, ♂.
Cryptus nigricornis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 338 n. 21, ♂.
Cryptus Purneri m.

purpuratus Smith — As.: China.
Cryptus purpuratus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. P. 2. 1852 p. 33; T. 8 F. 2.

pusillus Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Cryptus pusillus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 302 n. 18, ♀.

quadriannulatus Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus quadriannulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 471 n. 37, ♀.
Cryptus quadriannulatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 74 n. 14, ♀.
Cryptus quadriannulatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 98, ♀.

recreator Fabr. — ♀ ♂ — Eur.: Austria.
Cryptus recreator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 85 n. 63.

---

1) *Hymen.*: Lophyrus pini (Ratzeburg).

Ichneumon recreator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 264.
Ichneumon recreator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 317.
Cryptus recreator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1012 n. 198, ♀.
Cryptus recreator Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 115 & 156 n. 2, ♀ ♂.
Cryptus recreator Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 232 n. 1, ♀ ♂.
Cryptus recreator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 99, ♀ & 106, ♂.

recticornis (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Phaeogenes recticornis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 42 n. 15, ♀ ♂.
Cryptus recticornis Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 186.

rectus (Prov.) Davis — ♂ — Am.: Canada.
Phygadeuon rectus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 178.
Phygadeuon rectus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 69 n. 5, ♂.
Phygadeuon rectus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 315 n. 5, ♂.
Cryptus ? rectus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 187.

relativus Cress. — ♀ — Am.: Albany.
Cryptus relativus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 359, ♀.

resolutus Cress. — ♂ — Am.: California.
Cryptus resolutus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 363, ♂.

restaurator Fabr.! — ♀ — Eur.: Dania.
Ichneumon restaurator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 333 n. 35.
Ichneumon restaurator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 426 n. 39.
Ichneumon restaurator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 263 n. 47.
Ichneumon restaurator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 161 n. 80.
Ichneumon restaurator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2685 n. 113.
Ichneumon restaurator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 41 n. 758, ♀.
Ichneumon restaurator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 354.
Ichneumon restaurator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 177 n. 66.
Ichneumon restaurator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 151 n. 76.
Cryptus restaurator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 83 n. 48.
Ichneumon restaurator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 63 n. 758.
Ichneumon restaurator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀.
Ichneumon restaurator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon restaurator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 300.
Ichneumon restaurator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 916 n. 59.
Cryptus restaurator Trentepol, Isis 1829 p. 838 n. 17, ♀.

retentor Brullé — ♀ — Am.: Carolina.
Cryptus retentor (Bosc) Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 192 n. 10, ♀.

rhodius D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Rhodus.
Cryptus australis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 116 n. 3, ♀ ♂ [non Guérin].
Cryptus australis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 100, ♀ & 105, ♂.
Cryptus australis Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894 p. 12.
Cryptus Rhodius m.

rhomboidalis Walsh — ♀ — Am.: Illinois.
Cryptus rhomboidalis Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 74, ♀.

robustus Rdw.! — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus robustus Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 283 n. 8, ♀ ♂.

robustus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Colorado.
Cryptus robustus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 289 n. 1, ♀.
Cryptus crassicornis Cresson, Proc. entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 292 n. 5, ♂.
Cryptus robustus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 265 n. 1, ♀.

Cryptus robustus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 72, ♀.
Cryptus robustus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 361 n. 30, ♀.
Cryptus robustus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 783 n. 30, ♀.

rubiginosus Tosqu. — ♂ — Afr.: Cap.
Cryptus rubiginosus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 198 n. 37, ♂.

rubricans Fonsc. — Eur.: Gallia.
Cryptus rubricans Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 389 n. 41.

rudowii Dest. — ♀ — Eur.: Sicilia.
Cryptus Rudowi Destefani, Natural. Sicil. V. 1886 p. 184 n. 196, ♀.

ruficeps Desv. — ♀ — Eur.: Britannia.
Cryptus ruficeps Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 55 n. 46, ♀.
Cryptus ruficeps Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 280 n. 52, ♀.

ruficornis Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus ruficornis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 139 n. 20, ♂.
Cryptus ruficornis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 338 n. 20, ♂.

rufifrons Walsh — ♀ — Am.: Illinois.
Cryptus rufifrons Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 75, ♀.

rufifrons Rdw.! — ♀ — Eur. mer.
Cryptus rufifrons Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 241 n. 16, ♀.

rufigaster Tosqu. — ♂ — Afr.: Scioa.
Cryptus rufigaster Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 207 n. 42, ♂.

rufoannulatus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Cryptus rufoannulatus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 202.
Cryptus rufoannulatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 136 n. 13, ♀ ♂.
Cryptus rufoannulatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 335 n. 13, ♀ ♂.

rufodorsatus Tosqu. — ♀ — Afr.: Marocco.
Cryptus rufodorsatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 181 n. 28, ♀.

rufolimbatus Tosqu. — ♀ — Afr.: Caffraria.
Cryptus rufolimbatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 200 n. 38, ♀.

rufoniger Desv. — ♀ — Eur.: Britannia.
Cryptus rufoniger Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 58 n. 57, ♀.
Cryptus rufoniger Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 281 n. 58, ♀.

rufus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Cryptus rufus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 202.
Mesostenus rufipes Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 249.
Cryptus rufus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 143 n. 30, ♀ ♂.
Cryptus rufus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 342 n. 30, ♀ ♂.

rusticator Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Cryptus rusticator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 368 n. 7, ♂.

samiae Pack.[1] — ♀ ♂ — Am.: Massachusetts.
Cryptus Samiae Packard, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. IX. 1865 p. 345, ♀ ♂.
Cryptus Samiae Riley, 4th Ann. Rep. Insect. Missouri 1872 p. 110 & 111; Fig. 40 & 41.
Cryptus Samiae Riley, General Index Rep. Insect. Missouri 1881 p. 52.
Cryptus Samiae Riederer, Journ. New York Microsc. Soc. VI. 1890 p. 99-101; T. 25.

sanderi D. T. — ♀ — Am.: Colorado.
Cryptus monticola Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 410, ♀ [nec Cameron].
Cryptus Sanderi m.

---

1) *Lep.:* Samia columbia (Packard).

saturniae Boie[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus saturniae Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 98 n. 28, ♀ ♂.
scaber Fonsc. — ♀ — Eur.: Gallia.
Cryptus scaber Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 387 n. 38, ♀.
schmuckii D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Cryptus longicaudus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 68 n. 38, ♀ [nec Kriechbaumer].
Cryptus Schmuckii m.
schoberi D. T. — ♀ — Am.: California.
Cryptus ferrugineus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 412, ♀ [non Smith].
Cryptus Schoberi m.
schoenachii D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Cryptus ferrugineus Smith, Descr. New Spec. Hymen. 1879 p. 231 n. 1, ♀ [non 1861].
Cryptus Schoenachii m.
schuleri D. T. — ♀ — As.: Java.
Cryptus tibialis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 70 n. 13, ♀ [nec Fonscolombe].
Cryptus Schuleri m.
scrutator Woldst. — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus scrutator Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 398 n. 24, ♀.
scutellatus Smith — ♀ — As.: Aru.
Cryptus scutellatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 170 n. 1, ♀.
segregatus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus segregatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 73 n. 50, ♂.
Cryptus segregatus Davis, Canad. Entomol. XXVII. 1895 p. 287.
semirufus Brullé — ♀ — Am. bor.
Cryptus semirufus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 195 n. 15, ♀.
senilis Rdw. — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus senilis Rudow, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 284 n. 9, ♂.
sericeifrons Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Cryptus sericeifrons Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 132 n. 3, ♀.
Cryptus sericeifrons Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 361 n. 3, ♂.
Cryptus sericeifrons Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 331 & 783 n. 3, ♂.
sericeus Fabr.! — Am.: Guadeloupe.
Ichneumon sericeus Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 189 n. 232.
Cryptus sericeus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 90 n. 90.
Ichneumon sericeator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 264.
Ichneumon sericeator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 317.
sericeus Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Cryptus sericeus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 63 n. 4, ♀.
sericeus (Prov.) Davis! — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Mesostenus sericeus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 264, ♂ [p. p., nec Taschbg].
Mesoleptus sericeus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 222 n. 1, ♀ ♂.
Mesoleptus sericeus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 395 n. 1, ♀ ♂.
Cryptus ? sericeus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 189.
seticornis Ratzbg.[2]) — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon (Cryptus) seticornis Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 27 n. 27; T. 6 F. 10.
Cryptus seticornis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 141 n. 8, ♀.
Cryptus seticornis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 138 n. 18.

---

1) *Lep.:* Saturnia carpini (Boie).
2) *Col.:* Hylotrupes bajulus (Ratzeburg).

severus Tosqu. — ♀ — Afr.: Togo.
Cryptus severus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 133 n. 3, ♀.
sicarius Smith — ♀ — As.: Batchian.
Cryptus sicarius Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 138 n. 1, ♀.
signatorius Fabr.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Ichneumon signatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 135 n. 14.
Cryptus signatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 71 n. 6.
Ichneumon signatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255.
Ichneumon signatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 295.
Ichneumon signatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 892 n. 25^{b}.
Cryptus bellosus Curtis, Brit. entom. XIV. 1837 p. 668, ♀.
Cryptus signatorius Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 480 n. 31, ♀.
Cryptus signatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 281 n. 59, ♀ ♂.
similis Cress. — ♀ — Am.: Delaware.
Cryptus similis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 299 n. 14, ♀.
Phygadeuon annulatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 179, ♀ [non Cresson].
Cryptus montivagus Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 12.
Cryptus montivagus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 139 n. 22, ♀.
Cryptus montivagus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 338 n. 22, ♀.
Phygadeuon fusiformis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 51 n. 49, ♀.
Phygadeuon fusiformis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 359.
simplex Tschek — ♂ — Eur.: Austria.
Cryptus simplex Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 127 n. 16, ♂.
Cryptus simplex Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 106, ♂.
smithii Pack.[2]) — ♀ ♂ — Am.: Massachusetts.
Cryptus Smithii Packard, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. IX. 1865 p. 346, ♀ ♂.
Cryptus Smithii Riley, 4th Ann. Rep. Insect. Missouri 1872 p. 111.
soccata Fonsc. — Eur.: Gallia.
Cryptus soccata Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 372 n. 17.
sodalis Cam. — Am.: Mexico.
Cryptus sodalis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 204 n. 6.
solabilis Cam. — ♀ — Am.: Panama.
Cryptus solabilis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 206 n. 15, ♀; T. 9 F. 15.
sordidus Tschek — ♀ — Eur.
Cryptus sordidus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 409 n. 6, ♀.
Goniocryptus sordidus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 333, ♀.
Cryptus sordidus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 103, ♀.
soriculatus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus soriculatus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1881 p. 362 n. 31, ♂.
Cryptus soriculatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 784 n. 31, ♂.
soror Cress. — ♂ — Am.: Delaware.
Cryptus soror Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 296 n. 10, ♂.
Phygadeuon similaris Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 57 n. 60, ♂.
soror Trent.! — ♀ — Am. mer.
Cryptus capitator var. Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 82 n. 44, ♀.
Cryptus soror Trentepol, Isis 1829 p. 843, ♀.
sororius Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Cryptus sororius Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 159, ♂.

---

1) *Hymen.:* Osmia bidentata (Giraud). — *Lep.:* Spilonema troglodytes (Bignell).
2) *Lep.:* Samia columbia (Packard).

speciosus Tosqu. — ♀ — Afr.: Algeria.
Cryptus speciosus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 190 n. 33, ♀.
spinatorius Fabr.! — ♀ ♂ — Am. mer.
Cryptus spinatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 74 n. 16.
Ichneumon spinatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253.
Ichneumon spinatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 288.
Cryptus spinatorius Trentepol, Isis 1829 p. 851 n. 27, ♀ ♂.
spinosus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Gallia.
Cryptus spinosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 558 n. 95, ♀ ♂.
Cryptus spinosus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 312 n. 6; T. 2 F. 3.
Cryptus spinosus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 377 n. 23, ♀ ♂.
Cryptus spinosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 84 n. 44, ♀.
Cryptus spinosus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 482 n. 11.
Cryptus spinosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 332, ♀.
Cryptus spinosus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 278 n. 28, ♀ ♂.
Cryptus spinosus Holmgren, Entom. Tidskr. VII. 1886 p. 24 n. 13.
Cryptus spinosus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 101, ♀ & 105, ♂.
Cryptus spinosus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2353 n. 11, ♀ ♂.
spiralis (Fourcr.) Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Linné, Acta Upsal. 1736 p. 50 n. 21.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 339 n. 42, ♀.
Ichneumon spiralis Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 407 n. 42, ♀.
Ichneumon spiralis Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 212 n. 20.
Cryptus inconspicuus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 447 n. 18, ♂.
Cryptus spiralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 454 n. 23, ♀ [excl. ♂].
Cryptus spiralis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 278 n. 4, ♀ [excl. ♂].
Cryptus spiralis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 365 n. 5, ♀.
Cryptus spiralis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 71 n. 5, ♀ ♂.
Cryptus spiralis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 237 n. 5, ♀ ♂.
Cryptus spiralis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 277 n. 4, ♀ ♂.
Cryptus spiralis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 98, ♀ & 105, ♂.
spoliator Smith — ♀ — As.: Celebes.
Cryptus spoliator Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 61 n. 2, ♀.
sponsor Fabr. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon LXI Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768; T. 119 F. 4.
Ichneumon sponsor Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 153 n. 84.
Ichneumon sponsor Schrökenstein, Verz. d. Halbkäfer etc. 1802 p. 26 n. 75.
Cryptus sponsor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 83 n. 50.
Ichneumon regenerator Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 125.
Ichneumon sponsor Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 112, ♀.
Ichneumon sponsor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
Ichneumon sponsor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 296.
Cryptus sponsor Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 104.
Cryptus quadrilineatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 535 n. 81, ♂.
Cryptus sponsor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 554 n. 93, ♀.
Ichneumon sponsor Trentepol, Isis 1829 p. 940 n. 54, ♀.
Cryptus quadrilineatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 285 n. 24, ♂.
Cryptus sponsor Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 288 n. 31.
Cryptus sponsor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 139 n. 28, ♀.
Cryptus attentorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 79 n. 32, ♂ [excl. ♀].
Cryptus sponsor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 85 n. 47, ♀.

Cryptus sponsor Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 118 n. 7, ♀ ♂.
Cryptus sponsor Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 480 n. 7, ♀ ♂.
Cryptus sponsor Gerstaecker, Greenland: 2. deutsch. Nordpolfahrt II. 1. 1874 p. 404 n. 2, ♀.
Cryptus sponsor Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 9, ♂; T. 6 F. 6.
Cryptus sponsor Woldstedt, Horae soc. entom. Ross. XVI. 1881 p. 62, ♀.
Cryptus sponsor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 332, ♀.
Cryptus sponsor Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 278 n. 30, ♀.
Cryptus sponsor Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 21 n. 8.
Cryptus sponsor Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 100, ♀ & 106, ♂.
Cryptus sponsor Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2351 n. 7, ♂.

var. **filicornis** Ratzbg. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Cryptus filicornis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 141 n. 7, ♀.
Cryptus sponsor var filicornis Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 39 n. 30, ♀.

var. **leucostomus** Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus leucostomus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 531 n. 78, ♂.
Cryptus leucostomus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 140 n. 3, ♀.
Cryptus sponsor var. leucostomus m.

var. **spectator** Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus spectator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 529 n. 76, ♂.
Cryptus sponsor var. spectator m.

var. **stenogaster** Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus stenogaster Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 529 n. 77, ♂.
Cryptus sponsor var. stenogaster m.

striatellus Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Cryptus striatellus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 370 n. 15, ♂.

striatus Brullé — ♀ — Patria?
Cryptus striatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 197 n. 18, ♀.

subargenteus Cress. — ♀ — Am.: Pennsylvania.
Cryptus subargenteus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 302 n. 17, ♀.

subclavatus Say — ♀ — Am.: United States.
Cryptus subclavatus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 237 n. 12, ♀.
Cryptus subclavatus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 693 n. 12, ♀.

subgracilis Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Cryptus subgracilis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 303 n. 20, ♀.

subquadratus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cryptus subquadratus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 478 n. 4.
Cryptus subquadratus Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 20 n. 4.
Cryptus subquadratus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 98, ♀.
Cryptus subquadratus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2115 n. 4, ♂.
Cryptus subquadratus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2349 n. 4, ♀ ♂.

surrilis Tosqu. — ♂ — Afr.: Senegal.
Cryptus surrilis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 177 n. 26, ♂.

sutor Fabr.! — ♀ — Am. mer.
Cryptus sutor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 80 n. 40.
Ichneumon sutor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon sutor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 306.
Cryptus sutor Trentepol, Isis 1829 p. 855 n. 31, ♀.

tantillus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Cryptus tantillus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 134 n. 2, ♂.

tarsatus Smith — ♂ — As.: Mysol.
Cryptus tarsatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 7 n. 3, ♂.

speciosus Tosqu. — ♀ — Afr.: Algeria.
Cryptus speciosus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 190 n. 33, ♀.
spinatorius Fabr.! — ♀ ♂ — Am. mer.
Cryptus spinatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 74 n. 16.
Ichneumon spinatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253.
Ichneumon spinatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 288.
Cryptus spinatorius Trentepol, Isis 1829 p. 851 n. 27, ♀ ♂.
spinosus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Gallia.
Cryptus spinosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 558 n. 95, ♀ ♂.
Cryptus spinosus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 312 n. 6; T. 2 F. 3.
Cryptus spinosus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 377 n. 23, ♀ ♂.
Cryptus spinosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 84 n. 44, ♀.
Cryptus spinosus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 482 n. 11.
Cryptus spinosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 332, ♀.
Cryptus spinosus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 278 n. 28, ♀ ♂.
Cryptus spinosus Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 24 n. 13.
Cryptus spinosus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 101, ♀ & 105, ♂.
Cryptus spinosus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2353 n. 11, ♀ ♂.
spiralis (Fourcr.) Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Linné, Acta Upsal. 1736 p. 50 n. 21.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 339 n. 42, ♀.
Ichneumon spiralis Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 407 n. 42, ♀.
Ichneumon spiralis Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 212 n. 20.
Cryptus inconspicuus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 447 n. 18, ♂.
Cryptus spiralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 454 n. 23, ♀ [excl. ♂].
Cryptus spiralis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 278 n. 4, ♀ [excl. ♂].
Cryptus spiralis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 365 n. 5, ♀.
Cryptus spiralis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 71 n. 5, ♀ ♂.
Cryptus spiralis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 237 n. 5, ♀ ♂.
Cryptus spiralis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 277 n. 4, ♀ ♂.
Cryptus spiralis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 98, ♀ & 105, ♂.
spoliator Smith — ♀ — As.: Celebes.
Cryptus spoliator Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 61 n. 2, ♀.
sponsor Fabr. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon LXI Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768; T. 119 F. 4.
Ichneumon sponsor Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 153 n. 84.
Ichneumon sponsor Schrökenstein, Verz. d. Halbkäfer etc. 1802 p. 26 n. 75.
Cryptus sponsor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 83 n. 50.
Ichneumon regenerator Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 125.
Ichneumon sponsor Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 112, ♀.
Ichneumon sponsor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
Ichneumon sponsor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 296.
Cryptus sponsor Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 104.
Cryptus quadrilineatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 535 n. 81, ♂.
Cryptus sponsor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 554 n. 93, ♀.
Ichneumon sponsor Trentepol, Isis 1829 p. 940 n. 54, ♀.
Cryptus quadrilineatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 285 n. 24, ♂.
Cryptus sponsor Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 288 n. 31.
Cryptus sponsor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 139 n. 28, ♀.
Cryptus attentorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 79 n. 32, ♂ [excl. ♀].
Cryptus sponsor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 85 n. 47, ♀.

Cryptus sponsor Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 118 n. 7, ♀ ♂.
Cryptus sponsor Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 480 n. 7, ♀ ♂.
Cryptus sponsor Gerstaecker, Greenland: 2. deutsch. Nordpolfahrt II. 1. 1874 p. 404 n. 2, ♀.
Cryptus sponsor Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 9, ♂; T. 6 F. 6.
Cryptus sponsor Woldstedt, Horae soc. entom. Ross. XVI. 1881 p. 62, ♀.
Cryptus sponsor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 332, ♀.
Cryptus sponsor Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 278 n. 30, ♀.
Cryptus sponsor Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 21 n. 8.
Cryptus sponsor Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 100, ♀ & 106, ♂.
Cryptus sponsor Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2351 n. 7, ♂.

var. **filicornis** Ratzbg. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Cryptus filicornis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 141 n. 7, ♀.
Cryptus sponsor var filicornis Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 39 n. 30, ♀.

var. **leucostomus** Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus leucostomus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 531 n. 78, ♂.
Cryptus leucostomus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 140 n. 3, ♀.
Cryptus sponsor var. leucostomus m.

var. **spectator** Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus spectator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 529 n. 76, ♂.
Cryptus sponsor var. spectator m.

var. **stenogaster** Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus stenogaster Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 529 n. 77, ♂.
Cryptus sponsor var. stenogaster m.

striatellus Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Cryptus striatellus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 370 n. 15, ♂.

striatus Brullé — ♀ — Patria?
Cryptus striatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 197 n. 18, ♀.

subargenteus Cress. — ♀ — Am.: Pennsylvania.
Cryptus subargenteus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 302 n. 17, ♀.

subclavatus Say — ♀ — Am.: United States.
Cryptus subclavatus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 237 n. 12, ♀.
Cryptus subclavatus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 693 n. 12, ♀.

subgracilis Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Cryptus subgracilis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 303 n. 20, ♀.

subquadratus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cryptus subquadratus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 478 n. 4.
Cryptus subquadratus Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 20 n. 4.
Cryptus subquadratus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 98, ♀.
Cryptus subquadratus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2115 n. 4, ♂.
Cryptus subquadratus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2349 n. 4, ♀ ♂.

surrilis Tosqu. — ♂ — Afr.: Senegal.
Cryptus surrilis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 177 n. 26, ♂.

sutor Fabr.! — ♀ — Am. mer.
Cryptus sutor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 80 n. 40.
Ichneumon sutor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon sutor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 306.
Cryptus sutor Trentepol, Isis 1829 p. 855 n. 31, ♀.

tantillus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Cryptus tantillus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 134 n. 2, ♂.

tarsatus Smith — ♂ — As.: Mysol.
Cryptus tarsatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 7 n. 3, ♂.

tarsoleucus (Schrk.) Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon tarsoleucus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 359 n. 725, ♂.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 62 n. 216.
Ichneumon tarsoleucus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 181 n. 139.
Ichneumon leucotarsus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2696 n. 163.
Ichneumon leucopus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2700 n. 281.
Ichneumon compunctator Panzer & Kob, Wurmtrockniss 1802 p. ?; T. 2 F. 2 (♂) & 3 (♀).
Cryptus compunctator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 287.
Cryptus tarsoleucus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 698.
Cryptus tarsoleucus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 447 n. 19, ♀ ♂.
Cryptus tarsoleucus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 277 n. 2, ♀ ♂.
Cryptus tarsoleucus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 367 n. 1, ♀ ♂.
Cryptus tarsoleucus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 312 n. 2.
Cryptus tarsoleucus Imhof & Labram, Insect. d. Schweiz V. 1848; T. 60 F. 1 (♀) & 2 (♂).
Cryptus tarsoleucus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 364 n. 3, ♂.
Cryptus tarsoleucus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 135 n. 4, ♀.
Cryptus tarsoleucus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 71 n. 7, ♀ ♂.
Cryptus tarsoleucus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 479 n. 5, ♀ ♂.
Cryptus tarsoleucus Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 9, ♂; T. 6 F. 3.
Cryptus tarsoleucus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 332, ♂.
Cryptus tarsoleucus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 277 n. 8, ♀ ♂.
Cryptus tarsoleucus Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 20 n. 5.
Cryptus tarsoleucus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 98, ♀ & 104, ♂.
Cryptus tarsoleucus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2350 n. 5.

taschenbergii D. T. — ♂ — As.: Java.
Cryptus laticeps Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 68 n. 11, ♂ [non Cresson].
Cryptus Taschenbergii m.

tejonensis Cress. — ♀ — Am.: California.
Cryptus Tejonensis Cresson, Proc. Acad. Sc. Philadelphia 1878 p. 360, ♀.

tenellus Say — ♀ — Am.
Cryptus tenellus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 233 n. 5, ♀.
Cryptus tenellus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 690 n. 5, ♀.

tenerrimus D. T. — ♂ — Afr.: Cap.
Cryptus tenellus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 196 n. 36, ♂ [non Say].
Cryptus tenerrimus m.

tenuiventris Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Cryptus tenuiventris Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 134 n. 3, ♂.

texensis Ashm. — ♂ — Am.: Texas.
Cryptus Texensis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 410, ♂.

tibialis Fonsc. — Eur.: Gallia.
Cryptus tibialis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 388 n. 39.

tibiator Grav. — ♂ — Eur.: Britannia.
Cryptus tibiator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 539 n. 84, ♂.
Cryptus tibiator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 93 n. 66, ♂.
Cryptus tibiator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 280 n. 41, ♂.

tinctorius Grav. — ♂ — Eur.: Britannia.
Cryptus tinctorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 509 n. 60, ♂.
Cryptus tinctorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 98 n. 80, ♂.

---

1) *Lep.:* Trachea piniperda (Ratzeburg), Charipters viridana Walsh (Mocsáry).

Cryptus tinctorius Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 281 n. 46, ♂.
Cryptus ? tinctorius Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.

tornator Fabr.! — Am. mer.
Cryptus tornator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 81 n. 42.
Ichneumon tornator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258.
Ichneumon tornator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 304.
Cryptus tornator Trentepol, Isis 1829 p. 844 n. 22, ♀.

tosquinetii D. T. — ♀ ♂ — Afr.: Cap, Caffaria.
Cryptus lugubris Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 131 n. 2, ♀ ♂ [non Gravenhorst].
Cryptus Tosquinetii m.

transversus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Cryptus transversus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 136 n. 6, ♀.

trepidus Tosqu. — ♀ — Afr.: Scioa.
Cryptus trepidus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 167 n. 21, ♀.

triannulatus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus triannulatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 74 n. 51, ♂.

triannulatus (Prov.) Davis! — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon triannulatus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 355 n. 34, ♀.
Phygadeuon triannulatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 777 n. 34, ♀.
Cryptus ? triannulatus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 187.

tricolor Brullé — ♂ — As.: India.
Cryptus tricolor Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 195 n. 16, ♂.

trifasciatus Taschbg. — ♀ — As.: Java.
Cryptus trifasciatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 69 n. 12, ♀.

triguttatus Grav. — ♂ — Eur.: Austria, Italia.
Cryptus triguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 528 n. 75, ♂.
Cryptus triguttatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 85 n. 46, ♂.
Cryptus triguttatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 105, ♂.

tripunctator Fabr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon XXXII & XXXIII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 61 F. 8 & 9.
Ichneumon tripunctator Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 226 n. 135-136.
Ichneumon tripunctator Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. I. 1799 p. 17; T. 3 T. 10.
Cryptus tripunctator Fabricius, Syst. Piez. 1801 p. 86 n. 67.
Ichneumon tripunctator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 272.
Ichneumon tripunctator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 341.
Cryptus tripunctator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1054 n. 270.

tuberculatus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Cryptus tuberculatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 501 n. 53, ♀.
Cryptus tuberculatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 283 n. 18.
Cryptus tuberculatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 83 n. 41, ♀.
? Cryptus investigator Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 123 n. 11, ♀ ♂.
Cryptus tuberculatus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 485 n. 16, ♀ ♂.
Cryptus tuberculatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 279 n. 26, ♀.
Cryptus tuberculatus Holmgren, Entom. Tidsskr. VIII. 1886 p. 25 n. 17.
Cryptus tuberculatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 101, ♀ & 107, ♂.
Cryptus tuberculatus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2354 n. 16, ♀ ♂.

tuberculipes Rdw. — ♀ — Eur.: Alpes.
Cryptus tuberculipes Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 115, ♀.

tumidus Desv. — ♀ — Eur.: Britannia.
Cryptus tumidus Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 56 n. 47, ♀.
Cryptus tumidus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 278 n. 53, ♀.

turbatus Cress. — ♀ — Am.: California.
Cryptus turbatus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 363, ♀.
turcestanicus Kriechb. — ♂ — As.: Turcestania.
Cryptus Turcestanicus Kriechbaumer, Termész. Füzet. VI. 1882 p. 150 n. 14, ♂.
ultimus Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Cryptus ultimus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 305 n. 22, ♀.
Cryptus ultimus Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 83, ♀.
umbratus Fabr.![1]) — Eur.: Germania.
Ichneumon umbratus Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 229 n. 207-208.
Cryptus umbratus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 89 n. 85.
Ichneumon umbrator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273.
Ichneumon umbrator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 342.
unifasciatus Cam. — ♀ — Am.: Panama.
Cryptus unifasciatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 206 n. 16, ♀.
vancouverensis Harrgt. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Cryptus Vancouverensis Harrington, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 211, ♀.
variator Walk. — ♀ — As.: Japonia.
Cryptus variator Walker, Cistula entom. P. 11. 1874 p. 304 n. 6, ♀.
variegatus Smith — ♀ — As.: Celebes.
Cryptus variegatus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 61 n. 4, ♀.
velox Cress. — ♀ — Am.: Canada, New York.
Cryptus velox Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 293 n. 6, ♀.
Cryptus Quebecensis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 179.
Cryptus velox Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 132 n. 2, ♀.
Cryptus velox Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 330 n. 2, ♀.
verticalis Bingh. — As.: Philippines.
Cryptus verticalis Bingham, Ann. & Mag. Nat. Hist. XVI. 1895 p. 444.
victoriensis Harrgt. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Cryptus Victoriensis Harrington, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 211, ♀.
viduatorius Fabr.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Cryptus viduatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 70 n. 2, ♀.
Ichneumon viduatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀.
Ichneumon viduatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
Ichneumon viduatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 295.
Cryptus viduatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 700, ♀ ♂.
Cryptus viduatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 476 n. 40, ♀ ♂.
Cryptus viduatorius Trentepol, Isis 1829 p. 839 n. 18, ♀.
Cryptus viduatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 280 n. 11, ♀ ♂.
Cryptus viduatorius W. Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV. 1837 p. 259 n. 359.
Cryptus viduatorius Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 58.
Cryptus viduatorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 367 n. 7, ♂.
Cryptus viduatorius Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 94 n. 25, ♀.
Cryptus viduatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 70 n. 2, ♀ ♂.
Cryptus viduatorius Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 479 n. 6, ♀ ♂.
Cryptus viduatorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 9, ♀; T. 6 F. 5.
Cryptus viduatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 332, ♀.
Cryptus viduatorius Bridgman & Fitch, Entomologist. XV. 1882 p. 278 n. 1, ♀ ♂.
Cryptus viduatorius Holmgren, Entom. Tidskr. VII. 1886 p. 21 n. 7.

---

1) = ? Spathius rubidus (Rossi).

2) *Lep.:* Eupithecia oxycedrata (Giraud). — *Col.:* Saperda populnea (Mocsáry).

Cryptus viduatorius Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 97, ♀ & 104, ♂.
Cryptus viduatorius Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2351 n. 6, ♂.

violaceipennis Brullé — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Cryptus violaceipennis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 190 n. 6, ♀.
Cryptus violaceipennis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 67 n. 9, ♂.

vittatus Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Senegal, Guinea, Cap, Delagoa Bay.
Cryptus vittatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 148 n. 11, ♀ ♂.

volatilis Smith — ♀ — As.: Mysol.
Cryptus volatilis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VII. 1863 p. 7 n. 2, ♀.

xanthomerus Brullé — ♀ — Am. mer.
Cryptus xanthomerus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 189 n. 4, ♀.

xanthopus Brullé — ♀ — Afr.: Cap.
Cryptus xanthopus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 194 n. 13, ♀.
Cryptus xanthopus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 130 n. 1.

xanthostigma Brullé — ♀ — Am.: Mexico.
Cryptus xanthostigma Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 190 n. 7, ♀.
Cryptus xanthostigma Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 207 n. 17; T. 9 [F. 14.

xylocopae Rond.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Italia.
Cryptus xylocopae Rondani, Bull. soc. entom. Ital. VI. 1874 p. 103-105 & 134 n. 27 [s. descr.].
Cryptus xylocopae Rondani, Bull. soc. entom. Ital. IX. 1877 p. 177 n. 15, ♀ ♂.

zoesmairi D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Cryptus scutellatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 69 n. 39, ♀ [nec Smith, nec Provancher 1877].
Cryptus ornatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 63 n. 39.
Cryptus Zoesmairi m.

zonatus Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Cryptus zonatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 144 n. 9, ♀.

zygaenarum Ratzbg.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus zygaenarum Ratzeburg, Stettin. entom. Zeitg. VIII. 1847 p. 59 n. 5.
Cryptus zygaenarum Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 97 n. 26, ♀ ♂.

GORYPHUS

Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 398.
Etymol. obscura.

Synon.: Cryptus Brullé.

Subg.: Psacus Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 400.
Etymol. obscura.

apicalis Holmgr. — ♀ — As.: Philippines.
Goryphus apicalis Holmgren, Eugenies Resa. Insect, 1868 p. 399 n. 17, ♀.

areolaris Holmgr. — ♀ — Afr.: Cap.
Goryphus (Psacus) areolaris Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 400 n. 20, ♀.

basilaris Holmgr. — ♀ — As.: China.
Goryphus basilaris Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 398 n. 15, ♀; T. 8 F. 2.

detritus Holmgr. — ♀ — As.: China.
? Cryptus mesoxanthus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 196 n. 17, ♀.
Goryphus detritus Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 399 n. 16, ♀.

rubripes Holmgr. — ♀ — Am.: Valparaiso.
Goryphus rubripes Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 399 n. 19, ♀.

---

1) *Hymen.:* Xylocopa ramulorum (Rondani).

2) *Lep.:* Zygaena filipendulae (Ratzeburg), Z. onobrychis (Giraud).

ruficollis Holmgr. — ♀ ♂ — As.: Java.
Goryphus ruficollis Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 399 n. 18, ♀ ♂.
virginalis Holmgr. — ♀ — Afr.: Cap.
Goryphus (Psacus) virginalis Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 401 n. 21, ♀.

MERINGOPUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 186 n. 4.
μῆριγξ, crinis hirsutus; *πούς*, pes.
Species exstat.

MANSA

Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 209.
Etymol. obscura.

singularis Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Guinea.
Mansa singularis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 210, ♀ ♂.

DISTANTELLA

Saussure, Distant: Natural. Transvaal 1892 p. 229.
Distant, nom. propr.

trinotata Sauss. — Afr.: Transvaal.
Distantella trinotata Saussure, Distant: Natural. Transvaal 1892 p. 230.

OPISOXESTUS

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 40.
ὀπίσω, retrorsum; Xestus, nom. propr. Hymen.

ferrugineus Ashm. — Patria?
Opisoxestus ferrugineus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 40 [s. descr.].

METARHYSSA

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 40.
μετά, inter; Rhyssa, nom. propr. Hymen.

bifasciata Ashm. — Patria?
Metarhyssa bifasciata Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 40 [s. descr.].

ZONOCRYPTUS

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 40.
ζώνη, balteus; Cryptus, nom. propr. Hymen.

sphingis Ashm. — Patria?
Zonocryptus sphingis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 40 [s. descr.].

MEGAPLECTES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 186 n. 6.
μέγας, grandis; *πλήκτης*, percussor.

Synon.: Jocryptus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 470.
Jo = Juno; Cryptus, nom. propr. Hymen.
Cryptus Wesmael, Bridgman & Fitch.
Ichneumon Gravenhorst, Stephens.
Phygadeuon Taschenberg.

monticola (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia.
Ichneumon monticola Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 108 n. 1, ♂.
Ichneumon monticola Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 6 n. 1.
Ichneumon monticola Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 127 n. 1, ♂.
Cryptus monticola Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VIII. P. 1. 1840 p. 360, ♂.
Ichneumon monticola Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. ? n. 1, ♀.
Cryptus monticola Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 [Rem.] p. 9 n. 1, ♀♂.
Phygadeuon regius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 53 n. 89, ♀.
Phygadeuon monticola Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 229 n. 1.
Jocryptus regius Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 473 n. 1, ♀ ♂.
Cryptus monticola Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 277 n. 6, ♀ ♂.
Jocryptus monticola Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1887 p. 17 n. 1, ♀ ♂.
Jocryptus regius Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1236 n. 1.
Megaplectes monticola Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 87.
Jocryptus monticola Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1896 p. 2115 n. 1.
Jocryptus monticola Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2347 n. 1, ♀ ♂.

JOPPIDIUM

Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 69.
Joppa, nom. propr. Hymen.; εἶδος, visus.

Synon.: Banchus Say.
Cryptus Brullé.

annulicorne Ashm. — ♂ — Am.: California.
Joppidium annulicorne Ashmead, Proc. Californ. Acad. V. 1895 p. 549 n. 23, ♂.
apicale Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Joppidium apicale Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 160, ♀.
ardens Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Joppidium ardens Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 139 n. 2, ♀ ♂.
caeruleipenne Cam. — ♀ ♂ — Am.: Panama. [T. 9 F. 17.
Joppidium coeruleipenne Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 211 n. 4, ♀♂;
donabile Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Joppidium donabilis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 139 n. 3, ♀ ♂.
dubiosum Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Joppidium dubiosum Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 138 n. 1, ♀ ♂.
fuscipenne (Brullé) Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Cryptus fuscipennis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 189 n. 5, ♀.
Joppidium fuscipenne Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 211 n. 7.
rubripes Cress. — ♀ ♂ — Am.: Texas.
Joppidium rubripes (Walsh) Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 160, ♀ ♂.
ruficeps Walsh — ♀ — Am. bor.
? Banchus aequatus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 247 n. 2.
? Banchus aequatus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 701 n. 2.
Joppidium ruficeps Walsh, Trans. Acad. Sc. St. Louis III. P. 1. 1873 p. 70, ♀.
ruficolle Cam. — ♀ ♂ — Am.: Mexico, Guatemala. [T. 9 F. 16.
Joppidium ruficolle Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 210 n. 3, ♀ ♂;
yucatanense Cam. — ♀ — Am.: Mexico. [T. 9 F. 18.
Joppidium Yucatanense Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 211 n. 6, ♀;

OSPRYNCHOTUS

Spinola, Magas. de zool. XI. 1841 P. 45.
ὄσπριον, faba (*ὥσπερ*, propemodum); *ῥυγχωτύς*, rostratus.

Synon.: Acrorhicnus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 92 n. 10 [Acroricnus].
ἄκρον, metathorax; *ῥικνός*, rugosus.
Linoceras Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 105 n. 5.
λίνον, linum; *κέρας*, cornu.
Macrobatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 50.
μακρός, longus; *βαίνω*, gradior.
Xenodocon Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XII. 1855 p. 237.
χένος, hospes; *δέχομαι*, accipio.

Atractodes Provancher.
Bassus Fabricius.
Cryptus Gravenhorst.
Ichneumon Fabricius & auct. ant.

capensis Spin. — ♀ ♂ — Afr. mer. [3-5 (♀).
Osprynchotus Capensis Spinola, Magas. de zool. XI. 1841 P. 75, ♀♂; T. 75 F. 1 & 2 (♂) &
Osprynchotus Capensis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 134 n. 1, ♀.
Osprynchotus Capensis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 244 n. 1, ♀ ♂.
cloutieri (Prov.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Atractodes Cloutieri Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 150.
Linoceras Cloutieri Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 110, ♀ ♂; Fig. 2b.
Linoceras Cloutieri Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 343, ♀♂; Fig. 35a b.
Osprynchotus Cloutieri m.
edwardsii (Cress.) D. T. — ♂ — Am.: California.
Linoceras Edwardsii Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 365, ♂.
Osprynchotus Edwardsii m.
elegans Mocs. — ♀ — As.: Caucasus.
Osprynchotus elegans Mocsáry, Magy. Akad. Termész. Értek. XIII. P. 11. 1883 p. 11 n. 13, ♀.
flavipes Brullé — ♀ ♂ — Afr.: Senegal.
Osprynchotus flavipes Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 135 n. 2, ♀.
Osprynchotus flavipes Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 255 n. 1, ♀ ♂.
Osprynchotus flavipes Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 302 n. 8, ♂.
Osprynchotus flavipes Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 246 n. 2, ♀ ♂.
gigas Kriechb. — ♀ — Afr.: Mossambique.
Osprynchotus gigas Kriechbaumer, Mem. accad. sc. Bologna (5) IV. 1894 p. 152, ♀.
heros Schlett. — ♀ ♂ — Afr.: Congo.
Osprynchotus heros Schletterer, Ann. soc. entom. Belgique XXXV. 1891 p. 33, ♀.
Osprynchotus heros Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 248 n. 3, ♀ ♂.
macrobatus (Grav.) Kriechb.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon moschator var. Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 179 n. 135.
Ichneumon moschator var. Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1892 p. 188 n. 122.
Cryptus macrobatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 440 n. 15, ♀ ♂.
Cryptus macrobatus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 368 n. 5, ♀ ♂.
Acroricnus Schaumii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 92, ♂; Fig.
Macrobatus clavator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 50.

---

1) *Hymen.:* Eumenes coarctatus (Ratzeburg), Osmia adunca (Bridgman).

Linoceras macrobatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 106 n. 1, ♀♂.
Linoceras macrobatus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 475 n. 1, ♀ ♂.
Linoceras macrobatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 9, ♀ ♂; T. 6 F. 1.
Cryptus (Osprynchotus) macrobatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 221-226 & 251.
Linoceras macrobatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 331, ♀.
Linoceras macrobatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 36, ♀ ♂.
Macrobatus clavator Holmgren, Entom. Tidskr. VII. 1887 p. 18, ♀ ♂.
Osprynchotus macrobatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 88.
Linoceras macrobatus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2347 n. 1.

var. **exannulatus** (Kriechb.) D. T. — ♀ — Eur.: Littorale.
Linoceras macrobatus var. exannulata Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola [1894 p. 17, ♀.
Osprynchotus macrobatus var. exannulatus m.

melanoleucus (Grav.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus melanoleucus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 489 n. 46, ♀.
Linoceras melanoleucus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 106 n. 3, ♀.
Osprynchotus melanoleucus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 87.

seductor (Scop.) Schmkn.[1]) — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Ichneumon seductor Scopoli, Delic. faun. & flor. Insubr. I. 1786 p. 57; T. 23 F. A B C 1-4 a-e.
Ichneumon seductor Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2678 n. 221.
Ichneumon seductor Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 45 n. 770.
Ichneumon seductorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 139 n. 28.
Ichneumon seductorius Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. I. 1799 p. 17; T. 4 F. 1.
Ichneumon seductorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 51 n. 12.
Bassus seductorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 94 n. 4.
Ichneumon seductor Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 68 n. 770.
Cryptus seductorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 287.
Ichneumon seductorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255.
Ichneumon seductorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 293.
Cryptus seductorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 485 n. 45, ♀ ♂.
Cryptus seductorius Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 329 n. 389. [F. 1.
Ichneumon (Cryptus) seductor Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3a Insect. II. 1849; T. 111
Cryptus seductorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 368 n. 9, ♀♂.
Xenodocon ruficornis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XII. 1855 p. 237 n. 9, ♀.
Linoceras seductorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 106 n. 2, ♀♂.
Xenodocon ruficornis Mocsáry, Entom. Nachr. V. 1879 p. 11.
Osprynchotus seductorius Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 88.
Linoceras seductorius Magretti, Ann. mus. civ. Genova XXIX. 1890 p. 530 n. 17, ♂.

syriacus Mocs. — ♂ — As.: Syria.
Osprynchotus Syriacus Mocsáry, Magy. Akad. Termész. Értek. XIII. P. 11. 1883 p. 12 n. 14, ♂.

testaceoniger (Taschbg.) D. T. — ♂ — Am.: Brasilia.
Linoceras testaceonigrum Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 73 n. 2, ♂.
Osprynchotus testaceoniger m.

testaceus (Taschbg.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia, Venezuela.
Linoceras testaceum Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 71 n. 1, ♀♂.
Osprynchotus testaceus m.

thoracicus (Taschbg.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Linoceras thoracicum Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 74 n. 3, ♀.
Osprynchotus thoracicus m.

---

1) *Hymen.:* Sceliphron destillatorius (Mocsáry).

TRYCHOSIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 187 n. 9.
τρύχωσις, absumtio.

Synon.: Goniocryptus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 471.
γόνιος, fecundus; Cryptus, nom. propr. Hymen.

Cryptus Fabricius & auct. ant.
Ichneumon Linné & auct. ant.

abnormis (Tschek) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Austria.
Cryptus abnormis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 146 n. 39, ♀ ♂ & p. 419 n. 16, ♀.
Trychosis abnormis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 115, ♀ & 117, ♂.

ambigua (Tschek) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Austria.
Cryptus ambiguus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 145 n. 37, ♀ ♂ & p. 419 n. 14, ♂.
Trychosis ambigua Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 114, ♀ & 116, ♂.

annulicornis (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Goniocryptus annulicornis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2357 n. 2b, ♀.
Trychosis annulicornis m.

annulitarsis (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cryptus neglectus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 149 n. 44, ♀ ♂ [p. p.].
Goniocryptus annulitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 492 n. 2, ♀.
Goniocryptus annulitarsis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 333, ♂.
Goniocryptus annulitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2357 n. 2, ♀ ♂.
Trychosis annulitarsis m.

castaneiventris (Tschek) Schmkn. — ♀ — Eur.: Austria inf.
Cryptus castaniventris Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 151 n. 47, ♀.
Trychosis castaniventris Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 116, ♀.

clypearis (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Dania, Suecia. [♀ ♂ [p. p.].
Cryptus plebejus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 147 n. 40 & p. 419 n. 17,
Goniocryptus clypearis Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 494 n. 6, ♀ ♂.
Goniocryptus clypearis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 333, ♀.
Goniocryptus clypearis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2359 n. 6, ♀ ♂.
Trychosis clypearis m.

curvipes (Tschek) Schmkn. — ♀ — Eur.: Austria inf.
Cryptus curvipes Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 152 n. 49, ♀.
Trychosis curvipes Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 116, ♀.

fibulata (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cryptus fibulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 446 n. 17, ♂.
Cryptus fibulatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 363 n. 2, ♂.
Cryptus fibulatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 73 n. 10, ♂.
Goniocryptus ? fibulator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
Cryptus fibulatus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2350 n. 5, ♀ ♂.
Trychosis fibulator m.

glabricula (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Goniocryptus glabriculus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 491 n. 1, ♀ ♂.
Goniocryptus glabriculus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2357 n. 1.
Trychosis glabriuscula m.

gradaria (Tschek) Schmkn. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Cryptus gradarius Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 151 n. 48 & p. 424 n. 22, ♀.
Trychosis gradaria Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 115, ♀.

ingrata (Tschek) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.
Cryptus ingratus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 148 n. 42 & p. 422 n. 19, ♀.
Trychosis ingrata Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 115, ♀ & 116, ♂.
inimica (Tschek) Schmkn. — ♀ — Eur.
Cryptus inimicus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 147 n. 41, ♀.
Trychosis inimica Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 115.
lapponica (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Goniocryptus Lapponicus (Holmgren) Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2116 n. 1, ♀ ♂.
Goniocryptus Lapponicus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2360 n. 7, ♀ ♂.
Trychosis Lapponica m.
macroura (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Dania.
? Cryptus ingratus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 148 n. 42 & p. 422 n. 19, ♀.
Goniocryptus macrourus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 492 n. 3, ♀ ♂.
Goniocryptus macrourus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2358 n. 3, ♀ ♂.
Trychosis macroura m.
mesocastana (Tschek) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Austria. [n. 13, ♀ ♂.
Cryptus mesocastanus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 144 n. 36, ♀ & p. 418
Trychosis mesocastana Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 114, ♀ & 116, ♂.
molesta (Tschek) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania.
Cryptus molestus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 146 n. 38, ♀ ♂ & p. 419 n. 15, ♀.
Trychosis molesta Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 114, ♀ & 117, ♂.
neglecta (Tschek) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Cryptus neglectus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 149 n. 44, ♀ ♂.
Trychosis neglecta Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 115, ♀ & 116, ♂.
nitidula (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Goniocryptus nitidulus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2359 n. 4b, ♀.
Trychosis nitidula m.
parvula (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Mallorca.
Goniocryptus parvulus Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 243 n. 11,
Trychosis parvula m. [♀ ♂.
paupera (Tschek) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Tirolia.
Cryptus pauper Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 150 n. 46, ♀ & p. 424 n. 23, ♀ ♂.
Trychosis pauper Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 116, ♀ & 117, ♂.
picta (Thoms.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur. bor.
Goniocryptus pictus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 494 n. 5, ♀ ♂.
Trychosis picta Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 114, ♀.
Goniocryptus pictus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2359 n. 5, ♀ ♂.
plebeja (Tschek) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Corsica, Corfu, Epirus.
Cryptus plebejus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 147 n. 40 & p. 419 n. 17, ♀ ♂.
Trychosis plebeja Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 115, ♀ & 116, ♂.
Goniocryptus plebejus Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1895 p. 35, ♀.
pleuralis (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Goniocryptus pleuralis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2358 n. 2b, ♀.
Trychosis pleuralis m.
rustica (Tschek) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Cryptus rusticus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 421 n. 18, ♀ ♂.
Trychosis rustica Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 115, ♀ & 117, ♂.
simulator (Tschek) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur. [♀ ♂.
Cryptus simulator Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 149 n. 45, ♀ & p. 423 n. 21,
Trychosis simulator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 115, ♀ & 117, ♂.

titillator (L.) D. T.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.

Ichneumon titillator Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 565 n. 42.
Ichneumon titillator Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 403 n. 1611.
? Ichneumon III Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1. 1766; T. 6 F. 11.
Ichneumon titillator Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 934 n. 35.
? Ichneumon LV Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768; T. 107 F. 4.
Ichneumon titillator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 337 n. 56.
Ichneumon titillator Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 852 n. 35.
Ichneumon titillator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 156 n. 1812.
Ichneumon titillator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 431 n. 70.
Ichneumon titillator Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 358 n. 723, ♂.
Ichneumon titillator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 266 n. 86.
Ichneumon titillator Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. Nya Saml. III. 1788 p. ?.
Ichneumon titillator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 168 n. 101.
Ichneumon titillator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2692 n. 35.
Ichneumon titillator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 45 n. 769.
Ichneumon titillator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 371.
Ichneumon titillator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 188 n. 124.
Ichneumon titillator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 167 n. 140.
Ichneumon titillator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 60 n. 58.
Cryptus titillator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 86 n. 68.
Ichneumon titillator Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 188 n. 35.
Ichneumon titillator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 68 n. 769.
Ichneumon titillator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110, ♂.
Ichneumon titillator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 267.
Ichneumon titillator Thunberg, Mém acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 326.
Ichneumon elongator var. a Trentepol, Isis 1826 p. 224.
Cryptus titillator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 705 [excl. Synon.].
Cryptus titillator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 564 n. 98, ♀ ♂.
? Ichneumon titillator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1016 n. 207.
Ichneumon titillator Trentepol, Isis 1829 p. 938 n. 53, ♀.
Cryptus titillator Bouché, Naturg. d. Insect. 1834 p. 142 n. 10.
Cryptus titillator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 289 n. 34, ♀.
Cryptus titillator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 312 n. 7.
Cryptus titillator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 379 n. 26, ♀ ♂.
Cryptus titillator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 139 n. 27, ♀.
Cryptus titillator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 53 n. 13, ♀ ♂.
Cryptus titillator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 80 n. 34, ♀ ♂.
Goniocryptus titillator Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 499 n. 4, ♀ ♂.
Cryptus titillator Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 9, ♀ ♂; T. 6 F. 9.
Cryptus titillator Brischke, Deutsch. entom. Zeitschr. XXI. 1877 p. 286.
Cryptus titillator Brischke, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 27.
Goniocryptus titillator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 333, ♀ ♂.
Cryptus titillator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 278 n. 22, ♀ ♂.
Goniocryptus titillator Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2358 n. 4, ♀ ♂.
Trychosis titillator m.

tristator (Tschek) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.

Cryptus tristator Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 148 n. 43, ♀ ♂ & p. 423 n. 20, ♀.
Trychosis tristator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 115, ♀ & 116, ♂.

---

1) *Lep.:* Botys sambucalis (Bouché).

tunicula-rubra Fyles[1]) — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Trychosis tunicula-rubra Fyles, Canad. Entomol. XXVIII. 1896 p. 150, ♀ ♂.

JOPPOCERAS

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 39.
Joppa, nom. propr. Hymen.; κέρας, cornu.

dubiosum Ashm. — Am.
Joppoceras dubiosum (Cresson) Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 39 [s. descr.].

SPILOCRYPTUS

Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 472.
σπίλος, macula; Cryptus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Bassus Fabricius.
Cryptus Fabricius & auct.
Cyrtocryptus Vollenhoven.
Ichneumon Fabricius & auct.

adustus (Grav.) Thoms.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Cryptus adustus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 513 n. 63, ♀.
Cryptus opisoleucus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 522 n. 68, ♂.
Cryptus adustus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 94 n. 70, ♀ ♂.
Spilocryptus adustus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 507 n. 11, ♀.
Spilocryptus adustus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 336, ♀ ♂.
Cryptus adustus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 280 n. 42, ♀ ♂.
Spilocryptus adustus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 132, ♀ & 135, ♂.
Spilocryptus adustus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2369 n. 11, ♀ ♂.
var. **albolineatus** (Grav.) Schmkn. — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus albolineatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 525 n. 72, ♂.
Spilocryptus adustus var. albolineatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 135, ♂.
alutaceus (Tschek) Schmkn. — ♀ — Eur.: Austria.
Cryptus alutaceus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 129 n. 19.
Cryptus alutaceus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 247 n. 18, ♀.
Cryptus alutaceus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 98, ♀.
Spilocryptus alutaceus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 131, ♀.
bicolor (Destef.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Sicilia.
Cryptus bicolor Destefani, Natural. Sicil. III. P. 6. 1884 p. 153, ♀.
Spilocryptus ? bicolor Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 129 nota, ♀.
brachysoma (Taschbg.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus brachysoma Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 100 n. 86, ♀.
Cryptus ? brachysoma Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
Spilocryptus brachysoma Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 131, ♀.
brevipennis Kriechb. — ♀ — Eur.: Italia.
Spilocryptus brevipennis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 54, ♀.
canarsiae Ashm.[3]) — ♂ — Am.: Illinois.
Spilocryptus canarsiae Ashmead, Proc. Entom. Soc. Washington IV. 1897 p. 124, ♂.

---

1) *Lep.:* Gelechia gallae diplopappi (Fyles).
2) *Hymen.:* Lophyrus pini, L. similis, L. pallidus (Brischke).
3) *Lep.:* Canarsia Hammondi (Ashmead).

cimbicis (Tschek) Schmkn.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Austria.
Cryptus cimbicis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 412 n. 8, ♀ ♂.
Cryptus cimbicis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 280, ♀ ♂.
Spilocryptus cimbicis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 130, ♀ & 134, ♂.
claviventris Kriechb. — ♀ — Eur.: Littorale.
Spilocryptus claviventris Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894 p. 14, ♀.
excentricus (Tschek) Schmkn. — ♀ — Eur.: Austria.
Cryptus excentricus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 136 n. 27, ♀.
Spilocryptus excentricus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 130, ♀.
fumipennis (Grav.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Cryptus migrator var. 9 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 598, ♂.
Cryptus fumipennis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 601 n. 120, ♀ ♂ [excl. var. 2].
Cryptus fumipennis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 103 n. 91, ♀ ♂.
Cryptus fumipennis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 133 n. 23, ♂.
Spilocryptus fumipennis Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 503 n. 3, ♀ ♂.
Cryptus fumipennis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 280 n. 54, ♀ ♂.
Spilocryptus fumipennis Holmgren, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 29-31 n. 55.
Cryptus migrator var. fumipennis Verhoeff, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 332 n. 12, ♀.
Spilocryptus fumipennis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 130, ♀ & 133, ♂.
Spilocryptus fumipennis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2366 n. 3.
fuscipes (Tschek) Schmkn. — ♀ — Eur.: Austria.
Cryptus fuscipes Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 135 n. 26, ♀.
Spilocryptus fuscipes Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 131, ♀.
grossus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Cryptus grossus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 614 n. 126, ♀.
Cryptus grossus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 96 n. 74, ♀.
Spilocryptus grossus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 508 n. 12, ♀.
Spilocryptus grossus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 132, ♀.
Spilocryptus grossus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2369 n. 12, ♀ ♂.
hospes (Tschek) Schmkn.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus hospes Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 133 n. 24, ♀ ♂.
Spilocryptus hospes Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 130, ♀ & 133, ♂.
incubitor (Ström) Thoms.[4] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon incubitor Ström, Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768 p. 348 n. 65, ♀ [non Linné].
Cryptus incubitor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 590 n. 117, ♀.
Cryptus incubitor Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 291 n. 40, ♀.
Cryptus incubitor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 142 n. 11, ♀.
Cryptus incubitor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 123 n. 11, ♀ ♂.
Cryptus incubitor Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 383 n. 32.
Cryptus incubitor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 52 n. 2, ♀ ♂.
Ichneumon incubitor Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVIII. 1857 p. 195 n. 12, ♀ ♂.
Cryptus incubitor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 104 n. 94, ♀ ♂.
Cryptus incubitor Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 414 n. 9, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Clavellaria amerinae, Trichiosoma lucorum, Cimbex variabilis (Tschek).

2) *Lep.:* Zygaena laeta (Giraud), Bombyx populi (Mocsáry), Saturnia pavonia (Holmgren).

3) *Lep.:* Saturnia pini (Mocsáry).

4) *Hymen.:* Cimbex femorata (Ratzeburg), Trichiosoma lucorum (Brischke), Hylotoma rosarum (Taschenberg). — *Lep.:* Saturnia carpini (Brischke), Geometra lituraria (Boie). — *Col.:* Hylurgus piniperda.

Cryptus incubitor Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 250 n. 24.
Spilocryptus incubitor Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 502 n. 1, ♀ ♂.
Spilocryptus incubitor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 334, ♀ ♂.
Cryptus incubitor Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 280 n. 56, ♀ ♂.
Spilocryptus incubitor Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 130, ♀ & 133, ♂.
Spilocryptus incubitor Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2366 n. 1, ♀ ♂.

magrettii Kriechb. — ♀ — Eur.: Italia.
Spilocryptus Magrettii Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 54, ♀.

mansuetor (Tschek) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Stiria.
Cryptus mansuetor Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 131 n. 21, ♀ ♂.
Spilocryptus mansuetor Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 132, ♀ & 135, ♂.

migrator (Fabr.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 343 n. 50.
Ichneumon migrator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 334 n. 38, ♀.
Ichneumon migrator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 427 n. 42.
Ichneumon dictator Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 410 n. 51.
Ichneumon migrator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 264 n. 50.
Ichneumon migrator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 162 n. 82.
Ichneumon migrator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2686 n. 116.
Ichneumon migrator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 178 n. 69.
Ichneumon migrator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 152 n. 80.
Ichneumon emigrator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 56 n. 37.
Bassus migrator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 98 n. 16.
Ichneumon emigrator Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 182 n. 12.
Ichneumon migrator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
Ichneumon migrator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 297.
Cryptus migrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 705, ♀.
Cryptus migrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 592 n. 119, ♂ [excl. var. 9, ♂].
Cryptus fumipennis var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 603 n. 120, ♂.
Cryptus fumipennis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 291.
Cryptus migrator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 142 n. 16, ♀ ♂.
Cryptus migrator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 123 n. 10, ♀.
Cryptus migrator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 384 n. 33, ♀ ♂.
Cryptus migrator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 138 n. 20, ♂.
Cryptus migrator Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 99 n. 29, ♀ ♂.
Cryptus migrator Reinhard, Stettin. entom. Zeitg. XVII. 1856 p. 104 n. 4, ♀ ♂.
Cryptus migrator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 102 n. 90, ♀ ♂.
Cryptus migrator Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 410, ♀ ♂.
Spilocryptus migrator Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 502 n. 2, ♀ ♂.
Cryptus migrator Bridgman, Entomologist XI. 1878 p. 35.
Spilocryptus migrator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 334, ♀ ♂.
Cryptus migrator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 280 n. 51, ♀ ♂.
Spilocryptus migrator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 130, ♀ & 133, ♂.
Spilocryptus migrator Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2366 n. 2, ♀ ♂.

var. **intermedius** (Verh.) D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus migrator st. intermedius, Verhoeff, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 332 n. 12, ♀.
Spilocryptus migrator var. intermedius m.

---

[1]) *Hymen.:* Trichiosoma lucorum (Reinhard). — *Lep.:* Bombyx quercus, Dicranura erminea, Zygaena peucedani, Noctua moneta (Ratzeburg), Psyche viciella, P. graminella, Gastropacha trifolii (Brischke), Zygaena punctum (Mocsáry).

nasutus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Spilocryptus nasutus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 505 n. 7, ♀ ♂.
Cyrtocryptus nasutus Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 65; T. 41 F. 8.
Spilocryptus nasutus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 335, ♀ ♂.
Spilocryptus nasutus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 132, ♀ & 134, ♂.
Spilocryptus nasutus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2368 n. 7, ♀ ♂.
nigricornis Kriechb. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Spilocryptus nigricornis Kriechbaumer, Termész. Füzet. XIX. 1896 p. 128 n. 2, ♀.
nubeculatus (Grav.) Brischke[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Cryptus nubeculatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 611 n. 125, ♂ [excl. ♀].
Cryptus nubeculatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 293 n. 44, ♀ ♂.
Cryptus nubeculatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 143 n. 12, ♀.
Cryptus nubeculatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 384 n. 34. ♀.
Cryptus nubeculatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 138 n. 23, ♀.
Cryptus nubeculatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 96 n. 73, ♂.
Cryptus nubeculatus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 408 n. 5, ♀.
Cryptus nubeculatus Brischke, Deutsch. entom. Zeitschr. XXI. 1877 p. 286.
Spilocryptus nubeculatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 336, ♀.
Cryptus nubeculatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 280 n. 44, ♀ ♂.
Spilocryptus nubeculatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 132, ♀ & 135, ♂.
pumilus Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Tirolis.
Spilocryptus pumilus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 69 n. 8, ♀ ♂.
pygoleucus (Grav.) Brischke[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Cryptus pygoleucus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 702.
Cryptus pygoleucus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 540 n. 85, ♂.
? Pezomachus abbreviator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 878 n. 291, ♀.
Cryptus pygoleucus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 286 n. 27.
Cryptus leucomerus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 135 n. 6.
Cryptus evanescens Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 137 n. 15, ♂.
Cryptus pygoleucus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 103 n. 92, ♂.
Spilocryptus dispar Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 504 n. 6, ♀ ♂.
Cyrtocryptus pygoleucus Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 65; T. 41 F. 7.
Spilocryptus pygoleucus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 335, ♀ ♂.
Cryptus pygoleucus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 281 n. 55, ♂.
Cryptus pygoleucus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1884 p. 423.
Spilocryptus dispar Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 129, ♀ & 133, ♂.
Cryptus pygoleucus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 67, ♂.
Spilocryptus dispar Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2367 n. 6, ♀ ♂.
var. **ischioleucus** (Grav.) D. T. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Cryptus ischioleucus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 541 n. 86, ♂.
Cryptus pygoleucus var. ischioleucus Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 43 n. 55.
Cryptus (Spilocryptus) ischioleucus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 [p. 67, ♂.
Spilocryptus pygoleucus var. ischioleucus m.
remex (Tschek) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.
Cryptus remex Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 137 n. 28, ♀ & p. 416 n. 10, ♀ ♂.
? Habrocryptus remex Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 120, ♀.
Spilocryptus remex Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 131, ♀ & 134, ♂.

---

1) *Hymen.:* Lophyrus pini (Ratzeburg).

2) *Lep.:* Eupoecilia ambiguana (Fletcher), Gastropacha neustria, Harpyia bifida, Psyche spec. (Brischke). — *Hymen.:* Lophyrus pini (Ratzeburg).

solitarius (Tschek) Schmkn.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Austria.
Cryptus solitarius Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 410 n. 7, ♀ ♂.
Spilocryptus solitarius Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 131, ♀ & 134, ♂.
tibialis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
? Cryptus hospes Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 133 n. 24, ♀ ♂.
Spilocryptus tibialis Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 503 n. 4, ♀ ♂.
Spilocryptus tibialis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 131, ♀ & 134, ♂.
Spilocryptus tibialis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2367 n. 4, ♀ ♂.
vindex (Tschek) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus vindex Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 138 n. 29, ♀.
Cryptus vindex Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 247 n. 19, ♂.
? Habrocryptus vindex Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 120, ♀ & 121, ♂.
Spilocryptus vindex Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 131, ♀ & 134, ♂.
zygaenarum Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
? Cryptus migrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 592 n. 119, ♂ [excl. ♀].
? Cryptus fumipennis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 601 n. 120, ♀ [excl. ♂].
? Cryptus solitarius Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 410 n. 7, ♀ ♂.
Spilocryptus zygaenarum Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 504 n. 5, ♀ ♂.
Spilocryptus zygaenarum Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 131, ♀ & 134, ♂.
Spilocryptus zygaenarum Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2367 n. 5, ♀ ♂.

HOPLOCRYPTUS

Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 472 & 508.
ὅπλον, arma; Cryptus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Cryptus Gravenhorst & auct.

binotatulus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hoplocryptus binotatulus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 512 n. 7, ♀ ♂.
Hoplocryptus binotatulus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 147, ♀ & 149, ♂.
Hoplocryptus binotatulus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2372 n. 7.
bipunctatus (Tschek) Schmkn. — ♂ — Eur.: Austria inf.
Cryptus bipunctatus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 249 n. 22, ♂.
Hoplocryptus bipunctatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 149, ♂.
buccatus (Tschek) Schmkn. — ♂ — Eur.: Austria inf.
Cryptus buccatus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 245 n. 15, ♂.
Hoplocryptus buccatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 148 & 150, ♂.
confector (Grav.) Schmkn.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Cryptus fugitivus var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 517, ♀.
Cryptus confector Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 518 n. 66, ♀.
Cryptus confector Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 282 n. 22.
Cryptus confector Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 95 n. 72, ♀.
Cryptus confector Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 477 n. 27, ♀.
Cryptus confector Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 142 n. 35, ♀ ♂.
Cryptus confector Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 246 n. 16, ♂.
? Hoplocryptus elegans Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 511 n. 4, ♀ ♂.
? Cryptus (Hoplocryptus) Thomsoni Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 154.

---

1) *Lep.:* Zygaena filipendulae, Z. scabiosae, Limenitis Camilla (Tschek).
2) *Lep.:* Zygaena filipendulae (Thomson).
3) *Lep.:* Osmia tridentata (Giraud).

Cryptus confector Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 281 n. 43, ♀.
Hoplocryptus confector Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 146, ♀ & 148, ♂.
Spilocryptus confector Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 225, ♀.
Hoplocryptus confector Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2371 n. 4, ♀ ♂.

conjungens (Tschek) Schmkn. — ♀ — Eur.: Halicia.
Cryptus conjungens Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 428, ♀.
Hoplocryptus ? conjungens Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 147.

coxator (Tschek) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Cryptus coxator Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 140 & 156 n. 31, ♀ & p. 417 [n. 11, ♂.
Hoplocryptus fugitivus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 512 n. 6, ♀.
Hoplocryptus coxator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 146, ♀ & 149, ♂.
Hoplocryptus coxator Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2372 n. 6, ♀ ♂.

dubius (Taschbg.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Cryptus dubius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 99 n. 82, ♀.
Hoplocryptus dubius Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 510 n. 3, ♀ ♂.
Hoplocryptus dubius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 336, ♂.
Hoplocryptus dubius Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 146, ♀ & 148, ♂.
Hoplocryptus dubius Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2371 n. 3.

elegans Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Hoplocryptus elegans Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 511 n. 4, ♀ ♂.
Cryptus (Hoplocryptus) Thomsoni Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 154.
Hoplocryptus elegans Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 146, ♀ & 148, ♂.

femoralis (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia, Germania.
Cryptus femoralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 493 n. 48, ♀.
Cryptus femoralis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 369 n. 10, ♀.
Cryptus femoralis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 95 n. 71, ♀.
Cryptus femoralis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 242 n. 12, ♂.
Hoplocryptus femoralis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 146, ♀ & 148, ♂.

fugitivus (Grav.) Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Gallia, Germania.
Cryptus fugitivus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 515 n. 65, ♀ ♂ [excl. var. 3, ♀].
Cryptus fugitivus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 284 n. 21, ♀ ♂.
Cryptus fugitivus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 370 n. 13, ♀ ♂.
Cryptus fugitivus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 101 n. 87, ♀ ♂.
Hoplocryptus confector Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 511 n. 5, ♀ ♂ [non Gravenhorst].
Hoplocryptus fugitivus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 336, ♀.
Cryptus fugitivus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 281 n. 49, ♀ ♂.
Hoplocryptus fugitivus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 146, ♀ & 149, ♂.
Hopolocryptus fugitivus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2372 n. 5, ♀ ♂.

fuscomarginatus (Grav.) Schmkn. — ♂ — Eur.
Cryptus fuscomarginatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 526 n. 73, ♂.
Cryptus fuscomarginatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 97 n. 76, ♂.
Hoplocryptus fuscomarginatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 149, ♂.

gladiator Kriechb. — ♀ — Eur.: Tirolia.
Hoplocryptus gladiator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 70 n. 9, ♀.

gracilis (Grav.) Schmkn.[2] — ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Cryptus gracilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 520 n. 67, ♂ [excl. var. 2].
Cryptus gracilis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 371 n. 14, ♂.
Cryptus gracilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 53 n. 14, ♂.

---

[1]) = ? H. confector (Grav.) Schmkn.
[2]) *Lep.:* Smerinthus populi (Giraud).

Cryptus gracilis Taschenberg, Zeitschr f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 98 n. 79, ♂.
Hoplocryptus gracilis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 148, ♂.

heliophilus (Tschek) Schmkn.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Cryptus heliophilus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 138 n. 30, ♀ ♂.
Hoplocryptus heliophilus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 146, ♀ & 149, ♂.
Hoplocryptus heliophilus Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894 p. 14.
Hoplocryptus heliophilus Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1895 p. 35.

insectator (Tschek) Schmkn. — ♀ — Eur.: Austria inf.
Cryptus insectator Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 142 n. 34 & p. 417 n. 12, ♀.
Hoplocryptus insectator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 147, ♀.

var. **nigripes** Kriechb. — ♂ — Eur.: Littorale.
Hoplocryptus insectator var. nigripes Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894 [p. 14, ♂.

mallorcanus Kriechb. — ♀ — Eur.: Mallorca.
Hoplocryptus Mallorcanus Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. XXIII. 1894 p. 243 n. 12, ♀.

mediterraneus (Tschek) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Calabria, Corfu, Tinos.
Cryptus mediterraneus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 242 n. 13, ♀ ♂.
Hoplocryptus mediterraneus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 146, ♀ & 148, ♂.

mesoxanthus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hoplocryptus mesoxanthus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 509 n. 2, ♀ ♂.
Hoplocryptus mesoxanthus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 145, ♀ & 148, ♂.
Hoplocryptus mesoxanthus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2116 n. 1.
Hoplocryptus mesoxanthus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2371 n. 2, ♀ ♂.

nigripes (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania, Italia.
Cryptus nigripes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 523 n. 69, ♀ ♂.
Cryptus nigripes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 96 n. 75, ♀ ♂.
Cryptus nigripes Bridgman & Fitch, Entomol. XV. 1882 p. 280 n. 45, ♀ ♂.
Hoplocryptus nigripes Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 147, ♀ & 149, ♂.

procerus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Hoplocryptus procerus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 336, ♀.
Hoplocryptus ? procerus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 147.

pulcher Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hoplocryptus pulcher Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 509 n. 1, ♀ ♂.
Hoplocryptus pulcher Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 145, ♀ & 149, ♂.
Hoplocryptus pulcher Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2370 n. 1, ♀ ♂.

quadriguttatus (Grav.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia, Germania.
Cryptus quadriguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 479 n. 42, ♀.
Cryptus quadriguttatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 73 n. 13, ♀.
Cryptus quadriguttatus Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 483 n. 32, ♀ ♂.
Cryptus quadriguttatus Möller, Entom. Tidskr. IV. 1883 p. 94, ♀.
Cryptus quadriguttatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 98, ♀.
Hoplocryptus quadriguttatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2116 n. 2.
Hoplocryptus quadriguttatus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2370 n. 1ª, ♀ ♂.

subcinctus (Grav.) Schmkn. — ♂ — Eur.: Britannia.
Cryptus subcinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 703 n. 85ᵇ, ♂.
Cryptus subcinctus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 287 n. 28.
Cryptus subcinctus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 101 n. 88, ♂.
Cryptus subcinctus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 281 n. 50, ♂.
Hoplocryptus subcinctus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 149, ♂.

---

1) *Hymen.:* Osmia adunca (Tschek).
2) *Hymen.:* Crabro rubi (Giraud).

Cryptus confector Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 281 n. 43, ♀.
Hoplocryptus confector Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 146, ♀ & 148, ♂.
Spilocryptus confector Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 225, ♀.
Hoplocryptus confector Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2371 n. 4, ♀ ♂.

conjungens (Tschek) Schmkn. — ♀ — Eur.: Halicia.
Cryptus conjungens Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 428, ♀.
Hoplocryptus ? conjungens Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 147.

coxator (Tschek) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Cryptus coxator Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 140 & 156 n. 31, ♀ & p. 417 [n. 11, ♂.
Hoplocryptus fugitivus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 512 n. 6, ♀.
Hoplocryptus coxator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 146, ♀ & 149, ♂.
Hoplocryptus coxator Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2372 n. 6, ♀ ♂.

dubius (Taschbg.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Cryptus dubius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 99 n. 82, ♀.
Hoplocryptus dubius Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 510 n. 3, ♀ ♂.
Hoplocryptus dubius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 336, ♂.
Hoplocryptus dubius Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 146, ♀ & 148, ♂.
Hoplocryptus dubius Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2371 n. 3.

elegans Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Hoplocryptus elegans Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 511 n. 4, ♀ ♂.
Cryptus (Hoplocryptus) Thomsoni Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 154.
Hoplocryptus elegans Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 146, ♀ & 148, ♂.

femoralis (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia, Germania.
Cryptus femoralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 493 n. 48, ♀.
Cryptus femoralis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 369 n. 10, ♀.
Cryptus femoralis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 95 n. 71, ♀.
Cryptus femoralis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 242 n. 12, ♂.
Hoplocryptus femoralis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 146, ♀ & 148, ♂.

fugitivus (Grav.) Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Gallia, Germania.
Cryptus fugitivus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 515 n. 65, ♀ ♂ [excl. var. 3, ♀].
Cryptus fugitivus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 284 n. 21, ♀ ♂.
Cryptus fugitivus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 370 n. 13, ♀ ♂.
Cryptus fugitivus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 101 n. 87, ♀ ♂.
Hoplocryptus confector Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 511 n. 5, ♀ ♂ [non Gravenhorst].
Hoplocryptus fugitivus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 336, ♀.
Cryptus fugitivus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 281 n. 49, ♀ ♂.
Hoplocryptus fugitivus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 146, ♀ & 149, ♂.
Hopolocryptus fugitivus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2372 n. 5, ♀ ♂.

fuscomarginatus (Grav.) Schmkn. — ♂ — Eur.
Cryptus fuscomarginatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 526 n. 73, ♂.
Cryptus fuscomarginatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 97 n. 76, ♂.
Hoplocryptus fuscomarginatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 149, ♂.

gladiator Kriechb. — ♀ — Eur.: Tirolia.
Hoplocryptus gladiator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 70 n. 9, ♀.

gracilis (Grav.) Schmkn.[2] — ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Cryptus gracilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 520 n. 67, ♂ [excl. var. 2].
Cryptus gracilis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 371 n. 14, ♂.
Cryptus gracilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 53 n. 14, ♂.

---

1) = ? H. confector (Grav.) Schmkn.
2) *Lep.:* Smerinthus populi (Giraud).

Cryptus gracilis Taschenberg, Zeitschr f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 98 n. 79, ♂.
Hoplocryptus gracilis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 148, ♂.

heliophilus (Tschek) Schmkn.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Cryptus heliophilus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 138 n. 30, ♀ ♂.
Hoplocryptus heliophilus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 146, ♀ & 149, ♂.
Hoplocryptus heliophilus Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894 p. 14.
Hoplocryptus heliophilus Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1895 p. 35.

insectator (Tschek) Schmkn. — ♀ — Eur.: Austria inf.
Cryptus insectator Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 142 n. 34 & p. 417 n. 12, ♀.
Hoplocryptus insectator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 147, ♀.

var. **nigripes** Kriechb. — ♂ — Eur.: Littorale. [p. 14, ♂.
Hoplocryptus insectator var. nigripes Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894

mallorcanus Kriechb. — ♀ — Eur.: Mallorca.
Hoplocryptus Mallorcanus Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. XXIII. 1894 p. 243 n. 12, ♀.

mediterraneus (Tschek) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Calabria, Corfu, Tinos.
Cryptus mediterraneus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 242 n. 13, ♀ ♂.
Hoplocryptus mediterraneus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 146, ♀ & 148, ♂.

mesoxanthus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hoplocryptus mesoxanthus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 509 n. 2, ♀ ♂.
Hoplocryptus mesoxanthus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 145, ♀ & 148, ♂.
Hoplocryptus mesoxanthus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2116 n. 1.
Hoplocryptus mesoxanthus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2371 n. 2, ♀ ♂.

nigripes (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania, Italia.
Cryptus nigripes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 523 n. 69, ♀ ♂.
Cryptus nigripes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 96 n. 75, ♀ ♂.
Cryptus nigripes Bridgman & Fitch, Entomol. XV. 1882 p. 280 n. 45, ♀ ♂.
Hoplocryptus nigripes Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 147, ♀ & 149, ♂.

procerus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Hoplocryptus procerus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 336, ♀.
Hoplocryptus ? procerus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 147.

pulcher Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hoplocryptus pulcher Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 509 n. 1, ♀ ♂.
Hoplocryptus pulcher Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 145, ♀ & 149, ♂.
Hoplocryptus pulcher Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2370 n. 1, ♀ ♂.

quadriguttatus (Grav.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia, Germania.
Cryptus quadriguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 479 n. 42, ♀.
Cryptus quadriguttatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 73 n. 13, ♀.
Cryptus quadriguttatus Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 483 n. 32, ♀ ♂.
Cryptus quadriguttatus Möller, Entom. Tidskr. IV. 1883 p. 94, ♀.
Cryptus quadriguttatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 98, ♀.
Hoplocryptus quadriguttatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2116 n. 2.
Hoplocryptus quadriguttatus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2370 n. 1a, ♀ ♂.

subcinctus (Grav.) Schmkn. — ♂ — Eur.: Britannia.
Cryptus subcinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 703 n. 85b, ♂.
Cryptus subcinctus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 287 n. 28.
Cryptus subcinctus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 101 n. 88, ♂.
Cryptus subcinctus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 281 n. 50, ♂.
Hoplocryptus subcinctus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 149, ♂.

---

1) *Hymen.:* Osmia adunca (Tschek).
2) *Hymen.:* Crabro rubi (Giraud).

HABROCRYPTUS

Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 471 & 498.
ἁβρός, tenuis; Cryptus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Bassus Fabricius.
Cryptus Gravenhorst, Fonscolombe, Holmgren, Bridgman & Fitch.
Ichneumon Müller & auct.
Ischnus Blanchard, Westwood.
Microcryptus Schmiedeknecht.

alternator (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Cryptus alternator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 588 n. 116, ♀ ♂.
Cryptus alternator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 383 n. 31, ♀ ♂.
Cryptus alternator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 53 n. 12, ♀ ♂.
Cryptus alternator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 92 n. 64, ♀ ♂.
Habrocryptus alternator Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 499 n. 3, ♀ ♂.
Habrocryptus alternator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 334, ♀.
Cryptus alternator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 279 n. 39, ♀ ♂.
Habrocryptus alternator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 120, ♀ ♂.
Habrocryptus alternator Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2364 n. 3, ♀ ♂.

collaris (Tschek) Schmkn. — ♀ — Eur.: Austria inf.
Cryptus collaris Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 249 n. 23, ♀.
Habrocryptus collaris Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 119, ♀.
? Spilocryptus collaris Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 130, ♀.

constrictor (Fabr.) D. T. — Eur.: Austria.
Cryptus constrictor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 84 n. 54, ♀.
Ichneumon constrictor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
Ichneumon constrictor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 297.
Cryptus rubricator var. constrictor Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. IX. 1890 p. 140.
Habrocryptus constristor m.

geminus (Grav.) Schmkn. — ♀ — Eur.
Cryptus geminus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 506 n. 57, ♀.
Cryptus geminus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 91 n. 61, ♀.
Habrocryptus geminus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 119, ♀.

hostilis (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Cryptus hostilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 514 n. 62, ♂.
Cryptus brachyurus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 572 n. 103, ♀.
Cryptus brachyurus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 290 n. 36, ♀.
Cryptus hostilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 54 n. 15, ♀ ♂.
Cryptus hostilis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 89 n. 57, ♂.
Habrocryptus brachyurus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 499 n. 2, ♀ ♂.
Habrocryptus brachyurus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 334, ♂.
Cryptus hostilis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 269 n. 35, ♀ ♂.
Habrocryptus brachyurus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 120, ♀ & 121, ♂.
Microcryptus hostilis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
Cryptus hostilis Brischkke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 68.
Habrocryptus brachyurus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2363 n. 2, ♀ ♂.
Habrocryptus hostilis m.

inquisitor (Tschek) Schmkn. — ♀ — Eur.
Cryptus inquisitor Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 129 n. 18, ♀.
Habrocryptus inquisitor Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 119, ♀.

insulanus Krieg. — ♀ — Eur.: Borkum ins.

Habrocryptus insulanus Krieger, Entom. Nachr. XXIII. 1897 p. 7 n. 1, ♀.

orbitatorius Thoms. — ♀ — Eur.: Dalmatia.

Habrocryptus orbitatorius Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2364 n. 4a, ♀.

polytomi (Tschek) Schmkn.[1] — ♂ — Eur.: Austria inf.

Cryptus polytomi Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 248 n. 20, ♂.

Habrocryptus polytomi Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 120, ♂.

porrectorius (Fabr.) D. T. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.

Ichneumon inquisitorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 151 n. 1759.

Ichneumon porrectorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 260 n. 8, ♂.

Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 57 n. 152 & 153.

Ichneumon porrectorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 n. 140 n. 15, ♂.

Ichneumon porrectorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2676 n. 79, ♂.

Ichneumon sanguinolentus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2679 n. 231.

Ichneumon leucostictus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2679 n. 232.

Ichneumon porrectorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 166 n. 10, ♂.

Ichneumon porrectorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 137 n. 22, ♂.

Ichneumon assertorius Fabricius Entom. System. II. 1793 p. 140 n. 31, ♀.

Ichneumon porrectorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 51 n. 9, ♂.

Cryptus assertorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 76 n. 20, ♀.

Bassus porrectorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 93 n. 1, ♂.

Ichneumon assertorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 112, ♀.

Ichneumon porrectorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284, ♂.

Cryptus assertorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 287, ♀.

Ichneumon assertorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252, ♀.

Ichneumon porrectorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255, ♂.

Ichneumon assertorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 285 n. 76, ♀.

Ichneumon porrectorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 294, ♂.

Ichneumon (Ischnus) porrectorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 642 n. 277, ♂.

Cryptus assertorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 495 n. 50, ♀.

Ichneumon assertorius Trentepol, Isis 1829 p. 943 n. 57, ♀.

Ischnus porrectorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 207 n. 1, ♂.

Cryptus assertorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 281 n. 14, ♀.

Cryptus assertorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 370 n. 13, ♀.

Ichneumon (Ischnus) porrectorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 305 n. 18, ♂.

Ischnus porrectorius Westwood, Introd. mod. classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 57, ♂.

Cryptus assertorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 55 n. 17, ♀ ♂.

Cryptus assertorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 90 n. 60, ♀ ♂.

Habrocryptus assertorius Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 498 n. 1, ♀ ♂.

Habrocryptus assertorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 334, ♀ ♂.

Cryptus porrectorius Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 279 n. 36, ♀ ♂.

Habrocryptus assertorius Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 119, ♀ & 120, ♂.

Cryptus assertorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 47, ♀.

Habrocryptus assertorius Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2363 n. 1, ♀ ♂.

Habrocryptus porrectorius m.

punctiger Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.

Habrocryptus punctiger Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2364 n. 3a, ♀ ♂.

rubricator (Panz.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania, Austria, Italia.

Ichneumon agitator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 179 n. 77.

---

[1] *Hymen.:* Lophyrus polytomus (Tschek).

Ichneumon rubricator Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 84 T. 14.
Ichneumon agitator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 57 n. 43.
Cryptus minutorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 72 n. 9.
Cryptus rubricator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 71.
Ichneumon rubricator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110, ♀.
Cryptus minutorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 287.
Ichneumon minor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258.
Ichneumon minor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 306.
Cryptus minutorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 625 n. 136, ♀.
Cryptus minutorius Trentepol, Isis 1829 p. 870 n. 43, ♀.
Cryptus minutorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 294 n. 47.
Cryptus minutor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 140 n. 29, ♀.
Cryptus minutorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 88 n. 52, ♀.
Cryptus minutorius Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 134 n. 25, ♂.
Habrocryptus minutorius Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 500 n. 4, ♀ ♂.
Ichneumon minutorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1880 p. 215 n. 44, ♂.
Cryptus minutorius Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 281 n. 33, ♀.
Cryptus rubricator Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. IX. 1890 p. 140.
Habrocryptus minutorius Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 119, ♀ & 120, ♂.
Habrocryptus minutorius Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2364 n. 4.
Habrocryptus rubricator m.

ARITRANIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 187 n. 10.
ἀρι-, valde; τρανής, clarus.

Synon.: Hygrocryptus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 472.
ὑγρός, madidus; Cryptus, nom. propr. Hymen.
Cryptus Gravenhorst, Stephens, Desvignes, Taschenberg, Tschek, [Bridgman & Fitch.
Cyrtocryptus Vollenhoven.
Hoplocryptus Schmiedeknecht, Thomson.
Ichneumon Rossi.

amoena (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Cryptus amoenus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 623 n. 135, ♀.
Cryptus amoenus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 100 n. 83, ♀.
Cryptus amoenus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 280, ♀ ♂.
Aritranis amoena Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 122, ♀.
Hoplocryptus amoenus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 146, ♀.
Cryptus ? amoenus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.

carnifex (Grav.) Schmkn.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Cryptus carnifex Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 631 n. 141, ♀.
Cryptus carnifex Stephens, Illustr. Brit. entom. Mandib. VII. 1835 p. 295 n. 50.
Cryptus varicoxis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 97 n. 77, ♂.
Cryptus carnifex Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 105 n. 98, ♀.
Hygrocryptus carnifex Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 513 n. 1, ♀ ♂.
Cyrtocryptus carnifex Vollenhoven, Pinacogr. P. 9. 1880 p. 65; T. 41 F. 9.
Hygrocryptus carnifex Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 336, ♀ ♂.
Cryptus carnifex Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 280 n. 57, ♀ ♂.
Aritranis carnifex Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 121, ♀ & 122, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Nonagria paludicola, Leucania obsoleta (Brischke).

Hygrocryptus carnifex Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2117 n. 1.
Hygrocryptus (Aritranis) carnifex Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2376 n. 1, ♀♂.

drewsenii (Thoms.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Cryptus elegans (Curtis) Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 57 n. 53, ♀ ♂ [s. descr.].
Hygrocryptus Drewseni Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 514 n. 2, ♀ ♂.
Cryptus elegans Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 280 n. 57, ♀ ♂.
Aritranis Drewseni Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 122, ♀ & 123, ♂.
Hygrocryptus Drewseni Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2117 n. 2.
Hygrocryptus Drewseni Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2376 n. 3, ♀ ♂.

explorator Tschek — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf.
Cryptus explorator Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 141 n. 33, ♀ ♂.
Aritranis explorator Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 156.
Aritranis explorator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 122, ♀ ♂.
Hoplocryptus explorator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 149, ♂.

fuscicornis Tschek — ♀ — Eur.: Austria inf.
Cryptus fuscicornis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 140 n. 32, ♀.
Aritranis fuscicornis Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 156.
Aritranis fuscicornis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 122 & 145, ♀.

graefei Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Istria?, (Tirolia?).
Hoplocryptus (Aritranis) Graefei Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2373, ♀ ♂.

jonica (Tschek) Schmkn. — ♀ — Eur.: Corcyra.
Cryptus Jonicus Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. 1872 p. 244 n. 14, ♀.
Aritranis Jonica Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 121, ♀.
Hoplocryptus Jonicus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 147, ♀.

melanocephala (Grav.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Austria.
Cryptus melanocephalus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 629 n. 139, ♀.
Cryptus melanocephalus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 105 n. 97, ♀.
? Cryptus fuscipes Tschek, Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. 1870 p. 135 n. 26, ♀.
Aritranis melanocephala Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 121, ♀.

occisor (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia, Italia.
Cryptus occisor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 615 n. 128, ♀.
Cryptus occisor Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 385 n. 35, ♀.
Cryptus occisor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 79 n. 31, ♀.
Hoplocryptus occisor Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 512 n. 8, ♀ ♂.
Hoplocryptus occisor Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 147, ♀ & 148, ♂.
Hoplocryptus occisor Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894 p. 14, ♀ ♂.
Hoplocryptus (Aritranis) occisor Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2373 n. 8, ♀ ♂.

palustris (Thoms.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Hygrocryptus palustris Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 514 n. 3, ♀.
Aritranis palustris Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 122, ♀.
Hygrocryptus (Aritranis) palustris Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2376 n. 2, ♀ ♂.

praedator (Rossi) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur. centr.
Ichneumon praedator Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 116 n. 255.
Cryptus praedator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 633 n. 143, ♀.
Cryptus praedator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 88, ♀.
Cryptus praedator Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXVII. 1873 p. 23 [n. 1, ♀♂.
Aritranis praedator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 121 & 122, ♀.

sanguinolenta (Grav.) Schmkn. — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus sanguinolentus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 632 n. 142, ♂.
Cryptus sanguinolentus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 78 n. 29, ♂.
Aritranis sanguinolenta Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 122, ♂.

thoracica (Brischke) Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Hygrocryptus thoracicus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1. 2. 1881 p. 337, ♀.
Aritranis thoracica Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 121, ♀.

vancouverensis (Harrgt.) D. T. — ♂ — Am.: Vancouvers Island.
Hypocryptus Vancouverensis Harrington, Canad. Entomol. 1894 p. 248, ♂.
Aritranis Vancouverensis m.

30. *Subfam.* Hemigasterini

Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 25 & 38.

MACROGASTER

Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 184.
μακρός, longus; *γαστήρ*, venter.

ferruginea Cam. — ♂ — As.: India.
Macrogaster ferrugineus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 198, ♂.

flavopicta Smith — ♀ — As.: Singapore.
Macrogaster flavopictus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 121 n. 1, ♀.

lutea Cam. — ♂ — As.: India.
Macrogaster luteus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 199, ♂.

nigricans Cam. — ♀ — As.: India.
Macrogaster nigricans Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 194, ♀.

rufipennis Brullé — ♀ — Afr.: Cap.
Macrogaster rufipennis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 185 n. 1, ♀; T. 41 F. 4.

variipes Cam. — ♀ — As.: India.
Macrogaster varipes Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 196, ♀.

ARTHULA

Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIV. P. 5. 1900 No. 15. p. 112.
Etymol. obscura.

brunneicornis Cam. — ♀ — As.: India or. [p. 112, ♀.
Arthula brunneocornis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIV. P. 5. 1900 No. 15.

HEMIGASTER

Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 266.
ἡμι, semi; *γαστήρ*, venter.

carinifrons Cam. — ♀ ♂ — As.: India.
Hemigaster carinifrons Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 201, ♀ ♂.

fasciata Brullé — ♀ — As.: India.
Hemigaster fasciatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 267 n. 1, ♀; T. 41 F. 1.

lutea Brullé — ♀ — Austr.
Hemigaster luteus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 268 n. 2, ♀.

31. *Subfam.* Pezomachinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 144 & 173.

HEMIMACHUS

Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 157.
ἥμι, semi; μάχομαι, pugno.
Vide genus Pezomachus.

PEZOLOCHUS

Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 103.
πεζός, pedester; λοχέω, insequor caute.

Synon.: Pezomachus Thomson.

atratus Ashm. — ♀ — Am.: Colorado.
Pezolochus atratus Ashmead, Bull. Colorado Biol. Assoc. I. 1890 p. 22, ♀.
bucculatricis Ashm. — ♀ ♂ — Am.: Washington.
Pezolochus bucculatricis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 420, ♀ ♂.
pilosulus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pezomachus (Pezolochus) pilosulus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1003 n. 7, ♀ ♂.
rufipes Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pezolochus rufipes Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 104 n. 1, ♀.
Pezomachus rufipes Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1002 n. 6, ♀ ♂.

PEZOMACHUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 867 n. 7.
πεζός, pedester; μάχομαι, pugno.

Synon.: Gelis Thunberg, Nov. acta soc. sc. Upsal. IX. 1827 p. 199.
Gelis, nom. propr.
Hemimachus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 157.
ἥμι, semi; μάχομαι, pugno.
Cryptus Fabricius & auct.
Hemiteles Gravenhorst, Ratzeburg.
Ichneumon Linné & auct. ant.
Mutilla Linné & auct. ant.

acarorum (L.) Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Mutilla acarorum Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 583 n. 7.
Mutilla acarorum Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 428 n. 1729.
Mutilla acarorum O. F. Müller, Faun. Insect. Fridrichsdal 1764 p. 75 n. 659.
Mutilla acarorum Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 968 n. 9.
—— Degeer, Mém. hist. Insect. II. 1. 1771 p. 907 n. 19; T. 31 F. 19-21.
Ichneumon acarorum Fabricius, Syst. entom. 1774 p. 344 n. 99.
—— Ph. F. Gmelin, Onomatol. hist. nat. V. 1775 p. 396.
Mutilla acervorum Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 921 n. 9.
Mutilla acarorum O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 166 n. 1938.
—— Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 206 n. 19; T. 31 F. 19-21.
Ichneumon acarorum Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 441 n. 128.
Ichneumon nigricornis Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 70 n. 290.

Ichneumon acarorum Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 271 n. 151.
Mutilla acarorum Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 341 n. 3.
Ichneumon acarorum Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2716 n. 216.
Ichneumon (Mutilla) acarorum Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 376.
Ichneumon acarorum Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 204 n. 198.
Ichneumon acarorum Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 191 n. 243.
Ichneumon acarorum Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 165 n. 513.
Ichneumon acarorum Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 66 n. 86.
Cryptus acarorum Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 92 n. 99.
Ichneumon acarorum Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110, ♀.
Cryptus acarorum Panzer, Faun. Insect. German. X. 1812 P. 109 T. 10.
Ichneumon acarorum Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 101 n. 20, ♀.
Gelis acarorum Thunberg, Nov. acta soc. sc. Upsal. IX. 1827 p. 202.
Pezomachus acarorum Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 919 n. 311, ♀.
Cryptus acarorum Trentepol, Isis 1829 p. 824 n. 6, ♀.
Pezomachus acarorum Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 145 n. 41, ♀.
Pezomachus acarorum Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 226 n. 17.
Pezomachus acarorum Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1017 n. 37, ♀ ♂.

aemulus Först. — ♀ — Eur.
Pezomachus aemulus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 178 n. 86, ♀.

affinis Magr. — ♀ — Eur.: Italia.
Pezomachus affinis Magretti, Bull. soc. entom. Ital. XVI. 1884 p. 100 n. 12, ♀; T. 2 F. 1.

ageletes Först. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus ageletes Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 51 n. 187, ♂.
Pezomachus ageletes Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 229 n. 46.

agilis (Fabr.) Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Insectum apterum Brünnich, Prodr. insectol. Siaelland. 1761 p. 30 n. 20.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 361 n. 90.
? Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 362 n. 91.
? —— Degeer, Mém. hist. Insect. II. 1. 1771 p. 903 n. 17; T. 31 F. 18.
Ichneumon agilis Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 344 n. 97.
? —— Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 203 n. 17; T. 31 F. 18.
? Ichneumon cursor Schrank, Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin. I. 1780 p. 308.
Ichneumon agilis Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 441 n. 126.
? Ichneumon fuscicornis Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 70 n. 288.
? Ichneumon carpini Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 424 n. 91.
? Ichneumon apterus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 425 n. 92.
Ichneumon agilis Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 271 n. 149.
? Ichneumon fuscicornis Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 215 n. 266.
? Ichneumon carpini Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 217 n. 271.
? Ichneumon apterus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 217 n. 272; T. 8 F. 9.
? Ichneumon bicolor Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 218 n. 275; T. 8 F. 10.
? Ichneumon fuscicornis Villers, C. Linnaei Entom. IV. 1789 p. 550 n. 266.
Ichneumon agilis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2710 n. 214.
? Ichneumon cursor Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2717 n. 220.
? Ichneumon (Mutilla) hortensis Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 375; T. 39 F. 11.
? Ichneumon agilis Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 376.
? Ichneumon agilis Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 204 n. 196.
? Ichneumon carpini Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 205 n. 204.

---

[1]) *Col.:* Cionus fraxini (Kawall). — *Lep.:* Coleophora spec. (Ratzeburg).

? Ichneumon celer Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 205 n. 205.
Ichneumon agilis Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 190 n. 239.
? Ichneumon pulicarius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 191 n. 241.
? Ichneumon pulicarius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 84 T. 15.
? Ichneumon cursor Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 298 n. 2121, ♀.
? Ichneumon agilis Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 302 n. 2131, ♂.
? Ichneumon agilis Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 66 n. 85.
? Ichneumon carpini Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 67 n. 89.
? Ichneumon celer Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 67 n. 90.
Cryptus agilis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 91 n. 95.
? Cryptus pulicarius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 91 n. 97.
? Cryptus pulicarius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 71.
? Ichneumon agilis Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀.
? Ichneumon pulicarius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀.
? Ichneumon agilis Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 45 n. 15, ♀ ♂.
Ichneumon carpini Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 107 n. 1.
? Ichneumon pulicarius Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 108 n. 3.
Gelis agilis Thunberg, Nov. acta soc. sc. Upsal. IX. 1827 p. 200.
? Gelis pulicarius Thunberg, Nov. acta soc. sc. Upsal. IX. 1827 p. 201.
Pezomachus agilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 894 n. 303, ♀ ♂.
Ichneumon carpini Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1094 n. 340.
? Ichneumon pulicarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1095 n. 342.
Cryptus agilis Trentepol, Isis 1829 p. 823 n. 4.
? Cryptus pulicarius Trentepol, Isis 1829 p. 824 n. 5, ♀ ♂.
Cryptus (Pezomachus) agilis Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 371 n. 18, ♀ ♂.
Pezomachus agilis Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 314 n. 3.
Ichneumon (Pezomachus) agilis Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 28 n. 32; T. 7 F. 5.
Pezomachus agilis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 153 n. 1, ♀ ♂; T. 7 F. 5.
Pezomachus agilis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 122 n. 1.
Pezomachus agilis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 171 n. 77, ♀ [non Grav.].
Pezomachus agilis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 146 n. 2.
Pezomachus agilis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 430 n. 3, ♀.
Pezomachus agilis Kawall, Stettin. entom. Zeitg XVI. 1855 p. 231 n. 20.
Pezomachus agilis Goureau, Ann. soc. entom. France (4) II. 1862 Bull. p. II, ♀.
Pezomachus agilis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 227 n. 24.
Pezomachus agilis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1016 n. 35, ♀ ♂.

alacer Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus alacer Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 188 n. 100, ♀.

alaskensis Ashm. — ♀ — Am.: Alaska.
Pezomachus Alaskensis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 421, ♀.

albicinctus Ruthe — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus albicinctus Ruthe, Berlin. entom. Zeitschr. III. 1859 p. 125, ♀ ♂.

alienus Förest. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus alienus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 152 n. 50, ♀.

alternatus Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Pezomachus alternatus Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 64, ♀.

ambulans Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus ambulans Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 40 n. 173, ♂.

analis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Pezomachus analis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 170 n. 76, ♀.

Pezomachus analis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 230, ♀.
Pezomachus analis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1010 n. 22, ♀ ♂.
anceps Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus bicolor var. 4 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 904 n. 304, ♀.
Pezomachus anceps Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 227 n. 153, ♀.
anguineus Först. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus anguineus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 39 n. 172, ♂.
Pezomachus anguineus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 229 n. 42.
annulicornis (Bridgm.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
? Pezomachus juvenilis Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 136 n. 72.
Hemimachus annulicornis (Marshall) Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 160, ♀ ♂.
Pezomachus annulicornis m.
anthracinus Först.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Pezomachus anthracinus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 123 n. 11, ♀.
Pezomachus anthracinus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 147, ♂.
Hemimachus anthracinus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 159, ♂.
Pezomachus anthracinus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 225 n. 6.
Pezomachus anthracinus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1008 n. 18, ♀ ♂.
applanatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus applanatus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 143 n. 38, ♀.
aquisgranensis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pezomachus Aquisgranensis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 117 n. 2, ♀.
Pezomachus Aquisgranensis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1001 n. 3, ♀ ♂.
Pezomachus Aquisgranensis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 297 n. 13.
var. **quadrifasciatus** Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania. [p. 297, ♀.
Pezomachus Aquisgranensis var. quadrifasciata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899
aries Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus aries Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 194 n. 108, ♀.
astutus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus astutus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 176 n. 84, ♀.
attentus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus attentus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 163 n. 66, ♀.
audax Först.[2] — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus audax Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 172 n. 79, ♀.
avarus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus avarus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 214 n. 134, ♀.
avidus Först. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus hortensis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 717, ♂.
Pezomachus hortensis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 907, ♂ [excl. ♀].
Pezomachus avidus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 33 n. 163, ♂.
Hemiteles albipennis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 159 n. 32, ♂.
Hemimachus avidus Marshall, Entomol. Annual f. 1874 p. 127.
Hemimachus albipennis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 159, ♂.
Hemimachus (Pezomachus) avidus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 229.
bellicosus Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania, Italia.
? Pezomachus bicolor var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 904 n. 304.
Pezomachus bellicosus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 141 n. 36, ♀.

---

1) *Lep.:* Elachista subnigrella (Fletcher).
2) *Lep.:* Cheimatobia brumata (Förster).

Pezomachus bellicosus Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 18, ♀; T. 12 F. 4.
Pezomachus bellicosus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 226 n. 15.
Pezomachus bicolor Destefani, Natural. Sicil. III. 1884 p. 154, ♀.

bicinctus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus bicinctus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 158 n. 58, ♀.

bicolor (Vill.) Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon bicolor Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 218 n. 275; T. 8 F. 10.
Cryptus pulicarius Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 265 n. 3778.
? Ichneumon agilis Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 45 n. 15, ♀.
Ichneumon pulicarius Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 99 n. 18, ♀.
Pezomachus bicolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 717.
Pezomachus bicolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 904 n. 304, ♀ [excl. ♂ & varr.].
Pezomachus bicolor Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 253, ♀ ♂.
Pezomachus bicolor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 154 n. 3, ♀.
Pezomachus bicolor Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 174 n. 81, ♀.
Pezomachus bicolor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 147 n. 4.
Pezomachus bicolor Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 430 n. 4.
Pezomachus bicolor Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 227 n. 25.

blandus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus blandus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 192 n. 106, ♀.

brachyurus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus brachyurus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 184 n. 95, ♀.

breviceps Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pezomachus breviceps Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1017 n. 39, ♀ ♂.

brevis Bridgm. — Eur.: Britannia.
Pezomachus brevis Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 162.
Pezomachus brevis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 226.

bruneus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus brunneus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N.F. VII. P. 3. 1890 p. 107 n. 26, ♀.

californicus Ashm. — ♀ — Am.: California.
Pezomachus Californicus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 421, ♀.

callidus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus callidus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 214 n. 135, ♀.

calvus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pezomachus calvus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 205 n. 122, ♀.
Pezomachus calvus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 351, ♀.
Pezomachus calvus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1014 n. 30, ♀ ♂.

canadensis Cress. — ♀ — Am.: Canada, Illinois.
Pezomachus Canadensis Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 62.
Pezomachus Quebecensis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 330.
Pezomachus Canadensis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 114b, ♀.
Pezomachus Canadensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 347, ♀.

canaliculatus Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus hortensis var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 908 n. 305, ♀.
Pezomachus canaliculatus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 229 n. 155, ♀.
Pezomachus canaliculatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 228 n. 39.

carbonarius Destef. — ♀ — Eur.: Sicilia.
Pezomachus carbonarius Destefani, Natural. Sicil. III. 1884 p. 157, ♀.

---

[1]) *Hymen.:* Cynips rhizomatis (Giraud), Microgaster nemorum (Hartig).

carnifex Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus carnifex Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 148 n. 44, ♀.
Pezomachus carnifex Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 226 n. 19.
cautus Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus bicolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 904 n. 304 [p. p.].
Pezomachus cautus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 190 n. 103, ♀.
Pezomachus cautus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 227 n. 28.
celer Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus celer Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 206 n. 123, ♀.
circumcinctus Först.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus circumcinctus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 178 n. 87, ♀.
Pezomachus circumcinctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N.F. IV. P. 3. 1878 p. 204 [n. 9, ♀ ♂.
clavipes (Thunbg.) D. T.! — Eur.?
Gelis clavipes Thunberg, Nov. acta soc. sc. Upsal. IX. 1827 p. 202.
Pezomachus clavipes m.
comes Först.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pezomachus comes Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 163 n. 65, ♀.
Pezomachus comes Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1010 n. 23, ♀ ♂.
Pezomachus comes Magretti, Atti soc. Ital. sc. nat. XXXVI. 1896 p. 85.
confusus (Bridgm. & Fitch) D. T. — ♂ — Eur.: Britannia.
Hemimachus confusus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 159, ♂.
Pezomachus confusus m.
congruus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus congruus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 217 n. 139, ♀.
consobrinus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus consobrinus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 181 n. 91, ♀.
consociatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus consociatus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 222 n. 145, ♀.
constrictus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus constrictus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 36 n. 168, ♂.
conveniens Först.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus conveniens Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 57 n. 195, ♂.
Pezomachus analis var. Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 170 n. 76, ♀.
Pezomachus dubitator Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 161, ♂.
Pezomachus ? conveniens Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 229, ♀.
corruptor Först.[4]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Batavia.
Pezomachus corruptor Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 150 n. 47, ♀.
Pezomachus insidiosus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 44 n. 179, ♂.
Pezomachus dysalotus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 61 n. 201, ♂.
Pezomachus corruptor Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 18; T. 12 F. 10.
Pezomachus corruptor Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 226 n. 22.
Pezomachus insidiosus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 229 n. 43.
Pezomachus dysalotus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 229 n. 48, ♀.
Pezomachus corruptor Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1016 n. 34, ♀.
Pezomachus corruptor Bridgman, Entom. M. Magaz. XXV. 1888 p. 185, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Microgaster spec. (Brischke).
2) *Lep.:* Cemiostoma spartifoliella (Magretti).
3) *Lep.:* Zygaena filipendulae (Bridgman).
4) *Lep.:* Taleporia triquetrella (Fletcher). — *Arachn.:* Agraeca brunnea (Giraud).

costatus Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Pezomachus costatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 341, ♀.
cressonii D. T. — ♀ ♂ — Am.: Pennsylvania.
Pezomachus gentilis Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 61, ♀ ♂ [nec Förster].
Pezomachus Cressonii m.
currens Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus currens Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 183 n. 94, ♀.
cursitans (Fabr.) Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
—— Degeer, Mém. hist. Insect. II. 1. 1771 p. 906 n. 18.
Ichneumon cursitans Fabricius, System. entom. 1775 p. 344 n. 98.
—— Götze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 205 n. 18.
Ichneumon cursitans Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 441 n. 127.
Ichneumon ruficornis Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 70 n. 289.
Ichneumon cursitans Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 271 n. 150.
Ichneumon ruficornis Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 215 n. 267.
Ichneumon cursitans Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2716 n. 215.
Ichneumon cursitans Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 376.
Ichneumon cursitans Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 204 n. 197.
Ichneumon cursitans Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 191 n. 240.
Cryptus cursitans Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 91 n. 96.
Ichneumon cursitans Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110, ♀.
Cryptus cursitans Panzer, Faun. Insect German. X. 1812 P. 109 T. 9.
Ichneumon cursitans Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 104 n. 22, ♀.
Gelis cursitans Thunberg, Nov. acta soc. sc. Upsal. IX. 1827 p. 200.
? Hemiteles palpator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 818 n. 252, ♂ [excl. ♀].
Pezomachus cursitans Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 923 n. 313, ♀.
Cryptus cursitans Trentepol, Isis 1829 p. 826 n. 8.
Cryptus (Pezomachus) cursitans Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 372 n. 22, ♀.
Pezomachus cursitans Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 153 n. 4, ♀.
Pezomachus cursitans Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 126 n. 2, ♀.
Pezomachus cursitans Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 200 n. 115, ♀.
Pezomachus cursitans Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 149 n. 9.
Hemiteles variabilis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 158 n. 31, ♂.
Pezomachus cursitans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 2. 1877 p. 3 n. 3, ♀ ♂.
Pezomachus cursitans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 202 n. 3, ♀ ♂.
Pezomachus cursitans Bridgman & Fitch, Entomologist, XVI. 1883 p. 228 n. 33.
Pezomachus cursitans Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1014 n. 31, ♀ ♂.
cyanurus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus cyanurus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 226 n. 152, ♀.
Pezomachus cyanurus Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1875 p. 18, ♀; T. 12 F. 6.
debeyi Förest. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus Debeyii Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 142 n. 37, ♀.
Pezomachus Debeyii Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 106 n. 21.
debilis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus debilis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 168 n. 73, ♀.
decipiens Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus decipiens Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 200 n. 116, ♀.
Pezomachus decipiens Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 350, ♀.

---

1) *Lep.:* Lasiocampa pini, Tortrix piceana (Ratzeburg), Orgyia gonostigma (Brischke). — *Hymen.:* Cimbex femorata, Lophyrus pini, Microgaster spec. (Brischke).

declivis Först. — ♀ — Eur.: Germania? Italia?
Pezomachus agilis var. 5 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 899, ♀.
Pezomachus declivis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 130 n. 21, ♀.
decurtatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus decurtatus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 38 n. 171, ♂.
denudatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus denudatus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 230 n. 156, ♀.
Pezomachus denudatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 351, ♀.
derasus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus derasus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 224 n. 148, ♀.
detritus Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus detritus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 196 n. 111, ♀.
Pezomachus detritus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 228 n. 31.
dimidiatus Cress. — ♀ — Am.: Massachusetts, Illinois.
Pezomachus dimidiatus Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 63, ♀.
discedens Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus vagans var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 890 n. 302, ♀.
Pezomachus discedens Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 204 n. 121, ♀.
distinctus Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus distinctus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 155 n. 54, ♀.
Pezomachus distinctus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 227.
doliopus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus doliopus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 43 n. 177, ♂.
dubitator Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus dubitator Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 191 n. 105, ♀.
ecarinatus Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus ecarinatus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 135 n. 28, ♀.
Pezomachus ecarinatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 226 n. 11.
edentatus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pezomachus edentatus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 125 n. 13, ♀.
Pezomachus edentatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 18, ♀; T. 12 F. 2.
Pezomachus edentatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1011 n. 26, ♀ ♂.
egregius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus egregius Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 30 n. 159, ♂.
elaphrus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pozomachus elaphrus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 44 n. 178, ♂.
emarcidus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus emarcidus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 166 n. 70, ♀.
ephippiger Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus ephippiger Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 207 n. 125, ♀.
ephippium Rdw. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemimachus ephippium Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 271.
erythropus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus erythropus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 43 n. 176, ♂.
exareolatus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pezomachus exareolatus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 122 n. 9, ♀.
Pezomachus exareolatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1008 n. 17, ♀ ♂.
facialis Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus facialis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 72, ♀.

fallax Förat. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus agilis var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 894 n. 303, ♀.
Pezomachus fallax Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 139 n. 34, ♀.
faunus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus faunus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 165 n. 68, ♀.
festinans Grav. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
? Ichneumon festinans Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 232 n. 247.
? Cryptus festinans Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 92 n. 103.
? Ichneumon festinans Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807, ♀.
Ichneumon festinans Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 106 n. 23, ♀ [excl. syn.].
? Gelis festinans Thunberg, Nov. acta soc. sc. Upsal. IX. 1827 p. 201.
Pezomachus festinans Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 926 n. 314, ♀ [excl. syn.].
? Cryptus festinans Trentepol, Isis 1829 p. 826 n. 9, ♀.
Pezomachus festinans Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 121 n. 8, ♀.
Pezomachus festinans Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 225 n. 5.
filicornis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus filicornis Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 31 n. 161, ♂.
flavipes Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus flavipes Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 127 n. 17, ♀.
flavocinctus Ashm. — ♀ — Am.: Texas.
Pezomachus flavocinctus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 421, ♀.
foersteri Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Pezomachus Försteri Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 343.
formicarius (L.) Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia Germania.
Mutilla formicaria Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 583 n. 8.
Mutilla formicaria Linné, Pand. Insect. 1758 T. 3 F. 219 n. 8.
Mutilla formicaria Linné, Amoen. acad. V. 1758 T. 3 F. 219 n. 8.
Mutilla formicaria Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 428 n. 1728.
Mutilla formicaria Sulzer, Kennz. d. Insect. 1761 p. 52; T. 19 F. 126.
Ichneumon formicarius Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 938 n. 61.
Mutilla formicaria Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 968 n. 10.
Ichneumon formicarius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 345 n. 101.
Mutilla formicaria Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 397 n. 4.
Ichneumon formicarius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 858 n. 61.
Mutilla formicaria Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 921 n. 10.
Ichneumon formicarius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 441 n. 130.
Mutilla formicaria Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 495 n. 4.
Ichneumon formicarius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 271 n. 154.
Mutilla formicaria Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 311 n. 5.
Mutilla formicaria Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 342 n. 4.
Ichneumon formicarius Gmélin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2717 n. 219.
Mutilla formicaria Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2806 n. 11.
Mutilla formicaria Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 151.
Ichneumon formicaria Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 376.
Ichneumon formicarius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 204 n. 201.
Mutilla formicaria Latreille, Journ. hist. nat. II. 1792 p. 99 n. 1.
Ichneumon formicarius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 192 n. 246.
Mutilla formicaria Fabricius, Entom. System. II. 1794 p. 368 n. 6.
Cryptus formicarius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 92 n. 102.
Mutilla formicaria Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 430 n. 7.
Mutilla formicaria Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 274; T. 13 F. 7ª.

Mutilla formicaria Olivier, Encycl. méthod. Insect. VIII. 1811 p. 56 n. 9.
Ichneumon formicarius Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 98 n. 17, ♀.
Mutilla formicaria Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 100 n. 6.
Pezomachus formicarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 915 n. 308, ♀.
Pezomachus formicarius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 315 n. 4 [non 41].
Pezomachus formicarius Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 151 n. 49, ♀.
Pezomachus formicarius Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 18, ♀; T. 12 F. 9.
Pezomachus formicarius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 350, ♀.
Pezomachus formicarius Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1004 n. 10, ♀ ♂.

forticornis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus forticornis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 135 n. 29, ♀.
Pezomachus forticornis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 226 n. 12.

fraudulentus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus fraudulentus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 162 n. 64, ♀.
Pezomachus fraudulentus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 350, ♀.

frontalis (Thnbg.) D. T.! — Eur.
Gelis frontalis Thunberg, Nov. acta soc. sc. Upsal. IX. 1827 p. 204.
Pezomachus frontalis m.

fugitivus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus fugitivus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 58 n. 197, ♂.

furax Först. — ♀ ♂ — Er.: Germania.
Pezomachus furax Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 185 n. 96, ♀.
Pezomachus furax Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 2. 1877 p. 6 n. 13, ♀.
Pezomachus furax Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 106 n. 22, ♀ ♂.

furtivus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus furtivus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 189 n. 101, ♀.

fuscicornis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus fuscicornis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 202 n. 119, ♀.

fusculus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus fusculus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 35 n. 166, ♂.

gentilis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus gentilis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 219 n. 142, ♀.

geochares Först.[1] — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus geochares Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 231 n. 158, ♀.
Pezomachus geochares Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 147 n. 5.
Pezomachus geochares Bridgman & Fitch, Entomologist, XVI. 1883 p. 229.

glabratus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus glabratus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 222 n. 146, ♀.

gonatopinus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pezomachus gonatopinus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1008 n. 19, ♀ ♂.

gracilis Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus bicolor var. 6 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 905 n. 304.
Pezomachus gracilis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 209 n. 127, ♀.
Pezomachus gracilis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 228 n. 35.

gracillimus D. T. — ♀ — Am.: Pennsylvania.
Pezomachus gracilis Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 63, ♀ [non Förster].
Pezomachus gracillimus m.

grandiceps Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pezomachus grandiceps Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1007 n. 15.

---

[1]) *Lep.:* Tortrix piceana (Ratzeburg).

gravenhorstii Fonsc.[1]) — ♀ — Eur.: Gallia.
Pezomachus Gravenhorsti Fonscolombe, Mém. acad. sc. Aix V. 1845 p. 414.
Pezomachus Gravenhorstii Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 428 n. 2, ♀.
helvolus Förat. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus helvolus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 165 n. 69, ♀.
heydenii Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus Heydeni Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 31 n. 160, ♂.
hieracii Bridgm.[2]) — Eur.: Britannia.
Pezomachus hieracii Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 162.
Pezomachus hieracii Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 225.
higgii Dest. — ♀ — Eur.: Sicilia.
Pezomachus Higgii Destefani, Natural. Sicil. III. 1884 p. 154, ♀.
histrio Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus histrio Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 57 n. 196, ♂.
hoffmannseggii Grav. — ♀ — Eur.: Britannia, Lusitania, Gallia.
Ichneumon Hoffmannseggii Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 100 n. 19, ♀.
Pezomachus Hoffmannseggii Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 918 n. 310, ♀.
Pezomachus Hoffmannseggii Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 431 n. 5.
Pezomachus Hoffmannseggii Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 229 n. 18.
hortensis Grav.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
? Ichneumon (Mutilla) hortensis Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 375; T. 39 F. 11.
Ichneumon agilis Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 45 n. 15 var.
Pezomachus hortensis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 717, ♂.
Pezomachus hortensis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 907 n. 305 [excl. ♂ & Syn.].
Pezomachus hortensis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 154 n. 4.
Pezomachus hortensis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 126 n. 5.
Pezomachus hortensis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 173 n. 80, ♀ ♂.
Pezomachus hortensis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 147 n. 3.
Pezomachus hortensis Marshall, Entom. M. Magaz. VIII. 1872 p. 180.
Pezomachus hortensis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 2. 1877 p. 6 n. 11, ♀♂.
Pezomachus hortensis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 204 n. 10, ♀♂.
Pezomachus spec. Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 205 n. 10, ♀♂.
hostilis Först.[4]) — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus hostilis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 223 n. 147, ♀.
humilis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus agilis var. 4 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 895.
Pezomachus humilis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 198 n. 113, ♀.
hyponomeutae (Bridgm.) D. T.[5]) — ♂ — Eur.: Britannia.
Hemimachus hyponomeutae Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 155, ♂.
Hemimachus hyponomeutae Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 159, ♂.
Pezomachus hyponomeutae m.
imbecillus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus imbecillus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 55 n. 192, ♂.

---

1) *Col.:* Cionus fraxini (Fonscolombe, Rondani).
2) *Hymen.:* Aulax hieracii (Billups).
3) *Lep.:* Hyponomeuta padella (Ratzeburg), Ocneria dispar (Brischke), Psyche constancella (Giraud). — *Hymen.:* Microgaster spec. (Brischke).
4) *Hymen.:* Microgaster spec. (Brischke).
5) *Lep.:* Hyponomeuta evonymella (Mosley).

imbellis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus imbellis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 125 n. 14, ♀.
immaturus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus immaturus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 225 n. 150, ♀.
impotens Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus hortensis var. 6 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 910.
Pezomachus impotens Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 221 n. 144, ♀.
incertus Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus incertus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 160 n. 61, ♀.
Pezomachus incertus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 227.
incubitor Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus incubitor Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 169 n. 74, ♀.
indagator Först. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus indagator Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 47 n. 182, ♂.
Pezomachus indagator Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 59, ♂; T. 37 F. 9.
Pezomachus indagator Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 229 n. 45.
ineptus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pezomachus ineptus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 120 n. 6, ♀.
Pezomachus ineptus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1006 n. 12, ♀ ♂.
inermis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus hortensis var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 908.
Pezomachus inermis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 136 n. 30, ♀.
infirmus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus agilis var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 894.
Pezomachus infirmus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 202 n. 118, ♀.
inquilinus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus inquilinus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 211 n. 130, ♀.
insectator Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus bicolor var. 6 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 905.
Pezomachus insectator Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 210 n. 129, ♀.
insolens Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania?
Pezomachus bicolor var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 903.
Pezomachus insolens Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 230 n. 157, ♀.
Pezomachus insolens Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 229 n. 40.
insolitus How.[1]) — ♀ — Am.: Columbia.
Pezomachus insolitus Howard, Bull. Dep. Agric. Entom. Techn. V. 1897 p. 33, ♀.
inspector Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus inspector Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 48 n. 183, ♂.
instabilis Först.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Hemiteles rufocinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 811 n. 246, ♂.
Pezomachus vagans var. 4 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 892, ♀.
Pezomachus agilis var. 4^b Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 896, ♀.
Pezomachus instabilis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 195 n. 110, ♀.
Pezomachus instabilis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 148 n. 6, ♀.
? Hemiteles rufocinctus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 157 n. 28, ♂.
? Hemiteles rufocinctus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 35 n. 7.

---

1) *Lep.:* Orgyia leucostigma (Ashmead).
2) *Lep.:* Zygaena filipendulae (Bignell). — *Col.:* Cionus scrophulariae (Rondani). — *Hymen.:* Microgaster perspicuus (Förster).

Pezomachus instabilis Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 369 n. 50, ♀.
? Hemiteles rufocinctus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p.127 n. 28, ♂.
Pezomachus instabilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 2. 1877 p. 5 n. 8, ♀♂.
Pezomachus instabilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 203 n. 8, ♀♂.
? Hemiteles rufocinctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 347, ♂.
? Hemiteles rufocinctus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 102 & 159, ♂.
Hemimachus instabilis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 228.
? Hemimachus rufocinctus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 158.
Pezomachus instabilis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1015 n. 33, ♀ ♂.
Pezomachus instabilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 71, ♀.

integer Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus integer Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 172 n. 78, ♀.

intermedius Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus intermedius Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 156 n. 55, ♀.
Pezomachus intermedius Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 227.

juvenilis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus juvenilis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 168 n. 72, ♀.
Hemimachus juvenilis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 159 & 227, ♂.

keenii Harrgt. — ♀ — Am.: Canada.
Pezomachus Keenii Harrington, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 214, ♀.

kiesenwetteri Först. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Pezomachus Kiesenwetteri Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 133 n. 26, ♀.
Pezomachus Kiesenwetteri Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 226 n. 10.
Pezomachus Kiesenwetteri Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1004 n. 9, ♀ ♂.

kriechbaumeri D. T. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Pezomachus canaliculatus Kriechbaumer, Termész. Füzet. XIX. 1896 p. 129, ♀ [non **Förster**].
Pezomachus Kriechbaumeri m.

languidus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus languidus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 183 n. 93, ♀.

latrator Först.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus bicolor var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 903.
Pezomachus latrator Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 215 n. 136, ♀.
Pezomachus latrator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 148 n. 7, ♀.
Pezomachus latrator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 2. 1877 p. 4 n. 5, ♀♂.
Pezomachus latrator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 203 n. 5, ♀.
Pezomachus latrator Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 228 n. 36.

latro Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus latro Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 228 n. 154, ♀.

lepidus Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus hortensis var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 909.
Pezomachus lepidus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 220 n. 143, ♀.
Pezomachus lepidus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 228 n. 37.

leptogaster Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus leptogaster Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 131 n. 22, ♀.

linearis Först. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus linearis Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 45 n. 180, ♂.
Pezomachus linearis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 229 n. 44.

lividus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus lividus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 182 n. 92, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Lasiocampa pini (Ratzeburg).

longulus Zett. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Cryptus (Pezomachus) longulus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 371 n. 19, ♀.
lucidulus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pezomachus vagans var. 4, ♀ & 2, ♂ Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 891 & 892.
Pezomachus lucidulus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 138 n. 33, ♀ ♂.
Pezomachus lucidulus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1012 n. 27, ♀.
lugubris Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus lugubris Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 137 n. 31, ♀.
lustrator Först. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus lustrator Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 38 n. 170, ♂.
Pezomachus lustrator Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 229 n. 41.
lutescens Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus lutescens Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 161 n. 63, ♀.
macer Cress. — ♂ — Am.: Pennsylvania.
Pezomachus macer Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 64, ♂.
mandibularis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pezomachus mandibularis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1009 n. 21, ♀ ♂.
marginatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus marginatus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 52 n. 188, ♂.
meabilis Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Pezomachus meabilis Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 62, ♀.
mediocris Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus mediocris Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 144 n. 39, ♀.
meigenii Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus Meigenii Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 218 n. 140, ♀.
Pezomachus Meigenii Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 18, ♀; T. 12 F. 11.
melanocephalus (Schrk.) Kriechb.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Mutilla melanocephala Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 416 n. 841.
Mutilla melanocephala Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 344 n. 10.
Ichneumon fasciatus Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 191 n. 242.
Ichneumon fasciatus Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 79 T. 14.
Cryptus fasciatus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 92 n. 98.
Cryptus fasciatus Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 71.
Ichneumon fasciatus Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110, ♀.
Ichneumon fasciatus Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 42 n. 14, ♀.
Gelis fasciatus Thunberg, Nov. acta soc. sc. Upsal. IX. 1827 p. 202.
? Hemiteles luteiventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 812 n. 247, ♂.
Pezomachus fasciatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 889 n. 301, ♀.
Cryptus fasciatus Trentepol, Isis 1829 p. 823 n. 3.
Cryptus (Pezomachus) fasciatus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 372 n. 21, ♀.
Pezomachus fasciatus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 217 n. 138, ♀.
Pezomachus fasciatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 149 n. 8, ♀.
Hemiteles fasciatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 157 n. 26, ♂.
Pezomachus fasciatus Smith, Entomol. Annual f. 1860 p. 94.
Pezomachus fasciatus Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) V. P. 5. 1860 p. 209, ♀.
Hemiteles (Pezomachus) fasciatus Blackwell, Hist. Spiders Great Britain I. 1864, ♀; T. 12 [Fig. AA.
? Hemiteles luteiventris Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 133 n. 46, ♂.
Pezomachus fasciatus Marshall, Entom. M. Magaz. VIII. 1872 p. 180, ♀.

---

[1]) *Arachn.:* Lycosa pullata (Bignell).

Hemimachus fasciatus Marshall, Entom. M. Magaz. VIII. 1872 p. 181.
Pezomachus fasciatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 18, ♀; T. 12 F. 7.
Pezomachus fasciatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 2. 1877 p. 4 n. 4, ♀♂.
Pezomachus fasciatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 204 n. 4, ♀♂.
Hemimachus fasciatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 159 n. 3, ♂ & p. 228.
Pezomachus fasciatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1013 n. 28, ♀ ♂.
Pezomachus melanocephalus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 298 n. 14.

melanophorus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus melanophorus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 52 n. 189, ♂.

micariae How. — ♀ ♂ — Am.: Massachusetts.
Pezomachus micariae Howard, Proc. Entom. Soc. Washington 1892 p. 294 n. 16, ♀ ♂.

microcephalus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus microcephalus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 34 n. 165, ♂.

microstylus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus microstylus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 46 n. 181, ♂.

micrurus Först.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Pezomachus micrurus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 187 n. 98, ♀.
Pezomachus micrurus P. Cambridge, Entomologist XIV. 1881 p. 137.
Pezomachus micrurus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 350, ♀.
Pezomachus micrurus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 227.
Pezomachus micrurus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1007 n. 16, ♀ ♂.

migrator Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus migrator Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 48 n. 184, ♂.

minimus Walsh[2] — ♀ ♂ — Am.: Illinois, Missouri.
Pezomachus minimus Walsh, Insect. injur. Illinois 1861 p. 43.
Pezomachus minimus Walsh, Riley: 2d Ann. Rep. Insect. Missouri 1870 p. 52; Fig. 20 & 21.
Pezomachus minimus Packard, 9th Rep. U. St. Geol. & Geogr. Surv. f. 1875. 1877 p. 705.
Pezomachus minimus Riley, 11th Ann. Rep. Insect. Missouri 1876 p. 54; Fig. 36 & 37.
Pezomachus minimus Thomas, 10th Rep. State Entomol. Illinois f. 1880. 1881 p. 40.
Pezomachus minimus Riley, 3th Rep. U. St. Entom. Commiss. 1883 p. 127; T. 2 F. 7 & 9.

modestus Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus vagans var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 891.
Pezomachus modestus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 154 n. 53, ♀.
Pezomachus modestus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 227 n. 23.

molestus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus molestus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 175 n. 82, ♀.

muelleri Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus Mülleri Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 159 n. 60, ♀.
Pezomachus Mülleri Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 227.

myrmecinus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pezomachus myrmecinus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1001 n. 2, ♀ ♂.

nanus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus nanus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 132 n. 24, ♀.

navus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus navus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 55 n. 193, ♂.

neesii Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus Neesii Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 118 n. 3, ♀.
Pezomachus Neesi Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 18, ♀; T. 12 F. 1.
Pezomachus Neesii Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 225 n. 2.

---

1) *Arachn.:* Ocyale mirabilis, Lycosa amentata (Bignell).
2) *Lep.:* Leucania unipuncta (Haw.).

niger Brischke[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus niger Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 205 n. 11, ♀♂.
nigerrimus D. T. — ♀ — Am.: Canada.
Pezomachus niger Provancher, Addit. faun. Canada. 1888 p. 362 n. 3, ♀ [nec **Brischke**].
Pezomachus nigerrimus m.
nigricornis Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus agilis var. 4 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 895.
Pezomachus nigricornis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 140 n. 35, ♀.
Pezomachus nigricornis Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1875 p. 18, ♀; T. 12 F. 5.
Pezomachus nigricornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 350, ♀.
Pezomachus nigricornis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 226 n. 14.
nigritulus Zett. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Cryptus (Pezomachus) nigritulus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 372 n. 20, ♀.
nigritus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Pezomachus nigritus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 128 n. 19, ♀.
Pezomachus nigritus Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 18, ♀; T. 12 F. 3.
Pezomachus nigritus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 226.
Pezomachus nigritus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1005 n. 11, ♀ ♂.
nomas Först.[2]) — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus nomas Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 32 n. 162, ♂.
notabilis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus notabilis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 197 n. 112, ♀.
obscurus Cress. — ♀ — Am.: New Jersey.
Pezomachus obscurus Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 62, ♀.
ochraceus Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus ochraceus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 149 n. 46, ♀.
Pezomachus ochraceus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 226 n. 21.
ocissimus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus ocissimus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 36 n. 167, ♂.
ottowaensis Harrgt. — ♀ — Am.: Canada.
Pezomachus Ottowaensis Harrington, Canad. Entomol. XXVIII. 1896 p. 77, ♀.
ovatus (Bridgm.) D. T. — ♂ — Eur.: Britannia.
Hemimachus ovatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 158, ♂.
Hemimachus ovatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 159, ♂.
Pezomachus ovatus m.
pallidipes Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus pallipes Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 41 n. 174, ♂.
papaveris Först.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus papaveris Förster, Hymen. Stud. II. 1856 p. 119, ♀ ♂.
paradoxus Zett. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Cryptus (Pezomachus) paradoxus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 372 n. 24, ♀.
parvulus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus bicolor var. 5 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 905.
Pezomachus parvulus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 213 n. 133, ♀.
pedicularius (Fabr.) Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
? Ichneumon mutillarius, Syst. entom. 1775 p. 342 n. 82.

---

[1]) *Hymen.:* Microgaster congestus (Brischke).
[2]) *Lep.:* Gracilaria phasianipennella (Brischke).
[3]) *Hymen.:* Cynips rhoeadis (Kaltenbach).

? Ichneumon mutillarius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 437 n. 106.
? Ichneumon mutillarius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 269 n. 124.
? Ichneumon mutillarius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 201 n. 215 & p. 217 n. 274.
? Ichneumon mutillarius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2710 n. 186 & p. 2716 [n. 217.
? Ichneumon mutillarius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 361.
? Ichneumon mutillarius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 199 n. 175.
? Ichneumon mutillarius Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 125 n. 274.
? Ichneumon mutillarius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 183 n. 205 & p. 271 n. 152.
Ichneumon pedicularius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 192 n. 244.
Ichneumon pedicularius Schrökenstein, Verz. d. Halbkäfer etc. 1802 p. 28 n. 91.
? Cryptus mutillarius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 88 n. 81.
Cryptus pedicularius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 92 n. 100.
Ichneumon pedicularius Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 182 n. 15.
Cryptus pedicularius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 72.
Ichneumon pedicularius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110, ♀.
Ichneumon pedicularius Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 103 n. 21, ♀.
Ichneumon pedicularius Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 139 n. 12.
? Ichneumon mutillator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 261.
? Ichneumon mutillator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 312.
Ichneumon pedicularius v. d. Höven, Bijdr. natuurk. Wet. I. 1826 p. 440 n. 14.
Gelis pedicularius Thunberg, Nov. acta soc. sc. Upsal. IX. 1827 p. 203.
Pezomachus pedicularius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 922 n. 312, ♀.
Cryptus pedicularius Trentepol, Isis 1829 p. 825 n. 7, ♀.
Ichneumon pedicularius Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª IV. 1835 p. 351 n. 12.
Cryptus (Pezomachus) pedicularius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 372 n. 23, ♀.
Pezomachus pedicularius Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 199 n. 114, ♀.
Pezomachus pedicularius Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 228 n. 32.
Pezomachus pedicularius Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1015 n. 32, ♀ ♂.

peregrinator Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus peregrinator Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 201 n. 117, ♀.
Pezomachus peregrinator Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 59, ♀; T. 37 F. 8.

pettitii Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Pezomachus Pettiti Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 61.
Pezomachus sulcatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 77 n. 2, ♀.

petulans Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pezomachus bicolor var. 6 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 905.
Pezomachus petulans Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 158 n. 59, ♀.
Pezomachus petulans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 2. 1877 p. 5 n. 7, ♀ ♂.
Pezomachus petulans Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1011 n. 24, ♀ ♂.

piceus (Bridgm.) D. T. — ♂ — Eur.: Britannia.
Hemimachus piceus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 153.
Hemimachus piceus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 159, ♂.
Pezomachus piceus m.

pilosus Capr. — ♀ — Eur.: Britannia.
Pezomachus pilosus Capron, Entom. M. Magaz. XXIV. 1888 p. 217, ♀.

posthumus Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus posthumus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 138 n. 32, ♀.
Pezomachus posthumus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 226 n. 13.

procursorius Först. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus procursorius Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 42 n. 175, ♂.
Pezomachus procursorius Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 230.

proditor Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus proditor Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 147 n. 43, ♀
protuberans Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus protuberans Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 118 n. 4, ♀.
providus Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania?, Gallia?
Pezomachus vagans var. 4 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 892.
Pezomachus providus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 187 n. 99, ♀.
Pezomachus providus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 350, ♀
Pezomachus providus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 227 n. 27.
proximus Först.[1] — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachuns proximus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 216 n. 137, ♀.
Pezomachus proximus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 351, ♀.
Pezomachus proximus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 301 n. 16, ♀.
prudens Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus prudens Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 56 n. 194, ♂.
puberulus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus puberulus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 179 n. 88, ♀.
puerilis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus puerilis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 209 n. 128, ♀.
pulcher Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus pulcher Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 176 n. 83, ♀.
pulex Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus pulex Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 224 n. 149, ♀.
pulicarius Grav.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
? Ichneumon pulicarius Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 191 n. 241.
? Cryptus pulicarius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 91 n. 97.
? Ichneumon pulicarius Jurine; Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀.
? Gelis pulicarius Thunberg, Nov. acta soc. sc. Upsal. IX. 1827 p. 201.
Pezomachus pulicarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 917 n. 300, ♀.
? Cryptus pulicarius Trentepol, Isis 1829 p. 824 n. 5, ♀ ♂.
Pezomachus pulicarius Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 144 n. 40, ♀.
Pezomachus pulicarius Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 226 n. 16.
Pezomachus pulicarius Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 418, ♂.
pumilus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Pezomachus pumilus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 131 n. 23, ♀.
Pezomachus pumilus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 226 n. 9.
Pezomachus pumilus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1006 n. 14. ♀ ♂.
pusillus Destef. — ♀ — Eur.: Sicilia.
Pezomachus pusillus Destefani, Natural. Sicil. III. 1884 p. 156, ♀.
quaesitorius Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus quaesitorius Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 153 n. 51, ♀.
ragusae Destef. — ♀ — Eur.: Sicilia.
Pezomachus Ragusae Destefani, Natural. Sicil. III. 1884 p. 155, ♀.
ratzeburgii Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus Ratzeburgi Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 119 n. 5, ♀.
Pezomachus Ratzeburgi Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 350, ♀.
Pezomachus Ratzeburgi Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 225 n. 3.
reconditus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus reconditus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 126 n. 15, ♀.

---

[1] *Arachn.:* Agraeca brunnea (Giraud). [2] *Lep.:* Coleophora vibicella (Bower).

riggii Destef. — ♀ — Eur.: Sicilia.
Pezomachus Riggii Destefani, Natural. Sicil. III. 1884 p. 154, ♀.

rotundiventris Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus rotundiventris Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 129 n. 20, ♀.

ruficornis (Thnbg.) D. T. — Eur.: Suecia.
Gelis ruficornis Thunberg, Nov. acta soc. sc. Upsal. IX. 1827 p. 204.
Pezomachus ruficornis m.

rufipes (Bridgm.) D. T. — ♂ — Eur.: Britannia.
Hemimachus rufipes Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 157, ♂.
Hemimachus rufipes Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 159, ♂.
Pezomachus rufipes m.

rufogaster (Thnbg.) D. T. — Eur.: Suecia.
Gelis rufogaster Thunberg, Nov. acta soc. sc. Upsal. IX. 1827 p. 203.
Pezomachus rufogaster m.

rufotinctus (Bridgm.) D. T. — ♂ — Eur.: Britannia.
Hemimachus rufotinctus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 155, ♂.
Hemimachus rufotinctus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 159 n. 2, ♂.
Pezomachus rufotinctus m.

rufulus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia. Germania.
Pezomachus rufulus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 148 n. 45, ♀.
Pezomachus rufulus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 226 n. 20.
Pezomachus rufulus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1009 n. 20, ♀ ♂.

rusticus Först.[1] — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus rusticus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 54 n. 191, ♂.

scitulus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus scitulus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 167 n. 71, ♀.

secretus Först. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus secretus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 59 n. 198, ♂.
Pezomachus secretus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 229 n. 47.

sedulus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus sedulus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 212 n. 132, ♀.
Pezomachus sedulus Rudow, Entom. Nachr. IX. 1883 p. 62 n. 12, ♂.

semirufus Destef. — ♀ — Eur.: Sicilia.
Pezomachus semirufus Destefani, Natural. Sicil. III. 1884 p. 156, ♀.

sericeus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pezomachus sericeus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 157 n. 57, ♀.
Pezomachus sericeus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1017 n. 36, ♀ ♂.

sesquifasciatus Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania, Bavaria.
Pezomachus sesquifasciatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 303, ♀.

var. **evanescens** Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania. [p. 303, ♀.
Pezomachus sesquifasciatus var. evanescens Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899

var. **rufiventris** Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus sesquifasciatus var. rufiventris Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 303, ♀.

silvicola Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pezomachus sylvicola Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 134 n. 27, ♀.
Pezomachus sylvicola Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1000 n. 1, ♀ ♂.

simulans Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus simulans Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 123 n. 10, ♀.

---

1) *Lep.:* Tortrix viridana (Giraud).

solitarius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus solitarius Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 50 n. 186, ♂.
sordidus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus sordidus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 186 n. 97, ♀.
Pezomachus sordidus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 107 n. 23.
spadiceus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus spadiceus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 207 n. 124, ♀.
speculator Först.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus speculator Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 190 n. 104, ♀.
Pezomachus speculator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 2. 1877 p. 5 n. 6, ♀ ♂.
Pezomachus speculator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 203 n. 6, ♀ ♂.
spinula Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Pezomachus spinula Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1006 n. 13, ♀ ♂.
spurius Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania?, Italia.
Pezomachus agilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 894 n. 303 [p. p.].
Pezomachus spurius Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 194 n. 109, ♀.
Pezomachus spurius Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 228 n. 30.
squalidus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus squalidus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 126 n. 16, ♀.
stevenii Grav.[2]) — ♀ — Eur.: Britannia, Germania, Tauria.
Pezomachus Stevenii Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 913 n. 306, ♀.
Pezomachus Stevenii Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 226 n. 151, ♀.
Pezomachus Stevenii Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 228 n. 38.
striolatus Ratzbg.[3]) — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus striolatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 146 n. 1, ♀.
subtilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus subtilis Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 33 n. 164, ♂.
tachypus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus tachypus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 53 n. 190, ♂.
Pezomachus tachypus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 50, ♂.
tantillus Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Pezomachus tantillus Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 62, ♀.
tener Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus agilis var. 5 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 899, ♀.
Pezomachus tener Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 120 n. 7, ♀.
Pezomachus tener Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 225 n. 4, ♀.
tentator Först.[4]) — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus tentator Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 60 n. 200, ♂.
terebrator Ratzbg.[5]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Pezomachus terebrator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 126.
Pezomachus terebrator Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 132 n. 25, ♀.
Pezomachus terebrator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 149 n. 10, ♀.
Pezomachus terebrator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 350, ♀.
Pezomachus terebrator Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1003 n. 8, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Microgaster spec. (Brischke).
2) *Lep.:* Coleophora pyrrhulipennella (Giraud).
3) *Lep.:* Tortrix piceana (Ratzeburg).
4) *Lep.:* Hyponomeuta padella (Förster).
5) *Lep.:* Liparis salicis (Ratzeburg).

testaceipes Brischke[1]) — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus testaceipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N.F. IV. P.3. 1878 p.206 n.14, ♀.
texanus Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Pezomachus Texanus Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 64, ♀.
thoracicus Brischke[2]) — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus thoracicus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N.F. IV. P.3. 1878 p.206 n. 16, ♀.
tonsus Först. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Pezomachus tonsus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 208 n. 126, ♀.
Pezomachus tonsus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1017 n. 38, ♀ ♂.
transfuga Först.[3]) — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus bicolor var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 905.
Pezomachus transfuga Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 193 n. 107, ♀.
Pezomachus transfuga Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 350, ♀.
Pezomachus transfuga Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 228 n. 29.
tricinctus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus tricinctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 72, ♀.
tricolor Gir. — ♀ — Eur.: Austria.
Pezomachus tricolor Giraud, Verh. zool. bot. Ges. Wien VII. 1857 p. 171, ♀.
tristis Först.[4]) — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus tristis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 153 n. 52, ♀.
trux Först.[5])— ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Cryptus palpator Schummel, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1827. 1828 p. 67.
? Hemiteles palpator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 818 n. 252, ♂ [excl. ♀ & var. 1,
Pezomachus hortensis var. 5 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 910, ♀. [2, 3 & 5].
? Hemiteles palpator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 130 n. 15, ♀.
Pezomachus trux Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 146 n. 42, ♀.
? Hemiteles palpator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 154 n. 17.
? Hemiteles palpator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 43 n. 16, ♀ ♂.
? Hemiteles palpator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 58 n. 3, ♀ ♂.
? Hemiteles palpator Taschenberg, Arch. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 134 n. 49, ♂.
Pezomachus trux Marshall, Entom. M. Magaz. VIII. 1871 p. 162.
Pezomachus trux Marshall, Entom. M. Magaz. VIII. 1872 p. 180.
Hemimachus trux Marshall, Entom. M. Magaz. VIII. 1872 p. 181.
? Hemiteles palpator Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 103, ♂.
Hemimachus trux Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 226 n. 1, ♀.
tuberculatus Htg.[6]) — Eur.: Germania.
Pezomachus tuberculatus Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 255.
tumidus Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus timidus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 128 n. 18, ♀.
Pezomachus timidus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 226 n. 8.
unicolor Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus unicolor Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 177 n. 85, ♀.
uniformis D. T. — ♀ — Am.: Massachusetts, Delaware, Illinois.
Pezomachus unicolor Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 64, ♀ [non Förster].
Pezomachus uniformis m.

---

1) *Hymen.:* Microgaster congestus (Brischke).
2) *Col.:* Cionus verbasci (Brischke).
3) *Arachn.:* Agelena labyrinthica (Bignell).
4) *Lep.:* Chelonia villica (Bignell).
5) *Lep.:* Coleophora vibicella (Marshall), Pieris brassicae (Taschenberg).
6) *Lep.:* Gastropacha pini (Hartig).

vagabundus Först. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Pezomachus vagabundus Förster, Arch. f. Naturg. XXI. P. 1. 1850 p. 161 n. 62, ♀.
Pezomachus vagabundus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1011 n. 25, ♀.
vagans Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ichneumon vagans Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 204 n. 199.
Ichneumon vagans Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 67 n. 87.
Ichneumon agilis Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 45 n. 1-17 & 36-38.
Pezomachus vagans Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 716. [Rosenh.].
Pezomachus vagans Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 890 n. 302, ♀ [excl. varr., non
Pezomachus vagans Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 203 n. 120, ♀.
Pezomachus vagans Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 427 n. 1, ♀.
Pezomachus vagans Vollenhoven, Pinacogr. P. 3. 1876 p. 18, ♀; T. 12 F. 8.
Hemimachus vagans Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 159, ♂ & 228 n. 34.
Pezomachus vagans Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 163, ♀ ♂.
Pezomachus vagans Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1013 n. 29, ♀ ♂.
vagantiformis Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Pezomachus vagantiformis Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 342, ♀.
venatorius Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus venatorius Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 219 n. 141, ♀.
venustus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus venustus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 181 n. 90, ♀.
versatilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus versatilis Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 49 n. 185, ♂.
vicinus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus vicinus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 156 n. 56, ♀.
viduus Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus hortensis var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 909.
Pezomachus viduus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 180 n. 89, ♀.
Pezomachus viduus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 227 n. 26.
vigil Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus vigil Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 212 n. 131, ♀.
violentus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus violentus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 59 n. 199, ♂.
vorax Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus vorax Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 150 n. 48, ♀.
vulnerans Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Italia.
Pezomachus agilis var. 5 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 897.
Pezomachus vulnerans Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 189 n. 102, ♀.
Pezomachus vulnerans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 2. 1877 p. 6 n. 12, ♀ ♂.
Pezomachus spec. Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 207 n. 19, ♀ ♂.
vulpinus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Ichneumon vulpinus Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 96 n. 16, ♀.
Pezomachus vulpinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 914 n. 307, ♀.
Pezomachus vulpinus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 116 n. 1, ♀.
Pezomachus vulpinus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 350, ♀.
Pezomachus vulpinus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 225 n. 1.
Pezomachus vulpinus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1002 n. 4, ♀ ♂.
wesmaelii Fonsc. — Eur.: Gallia.
Pezomachus Wesmaelii Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 432 n. 6.
winnertzii Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Pezomachus Winnertzii Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 37 n. 169, ♂.

xenoctonus Förat. — ♀ — Eur.: Germania.
Pezomachus xenoctonus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 164 n. 67, ♀.
Pezomachus xenoctonus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 350, ♀.
xylochophilus Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus xylochophilus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 169 n. 75, ♀.
Pezomachus xylochophilus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 227, ♀.
zonatus Först.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
? Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 361 n. 89.
? Ichneumon aranearum Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 424 n. 90.
? Ichneumon aranearum Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 216 n. 270.
? Ichneumon audax Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 205 n. 203.
? Ichneumon audax Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 67 n. 88.
? Ichneumon aranearum Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 108 n. 4.
? Ichneumon aranearum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1061 n. 284, ♂.
? Ichneumon aranearum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1096 n. 343, ♀.
Pezomachus zonatus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 124 n. 12, ♀.
? Ichneumon aranearum Dumeril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 891 n. 3.
Pezomachus zonatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 2. 1877 p. 3 n. 2, ♀♂.
Pezomachus zonatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 201 n. 2, ♀♂.
Hemimachus zonatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 159, ♂.
Pezomachus zonatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 226 n. 7.
Pezomachus zonatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 1002 n. 5, ♀ ♂.
Pezomachus zonatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 298 n. 15, ♀ ♂.

THEROSCOPUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 240.
θηρίον, fera; σκοπέω, spector.
Vide genus Hemiteles.

PARAPTESIS

Magretti, Bull. soc. entom. Ital. XVI. 1884 p. 100.
παρά, ad; Aptesis, nom. propr. Hymen.

flavipes Magr. — ♀ — Eur.: Italia.
Paraptesis flavipes Magretti, Bull. soc. entom. Ital. XVI. 1884 p. 101 n. 13, ♀; T. 2 F. 2.

APTESIS

Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 82.
ἀ-priv.; πτῆσις, volatus.

Synon.: Ichneumon Gravenhorst.
Pezomachus Gravenhorst.

aphyoptera Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aptesis aphyoptera Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 89 n. 6, ♀.
assimilis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aptesis assimilis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 88 n. 5, ♀.
concolor Ruthe — ♀ — Eur.: Islandia.
Aptesis ? concolor Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 368 n. 49, ♀.

---

1) *Arachn.:* Agelena brunnea (Giraud, Bignell).

formosa Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Aptesis formosa Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 84 n. 1, ♀.
graviceps Marsh. — ♀ — Eur.: Britannia.
Aptesis graviceps Marshall, Entom. M. Magaz. V. 1868 p. 155, ♀.
Aptesis graviceps Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 157 n. 6, ♀.
longicauda Vollenh. — ♀ — Eur.: Batavia.
Aptesis longicauda Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XVI. 1873 p. 210 n. 2, ♀.
major Davis — ♀ — Am.ˢ: Michigan.
Aptesis major Davis, Entom. News IV. 1893 p. 32, ♀.
nordenskioeldii Holmgr. — ♀ ♂ — As.: Novaja Semlja.
Aptesis Nordenskiöldii Holmgren, Nov. spec. Insect. 1881 p. 15, ♂.
Aptesis Nordenskiöldii Holmgren, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 149 n. 21, ♀ ♂.
palanderi Holmgr. — ♂ — As.: Novaja Semlja.
Aptesis Palanderi Holmgren, Nov. spec. Insect. 1881 p. 16, ♂.
Aptesis Palanderi Holmgren, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 150 n. 22, ♂.
spectabilis Rdw. — Eur.: Gallia.
Aptesis spectabilis Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 33.
sudetica (Grav.) Först. — ♀ — Eur.: Montes Sudeti.
Ichneumon Sudeticus Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 37 n. 8, ♀.
Pezomachus Sudeticus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 884 n. 296, ♀.
Aptesis Sudetica Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 86 n. 3, ♀.
tricolor Rdw. — Eur.: Germania.
Aptesis tricolor Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 28.
vestigialis Först.[1]) — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Aptesis vestigialis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 90 n. 8, ♀.
Aptesis vestigialis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 157, ♀.

ORESBIUS

Marshall, Entom. M. Magaz. III. 1867 p. 193.
ὄρος, mons; *βιόω*, vivo.

castaneus Marsh. — ♀ — Eur.: Britannia.
Oresbius castaneus Marshall, Entom. M. Magaz. III. 1867 p. 193 & 194, ♀.
Oresbius castaneus Sharp, Entom. M. Magaz. IV. 1867 p. 18.
Oresbius castaneus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 157, ♀.

APTEROPHYGA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 172 n. 3.
ἄπτερος, non alatus; *φυγάς*, profugus.

paradoxus Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Apterophyga paradoxus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 417.
Apterophyga paradoxus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 133 & 555 n. 166, ♀.

CREMNODES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 237.
κρημνώδης, declivis.
Vide genus Hemiteles.

[1]) *Lep.:* Coleophora solitariella (Champion).

THAUMATOTYPUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 172 n. 1.
ϑαῦμα, miraculum; τύπος, forma.

Synon.: Pezomachus Thomson.

billupsi Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia, Suecia.
Thaumatotypus Billupsi Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 145, ♀.
Thaumatotypus Billupsi Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 159, ♀.
Pezomachus (Thaumatotypus) Billupsi Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1018 n. 40, ♀.

femoralis Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Thaumatotypus femoralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 349, ♀.
Thaumatotypus femoralis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 134 & 555 n. 165, ♀.

32. *Subfam.* Hemitelinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 144 & 173.

CHARITOPES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 181 n. 72.
χάρις, ιτος, gratia.

Synon.: Hemiteles Brischke.

chrysopae Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania. [p. 105 n. 18, ♀ ♂.
Hemiteles (Charitopus) Chrysopae Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890

ISOCHRESTA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 181 n. 71.
ἴσος, aequalis; χρήστης, vates.
Species exstat.

ERIPLANUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 180 n. 70.
ἔρι, valde; πλάνος, erraticus.
Species exstat.

BRACHYCYRTUS

Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXIV. 1880 p. 161.
βραχύς, brevis; κυρτός, umbo.

ornatus Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania. [p. 163, ♀.
Brachycyrtus ornatus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXIV. 1880
Brachycyrtus ornatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 109.

CECIDONOMUS

Bridgman, Entomologist XIII. 1880 p. 264.
κηκίς, galla; νέμομαι, pascor.

gallicola Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Cecidonomus gallicola Bridgman, Entomologist XIII. 1880 p. 265, ♀ ♂.
Cecidonomus gallicola Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 155, ♀ ♂.
Cecidonomus gallicola Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 562 n. 2, ♀ ♂.

rufus Bridgm.[1]) — ♀ — Eur.: Britannia.
Cecidonomus ? rufus Bridgman, Entomologist XIII. 1880 p. 265, ♀.
Cecidonomus ? rufus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 562 n. 3, ♀.
westonii Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Cecidonomus Westoni Bridgman, Entomologist XIII. 1880 p. 264, ♀ ♂.
Cecidonomus Westoni Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 155, ♀ ♂.
Cecidonomus Westoni Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 561 n. 1, ♀ ♂.

HEMITELES

Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 780 n. 6.
ἡμιτελής, semi-peractus.

Synon.: Catalytus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 62.
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 173 n. 5.
καταλύω, dissolvo.
Chirotica Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 173 n. 1.
χεῖρ, manus.
Cremnodes Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 72.
κρημνώδης, declivis.
Dichrogaster Doumerc, Ann. soc. entom. France (3) III. 1855 Bull. p. LXXXII.
δίχρος, duplex; γαστήρ, venter.
Phyrtus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 181 n. 3.
φυρτός, mixtus.
Spinolia Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 173 n. 3 [non Klug].
M. Spinola, nom. propr.
Theroscopus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 92.
θηρίον, fera; σκοπέω, spector.

Anomalon Panzer, Dufour & Perris.
Aptesis Marshall, Bridgman.
Bassus Provancher.
Bracon Panzer.
Cryptus Fabricius.
Echthrus Provancher.
Gelis Thunberg.
Hemimachus Bridgman.
Ichneumon Fabricius & auct. ant.
Ischnus Provancher.
Megastylus Provancher.
Microgaster Doumerc.
Pezomachus Gravenhorst, Westwood, Ratzeburg.
Phaeogenes Provancher.
Phygadeuon Provancher, Taschenberg.
Plectiscus Davis.
Stilpnus Cresson.
Xylonomus Brischke.

aberrans (Grav.) Marsh. — ♀ — Eur.: Britannia.
Pezomachus aberrans Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 714 n. 287^{b}, ♀.
Pezomachus aberrans Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 58.
Hemiteles aberrans Marshall, Catal. Brit. Hymen. III. 1872 p. 44 n. 44.
Hemiteles aberrans Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 104 n. 44, ♀.

1) = ? Hemiteles inimicus.

aciculatus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Hemiteles aciculatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 60 n. 21, ♂.
Hemiteles aciculatus Davis, Canad. Entomol. XXVII. 1895 p. 288.
adjicialis Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Hemiteles adjicialis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 172 n. 7, ♀.
Hemiteles adjicialis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 44. 1886 Hymen. I. p. 253 n. 7.
admirabilis Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Hemiteles admirabilis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 175 n. 14, ♀.
adultus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Hemiteles adultus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 173 n. 8, ♀.
Hemiteles adultus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 254 n. 9.
aeneus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Hemiteles aeneus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 982 n. 42, ♀ ♂.
Hemiteles aeneus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 115, 117 & 523 n. 69, ♀♂.
aestivalis Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Hemiteles aestivalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 712, ♀.
Hemiteles aestivalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 805 n. 244, ♀♂ [excl. var. 4 & 5].
Hemiteles palpator var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 820.
Hemiteles aestivalis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 152 n. 11, ♂.
Hemiteles aestivalis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 129 n. 32, ♀♂.
Hemiteles aestivalis Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 499 n. 50.
Hemiteles aestivalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 346, ♀♂.
Hemiteles aestivalis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 103 n. 28, ♀ ♂.
Hemiteles aestivalis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 988 n. 57, ♀ ♂.
Hemiteles aestivalis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 127 & 544 n. 131, ♀ ♂.
var. **modestus** Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles modestus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 858 n. 282, ♀.
Hemiteles modestus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 129 n. 10, ♀.
Hemiteles modestus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 154 n. 10.
Hemiteles aestivalis var. modesta Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 544.
var. **ruficollis** Grav. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania, Gallia.
Hemiteles ruficollis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 853 n. 279, ♀.
Hemiteles ruficollis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 48 n. 21, ♀.
Hemiteles ruficollis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 59 n. 7, ♀.
Hemiteles aestivalis var. ruficollis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 544.
affinis Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Hemiteles affinis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 99 n. 4, ♀.
alaskensis (Ashm.) D. T. — ♀ — Am.: Alaska.
Cremnodes Alaskensis Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 211, ♀.
Hemiteles Alaskensis m.
albipalpus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles albipalpus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 981 n. 40, ♀ ♂.
Hemiteles albipalpus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 113 & 519 n. 52, ♀♂.
albiscapus Ashm. — ♂ — Am.: Texas.
Hemiteles albiscapus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 403, ♂.
albituberculatus Cam. — ♀ — Am.: Panama.
Hemiteles albituberculatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 257 n. 21, ♀.
alboannulatus Taschbg. — ♀ — Am. mer.
Hemiteles alboannulatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 98 n. 3, ♀.

---

[1]) *Orth.:* Hemerobius perla (Brischke).

albomarginatus Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Hemiteles albomarginatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1887 p. 363, ♀.
Hemiteles albomarginatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 113 & 519 n. 53, ♀.
alpinus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles alpinus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 997 n. 83, ♀.
Hemiteles alpinus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 132 & 552 n. 158, ♀.
alticola Ashm.[1] — ♀ — Am.: Colorado.
Hemiteles alticola Ashmead, Bull. Colorado Biol. Assoc. I. 1890 p. 22, ♀.
americanus (Cress.) Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada, New York.
Stilpnus Americanus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 95, ♀ ♂.
Megastylus politus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 331.
Stilpnus Americanus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 42 n. 2, ♂.
Hemiteles orbicularis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 123 n. 9, ♂.
Stilpnus Americanus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 311 n. 2, ♂.
Hemiteles orbicularis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 326 n. 9, ♂.
amoenus Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Hemiteles amoenus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 23, ♀.
annulatus Ashm. — ♂ — Am.: California.
Hemiteles annulatus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 402, ♂.
annulicornis Ashm. — ♀ — Am.: Texas.
Hemiteles annulicornis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 403, ♀.
apertus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Oelandia.
Hemiteles apertus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 990 n. 62, ♀ ♂.
Hemiteles apertus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 128 & 546 n. 137, ♀ ♂.
arcticus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles arcticus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 998 n. 84, ♀.
Hemiteles arcticus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 132 & 552 n. 159, ♀.
areator (Panz.) Grav.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon areator Panzer, Faun. Insect. Germ. VII. 1801 P. 94 T. 14.
Bracon (Anomalon) areator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 78.
Ichneumon areator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♀.
Hemiteles areator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 714.
Hemiteles areator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 855 n. 281, ♀.
Ichneumon (Hemiteles) areator Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 28.
Hemiteles areator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 151 n. 5, ♀.
Hemiteles areator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 128 n. 9, ♀ ♂.
Hemiteles areator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 153 n. 9.
Hemiteles arcator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 48 n. 22, ♀.
Hemiteles areator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 130 n. 34, ♀ ♂.
Hemiteles areator Parfitt, Rep. & Trans. Devon. Assoc. XIII. 1881 p. 263.
Hemiteles areator Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 104 n. 29, ♀ ♂.
Hemiteles areator Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 980 n. 34.
Hemiteles areator Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 110 & 512 n. 33, ♀ ♂.
areolaris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles areolaris Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 986 n. 52, ♀ ♂.
Hemiteles areolaris Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 133 & 553 n. 161, ♀ ♂.

---

[1]) *Hymen.:* Apanteles laeviceps (Ashmead).

[2]) *Hymen.:* Lophyrus pini (Hartig), Trichiosoma betuleti, T. lucorum, Limneria vulgaris ex Gonepteryx rhamni (Bignell), Microgaster spec. ex Pieris brassicae, Coleophora nigriella (Brischke). — *Lep.:* Orgyia pudibunda (Ratzeburg),

argentatus Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Hemiteles argentatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 713 n. 271ᵇ, ♀.
Hemiteles gyrini Parfitt, Rep. & Trans. Devon. Assoc. XIII. 1881 p. 261.
Hemiteles gyrini Parfitt, Entom. M. Magaz. XVIII. 1881 p. 79, ♀ ♂.
Hemiteles gyrini Hellins, Entom. M. Magaz. XVIII. 1881 p. 88.
Hemiteles gyrini Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 144.
Hemiteles gyrini Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 102, ♀ ♂.
Hemiteles argentatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 102 n. 10, ♀.
Hemiteles argentatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 339, ♀.
Hemiteles argentatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 122 & 536 n. 107, ♀.
ashmeadii D. T. — ♂ — Am.: Virginia.
Theroscopus Americanus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 211, ♂ [nec Hemiteles Ashmeadii m. [Cresson].
asperatus Fonsc. — Eur.: Gallia.
Hemiteles asperatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 36 n. 8.
atricapillus (Grav.) Thoms. — ♀ — Eur. fere tota.
Ichneumon atricapillus Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 41 n. 13, ♀.
Pezomachus atricapillus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 888 n. 300, ♀.
Cremnodes atricapillus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 73 n. 1, ♀.
Cremnodes atricapillus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 156, ♀.
Hemiteles atricapillus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 996 n. 80, ♀.
Hemiteles atricapillus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 134 & 556 n. 168, ♀.
auriculatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles auriculatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 977 n. 28, ♀ ♂.
Hemiteles auriculatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 115, 117 & 522 n. 65, ♀ ♂.
australis Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Hemiteles australis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 26 n. 11, ♀.
Hemiteles australis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 114 & 520 n. 56, ♀.
balteatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Hemiteles balteatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 28 n. 14, ♀ ♂.
Hemiteles balteatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 124, 126 & 541 n. 122, ♀ ♂.
belfragei Ashm. — ♀ — Am.: Texas.
Hemiteles Belfragi Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 399, ♀.
bellicornis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles bellicornis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1243 n. 1, ♀.
Hemiteles bellicornis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 128 & 547 n. 139, ♀.
biannulatus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Hungaria.
Hemiteles biannulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 846 n. 274, ♀.
Hemiteles biannulatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 123 n. 10, ♀.
Hemiteles biannulatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 348, ♀.
Hemiteles biannulatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 101, ♀.
Hemiteles biannulatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 986 n. 53, ♀ ♂.
Hemiteles biannulatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 119 & 529 n. 86, ♀ ♂.
bicinctus Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Hemiteles bicinctus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 24, ♀.
bicolorinus Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Hemiteles bicolorinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 862 n. 284, ♀ ♂.
Hemiteles bicolorinus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 49 n. 24, ♀ ♂.

---

1) *Col.:* Gyrinus natator (Parfitt).
2) *Hymen.:* Microgaster ex Ocneria dispar, Bombyx neustria (Brischke).

Hemiteles bicolorinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 59 n. 6, ♀.
Hemiteles bicolorinus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 127 n. 30, ♀ ♂.
Hemiteles bicolorinus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 348, ♀ ♂.
Hemiteles bicolorinus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 104 n. 26, ♀ ♂.
Hemiteles bicolorinus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 979 n. 32, ♀ ♂.
Hemiteles bicolorinus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 109, 110 & 510 n. 27, ♀ ♂.

bicornutus Ashm. — ♂ — Am.: Missouri.
Hemiteles bicornutus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 403, ♂.

bidentulus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia, Hungaria.
Hemiteles bidentulus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 971 n. 12, ♀.
Hemiteles bidentulus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 111, 119 & 526 n. 43, ♀.

bimaculatus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Hemiteles bimaculatus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 173 n. 9, ♀ ♂.

bipartitus Fonsc. — Eur.: Gallia.
Hemiteles bipartitus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 40 n. 13.

borealis Boh. — ♀ ♂ — As.: Spitzbergen. [Zetterstedt].
Hemiteles borealis Boheman, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXII. 1865 p. 569 n. 4, ♀ [non
Hemiteles septentrionalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. VIII. P. 5. 1869 p. 20, ♂.

brachycyttari Ashm. — As.: Ceylon.
Hemiteles brachycyttari Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII. 1896 p. 644.

breviareolatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles breviareolatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 995 n. 78, ♀ ♂.
Hemiteles breviareolatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 131, 132 & 551 n. 154. [♀ ♂.

brevicauda Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Hungaria.
Hemiteles brevicauda Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 984 n. 48, ♀ ♂.
Hemiteles brevicauda Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 122, 125 & 537 n. 108, ♀ ♂.

bridgmanii Schmkn. — ♀ — Eur.: Britannia.
Theroscopus niger Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 152 [non Taschenberg].
Therescopus niger Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 158, ♀.
Hemiteles Bridgmani Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 134 & 556 n. 170, ♀.

brischkei D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles albipalpis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 1. 1888 p. 59, ♂ [nec
Hemiteles Brischkei m. [Thomson.

bruneipes Ratzbg. — Eur.: Germania.
Hemiteles brunnipes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 152 n. 3.
Hemiteles brunnipes Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 564 n. 9.

bucculatricis Ashm. — ♀ — Am.: Washington.
Hemiteles bucculatricis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 401, ♀.

californicus (Ashm.) D. T. — ♀ — Am.: California.
Cremnodes Californicus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 420, ♀.
Hemiteles Californicus m.

canadensis (Harrgt.) D. T. — ♀ — Am.: Queen Charlotte Island.
Cremnodes Canadensis Harrington, Canad. Entomol. 1894 p. 213, ♀.
Hemiteles Canadensis m.

caelebs Ratzbg. — ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles coelebs Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 158 n. 30, ♂.

capra Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles capra Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 974 n. 18. ♀.
Hemiteles capra Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 124 & 540 n. 119, ♀.

capreolus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Hemiteles capreolus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 970 n. 8, ♀ ♂.
Hemiteles capreolus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 107 & 507 n. 17, ♀♂.
castaneus Taschbg.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Hemiteles palpator var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 821 n. 252, ♀.
Hemiteles castaneus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 132 n. 40, ♀.
Hemiteles castaneus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 347, ♀.
Hemiteles castaneus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 143, ♂.
Hemiteles castaneus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 103 n. 33, ♀ ♂.
Hemiteles castaneus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 971 n. 11, ♀ ♂.
Hemiteles castaneus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 112 & 515 n. 42, ♀ ♂.
caudatus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Echthrus caudatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 313.
Hemiteles caudatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 121 n. 4, ♀.
Hemiteles caudatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 324 n. 4, ♀.
centralis Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Hemiteles centralis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 174 n. 10, ♀.
chionops Grav. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Hemiteles chionops Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 797 n. 236, ♂.
Hemiteles chionops Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 125 n. 22, ♂.
Hemiteles chionops Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 100 n. 21, ♂.
Hemiteles chionops Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 973 n. 16, ♀ ♂.
Hemiteles chionops Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 124 & 540 n. 118, ♀ ♂.
cincticornis Ashm. — ♀ — Am.: Colorado.
Hemiteles cincticornis Ashmead, Bull. Colorado Biol. Assoc. I. 1890 p. 21, ♀.
cingulator Grav.[2] — ♀ ♂ — Eur.
Hemiteles cingulator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 858 n. 283, ♀.
Hemiteles cingulator Fonscolombe, Ann. soc entom. France (2) X. 1852 p. 49 n. 23, ♀.
Hemiteles cingulator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 58 n. 5, ♀ ♂.
Hemiteles cingulator Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 101 n. 35.
Hemiteles cingulator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 136 n. 55, ♀♂.
Hemiteles cingulator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 348, ♂.
Hemiteles cingulator Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 104 n. 42, ♀ ♂.
Hemiteles cingulator Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 974 n. 19, ♀ ♂.
Hemiteles cingulator Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 110 & 512 n. 34, ♀♂.
cingulatus (Först.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Theroscopus cingulatus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 95 n. 2, ♀.
Theroscopus cingulatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 58, ♀; T. 37 F. 5.
Hemiteles cingulatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 134 & 558 n. 173, ♀.
clausus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles clausus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1245 n. 3, ♀.
Hemiteles clausus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 133 & 554 n. 163, ♀.
clypeator Lundb. — Am.: Groenlandia.
Hemiteles clypeator Lundbeck, Vidensk. Meddel. 1896 p. 228.
coactus Ratzbg.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles coactus Ratzeburg, Ichneum d. Forstinsect. III. 1852 p. 155 n. 22, ♀.

---

1) *Hymen.:* Trichiosoma betuleti (Bignell), Lophyrus pini (Brischke).
2) *Hymen.:* Microgaster spec., Paniscus spec. (Brischke).
3) *Hymen.:* Teras terminalis (Ratzeburg).

Hemiteles coactus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 348, ♀ ♂.
Hemiteles coactus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 513 & 565 n. 12, ♀ ♂.
cognatus Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles cognatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1891 p. 71, ♂.
coleophorae Ashm. — ♀ — Am.: California.
Hemiteles coleophorae Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 400, ♀.
collinus Costa — ♀ — Eur.: Sardinia.
Hemiteles collinus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. 13. 1885 p. 24, ♀.
Hemiteles collinus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 567 n. 16, ♀.
columbianus Ashm. — ♂ — Am.: Washington.
Hemiteles Columbianus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 402, ♂.
combustus (Först.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Cremnodes combustus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 74 n. 2, ♀.
Hemiteles combustus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 134 & 555 n. 167, ♀.
compactus Ashm. — Am. bor.
Hemiteles compactus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 398.
completus Ratzbg.[1] — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles completus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 129 n. 11.
Hemiteles completus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 564 n. 8, ♀.
conformis (Gmel.) Grav.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 70 n. 344.
Ichneumon conformis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2720 n. 389.
Hemiteles conformis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 803 n. 242, ♀.
Hemiteles conformis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 126 n. 26, ♀.
Hemiteles conformis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 346, ♀ ♂.
Hemiteles conformis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 102 n. 25, ♀.
Hemiteles conformis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 969 n. 5, ♀ ♂.
Hemiteles conformis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 108 & 509 n. 22, ♀ ♂.
confusus Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Hemiteles confusus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 37 n. 9, ♂?
conspicuus Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Hemiteles conspicuus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 161, ♀.
constrictus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles constrictus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 997 n. 82, ♀.
Hemiteles constrictus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 132 & 552 n. 157, ♀.
contaminatus Grav. — ♀ — Eur.: Britannia?, Pedemontana.
Hemiteles contaminatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 840 n. 268, ♀.
Hemiteles contaminatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 101 n. 18, ♀.
Hemiteles contaminatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 112 & 516 n. 44, ♀.
coriarius Taschbg.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles coriarius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 125 n. 19, ♀ ♂.
Hemiteles coriarius Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 114, 116 & 520 n. 59, ♀ ♂.
cornutus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon cornutus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 356 n. 38, ♀.
Phygadeuon cornutus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 778 n. 38, ♀.
Hemiteles cornutus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 186.

---

1) *Col.:* Ptilinus pectinicornis (Ratzeburg).

2) *Hymen.:* Microgaster spec. ex Eurycreon verticalis, Acronycta psi, Diloba coeruleocephala (Brischke).

3) *Lep.:* Retinia resinana (Brischke).

costalis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles costalis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 984 n. 47, ♀.
Hemiteles costalis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 124 & 542 n. 124, ♀.
coxalis Brischke — ♀ — Eur.: Borussia.
Hemiteles coxalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 49, ♀.
crassiceps Ratzbg.[1] — ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles crassiceps Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 151 n. 6, ♂.
Hemiteles crassiceps Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 562 n. 1, ♂.
crassicornis Grav. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania, Hungaria.
Hemiteles crassicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 713.
Hemiteles crassicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 847 n. 275, ♀.
Hemiteles crassicornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 123 n. 13, ♀.
Hemiteles crassicornis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 101 n. 12, ♀.
Hemiteles crassicornis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 112, 129 & 517 n. 47, ♀.
crassitelus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Phaeogenes crassitelus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 41 n. 13, ♀.
Hemiteles crassitelus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 186.
crassus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Hemiteles crassus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 361 n. 15, ♂.
Hemiteles crassus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 78n n. 15, ♂.
cressonii Ril. — ♂ — Am.: Missouri.
Hemiteles? Cressoni Riley, 1st Ann. Rep. Insect. Missouri 1869 p. 177, ♂; T. 2 F. 7.
Hemiteles Cressoni Riley, General-Index Rep. Insect. Missouri 1881 p. 65, ♂.
cyclogaster Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles cyclogaster Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 992 n. 69, ♀.
Hemiteles cyclogaster var. Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1246 n. 5.
Hemiteles cyclogaster Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 131 & 550 n. 149, ♀.
cylindrithorax Taschbg. — ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles cylindrithorax Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 132 n. 42, ♂.
Hemiteles cylindrithorax Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 125 & 544 n. 129, ♂.
cynipinus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles cynipinus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 977 n. 26, ♀ ♂.
Hemiteles cynipinus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 116, 117 & 524 n. 72, ♀ ♂.
debilis Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Hemiteles debilis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 59 n. 18, ♂.
decipiens Grav.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Hemiteles decipiens Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 825 n. 255, ♀.
Hemiteles decipiens Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 44 n. 17, ♀.
Hemiteles decipiens Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 124 n. 17, ♀ ♂.
Hemiteles decipiens Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 347, ♀ ♂.
Hemiteles decipiens Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 103 n. 16, ♀.
Hemiteles decipiens Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 122, 129 & 537 n. 111, ♀ ♂.
declivus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Hemiteles declivus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 60 n. 20, ♀ ♂.
deminuens Htg.[3] — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles deminuens Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. 2. 1838 p. 264, ♀.

---

[1]) *Hymen.:* Lophyrus pini (Ratzeburg).
[2]) *Dipt.:* Lipara lucens (Brischke).
[3]) *Lep.:* Geometra liturata (Hartig).

Hemiteles deminuens Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 152 n. 9.
Hemiteles diminuens Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 563 n. 3.

depressus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Hemiteles depressus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 334.
Hemiteles utilis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 125 n. 13, ♀ [non Norton].
Hemiteles utilis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 328 n. 13, ♀.

destructivus Cam. — ♀ — Austr.: New Zealand.
Hemiteles destructivus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 P. 1. p. 26, ♀.

dispar Ratzbg.![1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles dispar Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 152 n. 8, ♀ ♂.
Hemiteles dispar Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 562 n. 2, ♀ ♂.

dispar Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Hungaria.
Hemiteles dispar Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 28 n. 15, ♀ ♂.
Hemiteles dispar Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 126, 135 & 557 n. 171, ♀ ♂.

disputabilis Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles disputabilis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 133 & 552 n. 160, ♀.

dissimilis Grav. — ♂ — Eur. mer. (Britannia).
Hemiteles dissimilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 842 n. 270, ♂.
Hemiteles dissimilis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 135, ♂.
Hemiteles dissimilis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 104 n. 40, ♂.
Hemiteles dissimilis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 120 & 530 n. 90, ♂.

distans Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles distans Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 978 n. 29, ♀.
Hemiteles distans Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 121 & 534 n. 102, ♀.

distinctus Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Hemiteles distinctus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 151, ♀.
Hemiteles distinctus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 104, ♀.
Hemiteles distinctus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 130 & 549 n. 148, ♀.

dorsalis (Prov.) Davis — ♂ — Am.: Canada.
Bassus dorsalis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 112 n. 20.
Plectiscus dorsalis Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 190.
Plectiscus dorsalis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 1895 n. 30.
Hemiteles dorsalis Davis, Canad. Entomol. XXVII. 1895 p. 290, ♂ [non ♀].

drassi How. — ♂ — Am. bor.
Hemiteles drassi (Riley) Howard, Proc. Entom. Soc. Washington II. 1892 p. 296 n. 19, ♂.

dromicus (Grav.) Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon dromicus Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 39 n. 11, ♀.
Pezomachus dromicus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 886 n. 298, ♀.
Theroscopus dromicus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 102 n. 9, ♀.
Hemiteles dromicus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 996 n. 79, ♀ ♂.
Hemiteles dromicus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 132, 135 & 560 n. 180, ♀ ♂.

dubius Grav. — ♀ — Eur.: Britannia, Silesia.
Hemiteles dubius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 836 n. 264, ♀.
Hemiteles dubius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 122 n. 9, ♀.
Hemiteles dubius Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 102 n. 8, ♀.
Hemiteles dubius Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 120, 129 & 532 n. 96, ♀.

elegans (Först.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Theroscopus elegans Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 96 n. 3.
Hemiteles elegans Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 134 & 558 n. 174, ♀.

---

[1]) *Hymen.:* Cimbex femorata, Hyponomeuta spec. (Ratzeburg).

elongatus Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Hemiteles elongatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 40 n. 12, ♂.
elongatus Ratzbg.! — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles elongatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 134, ♀.
Hemiteles elongatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 565 n. 11, ♀.
elymi Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles elymi Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 981 n. 39.
Hemiteles elymi Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 122, 126 & 537 n. 110, ♀.
erasmius Marsh. — ♀ — Am.: Venezuela.
Hemiteles erasmius Marshall, Ann. soc. entom. France LXI. 1892 p. 63, ♀.
erythrocnemis Fonsc. — ♀ — Eur.: Gallia.
Hemiteles erythrocnemis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 45 n. 18, ♀.
erythromelas Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Hemiteles erythromelas Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 46 n. 19, ♂.
esenbeckii (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ichneumon Esenbeckii Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 37 n. 9, ♀.
Pezomachus Esenbeckii Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 883 n. 295, ♀.
Theroscopus Esenbeckii Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 99 n. 6, ♀.
Theroscopus Esenbeckii Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 59, ♀; T. 37 F. 7.
Theroscopus Esenbeckii Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 158 n. 2, ♀.
Hemiteles Esenbeckii Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 993 n. 72, ♀ ♂.
Hemiteles Esenbeckii Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 132, 135 & 559 n. 177, ♀ ♂.
euryptychiae Ashm.[1] — ♀ — Am.: Montana.
Hemiteles euryptychiae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 210, ♀.
excellens Imh. — Eur.: Helvetia.
Hemiteles excellens Imhoff, Neu. Denkschr. schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 171 nota.
exilis Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Hemiteles exilis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 171 n. 3, ♂.
falcatus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles falcatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 999 n. 86, ♀.
Hemiteles falcatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 105 & 503 n. 6, ♀.
fasciatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Hungaria.
Hemiteles fasciatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 995 n. 77, ♀ ♂.
Hemiteles fasciatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 131, 132 & 551 n. 153, ♀ ♂.
fasciatus Heer — Eur.: Radoboj.
Hemiteles fasciatus Heer, Neu. Denkschr. schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 170 n. 78; T. 13 [F. 15.
Hemiteles fasciata Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 647.
Hemiteles fasciata Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1856 p. 157.
fasciipennis Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Hemiteles fasciipennis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 253 n. 2, ♀.
fasciitinctus D. T.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles fasciipennis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 348, ♀ ♂.
Hemiteles fasciipennis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 511 n. 31, ♀ ♂.
Hemiteles fasciitinctus m.
flavigaster Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania, Hungaria.
Hemiteles flavigaster Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 121 & 534 n. 101, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Euryptychia saligneana (Ashmead).
[2]) *Hymen.:* Microgaster spec. — *Arachn.* (Brischke).

flavovariegatus Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [T. 10 F. 23.
Hemiteles flavovariegatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 254 n. 10, ♀;

floriculator Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
—— Réaumur, Mém. hist. Insect. II. 1736 p. ?; T. 3 F. 33.
Ichneumon floricolator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 260 n. 3750.
Hemiteles floricolator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 841 n. 269, ♀.
Hemiteles floricolator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 42 n. 15.
Microgaster Perlae Doumerc, Ann. soc. entom. France (3) III. 1855 Bull. p. LXXX.
Dichrogaster Perlae Sichel, Ann. soc. entom. France (3) III. 1855 Bull. p. LXXXVIII.
Dichrogaster Perlae Sichel, Ann. soc. entom. France (3) V. 1857 Bull. p. XCVI.
Hemiteles floricolator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 132 n. 43, ♀♂.
Hemiteles floricolator Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 103 n. 35, ♀.
Hemiteles floricolator Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 981 n. 38, ♀ ♂.
Hemiteles floricolator Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 338.
Hemiteles floricolator Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 113, 123 & 539 n. 114, ♀♂.

formosus Desv.[2] — Eur.: Britannia.
Hemiteles spec. Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) V. P. 5. 1860 p. 211.
Hemiteles formosus Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (2) V. P. 5. 1860 p. 211.
Hemiteles formosus Smith, Entomol. Annual f. 1860 p. 93.
Hemiteles formosus Blackwell, Hist. Spiders Great Britain I. 1864; T. 12 Fig. BB.

fragilis Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles fragilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 828 n. 258, ♀.
Hemiteles fragilis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 133 n. 45, ♀.
Hemiteles fragilis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 103 n. 36, ♀.
Hemiteles fragilis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 118, 122 & 527 n. 81, ♀♂.

fulveolatus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Pezomachus fulveolatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 871 n. 287, ♀ ♂.
Catalytus fulveolatus Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 63 n. 2, ♀ ♂.
Catalytus fulveolatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 155, ♀ ♂.
Hemiteles fulveolatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 999 n. 87, ♀ ♂.
Hemiteles fulveolatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 106 & 504 n. 8, ♀.

fulvipes Grav.[3] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Hemiteles fulvipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 792 n. 234, ♀ ♂.
Ichneumon (Hemiteles) fulvipes Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 28 n. 31; T. 7 F. 6.
Hemiteles fulvipes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 150 n. 2.
Hemiteles fulvipes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 151 n. 2.
Hemiteles fulvipes Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 34 n. 5, ♂.
Hemiteles fulvipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 124 n. 15, ♀ ♂.
Hemiteles fulvipes Brischke, Deutsch. entom. Zeitschr. XXI. 1877 p. 287.
Hemiteles fulvipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 345, ♀ ♂.
Hemiteles fulvipes Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 100 n. 14, ♀ ♂.
Hemiteles fulvipes Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 968 n. 1, ♀ ♂.
Hemiteles fulvipes Möller, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 83 n. 1.
Hemiteles fulvipes Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 107 & 506 n. 13, ♀ ♂.

---

1) *Neur.:* Chrysopa perla (Doumerc). — *Lep.:* Depressaria nervosella (Bignell).

2) *Arachn.:* Agelena brunnea (Bignell).

3) *Hymen.:* Microgaster spec. ex Vanessa urticae, Pieris brassicae, P. napi, Zygaena spec., Ocneria dispar, Lasiocompa pini, Plusia gamma (Brischke). — *Lep.:* Vanessa atalanta (Bignell).

fumipennis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles fumipennis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 984 n. 46, ♀.
Hemiteles fumipennis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 124 & 542 n. 123, ♀.
fuscicarpus Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Hemiteles fuscicarpus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 29 n. 17, ♀.
Hemiteles fuscicarpus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 123 & 529 n. 88, ♀.
fuscipennis Brullé — ♀ — Austr.: Haiti.
Hemiteles fuscipennis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 257 n. 8, ♀.
gallarum Rdw.[1]) — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles gallarum Rudow, Entom. Nachr. VII. 1881 p. 79 n. 2, ♀.
gastricus Holmgr. — ♀ — Am.: California.
Hemiteles gastricus Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 401 n. 22, ♀.
gastrocoelus Ratzbg. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles gastrocoelus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 153 n. 7, ♀ ♂.
Hemiteles gastrocoelus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 565 n. 10, ♀ ♂.
geniculatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles geniculatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 989 n. 58, ♀ ♂.
Hemiteles geniculatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 127 & 545 n. 132, ♀ ♂.
gibbifrons Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles gibbifrons Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 980 n. 36, ♀.
Hemiteles gibbifrons Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 113 & 518 n. 51, ♀.
glacialis Holmgr. — ♀ ♂ — As.: Spitzbergae.
Hemiteles glacialis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. VIII. P. 5. 1869 p. 20, ♀ ♂.
glyptonotus Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Hemiteles glyptonotus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 32 n. 21, ♀.
Hemiteles glyptonotus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 106, 109 & 503 n. 5, ♀.
gracilariae Ashm.[2]) — ♀ — Am.: Missouri.
Hemiteles gracilariae Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 401, ♀.
gracilipes Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles gracilipes Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 992 n. 68, ♀.
Hemiteles gracilipes Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 130 & 549 n. 147, ♀.
gracilis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Hemiteles gracilis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 989 n. 60, ♀ ♂.
Hemiteles gracilis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 128 & 546 n. 135, ♀ ♂.
gravenhorstii (Ratzbg.) Schmkn.[3]) — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Pezomachus Gravenhorstii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 154 n. 6, ♀.
Pezomachus (Theroscopus) Gravenhorstii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 [p. 149 n. 12.
Theroscopus Gravenhorstii Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 100 n. 7, ♀.
Thereoscopus Gravenhorsti Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 159.
Hemiteles Gravenhorstii Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 135 & 559 n. 178, ♀.
gumperdensis Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles Gumperdensis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 107 & 505 n. 11, ♀.
hadrocerus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Hemiteles hadrocerus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 991 n. 65, ♀ ♂.
Hemiteles hadrocerus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 129, 130 & 548 n. 143, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Nematus viminalis (Rudow).
2) *Lep.:* Gracilaria packardella (Ashmead).
3) *Hymen.:* Ophion merdarius, Trachea piniperda (Ratzeburg).

haemorrhoidalis Taschbg. — ♀ — Am. mer. [n. 5, ♀.
Hemiteles haemorrhoidalis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 100
hemerobii Ashm. — ♂ — Am.: Michigan.
Hemiteles hemerobii Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 404, ♂.
hemipterus (Fabr.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
? Ichneumon hemipteron Riche, Bull. soc. philom. Paris I. 1791 p. 1.
? Ichneumon hemipteron Riche, Act. soc. hist. nat. Paris. I. 1. 1792 p. 39.
Ichneumon hemipterus Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 190 n. 238.
? Ichneumon hemipteron Riche, Reiche: Magaz. Thierr. I. 1793 p. 100-101.
Cryptus hemipterus Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 91 n. 94.
Ichneumon hemipterus Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 25 n. 1, ♀.
? Ichneumon hemipteron Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 109 n. 5.
Ichneumon hemipterator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 270.
Ichneumon hemipterator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 336.
Pezomachus hemipterus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 874 n. 289, ♀.
? Ichneumon hemipteron Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1097 n. 344.
Aptesis hemiptera Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 87 n. 4, ♀.
Aptesis hemiptera Marshall, Entom. M. Magaz. V. 1868 p. 157, ♀.
Aptesis hemiptera Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 157 n. 2, ♀.
Hemiteles hemipterus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 993 n. 70, ♀ ♂.
Aptesis hemiptera Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1887 p. 364.
Hemiteles hemipterus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 132, 133 & 554 n. 164, ♀ ♂.
Phyrtus hemipterus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 27.
heringii Ratzbg.[2] — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles Heringii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 156 n. 24, ♀; Fig.
Xylonomus Heringi Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 128, ♀.
Hemiteles Heringii Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 566 n. 14, ♀.
hirticeps Thoms. — ♀ — Eur.: Pyrenaei montes.
Hemiteles hirticeps Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 27 n. 13, ♀.
Hemiteles hirticeps Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 121 & 535 n. 104, ♀.
hirtus Brauns — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia.
Hemiteles hirtus Brauns, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VIII. P. 1. 1888 p. 5, ♀ ♂.
Hemiteles hirtus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 535 (n. 104).
homocerus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Hemiteles homocerus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 29 n. 16, ♀ ♂.
Hemiteles homocerus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 123, 127 & 529 n. 87, ♀ ♂.
hospes Ratzbg. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles hospes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 128 n. 8, ♀.
Hemiteles hospes Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 561 n. 7, ♀.
humeralis Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Hemiteles humeralis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 333.
Hemiteles humeralis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 124 n. 11, ♀.
Hemiteles humeralis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 327 n. 11, ♀.
Stilpnus appendiculatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 44, ♂.
Hemiteles humeralis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 398.
hydrophilus Ashm. — ♀ — Am.: Nova Scotia.
Hemiteles hydrophilus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 401, ♀.

---

1) *Lep.:* Euzophora cinerosella (Bignell), Catoptria microgramma (Walker).
2) *Lep.:* Psyche unicolor (Mocsáry).

imbecillus Grav.[1]) — ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles imbecillus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 813 n. 248, ♂.
Hemiteles imbecillus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 121 n. 6, ♂.
Hemiteles imbecillus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 101 n. 5, ♂.
Hemiteles imbecillus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 70, ♂.
Hemiteles imbecillus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 125, 127 & 513 n. 126, ♂.
inaequalis (Först.) Schmkn.[2]) — ♀ — Eur.: Britannia.
Theroscopus inaequalis Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 97 n. 5, ♀.
Theroscopus inaequalis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 158 n. 4, ♀.
Hemiteles inaequalis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 135 & 559 n. 176, ♀.
incertulus D. T. — ♀ ♂ — Am.: Cuba.
Hemiteles incertus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 22, ♀ ♂.
Hemiteles incertulus m.
incertus Taschbg. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles incertus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 131 n. 39, ♀.
Hemiteles incertus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 122 & 537 n. 109, ♀.
incisus Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Hemiteles incisus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 150, ♀.
Hemiteles incisus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 104, ♀.
Hemiteles incisus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 987 n. 55, ♀ ♂.
Hemiteles incisus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 121, 126 & 533 n. 100, ♀ ♂.
infirmus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Hemiteles infirmus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 797 n. 237, ♀.
Hemiteles infirmus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 126 n. 23, ♀.
Hemiteles infirmus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 100 n. 22, ♀.
Hemiteles infirmus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 968 n. 2, ♀ ♂.
Hemiteles infirmus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 108 & 509 n. 23.
inflatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles inflatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 992 n. 67, ♀ ♂.
Hemiteles inflatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 130 & 549 n. 145, ♀ ♂.
infumatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles infumatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 983 n. 44, ♀ ♂.
Hemiteles infumatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 121, 125 & 533 n. 99, ♀ ♂.
infuscatus Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles infuscatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 848 n. 276, ♀.
ingenuus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Hemiteles ingenuus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 172 n. 6, ♀.
ingrediens (Först.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Theroscopus ingrediens Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 96 n. 4, ♀.
Theroscopus ingrediens Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 158 n. 1, ♀.
Hemiteles ingrediens Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 134 & 558 n. 175, ♀.
inimicus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Hungaria.
Hemiteles inimicus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 824 n. 254, ♀.
Hemiteles inimicus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 132 n. 41, ♀.
Hemiteles inimicus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 103 n. 34, ♀.
Hemiteles inimicus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 970 n. 9, ♀ ♂.
Hemiteles inimicus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 111, 116 & 515 n. 40, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Rhodites eglanteriae (Rondani).
2) *Hymen.:* Diastrophus scabiosae (Bridgman).

insignis Grav. — ♀ — Eur.: Germania, Italia, Corfu, Hungaria, Hispania; Afr.: Algeria.
Hemiteles insignis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 851 n. 277.
Hemiteles (Chirotica) insignis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 105 & 501 n. 2, ♀.

intersectus Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Hemiteles intersectus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 38 n. 10, ♂.

interstitialis Schmkn. — ♀ — Eur.
Hemiteles interstitialis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 121 & 533 n. 98, ♀.

inustus Grav. — ♂ — Eur.: Italia.
Hemiteles inustus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 828 n. 257, ♂.
Hemiteles inustus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 112 & 517 n. 48, ♂.

irritatus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Hemiteles irritatus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 171 n. 5, ♂.

ischnocerus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles ischnocerus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1246 n. 4, ♀ ♂.

jucundus Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Hemiteles jucundus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 97 n. 2, ♀.

junctus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Hemiteles junctus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 174 n. 11, ♀.

lascivus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Hemiteles lascivus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 170 n. 1, ♀.

laticinctus Ashm.[1] — ♂ — Am.: Connecticut.
Hemiteles laticinctus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 210, ♂.

lepidus Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Hemiteles lepidus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 256 n. 6, ♀.

leucomerus Ratzbg. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles leucomerus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 155 n. 23, ♀.
Hemiteles leucomerus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 566 n. 13, ♀.

leucosoma Cam. — Am.: Guatemala.
Hemiteles leucosoma Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 259 n. 25.

levigatus Ratzbg.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Hemiteles aestivalis var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 808, ♀.
Hemiteles laevigatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 128 n. 7, ♂.
Hemiteles furcatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 121 n. 2, ♀.
Hemiteles furcatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 102 n. 2, ♀ ♂.
Hemiteles laevigatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 973 n. 17, ♀ ♂.
Hemiteles laevigatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 119 & 528 n. 83, ♀ ♂.

liambus Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Hemiteles liambus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 25 n. 10, ♀.
Hemiteles liambus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 113 & 519 n. 55, ♀.

limbatus Grav.[3] — ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles limbatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 803 n. 241, ♂.
Hemiteles limbatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 126 n. 25, ♂.
Hemiteles limbatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 346, ♂.
Hemiteles limbatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 102 n. 24, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Leucania unipunctata (Ashmead).
[2]) *Lep.:* Dianthoecia cucubali (Bignell).
[3]) *Orth.:* Chrysopa spec. (Brischke).

Hemiteles limbatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 49, ♂.
Hemiteles limbatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 112 & 517 n. 46, ♂.

liostylus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Hemiteles liostylus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 30 n. 18, ♀ ♂.
Hemiteles liostylus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 113, 114, 116 & 518 n. 50, ♀ ♂.

liparae Gir.[1]) — ♂ — Eur.: Austr. inf.
Hemiteles Liparae Giraud, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 1267 n. 2, ♂.

lissonotoides Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles lissonotoides Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 30 n. 19, ♀.
Hemiteles lissonotoides Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 106 & 505 n. 10, ♀.

litoreus Parf. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Hemiteles litoreus Parfitt, Entom. M. Magaz. XVIII. 1882 p. 272, ♀ ♂.

longicauda Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Hemiteles longicauda Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 980 n. 35, ♀ ♂.
Hemiteles longicauda Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 417.
Hemiteles longicauda Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 110 & 511 n. 30, ♀ ♂.

longicaudatus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles longicaudatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 989 n. 59, ♀.
Hemiteles longicaudatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 127 & 545 n. 133. ♀.

longicornis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Hemiteles longicornis Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 361 n. 16, ♀.
Hemiteles longicornis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 783 n. 16, ♀.

longipennis (Grav.) Schmkn. — ♀ — Eur. centr.
Pezomachus longipennis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 870 n. 286, ♀.
Catalytus longipennis Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 62 n. 1, ♀.
Hemiteles longipennis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 106 & 504 n. 7, ♀.

longisetosus Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles longisetosus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 111 & 514 n. 39, ♀.

longulus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Hemiteles longulus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 997 n. 81, ♀ ♂.
Hemiteles longulus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 131, 132 & 552 n. 156, ♀ ♂.

lucidulus Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Hemiteles lucidulus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 39 n. 11, ♂.

lundensis Ratzbg. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles Lundensis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 152 n. 10, ♀.
Hemiteles Lundensis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 563 n. 4, ♀.

luteiventris Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles luteiventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 812 n. 247, ♂.
Hemiteles luteiventris Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 133 n. 46, ♂.
Hemiteles luteiventris Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 135 & 143 n. 127, ♂.

lycaenae How.[2]) — ♀ — Am.: United States.
Hemiteles lycaenae Howard, Scudder: Butterflies U. S. 1889 p. 1880, ♀.

macrurus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Hungaria.
Hemiteles macrurus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 985 n. 50, ♀ ♂.
Hemiteles macrurus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 121, 125 & 536 n. 106, ♀ ♂.

macula Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Hemiteles macula Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 256 n. 19, ♀.

---

[1]) *Dipt.:* Lipara tomentosa (Giraud).
[2]) *Lep.:* Cyaniris pseudargiolus (Howard).

maculipennis Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota; Afr. bor.
Hemiteles maculipennis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 854 n. 278, ♀.
Hemiteles maculipennis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 137 n. 56, ♀.
Hemiteles maculipennis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 998 n. 85, ♀.
Hemiteles maculipennis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2388 n. 85, ♂.
Hemiteles (Spinolia) maculipennis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 106 & 502 [n. 3, ♀ ♂.

maculipennis Rdw.! — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles maculipennis Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 17 ♀ ♂.

maculithorax Ashm. — ♂ — Am.: Grenada.
Hemiteles maculithorax Ashmead, Proc. Zool. Soc. London 1895 p. 780, ♂.

magnicornis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles magnicornis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 994 n. 75, ♀ ♂.
Hemiteles magnicornis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 131, 132 & 550 n. 151, ♀ ♂.

mandibularis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Hemiteles mandibularis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 315.
Hemiteles mandibularis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 121 n. 1, ♀.
Hemiteles mandibularis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 324 n. 1, ♀.

mandibulator (Duf. & Perr.) Gir.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Anomalon mandibulator Dufour & Perris, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 46 n. 24, ♀.
Hemiteles mandibulator Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 484 n. 33, ♀ ♂.

mangeri (Grav.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Ichneumon Mangeri Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 31 n. 5, ♀.
Pezomachus Mangeri Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 872 n. 288, ♀.
Catalytus Mangeri Förster, Arch. f. Naturg. XVII. P. 1. 1851 p. 65 n. 3, ♀.
Aptesis Försteri Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 146, ♀.
Aptesis Försteri Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 161.
Hemiteles Mangeri Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 133 & 504 n. 9, ♀.

marginatus Bridgm.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Hemiteles marginatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 144.
Hemiteles marginatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 101, ♀ ♂.
Hemiteles marginatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 113 & 518 n. 49, ♀ ♂.

mediovittatus Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles mediovittatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 118 & 525 n. 74, ♀.

melanarius Grav.[3] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Hemiteles melanarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 790 n. 233, ♂ [excl. varr. 1 & 2].
Hemiteles vicinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 845 n. 273, ♀.
Hemiteles melanarius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 128 n. 6.
Hemiteles melanarius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 153 n. 6.
Hemiteles melanarius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 31 n. 1, ♂.
Hemiteles melanarius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 57 n. 1, ♂.
Hemiteles vicinus Kawall, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 230 n. 16, ♀ ♂.
Hemiteles vicinus Curtis, Farm. Insects 1860 p. ?; T. 15 F. 6.
Hemiteles melanarius Goureau, Ann. soc. entom. France (4) II. 1862 Bull. p. II, ♂.
Hemiteles melanarius Taschenberg, Naturg. d. wirbellos. Thiere 1865 p. 260.

---

1) *Hymen.:* Solenius rubicola, Odynerus laevipes (Dufour & Perris). — *Lep.:* Gracilaria purpuriella (Giraud).

2) *Lep.:* Chrysocorys festaliella (Bridgman).

3) *Lep.:* Argynnis paphia (Bignell), Pieris brassicae, Coleophora Giraudi (Giraud), Pontia rapae (Mocsáry, Bignell).

Hemiteles vicinus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 125 n. 21, ♀.
Hemiteles melanarius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 130 n. 36, ♀ ♂.
Hemiteles melanarius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 345, ♀ ♂.
Hemiteles melanarius Holmgren & Zetterlind, Entom. Tidskr. II. 1881 p. 48-50 & 58-59.
Hemiteles vicinus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 150, ♂.
Hemiteles melanarius Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 100 n. 30, ♀ ♂.
Hemiteles vicinus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 101 & 103 n. 20, ♀.
Hemiteles vicinus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 150, ♂.
Hemiteles vicinus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 982 n. 43, ♀ ♂.
Hemiteles vicinus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 117, 122 & 525 n. 76, ♀ ♂.

melanogaster Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles melanogaster Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 982 n. 41, ♀ ♂.
Hemiteles melanogaster Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 115, 118 & 523 n. 67, ♀ ♂.

melanogonus Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles melanogonus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 816 n. 250, ♂.
Hemiteles melanogonus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 49, ♂.

melanopygus Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles melanopygus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 835 n. 263, ♀.
Hemiteles melanopygus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 125 n. 20, ♀.
Hemiteles melanopygus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 347, ♀.
Hemiteles melanopygus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 103 n. 19, ♀.
Hemiteles melanopygus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 119, 129 & 530 n. 89, ♀.

melitaeae Ashm.[1] — ♀ — Am.: California.
Hemiteles Melitaeae Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 399, ♀.

mellicornis Ashm. — ♀ — Am.: Washington.
Hemiteles mellicornis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 404, ♀.

meridionalis Grav. — ♀ — Eur.: Italia.
Hemiteles meridionalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 834 n. 262, ♀.
Hemiteles meridionalis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 128, ♀.
Hemiteles meridionalis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 122 & 538 n. 112, ♀.

mexicanus Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Hemiteles Mexicanus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 259 n. 26, ♀.

micans Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Hemiteles micans Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 250 n. 1, ♀.

micarivorus How. — ♂ — Am. bor.
Hemiteles micarivora (Riley) Howard, Proc. Entom. Soc. Washington II. 1892 p. 295 n. 18, ♂.

micator Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon micator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 260 n. 3748.
Hemiteles micator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 832 n. 261, ♀ [excl. ♂].
Hemiteles micator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 122 n. 7, ♀.
Hemiteles micator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 347, ♀ ♂.
Hemiteles micator Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 102 n. 6, ♀ ♂.
Hemiteles micator Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 990 n. 63, ♀ ♂.
Hemiteles micator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 48, ♀.
Hemiteles micator Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 128 & 546 n. 138, ♀ ♂.

microgastri Rdw.[2] — Eur.: Germania.
Hemiteles Microgastri Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 17.

---

[1] *Lep.:* Melitaea chalcedon (Ashmead).
[2] *Hymen.:* Microgaster spec. (Rudow).

microstomus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles microstomus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 969 n. 3.
Hemiteles microstomus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 108 & 510 n. 24, ♀.
minutus Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Hemiteles minutus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 340, ♀ ♂.
Hemiteles minutus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 128 & 525 n. 134, ♀ ♂.
monilis Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Hemiteles monilis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 174 n. 13, ♀.
monodon Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles monodon Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 991 n. 66, ♀ ♂.
Hemiteles monodon Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 130 & 549 n. 146, ♀ ♂.
monospilus Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles monospilus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 810 n. 245, ♀.
Hemiteles monospilus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 134 n. 50, ♀.
Hemiteles monospilus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 121 & 536 n. 105, ♀.
monozonius Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles monozonius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 712.
Hemiteles monozonius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 802 n. 240, ♂.
Hemiteles monozonius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 152 n. 7, ♂.
Hemiteles monosonius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 133 n. 48, ♂.
Hemiteles monozonius Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 103 n. 37, ♂.
Hemiteles monozonius Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 112 & 516 n. 45, ♂.
var. **micator** Grav. — ♂ — Eur.: Germania, Tauria.
Hemiteles micator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 832 n. 261, ♂ [excl. ♀].
Hemiteles monozonius var. micator Marshall, Catal. Brit. Ichneum. 1872 p. 44.
Hemiteles monozonius var. micator Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 517, ♂.
montezuma Cam. — ♀ — Am.: Mexico. [F. 26.
Hemiteles Montezuma Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 257 n. 22, ♀; T. 10
mucronatus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Hemiteles mucronatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 58 n. 17, ♂.
mulsantii Fonsc. — ♀ — Eur.: Gallia.
Hemiteles Mulsantii Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 47 n. 20, ♀.
nanodes (Först.) Schmkn. — ♀ — Eur: Germania.
Cremnodes nanodes Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 75 n. 3, ♀.
Hemiteles nanodes Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 134 & 556 n. 169, ♀.
nasutus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles nasutus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 57 n. 2, ♂.
natalensis Kriechb. — ♀ — Afr: Natal.
Hemiteles Natalensis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 303 n. 11, ♀.
nebulosus Rdw. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles nebulosus Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 17, ♀.
necator (Fabr.) Grav.! — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon necator Fabricius, Gen. Insect. 1776 p. 246 n. 74-75.
Ichneumon necator Villers, C. Linnaei Entom. IV. 1789 p. 179 n. 133.
Ichneumon necator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 194 n. 151.
Ichneumon necator Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 178 n. 185.
Cryptus necator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 88 n. 79.
Ichneumon necator Bechstein, Forstinsectol. 1818 p. 144 n. 295 & p. 495 n. 9.
Ichneumon necator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 269.
Ichneumon necator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 332.
Hemiteles necator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 829 n. 259, ♀ ♂.

Hemiteles necator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 314 n. 2.
Hemiteles necator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 154 n. 14, ♂.
Hemiteles necator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 122 n. 8, ♀ ♂.
Hemiteles necator Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 101 & 104 n. 7, ♀ ♂.
Hemiteles necator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1891 p. 71, ♂.
Hemiteles necator Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 109, 130 & 511 n. 29, ♀ ♂.

nemativorus Walsh[1]) — ♀ ♂ — Am.: United States.
Hemiteles nemativorus Walsh, Canad. Entomol. II. 1869 p. 9-12 & 31-33, ♀ ♂.

var. **fuscatus** Walsh — ♀ — Am.: Canada.
Hemiteles nemativorus var. fuscatus Walsh, Canad. Entomol. II. 1869 p. 12, ♀.

nens Htg.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles nens Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 253, ♀ ♂.
Hemiteles nens Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 151 n. 3.

niger Taschbg. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Hemiteles niger Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 136 n. 54, ♀ ♂.
Hemiteles niger Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 101 n. 41, ♀ ♂.
Hemiteles niger Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 113 & 519 n. 54, ♀ ♂.

nigricans Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Hemiteles nigricans Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 359 n. 13, ♂.
Hemiteles nigricans Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 782 n. 13.

nigriceps Ashm. — ♀ — Am.: California.
Hemiteles nigriceps Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 400, ♀.

nigricornis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Hemiteles nigricornis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 987 n. 54, ♀ ♂.
Hemiteles nigricornis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 118 & 526 n. 79, ♀ ♂.

nigriventris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia.
Hemiteles nigriventris Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 975 n. 22, ♀ ♂.
Hemiteles nigriventris Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 114, 117 & 521 n. 61, ♀ ♂.

nigromaculatus Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Hemiteles nigromaculatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 101 n. 7, ♀.

nitidus Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Hemiteles nitidus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 416, ♀.
Hemiteles nitidus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 123 & 540 n. 117, ♀.

notaticrus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles notaticrus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1244 n. 2, ♀.
Hemiteles notaticrus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 124 & 541 n. 121, ♀.

numidicus Thoms. — ♀ — Afr.: Numidia.
Hemiteles Numidicus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 32 n. 22, ♀.

obliquus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Hemiteles obliquus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 24 n. 9, ♀ ♂.
Hemiteles obliquus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 116, 117 & 524 n. 73, ♀ ♂.

obscuripes Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles obscuripes Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 976 n. 23, ♀.
Hemiteles obscuripes Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 114 & 521 n. 62, ♀.

obscurus Bridgm. — ♂ — Eur.: Britannia.
Hemiteles obscurus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 142, ♂.
Hemiteles obscurus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 100, ♂.
Hemiteles obscurus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 117 & 526 n. 77, ♂.

---

1) *Hymen.:* Nematus ventricosus (Walsh).
2) *Hymen.:* Microgaster nemorum (Hartig).

occidentalis Harrgt. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Hemiteles occidentalis Harrington, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 213, ♀.

opaculus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles opaculus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 975 n. 21, ♀.
Hemiteles opaculus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 115 & 523 n. 70, ♀.

orbiculatus Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles orbiculatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 866 n. 285, ♀.
Hemiteles orbiculatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 129 n. 33, ♀.
Hemiteles orbiculatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 117 & 511 n. 28, ♀.

ornaticeps Cam. — ♀ — Am.: Panama. [F. 24.
Hemiteles ornaticeps Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 258 n. 24, ♀; T. 10

ornaticornis Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles ornaticornis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 128, 133 & 547 n. 140, ♀.

ornatulus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles ornatulus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 980 n. 37, ♀.
Hemiteles ornatulus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 110 & 512 n. 32, ♀.

ottawensis Harrgt. — ♂ — Am.: Canada.
Hemiteles Ottawensis Harrington, Canad. Entomol. XXVIII. 1896 p. 78, ♂.

oxyphimus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Hemiteles oxyphymus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 815 n. 249, ♂.
Hemiteles palpator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 818 n. 252, ♀ [excl. ♂ & var. 5].
Hemiteles palpator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 130 n. 15, ♀.
Hemiteles palpator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 154 n. 17.
Hemiteles palpator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 43 n. 16, ♀ [excl. ♂].
Hemiteles palpator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 58 n. 3, ♀ [excl. ♂].
Hemiteles oxyphymus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 123 n. 12, ♀♂.
Hemiteles oxyphymus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 347, ♀♂.
Hemiteles oxyphimus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 101 n. 11, ♀ ♂.
Hemiteles oxyphymus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 123, 126, 129 & 538 [n. 113, ♀♂.

pallidicarpus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles pallicarpus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 970 n. 7, ♀.
Hemiteles pallicarpus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 108 & 508 n. 20, ♀.

pallidipennis Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Hemiteles pallipennis Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 361 n. 14, ♀ ♂.
Hemiteles pallipennis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 782 n. 14, ♀♂.

pallidipes (Ashm.) D. T. — ♀ ♂ — Am.:
Catalytus pallipes Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 419, ♀ ♂.
Hemiteles pallidipes m.

pallidus Ashm. — ♂ — Am.: Texas.
Hemiteles pallidus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 406, ♂.

palpator (Müll.) Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon palpator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 158 n. 1832.
? Cryptus palpator Schummel, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1827. 1828 p. 67.
Hemiteles palpator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 818 n. 252, ♂ [excl. ♀ & var. 1-3].
Hemiteles palpator Fonscolombe, Ann. soc. entom. Franee (2) X. 1852 p. 43 n. 16, ♂ [excl. ♀].
Hemiteles palpator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 58 n. 3, ♂ [excl. ♀].
Hemiteles palpator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 134 n. 49, ♂.
Hemiteles palpator Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 103, ♂.
Hemiteles palpator Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 125 & 543 n. 128, ♂.

pardosae Giard[1]) — ♀ — Eur.: Gallia.
Hemiteles Pardosae Giard, Bull. soc. entom. France 1895 p. LXXIV, ♀; Fig. III.

parvus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Ischnus parvus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 112.
Hemiteles parvus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 121 n. 3, ♂.
Hemiteles parvus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 324 n. 3, ♂.

patruelis Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Hemiteles patruelis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 170 n. 2, ♀.

pavoniae Rond.[2]) — Eur.: Italia.
Hemiteles Pavoniae Rondani, Bull. soc. entom. Ital. IX. 1877 p. 181 n. 36.

pectoralis Rdw.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles pectoralis Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 27, ♀ ♂.

pedestris (Fabr.) Thoms.[4]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon pedestris Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 344 n. 100.
Ichneumon pedestris Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 441 n. 129.
Ichneumon pedestris Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 211 n. 153.
Ichneumon pedestris Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 217 n. 273.
Ichneumon pedestris Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2717 n. 218.
Ichneumon pedestris Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 376.
Ichneumon pedestris Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 204 n. 200.
Ichneumon pedestris Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 192 n. 254.
Ichneumon pedestris Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 302 n. 2132, ♀ ♂.
Cryptus pedestris Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 92 n. 101.
Ichneumon pedestris Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 38 n. 10, ♀.
Gelis pedestris Thunberg, Nov. acta soc. sc. Upsal. IX. 1827 p. 200.
Pezomachus pedestris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 882 n. 294, ♀.
Cryptus pedestris Trentepol, Isis 1829 p. 823 n. 2.
Cryptus (Pezomachus) pedestris Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 371 n. 17, ♀.
Pezomachus pedestris Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 315 n. 2.
Pezomachus pedestris Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 154 n. 5, ♀.
Pezomachus vagans Rosenhauer, Ber. Naturf. Vers. Nürnberg 1845 p. 179 [non Grav.].
Theroscopus pedestris Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 102 n. 10, ♀.
Pezomachus (Theroscopus) pedestris Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 149 [n. 11 & p. 247 n. 2.
Pezomachus (Theroscopus) pedestris Tappes, Ann. soc. entom. France (4) IX. 1869 p. 20, ♂;
Theroscopus pedestris Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 59, ♀; T. 37 F. 6. [T. 1 F. 15.
Theroscopus pedestris Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 158 n. 5, ♀.
Hemiteles pedestris Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 993 n. 71, ♀ ♂.
Hemiteles pedestris Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 132, 135 & 561 n. 181, ♀♂.

perditus (Prov.) Davis — ♂ — Am.: Canada.
Cryptus perditus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 73 n. 48, ♂.
Hemiteles perditus Davis, Canad. Entomol. XXVII. 1895 p. 288.

---

1) *Arachn.:* Pardosa saccata, P. pullata (Giard).
2) *Lep.:* Saturnia pyri (Rondani).
3) *Hymen.:* Hemiteles pectoralis (Rudow).
4) *Lep.:* Psyche opacella, P. calvella, Fumea intermediella (Ratzeburg). — *Col.:* Cryptocephalus duodecimpunctatus (Tappes). — *Hymen.:* Microgaster: Lasiocampa pini, Hypera plantaginis (Ratzeburg).

persector Parf.[1]) — ♀ — Eur.: Britannia.
Hemiteles persector Parfitt, Entom. M. Magaz. XVIII. 1882 p. 184, ♀.
Hemiteles persector Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 102, ♀.
pezomachorum Ratzbg. — Eur.: Germania.
Hemiteles Pezomachorum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 157 n. 27.
phloeas Boie[2]) — ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles phloeas Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 101 n. 34, ♂.
Hemiteles phloeas Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 135, ♂.
Hemiteles phloeas Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 119 & 528 n. 84, ♂.
piceiventris Harrgt. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Hemiteles piceiventris Harrington, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 213, ♀.
picipes Grav. — ♂ — Eur.: Austria inf., Hungaria.
Hemiteles picipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 785 n. 229, ♂.
Hemiteles picipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 133 n. 47, ♂.
Hemiteles picipes Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 117 & 525 n. 75, ♂.
pictipes Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Hemiteles pictipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 799 n. 239, ♀.
Hemiteles pictipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 131 n. 37, ♀.
Hemiteles pictipes Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 100 n. 31, ♀.
Hemiteles pictipes Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 972 n. 13, ♀ ♂.
Hemiteles pictipes Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 111 & 513 n. 35, ♀♂.
platygaster Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles platygaster Schmiedeknecht, Termész. Füset. XX. 1897 p. 124 & 541 n. 120, ♀.
plectisciformis Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles plectisciformis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 119 & 528 n. 85, ♀.
plumbeus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles plumbeus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 979 n. 31, ♀.
Hemiteles plumbeus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 114 & 520 n. 57, ♀.
politus Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Hemiteles politus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 146.
Hemiteles politus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 101, ♀.
Hemiteles politus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 131 & 551 n. 155, ♀.
populneus Boie — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles populneus Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 102 n. 36, ♀ ♂.
posticus Woll. — ♀ — Afr.: Madeira.
Hemiteles posticus Wollaston, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) I. 1858 p. 22, ♀.
pothinus Marsh. — ♀ — Am.: Venezuela.
Hemiteles postinus Marshall, Ann. soc. entom. France XLI. 1892 p. 64 n. 53, ♀.
prosthesimae How.[3]) — ♂ — Am.: Massachusetts.
Hemiteles Prosthesimae (Riley) Howard, Proc. Entom. Soc. Washington II. 1892 p. 294 n. 17, ♂.
pulchellus Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles pulchellus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 854 n. 280, ♀.
Hemiteles pulchellus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 130 n. 35, ♀.
Hemiteles pulchellus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 110 & 514 n. 37, ♀.
pulcher D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Hemiteles pulchellus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 257 n. 7, ♀ [non Gravenhorst].
Hemiteles pulcher m.

---

1) *Col.:* Gyrinus natator (Parfitt).
2) *Lep.:* Polyommatus phloeas (Boie).
3) *Arachn.:* Prosthesima furcata (Howard).

pullator (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Cryptus pullator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 584 n. 112, ♀.
Phygadeuon pullator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 29, ♀.
Phygadeuon pullator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 225 n. 13, ♀.
Hemiteles pullator Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2388 n. 69b, ♀ ♂.
Hemiteles pullator Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 133 & 553 n. 162, ♀ ♂.
punctatus Ratzbg. — ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles punctatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 127 n. 5, ♂.
Hemiteles punctatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 564 n. 6, ♂.
punctiventris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles punctiventris Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 977 n. 27, ♀ ♂.
Hemiteles punctiventris Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 123, 126 & 539 n. 115, [♀ ♂.
pygmaeus Brischke [1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles pygmaeus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 1. 1888 p. 110 n. 3, ♀ ♂.
Hemiteles pygmaeus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 106 n. 20, ♀ ♂.
rarus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Hemiteles rarus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 171 n. 4, ♂.
ridibundus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Hemiteles ridibundus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 844 n. 272, ♀.
Hemiteles ridibundus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 128 n. 31, ♀.
Hemiteles ridibundus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 348, ♀.
Hemiteles ridibundus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 101 & 103 n. 27, ♀ ♂.
Hemiteles ridibundus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 48, ♀.
Hemiteles ridibundus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 123, 131 & 539 n. 116, ♀.
rileyi Ashm. — ♂ — Am.: Missouri.
Hemiteles Rileyi Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 402, ♂.
rubiginosus (Gmel.) Grav. — ♂ — Eur.: Germania, Gallia.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 62 n. 218.
Ichneumon rubiginosus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2700 n. 283.
Hemiteles rubiginosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 804 n. 243.
Hemiteles rubiginosus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 34 n. 6.
Hemiteles rubiginosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 127 n. 27, ♂.
Hemiteles rubiginosus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 118 & 526 n. 78, ♂.
rubricollis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles rubricollis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 979 n. 33, ♀.
Hemiteles rubricollis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 109 & 510 n. 26, ♀.
rubricornis Ashm. — ♀ — Am.: Virginia.
Hemiteles rubricornis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 405, ♀.
rubripes Thoms. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Hemiteles rubripes Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 976 n. 24, ♀.
Hemiteles rubripes Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 120 & 521 n. 63, ♀.
rubrotinctus Thoms. — ♀ — Eur. mer.
Hemiteles rubrotinctus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 31 n. 20, ♀.
Hemiteles rubrotinctus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 106, 109 & 503 n. 4, ♀.
rufiantennatus Cam. — ♂ — Am.: Guatemala.
Hemiteles ruficornis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 259 n. 27, ♂ [nec Gravenhorst].
Hemiteles rufiantennatus m.
ruficollis Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles ruficollis Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 27, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.*: Fenella agrimoniae (Brischke).

ruficornis (Grav.) Thoms. — ♀ — Eur.: Britannia.
Cryptus ruficornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 574 n. 105, ♀.
Phygadeuon ovatus var. ruficornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 42.
Hemiteles ruficornis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 971 n. 10, ♀.
Cryptus ruficornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 47, ♀.
Hemiteles ruficornis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 112 & 515 n. 41, ♀.
ruficoxus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Hemiteles ruficoxus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 331.
Hemiteles ruficoxus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 122 n. 5, ♀ ♂.
Hemiteles ruficoxus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 325 n. 5, ♀ ♂.
rufipes Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Hemiteles rufipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 96 n. 1, ♀.
rufithorax Cam. — ♀ — Am.: Panama.
Hemiteles rufithorax Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 254 n. 8, ♀.
rufiventris Brullé — ♀ — Am. mer.
Hemiteles rufiventris Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 254 n. 4, ♀.
rufocinctus Grav. — (♀) ♂ — Eur.
Hemiteles rufocinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 811 n. 246, ♂.
Hemiteles rufocinctus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 157 n. 28, ♂.
Hemiteles rufocinctus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 35 n. 7.
Hemiteles rufocinctus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 127 n. 28, ♂.
Hemiteles rufocinctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 347, ♂.
Hemiteles rufocinctus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 102 & 159, ♂.
Hemimachus rufocinctus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 158.
Hemiteles rufocinctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 70, ♂.
Hemiteles rufocinctus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 120 & 531 n. 94, (♀) ♂.
rufulus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles rufulus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 972 n. 15, ♀ ♂.
Hemiteles rufulus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 111, 124, 126 & 514 n. 38, ♀ ♂.
rufus Taschbg. — Am.: Brasilia.
Hemiteles rufus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 104 n. 10 [nec Brischke].
rugifer Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles rugifer Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 983 n. 45, ♀.
Hemiteles rugifer Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 114, 116 & 520 n. 58, ♀.
rugifrons Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles rugifrons Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 978 n. 30, ♀.
Hemiteles rugifrons Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 121 & 535 n. 103, ♀.
scabriculus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles scabriculus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 969 n. 6, ♀ ♂.
Hemiteles scabriculus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 107 & 507 n. 15, ♀ ♂.
scabrosus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Hemiteles scabrosus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 332.
Hemiteles scabrosus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 121 n. 2, ♀.
Hemiteles scabrosus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 324 n. 2, ♀.
schaffneri Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles Schaffneri Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 109 & 505 n. 12, ♀ ♂.
scitulus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Hemiteles scitulus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 174 n. 12, ♀.
scrupulosus Grav. — ♂ — Eur.: Britannia.
Hemiteles scrupulosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 817 n. 251, ♂.
Hemiteles scrupulosus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 41 n. 14, ♂.

Hemiteles scrupulosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 135, ♂.
Hemiteles scrupulosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 347, ♂.
Hemiteles scrupulosus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 104 n. 43, ♂.
Hemiteles scrupulosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 1. 1888 p. 59, ♂.
Hemiteles scrupulosus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 126 & 530 n. 91, ♂.

scutellaris Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Hemiteles scutellaris Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 103 n. 9, ♀.

secernendus Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles secernandus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 108 & 509 n. 21, ♀.

semicroceus Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles semicroceus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 129 & 548 n. 144, ♀.

semistrigosus Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles semistrigosus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 107 & 508 n. 18, ♀.

sericeus Rdw. — Eur.: Germania.
Hemiteles sericeus Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 17.

servilis Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Hemiteles servilis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 176 n. 17, ♀.

sessilis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Hemiteles sessilis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 334.
Hemiteles sessilis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 124 n. 12, ♀.
Hemiteles sessilis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 327 n. 12, ♀.

sexlineatus Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Hemiteles sexlineatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 255 n. 11, ♀.

similis (Gmel.) Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Gallia.
? Ichneumon debellator Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 370 n. 747, ♀.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 70 n. 347.
? Ichneumon debellator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 184 n. 150.
? Ichneumon debellator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2698 n. 176.
Ichneumon similis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2720 n. 393.
? Ichneumon debellator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 222 n. 98.
Hemiteles similis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 793 n. 235, ♀ ♂.
Hemiteles similis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 150 n. 1, ♀ ♂.
Hemiteles similis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 151 n. 1.
Hemiteles similis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 33 n. 4, ♂.
Hemiteles similis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 123 n. 14, ♀ ♂.
Hemiteles similis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 346, ♀ ♂.
Hemiteles similis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 100 n. 13, ♀ ♂.
Hemiteles similis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 985 n. 49, ♀ ♂.
Hemiteles similis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 115, 116 & 522 n. 64, ♀ ♂.

simillimus Taschbg. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles similis var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 793 n. 235.
Hemiteles aestivalis var. 5 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 805 n. 244.
Hemiteles simillimus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 124 n. 18, ♀.
Hemiteles simillimus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 120, 124 & 530 n. 92, ♀ ♂.

sisyphii Verh.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles sisyphii Verhoeff, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 53, ♀ ♂.
Hemiteles sisyphii Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 115, 117 & 522 n. 66, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Grapholitha tripunctata, Lasiocampa pini, — *Arachn.:* Epeira diadema (Brischke).

2) *Arachn.:* Theridium sisyphium (Verhoeff).

socialis Ratzbg. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles socialis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 151 n. 4, ♂.
Hemiteles socialis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 127 n. 4, ♀.
Hemiteles socialis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 152 n. 4, ♀ ♂.
Hemiteles socialis Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 102 n. 36, ♂.
Hemiteles socialis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 563 n. 5, ♀ ♂.

solutus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles solutus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 990 n. 61, ♀ ♂.
Hemiteles solutus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 128 & 546 n. 136, ♀ ♂.

sordipes Grav. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania, Gallia.
Hemiteles sordipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 708 n. 238, ♀.
Hemiteles sordipes Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 33 n. 3, ♀.
Hemiteles sordipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 131 n. 38, ♀.
Hemiteles sordipes Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 100 n. 32, ♀.
Hemiteles sordipes Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 976 n. 25, ♀.
Hemiteles sordipes Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 114 & 521 n. 60, ♀.

spinosus Spin. — ♀ — Am. mer.
Hemiteles spinosus Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 145 n. 8, ♀.

stagnalis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles stagnalis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 987 n. 56, ♀ ♂.
Hemiteles stagnalis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 127 & 544 n. 130, ♀ ♂.

stenopterus (Marsh.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia, Britannia.
Aptesis stenoptera Marshall, Entom. M. Magaz. V. 1868 p. 156, ♀.
Aptesis stenoptera Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 157 n. 5.
Hemiteles stenopterus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 985 n. 51, ♀.
Hemiteles stenopterus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 108, 133 & 510 n. 25, ♀.

stigmatus Ashm. — ♂ — Am.: Colorado.
Hemiteles stigmatus Ashmead, Bull. Colorad. Biol. Assoc. I. 1890 p. 21, ♂.

striatus Brullé — ♀ — Am.: Columbia.
Hemiteles striatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 255 n. 25, ♀.

subannulatus Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Hemiteles subannulatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 147.
Hemiteles subannulatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 101, ♀.
Hemiteles subannulatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 128 & 547 n. 141, ♀.

subflavescens Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Hemiteles subflavescens Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 24, ♂.

submarginatus Bridgm.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Hemiteles submarginatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 143, ♀ ♂.
Hemiteles submarginatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 100, ♀ ♂.
Hemiteles submarginatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 107, 108 & 507 n. 14, [♀ ♂.

subspinosus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Hemiteles subspinosus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 333.
Hemiteles subspinosus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 123 n. 10, ♀.
Hemiteles subspinosus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 326 n. 10, ♀.

subzonatus (Grav.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Britannia.
Ichneumon subzonatus Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 40 n. 12, ♀.
Pezomachus subzonatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 887 n. 299, ♀.
Theroscopus subzonatus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 101 n. 8, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Apanteles nothus (Bignell).

Theroscopus subzonatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 158 n. 3, ♀.
Hemiteles subzonatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 135 & 560 n. 179, ♀.
sulsus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Hemiteles sulsus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 175 n. 15, ♀.
syrphicola Ashm.[1]) — ♂ — Am.: Washington.
Hemiteles syrphicola Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 405, ♂.
taschenbergii Schmkn. — ♂ — Eur.: Germania.
Hemiteles melanarius var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 790 n. 233, ♂
Hemiteles Gravenhorstii Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 132 n. 44, ♂ [[non Ratzeburg].
Hemiteles Taschenbergii Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 120, 121 & 531 n. 93, ♂.
tener Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Hemiteles tener Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 333.
Hemiteles tener Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 123 n. 8, ♂.
Hemiteles tener Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 326 n. 8, ♂.
tenerrimus Grav. — ♂ — Eur.: Britannia.
Hemiteles tenerrimus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 831, ♂.
Hemiteles tenerrimus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 135 n. 52, ♂.
Hemiteles tenerrimus Parfitt, Rep. & Trans. Devon. Assoc. XIII. 1881 p. 261.
Hemiteles tenerrimus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 104 n. 39, ♂.
Hemiteles tenerrimus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 125 & 542 n. 125, ♂.
tenuicornis Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Hemiteles tenuicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 843 n. 271, ♀ ♂.
Hemiteles tenuicornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 123 n. 11, ♀♂.
Hemiteles tenuicornis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 102 n. 9, ♀ ♂.
Hemiteles tenuicornis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 120 & 532 n. 97, ♀♂.
texanus Ashm. — ♀ — Am.: Texas.
Hemiteles Texanus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 404, ♀.
thoracicus Cress. — ♀ — Am.: Cuba. [Ratzeburg].
Hemiteles thoracicus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 24, ♀ [nec
thoracicus Ratzbg.! — ♀ — Eur.
Hemiteles thoracicus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 156 n. 25, ♀.
Hemiteles thoracicus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 566 n. 15, ♀.
thyridopterigis Ril.[2]) — ♀ ♂ — Am.: United States. [11 (♀) & 12 (♂).
Hemiteles? thyridopterigis Riley, 1st Ann. Rep. Insect. Missouri 1869 p. 150, ♀♂; T. 2 F. 10,
Hemiteles thyridopterigis Walsh, Canad. Entomol. II. 1869 p. 31, ♀ ♂.
Hemiteles thyridopterigis Riley, General-Index Rep. Insect. Missouri 1881 p. 65, ♀ ♂.
Hemiteles thyridipterigis Lintner, 1st Ann. Rep. Insect. New York 1882 p. 85.
Hemiteles thyridopterygis Howard, Proc. Entom. Soc. Washington I. 1886 p. 28.
Hemiteles thyridopterigis Packard, Rep. U. S. Entom. Commiss. V. 1890 p. 261; Fig. 101.
tosquinetii D. T. — ♀ — Afr.: Cap.
Hemiteles scitulus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 251 n. 2, ♀ [non Cresson].
Hemiteles Tosquinetii m.
townsendii Ashm. — ♂ — Am.: Michigan.
Hemiteles Townsendi Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 405, ♂.
transilis Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Hemiteles transilis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 175 n. 16, ♀.
Hemiteles transilis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 45. 1886 Hymen. I. p. 257 n. 20, ♀.

---

[1]) *Dipt.:* Mesograpta obliqua (Ashmead).
[2]) *Lep.:* Thyridopteryx ephemeraeformis Haw

triannulatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles triannulatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 991 n. 64, ♀ ♂.
Hemiteles triannulatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 129, 130 & 548 n. 142, [♀ ♂.

trichocampi Boie[1]) — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles Trichocampi Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 100 n. 32, ♀.

tricolor Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Hemiteles tricolor Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 252 n. 1, ♀.

trifasciatellus D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Hemiteles trifasciatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1867 p. 101 n. 6, ♀
Hemiteles trifasciatellus m. [[non Förster].

trifasciatus (Först.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Theroscopus trifasciatus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 94 n. 1, ♀.
Hemiteles trifasciatus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 134 & 557 n. 172, ♀.

trimaculatus Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Hemiteles trimaculatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XLVIII. 1876 p. 102 n. 8, ♀.

tripartitus Brullé — ♂ — As.: India, Pondicherry.
Hemiteles tripartitus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 258 n. 9, ♂.

tristator Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania, Gallia.
Hemiteles tristator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 787 n. 231, ♂.
Hemiteles tristator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 314 n. 1.
Hemiteles tristator Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 58.
Hemiteles tristator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 158 n. 29, ♀.
Hemiteles tristator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) X. 1852 p. 32 n. 2, ♂.
Hemiteles tristator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 126 n. 24, ♀ ♂.
Hemiteles tristator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 345, ♂.
Hemiteles tristator Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 100 n. 23, ♀ ♂.
Hemiteles tristator Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 116 & 523 n. 68, ♀ ♂.

trochanteralis D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia. [[nec Thomson 1884].
Hemiteles trochanteratus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 26 n. 12, ♀ ♂
Hemiteles trochanteratus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 107, 115, 117, 131,
Hemiteles trochanteralis m. [132 & 508 n. 19, ♀ ♂.

trochanteratus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles trochanteratus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 994 n. 73, ♀ ♂.

tuberculatus (Ashm.) D. T. — ♀ — Am.: California.
Cremnodes tuberculatus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 211, ♀.
Hemiteles tuberculatus m.

ungularis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles ungularis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 994 n. 74, ♀.
Hemiteles ungularis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 131 & 550 n. 150, ♀.

unicolor Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Hemiteles unicolor Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 974 n. 20, ♀ ♂.
Hemiteles unicolor Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 115, 116 & 524 n. 71, ♀ ♂.

utilis Nort.[3]) — ♀ — Am.: Connecticut.
Hemiteles utilis Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1869 p. 326 nota n. 2, ♀.
Hemiteles utilis Howard, Scudder: Butterflies U. S. 1889 p. 1879, ♀; T. 88 F. 4.

---

1) *Hymen.:* Trichiocampus eradiatus (Boie).
2) *Arachn.:* Epeira diademata (Brischke).
3) *Lep.:* Heraclides cresprontes (Howard). — *Hymen.:* Lophyrus abietis (Webster).

validicornis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemiteles validicornis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 995 n. 76, ♀.
Hemiteles validicornis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 131 & 550 n. 152, ♀.

variegatus Ashm. — ♀ — Am.: California.
Hemiteles variegatus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 400, ♀.

varilcornis Grav. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Hemiteles varicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 837 n. 265, ♀.
Hemiteles varicornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 121 n. 3, ♀.
Hemiteles varicornis Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 101 n. 3, ♀.
Hemiteles varicornis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 120, 127 & 532 n. 95, ♀.

varilcoxis Taschbg. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Hemiteles varicoxis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 134 n. 51, ♀.
Hemiteles varicoxis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 972 n. 14, ♀.
Hemiteles varicoxis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 111 & 513 n. 36, ♀.

varilitarsus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Hemiteles varitarsus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 823 n. 253, ♀.
Hemiteles varitarsus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 58 n. 4, ♀ ♂.
Hemiteles varitarsus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 124 n. 16, ♀.
Hemiteles varitarsus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 347, ♀ ♂.
Hemiteles varitarsus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 103 n. 15, ♀ ♂.
Hemiteles varitarsus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 969 n. 4, ♀ ♂.
Hemiteles varitarsus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 107 & 507 n. 16, ♀ ♂.

varius Walk. — ♀ — As.: Ceylon.
Hemiteles ? varius Walker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) V. 1860 p. 307, ♀.

veda Cam. — ♀ — As.: Ceylon.
Hemiteles veda Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. P. 4. 1897 p. 17, ♀.

virginiensis Ashm. — ♀ — Am.: Virginia.
Hemiteles Virginiensis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 404, ♀.

xanthogaster Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Hemiteles xanthogaster Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 253 n. 3, ♀.

URITHREPTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 180 n. 68.
οὐρίθρεπτος, in monte nutritus.

Species exstat.

OCYMORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 180 n. 67.
Etymol. obscura.

Species exstat.

ISDROMAS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 180 n. 66.
εἰσδρομή, incursus.

Species exstat.

ADIASTOLA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 180 n. 69.
ἀδιάστολος, confusus, obscurus.

americana How.[1]) — ♀ ♂ — Am.: Columbia.
Adiastola Americana Howard, Bull. Dep. Agric. Entom. Techn. V. 1897 p. 54, ♀ ♂.

ENCRATES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 180 n. 64.
κράτησις, potentia.

Synon.: Hemiteles Brischke.

subimpressus Brischke — ♀ — Eur.: Germania. [1892 p. 48, ♀.
Hemiteles (Encratis?) subimpressus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1.

DIATORA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 180 n. 63.
διατόρος, perforans.
Species exstat.

ZOOPHTHORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 180 n. 62.
ζῶον, animal; φθείρω, perdo.
Species exstat.

ETHELURGUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 180 n. 61.
ἐθελουργός, sponte opus agens.
Species exstat.

PHATNACRA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 179 n. 60.
φάτνη, praesepe; ἀκρός, acer.
Species exstat.

IDEMUM

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 179 n. 59.
εἰδήμων, sciens.
Species exstat.

EUDELUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 179 n. 58.
εὔδηλος, evidentissimus.
Species exstat.

---

[1]) *Hymen.*: Pimpla inquisitor in: Orgyia leucostigma (Howard).

ITAMUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 179 n. 57.
ἰταμός, temerarius.
Species exstat.

GNOTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 179 n. 56.
γνωτός, notus.
Species exstat.

ILAPINASTES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 179 n. 55.
εἰλαπιναστής, conviva.

Synon.: Hemiteles Ashmead.

davidsonii Ashm. — ♀ — Am.: California.
Hemiteles (Ilapinastes) Davidsonii Ashmead, Entom. News VII. 1896 p. 320, ♀.

NAETES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 179 n. 54.
ναιέτης, incola.

Synon.: Hemiteles Brischke.

rufus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Hemiteles (Naites) rufus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 49, ♀.

BRACHYCRANIUM

Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 368.
βραχύς, brevis; *κρᾶνον*, caput.

Synon.: Brachycephalus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 179 n. 53
βραχύς, brevis; *κεφαλή*, caput. [[nec Holland 1857].

Species exstat.

XENOBRACHYS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 179 n. 52.
ξένος, peregrinus; *βραχύς*, brevis.
Species exstat.

AGASTHENES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 178 n. 51.
ἀγασθενής, valde robustus.
Species exstat.

CHRIODES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 178 n. 50.
χρίω, leviter tango.
Species exstat.

ORTHIZEMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 178 n. 49.
ὄρθος, erectus; *ζέμα*, decoctum.

Synon.: Hemiteles Brischke.

ornatus Brischke — ♀ — Eur.: Germania. [p. 106 n. 19, ♀.
Hemiteles (Orthizema) ornatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890

MICROTORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 178 n. 48.
μικρός, parvus; *τόρος*, scalprum lapicidarum.
Species exstat.

PANTOLISPA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 178 n. 47.
πᾶς, omnis; *λίσπος*, levis.
Species exstat.

BARYDOTIRA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 178 n. 46.
βαρυδότειρα, quae mala tribuit.
Species exstat.

PHILONYGMUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 177 n. 45.
φίλος, amicus; *νυγμός*, punctio.
Species exstat.

ALLOMACRUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 177 n. 44.
Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1281.
ἄλλος, alius; *μακρός*, longus.

pimplarius Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Helvetia.
Allomacrus pimplarius Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1282 n. 1, ♀ ♂.

BLAPSIDOTES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 177 n. 43.
βλάψις, laesio; *δοτός*, qui dare potest.
Species exstat.

ISADELPHUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 177 n. 42.
ἴσος, aequalis; *ἀδελφός*, frater.
Species exstat.

RHADINOCERA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 177 n. 41.
ῥαδινός, gracilis; κέρας, cornu.
Species exstat.

TOLMERUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 177 n. 40.
τολμηρός, audax.
Species exstat.

ASCHISTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 177 n. 39.
ἀ-σχιστός, non fissus.
Species exstat.

RHADIURGUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 177 n. 38.
ῥαδιουργέω, levis sum.
Species exstat.

PARAPHYLAX

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 176 n. 37.
παρά, ad; φύλαξ, custos.
Species exstat.

LYMEON

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 176 n. 36.
λυμεών, vastator.

annulicornis Ashm. — ♀ — Am.: Utica.
Lymeon annulicornis Ashmead, Insect Life VII. 1894 p. 243, ♀.

MASTRUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 176 n. 35.
μαστρός, quaesitor.
Species exstat.

AENOPLEX

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 176 n. 34.
αἰνός, vehemens; πλήκτης, percussor.

betulaecola Ashm.[1] — ♀ — Am.: Washington.
Aenoplex betulaecola Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 208, ♀.

STREPSIMALLUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 176 n. 33.
στρέψις, conversio; μαλλός, vellus.
Species exstat.

---

[1]) *Lep.:* Acronycta betulae (Ashmead).

DAÏCTES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 176 n. 32.
δαϊκτήρ, qui interficit in bello.
Species exstat.

ALEGINA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 176 n. 31.
ἀλεγεινός, molestus.
Species exstat.

BATHYTHRIX

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 176 n. 30.
βαθύς, altus; *θρίξ*, capillus.

meteori How. — ♀ ♂ — Am.: Columbia.
Bathythrix meteori Howard, Bull. Dep. Agric. Entom. Techn. V. 1897 p. 53, ♀ ♂.
pimplae How.[1]) — ♀ — Am.: Columbia.
Bathythrix pimplae Howard, Bull. Dep. Agric. Entom. Techn. V. 1897 p. 54, ♀; Fig.

PLESIOMMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 176 n. 29.
πλησίος, propinquus; *ὄμμα*, oculus.
Species exstat.

HABROMMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 176 n. 28.
ἁβρός, splendidus; *ὄμμα*, oculus.
Species exstat.

DIAGLYPTA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 176 n. 27.
διάγλυπτος, insculptus.
Species exstat.

STYGERA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 176 n. 26.
στυγερός, terribilis.
Species exstat.

ASTHENOPTERA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 175 n. 25.
ἀ-priv.; *σθένος*, robur; *πτερόν*, penna.
Species exstat.

---

1) *Hymen.:* Pimpla inquisitor (Howard).

OPISTHOSTENUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 175 n. 24.
ὄπισθε, a tergo; *στενός*, angustus.
Species exstat.

ACLASTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 175 n. 23.
ἄ-κλαστος, infractus.
Species exstat.

DAËTORA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 175 n. 22.
δαῖτες, cibi.
Species exstat.

LYSIBIA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 175 n. 21.
λύσις, solutio; *βιόω*, vivo.
Species exstat.

MICROPLEX

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 175 n. 20.
μικρός, parvus; *πλήκτης*, percussor.
Species exstat.

ASTOMASPIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 175 n. 19.
ἄστομος, os non habens; *ἀσπίς*, scutum.
Species exstat.

ISCHYRACIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 175 n. 18.
ἰσχυρός, validus; *ἀκίς*, cuspis.
Species exstat.

STEGANOPS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 175 n. 17.
στεγάνη, operculum; *ὄψ*, oculus.
Species exstat.

ISCHNURGOPS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 175 n. 16.
ἰσχνός, macer; *ὄψ*, oculus.
Species exstat.

TRISACRA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 174 n. 14.
τρίς, ter; *ἀκρός*, acer.
Species exstat.

PEMON

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 174 n. 13.
Etymol. obscura.
Species exstat.

TRESTIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 174 n. 12.
τρέστης, timidus.
Species exstat.

GUNOPACHES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 174 n. 11.
γουνοπαχής, genua pinguia habens.
Species exstat.

ACROLYTA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 174 n. 10.
ἄκρον, apex; *λυτός*, solutus.

aletiae Ashm.[1] — ♀ ♂ — Am.: Alabama, Missouri.
Acrolyta Aletiae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 209, ♀ ♂.
empretiae Ashm.[2] — ♀ — Am.: Washington Terr.
Acrolyta Empretiae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 209, ♀.
mesochori Ashm.[3] — ♀ — Am.: Washington Terr.
Acrolyta Mesochori Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 208, ♀.

CAENOMERIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 174 n. 9.
καινός, novus; *μερίς*, portio.
Species exstat.

OTACUSTES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 174 n. 8.
ὠτακουστέω, ausculto.

Synon.: Mesostenus Provancher.

armatus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Mesostenus armatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 76 n. 9, ♀.
Mesostenus (Otacustes) armatus Davis, Canad. Entomol. XXVII. 1895 p. 288.

---

1) *Hymen.:* Apanteles aletiae (Ashmead).
2) *Lep.:* Empretia stimulea (Ashmead).
3) *Hymen.:* Apanteles congregatus (Ashmead).

atriceps Ashm.[1]) — ♀ — Am.: Missouri.
Otacustes atriceps Ashmead, Insect Life VII. 1894 p. 244, ♀.
breviventris Grav. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Hemiteles breviventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 789 n. 232, ♂.
Hemiteles breviventris Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 120 n. 1, ♂.
Hemiteles breviventris Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 100 n. 1, ♂.
Hemiteles breviventris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1891 p. 70, ♂.
Hemiteles (Otacustes) breviventris Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 106 & 501 [n. 1, ♂.
chrysopae Ashm.[2]) — ♂ — Am.: Missouri.
Otacustes Chrysopae Ashmead, Insect Life VII. 1894 p. 243, ♂.
orgyiae Ashm.[3]) — ♀ — Am.: Missouri.
Otacustes Orgyiae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 209, ♀.
periliti Ashm.[4]) — ♀ — Am.: Washington Terr.
Otacustes Periliti Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 210, ♀.
Otacustes Periliti Howard, Bull. Dep. Agric. Entom. Techn. V. 1897 p. 32; Fig.

XENOLYTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 174 n. 7.
ξενός, peregrinus; *λυτός*, solubilis.
Species exstat.

GNYPETOMORPHA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 173 n. 6.
γνυπετός, in genua procumbens; *μορφή*, forma.
Species exstat.

CATALYTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 173 n. 5.
καταλύω, dissolvo.
Vide genus Hemiteles.

CHIROTICA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 173 n. 1.
χείρ, manus.
Vide genus Hemiteles.

SYNECHES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 173 n. 4.
συνεχής, continuus.
Species exstat.

---

1) *Neur.:* Chrysopa oculata (Ashmead).
2) *Neur.:* Chrysopa oculata (Ashmead).
3) *Lep.:* Orgyia leucostigma (Ashmead).
4) *Hymen.:* Perilitus communis (Ashmead).

ACLASTONEURA

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 359.
ἄκλαστος, haud fractus; νεῦρον, nervus.

tricolor Kriechb. — ♀ — Eur.: Gallia.
Aclastoneura tricolor Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 359, ♀.
Aclastoneura tricolor Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 567, ♀.

ALLOCOTA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 173 n. 2.
ἀλλόκοτος, alienus.

confederatae Ashm.[1], — ♀ — Am.: Missouri.
Allocota confederatae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 208, ♀.

DEUTEROSPINOLIA m.

δεύτερος, secundus; Spinolia, nom. propr. Hymen.

Synon.: Spinolia Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 173 n. 3 [non Klug].
M. Spinola, nom. propr.

Vide genus Hemiteles.

33. *Subfam.* Phygadeuontinae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 144 & 181.

DEMOPHELES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 186 n. 49.
δημός, pinguedo; φηλέω, decipio.

Synon.: Mecocryptus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 520.
μήκων, papaver; Cryptus, nom. propr. Hymen.
Phygadeuon Gravenhorst & auct.

caliginosus (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Phygadeuon caliginosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 645 n. 150, ♀ [excl. ♂].
Phygadeuon corruptor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 49 n. 78, ♀.
Mecocryptus caliginosus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 521.
Mecocryptus caliginosus Thomson, Opusc. entom. P. 6. 1874 p. 607 n. 1, ♀ ♂.
Mecocryptus caliginosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 340, [♀ ♂.
Phygadeuon caliginosus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 223 n. 1, ♀ ♂.
Phygadeuon corruptor Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 223 n. 60, ♀.
Demopheles caliginosus m.

NUNECHES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 186 n. 48.
νουνέχεια, prudentia.
Species exstat.

---

[1]) *Lep.:* Psyche confederata (Ashmead).

BACHIA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 186 n. 47.
M. Bach, nom. propr.

Synon.: Phygadeuon Brischke.

nigra Ashm. — ♀ — Am.: Bering Island.
Bachia nigra Ashmead, Fur Seals & Fur Seals Islands IV. 1899 p. 340, ♀.

testaceipes Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Phygadeuon (Bachia) testaceipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 1. 1888 [p. 69, ♀.

PHYZELUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 185 n. 46.
φύζηλις, profuga.

fasciatus Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Phyzelus fasciatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 1. 1888 p. 105, ♂.

MEDOPHRON

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 185 n. 45.
Etymol. obscura.

niger Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Medophron niger Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 344, ♀.

TERPIPHORA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 185 n. 43.
Etymol. obscura.
Species exstat.

TRACHYSPHYRUS

Haliday, Trans. Linn. Soc. London XVII. P. 3. 1836 p. 317.
τραχύς, asper; *σφυρόν*, calyx.

imperialis Hal. — ♀ — Am.: Cap Horn.
Trachysphyrus imperialis Haliday, Trans. Linn. Soc. London XVII. P. 3. 1836 p. 317 n. 5, ♀.

SCINACOPUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 185 n. 44.
σκίναξ, *ἀκός*, agilis ad subsiliendum; *πούς*, pes.
Vide genus Pezomachus.

PHYGADEUON

Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 635 n. 3.
φυγαδεύω, exulo.

Synon.: Plesiognathus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 183 n. 19.
πλησίος, propinquus; *γνᾶθος*, maxilla.
Scinacopus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 185 n. 44.
σκίναξ, *ακός*, agilis ad subsiliendum; *πούς*, pes.

Synon.: Zaphleges Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 184 n. 26.
ζα-, valde; φλέγεθω = φλέγω, uro.

Alomya Provancher.
Cryptus Gravenhorst & auct.
Hemiteles Bridgman & Fitch.
Ichneumon Fabricius & auct. ant.
Ischnus Provancher.
Leptobates Provancher.
Mesostenus Provancher.
Phaeogenes Provancher.
Platylabus Provancher.
Semiodes Harrington.
Spilocryptus Brischke.

abdominalis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon abdominalis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 280.
Phygadeuon abdominalis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 73 n. 19, ♀.
Phygadeuon abdominalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 319 n. 19, ♀.
aberrans Taschbg. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Phygadeuon abdominator var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 728 n. 202, ♀.
Phygadeuon aberrans Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 52 n. 86, ♀.
aciculatus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Phygadeuon aciculatus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 356 n. 36, ♂.
Phygadeuon aciculatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 778 n. 36, ♂.
acutipennis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon acutipennis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 954 n. 33, ♀ ♂.
afflictor Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Phygadeuon afflictor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 642 n. 147, ♀.
Phygadeuon afflictor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 38 n. 47, ♀.
Phygadeuon afflictor Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 223 n. 36, ♀.
Phygadeuon afflictor Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 942 n. 4, ♀ ♂.
alacris (Cress.) Prov. — ♀ — Am.: Canada, Delaware, Illinois.
Cryptus alacris Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 307 n. 24, ♀.
Phygadeuon tegularis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 282.
Phygadeuon alacris Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 69 n. 8, ♀.
Phygadeuon alacris Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 316 n. 8, ♀.
Cryptus mellipes Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 68 n. 37, ♀.
albiceps Htg.[1]) — Eur.: Germania.
Phygadeuon albiceps Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 264.
albicollis Cam. — ♀ — Am.: Panama.
Phygadeuon albicollis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 212 n. 2, ♀.
albicoxus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Mesostenus albicoxus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 266.
Phygadeuon albicoxus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 72 n. 17, ♂.
Phygadeuon albicoxus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 318 n. 17, ♂.
albirictus Cress. — ♂ — Am.: California.
Phygadeuon albirictus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 358, ♂.
albovinctus (Grav.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Italia.
Cryptus albovinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 591 n. 118, ♀.

---

1) *Lep.:* Geometra liturata (Hartig).

Cryptus albovinctus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 102 n. 89, ♀.
Phygadeuon ? albovinctus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
albulatorius (Grav.) Taschbg. — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus albulatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 508 n. 59, ♂.
Phygadeuon albulatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 33 n. 32, ♂.
Phygadeuon albulatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 341, ♂.
alpinus Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Phygadeuon alpinus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 213 n. 5, ♀.
ambiguus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Phygadeuon ambiguus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 703 n. 185, ♂.
Phygadeuon ambiguus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 34 n. 34, ♂.
Phygadeuon ambiguus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 342, ♀♂.
Phygadeuon ambiguus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 227 n. 23, ♂.
annulatus Cress. — ♀ — Am.: Canada, Delaware.
Phygadeuon annulatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 308 n. 2, ♀.
Phygadeuon annulatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 359.
annulicornis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon annulicornis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 947 n. 17, ♀.
Phygadeuon annulicornis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2387 n. 17, ♀ ♂.
anthracinus Kriechb. — ♀ — Eur.: Mallorca. [n. 15, ♀.
Phygadeuon anthracinus Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 244
anurus Thoms. — Eur.: Suecia.
Phygadeuon anurus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 946 n. 12.
apicalis (Grav.) Taschbg. — ♀ — Eur.
Cryptus apicalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 574 n. 106, ♀.
Phygadeuon apicalis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 26 n. 12, ♀.
armatulus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon armatulus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1240 n. 3, ♀.
assimilis Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Phygadeuon fumator var. 9 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 695, ♂.
Phygadeuon variabilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 705, ♀ [p. p.].
Phygadeuon assimilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 711 n. 191, ♂.
Phygadeuon assimilis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 301 n. 14, ♂.
Phygadeuon assimilis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 44 n. 66, ♂.
Phygadeuon assimilis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 228 n. 52, ♂.
ater Ashm. — ♀ — Am.: Colorado.
Phygadeuon ater Ashmead, Bull. Colorado Biol. Assoc. I. 1890 p. 20, ♀.
aterrimus (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Phaeogenes aterrimus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 330 n. 6, ♂.
Phaeogenes aterrimus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 769 n. 6, ♂.
Phaeogenes aterrimus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 41 n. 6, ♀.
Phygadeuon aterrimus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 186.
autumnalis Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Phygadeuon autumnalis Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 357 n. 39, ♀ ♂.
Phygadeuon autumnalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 779 n. 39, ♀♂.
balearicus Kriechb. — ♂ — Eur.: Mallorca.
Phygadeuon Balearicus Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXII. 1894 p. 245 n. 16, ♂.
bellator Fonsc. — ♀ — Eur.: Gallia.
Phygadeuon bellator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IX. 1851 p. 117 n. 17, ♀.
bidens Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon bidens Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 958 n. 44, ♀ ♂.

biguttatus (Grav.) Schmkn. — ♂ — Eur.
Cryptus biguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 478 n. 41, ♂.
Cryptus biguttatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 77 n. 25, ♂.
Phygadeuon ? biguttatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
bilineatus (Grav.) Schmkn. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Cryptus bilineatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 468 n. 33, ♂.
Cryptus bilineatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 75 n. 19, ♂.
Cryptus bilineatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 278 n. 16, ♂.
Phygadeuon ? bilineatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
bispinosus Rdw.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Phygadeuon bispinosus Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 6, ♀ ♂.
bitinctus (Gmel.) Taschbg. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 69 n. 331.
Ichneumon bitinctus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2719 n. 377.
Cryptus bitinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 576 n. 108, ♀.
Cryptus bitinctus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 290 n. 37, ♀.
Phygadeuon bitinctus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 32 n. 28, ♀.
Phygadeuon bitinctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 343, ♀.
Phygadeuon bitinctus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 225 n. 19, ♀.
Phygadeuon bitinctus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 942 n. 3, ♀ ♂.
blakei Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Colorado.
Ichneumon Blakei Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 139 n. 8, ♂.
Cryptus insignis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 178.
Cryptus Blakii Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 200.
Phygadeuon Blakei Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 67 n. 1, ♀ ♂.
Phygadeuon Blakei Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 313 n. 1, ♀ ♂.
brachyurus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon brachyurus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 955 n. 34, ♀ ♂.
brevis Ril. — Am.: Missouri.
Phygadeuon brevis Riley, 4th Ann. Rep. Insect. Missouri 1872 p. 28.
brevitarsis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon brevitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 959 n. 46, ♀.
brischkei Woldst. — ♂ — Eur.: Germania.
Phygadeuon Brischkii Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 397 n. 21, ♂.
brumatae Rdw.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Phygadeuon brumatae Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 11, ♀ ♂.
californicus Cress. — ♂ — Am.: California.
Phygadeuon Californicus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 358, ♂.
campoplegoides Ratzbg. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Phygadeuon campoplegoides Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 124 n. 3, ♀ ♂.
canaliculatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon canaliculatus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1406 n. 4, ♀ ♂.
caracacensis Marsh. — ♀ — Am.: Venezuela.
Phygadeuon Caracacensis Marshall, Ann. soc. entom. France LXI. 1892 p. 62 n. 51, ♀.
caudatulus D. T. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Phygadeuon caudatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 946 n. 14, ♀ [nec Provancher].
Phygadeuon caudatulus m.

---

1) *Hymen.:* Nematus spec. (Rudow).
2) *Lep.:* Cheimatobia brumata (Rudow).

caudatus Prov. — ♀ — Am.: Am.: Canada.
Cryptus caudatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 314.
Phygadeuon caudatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 73 n. 18, ♀.
Phygadeuon caudatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 319 n. 18, ♀.
cephalicus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Phygadeuon cephalicus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 354 n. 32, ♂.
Phygadeuon cephalicus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 777 n. 32, ♂.
cephalotes Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon transfuga Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 158 n. 29b.
Phygadeuon cephalotes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 644 n. 149, ♀ ♂.
Ichneumon transfuga Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 12 n. 20, ♀.
Ichneumon transfuga Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 139 n. 34, ♀.
Phygadeuon cephalotes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 55 n. 1, ♀ ♂.
Phygadeuon cephalotes Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 [Rem.] p. 17 n. 29b.
Phygadeuon cephalotes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 41 n. 54, ♀ ♂.
Phygadeuon transfuga Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 259 n. 29b, ♀ ♂.
Phygadeuon cephalotes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 340, ♂.
Phygadeuon cephalotes Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 223 n. 41, ♀ ♂.
Phygadeuon cephalotes Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 956 n. 37, ♀ ♂.
Plesignathus cephalotes Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 29.
cerinostomus Grav. — ♂ — Eur.
Phygadeuon cerinostomus Gravenhorst, Ichneum. Europ. 1829 p. 714 n. 195, ♂.
Phygadeuon cerinostomus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 53 n. 91, ♂.
Phygadeuon cerinostomus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1891 p. 69, ♂.
cinctellus Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Phygadeuon cinctellus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IX. 1851 p. 105 n. 4, ♂.
cincticornis Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Phygadeuon cincticornis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 309 n. 3, ♀.
cnemargus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Phygadeuon cnemargus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 734 n. 204, ♂.
Phygadeuon cnemargus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 303 n. 21, ♂.
Phygadeuon (Scinacopus) cnemargus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. [1891 p. 69, ♀ ♂.
commutatus Ratzbg.[1] — ♀ — Eur.: Germania.
Phygadeuon commutatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 125 n. 6, ♀.
Phygadeuon commutatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 141 n. 4.
constrictus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Phygadeuon constrictus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 357 n. 41, ♂.
Phygadeuon constrictus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 779 n. 41, ♂.
Phygadeuon constrictus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 53 n. 41, ♀.
crassicornis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Platylabus crassicornis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 37 n. 10, ♀.
Phygadeuon crassicornis Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 186.
crassipes Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon crassipes Provancher, Naturel. Canad. IX. 1877 p. 11.
Phygadeuon crassipes Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 358, ♀.
Phygadeuon crassipes Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 74 n. 22, ♀.
Phygadeuon crassipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 320 n. 22, ♀.
crotchii Cress. — ♀ — Am.: British Columbia.
Phygadeuon Crotchii Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 357, ♀.

---

1) *Lep.:* Trachea piniperda (Ratzeburg).

cubiceps Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon cubiceps Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 961 n. 53, ♀ ♂.
curviscapus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon curviscapus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1405 n. 2, ♀.
curvispina Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon curvispina Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 948 n. 18, ♀ ♂.
cylindraceus Ruthe — ♀ ♂ — Eur.: Islandia, Suecia.
Phygadeuon cylindraceus Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 367 n. 47, ♀.
Phygadeuon cylindraceus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 949 n. 22, ♀ ♂.
desertor Grav. — ♀ — Eur.
Phygadeuon desertor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 745 n. 213, ♀.
Phygadeuon desertor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 43 n. 60, ♀.
diaphanus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Phygadeuon diaphanus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 737 n. 206, ♂.
Phygadeuon diaphanus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 40 n. 53, ♀ ♂.
Phygadeuon diaphanus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 364, ♀ ♂.
dimidiatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon dimidiatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 963 n. 58, ♀ ♂.
dumetorum Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Phygadeuon dumetorum Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 669 n. 168, ♀ ♂.
Phygadeuon dumetorum Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 24 n. 6, ♀ ♂.
Phygadeuon dumetorum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 341, ♂.
Phygadeuon dumetorum Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 226 n. 5, ♀ ♂.
Phygadeuon dumetorum Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 957 n. 41, ♀ ♂.
electus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon electus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 51 n. 48, ♀.
ensator Fonsc. — ♀ — Eur.: Gallia.
Phygadeuon ensator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IX. 1851 p. 110 n. 7, ♀.
erraticus Holmgr. — ♀ ♂ — As.: Beeren, Island.
Phygadeuon erraticus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. VIII. P. 5. 1869 p. 19, ♀ ♂.
errator Marsh. — ♀ — Eur.: Britannia.
Phygadeuon errator Marshall, Entom. M. Magaz. V. 1868 p. 154, ♀.
Phygadeuon errator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 266 n. 46, ♀.
excavatus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon excavatus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 285.
excelsus Grav. — ♀ — Eur.
Phygadeuon excelsus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 742 n. 211, ♀.
Phygadeuon excelsus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 52 n. 87, ♀.
exiguus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Phygadeuon exiguus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 666 n. 165, ♀.
Phygadeuon exiguus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 298 n. 5, ♀.
Phygadeuon exiguus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 32 n. 29, ♀.
Phygadeuon exiguus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 225 n. 20, ♀.
Phygadeuon exiguus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 958 n. 43, ♀ ♂.
facialis Grav.![2]) — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Phygadeuon facialis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 656 n. 159, ♂.
Phygadeuon facialis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 31, ♂.

---

[1]) *Dipt.:* Stratiomyia Chamaeleon (Brischke).
[2]) = ? Phygadeuon cretatus var. (Taschenberg).

facialis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon facialis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 952 n. 28, ♀.
flavicans Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon flavicans Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 961 n. 52, ♀ ♂.
flavimanus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Phygadeuon flavimanus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 647 n. 152, ♂.
Phygadeuon flavimanus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 296 n. 1, ♂.
Phygadeuon flavimanus Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 58.
Phygadeuon flavimanus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 23 n. 4, ♂.
Phygadeuon flavimanus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 223 n. 4, ♀ ♂.
Phygadeuon flavimanus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 956 n. 38, ♀ ♂.
flavipes (Prov.) Davis — ♂ — Am.: Canada.
Mesostenus flavipes Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 363 n. 5, ♂.
Mesostenus flavipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 785 n. 5, ♂.
Phygadeuon flavipes Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 187.
flavitarsis D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon flavipes Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1238 n. 1, ♀ [non Provancher].
Phygadeuon flavitarsis m.
fulgens Taschbg. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Phygadeuon fulgens Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 36 n. 42, ♀.
Phygadeuon fulgens Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 226, ♀.
fulvescens Cress. — ♀ — Am.: California.
Phygadeuon fulvescens Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 359, ♀.
fumator Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Gallia.
Phygadeuon fumator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 707, ♂.
Phygadeuon fumator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 687 n. 179, ♀ ♂ [excl. var. 4, 5, 7 & 9].
Phygadeuon fumator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 300 n. 11, ♀ ♂.
Phygadeuon fumator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IX. 1851 p. 106 n. 6, ♀ ♂.
Phygadeuon fumator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 56 n. 5, ♀.
Phygadeuon fumator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 27 n. 14, ♀ ♂.
Phygadeuon fuscator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 341, ♀ ♂ [err. typ.].
Phygadeuon fumator Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 151; T. 8 F. 6-8.
Phygadeuon fumator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 225 n. 8, ♀ ♂.
Phygadeuon fumator Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 960 n. 49, ♀.
Phygadeuon fumator Brischke. Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1891 p. 69, ♂.
galactinus Grav. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Phygadeuon galactinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 682 n. 176, ♂.
Phygadeuon galactinus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 299 n. 9, ♂.
Phygadeuon galactinus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 54 n. 92, ♂.
Phygadeuon galactinus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 341, ♂.
Phygadeuon galactinus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 228 n. 68, ♂.
Phygadeuon galactinus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1891 p. 69, ♂.
geddessii Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon Geddessii Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 54 n. 55, ♀.
gracilis Jaenn. — ♀ — Eur.: Germania.
Phygadeuon gracile Jännicke, Berlin. entom. Zeitschr. XI. 1867 p. 155, ♀.
gracilipes (Grav.) Schmkn. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Cryptus gracilipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 547 n. 89, ♂.
Cryptus gracilipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 90 n. 58, ♂.
Phygadeuon ? gracilipes Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.

grandiceps Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon grandiceps Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 950 n. 24, ♀ ♂.
Phygadeuon grandiceps Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 111.
grandis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon grandis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 940 n. 1, ♀.
Phygadeuon grandis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2386 n. 1, ♂.
hastatus Taschbg. — ♀ — Eur.
Phygadeuon hastatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 45 n. 69, ♀.
heterogaster Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Phygadeuon heterogaster Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 n. 22 n. 6, ♀.
heteropus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon heteropus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2387 n. 7b, ♀ ♂.
hopei Desv. — ♀ — Eur.: Britannia.
Cryptus flagitator var. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 705.
Phygadeuon Hopei Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 58.
Phygadeuon Hopei Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 228 n. 31, ♀.
hortulanus (Grav.) Taschbg. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus hortulanus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 575 n. 107, ♀.
Cryptus hortulanus Ratzeburg, Ichneum. Forstinsect. II. 1848 p. 123 n. 14.
Phygadeuon hortulanus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 26 n. 13, ♀.
Phygadeuon hortulanus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 344, ♂.
impressus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Ischnus impressus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 112.
Cryptus brevicornis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 176.
Phygadeuon impressus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 79 n. 14, ♂.
Phygadeuon impressus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 317 n. 14, ♂.
incertus Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Phygadeuon incertus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IX. 1851 p. 112 n. 9, ♂.
infelix D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon inflatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 959 n. 48, ♀ ♂ [nec Prov.].
Phygadeuon infelix m.
infernalis Ruthe — ♀ — Eur.: Islandia.
Phygadeuon infernalis Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 366 n. 46, ♀.
inflatus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon inflatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 83.
Phygadeuon inflatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 75 n. 24, ♀ ♂.
Phygadeuon inflatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 321 n. 24, ♀ ♂.
inhabilis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon inhabilis Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 11.
Phygadeuon inhabilis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 69 n. 6, ♀.
Phygadeuon inhabilis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 315 n. 6, ♀.
insidiator (Grav.) Schmkn. — ♂ — Eur.: Italia.
Cryptus insidiator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 450 n. 20, ♂.
Cryptus insidiator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 76 n. 22, ♂.
Phygadeuon ? insidiator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
intermedius Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Phygadeuon intermedius Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1874 p. 160, ♀.
labralis Grav. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Phygadeuon labralis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 710 n. 190, ♂.
Phygadeuon jejunator var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 715, ♂.

Phygadeuon labralis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 46 n. 72, ♂.
Phygadeuon labralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 342, ♂.
Phygadeuon labralis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 228 n. 55, ♂.

lapponicus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Phygadeuon Lapponicus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 953 n. 29, ♀ ♂.

larvatus Grav. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Phygadeuon larvatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 662 n. 163, ♂.
Phygadeuon larvatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 297 n. 4, ♂.
Phygadeuon larvatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 33 n. 30, ♂.
Phygadeuon larvatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 224 n. 21, ♂.

laticinctus Ashm. — ♀ — Am.: Colorado.
Phygadeuon laticinctus Ashmead, Bull. Colorado Biol. Assoc. I. 1890 p. 21, ♀.

laticollis Holmgr. — ♂ — As.: Waigiou.
Phygadeuon laticollis Holmgren, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 149 n. 20, ♂.

latus (Prov.) D. T. — ♀ — Am.: Canada, Delaware, Texas.
Cryptus incertus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 306 n. 23, ♀ [nec
Cryptus incertus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 158, ♀. [Fonsc.].
Cryptus latus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 204, ♀.
Cryptus incertus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 205.
Cryptus occidentalis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 314.
Cryptus latus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 361, ♀.
Phygadeuon occidentalis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 70 n. 9, ♀.
Phygadeuon occidentalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 316 n. 9, ♀
Phygadeuon longicornis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 52 n. 50, ♀.
Phygadeuon latus m.

lechevallieri Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon Lechevallieri Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 356 n. 37, ♀.
Phygadeuon Lechevallieri Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 778 n. 37, ♀.

leucocephalus Tosqu. — ♀ — Afr.: Guinea.
Phygadeuon leucocephalus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 121, ♀.

leucostictus Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Phygadeuon leucostictus Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 7, ♀ ♂.

leucostigma Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Phygadeuon leucostigmus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 667 n. 166, ♀.
Phygadeuon leucostigma Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 24 n. 5, ♀.
Phygadeuon leucostigmus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 953 n. 30, ♀ ♂.
Phygadeuon leucostigmus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 351, ♀.
Zaphleges leucostigmus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 30.

levigator Grav. — ♂ — Eur.
Phygadeuon laevigator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 650 n. 154, ♂.
Phygadeuon laevigator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 54 n. 94, ♂.

leviventris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon laeviventris Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 955 n. 36, ♀ ♂.

limatus Cress. — ♀ — Am.: California.
Phygadeuon limatus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 358, ♀.

liogaster Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon liogaster Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 949 n. 21, ♀.
Phygadeuon liogaster Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 111.

liosternus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon liosternus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1040 n. 3, ♀ ♂.

lituratae Htg.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Phygadeuon lituratae Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 264, ♀ ♂.
Phygadeuon liturariae Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 146.
longiceps Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon longiceps Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 946 n. 13, ♀ ♂.
longigena Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon longigena Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 947 n. 16, ♀ ♂.
lucens Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon lucens Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 281.
Phygadeuon lucens Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 72 n. 15, ♀.
Phygadeuon lucens Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 318 n. 15.
luteicornis (Grav.) Wesm. — ♀ — Eur.
Ichneumon luteicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 623 n. 268, ♀.
Phygadeuon luteicornis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 [Rem.] p. 78 n. 268.
lycaenae Rdw.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Phygadeuon Lycaenae Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 11, ♀ ♂.
macilentus (Grav.) Schmkn. — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus macilentus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 584 n. 111, ♂.
Cryptus macilentus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 90 n. 59, ♂.
Phygadeuon ? macilentus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
maculatus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Phygadeuon maculatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 178, ♀.
Phygadeuon maculatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 67 n. 2, ♀.
Phygadeuon maculatus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 353 n. 8, ♂.
Phygadeuon maculatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 314 n. 2, ♀ & p. 775 [n. 8, ♂.
major Cress. — ♀ — Am.: Canada, Illinois.
Phygadeuon major Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 308 n. 1, ♀.
Phygadeuon major Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 74 n. 21, ♀.
Phygadeuon major Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 320 n. 21, ♀.
mandibularis Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Phygadeuon mandibularis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 311 n. 7, ♀.
marshallii Bridgm. — ♂ — Eur.: Britannia.
Phygadeuon procerus var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 724, ♂.
Phygadeuon Marshalli Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 228, ♂.
Phygadeuon Marshalli Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 141.
maturus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon maturus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 68 n. 4, ♀.
Phygadeuon maturus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 314 n. 4, ♀.
melanopoda Cam. — ♀ — Am.: Mexico. [T. 10 F. 22.
Phygadeuon melanopoda Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 214 n. 6, ♀;
mesozonius Grav. — ♂ — Eur.
Phygadeuon mesozonius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 700 n. 182, ♂.
micromelas Kriechb. — ♂ — Eur.: Mallorca.
Phygadeuon micromelas Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 245 n. 17, ♂.
mignaultii Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon Mignaulti Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 355 n. 35, ♀.
Phygadeuon Mignaulti Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 777 n. 35, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Geometra liturata (Hartig).
[2]) *Lep.:* Lycaena spec. (Rudow).

minor Fonsc. — ♀ — Eur.: Gallia.
Phygadeuon minor Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IX. 1851 p. 111 n. 8, ♀.
minutus Fonsc. — ♀ — Eur.: Gallia.
Phygadeuon minutus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IX. 1851 p. 113 n. 10, ♀.
mitralis (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Platylabus mitralis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 37 n. 9, ♀.
Phygadeuon mitralis Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 185.
mixtus Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Hemiteles mixtus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 148, ♀.
Hemiteles mixtus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 102, ♀.
Phygadeuon mixtus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 339, ♀.
Phygadeuon mixtus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 119 & 123.
monodon Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon monodon Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 950 n. 23, ♀ ♂.
montanus (Grav.) Schmkn. — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus montanus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 616 n. 129, ♀.
Cryptus montanus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 104 n. 96, ♀.
Spilocryptus montanus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 335, ♀.
Phygadeuon montanus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
monticola D. T. — ♀ — Am.: Colorado.
Phygadeuon montanus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 309 n. 4, ♀.
Phygadeuon monticola m.
mucronatus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Phygadeuon mucronatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 73 n. 20, ♀.
Phygadeuon mucronatus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 353 n. 20, ♂.
Phygadeuon mucronatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 319 n. 20, ♀ & [p. 775 n. 20, ♂.
mutabilis (Grav.) Wesm. — ♂ — Eur.: Britannia.
Ichneumon mutabilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 599 n. 255, ♂.
Ichneumon mutabilis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 203 n. 212.
Phygadeuon mutabilis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 [Rem.] p. 74 n. 255.
nanus (Grav.) Taschbg. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Cryptus nanus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 585 n. 113, ♀.
Phygadeuon nanus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 25 n. 9, ♀.
Phygadeuon nanus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 343, ♀.
Phygadeuon nanus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 225, ♀.
Phygadeuon nanus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 954 n. 32, ♀ ♂.
nematorum Rdw.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Phygadeuon nematorum Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 11, ♀ ♂.
niger Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon niger Provancher, Natural. Canad. VIII. 1876 p. 317, ♀.
nigrescens Fonsc. — Eur.: Gallia.
Phygadeuon nigrescens Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IX. 1851 p. 103 n. 2.
nigriceps Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon nigriceps Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 52 n. 51, ♀.
nitidulus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Vancouvers Island.
Mesostenus nitidus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 301, ♂ [non Gravenhorst].
Cryptus ruficornis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 176, ♂.
Mesostenus ruficornis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 226, ♂.
Phygadeuon nitidulus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 70 n. 11, ♂.

---

1) *Hymen.:* Nematus spec. (Rudow).

Phygadeuon nitidulus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 317 n. 11, ♂.
Phygadeuon nitidulus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 58, ♀.

nivalis Holmgr. — ♀ ♂ — As.: Waigatsch.
Phygadeuon nivalis Holmgren, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 149 n. 19, ♀ ♂.

nycthemerus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Phygadeuon nycthemerus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 647 n. 151, ♂.
Phygadeuon nycthemerus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 49 n. 80, ♂.
Phygadeuon nycthemerus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 224 n. 62, ♂.
Phygadeuon nycthemerus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 943 n. 7, ♀ ♂.
Phygadeuon nycthemerus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2386 n. 7.

obscuratus Fonsc. — ♀ — Eur.: Gallia.
Phygadeuon obscuratus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IX. 1851 p. 104 n. 3, ♀.

ochrogaster Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon ochrogaster Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1241 n. 4, ♀.

ocularis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon ocularis Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1405 n. 3, ♀ ♂.

opacus (Taschbg.) Schmkn. — ♂ — Eur.
Cryptus opacus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 88 n. 53, ♂.
Phygadeuon ? opacus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.

oppositus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon oppositus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 960 n. 51, ♀.

orbitalis Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Phygadeuon orbitalis Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 354 n. 31, ♂.
Phygadeuon orbitalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 776 n. 31, ♂.

ovaliformis D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon ovalis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 963 n. 60, ♀.
Phygadeuon ovaliformis m.

ovalis Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Phygadeuon vulgaris Cresson, Natural. Canad. VI. 1874 p. 281, ♂ [non 1864].
Phygadeuon ovalis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 180, ♀ ♂.
Phygadeuon ovalis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 71 n. 12, ♀ ♂.
Phygadeuon ovalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 317 n. 12, ♀ ♂.

ovatus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Phygadeuon ovatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 668 n. 167, ♀.
Phygadeuon ovatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 298 n. 6, ♀.
Phygadeuon ovatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 32 n. 27, ♀.
Phygadeuon ovatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 341, ♀.
Phygadeuon ovatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 225 n. 18, ♀.
Phygadeuon ovatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 959 n. 47, ♀ ♂.

pachycephalus Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Phygadeuon pachycephalus Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 6, ♀ ♂.

pallidicarpus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon pallicarpus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 947 n. 15, ♀ ♂.

pallidicoxus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Phygadeuon pallicoxus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 75 n. 26, ♂.
Phygadeuon pallicoxus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 321 n. 26, ♂.

parallelus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Phygadeuon parallelus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 355 n. 33, ♂.
Phygadeuon parallelus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 777 n. 33, ♂.

parvicauda Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Phygadeuon parvicauda Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 20 n. 4, ♀.

parvipennis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon parvipennis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 944 n. 9, ♀ ♂.
pelinocheirus (Grav.) Schmkn. — ♂ — Eur.
Cryptus pelinocheirus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 527 n. 74, ♂.
Cryptus pelinocheirus Taschenberg, Zeitschr f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 87 n. 51, ♂.
Phygadeuon pelinocheirus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
perfusor (Grav.) Taschbg. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cryptus perfusor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 586 n. 114, ♀.
Phygadeuon perfusor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 26 n. 10, ♀.
Phygadeuon perfusor Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 944 n. 8, ♀ ♂.
phryganidiae Ashm.[1]) — ♀ — Am.: California.
Phygadeuon Phryganidiae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 207, ♀.
pictipes Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Phygadeuon pictipes Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 6, ♀ ♂.
placidus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Ischnus placidus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 110, ♂.
Phygadeuon rectus var. placidus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 69, ♂.
Phygadeuon rectus var. placidus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 315, ♂.
plagiator Grav. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania, Italia.
Phygadeuon plagiator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 739 n. 208.
Phygadeuon plagiator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 34 n. 35, ♀.
Phygadeuon plagiator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 225 n. 24, ♀.
planosae Fitch[2]) — Am. bor.
Phygadeuon Planosae A. Fitch, Trans. New York State Agric. Soc. XV. 1855 p. ?
Phygadeuon Planosae A. Fitch, 1st & 2d Rep. Insects New York 1859 p. 269.
planus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon planus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 283.
Phygadeuon planus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 76 n. 28, ♀.
Phygadeuon planus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 322 n. 28, ♀.
praelatus Hal. — ♂ — Am.
Phygadeuon praelatus Haliday, Trans. Linn. Soc. London XVII. P. 3. 1836 p. 317 n. 4, ♂.
profligator (Fabr.) Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 341 n. 46.
Ichneumon profligator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 334 n. 39.
Ichneumon profligator Fabricius, Reise nach Norwegen 1779 p. 302.
Ichneumon profligator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 427 n. 44.
Ichneumon abdominalis Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 409 n. 47.
Ichneumon profligator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 264 n. 52.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 69 n. 152 & 335.
Ichneumon profligator Razoumowski, Hist. nat. Jorat. I. 1789 p. 215 n. 250.
Ichneumon profligator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2686 n. 118.
Ichneumon nigricornis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2719 n. 381.
Ichneumon profligator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 41 n. 756.
Ichneumon profligator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 353.
Ichneumon profligator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 178 n. 72.
Ichneumon profligator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 153 n. 85.
Ichneumon profligator Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 297 n. 2118, ♀ ♂.
Ichneumon profligator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 57 n. 40.

---

1) *Lep.:* Phryganidia californica (Ashmead).
2) *Lep.:* Planosa laricis (Fitch).

Cryptus profligator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 83 n. 52.
Cryptus profligator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 265 n. 3775.
Ichneumon profligator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 63 n. 756.
Ichneumon profligator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 112, ♀.
Ichneumon (Cryptus) profligator Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 7.
Cryptus profligator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 288.
Ichneumon profligator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
Ichneumon profligator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 296.
Phygadeuon profligator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 729 n. 203, ♀ [excl. varr. & ♂].
Ichneumon profligator Trentepol, Isis 1829 p. 944 n. 58, ♀.
Phygadeuon profligator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IX. 1851 p. 118 n. 18, ♀.
Phygadeuon profligator Curtis, Farm Insects 1860 p. 414.
Phygadeuon profligator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 37 n. 45, ♀.
Phygadeuon profligator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 343, ♀ ♂.
Phygadeuon profligator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 226 n. 32, ♀.

proximator Costa — ♂ — Eur.: Sardinia.
Phygadeuon proximator A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli XXIV. 1885 p. 323.
Phygadeuon proximator A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 1. 1886 p. 15, ♂.
Phygadeuon proximator A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 113, ♂.

pubescens Prov.[1] — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Cryptus pumilus Cresson, Natural. Canad. VI. 1874 p. 203, ♂ [non 1864].
Phygadeuon pubescens Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 282.
Phygadeuon dubius Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 283.
Alomyia pulchra Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 120.
Phygadeuon pubescens Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 72 n. 16, ♀.
Phygadeuon pubescens Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 318 n. 16, ♀.

pugnator Fonsc. — ♀ — Eur.: Gallia.
Phygadeuon pugnator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IX. 1851 p. 115 n. 14, ♀.

pugnax Htg.[2] — Eur.: Germania.
Phygadeuon pugnax Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. 2. 1838 p. 273 n. 20.
Phygadeuon pugnax Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 145 n. 2.
Phygadeuon pugnax Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 124 n. 2.

punctigena Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon punctigena Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 953 n. 31, ♀.

punctiger Taschbg. — ♂ — Eur.
Phygadeuon punctiger Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 33 n. 33, ♂.

punctipleuris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon punctipleuris Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 962 n. 55, ♀ ♂.

punctiventris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon punctiventris Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 955 n. 35, ♀ ♂.

recurvus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon recurvus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 943 n. 5, ♀.

reinhardii Jaenn. — ♂ — Eur.: Germania.
Phygadeuon Reinhardii Jaennicke, Berlin. entom. Zeitschr. XI. 1867 p. 154, ♂.

ripicola Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon ripicola Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 19 n. 3, ♀ ♂.
Phygadeuon ripicola Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1242 n. 5, ♀ ♂.

---

1) *Hymen.:* Nematus similaris (Norton).
2) *Hymen.:* Lophyrus pini (Hartig).

robustus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon robustus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 75 n. 27, ♀.
Phygadeuon robustus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 322 n. 27, ♀.
rotundiceps Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon rotundiceps Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 12, ♀.
Phygadeuon rotundiceps Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 74 n. 23, ♀.
Phygadeuon rotundiceps Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 320 n. 23, ♀.
rotundipennis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon rotundipennis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 963 n. 59, ♀ ♂.
rubrocinctus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon rubrocinctus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 280.
Phygadeuon rubrocinctus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 69 n. 7, ♀.
Phygadeuon rubrocinctus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 315 n. 7, ♀.
ruficornis Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Ischnus ruficornis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 110.
Phygadeuon ruficornis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 179, ♂.
Phygadeuon ruficornis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 75 n. 25, ♂.
Phygadeuon ruficornis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 321 n. 25, ♂.
rufulus (Gmel.) Taschbg. — ♀ — Eur.: Britannia.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 68 n. 311-316 & 366.
Ichneumon rufulus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2717 n. 362, ♀.
Cryptus rufulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 622 n. 134, ♀.
Ichneumon rufulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1086 n. 328.
Phygadeuon rufulus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 25 n. 8, ♀.
Phygadeuon rufulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 344, ♀.
Phygadeuon rufulus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 225 n. 7, ♀.
Cryptus rufulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 68, ♀.
rugipectus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon rugipectus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1040 n. 2, ♀ ♂.
rugulosus Grav. — ♂ — Eur.: Britannia.
Phygadeuon rugulosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 686 n. 178, ♂.
Phygadeuon rugulosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 22 n. 2, ♂.
Phygadeuon rugulosus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 227 n. 2, ♂.
rusticellae Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Phygadeuon rusticellae Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 337, ♀ ♂.
sanguinator (Rossi) Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Italia.
Ichneumon sanguinator Rossi, Mant. Insect. 1792 II. App. p. ? n. 85.
Ichneumon sanguinator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 918 n. 63, ♀.
Ichneumon ruficollis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 206 n. 222, ♀.
Cryptus sanguinator Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 58 n. 56, ♀.
Ichneumon erythraeus Billups, Entomologist XV. 1882 p. 92-93.
Ichneumon sanguinator Bridgman, Entomologist XV. 1882 p. 139-140.
Phygadeuon sanguinator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 228 n. 30, ♀.
Ichneumon sanguinator Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1882 p. 142.
satageus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Phygadeuon satageus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 140 n. 1, ♀.
scaposus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon scaposus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 961 n. 54, ♀ ♂.
scoticus Marsh. — ♀ — Eur.: Britannia.
Phygadeuon Scoticus Marshall, Entom. M. Magaz. V. 1868 p. 154, ♀.
Phygadeuon Scoticus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 225 n. 48, ♀.

sectator Grav. — ♀ — Eur.
Phygadeuon sectator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 725 n. 201, ♀.
Phygadeuon sectator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 46 n. 71, ♀.
segnis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon segnis Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 11, ♀.
Phygadeuon segnis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 71 n. 13, ♀.
Phygadeuon segnis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 317 n. 13, ♀.
semifumatus Cam. — ♂ — Am.: Mexico.
Phygadeuon semifumatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 212 n. 1, ♂.
seminiger Harrgt. — ♂ — Am.: Vancouver Island.
Semiodes seminiger Harrington, Canad. Entomol. 1894 p. 247, ♂.
Phygadeuon seminiger Harrington, Canad. Entomol. XXIX. 1897 p. 43.
semiorbitalis Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Phygadeuon semiorbitalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 682 n. 175, ♂.
Phygadeuon semiorbitalis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 53 n. 90, ♂.
Phygadeuon semiorbitalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 341, ♂.
semipolitus Taschbg. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Phygadeuon semipolitus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 28 n. 18, ♀.
Phygadeuon semipolitus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 225 n. 33, ♀.
Phygadeuon semipolitus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 951 n. 26, ♀ ♂.
signatus Prov. — ♀ — Am.: Am.: Canada.
Cryptus signatus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 179, ♀.
Leptobates Canadensis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 145.
Phygadeuon signatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 67 n. 3, ♀.
Phygadeuon signatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 314 n. 3, ♀.
sodalis Taschbg.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Phygadeuon sodalis Taschenberg Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 29 n. 20, ♀.
Phygadeuon sodalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 344, ♀♂.
Phygadeuon sodalis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 945 n. 11, ♀ ♂.
solidus Lundb. — Am.: Groenlandia.
Phygadeuon solidus Lundbeck, Vidensk. Meddel. 1896 p. 227.
speculator Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Phygadeuon speculator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 704 n. 186, ♀.
Phygadeuon speculator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 26 n. 11, ♀.
Phygadeuon speculator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 342, ♀.
Phygadeuon speculator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 225, ♀.
Phygadeuon speculator Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 945 n. 10, ♀ ♂.
spinolae Grav. — ♀ — Eur.: Britannia.
Phygadeuon Spinolae Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 708.
Phygadeuon Spinolae Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 712 n. 192, ♀.
Phygadeuon Spinolae Stephens, Illustr. Brit. Entom Mandib. VII. 1835 p. 301 n. 15.
Phygadeuon Spinolae Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 45 n. 68, ♀.
Phygadeuon Spinolae Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 342, ♀.
Phygadeuon Spinolae Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 226 n. 54, ♀.
spinosus Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Phygadeuon spinosus Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 61, ♀ ♂.
spissicornis (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada. [n. 57, ♀.
Cryptus spissicornis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 68 n. 36, ♀ ♂ & p. 361
Phygadeuon spissicornis Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 187.

[1] *Dipt.:* Syrphus spec. (Brischke).

stilpninus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon stilpninus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1239 n. 2, ♀.
Phygadeuon stilpninus Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 118.
subfuscus Cress. — ♀ — Am.: Canada, Illinois.
Phygadeuon subfuscus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 311 n. 6, ♀.
Phygadeuon subfuscus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 70 n. 10, ♀.
Phygadeuon subfuscus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 316 n. 10, ♀.
subspinosus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Phygadeuon subspinosus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 357 n. 40, ♂.
Phygadeuon subspinosus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 779 n. 40, ♂.
subtilicornis (Grav.) Wesm. — Eur.: Britannia.
Ichneumon subtilicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 592 n. 251, ♂ [excl. ♀].
Phygadeuon subtilicornis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 [Rem.] p. 72 [n. 251, ♂.
Phygadeuon subtilicornis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 227 n. 34, ♂.
subtilis Grav. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Phygadeuon subtilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 701 n. 183, ♂.
Phygadeuon subtilis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 55 n. 95, ♂.
Phygadeuon subtilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 342, ♂.
Phygadeuon subtilis Bridgman & Fitch, Entomologist, XV. 1882 p. 228 n. 70, ♂.
tarsatus Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Phygadeuon tarsatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 150, ♀ ♂; T. 8 F. 9.
Phygadeuon tarsatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 223, ♀ ♂.
teneriventris Grav. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Phygadeuon teneriventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 707.
Phygadeuon teneriventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 698 n. 181, ♂.
Phygadeuon teneriventris Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 300 n. 12.
Phygadeuon teneriventris Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 55 n. 96, ♂.
Phygadeuon teneriventris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 342, ♂.
Phygadeuon teneriventris Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 228 n. 71, ♂.
tenuicosta Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon tenuicosta Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 957 n. 42, ♀.
Phygadeuon tenuicosta Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2387, ♀ ♂.
tenuipes Grav. — ♂ — Eur.: Britannia.
Phygadeuon tenuipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 720 n. 198, ♂.
Phygadeuon tenuipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 27 n. 15, ♂.
Phygadeuon tenuipes Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 227 n. 9, ♂.
tenuis (Grav.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus tenuis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 544 n. 87, ♂.
Cryptus tenuis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 89 n. 56, ♀ ♂.
Cryptus (Chaeretymma?) tenuis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 [p. 327, ♀.
Phygadeuon ? tenuis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
tenuiscapus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon tenuiscapus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 960 n. 50, ♀.
testaceus Taschbg. — ♀ — Eur.: Germania.
Phygadeuon testaceus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 35 n. 37, ♀.
Phygadeuon (Colocnema?) testaceus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. [1881 p. 344, ♀ ♂.
texanus Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Phygadeuon Texanus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 160, ♂.
timidus Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Phygadeuon timidus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 161, ♂.

trichops Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon trichops Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 962 n. 57, ♀ ♂.
troglodytes Grav. — ♂ — Eur.: Britannia.
Phygadeuon troglodytes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 713 n. 193, ♂.
Phygadeuon troglodytes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 27 n. 16, ♂.
Phygadeuon troglodytes Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 227 n. 10, ♂.
truncatus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon truncatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 53 n. 52, ♀.
tuberculifer (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Phaeogenes tuberculifer Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 331 n. 9, ♀.
Phaeogenes tuberculifer Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 770 n. 9, ♀.
Phygadeuon tuberculifer Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 186.
tyrannus (Dalm.) Taschbg. — ♀ — Eur.: Britannia, Suecia.
Cryptus tyrannus Dalman, Anal. entom. 1823 p. 97 n. 11, ♀.
Cryptus tyrannus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 630 n. 140, ♀.
Cryptus tyrannus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 295 n. 49, ♀.
Phygadeuon tyrannus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 48 n. 75, ♀.
Phygadeuon tyrannus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 228 n. 58, ♀.
ungularis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon ungularis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 951 n. 27, ♀ ♂.
unicinctus (Grav.) Schmkn. — ♂ — Eur.: Italia.
Cryptus unicinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 470 n. 35, ♂.
Cryptus unicinctus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 78 n. 28, ♂.
Phygadeuon ? unicinctus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
vagans Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Phygadeuon vagans Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 738 n. 207, ♀ ♂.
Phygadeuon vagans Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 31 n. 25, ♀ ♂.
Phygadeuon vagans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 343, ♀.
Phygadeuon vagans Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 225 n. 17, ♀ ♂.
Phygadeuon vagans Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 953 n. 25, ♀ ♂.
variabilis Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Gallia.
Phygadeuon variabilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 707.
Phygadeuon variabilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 705 n. 187, ♀ ♂.
Phygadeuon variabilis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 304 n. 22, ♀ ♂.
Phygadeuon variabilis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IX. 1851 p. 114 n. 12, ♀ ♂.
Phygadeuon variabilis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 24 n. 7, ♀ ♂.
Phygadeuon variabilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 342, ♀.
Phygadeuon variabilis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 225 n. 6, ♀ ♂.
Phygadeuon variabilis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 956 n. 40, ♀ ♂.
varians (Taschbg.) Schmkn. — ♂ — Eur.
Cryptus varians Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 76 n. 20, ♂.
Phygadeuon ? varians Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
variegator Er. — ♀ — Austr.: Tasmania.
Cryptus (Phygadeuon) variegator Erichson, Arch. f. Naturg. VIII. P. 1. 1841 p. 257 n. 224, ♀.
variicornis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Phygadeuon varicornis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 21 n. 5, ♀ ♂.
Phygadeuon varicornis Schmiedeknecht, Termész. Füzet. XX. 1897 p. 121 & 126.
variipes Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Phygadeuon varipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 747 n. 215, ♀.
Phygadeuon varipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 35 n. 39, ♀.
Phygadeuon varipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 343, ♀.

volucellae Boie[1]) — ♀ — Eur.: Germania.
Phygadeuon Volucellae Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 102 n. 37, ♀.
vulgaris Cress. — ♀ — Am.: Canada, Pennsylvania, Delaware, Illinois.
Phygadeuon vulgaris Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 310 n. 5, ♀.
Phygadeuon vulgaris Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 354 n. 30, ♀.
Phygadeuon vulgaris Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 776 n. 30, ♀.
vulnerator Grav. — ♀ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Phygadeuon vulnerator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 640 n. 145, ♀.
Cryptus (Phygadeuon) vulnerator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 313 n. 9.
Phygadeuon vulnerator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 23, ♀.
Phygadeuon vulnerator Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 943 n. 6, ♀.
waigatschensis Holmgr. — ♂ — As.: Waigatsch.
Phygadeuon Waigatschensis Holmgren, Entom. Tidskr. IV. 1883 p. 148 n. 18, ♂.
zapotecus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Phygadeuon Zapotecus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 140 n. 2, ♂.
zonatus Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Phygadeuon zonatus Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 12, ♀ ♂.

PAMMACHUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 185 n. 41.
πάμμαχος, omni pugnae genere certans.

Synon.: Cubocephalus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 121 n. 26.
κύβος, cubus; κεφαλή, caput.
Ecporthetor Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 184 n. 33.
Etymol. obscura.
Stenocryptus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 520.
στενός, angustus; Cryptus, nom. propr. Hymen.
Cryptus Gravenhorst.
Phygadeuon Gravenhorst, Taschenberg, Bridgman & Fitch.

fortipes (Grav.) D. T.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Cryptus fortipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 473 n. 39, ♀.
Cubocephalus fortipes Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 122, ♀ ♂.
Phygadeuon fortipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 52 n. 88, ♀.
Stenocryptus fortipes Thomson, Opusc. entom. P. 6. 1874 p. 605 n. 2, ♀ ♂.
Stenocryptus fortipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N.F. V. P.1./2. 1881 p. 340, ♀.
Phygadeuon fortipes Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 223 n. 67, ♀.
Pammachus fortipes m.
nigriventris (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
? Phygadeuon oviventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 648, ♀ [excl. ♂].
Phygadeuon caliginosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 22 n. 1, ♀ ♂ [nec Gravenhorst].
? Phygadeuon brevicornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 48 n. 77, ♀.
Stenocryptus nigriventris Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 521.
Stenocryptus nigriventris Thomson, Opusc. entom. P. 6. 1874 p. 604 n. 1, ♀ ♂.
? Phygadeuon brevicornis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 223 n. 59, ♀
Pammachus nigriventris m.

---

1) *Dipt.:* Volucella spec. (Brischke).
2) *Hymen.:* Allanthus cingulum (Ratzeburg).

oviventris (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Phygadeuon oviventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 648 n. 153, ♂ [excl. ♀].
Phygadeuon oviventris Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 49 n. 79, ♀♂.
Stenocryptus oviventris Thomson, Opusc. entom. P. 6. 1874 p. 606 n. 3, ♀ ♂.
Phygadeuon oviventris Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 223 n. 61, ♀ ♂.
Pammachus oviventris m.

HOMOTHERUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 185 n. 40.
ὅμοιος, par; *θηρίον*, bestis.
Species exstat.

OPIDNUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 185 n. 39.
ὀπιδνός, extimescendus.
Species exstat.

ULOTHYMUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 185 n. 38.
οὐλοθῦμος, exitialis animi.
Species exstat.

ODONTONEURA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 185 n. 37.
ὀδοῦς, dens; *νεῦρα*, nervus.
Species exstat.

ECPAGLUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 185 n. 36.
ἔκπαγλος, stupendus.
Vide genus Microcryptus.

EPIPHOBUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 185 n. 35.
ἐπίφοβος, perterritus.
Species exstat.

NELEOPHRON

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 184 n. 34.
νηλεής, immisericors; *φρονέω*, intelligo.
Species exstat.

ECPORTHETOR

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 184 n. 33.
Etymol. obscura.
Vide genus Pammachus.

COLOCNEMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 184 n. 32.
κόλον, truncatus; νῆμα, filum.
Species exstat.

RHEMBOBIUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 184 n. 31.
ῥέμβη, vagatio; βιόω, vivo.

Synon.: Acanthocryptus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 520.
ἄκανθα, aculeus; Cryptus, nom. propr. Hymen.
Cryptus Panzer, Gravenhorst & auct.
Ichneumon Rossi, Panzer.
Phygadeuon Gravenhorst & auct.

flagitator (Rossi) D. T.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon flagitator Rossi, Mant. Insect. II. 1794 p. ? n. 83.
Ichneumon exhortator Panzer, Faun. Insect. German. VIII. 1805 P. 94 T. 13 [non Fabr.].
Cryptus exhortator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 71.
Cryptus flagitator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 705 [excl. var.].
Cryptus flagitator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 627 n. 137, ♀ [excl. var.].
Phygadeuon pumilio Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 653 n. 156, ♂.
Cryptus flagitator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 294 n. 48, ♀.
Phygadeuon pumilio Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 296 n. 2.
Cryptus flagitator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1850 p. 389 n. 40, ♀.
Cryptus flagitator Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 93 n. 24, ♀ ♂.
Phygadeuon pumilio Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 33 n. 31, ♀.
Phygadeuon flagitator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 36 n. 44, ♀.
Phygadeuon pumilio Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 340, ♂.
Phygadeuon flagitator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 344, ♀.
Phygadeuon pumilio Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 224 n. 22, ♂.
Phygadeuon flagitator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 228 n. 29, ♀.
Acanthocryptus flagitator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 867 n. 1, ♀ ♂.
Phygadeuon flagitator A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p. 15.
Rhembobius flagitator m.

nigriceps (Thoms.) D. T. — ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Phygadeuon quadrispinus var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 674 n. 172, ♂.
Acanthocryptus nigriceps Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 868 p. 4, ♂.
Rhembobius nigriceps m.

nigricollis (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Acanthocryptus nigricollis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 868 n. 2, ♀.
Rhembobius nigricollis m.

nigritus (Grav.) D. T.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Phygadeuon nigrita Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 641 n. 164, ♀ ♂.
Phygadeuon nigrita Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 23, ♀ ♂.
Phygadeuon nigrita Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 223 n. 3, ♀ ♂.
Acanthocryptus nigrita Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 869 n. 5, ♀ ♂.
Rhembobius nigritus m.

---

1) *Lep.:* Depressaria heracleana (Boie).
2) *Dipt.:* Eristalis floreus (Bridgman).

quadrispinus (Grav.) Ashm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Gallia.
Phygadeuon quadrispinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 706. [1 & 2].
Phygadeuon quadrispinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 674 n. 172, ♀ ♂ [excl. var.
Phygadeuon quadrispinus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 298 n. 7, ♀ ♂.
Phygadeuon quadrispinus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IX. 1851 p. 106 n. 5, ♂.
Phygadeuon quadrispinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 55 n. 2, ♀ ♂.
Phygadeuon quadrispinus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 39 n. 50, ♀ ♂.
Acanthocryptus quadrispinus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1877 p. 521.
Phygadeuon quadrispinus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 226 n. 39, ♀ ♂.
Acanthocryptus quadrispinosus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 868 n. 3, ♀ ♂.
Rhembobius quadrispinosus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 30.

COELOCRYPTUS

Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 519.
κοῖλος, cavus; Cryptus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Phygadeuon Gravenhorst & auct.

erythrostictus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Phygadeuon erythrostictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 709, ♂.
Phygadeuon rufinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 681 n. 174, ♀.
Phygadeuon erythrostictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 714 n. 194, ♂.
Phygadeuon erythrostictus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 301 n. 16, ♂.
Phygadeuon rufinus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 41 n. 55, ♀.
Phygadeuon erythrostictus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 44 n. 64, ♀.
Coelocryptus rufinus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 521.
Coelocryptus rufinus Thomson, Opusc. entom. P. 6. 1874 p. 597 n. 1, ♂.
Phygadeuon rufinus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 225 n. 42, ♀.
Phygadeuon erythrostictus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 228 n. 50, ♂.

SCHENKIA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 184 n. 30.
C. A. Schenck, nom. propr.
Vide genus Microcryptus.

GIRAUDIA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 184 n. 29.
Dr. J. Giraud, nom. propr.

Synon.: Calocryptus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 519.
καλός, pulcher; Cryptus, nom. propr. Hymen.
Cryptus Gravenhorst, Holmgren.
Phygadeuon Taschenberg, Bridgman & Fitch.

congruens (Grav.) Ashm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Cryptus congruens Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 533 n. 80, ♀ ♂.
Cryptus congruens Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 51 n. 5, ♂.
Phygadeuon congruens Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 41 n. 57, ♀ ♂.
Calocryptus congruens Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 521.
Calocryptus congruens Thomson, Opusc. entom. P. 6. 1874 p. 595 n. 1, ♀ ♂.
Calocryptus congruens Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 339, ♀.
Phygadeuon congruens Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 224 n. 44, ♀ ♂.
Phygadeuon (Calocryptus) congruens Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1.
Giraudia congruens Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 30. [1892 p. 48, ♂.

BARYNTICA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 184 n. 28.
βαρυντικός, gravans.
Species exstat.

ENDASYS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 184 n. 27.
ἐν-, in; δασύς, densus.
Species exstat.

ZAPHLEGES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 184 n. 26.
ζα-, valde; φλεγέθω, uro.
Vide genus Phygadeuon.

TRICHOLINUM

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 183 n. 25.
θρίξ, τριχός, capillus; λίνον, linum.
Species exstat.

DIROPHANES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 183 n. 24.
δειράς, collum; φαίνω, monstro.
Species exstat.

HEDYLUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 183 n. 23.
ἡδύλος = ἡδύς, suavis.
Species exstat.

TRICHOCRYPTUS

Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 520.
θρίξ, pilus; Cryptus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Dapanus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 183 n. 22.
δάπανος, sumptuosus.
Sobas Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 187 n. 7 [nec Pasc. 1863].
σόβησις, expulsio.
Cryptus Fabricius & auct.
Ichneumon Fabricius & auct.
Phygadeuon Taschenberg, Bridgman & Fitch.

aquaticus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Trichocryptus aquaticus Thomson, Opusc. entom. P. 6. 1874 p. 611 n. 2, ♀ ♂.
cinctorius (Fabr.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 346 n. 56.
Ichneumon cinctorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 332 n. 31 [non Stephens].

Ichneumon cinctorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 425 n. 33.
Ichneumon scirpi Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 413 n. 57.
Ichneumon cinctorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 263 n. 41.
Ichneumon cinctorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 151 n. 49.
Ichneumon scirpi Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 155 n. 60.
Ichneumon cinctorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2683 n. 105.
Ichneumon cinctorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 341.
Ichneumon cinctorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 176 n. 59.
Ichneumon cinctorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 149 n. 66.
Ichneumon cinctorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 55 n. 33.
Cryptus cinctorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 78 n. 33.
Ichneumon cinctorius Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 182 n. 14.
Ichneumon cinctorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♀.
Ichneumon cinctorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284.
Ichneumon cinctorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Ichneumon cinctorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 355.
Cryptus parvulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 459 n. 26, ♂ [excl. ♀].
Cryptus cinctorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 480 n. 43, ♀.
Ichneumon cinctorius Trentepol, Isis 1829 p. 930 n. 46, ♀.
Cryptus parvulus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 279 n. 6, ♂ [excl. ♀].
Cryptus cinctorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 281 n. 12, ♀.
Cryptus parvulus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 368 n. 6, ♂ [excl. ♀].
Cryptus cinctorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 312 n. 4.
Phygadeuon cinctorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 38 n. 48, ♀♂.
Cryptus parvulus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 74 n. 15, ♂ [excl. ♀].
Trichocryptus cinctorius Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 521.
Trichocryptus cinctorius Thomson, Opusc. entom. P. 6. 1874 p. 610 n. 1, ♀ ♂. [♀♂.
Trichocryptus cinctorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 340,
Phygadeuon cinctorius Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 224 n. 37, ♀ ♂.
Sobas cinctorius Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 113.

HETEROTYPUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 183 n. 21.
ἑτερός, alter; τύπος, forma.
Species exstat.

MICROMONODON

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 183 n. 20.
μικρός, parvus; μόνος, unus; ὀδοῦς, dens.

Synon.: Hemicryptus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 152.
ἥμι, semi; Cryptus, nom. propr. Hymen.

tener (Kriechb.) D. T. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Hemicryptus tener Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 152, ♀.
Micromonodon tener m.

PLESIGNATHUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 183.
πλησίος, propinquus; γνάθος maxilla.
Vide genus Phygadeuon.

ERNOCTONA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 183 n. 18.
ἔρνος, germen; *κτείνω*, interficio.

Species exstat.

POLYTRIBAX

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 183 n. 17.
πολύς, multum; *τριβάς*, femina fricatrix.

Species exstat.

HOMELYS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 182 n. 16.
ὅμηλυς, comes viae.

Species exstat.

ISELIX

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 182 n. 15.
ἴσος, par; *ἕλιξ*, tortuosum.

Synon.: Ischnocryptus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 351.
ἰσχνός, gracilis; Cryptus, nom. propr. Hymen.
Phygadeuon Gravenhorst & auct.

atropos (Kriechb.) D. T. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Phygadeuon (Ischnocryptus) Atropos Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 346, ♀.
Iselix Atropos m.

clotho (Kriechb.) D. T. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Phygadeuon (Ischnocryptus) Clotho Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 344, ♀.
Iselix Clotho m.

forticornis (Kriechb.) D. T. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Phygadeuon (Ischnocryptus) forticornis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 344, ♀.
Iselix forticornis m.

geniculatus (Kriechb.) D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Phygadeuon (Ischnocryptus) geniculatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 343, ♀.
Iselix geniculatus m.

hercynicus (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Phygadeuon Hercynicus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 709 n. 189, ♀.
Phygadeuon Hercynicus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 29 n. 21, ♀.
Phygadeuon Hercynicus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 342, ♀.
Phygadeuon Hercynicus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 958 n. 45, ♀ ♂.
Phygadeuon (Ischnocryptus) Hercynicus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 341.
Iselix Hercynicus m.

lachesis (Kriechb.) D. T. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Phygadeuon (Ischnocryptus) Lachesis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 345, ♀.
Iselix Lachesis m.

nitidus (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Phygadeuon nitidus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 708.
Phygadeuon nitidus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 708 n. 188, ♀.
Phygadeuon nitidus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 300 n. 13.

Phygadeuon nitidus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 30 n. 22, ♀.
Phygadeuon nitidus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 224 n. 14, ♀ ♂.
Phygadeuon nitidus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1404 n. 1, ♀ ♂.
Phygadeuon (Ischnocryptus) nitidus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 341.
Iselix nitidus m.

MICROCRYPTUS

Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 520.
μικρός, parvus; Cryptus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Ecpaglus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 185 n. 36.
ἔκπαγλος, stupendus.
Schenckia Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 184 n. 30
C. A. Schenck, nom. propr. [[Schenkia].

Aptesis Förster.
Cryptus Gravenhorst & auct.
Ichneumon O. F. Müller, Gravenhorst.
Pezomachus Gravenhorst.
Phygadeuon Gravenhorst & auct.

abdominator (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon jejunator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. system. 1807 p. 259 n. 3745-46.
? Cryptus jejunator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 288.
? Phygadeuon abdominator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 709 [excl. var. & ♂].
? Phygadeuon jejunator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 715 n. 196, ♂ [excl. var. 1 & 2].
Phygadeuon abdominator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 726 n. 202, ♀ [excl. ♂ [& var.].
Phygadeuon profligator var. 4 & 5 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 732 n. 203, ♂.
Phygadeuon quadrispinus var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 676, ♂.
Phygadeuon vagabundus var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 736, ♂.
Phygadeuon abdominator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 302 n. 19, ♀ [excl. ♂].
? Phygadeuon jejunator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IX. 1851 p. 115 n. 13, ♂.
Phygadeuon abdominator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IX. 1851 p. 117 n. 16, ♀.
Phygadeuon abdominator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 56 n. 3, ♀ ♂.
? Phygadeuon jejunator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 28 n. 17, ♂.
Phygadeuon abdominator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 43 n. 61, ♀ ♂.
? Phygadeuon jejunator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 342, ♀.
Phygadeuon abdominator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 342, ♂.
Phygadeuon abdominator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 226 n. 47, ♀ ♂.
? Phygadeuon jejunator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 227 n. 11, ♂.
Microcryptus abdominator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 855 n. 11, ♀ ♂.
? Phygadeuon jejunator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 48, ♂.
Microcryptus abdominator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 123, ♂.

acuminatus Kriechb. — ♀ — Eur.: Belgia.
Microcryptus acuminatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 296 n. 12, ♀.

alpinus Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Microcryptus alpinus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1894 p. 145, ♀.

alutaceus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Microcryptus alutaceus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 863 n. 30, ♀.

amoenus Kriechb. — ♂ — Eur.: Germania.
Microcryptus amoenus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 362, ♂.

aries Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Microcryptus aries Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 851 n. 3, ♀ ♂.
arridens (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Phygadeuon arridens Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 654 n. 157, ♂.
Phygadeuon improbus var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 670 n. 169, ♂.
Phygadeuon probus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 42 n. 59, ♀.
Phygadeuon arridens Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges Naturw. XXV. 1865 p. 45 n. 67, ♂.
Phygadeuon arridens Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F.V. P. 1./2. 1881 p. 340, ♂.
Phygadeuon probus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 151.
Phygadeuon arridens Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 224 n. 53, ♂.
Phygadeuon probus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 226, ♀.
Microcryptus arridens Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 859 n. 19, ♀ ♂.
basizonus (Grav.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.
Cryptus varicolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 603 n. 121, ♂.
Phygadeuon abdominator var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 727, ♂.
Phygadeuon basizonus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 748 n. 216, ♀.
Phygadeuon pteronorum Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. 2. 1838 p. 273 n. 19, ♀ ♂.
Ichneumon (Phygadeuon) pteronorum Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 28.
Phygadeuon pteronorum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 145 n. 4, ♀ ♂.
Phygadeuon pteronorum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 125 n. 5, ♀ ♂.
Phygadeuon pteronorum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsdct. III. 1852 p. 141 n. 3.
Phygadeuon pteronorum Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 46 n. 73, ♀ ♂.
Phygadeuon pteronorum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 343, ♀ ♂.
Phygadeuon basizonus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 224 n. 56, ♀ ♂.
Microcryptus basizonus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 863 n. 29, ♀ ♂.
Phygadeuon pteronorum Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 69, ♀ ♂.
bifrons (Gmel.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 69 n. 323.
Ichneumon bifrons Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2718 n. 369.
Phygadeuon bifrons Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 698 n. 180, ♂.
Phygadeuon gravipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 740 n. 209, ♀.
Phygadeuon gravipes Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 304 n. 24.
Phygadeuon bifrons Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 56 n. 6, ♂.
Phygadeuon bifrons Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 30 n. 23, ♂.
Phygadeuon gravipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 35 n. 40, ♀.
Phygadeuon bifrons Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 341, ♂.
Phygadeuon gravipes Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 226 n. 27, ♀.
Phygadeuon bifrons Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 227 n. 15, ♂.
Microcryptus gravipes Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 866 n. 36, ♀ ♂.
borealis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Microcryptus borealis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 862 n. 27, ♀ ♂.
brachypterus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon abbreviator Panzer, Faun. Insect. German. VI. 1799 P. 71 T. 17, ♀ [nec Fabr.].
Cryptus abbreviator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 70.
Ichneumon brachypterus Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 29 n. 4, ♀.
Pezomachus brachypterus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 715, ♀.
Phygadeuon jejunator var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 717 n. 196, ♂.
Pezomachus brachypterus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 876 n. 290, ♀.
Cryptus (Pezomachus) brachypterus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 371 n. 16, ♀.

[1]) *Hymen.:* Lophyrus pini, L. frutetorum, L. rufus (Ratzeburg), L. similis (Brischke).

Aptesis brachyptera Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 91 n. 9, ♀.
Microcryptus brachypterus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 864 n. 33, ♀ ♂.
Aptesis brachyptera Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 157 n. 4, ♀.

brevicornis (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Cryptus brevicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 511 n. 61, ♂.
Cryptus humilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 604 n. 122, ♂.
Phygadeuon peregrinator var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 606 n. 123, ♀.
Phygadeuon graminicola Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 673 n. 170, ♀.
Cryptus brevicornis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 283 n. 20, ♂.
Phygadeuon graminicola Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 41 n. 56, ♀.
Phygadeuon graminicola Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 341, ♀.
Phygadeuon graminicola Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 226 n. 43, ♀.
Microcryptus graminicola Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 852 n. 4, ♀ ♂.
Cryptus brevicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 47, ♂.
Schenkia graminicola Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 30.
Ecpaglus brevicornis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 30.

contrarius Kriechb. — ♀ — Eur.: Tyrolis.
Microcryptus contrarius Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 147, ♀.

crassicornis Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Microcryptus crassicornis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 163 n. 1, ♀ ♂.

cretatus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Phygadeuon cretatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 652 n. 155, ♂.
Phygadeuon jejunator var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 717 n. 196, ♂.
Cryptus (Phygadeuon) cretatus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 313 n. 10.
Phygadeuon cretatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 30 n. 24, ♂.
Phygadeuon cretatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 224 n. 16, ♂.
? Microcryptus cretatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 856 n. 14, ♂.
? Microcryptus cretatus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1532 n. 1, ♀.
Phygadeuon (Microcryptus) cretatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 363, ♂.

cruentus Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Microcryptus cruentus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 167 n. 4, ♂.

curtulus Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Microcryptus curtulus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 171 n. 3, ♂.

var. **polystictus** Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Microcryptus curtulus var. polysticta Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 171, ♂.

distans Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Ölandia.
Microcryptus distans Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 864 n. 32, ♀ ♂.

effeminatus (Grav) Thoms. — ♂ — Eur.: Germania.
Cryptus effeminatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 532 n. 79, ♂.
Cryptus effeminatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 87 n. 50, ♂.
Microcryptus effeminatus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.

erythrinus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Gallia.
Cryptus lacteator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 618 n. 131, ♀.
Cryptus erythrinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 621 n. 133, ♀.
Cryptus erythrinus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 294 n. 46, ♀.
Cryptus lacteator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 386 n. 36, ♀ ♂.
Phygadeuon lacteator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 50 n. 81, ♀ ♂.
Phygadeuon erythrinus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 52 n. 85, ♀.
Microcryptus erythrinus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 521.
Phygadeuon lacteator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 341, ♂.
Phygadeuon lacteator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 226 n. 63, ♂.

Phygadeuon erythrinus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 227 n. 66, ♀.
Microcryptus erythrinus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 860 n. 22, ♀ ♂.
Microcryptus lacteator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 861 n. 23, ♀.
Cryptus erythrinus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 105 n. 16, ♀.

femoralis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Microcryptus femoralis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 853 n. 6, ♀ ♂.

flavopunctatus (Bridgm.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania, Austria, Italia, Corfu.
Phygadeuon flavopunctatus Briegman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 414.
Microcryptus clavatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 57, ♂.
Microcryptus armatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 123, ♀.
Microcryptus flavopunctatus m.

genalis Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria, Littorale.
Microcryptus genalis Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1895 p. 38, ♂.

gracilicornis Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Microcryptus gracilicornis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 166 n. 3, ♀.
Microcryptus gracilicornis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 124, ♂.

gravenhorstii Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Microcryptus Gravenhorsti Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 854 n. 8, ♀ ♂.

halensis (Taschbg.) Thoms. — ♀ — Eur.: Germania.
Phygadeuon Halensis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 45 n. 70, ♀.
Microcryptus Halensis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 866 n. 37.

jemülleri Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Microcryptus Jemülleri Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 59, ♀ ♂.

improbus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Phygadeuon improbus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 670 n. 169, ♀♂ [excl. var. 2].
Phygadeuon improbus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 36 n. 41, ♀♂.
Phygadeuon improbus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 341, ♂.
Phygadeuon improbus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 226 n. 28, ♀ ♂.
Microcryptus improbus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 851 n. 1, ♀ ♂.
Phygadeuon improbus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VI. P. 4. 1887 p. 87, ♂.

lapponicus Thoms. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Microcryptus Lapponicus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 862 n. 26, ♀.

leucopygus Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Microcryptus leucopygus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 169 n. 1, ♂.

leucostictus (Grav.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Gallia.
Cryptus leucostictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 538 n. 83, ♂.
Cryptus leucostictus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 286 n. 26.
Cryptus leucostictus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 373 n. 18, ♂.
Cryptus leucostictus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 89 n. 55, ♂.
Cryptus leucostictus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 280 n. 34, ♂.
Microcryptus leucostictus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 856 n. 13, ♀ ♂.
Microcryptus leucostictus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.

longicauda Thoms. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Microcryptus longicauda Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 862 n. 25, ♀.

micropterus (Grav.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ichneumon micropterus Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 26 n. 2, ♀.
Pezomachus micropterus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 879 n. 292, ♀.
Pezomachus jejunator var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 717 n. 196, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Vanessa urticae (Giraud).
[2]) *Hymen.:* Formica rufa (Bridgman & Fitch).

Aptesis microptera Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 89 n. 7, ♀.
Aptesis microptera Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 368 n. 48.
Microcryptus micropterus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 865 n. 34, ♀ ♂.
Aptesis microptera Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 157 n. 3, ♀.

nigricornis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Microcryptus nigricornis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 860 n. 21, ♀.

nigritulus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Microcryptus nigritulus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 23 n. 8, ♀ ♂.

oppositus Kriechb. — ♂ — Eur.: Mallorca.
Microcryptus contrarius Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 244 n. 14, [♂ [non 1893].
Microcryptus oppositus Kriechbaumer i. l.

orbitalis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon abdominator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 26 n. 202, ♂ [excl. ♀].
Microcryptus orbitalis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 856 n. 12, ♀ ♂.

ornaticeps Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Microcryptus ornaticeps Thomson, Ann. soc. entom. France (6) V. 1885 p. 23 n. 7, ♀.

pectoralis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Microcryptus pectoralis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1237 n. 1, ♀ ♂.

perversus Kriechb. — ♂ — Eur.: Italia.
Microcryptus perversus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 126, ♂.

planus Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Microcryptus planus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 151, ♀.

poecilops Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Microcryptus poecilops Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 169 n. 2, ♂.

puncticollis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
? Phygadeuon improbus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 670 n. 169, ♂ [excl. ♀].
Microcryptus puncticollis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 866 n. 35, ♀ ♂.

punctifer Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Microcryptus punctifer Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 860 n. 20, ♀ ♂.

punctulatus Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Microcryptus punctulatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 165 n. 2, ♀.

rhombifer Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Microcryptus rhombifer Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIV. 1893 p. 148, ♀.

rubricollis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Microcryptus rubricollis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 853 n. 5, ♀.

rufoniger Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Phygadeuon (Microcryptus) rufoniger Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 415, ♀.

senex Kriechb. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Microcryptus senex Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 56, ♂.

seniculus Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Microcryptus seniculus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 56, ♂.

septentrionalis Thoms. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Microcryptus septentrionalis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 863 n. 28, ♀.

sericans (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Gallia.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 64 n. 249.
Ichneumon pictus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2702 n. 305.
Phygadeuon sericans Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 702 n. 184, ♂.
Phygadeuon sericans Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IX. 1851 p. 113 n. 11, ♂.
Phygadeuon sericans Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 47 n. 74, ♂.
Phygadeuon sericans Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 228 n. 57, ♂.
Microcryptus sericans Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 864 n. 31, ♀ ♂.

sperator (Müll.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ichneumon sperator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 157 n. 1829.
Ichneumon sperator Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 293 n. 2108.
Phygadeuon sperator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 683 n. 177, ♂.
Phygadeuon sperator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 299 n. 10.
Phygadeuon sperator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 50 n. 82, ♀ ♂.
Phygadeuon sperator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 341, ♂.
Phygadeuon sperator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 227 n. 64, ♂.
Microcryptus sperator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 861 n. 24, ♂.

subguttatus (Grav.) D. T.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Cryptus subguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 610 n. 124, ♂.
Cryptus contractus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 617 n. 130, ♀.
Cryptus subguttatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 292 n. 42.
Phygadeuon subguttatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 54 n. 93, ♂.
Cryptus contractus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 104 n. 95, ♀.
Phygadeuon subguttatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 344, ♀ ♂.
Phygadeuon subguttatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 228 n. 69, ♂.
Microcryptus contractus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 867 n. 38, ♀ ♂.
Microcryptus contractus Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.
Microcryptus subguttatus m.

terminatus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Phygadeuon terminatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 663.
Phygadeuon gilvipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 661 n. 162, ♂.
Phygadeuon ceilonotus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 36 n. 43, ♀.
Phygadeuon gilvipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 40 n. 51, ♂.
Phygadeuon ceilonotus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 344, ♀ ♂.
Microcryptus terminatus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 857 n. 15, ♀ ♂.
Phygadeuon terminatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 105 [n. 17, ♀.

tricolor Kriechb. — ♀ — Eur.: Mallorca.
Microcryptus tricolor Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 243 n. 13, ♀.

zonatus Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Microcryptus zonatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 126, ♂.

PLECTOCRYPTUS

Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 519.
πλεκτός, plexus; Cryptus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Cryptus Gravenhorst, Fonscolombe, Taschenberg, Bridgman & Fitch.
Ichneumon Gmelin.
Microcryptus Thomson.
Phygadeuon Gravenhorst, Fonscolombe, Taschenberg, Capron.

arrogans (Grav.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur. tota.
Cryptus arrogans Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 494 n. 49, ♂.
Phygadeuon abdominator var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 726, ♀.
Cryptus arrogans Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VIII. 1835 p. 281 n. 13, ♂.
Cryptus arrogans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 51 n. 6, ♂.
Cryptus arrogans Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 86 n. 49, ♂.
Plectocryptus arrogans Thomson, Opusc. entom. P. 6. 1874 p. 601 n. 3, ♂.

---

[1] *Hymen.:* Lophyrus pini, L. similis (Brischke).
[2] *Lep.:* Panolis piniperda (Brischke).

Plectocryptus arrogans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 339, ♀ ♂.
Cryptus arrogans Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 280 n. 32, ♂.
Microcryptus arrogans Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 855 n. 10, ♀ ♂.
Plectocryptus arrogans Schmiedekhecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.

digitatus (Gmel.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 60 n. 188.
Ichneumon digitatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2688 n. 258.
Cryptus bivinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 465 n. 30, ♂.
Phygadeuon digitatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 642 n. 148, ♀.
Cryptus bivinctus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 381 n. 29, ♂.
Phygadeuon digitatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IX. 1851 p. 103 n. 1, ♀.
Phygadeuon digitatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 48 n. 76, ♀.
Cryptus bivinctus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 78 n. 26, ♂.
Plectocryptus digitatus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 521.
Plectocryptus digitatus Thomson, Opusc. entom. P. 6. 1874 p. 602 n. 4, ♀ ♂.
Phygadeuon digitatus Capron, Entomologist XII. 1879 p. 14, ♀.
Plectocryptus digitatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 340, ♂.
Cryptus digitatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 277 n. 19, ♀ ♂.
Plectocryptus digitatus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2382 n. 1, ♀ ♂.

pectoralis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Plectocryptus pectoralis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2383 n. 3, ♀ ♂.

perspicillator (Grav.) Thoms.¹) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon perspicillator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 261 n. 3754.
Cryptus perspicillator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 287.
Cryptus perspicillator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 503 n. 55, ♂.
Cryptus abdominator var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 726, ♀.
Cryptus perspicillator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 283 n. 19.
Cryptus perspicillator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 369 n. 12, ♂.
Cryptus perspicillator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 52 n. 7, ♂.
Phygadeuon obscuripes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 43 n. 62, ♀ ♂.
Cryptus perspicillator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 82 n. 40, ♂.
Plectocryptus perspicillator Thomson, Opusc. entom. P. 6. 1874 p. 601 n. 2, ♂.
Phygadeuon obscuripes Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 226 n. 49, ♀ ♂.
Microcryptus perspicillator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 854 n. 9, ♀ ♂.
Plectocryptus perspicillator Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 150.

scansor Thom. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Cryptus grisescens Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 464 n. 29, ♂ [p. p.].
Plectocryptus scansor Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1532 n. 1, ♀.
Plectocryptus scansor Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2118 n. 1, ♂.
Plectocryptus scansor Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2382 n. 2, ♀ ♂.

BATHYMETIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 182 n. 14.
βαθύς, altus; μῆτις, nequis.

Synon.: Phygadeuon Brischke.

cylindricus Brischke — ♀ — Eur.: Germania. [1891 p. 70, ♀.
Phygadeuon (Bathymetis) cylindricus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4.

mandibularis Brischke — ♀ — Eur.: Germania. [1891 p. 70, ♀.
Phygadeuon (Bathymetis) mandibularis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4.

¹) *Lep.:* Chariptera viridana (Mocsáry).

STYLOCRYPTUS

Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 520.
στύλος, stylus; Cryptus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Hemiteles Bridgman.
Ichneumon Gmelin.
Phygadeuon Gravenhorst & auct.

analis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Stylocryptus analis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 871 n. 6, ♀ ♂.
bispinus Thoms. — ♂ — Eur.: Suecia.
Stylocryptus bispinus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2385 n. 9, ♂.
brevis (Grav.) Thoms.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Phygadeuon brevis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 743 n. 212, ♀.
Phygadeuon brevis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 145 n. 5, ♀.
Phygadeuon brevis Taschenberg, Zeitschr. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 35 n. 38, ♀.
Stylocryptus brevis Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 521.
Phygadeuon brevis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 343, ♀ ♂.
Phygadeuon brevis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 226 n. 26, ♀.
Stylocryptus brevis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 870 n. 4, ♀ ♂.
erythrogaster (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Phygadeuon erythrogaster Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 711.
Phygadeuon erythrogaster Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 741 n. 210, ♀.
Phygadeuon erythrogaster Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 305 n. 26.
Phygadeuon erythrogaster Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 34 n. 36, ♀.
Phygadeuon erythrogaster Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 225 n. 25, ♀.
Stylocryptus erythrogaster Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 872 n. 7, ♀ ♂.
eurycerus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Stylocryptus eurycerus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1895 p. 2386 n. 10, ♀.
minutulus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Turcia.
Stylocryptus minutulus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 872 n. 8, ♀ ♂.
parviventris (Grav.) Thoms.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Phygadeuon parviventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 746 n. 214, ♀ ♂.
Phygadeuon parviventris Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 305 n. 27.
Phygadeuon parviventris Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 39 n. 49, ♀ ♂.
Phygadeuon parviventris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 343, ♀ ♂.
Phygadeuon parviventris Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 226 n. 38, ♀ ♂.
Stylocryptus parviventris Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 870 n. 3, ♀ ♂,
ruficaudatus Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Hemiteles ruficaudatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 149, ♀.
Stylocryptus ruficaudatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 339.
senilis (Gmel.) Thoms. — ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 65 n. 266.
Ichneumon senilis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2704 n. 321.
Phygadeuon senilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 718 u. 197, ♂.
Phygadeuon senilis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 302 n. 17.
Phygadeuon senilis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 40 n. 52, ♂.
Phygadeuon senilis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 228 n. 40, ♂.
Stylocryptus senilis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 871 n. 5, ♂.

---

1) *Lep.:* Carpocapsa pomonana (Ratzeburg).
2) *Hymen.:* Lophyrus pini (Brischke).

GLYPHICNEMIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 181 n. 6.
γλυφίς, crena sagittae; κνημίς, tibiale.

Synon.: Gnathocryptus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 520.
γνᾶθος, maxilla; Cryptus, nom. propr. Hymen.
Phygadeuon Gravenhorst.
Stylocryptus Thomson.

clypealis (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Stylocryptus (Gnathocryptus) clypealis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 870 n. 2, ♀♂.
Glyphicnemis clypealis m.

vagabundus (Grav.) Ashm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Phygadeuon quadrispinus var. 1 & 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 676, ♂.
Phygadeuon profligator var. 1 & 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 731, ♂.
Phygadeuon vagabundus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 735 n. 205, ♀ [excl. ♂ & var. 1, ♂].
Phygadeuon vagabundus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 304 n. 23, ♀ [excl. ♂].
Phygadeuon vagabundus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IX. 1851 p. 119 n. 19, ♀♂.
Phygadeuon vagabundus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 56 n. 4, ♀ [excl. ♂].
Phygadeuon vagabundus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 37 n. 46, ♀♂.
Gnathocryptus vagabundus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1877 p. 521.
Phygadeuon vagabundus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 225 n. 35, ♀ ♂.
Stylocryptus (Gnathocryptus) vagabundus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 869 n. 1, ♀♂.
Phygadeuon vagabundus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1891 p. 69, ♀.
Glyphicnemis vagabundus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 28.

var. **podagricus** (Grav.) D. T. — ♀ — Eur.: Britannia.
Phygadeuon podagricus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 710 n. 209b, ♀.
Phygadeuon podagricus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 305 n. 25.
Phygadeuon vagabundus var. podagricus Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 34 n. 35.
Glyphicnemis vagabundus var. podagricus m.

STIBOSCOPUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 182 n. 13.
στίβος, via trita; σκοπός, speculator.

grenadensis Ashm. — ♂ — Am.: Grenada.
Stiboscopus Grenadensis Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 268 n. 172, ♂.

thoracicus Ashm. — ♀ ♂ — Am.: Grenada.
Stiboscopus thoracicus Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 267 n. 171, ♀ ♂.

ACRORRHICNUS

Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinset. III. 1852 p. 92 n. 10 [Acoricnus].
ἄκρον, metathorax; ῥικνός, rugosus.

Vide genus Osprynchotus.

ISOTIMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 182 n. 12.
ἰσότιμος, in honoribus gerendis ceteris par.

Species exstat.

OXYTAENIA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 182 n. 11.
ὀξύς, acer; ταινία, fascia.
Species exstat.

LEPTODEMAS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 182 n. 10.
λεπτός, tenuis; δέμας, corpus.
Species exstat.

LOCHETICA

(Förster) Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 340.
λόχευμα, partu editum.

Synon.: Phygadeuon Thomson.

pimplarius (Thoms.) Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phygadeuon pimplarius Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 941 n. 2, ♀ ♂.
Lochetica pimplarius Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 340.

PANARGYROPS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 182 n. 9.
πᾶς, omne; ἀργυρός, argenteus; ὄψ, visus.

Synon.: Leptocryptus Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 521.
λεπτός, tenuis; Cryptus, nom. propr. Hymen.
Chaeretymma Brischke.
Cryptus Taschenberg.
Hemiteles Bridgman.
Nematopodius Bridgman & Fitch.
Phygadeuon Taschenberg.

aereus (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Cryptus aereus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 578 n. 109, ♀ ♂.
Cryptus aereus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 290 n. 38, ♀ ♂.
Phygadeuon aereus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 28 n. 19, ♀ ♂.
Cryptus (Chaeretymma) aereus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 [p. 338, ♀ ♂.
Phygadeuon aereus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 225 n. 12, ♀ ♂.
Leptocryptus aereus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 965 n. 4, ♀.
Panargyrops aereus m.

albomarginatus (Kriechb.) D. T. — ♀ — Eur : Germania.
Leptocryptus albomarginatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 371, ♀.
Panargyrops albomarginatus m.

bellulus (Kriechb.) D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Leptocryptus bellulus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 372, ♀.
Panargyrops bellulus m.

brevis (Thoms.) D. T.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Leptocryptus brevis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 965 n. 5, ♀ ♂.
Panargyrops brevis m.

---

[1]) *Hymen.:* Microgaster conglomeratus (Thomson).

claviger (Taschbg.) Schmkn.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Cryptus claviger Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 76 n. 21, ♂.
Leptocryptus claviger Thomson, Opusc. entom. P. 5. 1873 p. 521. [p. 338, ♀ ♂.
Cryptus (Chaeretymma) ater Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881
Nematopodius ater Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 38, ♀ ♂.
Leptocryptus claviger Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 964 n. 1, ♀ ♂.
Panargyrops claviger Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 435.
Panargyrops claviger Schmiedeknecht, Entom. Nachr. XVI. 1889 p. 150.

clavipes (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Leptocryptus clavipes Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1243 n. 1, ♀.
Leptocryptus clavipes Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2388 n. 8b, ♂.
Panargyrops clavipes m.

collaris (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Leptocryptus collaris Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2388 n. 6b, ♀.
Panargyrops collaris m.

geniculosus (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Leptocryptus geniculosus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 966 n. 7, ♀.
Panargyrops geniculosus m.

heteropus (Thoms.) Schmkn. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Leptocryptus heteropus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1040 n. 1, ♀ ♂.
Panargyrops heteropus Schmiedeknecht, Zool. Jahrb. III. 1888 p. 435.

lamina (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Leptocryptus lamina Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 965 n. 3, ♀ ♂.
Panargyrops lamina m.

pellucidator (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Cryptus pellucidator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 581 n. 110, ♀.
Cryptus pellucidator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 291 n. 39.
Cryptus (Chaeretymma) pellucidator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. [1881 p. 338, ♂.
Leptocryptus pellucidator Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 965 n. 6, ♀.
Leptocryptus pellucidator Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2388 n. 6, ♂.
Panargyrops pellucidator m.

rubens (Kriechb.) D. T. — ♀ — Eur.: Germania.
Leptocryptus rubens Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 373, ♀.
Panargyrops rubens m.

ruficaudatus (Bridgm.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Hemiteles ruficaudatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 149.
Hemiteles ruficaudatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 102, ♀.
Leptocryptus ruficaudatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 966 n. 9, ♀ ♂.
Leptocryptus ruficaudatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 415, ♀ ♂.
Panargyrops ruficaudatus m.

rugulosus (Thoms.) D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Leptocryptus rugulosus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 966 n. 8, ♀.
Panargyrops rugulosus m.

strigosus (Thoms.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Leptocryptus strigosus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 964 n. 2, ♀ ♂.
Panargyrops strigosus m.

---

[1]) *Hymen.:* Emphytus cinctus (Brischke).

APSILOPS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 182 n. 8.
ἀ-ψιλός, nudus; ὄψ, oculus.

Synon.: Cryptus Ashmead.
Diaglypta Ashmead.

hirtifrons Ashm.[1] — ♀ ♂ — Am.: Texas, Columbia, Oregon, Illinois.
Cryptus hirtifrons Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 411, ♂.
Apsilops hirtifrons Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 207, ♀.
radiata Ashm. — ♀ — Am.: Grenada.
Diaglypta radiata Ashmead, Proc. Zool. Soc. London 1895 p. 780, ♀.
Apsilops radiata Ashmead, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 268.

THYSIOTORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 181 n. 7.
θυσία, actio sacrificandi; τόρος, scalprum lapicidarum.

Synon.: Hemiteles Brischke.
Physiotorus Brischke [err. typogr.].

brevipennis Brischke — ♀ — Eur.: Germania. [1891 p. 71, ♀.
Hemiteles (Thysiotorus) brevipennis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4.
similis Brischke — ♀ — Eur.: Germania. [p. 71, ♀.
Hemiteles (Physiotorus) similis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891

CHAMAEZELUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 181 n. 4.
χαμαί, humi; ζῆλος, aemulatio.
Species exstat.

PHYRTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 181 n. 3.
φυρτός, mixtus.
Vide genus Hemiteles.

CHAMERPES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 172 n. 4.
χαμαί, humi; ἕρπω, repo.
Species exstat.

PEZOPORUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 181 n. 2.
πεζός, pedes; πορός, transitus.
Vide genus Helcostizus.

---

[1]) *Lep.:* Hydrocampa obliteralis (Ashmead).

STIBEUTES

Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 75.
στιβευτής, inquisitor.

Synon.: Ichneumon Gravenhorst.
Pezomachus Gravenhorst.
Phygadeuon Thomson.

atratus Rdw.! — Eur. mer.
Stibeutes atratus Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 34.
atratus Destef. — ♀ — Eur.: Sicilia.
Stibeutes ? atratus Destefani, Natural. Sicil. III. 1884 p. 157, ♀.
bonellii (Grav.) Först. — ♀ — Eur.: Britannia, Italia.
Ichneumon Bonelli Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 34 n. 6, ♀.
Pezomachus Bonellii Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 885 n. 297, ♀.
Stibeutes Bonellii Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 78 n. 3, ♀.
Stibeutes Bonelli Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 156 n. 2, ♀.
gravenhorstii Först. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Stibeutes Gravenhorstii Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 77 n. 1, ♀.
Stibeutes Gravenhorstii Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 156 n. 1, ♀.
Phygadeuon Gravenhorsti Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 948 n. 20, ♀ ♂.
heinemannii Först. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Stibeutes Heinemanni Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 78 n. 2, ♀.
Stibeutes Heinemanni Capron, Entomologist XII. 1879 p. 15, ♀.
Stibeutes Heinemanni Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 156, ♀.
Phygadeuon Heinemanni Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 948 n. 19, ♀ ♂.
longicauda Rdw. — Eur. mer.
Stibeutes longicauda Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 33.
nigra Ashm. — ♀ — Am.: Copper Ins.
Stibeutes nigra Ashmead, Fur Seals & Fur Seal Islands IV. 1899 p. 338, ♀.

GENUS SEDIS INCERTAE.

STENOSCHEMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 220 [s. descr.].
στενός, angustus; σχῆμα, figura.
Species exstat.

34. *Subfam.* Stilpninae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 144 & 188.

ATRACTODES

Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 789 n. 10.
ἀτρακτο-ειδής, fuso-similis.

Synon.: Cremastus Provancher.
Mesoleptus Provancher.
Ophion Blanchard.
Pyracmon Provancher.

abnormis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes abnormis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 179, ♂.

absconditus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes absconditus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 156, ♂.
acceptus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes acceptus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 147, ♂.
adversarius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes adversarius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 158, ♂.
aemulator Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes aemulator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 186, ♂.
aequilongus Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Atractodes aequilongus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 149, ♂.
affinis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes affinis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 143, ♀.
agilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes agilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 161, ♂.
albitarsis Brullé — ♂ — Am.: Brasilia.
Atractodes albitarsis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 166 n. 1, ♂; T. 42 F. 2.
albopleuralis (Prov.) Davis — ♂ — Am.: Canada.
Mesoleptus albopleuralis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 224 n. 5, ♂.
Mesoleptus albopleuralis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 397 n. 5, ♂.
Atractodes ? albopleuralis Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 189.
albovinctus Curt. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Atractodes albovinctus Curtis, Brit. Entom. IX. 1832 p. 538, ♀.
Atractodes albovinctus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 118, ♀ ♂. [n. 8, ♀♂.
? Atractodes varicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8 (Oph.) p. 114
Atractodes albovinctus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1024 n. 19, ♀ ♂.
alpigenus Först. — ♂ — Eur.: Tirolia.
Atractodes alpigena Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 169, ♂.
alpigradus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes alpigradus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 147, ♂.
alpinus Först. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Atractodes alpinus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 123, ♀.
alticola Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Atractodes alticola Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 176, ♂.
alutaceus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Atractodes alutaceus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1026 p. 25, ♀ ♂.
ambifarius Först. — ♂ — Eur.: Germania. [153, ♂.
Atractodes ambifarius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 146 &
ambiguus Ruthe — ♀ — Eur.: Islandia.
Atractodes ambiguus Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 377 n. 63, ♀.
analogus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes analogus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 122, ♀.
angustipennis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes angustipennis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 132, ♀.
angustulus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes angustulus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 166, ♂.
arator Hal. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Atractodes arator Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 119, ♀ ♂.
arcticus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Atractodes arcticus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXIX. 1872 P. 6. p. 99, ♂.
assimilis Först. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Atractodes assimilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 131, ♀.

aterrimus Holmgr. — ♂ — As.: Groenlandia.
Atractodes aterrimus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXIX. 1872 P. 6. p. 98, ♂.
atricornis Först. — — ♂ Eur.: Germania.
Atractodes atricornis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 157, ♂.
autumnalis Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Atractodes autumnalis Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 367 n. 2, ♀ ♂.
Atractodes autumnalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 789 n. 2, ♀ ♂.
avidus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes avidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 153, ♂.
bicolor Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Atractodes bicolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 791 n. 179, ♀.
Atractodes bicolor Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 119, ♀ ♂.
Ophion (Atractodes) bicolor Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 327 n. 15.
Atractodes bicolor Westwood, Introd. mod. classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 60.
Atractodes bicolor Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 108 n. 51.
Atractodes bicolor Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 328 n. 18.
Atractodes bicolor Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 113 n. 4, ♀.
Atractodes bicolor Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 375 n. 61, ♀ ♂.
Atractodes bicolor Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 119 & 129, ♀.
Atractodes bicolor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VI. P. 4. 1880 p. 178, ♀ ♂.
Atractodes bicolor Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1022 n. 9.
bidentulus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes bidentulus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 174, ♂.
breviscapus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Atractodes breviscapus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1023 n. 14, ♀ ♂.
breviusculus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes breviusculus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 164, ♂.
calceatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes calceatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 161, ♂.
callidus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes callidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 169, ♂.
carinatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes carinatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 137, ♂.
castus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes castus Förster, Verh. naturh. Verh. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 141, ♂.
cautior Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes cautior Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 154, ♂.
citator Hal. — ♀ — Eur.: Britannia.
Atractodes citator Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 120, ♀.
compressus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia.
Atractodes compressus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1023 n. 15, ♀ ♂.
conspicuus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes conspicuus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 157, ♂.
contrarius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes contrarius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 191, ♂.
corruptor Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes corruptor Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 190, ♂.
crassicornis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Atractodes crassicornis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1025 n. 20, ♀ ♂.
croceicornis Hal. — ♀ — Eur.: Britannia.
Atractodes croceicornis Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 119, ♀.

cryptobius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes cryptobius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 136, ♂.
cryptonastes Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes cryptonastes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 183, ♂.
cultrarius Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes cultrarius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 123, ♀.
curvatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes curvatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 163, ♂.
custoditor Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes custoditor Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 178, ♂.
debilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes debilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 163, ♂.
declivis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes declivis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 182, ♂.
delicatulus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes delicatulus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 165, ♂.
designatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes designatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 135, ♀.
destructor Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes destructor Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 146, ♂.
difficilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes difficilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 176, ♂.
difformis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes difformis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 162, ♂.
dionaeus Curt. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Atractodes Dionaeus Curtis, Brit. Entom. IX. 1832 p. 538.
Atractodes Dionaeus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 118, ♀ ♂.
discolor Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes discolor Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 126 & 133, ♀.
discoloripes Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes discoloripes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 121, ♀.
dispar Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes dispar Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 183, ♂.
dissidens Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes dissidens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 180, ♂.
distinctus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes distinctus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 172, ♂.
ebeninus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes ebeninus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 159, ♂.
ecarinatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes ecarinatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 152, ♂.
engadinus Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Atractodes Engadinus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 149, ♂.
exilis Curt. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Atractodes exilis Curtis, Brit. Entomol. IX. 1832 p. 538.
Atractodes exilis Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 119, ♀.
Atractodes exilis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 113 n. 6, ♀.
Atractodes exilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 125, ♀.
Atractodes exilis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1024 n. 16, ♀ ♂.
exitialis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes exitialis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 121, ♀.

exosus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes exosus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 172, ♂.
expertus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes expertus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 156, ♂.
fatalis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes fatalis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 133, ♀.
flavicoxis Först. — ♀ — Eur.: Germania. [142, ♀.
Atractodes flavicoxis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 136 &
foerstori D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes niger Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 162, ♂ [nec
Atractodes Foersteri m. [Brullé].
fraternus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes fraternus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 127, ♀.
fulvicornis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes fulvicornis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 137, ♀.
fumatus Hal. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Atractodes fumatus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 119, ♀ ♂.
funebris Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes funebris Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 174, ♂.
geminus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes geminus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 186 & 187, ♂.
genuinus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes genuinus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 186, ♂.
gilvipes Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Atractodes gilvipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 112 n. 2, ♀.
Atractodes gilvipes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 130, ♀.
Atractodes gilvipes Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1022 n. 10, ♀.
Atractodes gilvipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 46, ♀ ♂.
gracilentus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes gracilentus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 137, ♀.
gravidus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Atractodes gravidus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 793 n. 180, ♀.
Atractodes gravidus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 118, ♀ ♂.
Atractodes gravidus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 112 n. 3, ♀.
Atractodes gravidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 127, ♀.
Atractodes gravidus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 178, ♀ ♂.
Atractodes gravidus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1023 n. 13, ♀ ♂.
Atractodes gravidus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 45, ♀ ♂.
guienzii Taschbg.[1] — ♀ ♂ — Afr.: Natal.
Atractodes Guienzii Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXIX. 1872 p. 7 n. 2, ♀ ♂.
helveticus Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Atractodes Helveticus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 148, ♂.
homologus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes homologus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 143, ♀.
humeralis (Prov.) Davis — ♂ — Am.: Canada.
Mesochorus humeralis Provancher, Natural. Canad. XIV. 1883 p. 3 n. 6, ♀.
Mesochorus humeralis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 792 n. 6, ♀.
Atractodes ? humeralis Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 188.

---

[1]) *Hymen.:* Vespa calida (Taschenberg).

inclinans Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes inclinans Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 191, ♂.
incommodus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes incommodus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 145, ♂.
incompletus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Pyracmon incompletum Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 90 n. 4, ♀.
Atractodes incompletus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 188.
incongruens Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes incongruens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 139, ♀.
indigena Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes indigena Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 130, ♀.
infestus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes infestus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 189, ♂.
infimus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes infimus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 153, ♂.
inimicus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes inimicus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 154, ♂.
inquilinus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes inquilinus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 167, ♂.
insignis Först. — ♂ — Eur.: Germania. [♂ [nec ♀].
Atractodes insignis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 125 & 150,
intemperans Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes intemperans Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 188, ♂.
intersectus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes intersectus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 138, ♀.
invalidus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes invalidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 164, ♂.
isomorphus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes isomorphus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 140, ♀.
labefactor Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes labefactor Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 135, ♀.
laboriosus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes laboriosus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 173, ♂.
lentus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes lentus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 158, ♂.
lepidus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes lepidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 128, ♀.
ligatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes ligatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 128, ♀.
linearis Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Atractodes linearis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 159, ♂.
lineatus Brullé — ♀ — Am.: Brasilia, Guyana.
Atractodes lineatus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 146 p. 167 n. 2, ♀.
liogaster Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Atractodes liogaster Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1023 n. 12, ♀.
longicaudus (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Cremastus longicaudus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 367 n. 5, ♀ ♂.
Cremastus longicaudus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 789 n. 5, ♀ ♂.
Atractodes ? longicaudus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 188.
malevolus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes malevolus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 178, ♂.

mediatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.

Atractodes mediatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 129, ♀.

melanocerus Först. — ♀ — Eur.: Germania.

Atractodes melanocerus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 133, ♀.

melanostomus Först. — ♀ — Eur.: Germania.

Atractodes melanostomus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 139, ♀.

mesoxanthus Först. — ♂ — Eur.: Germania.

Atractodes mesoxanthus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 144, ♂.

minax Först. — ♂ — Eur.: Germania.

Atractodes minax Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 173, ♂.

minusculus Först. — ♀ — Eur.: Germania.

Atractodes minusculus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 131, ♀.

minutus Först. — ♂ — Eur.: Germania.

Atractodes minutus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 160, ♂.

modestus Först. — ♂ — Eur.: Germania.

Atractodes modestus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 166, ♂.

montanus Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.

Atractodes montanus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 160, ♂.

monticola Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.

Atractodes monticola Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 175, ♂.

montivagus Först. — ♀ — Eur.: Germania.

Atractodes montivagus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 130, ♀.

neophytes Först. — ♀ — Eur.: Germania.

Atractodes neophytes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 122, ♀.

niger Brullé — ♀ — Eur.: Brasilia.

Atractodes niger Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 168 n. 4, ♀.

nigerrimus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.

Atractodes nigerrimus Holmgren, Entom. Tidskr. IV. 1883 p. 151 n. 24, ♂.

nigricoxatus D. T. — ♂ — Am.: Canada.

Atractodes nigricoxus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 368 n. 3, ♂ [non Förster].

Atractodes nigricoxus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 790 n. 3, ♂.

Atractodes nigricoxatus m.

nigricoxis Först. — ♀ — Eur.: Germania.

Atractodes nigricoxis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 126, ♀.

nigripes Först. — ♀ — Eur.: Germania.

Atractodes nigripes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 120, ♀.

nitens Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.

Atractodes nitens Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 368 n. 4, ♀ ♂.

Atractodes nitens Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 790 n. 4, ♀ ♂.

nodifer Först. — ♂ — Eur.: Germania.

Atractodes nodifer Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 189, ♂.

obsoletus Först. — ♂ — Eur.: Germania.

Atractodes obsoletus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 187, ♂.

occultus Först. — ♂ — Eur.: Germania.

Atractodes occultus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 149, ♂.

offensorius Först. — ♂ — Eur.: Germania.

Atractodes offensorius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 150, ♂.

oreophilus Först. — ♀ — Eur.: Helvetia.

Atractodes oreophilus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 124, ♀.

oribates Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.

Atractodes oribates Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 188, ♂.

parallelus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Atractodes parallelus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1024 n. 18, ♀ ♂.
parilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes parilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 171, ♂.
particeps Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes particeps Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 170, ♂.
pauxillus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes pauxillus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 160, ♂.
pediophilus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes pediophilus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 125, ♀.
perniciosus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes perniciosus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 175, ♂.
perpusillus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes perpusillus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 168, ♂.
piceicornis Hal. — ♀ — Eur.: Britannia.
Atractodes piceicornis Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 119, ♀.
picipes Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Atractodes picipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 113 n. 5, ♀ ♂.
Atractodes picipes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 120, ♀ & 191, ♂.
Atractodes picipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 178, ♀ ♂.
Atractodes picipes Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1025 n. 21.
placidus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes placidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 171, ♂.
politus Ashm. — ♀ — Am.: Colorado.
Atractodes politus Ashmead, Bull. Colorado Biol. Assoc. I. 1890 p. 23, ♀.
praecautus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes praecautus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 140, ♀.
praepotens Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes praepotens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 155, ♂.
procerus Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Atractodes procerus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 148, ♂.
progenitus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes progenitus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 177, ♂.
proprius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes proprius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 151, ♂.
prosperator Hal. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Atractodes ? prosperator Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 120, ♀ ♂.
provancheri D. T. — Am.: Canada.
Atractodes singularis Provancher, Natural. Canad. VIII. 1876 p. 328 [nec Förster].
Atractodes Provancheri m.
pusillus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes pusillus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 121, ♀.
quaerulosus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes quaerulosus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 185, ♂.
rapinatorius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes rapinatorius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 180, ♂.
reconditus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes reconditus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 181, ♂.
repudiatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes repudiatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 165, ♂.

mediatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.

Atractodes mediatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 129, ♀.

melanocerus Först. — ♀ — Eur.: Germania.

Atractodes melanocerus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 133, ♀.

melanostomus Först. — ♀ — Eur.: Germania.

Atractodes melanostomus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 139, ♀.

mesoxanthus Först. — ♂ — Eur.: Germania.

Atractodes mesoxanthus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 144, ♂.

minax Först. — ♂ — Eur.: Germania.

Atractodes minax Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 173, ♂.

minusculus Först. — ♀ — Eur.: Germania.

Atractodes minusculus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 131, ♀.

minutus Först. — ♂ — Eur.: Germania.

Atractodes minutus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 160, ♂.

modestus Först. — ♂ — Eur.: Germania.

Atractodes modestus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 166, ♂.

montanus Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.

Atractodes montanus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 160, ♂.

monticola Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.

Atractodes monticola Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 175, ♂.

montivagus Först. — ♀ — Eur.: Germania.

Atractodes montivagus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 130, ♀.

neophytes Först. — ♀ — Eur.: Germania.

Atractodes neophytes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 122, ♀.

niger Brullé — ♀ — Eur.: Brasilia.

Atractodes niger Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 168 n. 4, ♀.

nigerrimus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.

Atractodes nigerrimus Holmgren, Entom. Tidskr. IV. 1883 p. 151 n. 24, ♂.

nigricoxatus D. T. — ♂ — Am.: Canada.

Atractodes nigricoxus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 368 n. 3, ♂ [non Förster].
Atractodes nigricoxus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 790 n. 3, ♂.
Atractodes nigricoxatus m.

nigricoxis Först. — ♀ — Eur.: Germania.

Atractodes nigricoxis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 126, ♀.

nigripes Först. — ♀ — Eur.: Germania.

Atractodes nigripes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 120, ♀.

nitens Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.

Atractodes nitens Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 368 n. 4, ♀ ♂.
Atractodes nitens Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 790 n. 4, ♀ ♂.

nodifer Först. — ♂ — Eur.: Germania.

Atractodes nodifer Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 189, ♂.

obsoletus Först. — ♂ — Eur.: Germania.

Atractodes obsoletus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 187, ♂.

occultus Först. — ♂ — Eur.: Germania.

Atractodes occultus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 149, ♂.

offensorius Först. — ♂ — Eur.: Germania.

Atractodes offensorius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 150, ♂.

oreophilus Först. — ♀ — Eur.: Helvetia.

Atractodes oreophilus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 124, ♀.

oribates Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.

Atractodes oribates Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 188, ♂.

parallelus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Atractodes parallelus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1024 n. 18, ♀ ♂.
parilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes parilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 171, ♂.
particeps Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes particeps Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 170, ♂.
pauxillus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes pauxillus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 160, ♂.
pediophilus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes pediophilus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 125, ♀.
perniciosus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes perniciosus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 175, ♂.
perpusillus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes perpusillus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 168, ♂.
piceicornis Hal. — ♀ — Eur.: Britannia.
Atractodes piceicornis Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 119, ♀.
picipes Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Atractodes picipes Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 113 n. 5, ♀ ♂.
Atractodes picipes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 120, ♀ & 191, ♂.
Atractodes picipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 178, ♀ ♂.
Atractodes picipes Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1025 n. 21.
placidus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes placidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 171, ♂.
politus Ashm. — ♀ — Am.: Colorado.
Atractodes politus Ashmead, Bull. Colorado Biol. Assoc. I. 1890 p. 23, ♀.
praecautus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes praecautus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 140, ♀.
praepotens Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes praepotens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 155, ♂.
procerus Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Atractodes procerus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 148, ♂.
progenitus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes progenitus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 177, ♂.
proprius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes proprius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 151, ♂.
prosperator Hal. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Atractodes ? prosperator Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 120, ♀ ♂.
provancheri D. T. — Am.: Canada.
Atractodes singularis Provancher, Natural. Canad. VIII. 1876 p. 328 [nec Förster].
Atractodes Provancheri m.
pusillus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes pusillus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 121, ♀.
quaerulosus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes quaerulosus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 185, ♂.
rapinatorius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes rapinatorius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 180, ♂.
reconditus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes reconditus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 181, ♂.
repudiatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes repudiatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 165, ♂.

rivalis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes rivalis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 185, ♂.
royi (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Cremastus Royi Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 366 n. 4, ♀ ♂.
Cremastus Royi Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 788 n. 4, ♀ ♂.
Atractodes Royi Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 188.
ruficinctus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes ruficinctus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 187, ♂.
ruficornis Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes ruficornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Canzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 178, ♀.
rufipes Prov. — Am.: Canada.
Atractodes rufipes Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 151.
salius Hal. — ♀ — Eur.: Britannia.
Atractodes salius Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 119, ♀.
sarntheinii D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes rufipes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 151, ♂.
Atractodes Sarntheinii m.
scapiphorus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Atractodes scapiphorus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 151.
Atractodes scapiphorus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 207, ♂.
Atractodes scapiphorus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 367 n. 1.
Atractodes scapiphorus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 379, ♂.
Atractodes scapiphorus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 789 n. 1.
scrutator Hal. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Atractodes scrutator Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 118, ♀ ♂.
sectator Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes sectator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 164, ♂.
separatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes separatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 152, ♂.
singularis Först. — ♂ — Eur.: Britannia.
Atractodes singularis Förster, Ver. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 155, ♂.
solivagus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes solivagus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 184, ♂.
sollicitator Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes sollicitator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 184, ♂.
sordidus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes sordidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 132, ♀.
spiniger Voll. — ♂ — Eur.: Batavia.
Atractodes spiniger Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXI. 1878 p. 171 n. 18, ♂; T. 10 F. 8.
sponsus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes sponsus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 182, ♂.
subdentatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes subdentatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 167, ♂.
subdolus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes subdolus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 141 & 143, ♀.
subrepens Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes subrepens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 168, ♂.
subsimilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes subsimilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 170, ♂.
sulcatulus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes sulcatulus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 177, ♂.

suspicax Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes suspicax Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 181, ♂.
tenax Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes tenax Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 145, ♂.
tenellus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes tenellus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 181, ♂.
tenuicinctus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes tenuicinctus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 142, ♀.
tenuipes Thoms. — Eur.: Suecia.
Atractodes tenuipes Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1022 n. 11.
tenuis Först. — ♂ — Eur.: Tirolia.
Atractodes tenuis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 168, ♂.
thomsonii D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Atractodes flavicoxa Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1024 n. 17, ♀ ♂ [nec Förster].
Atractodes Thomsonii m.
thoracicus Brullé — ♀ — Am. mer.
Atractodes thoracicus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 167 n. 3, ♀.
tibialis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes tibialis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 120, ♀.
ultorius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes ultorius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 177, ♂.
unicinctus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes unicinctus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 142, ♀.
vanus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes vanus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 157, ♂.
venustulus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes venustulus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 190, ♂.
vicinus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Atractodes vicinus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 138, ♀.
vilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes vilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 154, ♂.
vorax Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes vorax Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 179, ♂.
xanthocarpus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Atractodes xanthocarpus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 144, ♂.
xanthoneurus Först. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Atractodes xanthoneurus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 134, ♀.

EXOLYTUS

Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 328.
ἔξω, extra; λυτός, apertus.

Synon.: Atractodes Holmgren, Thomson.
Ichneumon Gravenhorst.
Mesoleptus Gravenhorst, Stephens, Fonscolombe.

aciculatus Davis — ♀ ♂ — Am.: Illinois, New York, Michigan.
Exolytus aciculatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 354, ♀ ♂.
adaequator Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus adaequator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 53, ♀.
adversarius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus adversarius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 68, ♂.

aequalis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus aequalis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 55, ♀.
aequilatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus aequilatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 72, ♂.
aggressorius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus aggressorius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 65, ♂.
agilis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus agilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 53, ♀.
agnatus Först. — ♀ — Eur.: Gallia.
Exolytus agnatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 57, ♀.
alamagnus Davis — ♂ — Am.: Colorado.
Exolytus alamagnus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 355, ♂.
alticola Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Exolytus alticola Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 82, ♂.
ambiguus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus ambiguus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 92, ♂.
ambulator Först. — ♀ — Eur.: Gallia.
Exolytus ambulator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 54, ♀.
anceps Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus anceps Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 51, ♀.
anguinus Först. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Exolytus anguinus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 62, ♀.
angustulus Först. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Exolytus angustulus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 52, ♀.
annexus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus annexus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 58, ♀.
anxius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus anxius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 96, ♂.
approximatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus approximatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 63, ♀.
arrogans Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus arrogans Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 93, ♂.
assimilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus assimilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 105, ♂.
attenuatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus attenuatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 64, ♀.
auxiliarius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus auxiliarius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 86, ♂.
beneplacidus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus beneplacidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 54, ♀.
binoculus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus binoculus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 113, ♂.
biosteres Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus biosteres Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 104, ♂.
bizonulis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus bizonulis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 105, ♂.
blandus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus blandus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 95, ♂.
borealis Davis — ♂ — Am.: Hudsons Bay Terr.
Exolytus borealis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 355, ♂.

brevis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus brevis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 113, ♂.
brevissimus D. T. — ♀ — Am.: Illinois, Michigan, New Hampshire.
Exolytus brevis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 355, ♀ [non Förster].
Exolytus brevissimus m.
callidus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus callidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 70, ♂.
carinatus Först. — ♂ — Eur.: Gallia.
Exolytus carinatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 78, ♂.
cinctus Fabr. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus cinctus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 59, ♀.
circumspectus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus circumspectus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 99, ♂.
commixtus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus commixtus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 91, ♂.
complacens Först. — ♂ — Eur.: Germania, Gallia.
Exolytus complacens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 89, ♂.
comptus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus comptus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 63, ♀.
concamerus Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Exolytus concamerus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 356, ♀.
concinnus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus concinnus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 64, ♀.
concors Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus concors Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 83, ♂.
confusus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus confusus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 80, ♀.
congener Först. — ♀ ♂ — Eur.: Tirolia.
Exolytus congener Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 58, ♀ & 96, ♂.
consortius Först. — ♀ ♂ — Eur.
Exolytus consortius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 50, ♀ & 74, ♂.
contrarius Först. — Eur.: Germania.
Exolytus contrarius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 70, ♂.
cooperator Först. — Eur.: Germania.
Exolytus cooperator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 80, ♂.
cultus Davis — ♀ — Am.: Colorado, Illinois.
Exolytus cultus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 355, ♀.
cupidus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus cupidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 61, ♀.
curiosus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus curiosus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 84, ♂.
cursitans Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus cursitans Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 93, ♂.
dakotaensis Davis — ♀ ♂ — Am.: Dakota.
Exolytus Dakotaensis Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 354, ♀ ♂.
davisii D. T. — ♂ — Am.: Colorado.
Exolytus petiolaris Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 355, ♂ [non Thomson].
Exolytus Davisii m.
debilitatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus debilitatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 76, ♂.

deceptor Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus deceptor Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 70, ♂.
decimator Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus decimator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 59, ♀.
declinans Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus declinans Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 71, ♂.
defectivus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus defectivus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 71, ♂.
definitus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus definitus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 76, ♂.
delicatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus delicatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 114, ♂.
derasus Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Exolytus derasus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 89, ♂.
despectus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus despectus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 116, ♂.
devotus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus devotus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 50, ♀ & 76, ♂.
dichrocerus Först. — ♀ — Eur.
Exolytus dichrocerus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 56. ♀.
difformis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus difformis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 86, ♂.
diminutus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus diminutus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 108, ♂.
distans Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus distans Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 84, ♂.
distinctus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus distinctus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 51, ♀.
egregius Först. — ♂ — Patria?
Exolytus egregius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 81. ♂.
elaphrus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus elaphrus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 102, ♂.
elegantulus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus elegantulus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 64, ♀.
enodis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus enodis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 97, ♂.
erugatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus erugatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 111, ♂.
evagator Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus evagator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 77, ♂.
exaequatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus exaequatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 84, ♂.
exhaustorius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus exhaustorius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 87, ♂.
exiguus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus exiguus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 100, ♂.
exstinctus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus exstinctus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 81, ♂.
exstirpator Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus exstirpator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 67, ♂.

fallax Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus fallax Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 66, ♂.
ficticius Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus ficticius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 57, ♀.
filicornis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Atractodes (Exolytus) filicornis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1020 n. 4, ♀ ♂.
filiventris Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus filiventris Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 63, ♀.
flavipes Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Atractodes (Exolytus) flavipes Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1021 n. 7, ♀ ♂.
flexibilis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus flexibilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 116, ♀.
foveolatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus foveolatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 109, ♂.
fractus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus fractus Förster, Verh. naturh. Ver preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 99, ♂.
fulvipes Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus fulvipes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 50, ♀.
fundatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus fundatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 90, ♂.
futilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus futilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 104, ♂.
gallicus Först. — ♀ — Eur.: Gallia.
Exolytus Gallicus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 53, ♀.
gelechiae Ashm. — ♂ — Am.: California.
Exolytus Gelechiae Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 397, ♂.
gemellus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus gemellus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 56, ♀.
genitor Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus genitor Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 90, ♂.
genuinus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus genuinus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 95, ♂.
glabriculus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus glabriculus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 87, ♂.
glaucus Davis — ♀ ♂ — Am.: Michigan, Illinois, New York.
Exolytus glaucus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 354, ♀ ♂.
gracilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus gracilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 116, ♂.
gratiosus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus gratiosus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 93, ♂.
gravabilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus gravabilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 68, ♂.
helveticus Först. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Exolytus Helveticus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 57, ♀.
homologus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus homologus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 115, ♂.
hospitans Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus hospitans Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 90, ♂.
humilis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus humilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 53, ♀ & 106, ♂.

hypoleptus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus hypoleptus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 118, ♂.
impotens Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus impotens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 101, ♂.
incertus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus incertus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 50, ♀ & 73, ♂.
Atractodes (Exolytus) incertus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1021 n. 6.
incitus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus incitus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 56, ♀.
incolumis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus incolumis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 81, ♂.
ineditus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus ineditus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 108, ♂.
infestus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus infestus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 75, ♂.
infirmus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus infirmus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 101, ♂.
infligens Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus infligens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 67, ♂.
insidiator Först. — ♀ — Eur.: Tirolia.
Exolytus insidiator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 60, ♀.
integrellus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus integrellus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 62, ♀.
intermedius Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus intermedius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 54, ♀.
intermixtus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus intermixtus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 65, ♀.
internecivus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus internecivus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 107, ♂.
invalidus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus invalidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 59, ♀.
invidiosus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus invidiosus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 83, ♂.
invitus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus invitus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 82, ♂.
ithacae Ashm. — ♀ — Am.: New York.
Exolytus Ithacae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 206, ♀.
jucundus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus jucundus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 92, ♂.
juvenilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus juvenilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 75, ♂.
labilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus labilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 75, ♂.
lepidus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus lepidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 93, ♂.
leptodomus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus leptodomus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 98, ♂.
leptogaster Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus leptogaster Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 114, ♂.

levigatus (Grav.) Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Gallia, Italia.
Ichneumon laevigatus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 371 n. 121, ♀ ♂.
Mesoleptus laevigatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 687.
Mesoleptus laevigatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 111 n. 69, ♀ ♂.
Mesoleptus laevigatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 230 n. 51.
Mesoleptus laevigatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 215 n. 7, ♀ ♂.
Atractodes (Exolytus) laevigatus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 [p. 328 n. 18.
Exolytus laevigatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 115 [n. 1, ♀ ♂.
Exolytus laevigatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 10, ♀ ♂.
Exolytus laevigatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 47, 49, [55, 58, ♀ & 97, ♂.
Exolytus laevigatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 179, ♀ ♂.
Atractodes (Exolytus) laevigatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1019 n. 1, ♀ ♂.
var. **incessor** (Hal.) Marsh. — Eur.: Britannia.
Atractodes incessor Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 118, ♀ ♂.
Exolytus laevigatus var. incessor Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 60.
var. **scrutator** (Hal.) Marsh. — Eur.: Britannia.
Atractodes scrutator Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 118, ♀ ♂.
Exolytus laevigator var. scrutator Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p. 60.
levis Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus laevis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 55, ♀, 106 & [109, ♂.
limitaris Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus limitaris Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 64, ♀.
marginatus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Atractodes (Exolytus) marginatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1020 n. 2, ♀.
melanocerus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus melanocerus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 74, ♂.
melanurus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus melanurus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 99, ♂.
mesomeristus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus mesomeristus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 117, ♂.
mitis Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Exolytus mitis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 109, ♂.
molestus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus molestus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 82, ♂.
monticola Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus monticola Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 52, ♀.
navus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus navus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 106, ♂.
nefastus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus nefastus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 100, ♂.
neglectus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus neglectus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 115, ♂.
nemophilus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus nemophilus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 109, ♂.
niger Ashm. — ♀ — Am.: Bering Ins.
Exolytus niger Ashmead, Fur Seals and Fur-Seal Islands IV. 1899 p. 338, ♀.

[1]) *Hymen.:* Lophyrus spec. (Brischke), Tenthredo spec.

nigricornis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus nigricornis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 60, ♀.
nitidulus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus nitidulus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 110, ♂.
nosophorus Först. — Eur.: Germania.
Exolytus nosophorus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 103, ♂.
novellus Först. — Eur.: Germania.
Exolytus novellus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 83, ♂.
obscurellus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus obscurellus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 107, ♂.
occultus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus occultus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 67, ♂.
oligomerus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus oligomerus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 88, ♂.
olistherus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus olistherus Förster. Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 97, ♂.
onerosus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus onerosus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 79, ♂.
optabilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus optabilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 103, ♂.
percussor Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus percussor Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 85, ♂.
perditorius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus perditorius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 95, ♂.
peregrinus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus peregrinus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 114, ♂.
petiolaris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Atractodes (Exolytus) petiolatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1020 n. 3, ♀ ♂.
politus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Campoplex politus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 144.
Exolytus politus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 208, ♀.
Exolytus politus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 368 & 790, ♀.
Exolytus politus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 380 n. 1, ♀.
pontresinensis Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Exolytus Pontresinensis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 79, ♂.
pravus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus pravus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 69, ♂.
productus Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus productus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 179, ♀ ♂.
pronus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus pronus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 51, ♀ & 71, ♂.
propinquus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus propinquus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 69, ♂.
propugnator Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus propugnator Förter, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 111, ♂.
punctiger Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus punctiger Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 61, ♀.
purus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus purus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 80, ♂.
quadrituberculatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus quadrituberculatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 98, [♂.

quietus Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Exolytus quietus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 78, ♂.
raptor Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus raptor Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 94, ♂.
remotus Först — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus remotus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 68, ♂.
renitens Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus renitens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 91, ♂.
requirens Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus requirens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 102, ♂.
retractus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus retractus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 88, ♂.
ripicola Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Atractodes (Exolytus) ripicola Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1021 n. 5, ♀ ♂.
ruficoxatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus ruficoxatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 50, ♀.
rufipes Först. — ♀ — Eur.: Gallia.
Exolytus rufipes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 59, ♀.
secretus Först. — ♂ — Eur.: Gallia.
Exolytus secretus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 73, ♂.
seductorius Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus seductorius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 63, ♀.
segregatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus segregatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 66, ♂.
sericeifrons Davis — ♀ — Am.: Washington.
Exolytus sericeifrons Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 355, ♀.
signatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus signatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 89 & 113, ♂.
silesiacus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus Silesiacus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 77, ♂.
similatorius Först. — ♂ — Eur.: Gallia.
Exolytus similatorius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 69, ♂.
singularis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus singularis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 112, ♂.
sobrius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus sobrius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 85, ♂.
solitarius Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus solitarius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 61, ♀.
sollicitus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus sollicitus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 72, ♂.
speculum Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus speculum Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 52, ♀.
splendens (Grav.) Först. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Mesoleptus splendens Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 115 n. 70, ♀. [104, ♂.
Exolytus splendens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 56, ♀ &
Atractodes (Exolytus) splendens Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1021 n. 8, ♀ ♂.
spoliator Först. — ♂ — Eur.: Tirolia.
Exolytus spoliator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 66, ♂.
subdentatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus subdentatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 60, ♀.

subimpressus Först. — ♀ — Eur.: Tirolia.
Exolytus subimpressus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 62, ♀.
subrugosus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus subrugosus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 112, ♂.
subsulcatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus subsulcatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 111, ♂.
subtilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus subtilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 117, ♂.
taeniolatus Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Exolytus taeniolatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 66, ♂.
tenellus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus tenellus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 57, ♀.
tenuiventris Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus tenuiventris Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 92, ♂.
trepidus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus trepidus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 110, ♂.
tribulator Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus tribulator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 86, ♂.
trifoveolatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus trifoveolatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 55, ♀.
tripunctus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus tripunctus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 62, ♀.
unipunctus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus unipunctus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 60, ♀.
unitus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus unitus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 74, ♂.
vacuus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus vacuus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 88, ♂.
vetustus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Exolytus vetustus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 65, ♀.
vicinus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus vicinus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 94, ♂.
vigilatorius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus vigilatorius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 73, ♂.
vilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus vilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 79, ♂.
volubilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Exolytus volubilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 101, ♂.

POLYRRHEMBIA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 189 n. 5 [Polyrhembia].
Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 42.
πολύς, multus; ῥεμβίν, circumerrare.

Synon.: Atractodes Haliday & auct.
Hemiteles Gravenhorst.

albicincta Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Polyrrhembia albicincta Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 47, ♂.
anthracina Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Polyrrhembia anthracina Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 45, ♀.

canaliculata Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Polyrrhembia canaliculata Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 44, ♂.
carbonaria Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Polyrrhembia carbonaria Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 46, ♀ ♂.
corvina Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Polyrrhembia corvina Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 46, ♀ ♂.
latiuscula Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Polyrrhembia latiuscula Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 45, ♀.
linearis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Polyrrhembia linearis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 45, ♂.
major Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Polyrrhembia major Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 43, ♂.
melanaria Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Polyrrhembia melanaria Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 46, ♀.
monticola Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Polyrrhembia monticola Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 44, ♂.
nigrata Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Polyrrhembia nigrata Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 45, ♀ ♂.
nigripes Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Polyrrhembia nigripes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 46, ♂.
oligomera Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Polyrrhembia oligomera Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 44, ♀.
oreophila Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Polyrrhembia oreophila Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 44, ♂.
procerula Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Polyrrhembia procerula Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 45, ♀ ♂.
splendida Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Polyrrhembia splendida Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 46, ♀.
stygia Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Polyrrhembia stygia Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 44, ♀.
subcoriacea Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Polyrrhembia subcoriacea Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 47, ♂.
tenebricosa (Grav.) Först. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania, Helvetia.
Hemiteles tenebricosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 785 n. 230, ♂.
Hemiteles tenebricosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 121 n. 5, ♂.
Polyrrhembia tenebricosa Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 43 [& 47, ♀ ♂.
Hemiteles tenebricosus Bridgman & Fitch, Entomologist XVI. 1883 p. 100 n. 4, ♂.
tibialis Först. — ♂ — Eur.: Tirolia.
Polyrrhembia tibialis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 47, ♂.
vestalis (Hal.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Islandia, Britannia, Suecia, Germania.
Atractodes vestalis Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 118, ♀ ♂.
Atractodes vestalis Curtis, Brit. Entom. IX. 1832 p. 558. [♀ ♂.
Atractodes vestalis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 112 n. 1,
Atractodes tenebricosus Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 376 n. 62, ♀.
Atractodes vestalis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 130, ♀ [& 159, ♂.
Atractodes vestalis Britschke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 178, ♀ ♂.
Atractodes (Polyrhembia) tenebricosus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1026 n. 24, ♀ ♂.

STILPNUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 664 n. 5.
στιλπνός, fulgens.

Synon.: Ichneumon Scopoli & auct.

aequilongus Förat. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus aequilongus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 37, ♀.
agilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Stilpnus agilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 39, ♂.
ambulatorius Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Stilpnus ambulatorius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 40, ♂.
analogus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Stilpnus analogus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 41, ♂.
angustatus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Stilpnus angustatus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1027 n. 3, ♀.
arridens Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus arridens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 34, ♀.
assimilis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus assimilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 33, ♀.
blandus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ichneumon (Stilpnus) blandus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 672 n. 290, ♀.
Stilpnus blandus Curtis, Brit. Entom. IX. 1832 p. 388 n. 4, ♀.
Stilpnus blandus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 210 n. 4, ♀.
Stilpnus blandus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 33, ♀.
Stilpnus blandus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 345, ♀ ♂.
Stilpnus blandus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 222 n. 5, ♀ ♂.
Stilpnus blandus Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1028 n. 5, ♀ ♂.
callens Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus callens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 35, ♀.
canadensis Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Stilpnus Canadensis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 112, ♂.
Stilpnus Canadensis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 42 n. 1, ♀ ♂.
Stilpnus Canadensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 311 n. 1, ♀ ♂.
canaliculatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus canaliculatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 36, ♀.
clypeatus Cress. — ♂ — Am.: Illinois.
Stilpnus clypeatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 95, ♂.
compressus Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Stilpnus ? compressus Cressus, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 260 n. 2, ♂.
concinnus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus concinnus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. XXXIII. 1876 p. 34, ♀.
conformatus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Stilpnus conformatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 39, ♂.
crassicornis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Stilpnus crassicornis Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1027 n. 2, ♀ ♂.
cyclodes Först. — ♀ — Eur.: Gallia, Germania.
Stilpnus cyclodes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 37, ♀.
cyclogaster Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania. [39 & 41, ♂.
Stilpnus cyclogaster Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 34, ♀,
declinis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus declinis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 38, ♀.

denticulatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus denticulatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 37, ♀.
deplanatus Grav. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Ichneumon (Stilpnus) deplanatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 667 n. 287, ♀.
Stilpnus deplanatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 209 n. 1, ♀.
Stilpnus deplanatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 34, ♀.
Stilpnus deplanatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 222 n. 2, ♀.
Stilpnus deplanatus Anonym, Trans. Entom. Soc. London 1887 p. 50; T. 2 F. 9.
diffinis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus diffinis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 38, ♀.
dimidiatus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus dimidiatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 34, ♀.
diversus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Stilpnus diversus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 39, ♂.
dryadum Curt. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Stilpnus dryadum Curtis, Brit. Entom. IX. 1832 p. 388 n. 3, ♀ ♂; T. 388.
Stilpnus dryadum Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 210 n. 5.
Stilpnus dryadum Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 222 n. 4, ♀ ♂.
elimatus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Stilpnus elimatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 38, ♀ & 40, ♂.
eurygaster Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus eurygaster Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 34 & 38, ♀.
fulvicornis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus fulvicornis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 37, ♀.
fuscicornis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus fuscicornis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 35, ♀.
gagates Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon gagates Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. Syst. 1807 p. 263 n. 3760.
Ichneumon gagates Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 286.
Ichneumon (Stilpnus) gagates Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 667 n. 288, ♀ ♂.
Stilpnus gagates Curtis, Brit. Entom. IX. 1832 p. 388 n. 1, ♀ ♂.
Stilpnus gagates Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 208 n. 2, ♀ ♂.
Ichneumon (Stilpnus) gagates Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 306 n. 21, ♀ ♂.
Stilpnus gagates Wetwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 57.
Stilpnus gagates Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 419 n. 1, ♂.
Stilpnus gagates Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 56, ♀ ♂.
Stilpnus gagates Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 56, ♀ ♂.
Stilpnus gagates Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 36, ♀ & 41, ♂.
Stilpnus gagates Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 222 n. 1, ♀ ♂.
Stilpnus gagates Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1027 n. 1, ♀ ♂.
gallicus Först. — ♀ — Eur.: Gallia.
Stilpnus Gallicus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 37, ♀.
hudsonicus Cress. — ♂ — Am.: Hudsons Bay.
Stilpnus Hudsonicus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 95, ♂.
inaequalis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Stilpnus inaequalis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 41, ♂.
latens Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus latens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 35, ♀.

[1]) *Dipt.:* Anthomyia radicum (Brischke).

leptomerus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Stilpnus leptomerus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 41, ♂.
levis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Stilpnus laevis Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 332 n. 3, ♀.
Stilpnus laevis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 772 n. 3, ♀.
mediocris Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus mediocris Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 36, ♀.
morionellus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Stilpnus morionellus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 40, ♂.
neglectus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Stilpnus neglectus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 41, ♂.
nigricoxis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Stilpnus nigricoxis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 41, ♂.
nitidulator Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Ichneumon (Stilpnus) nitidulator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 362 n. 19, ♂.
novitius Först. — ♀ — Eur: Germania.
Stilpnus novitius Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 38, ♀.
obscurus Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Stilpnus obscurus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 259 n. 1, ♂.
parvulus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus parvulus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 37, ♀.
pavoniae (Scop.) Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon Pavoniae Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 288 n. 762.
Ichneumon Pavoniae Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 368.
Ichneumon Pavoniae Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 214 n. 42.
Ichneumon (Stilpnus) Pavoniae Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 671 n. 289, ♀ ♂.
Stilpnus Pavoniae Curtis, Brit. Entom. IX. 1832 p. 388 n. 2.
Stilpnus Pavoniae Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 209 n. 3.
Stilpnus Pavoniae Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 36, ♀.
Stilpnus Pavoniae Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 1./2. 1881 p. 345, ♀ ♂.
Stilpnus Pavoniae Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 222 n. 3, ♀ ♂.
Stilpnus Pavoniae Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1028 n. 4, ♀ ♂.
pellucens Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus pellucens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 33, ♀.
placitus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Stilpnus placitus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 35, ♀ & 42, ♂.
politus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus politus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 36, ♀.
providus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Stilpnus providus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 39, ♂.
pygmaeator Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Ichneumon (Stilpnus) pygmaeator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 362 n. 18, ♂.
retritus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus retritus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 35, ♀.
subimpressus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus subimpressus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 35, ♀.
subtilis Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Stilpnus subtilis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 40, ♂.
subzonulus Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus subzonulus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 34, ♀.

tenuicinctus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Stilpnus tenuicinctus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 33, ♂.
tenuipes Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Stilpnus tenuipes Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1028 n. 6, ♀ ♂.
tersus Först. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia, Germania.
Stilpnus tersus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 36, ♀ & 40, ♂.
texanus Ashm. — ♀ — Am.: Texas.
Stilpnus Texanus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 397, ♀.
trivialis Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Stilpnus trivialis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 36, ♀.
unctus Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Stilpnus unctus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 41, ♂.
xanthopus Först. — ♂ — Eur.
Stilpnus xanthopus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 39, ♂.

ASYNCRITA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 29 n. 4.
ἀ-σύνκριτος, incomparabilis.

Synon.: Atractodes Gravenhorst, Haliday, Curtis, Holmgren, Thomson.

alpicola Först. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Asyncrita alpicola Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 31, ♀.
anceps Först. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Asyncrita anceps Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 31, ♀.
cultraria Först. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia.
Asyncrita cultraria Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 31, ♀ ♂.
designata Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Asyncrita designata Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 30, ♂.
foveolata (Grav.) Först. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Atractodes foveolatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 794 n. 181.
Atractodes cultellator Curtis, Brit. Entom. IX. 1832 p. 558.
Atractodes cultellator Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 120, ♀. [n. 7, ♀ ♂.
Atractodes cultellator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 114
Asyncrita foveolata Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 30, ♀.
Asyncrita cultellator Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 31.
Atractodes (Asyncrita) foveolator Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1025 n. 22, ♀ ♂.
longiventris Först. — ♀ — Eur.: Tirolia.
Asyncrita longiventris Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 31, ♀.
microcephala Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Asyncrita microcephala Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 31, ♀.
punctulata Först. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Asyncrita punctulata Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 30, ♂.
rufipes Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Asyncrita rufipes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 30 (♀).
thomsoni D. T. — ♀ — Eur.: Suecia.
Atractodes (Asyncrita) rufipes Thomson, Opusc. entom. P. 10. 1884 p. 1025 n. 23, ♀ [non Förster].
Asyncrita Thomsoni m.

XESTOPHYA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 189 n. 2 [**Xestophyes**].
ξεστός, rasus; φυή, natura.

fallax Först. — ♀ — Eur.: Germania.
Xestophya fallax Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 28 n. 1, ♀.
montana Först. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Xestophya montana Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 28 n. 2, ♀.

ZETESIMA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 25 n. 2.
ζητήσιμος, ad inveniendum aptus.

rufipes Först. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Zetesima rufipes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 25, ♀.

SELEUCUS

Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 111 n. 24.
Seleucus, nom. propr.

cuneiformis Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Seleucus cuneiformis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. II. 2. 1858 P. 8. (Oph.) p. 111 n. 1, ♀.
Seleucus cuneiformis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIII. 1876 p. 25, ♀.
Seleucus cuneiformis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 179, ♀.
gillettei Ashm. — ♂ — Am.: Colorado.
Seleucus Gillettei Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 n. 206, ♂.
rufiventris Ashm. — ♀ — Am.: Michigan.
Seleucus rufiventris Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 207, ♀.

Sect. E. **Ichneumonoidae** m.

35. *Subfam.* **Phaeogeninae**

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 144 & 191.

PROSCUS

Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 420.
Nom. propr.

Synon.: Phaeogenes Wesmael & auct.

cephalotes (Wesm.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Gallia, Belgia, Germania.
Phaeogenes cephalotes Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 197 [n. 29, ♀♂.
Phaeogenes cephalotes Holmgren, Svensk. Vet.-Acad. Handl. LXXV. 1854 p. 47 n. 7, ♀.
Phaeogenes cephalotes Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 427 (Misc. p. 68) [n. 11, ♀.
Phaeogenes cephalotes Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 79 n. 12, ♀ ♂.
Proscus cephalotes Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 420 n. 1, ♀ ♂.
Phaeogenes (Proscus) cephalotes Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1651 n. 18, ♀ ♂.
Phaeogenes cephalotes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 381 n. 43, ♀♂.

elongatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Phaeogenes (Proscus) elongatus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1651 n. 20, ♀ ♂.

suspicax (Wesm.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania. [n. 33, ♀ ♂.
Phaeogenes suspicax Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 200
Phaeogenes suspicax Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 57, ♀.
Phaeogenes suspicax Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 147.
Phaeogenes suspicax Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 81, ♀ ♂.
Proscus suspicax Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 420 n. 2, ♀ ♂.
Phaeogenes (Proscus) suspicax Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1651 n. 19, ♀ ♂.
Phaeogenes suspicax Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 382 n. 45, ♀ ♂.

PHAEOGENES

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 166.
φαιός, fuscus; γίγνομαι, fio.

Synon.: Posocentrus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 273.
ποσός, aliquantus; κέντρον, aculeus.

Cryptus Gravenhorst.
Diadromus Brischke.
Ichneumon Gravenhorst.
Limerodes Bridgman & Fitch.
Phygadeuon Taschenberg.

acutus (Grav.) Wesm. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Ichneumon acutus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 598 n. 254, ♀.
Phaeogenes acutus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 74 n. 254.
Phaeogenes acutus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 81 n. 13, ♀.
Phaeogenes acutus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 385 n. 58, ♀.

amoenus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Belgia, Germania Russia, Hispania. [n. 27, ♀.
Phaeogenes amoenus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 196
Phaeogenes amoenus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 424 (Misc. p. 65) n. 8, ♂.
Phaeogenes amoenus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 56, ♀.
Phaeogenes amoenus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1655 n. 28, ♀ ♂.
Phaeogenes amoenus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 382 n. 48, ♀ ♂.

annulatipes Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phaeogenes annulatipes Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 43 n. 17, ♀.

aries Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Phaeogenes aries Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VI. P. 4. 1887 p. 87 n. 2, ♀.

ater Cress.[1]) — ♀ — Am.: United States.
Phaeogenes ater Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 202 n. 1, ♀.
Phaeogenes ater G. H. French, Papilio I. 1881 p. 106.
Phaeogenes ater Osborn, Papilio II. 1882 p. 72.
Phaeogenes ater Cook, Pract. Entom. 1884 p. 17; Fig.

austriacus (Grav.) Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Austria.
Cryptus Austriacus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 573 n. 104, ♀.
Phaeogenes Austriacus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 28, ♂.
Phygadeuon Austriacus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 31 n. 26, ♀.
Phaeogenes Austriacus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 55, ♂.
Phaeogenes Austriacus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 385 n. 59, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Aegeria tipuliformis, Ae. exitiosa (Cook).

balearicus Kriechb. — ♂ — Eur.: Mallorca.
Phaeogenes? Balearicus Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 241 n. 6, ♂.
bellicornis Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia, Belgia, Germania, Russia. [n. 11, ♀ ♂.
Phaeogenes bellicornis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 186
Phaeogenes bellicornis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 320 (Mant. p. 83), ♀ ♂.
Phaeogenes bellicornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 29, ♂.
Phaeogenes bellicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 56, ♀.
Phaeogenes bellicornis Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1655 n. 27, ♀ ♂.
Phaeogenes bellicornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 374 n. 16, ♀ ♂.
bellulus Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Mallorca.
Phaeogenes bellulus Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 241 n. 7, ♂.
Phaeogenes bellulus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 385 n. 62, ♀ ♂.
bicolor Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Phaeogenes bicolor Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 30, ♂.
bisignatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [p. 60) n. 1, ♀.
Phaeogenes scutellaris var. 1 Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 419 (Misc.
Phaeogenes bisignatus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 437 n. 8, ♀ ♂.
Phaeogenes bisignatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 372 n. 9, ♀ ♂.
bolivari Berth. — ♀ — Eur.: Hispania.
Phaeogenes Bolivari Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VIII. 1895 p. 162, ♀.
Phaeogenes Bolivari Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 384 n. 57, ♀.
callopus Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon stimulator var. 1-2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 145, ♀. [♀ ♂.
Phaeogenes callopus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 185 n. 8,
Phaeogenes callopus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 318 (Mant. p. 81), ♀ ♂.
Phaeogenes callopus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 420 (Misc. p. 61)
[n. 2, ♀ ♂.
Phaeogenes callopus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 28, ♀ ♂.
Phaeogenes callopus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 55, ♂.
Phaeogenes callopus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 79 n. 6, ♀ ♂.
Phaeogenes callopus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 449 n. 15, ♀ ♂.
Phaeogenes callopus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 59, ♂.
Phaeogenes callopus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1647 n. 8, ♀ ♂.
Phaeogenes callopus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 375 n. 20, ♀ ♂.
capitosus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia.
Phaeogenes capitosus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 462, ♀ ♂.
Phaeogenes capitosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 379 n. 37, ♀ ♂.
clypearis Brischke[2] — ♀ — Eur.: Germania, Russia.
Phaeogenes clypearis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 57, ♀.
Phaeogenes clypearis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 382 n. 46, ♀.
conciliator Wesm. — ♂ — Eur.: Britannia, Italia. [[excl. ♀].
Ichneumon opprimator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 355 n. 100, ♂
Ichneumon opprimator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 595 n. 252, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon opprimator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 203 n. 210, ♂
[excl. ♀].
Phaeogenes conciliator Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 73 n. 252,
Phaeogenes conciliator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 81 n. 11, ♂. [♂.
Phaeogenes conciliator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 386 n. 64, ♂.

---

[1] *Lep.:* Eriogaster lanestris (Bignell).
[2] *Lep.:* Psyche viciella, Eupithecia pimpinellaria (Brischke).

coryphaeus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Belgia, Germania. [n. 5, ♂.
Phaeogenes coryphaeus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 183
Phaeogenes versutus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 186 [n. 10, ♀ [excl. ♂].
Phaeogenes coryphaeus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 318 (Mant. p. 81), ♂.
Phaeogenes versutus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 319 (Mant. p. 82), ♀ ♂.
Phaeogenes versutus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 55, ♀.
Phaeogenes versutus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1647 n. 10, ♀ ♂.
Phaeogenes versutus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 375 n. 18, ♀ ♂.
crassidens Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phaeogenes crassidens Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1644 n. 4, ♀ ♂.
crassipes Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Phaeogenes crassipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 103 n. 7, ♀.
decoloratus Cress. — ♀ — Am.: United States.
Phaeogenes decoloratus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 203 n. 5, ♀.
discus Cress. — ♂ — Am.: United States.
Phaeogenes discus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 203 n. 6, ♂.
eques Wesm. — ♀ — Eur.: Suecia, Belgia, Gallia.
Phaeogenes eques Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 [Tent.] p. 194 n. 24, ♀.
Phaeogenes eques Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 324 (Mant. p. 87), ♀.
Phaeogenes eques Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1654 n. 28, ♀.
Phaeogenes eques Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 379 n. 35, ♀.
eupitheciae Brischke [1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania. [1879 p. 45, ♀ ♂.
Ichneumon (Phaeogenes) Eupitheciae Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3.
Phaeogenes Eupitheciae Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 380 n. 39, ♀ ♂.
exiguus Cress. [2]) — ♀ — Am.: Colorado.
Ichneumon exiguus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 182 n. 71, ♀.
Phaeogenes exiguus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 204 n. 7, ♀.
exilicornis Berth. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Phaeogenes exilicornis Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1899 p. 138 n. 60, ♀.
eximius Wesm. — ♀ — Eur.: Gallia, Germania, Hungaria. [n. 23, ♀.
Phaeogenes eximius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 193
Phaeogenes eximius Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1654 n. 27, ♀.
Phaeogenes eximius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 379 n. 34, ♀
falardeaui Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Phaeogenes Falardeaui Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 331 n. 10, ♀ ♂.
Phaeogenes Falardeaui Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 771 n. 10, ♀ ♂.
flavidens Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Belgia, Gallia, Germania. [n. 26, ♀ ♂.
Phaeogenes flavidens Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 195
Phaeogenes flavidens Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 424 (Misc. p. 65) [n. 7, ♀.
Phaeogenes flavidens Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 29, ♀ ♂.
Phaeogenes flavidens Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p 56, ♀ ♂.
Phaeogenes flavidens Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1650 n. 17, ♀ ♂.
Phaeogenes flavidens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 382 n. 47, ♀ ♂.
fulvitarsis Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Gallia, Belgia, Germania.
Ichneumon melanogonus var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 582, ♀.
Phaeogenes callopus var. b Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 185 n. 8, ♂.

---

1) *Lep.:* Eupithecia digitaliata (Brischke).
2) *Lep.:* Lophoderus velutinana (Walker).

Phaeogenes fulvitarsis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 185 [n. 8, ♀.
Phaeogenes fulvitarsis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 318 (Mant. p. 81), ♀.
Phaeogenes fulvitarsis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 29, ♀.
Phaeogenes fulvitarsis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 55, ♀♂.
Phaeogenes fulvitarsis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 80 n. 7, ♀ ♂.
Phaeogenes fulvitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1647 n. 9, ♀ ♂.
Phaeogenes fulvitarsis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 375 n. 17, ♀♂.

fungor Cress.[1] — ♂ — Am.: Connecticut, New York.
Ichneumon fungor (Norton) Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 306, ♂.
Phaeogenes fungor Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 204 n. 8, ♂.
Cryptus certus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 200.
Cryptus fungor Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 138 n. 19, ♂.
Cryptus fungor Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 337 n. 19, ♂.
Phaeogenes fungor Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 358.

fuscicornis Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Phaeogenes fuscicornis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 189 [n. 15, ♀.
Phaeogenes fuscicornis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 321 (Mant. p. 84), ♀.
Phaeogenes fuscicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 46 n. 5, ♀.
Phaeogenes fuscicornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 29, ♀.
Phaeogenes fuscicornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 207, ♀.
Phaeogenes fuscicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 56, ♀.
Phaeogenes fuscicornis Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 457 n. 21, ♀ ♂.
Phaeogenes fuscicornis Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1652 n. 23, ♀ ♂.
Phaeogenes fuscicornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 376 n. 24, ♀♂.

gaspesianus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phaeogenes Gaspesianus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 331 n. 8, ♀.
Phaeogenes Gaspesianus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 770 n. 8, ♀.

gelechiae Ashm.[2] — ♀ ♂ — Am.: New Hampshire.
Phaeogenes Gelechiae Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 392, ♀ ♂.

glaucus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Phaeogenes (Herpestomus) glaucus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 [p. 31, ♀.
Phaeogenes glaucus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 206.

gracilis Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Phaeogenes gracilis Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1898 p. 334 n. 46, ♀.

grammostoma Kriechb. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Phaeogenes grammostoma Kriechbaumer, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. 1887 p. 309, ♂.
Phaeogenes grammostoma Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 386 n. 65, ♂.

hariolus Cress. — ♀ — Am.: Massachusetts.
Ichneumon hariolus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 305, ♀.
Phaeogenes hariolus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 202 n. 2, ♀.

hebe Cress. — ♀ ♂ — Am.: Connecticut, Illinois.
Ichneumon Hebe Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 306, ♀ ♂.
Phaeogenes Hebe Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 203 n. 4, ♀.

hebrus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Connecticut, Illinois.
Ichneumon hebrus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 306, ♀ ♂.
Phygadeuon insignis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 179.
Phaeogenes hebrus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 203 n. 3, ♀ ♂.

---

[1] *Hymen.:* Lophyrus abietis (Cresson).
[2] *Lep.:* Gelechia gallae-solidaginis (Ashmead).

Phaeogenes hebrus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 38 n. 1, ♀ ♂.
Phaeogenes hebrus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 307 n. 1, ♀ ♂.
helvolus Cress. — ♀ — Am.: Connecticut, Pennsylvania, Illinois.
Ichneumon helvolus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 312, ♀.
Phaeogenes helvolus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 205 n. 12, ♀.
hemiteloides Ashm. — ♀ — Am.: Washington.
Phaeogenes hemiteloides Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 393, ♀.
heterogonus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Hispania.
Phaeogenes heterogonus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 431 n. 4, ♀ ♂.
Phaeogenes heterogonus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 372 n. 7, ♀ ♂.
hispanicus Berth. — ♀ — Eur.: Hispania.
Phaeogenes Hispanicus Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VIII. 1895 p. 161, ♀.
Phaeogenes Hispanicus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 381 n. 44, ♀.
histrio Wesm. — ♀ — Eur.: Belgia. [n. 22b, ♀.
Phaeogenes histrio Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 323 (Mant. p. 86)
Phaeogenes histrio Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 380 n. 38, ♀.
homochlorus Wesm. — ♀ — Eur.: Britannia, Belgia, Gallia. [p. 184 n. 7, ♀.
Phaeogenes homochlorus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.)
Phaeogenes homochlorus Billups, Trans. Entom. Soc. London 1883 Proc. p. III.
Phaeogenes homochlorus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 376 n. 23, ♀.
huartii Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Posocentrus Huarti Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 273.
Posocentrus Huarti Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 251, ♀.
Posocentrus Huarti Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 409, ♀.
Phaeogenes Huarti Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 359.
hyperboreus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phaeogenes hyperboreus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 454 n. 19, ♀ ♂.
Phaeogenes hyperboreus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 374 n. 13, ♀ ♂.
impiger Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Belgia, Germania. [♀ ♂.
Phaeogenes impiger Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 198 n. 30,
Phaogenes impiger Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 57, ♀.
Phaeogenes impiger Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 80, ♀.
Phaeogenes impiger Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1654 n. 26, ♀ ♂.
Phaeogenes impiger Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 384 n. 56, ♀ ♂.
impressus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Phaeogenes impressus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 104 n. 10, ♀.
infimus Wesm. — ♀ — Eur.: Suecia, Belgia, Germania.
Phaeogenes infimus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 191
Phaeogenes infimus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1653 n. 25. [n. 18, ♀.
Phaeogenes infimus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 377 n. 27, ♀.
ischiomelinus (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon ischiomelinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 608 n. 259, ♂ [excl. var. 1].
Phaeogenes ischiomelinus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.)
[p. 192 n. 21, ♀ ♂.
Phaeogenes ischiomelinus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 416 n. 66, ♀.
Phaeogenes ischiomelinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 47 n. 6, ♀ ♂.
Phaeogenes ischiomelinus Brischke, Schrift. phys.-ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 29, ♀ ♂.
Phaeogenes ischiomelinus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 56, ♀ ♂.
Phaeogenes ischiomelinus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 80 n. 10, ♀ ♂.
Phaeogenes ischiomelinus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 456 n. 20, ♀ ♂.

Phaeogenes ischiomelinus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1651 n. 26, ♀ ♂.
Phaeogenes ischiomelinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 379 n. 33, ♀ ♂.
jucundus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Belgia. [n. 25, ♀.
Phaeogenes jucundus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 194
Phaeogenes jucundus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 444 n. 12, ♀ ♂.
Phaeogenes jucundus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 383 n. 49, ♀ ♂.
juvenilis Wesm. — ♂ — Eur.: Belgia. [n. 9b, ♂.
Phaeogenes juvenilis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 319 (Mant. p. 82)
Phaeogenes juvenilis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 386 n. 63, ♂.
lascivus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Helvetia, Russia. [n. 10, ♂.
Phaeogenes lascivus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 426 (Misc. p. 67)
Phaeogenes lascivus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 459 n. 22, ♀ ♂.
Phaeogenes lascivus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 104 n. 9, ♂.
Phaeogenes lascivus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 378 n. 29, ♀ ♂.
levigatus Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Ichneumon laevigatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 176 n. 61, ♀.
Phaeogenes laevigatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 205 n. 13, ♀.
limatus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Belgia.
Phaeogenes limatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 187
Phaeogenes limatus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1654 n. 25, ♀ ♂. [n. 12, ♀.
Phaeogenes limatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 375 n. 19, ♀.
luteicornis Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Phaeogenes luteicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 103 n. 8, ♀.
martialis Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Phaeogenes martialis Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1899 p. 9, ♀.
melanogaster Holmgr. — ♀ ♂ — Am.: Patagonia.
Phaeogenes melanogaster Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 396 n. 12, ♀ ♂.
melanogonus (Gmel.) Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 67 n. 306.
Ichneumon melanogonus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2709 n. 357.
Ichneumon melanogonus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 354 n. 99, ♀.
Ichneumon melanogonus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 581 n. 245, ♀ [excl. varr.].
Ichneumon mutabilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 599 n. 255, ♂ [p. p.].
Ichneumon melanogonus Gravenhorst, Beitr. z. Entom. Schles. I. 1829 p. 3 n. 2, ♀; T. 1 F. 4.
Ichneumon melanogonus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 202 n. 206.
Ichneumon melanogonus Audouin, Hist. nat. Insect. nuis. 1842 p. 178; T. 17 F. 1.
Phaeogenes melanogonus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 182 n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon melanogonus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 414 n. 65.
Phaeogenes melanogonus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 317 (Mant. [p. 80), ♀ ♂.
Phaeogenes melanogona Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 46 n. 3, ♀ ♂.
Phaeogenes melanogonus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 95.
Phaeogenes melanogonus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 28, ♀ ♂.
Phaeogenes melanogonus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 54, ♀ ♂.
Phaeogenes melanogonus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 80 n. 3, ♀ ♂.
Phaeogenes melanogonus Holmgren, Ichneum. Sue. III. 1890 p. 434 n. 7, ♀ ♂.
Phaeogenes melanogonus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1645 n. 5, ♀ ♂.
Phaeogenes melanogonus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 371 n. 3, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Anecta pollinaria (Taschenberg), Depressaria nervosa (Wollaston).

var. **mutabilis** (Grav.) Holmgr. — ♂ — Eur.
Ichneumon mutabilis var. 2-6 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 599 n. 255, ♂.
Phaeogenes melanogonus var. mutabililis Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 435, ♂.
var. **protervus** Wesm. — ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 12, ♂.
Phaeogenes protervus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 427 (Misc. p. 68)
Phaeogenes protervus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 28, ♂.
Phaeogenes protervus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 207, ♂.
Phaeogenes protervus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 55, ♂.
Phaeogenes melanogonus var. protervus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 435.
mellinus (Prov.) Cress. — ♀ — Am.: Canada, Massachusetts.
Phygadeuon mellinus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 315.
Phaeogenes mellinus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 205 n. 14, ♀.
Phaeogenes mellinus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 39 n. 3, ♀.
Phaeogenes mellinus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 308 n. 3, ♀.
minutus Wesm. — ♀ — Eur.: Germania. [n. 19, ♀.
Phaeogenes minutus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 191
Phaeogenes minutus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 377 n. 28, ♀.
missouriensis Ashm. — ♀ — Am.: Missouri.
Phaeogenes Missouriensis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 393, ♀.
modestus Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Belgia, Gallia. [n. 22, ♀.
Phaeogenes modestus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 193
Phaeogenes modestus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 323 (Mant. p. 86), ♀.
Phaeogenes modestus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 336.
Phaeogenes modestus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1652 n. 21, ♀ ♂.
Phaeogenes modestus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 379 n. 36, ♀ ♂.
montanus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Bohemia.
Phaeogenes montanus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1652 n. 22, ♀ ♂.
montivagus Ashm. — ♂ — Am.: Colorado.
Phaeogenes montivagus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XIII. 1890 p. 394, ♂.
muricifer Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia.
Phaeogenes muricifer Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 440 n. 10, ♀ ♂.
Phaeogenes muricifer Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 373 n. 12, ♀ ♂.
mysticus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia. [n. 3, ♂.
Phaeogenes mysticus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 421 (Misc. p. 62)
Phaeogenes tetricus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 422 (Misc. p. 63)
[n. 4, ♀.
Phaeogenes mysticus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 29, ♂.
Phaeogenes mysticus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 207, ♂.
Phaeogenes tetricus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 55, ♀.
Phaeogenes mysticus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 453 n. 18, ♀ ♂.
Phaeogenes tetricus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1650 n. 16, ♀ ♂.
Phaeogenes tetricus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 376 n. 22, ♀.
Phaeogenes mysticus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 386 n. 67, ♂.
nanus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Phaeogenes nanus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 190 n. 17, ♀.
Phaeogenes nanus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 321 (Mant. p. 84), ♀.
Phaeogenes nanus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 81, ♀.
Phaeogenes nanus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1655 n. 29, ♀ ♂.
Phaeogenes nanus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 377 n. 25, ♀.

---

[1] *Lep.:* Euchromia flammea (Fletcher).

nigratus Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Phaeogenes nigratus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 30, ♂.
nigricornis Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Phaeogenes nigricornis Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 330 n. 7, ♂.
Phaeogenes nigricornis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 770 n. 7, ♂.
nigridens Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia, Belgia, Germania.
Phaeogenes nigridens Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 192 [n. 20, ♀.
Phaeogenes nigridens Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 (Mant. p. 85) p. 322, ♀ ♂.
Phaeogenes nigridens Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 29, ♀ ♂.
Phaeogenes nigridens Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 56, ♂.
Phaeogenes nigridens Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 432 n. 3, ♀ ♂.
Phaeogenes nigridens Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1644 n. 3, ♀ ♂.
Phaeogenes nigridens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 371 n. 4, ♀ ♂.
nitidiventris Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Gallia.
Phaeogenes nitidiventris Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 452 n. 17, ♀ ♂.
Phaeogenes nitidiventris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 374 n. 14, ♀ ♂.
nitidus Bridgm. — ♂ — Eur.: Britannia.
Phaeogenes nitidus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1886 p. 337, ♂.
Phaeogenes nitidus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 387 n. 68, ♂.
ophthalmicus Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Phaeogenes ophthalmicus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 186 [n. 14, ♀ (♂?).
Phaeogenes ophthalmicus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 320 (Mant. [p. 83), ♀ ♂.
Phaeogenes ophthalmicus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 46 n. 4, ♀.
Phaeogenes hybridus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 428 (Misc. p. 69) [n. 13, ♂.
Phaeogenes ophthalmicus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 56, ♀ ♂.
Phaeogenes ophthalmicus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 80 n. 8, ♀ ♂.
Phaeogenes ophthalmicus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 439 n. 9, ♀ ♂.
Phaeogenes ophthalmicus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1646 n. 7, ♀ ♂.
Phaeogenes ophthalmicus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXI. 1895 p. 112, ♀ ♂.
Phaeogenes ophthalmicus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 373 n. 11, ♀ ♂.
phycidis Ashm.[1] — ♀ — Am.: New Hampshire.
Phaeogenes Phycidis Ashmead, Proc. Entom. Soc. Washington IV. 1897 p. 169 n. 57, ♀.
picii Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Phaeogenes Pici Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 378 n. 31, ♀.
planifrons Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon mutabilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 599, ♂ [p. p.].
Phaeogenes planifrons Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 182 [n. 2, ♀ ♂.
Phaeogenes planifrons Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 317 (Mant. [p. 80), ♀ ♂.
Phaeogenes planifrons Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 45 n. 2, ♀ ♂.
Phaeogenes planifrons Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 28, ♀ ♂.
Phaeogenes planifrons Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 54, ♂.
Phaeogenes planifrons Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 80 n. 2, ♀ ♂.
Phaeogenes planifrons Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1891 p. 433 n. 6, ♀ ♂.
Phaeogenes planifrons Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1644 n. 2, ♀ ♂.
Phaeogenes planifrons Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 371 n. 2, ♀ ♂.

---

[1] *Lep.:* Phycis rubrifasciata (Ashmead).

planipectus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia.
Phaeogenes planipectus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 430 n. 3, ♀ ♂.
Phaeogenes planipectus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 372 n. 6, ♀ ♂.
pulchricornis Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Phaeogenes pulchricornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 59, ♀.
quadriceps Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Connecticut.
Ichneumon quadriceps Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 312, ♀ ♂.
Phaeogenes quadriceps Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 204 n. 9, ♀ ♂.
Phaeogenes quadriceps Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 332 n. 12, ♂.
Phaeogenes quadriceps Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 771 n. 12, ♂.
recticaudus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phaeogenes recticaudus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 42 n. 14, ♀.
rubicundus Berth. — ♀ — Afr.: Algeria.
Phaeogenes rubicundus Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VIII. 1895 p. 161, ♀.
Phaeogenes rubicundus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 384 n. 54, ♀.
rubripictus Wesm. — ♀ — Eur.: Gallia.
Phaeogenes rubripictus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 416 (Ot. p. 65) n. 1, ♀.
Phaeogenes rubripictus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 381 n. 41, ♀.
ruficornis Ashm. — ♀ — Am.: St. Louis.
Phaeogenes ruficornis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 394, ♀.
ruficoxa Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phaeogenes ruficoxa Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1648 n. 11, ♀ ♂.
rufipes Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Phaeogenes rufipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 59, ♂.
rusticatus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Belgia, Helvetia.
Ichneumon melanogonus var. 6 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 581, ♀. [♀.
Phaeogenes rusticatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 188 n. 13,
Phaeogenes rusticatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 320 (Mant. p. 83), ♀.
Phaeogenes callopus var. 2 Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 420 (Misc. [p. 61) n. 2, ♂.
Phaeogenes rusticatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 29, ♀.
Phaeogenes rusticatus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 450 n. 16, ♀ ♂.
Phaeogenes rusticatus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1648 n. 12, ♀ ♂.
Phaeogenes rusticatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 374 n. 15, ♀ ♂.
scutellaris Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Belgia, Gallia, Germania. [n. 4, ♀.
Phaeogenes scutellaris Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 183
Phaeogenes scutellaris Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 419 (Misc. [p. 60) n. 1, ♀.
Phaeogenes scutellaris Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 417 (Ot. p. 66) n. 2, ♂.
Phaeogenes scutellaris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 54, ♀.
Phaeogenes scutellaris Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 80 n. 4, ♀.
Phaeogenes scutellaris Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1649 n. 13, ♀ ♂.
Phaeogenes scutellaris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 372 n. 8, ♀ ♂.
sectus Prov. — ♂ — Am.: Vancouvers Island.
Phaeogenes sectus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 358, ♂.
semivulpinus (Grav.) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon semivulpinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 565 n. 238, ♀ [p. p.].
Ichneumon melanogonus var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 581.
Ichneumon mutabilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 599, ♂.

---

1) *Lep.:* Tortrix rosaria (Bridgman), Euchromia rufina (Rondani).

Ichneumon semivulpinus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 199 n. 198, ♀ [p. p.].
Phaeogenes primarius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 181 [n. 1, ♀ ♂.
Phaeogenes primarius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 316 (Mant. p. 79), ♀ ♂.
Phaeogenes semivulpinus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 317 (Mant. [p. 80), ♀ ♂.
Phaeogenes semivulpinus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 45 n. 1, ♀ ♂.
Phaeogenes semivulpinus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 27, ♀ ♂.
Phaeogenes semivulpinus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 53, ♂.
Phaeogenes semivulpinus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 80 n. 1, ♀ ♂.
Phaeogenes semivulpinus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 427 n. 1, ♀ ♂.
Phaeogenes semivulpinus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1643 n. 1, ♀ ♂.
Phaeogenes semivulpinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 370 n. 1, ♀ ♂.

septentrionalis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia.
Phaeogenes septentrionalis Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 445 n. 13, ♀ ♂.
Phaeogenes septentrionalis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 383 n. 50, ♀ ♂.

sesiae Mocs.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Phaeogenes Sesiae Mocsáry, Magy. Tud. Akad. Math. & Termész. Közlem. XX. P. 2. 1885 [p. 135 n. 202, ♀ ♂.
Phaeogenes Sesiae Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 381 n. 42, ♀ ♂.

similis Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Phaeogenes similis Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 148, ♀; T. 8 F. 4.
Phaeogenes similis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 79, ♀ ♂.

socialis (Ratzbg.) Brischke[2] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon discoidalis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 167 n. 18, ♀.
Ichneumon socialis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 167 n. 19, ♂.
Diadromus discoidalis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 35, ♀.
Diadromus socialis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 35, ♀ ♂.
Phaeogenes discoidalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 57, ♀.
Phaeogenes socialis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 57, ♀ ♂.
Phaeogenes socialis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 383 n. 51, ♀ ♂.

socius Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Phaeogenes socius Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 461 n. 23, ♀ ♂.
Phaeogenes socius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 378 n. 30, ♀ ♂.

solers Wesm. — ♂ — Eur.: Germania.
Phaeogenes solers Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 425 (Misc. p. 66) n. 9, ♂.
Phaeogenes solers Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 386 n. 66, ♂.

spiniger (Grav.) Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Helvetia.
Ichneumon spiniger Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 142 n. 20, ♀.
Ichneumon spiniger Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 11 n. 14.
Phaeogenes spiniger Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 28, ♀.
Ichneumon spiniger Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 247 n. 20, ♀.
Phaeogenes spiniger Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 54, ♀ ♂.
Phaeogenes spiniger Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1649 n. 14.
Phaeogenes spiniger Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 373 n. 10, ♀ ♂.

var. **bacilliger** Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Phaeogenes bacilliger Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 10 n. 42, ♀.
Phaeogenes bacilliger Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 296 n. 54, ♀.
Phaeogenes spiniger var. bacilliger Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 373, ♀.

---

1) *Lep.:* Sesia asiliformis (Mocsáry).

2) *Lep.:* Psyche viciella, P. nitidella (Ratzeburg).

stimulator (Grav.) Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon stimulator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 143 n. 21, ♀ ♂ [excl. var. 1 & 2].
Ichneumon stimulator Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 9 n. 9.
Ichneumon stimulator Gravenhorst, Beitr. z. Entom. Schles. I. 1829 p. 1 n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon stimulator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 135 n. 25.
Ichneumon stimulator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 134 n. 9, ♀ ♂.
Phaeogenes stimulator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 184 [n. 6, ♀ ♂.
Phaeogenes stimulator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 318 (Mant. p. 81), ♀ ♂.
Phaeogenes stimulator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 28, ♀.
Ichneumon stimulator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 248 n. 21, ♀ ♂.
Phaeogenes stimulator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 79 n. 5, ♀ ♂.
Phaeogenes stimulator Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 447 n. 14, ♀ ♂.
Phaeogenes stimulator Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1649 n. 15, ♀ ♂.
Phaeogenes stimulator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 376 n. 21, ♀ ♂.

stipator Wesm.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania. [n. 5, ♀.
Phaeogenes stipator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 422 (Misc. p. 63)
Phaeogenes jucundus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 423 (Misc. p. 65) [n. 6, ♂ [non 1844].
Ichneumon Cambriensis Desvignes, Entom. M. Magaz. IV. 1867 p. 130, ♂.
Phaeogenes stipator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 54, ♀.
Phaeogenes cicutella (Siebold) Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 56,
Limerodes Cambrensis Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 60 n. 2, ♂. [♀ ♂.
Phaeogenes stipator Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 442 n. 11, ♀ ♂.
Phaeogenes stipator Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1645 n. 6.
Phaeogenes stipator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 378 n. 32, ♀ ♂.

subuliferus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Phaeogenes subuliferus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 429 n. 2, ♀.
Phaeogenes subulifer Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1656 n. 31, ♀.
Phaeogenes subuliferus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 371 n. 5, ♀.

tegularis Thoms. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Phaeogenes tegularis Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1656 n. 30, ♀.

tenuis Berth. — ♀ — Eur.: Alpes maritimae.
Phaeogenes tenuis Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1899 p. 138 n. 58, ♀.

trepidus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Belgia. [n. 16, ♀.
Phaeogenes trepidus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 190
Phaeogenes trepidus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 81, ♀.
Phaeogenes trepidus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1653 n. 24, ♀ ♂.
Phaeogenes trepidus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 377 n. 26, ♀.

trochanteratus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Phaeogenes trochanteratus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 31, ♀.
Phaeogenes trochanteratus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 207, ♀.

umbripennis Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Phaeogenes umbripennis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 60, ♂.

vafer Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Belgia, Germania, Russia.
Phaeogenes vafer Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 198 n. 31, ♀.
Phaeogenes vafer Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 325 (Mant. p. 88), ♀ ♂.
Phaeogenes vafer Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 384 n. 55.

---

1) *Lep.:* Tortrix viridana (Holmgren), Hyponomeuta padella (Bridgman).
2) *Lep.:* Orthotelia sparganella (Fletcher).

vagus Berth. — ♀ — Eur.: Alpes maritimae.
Phaeogenes vagus Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1899 p. 138 n. 59, ♀.
variabilis Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Phaeogenes variabilis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 30, ♀.
vincibilis Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Ichneumon vincibilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 312, ♀.
Phaeogenes vincibilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 204 n. 10, ♀.
walshiae Ashm.[1] — ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Phaeogenes Walshiae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 205, ♀ ♂.
xanthopygus Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Phaeogenes xanthopygus Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1898 p. 334 n. 46, ♀.

MEVESIA

Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 418.
Etymol. obscura.

Synon.: Diadromus Wesmael, Berthoumieu.
Phaeogenes Wesmael.

alternans (Wesm.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Belgia.
Phaeogenes (Diadromus) alternans Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 [(Tent.) p. 196 n. 28, ♀.
Phaeogenes (Diadromus) alternans Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 324 [(Mant. p. 87), ♀ ♂
Mevesia alternans Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1629 n. 2, ♀ ♂.
Diadromus alternans Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 358 n. 9, ♀ ♂.
argutus (Wesm.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Phaeogenes argutus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 201 [n. 34, ♀ ♂.
Phaeogenes argutus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 326 (Mant. p. 89), ♀ ♂.
Phaeogenes argutus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 57, ♂.
Mevesia arguta Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 418 n. 1, ♀ ♂.
Mevesia arguta Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1629 n. 1, ♀ ♂.
Phaeogenes argutus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 383 n. 52, ♀ ♂.

NOTOSEMUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 194 n. 27.
νῶτος, dorsum; *σῆμα*, signum.

Synon.: Ischnidium Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 351.
Ischnus, nom. propr. Hymen.
Ischnogaster Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 153 [nec Guérin].
ἰσχνός, macer; *γαστήρ*, venter.
Phaeogenes Wesmael, Brischke.

albibucca (Kriechb.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Ischnogaster albibucca Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 154.
Ischnidium albibuccum Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 351.
Notosemus albibucca Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1627.
Ischnogaster albibucca Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 388, ♀ ♂.
bohemanii (Wesm.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Phaeogenes Bohemani Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 429 (Misc. p. 70) [n. 14, ♀.
Notosemus dives Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VI. P. 4. 1888 p. 88 n. 3, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Walshia amorphilla (Ashmead).

Notosemus Bohemani Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 405 n. 1, ♀.
Phaeogenes Bohemani Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 104 n. 10.
Phaeogenes (Notosemus) Bohemani Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. [1892 p. 31, ♀♂.
Phaeogenes Bohemani Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 380 n. 40, ♀.

BAEOSEMUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 194 n. 26.
βαιός, minutus; σῆμα, signum.

Synon.: Baeosomus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1614.
Ichneumon Gravenhorst.
Phaeogenes Wesmael, Bridgman & Fitch, Berthoumieu.

aenescens Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Baeosomus aenescens Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1615 n. 2, ♀.
mitigosus (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ichneumon mitigosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 604 p. 257, ♂.
Ichneumon mitigosus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 204 n. 214.
Phaeogenes mitigosus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 74 n. 256.
Phaeogenes mitigosus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 81 n. 9, ♂.
Baeosemus mitigosus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 424 n. 1, ♀ ♂.
Baeosomus mitigosus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1614 n. 1, ♀ ♂.
Phaeogenes mitigosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 385 n. 60, ♀ ♂.
vulpecula Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Baeosemus vulpecula Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 426 n. 2, ♀.
Phaeogenes vulpecula Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 385 n. 61, ♀.

NEMATOMICRUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 166.
Nematus, nom. propr. Hymen.; νῆμα, filum; μικρός, parvus.

coloradensis Ashm. — ♀ — Am.: Colorado.
Nematomicrus Coloradensis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 395, ♀.
tenellus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Nematomicrus tenellus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 179 [n. 1, ♀♂.
Nematomicrus tenellus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 14 n. 1, ♀ ♂.
Nematomicrus tenellus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1613 n. 1, ♀ ♂.
Nematomicrus tenellus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 387, ♀ ♂.

ANOPIESTA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 193 n. 24.
ἄνω, sursum; πιεστός, pressus.
Species exstat.

ERIPLATYS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 193 n. 23.
ἐρι, valde; πλατύς, latus.

Synon.: Herpestomus Wesmael, Brischke, Holmgren.

ardeicollis (Wesm.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Herpestomus ardeicollis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 173 [n. 8, ♀.

vagus Berth. — ♀ — Eur.: Alpes maritimae.
Phaeogenes vagus Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1899 p. 138 n. 59, ♀.
variabilis Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Phaeogenes variabilis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 30, ♀.
vincibilis Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Ichneumon vincibilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 312, ♀.
Phaeogenes vincibilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 204 n. 10, ♀.
walshiae Ashm.[1] — ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Phaeogenes Walshiae Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 205, ♀ ♂.
xanthopygus Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Phaeogenes xanthopygus Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1898 p. 334 n. 46, ♀.

MEVESIA

Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 418.
Etymol. obscura.

Synon.: Diadromus Wesmael, Berthoumieu.
Phaeogenes Wesmael.

alternans (Wesm.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Belgia.
Phaeogenes (Diadromus) alternans Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 [(Tent.) p. 196 n. 28, ♀.
Phaeogenes (Diadromus) alternans Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 324 [(Mant. p. 87), ♀ ♂
Mevesia alternans Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1629 n. 2, ♀ ♂.
Diadromus alternans Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 358 n. 9, ♀ ♂.
argutus (Wesm.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Phaeogenes argutus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 201 [n. 34, ♀ ♂.
Phaeogenes argutus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 326 (Mant. p. 89), ♀ ♂.
Phaeogenes argutus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 57, ♂.
Mevesia arguta Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 418 n. 1, ♀ ♂.
Mevesia arguta Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1629 n. 1, ♀ ♂.
Phaeogenes argutus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 383 n. 52, ♀ ♂.

NOTOSEMUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 194 n. 27.
νῶτος, dorsum; σῆμα, signum.

Synon.: Ischnidium Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 351.
Ischnus, nom. propr. Hymen.
Ischnogaster Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 153 [nec Guérin].
ἰσχνός, macer; γαστήρ, venter.
Phaeogenes Wesmael, Brischke.

albibucca (Kriechb.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Ischnogaster albibucca Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 154.
Ischnidium albibuccum Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 351.
Notosemus albibucca Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1627.
Ischnogaster albibucca Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 388, ♀ ♂.
bohemanii (Wesm.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Phaeogenes Bohemani Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 429 (Misc. p. 70) [n. 14, ♀.
Notosemus dives Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VI. P. 4. 1888 p. 88 n. 3, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Walshia amorphilla (Ashmead).

Notosemus Bohemani Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 405 n. 1, ♀.
Phaeogenes Bohemani Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 104 n. 10.
Phaeogenes (Notosemus) Bohemani Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. [1892 p. 31, ♀♂.
Phaeogenes Bohemani Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 380 n. 40, ♀.

BAEOSEMUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 194 n. 26.
βαιός, minutus; σῆμα, signum.

Synon.: Baeosomus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1614.
Ichneumon Gravenhorst.
Phaeogenes Wesmael, Bridgman & Fitch, Berthoumieu.

aenescens Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Baeosomus aenescens Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1615 n. 2, ♀.
mitigosus (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ichneumon mitigosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 604 p. 257, ♂.
Ichneumon mitigosus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 204 n. 214.
Phaeogenes mitigosus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 74 n. 256.
Phaeogenes mitigosus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 81 n. 9, ♂.
Baeosemus mitigosus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 424 n. 1, ♀ ♂.
Baeosomus mitigosus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1614 n. 1, ♀ ♂.
Phaeogenes mitigosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 385 n. 60, ♀ ♂.
vulpecula Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Baeosemus vulpecula Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 426 n. 2, ♀.
Phaeogenes vulpecula Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 385 n. 61, ♀.

NEMATOMICRUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 166.
Nematus, nom. propr. Hymen.; νῆμα, filum; μικρός, parvus.

coloradensis Ashm. — ♀ — Am.: Colorado.
Nematomicrus Coloradensis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 395, ♀.
tenellus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Nematomicrus tenellus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 179 [n. 1, ♀♂.
Nematomicrus tenellus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 14 n. 1, ♀ ♂.
Nematomicrus tenellus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1613 n. 1, ♀ ♂.
Nematomicrus tenellus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 387, ♀ ♂.

ANOPIESTA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 193 n. 24.
ἄνω, sursum; πιεστός, pressus.
Species exstat.

ERIPLATYS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 193 n. 23.
ἔρι, valde; πλατύς, latus.

Synon.: Herpestomus Wesmael, Brischke, Holmgren.

ardeicollis (Wesm.) Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Herpestomus ardeicollis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 173 [n. 8, ♀.

Herpestomus ardeicollis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 25, ♀.
Herpestomus ardeicollis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 53, ♀.
Herpestomus ardeicollis Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 380 n. 3, ♀.
Herpestomus ardeicollis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 103 n. 2, ♂.
Eriplatys ardeicollis Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1616 n. 1, ♀.
Herpestomus ardeicollis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 351 n. 9, ♀.

POECILOSTICTUS

Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 1852 p. 174 n. 38.
ποικίλος, varius; στικτός, punctus.

octopunctatus Ratzbg.[1] — ♀ — Eur.: Germania.
Poecilostictus octopunctatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 174 n. 1, ♀; Fig.
ratzeburgii Kaw.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Poecilostictus Ratzeburgii Kawall, Bull. soc. natural. Moscou XLI. P. 4. 1868 p. 503 n. 1, ♀ ♂.

CENTETERUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 165.
κεντητήριον, id quo pungimus.

Synon.: Euryptilus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 375.
εὐρύς, latus; πτίλον, pluma.

Ichneumon Gravenhorst, Stephens.
Phaeogenes Cresson.
Phygadeuon Provancher.

canadensis Harrgt. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Centeterus Canadensis Harrington, Canad. Entomol. XX. 1894 p. 210, ♀.
confector (Grav.) Wesm.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ichneumon confector Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 579 n. 243, ♀.
Ichneumon confector Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 201 n. 204, ♀.
Centeterus picticollis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 177 n. 2, ♀.
Centeterus confector Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 70 n. 243, ♀.
Centeterus confector Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 27, ♀.
Centeterus confector Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 207, ♂.
Centeterus confector Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 53, ♀ ♂.
Centeterus confector Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 14 n. 3, ♀ ♂.
Centeterus confector Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 373 n. 2, ♀ ♂.
Centeterus confector Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1638 n. 3, ♀ ♂.
Centeterus confector Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 338 n. 3, ♀ ♂.
elongator Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Hungaria.
Centeterus elongator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 337 n. 1, ♀ ♂.
grandiceps Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Centeterus grandiceps Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1638 n. 5, ♀ ♂.
kriechbaumeri (Holmgr.) Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Euryptilus Kriechbaumeri Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 375 n. 1, ♀ ♂.
Centeterus Kriechbaumeri Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 339 n. 4, ♀.

---

1) *Lep.:* Fidonia piniaria (Ratzeburg).
2) *Lep.:* Fidonia piniaria (Kawall).
3) *Lep.:* Nonagria geminipuncta (Brischke).

major Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Centeterus major Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 177 n. 1, ♀ ♂.
Centeterus major Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 27, ♂.
Centeterus major Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 53, ♀ ♂.
Centeterus major Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 14 n. 1, ♀ ♂.
Centeterus major Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 372 n. 1, ♀ ♂.
Centeterus major Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1638 n. 2, ♀ ♂.
Centeterus major Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 338 n. 2, ♀ ♂.

nigricornis Thoms. — ♀ — Eur.: Gallia.
Centeterus nigricornis Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1638 n. 1, ♀.

opprimator (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ichneumon opprimator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 355 n. 100, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon opprimator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 595 n. 252, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon opprimator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 203 n. 210, ♀ [excl. ♂].
Centeterus opprimator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 178 n. 3, ♀ ♂.
Centeterus opprimator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 45 n. 1, ♀.
Centeterus opprimator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 53, ♂.
Centeterus opprimator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 14 n. 2, ♂.
Centeterus opprimator Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 374 n. 3, ♀ ♂.
Centeterus opprimator Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1638 n. 4, ♀ ♂.
Centeterus confector var. opprimator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 339, ♀ ♂.

tuberculifrons Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Phygadeuon tuberculifrons Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 284.
Phaeogenes tuberculifrons Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 205 n. 11, ♀ ♂.
Phaeogenes tuberculifrons Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 39 n. 2, ♀ ♂.
Phaeogenes tuberculifrons Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 308 n. 2, ♀ ♂.
Centeterus tuberculifrons Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 358.

EPARCES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 193 n. 21.
ἐπάρκεσις, auxilium.
Species exstat.

MICROPE

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 193 n. 20.
Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1627.
μικρόπος, parvos pedes habens.

Synon.: Phaeogenes Wesmael, Brischke, Berthoumieu.

macilenta (Wesm.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Belgia, Gallia, Russia.
Phaeogenes macilentus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 199 n. 32, ♀.
Phaeogenes macilentus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 325 (Mant. p. 88), ♀ ♂.
Phaeogenes macilentus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 29, ♂.
Micrope macilenta Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1628.
Phaeogenes macilentus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 384 n. 53, ♀ ♂.

---

1) *Lep.*: Sesia hylaeiformis (Brischke).

DELOGLYPTUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 193 n. 19.
Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1622.
δῆλος, manifestus; *γλυπτός*, sculptus.

punctiventris Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Deloglyptus punctiventris Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1623 n. 1, ♀.

HOLOCREPIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 193 n. 18.
ὅλος, totus; *κρηπίς*, crepida.

Species exstat.

DICAELOTUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 165.
δίς, bis; *κοιλότης* cavitas.

Synon.: Cinxaelotus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1620 [forse Holmgren].
κιξαλλεία, latrocinium.
Dicoelus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 165.
δίς, bis; *κοῖλος*, cavus.
Ichneumon Gravenhorst, Stephens, Ratzeburg, Taschenberg.
Phaeogenes Destefani.
Phygadeuon Provancher.

acaudus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon acaudus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 358 n. 45, ♀.
Phygadeuon acaudus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 780 n. 45, ♀.
Dicaelotus acaudus Davis, Proc. acad. Sc. Philadelphia 1894 p. 186.
andrei Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Dicaelotus Andrei Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 343 n. 8, ♀.
annellatus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Dicaelotus (Cinxaelotus) annellatus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1621 n. 8, ♀.
cameronii Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania; Afr.: Algeria.
Dicaelotus Cameroni Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 146, ♀; T. 8 F. 3.
Dicaelotus Cameroni Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 13.
Dicaelotus Cameroni Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 363 n. 2, ♀.
Dicaelotus Cameroni Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1619 n. 2, ♀ ♂.
Dicaelotus Cameroni Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 342 n. 5, ♀.
crassifemur Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Dicaelotus (Cinxaelotus) crassifemur Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1620 n. 6, ♀ ♂.
gravis (Grav.) Wesm. — ♀ — Eur.: Austria.
Ichneumon gravis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 588 n. 247, ♀.
Dicaelotus gravis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 71 n. 247.
Dicaelotus gravis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1816 p. 343 n. 9, ♀.
inflexus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Dicaelotus inflexus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1619 n. 4, ♀ ♂.
montanus (Dest.) Berth. — ♀ — Eur.: Sicilia.
Phaeogenes montanus Destefani, Natural. Sicil. IV. 1885 p. 187 n. 6, ♀.
Dicaelotus montanus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 341 n. 3, ♀.

morosus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [n. 3, ♀.
Dicaelotus morosus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 418 (Misc. p. 59)
Dicaelotus morosus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 364 n. 3, ♀ ♂.
Dicaelotus morosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 103 n. 5, ♂.
Dicaelotus morosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 343 n. 10, ♀ ♂.

orbitalis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Dicaelotus orbitalis Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1621 n. 9, ♀.

parvulus (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ichneumon parvulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 591 n. 250, ♀.
Ichneumon parvulus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 203 n. 209, ♀.
Dicaelotus parvulus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 72 n. 250, ♀.
Dicaelotus parvulus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 13 n. 3, ♀.
Dicaelotus parvulus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 365 n. 5, ♀ ♂.
Dicaelotus (Cinxaelotus) parvulus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1621 n. 7, ♀ ♂.
Dicaelotus parvulus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 342 n. 7, ♀.

picii Berth. — ♀ — Afr.: Algeria.
Dicaelotus Pici Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 340 n. 2, ♀.

pumilus (Grav.) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon pumilus Gravenhorst, Ichneum Europ. I. 1829 p. 152 n. 26, ♀.
Ichneumon pumilus Gravenhorst, Monita spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 11 n. 18.
Ichneumon pumilus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 138 n. 31.
Dicaelotus pumilus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 175 n. 1, ♀.
Dicoelotus pumilus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 315 (Mant. p. 78), ♀ ♂.
Dicaelotus pumilus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 43 (Adn. p. 11), ♀ ♂.
Dicaelotus pumilus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 26, ♀ ♂ [var. ♀].
Dicaelotus pumilus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 206, ♀ ♂.
Ichneumon pumilus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 255 n. 26, ♀.
Dicaelotus pumilus Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 182 n. 39, ♂.
Dicaelotus pumilus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 53, ♂.
Dicaelotus pumilus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 13 n. 1, ♀ ♂.
Dicaelotus pumilus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 361 n. 1, ♀ ♂.
Dicaelotus pumilus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1619 n. 1, ♀ ♂.
Dicaelotus pumilus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 341 n. 4, ♀ ♂.

var. **rufoniger** Berth. — ♀ ♂ — Eur. [♀ ♂.
Dicaelotus pumilus var. rufoniger Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 341,

pusillator Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Fennia, Germania.
Ichneumon pusillator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 260 n. 3749.
Ichneumon pusillator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 605 n. 258, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon pusillator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 135 n. 13, ♀ [excl. ♂].
Dicoelotus pusillator Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 75 n. 258.
Diadromus pusillator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 35, ♀ ♂.
Dicaelotus pusillator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 13 n. 5, ♀.
Dicaelotus pusillator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 344 n. 11, ♀.

pusillus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Dicaelotus pusillus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 365 n. 4, ♀.
Dicaelotus pusillus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1617 n. 3.
Dicaelotus pusillus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 344 n. 12, ♀.

---

[1] *Lep.:* Depressaria nervosa (White).

resplendens Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Dicaelotus resplendens Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 366 n. 6, ♀.
Dicaelotus resplendens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 344 n. 13, ♀.
ruficoxatus (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia, Belgia.
Ichneumon ruficoxatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 597 n. 253, ♀.
Ichneumon ruficoxatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 203 n. 211, ♀.
Dicaelotus unipunctatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 176 [n. 3, ♀.
Dicoelotus unipunctatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 316 (Mant. [p. 79), ♀.
Dicoelotus ruficoxatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 415 (Ot. p. 64) n. 1, ♀ ♂.
Dicaelotus ruficoxatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 73 n. 253.
Dicaelotus ruficoxatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 13 n. 2, ♀ ♂.
Dicaelotus ruficoxatus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1622 n. 10, ♀ ♂.
Dicaelotus ruficoxatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 340 n. 1, ♀ ♂.
rufilimbatus (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon rufilimbatus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 535 n. 101, ♂.
Ichneumon rufilimbatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 603 n. 256, ♂.
Ichneumon rufilimbatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 204 n. 213, ♂.
Dicaelotus erythrostoma Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 176 [n. 2, ♀.
Dicoelotus erythrostoma Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 417 (Misc. p. 58) [n. 1, ♀.
Dicoelotus rufilimbatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 417 (Misc. p. 58 [n. 2, ♀.
Dicaelotus rufilimbatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 74 [n. 256, ♂.
Dicaelotus erythrostoma Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 26, ♀ ♂.
Dicaelotus rufilimbatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 53, ♀ ♂.
Dicaelotus rufilimbatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 13 n. 4, ♀ ♂.
Dicaelotus rufilimbatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 103 [n. 4, ♀.
Dicaelotus erythrostoma Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1620 n. 5, ♀ ♂.
Dicaelotus rufilimbatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 342 n. 6, ♀ ♂.
rufiventris Berth. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Dicaelotus rufiventris Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1899 p. 137 n. 54, ♀.
striatifrons Cam. — ♀ — Austr.: New Zealand.
Dicaelotus striatifrons Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 No. 1 p. 24, ♀.
trochanteratus Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Dicaelotus trochanteratus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VI. P. 4. 1888 p. 87 [n. 1, ♂.

COLPOGNATHUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 165.
κόλπος, sinus; γνάθος, maxilla.

Synon.: Ichneumon Gravenhorst, Fonscolombe, Cresson.
Phaeogenes Wesmael, Brischke, Bridgman & Fitch, Cresson, Provancher, Holmgren.
Phygadeuon Gravenhorst, Taschenberg, Provancher.

annulicornis Ashm. — ♀ — Am.: Luisiana.
Colpognathus annulicornis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 396, ♀.
armatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Colpognathus armatus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1636 n. 3, ♀ ♂.

celerator (Grav.) Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? —— Linné, Acta Upsal. 1736 p. 29 n. 7.
? Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 341 n. 48; T. 16 F. 1.
? Ichneumon Upsaliensis Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 409 n. 49.
Ichneumon celerator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 258 n. 3740.
Ichneumon celerator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 353 n. 97, ♀.
Ichneumon celerator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 566 n. 239, ♀.
Phygadeuon procerus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 722 n. 200, ♂ [excl. var. 2].
Ichneumon celerator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 200 n. 199, ♀.
Phygadeuon procerus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 302 n. 18.
Ichneumon celeratorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 365 n. 30, ♀.
Colpognathus celerator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 174 [n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon celerator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 413 n. 63.
Phygadeuon procerus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) IX. 1851 p. 116 n. 15, ♂.
Colpognathus celerator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 44 n. 1, ♀ ♂.
Colpognathus celerator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 206, ♀.
Phygadeuon procerus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 51 n. 83, ♂.
Colpognathus celerator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 53, ♂.
Colpognathus celerator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 13 n. 1.
Phygadeuon procerus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 228 n. 65, ♂.
Colpognathus celerator Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 370 n. 1, ♀ ♂.
Colpognathus celerator Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1636 n. 1, ♀ ♂.
Colpognathus celerator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 337, ♀ ♂.

divisus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Colpognathus divisus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1636 n. 2, ♀ ♂.

euryptychiae Ashm.[2]) — ♀ — Am.: Washington.
Colpognathus Euryptychiae Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 395, ♀.

fasciatus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon fasciatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 55 n. 56, ♀.
Colpognathus fasciatus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 186.

helvus (Cress.) Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Connecticut, Pennsylvania, Illinois.
Ichneumon helvus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 312, ♀.
Phygadeuon hilaris Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 284.
Phaeogenes helvus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 206 n. 15, ♀.
Phaeogenes helvus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 40 n. 4, ♂.
Phaeogenes helvus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 308.
Colpognathus helvus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 358.

jucundus (Wesm.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Belgia, Germania.
Phaeogenes jucundus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 194 [n. 25, ♀.
Phaeogenes jucundus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 324 (Mant. p. 87), ♀.
Phaeogenes jucundus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 423 (Misc. p. 64) [n. 6, ♀ ♂.
Phaeogenes jucundus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 29, ♂.
Phygadeuon jucundus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 44 n. 65, ♂.
Phaeogenes jucundus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 80 n. 16, ♀ ♂.
Phaeogenes jucundus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 444 n. 12, ♀ ♂.
Colpognathus jucundus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1636 n. 4.

---

1) *Lep.:* Sesia hylaeiformis (Brischke).
2) *Lep.:* Euryptychia saligneana (Ashmead).

magellansis Cam. — ♀ — Am.: Magellania.
Colpognathus Magellansis Cameron, Proc. Manchester Philos. Soc. XXVI. 1888 p. 129, ♀.
pentagonus Thoms. — ♀ — Eur.: Graecia.
Colpognathus pentagonus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1637 n. 5, ♀.

THYRAEELLA

Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 402.
θυραία, janua inter duas aedes.

Synon.: Diadromus Wesmael & auct. plur.
Ichneumon Gravenhorst.
Ischnus Gravenhorst.
Phaeogenes Bridgman & Fitch.

collaris (Grav.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon (Ischnus) collaris Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 653 n. 285, ♀.
Diadromus collaris Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 209 n. 4, ♀.
Diadromus collaris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 48 n. 2, ♀.
Diadromus collaris Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 34, ♀ ♂.
Phaeogenes collaris Marshall, Catal. Brit. Hymen. III. 1872 p. 30 n. 18.
Diadromus collaris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 58, ♀ ♂.
Phaeogenes collaris Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 80 n. 18, ♀ ♂.
Thyraeella collaris Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 402 n. 1, ♀ ♂.
Diadromus collaris Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1633 n. 8, ♀ ♂.
Diadromus collaris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 355 n. 4, ♀ ♂.
var. **brischkei** (Berth.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.
Diadromus collaris var. Brischkei Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 356, ♀ ♂.
Thyraeella collaris var. Brischkei m.

OROTYLUS

Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 405.
ὀρώδης, montanus.

Synon.: Diadromus Wesmael, Brischke, Berthoumieu.

mitis (Wesm.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Diadromus mitis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 329 n. 5b (Mant. p. 92), ♂.
Diadromus mitis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 418 (Ot. p. 67) n. 1, ♀.
Diadromus mitis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 59, ♀ ♂.
Orotylus mitis Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 405 n. 1, ♀ ♂.
Orotylus mitis Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1635 n. 1, ♀ ♂.
Diadromus mitis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 354 n. 2, ♀ ♂.

DIADROMUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 166.
διατρέχω, discurro.

Synon.: Microdromus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 166.
μικρός, parvus; *δρόμος*, cursus.
Gnathoxys Brischke.
Ichneumon Gravenhorst, Stephens, Taschenberg.
Phaeogenes Bridgman & Fitch, Brischke.

albinotatus (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon albinotatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 507 n. 211, ♂.
Diadromus albinotatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 63 n. 211.
Diadromus albinotatus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 390 n. 5, ♀ ♂.
Diadromus albinotatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 357 n. 7, ♀ ♂.

arcticus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Diadromus arcticus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1634 n. 9, ♀ ♂.

arrisor Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Diadromus arrisor Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 210 n. 5, ♀.
Diadromus arrisor Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 34, ♀.
Diadromus arrisor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 58, ♀ ♂.
Diadromus arrisor Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 398 n. 11, ♀ ♂.
Diadromus arrisor Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1632 n. 4, ♀.
Diadromus arrisor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 354 n. 1, ♀ ♂.

bipunctatus Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Diadromus bipunctatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 36, ♂.

candidatus (Grav.) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon candidatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 193 n. 49, ♂.
Ichneumon candidatus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 9 n. 9.
Ichneumon candidatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 145 n. 51, ♂.
Diadromus candidatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 330 (Mant. p. 93) n. 5, ♂.
Ichneumon candidatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 284 n. 49, ♂.
Diadromus candidatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 59, ♂.
Phaeogenes candidatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 79 n. 19, ♂.
Diadromus decolor Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 400 n. 13, ♀ ♂.
Gnathoxys candidatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 102 n. 1, ♂.
Diadromus candidatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 359 n. 13, ♀ ♂.

cautus Berth. — ♂ — Eur.: Alpes maritimae.
Diadromus cautus Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1898 p. 333 n. 43, ♂.

dolosus Berth. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Diadromus dolosus Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1899 p. 138 n. 55, ♀.

erubescens Berth. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Diadromus erubescens Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1899 p. 138 n. 56, ♀.

exilis Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Diadromus exilis Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1899 p. 138 n. 57, ♀.

guttulatus (Grav.) Wesm. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Ichneumon guttulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 580 n. 244, ♀ [excl. varr.].
Ichneumon guttulatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 201 n. 205, ♀.
Diadromus guttulatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 70 n. 244, ♀.
Phaeogenes guttulatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 80 n. 15, ♀.
Phaeogenes guttulatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 103 n. 6, ♀.
Diadromus guttulatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 361 n. 19, ♀.

heteroneurus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Diadromus heteroneurus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 399 n. 12, ♀ ♂.
Diadromus heteroneurus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 359 n. 12, ♀ ♂.

medialis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Diadromus medialis Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1634 n. 10, ♀ ♂.

picii Berth. — ♀ — Afr.: Algeria.
Diadromus Pici Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 356 n. 5, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Tortrix viridana (Bignell).

pimplarius Wesm. — ♂ — Eur.: Suecia. [(Mant. p. 93), ♂.
Diadromus pimplarius (Fallou) Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 330 n. 3b
Diadromus pimplarius Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 394 n. 8, ♂.
Diadromus pimplarius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 360 n. 15, ♂.

prosopius Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Diadromus prosopius Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 401 n. 14, ♂.
Diadromus prosopius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 360 n. 16, ♂.

pulchellus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia. [n. 2, ♀.
Diadromus pulchellus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Trent.) p. 208
Diadromus pulchellus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 389 n. 4, ♀ ♂.
Diadromus pulchellus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1632 n. 3, ♂.
Diadromus pulchellus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 357 n. 8, ♀ ♂.

punicus Berth. — ♀ — Afr.: Tunisia.
Diadromus Punicus Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1898 p. 333 n. 44, ♀.

pygmaeus Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Diadromus pygmaeus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 36, ♀ ♂.

quadriguttatus (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Belgia.
Ichneumon rubellus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 138 n. 16, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon quadriguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 178 n. 42, ♀.
Ichneumon quadriguttatus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 9 n. 9.
Diadromus quadriguttatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 212 n. 9, ♀.
Diadromus quadriguttatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 432 (Misc. [p. 73) n. 2, ♀.
Diadromus quadriguttatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) [p. 14 n. 16.
Ichneumon quadriguttatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 273 n. 42, [♀.
Diadromus rubellus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 387 n. 3, ♀ ♂.
Diadromus rubellus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1631 n. 1, ♀ ♂.
Diadromus quadriguttatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 356 n. 6, ♀ ♂.

scobinatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Diadromus scobinatus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 386 n. 2, ♀ ♂.
Diadromus scobinatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 359 n. 11, ♀ ♂.

subtilicornis (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon subtilicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 592 n. 251, ♀ [excl. ♂].
Diadromus imbellis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 209 n. 3, ♀.
Diadromus imbellis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 47 n. 1, ♀.
Diadromus subtilicornis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 72 [n. 251, ♂.
Diadromus subtilicornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 34, ♀.
Diadromus subtilicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 58, ♀.
Phaeogenes imbellis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 80 n. 17, ♀ ♂.
Diadromus subtilicornis Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 396 n. 10, ♀ ♂.
Phaeogenes imbellis Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. IX. 1890 p. 140.
Diadromus subtilicornis Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 1633 n. 7, ♀ ♂.
Diadromus subtilicornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 355 n. 3, ♀ ♂.

tenax Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Belgia, Gallia.
Diadromus tenax Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 210 n. 6, ♀ ♂.
Diadromus tenax Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 59, ♀.
Diadromus tenax Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1632 n. 6, ♀ ♂.
Diadromus tenax Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 360 n. 17, ♀ ♂.

troglodytes (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon troglodytes Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 587 n. 246, ♀.
Ichneumon troglodytes Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 202 n. 207, ♀.
Diadromus troglodytes Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 207 n. 1, ♀.
Diadromus troglodytes Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 329 (Mant. p. 92), ♀.
Diadromus troglodytes Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 431 (Misc. p. 72) [n. 1, ♀ ♂.
Diadromus troglodytes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 34, ♀.
Phaeogenes troglodytes Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 80 n. 14, ♀ ♂.
Diadromus troglodytes Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 385 n. 1, ♀ ♂.
Diadromus troglodytes Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1631 n. 2, ♀ ♂.
Diadromus troglodytes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 32, ♀.
Diadromus troglodytes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 358 n. 10, ♀ ♂.

ustulatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Diadromus ustulatus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 395 n. 9, ♀ ♂.
Diadromus ustulatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 360 n. 14, ♀ ♂.

variicolor Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Belgia. [n. 7, ♀ ♂.
Diadromus varicolor Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 211
Diadromus varicolor Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 331 (Mant. p. 94), ♀ [[excl. ♂].
Diadromus varicolor Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 34, ♀.
Diadromus varicolor Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 392 n. 6, ♀ ♂.
Diadromus varicolor Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1632 n. 5, ♀ ♂.
Diadromus varicolor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 361 n. 18, ♀ ♂.

var. **intermedius** Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Belgia. [n. 8, ♂.
Diadromus intermedius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 211
Diadromus varicolor Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 331 (Mant. p. 94), ♂
Phaeogenes varicolor Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 413. [[excl. ♀].
Diadromus intermedius Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 393 n. 7, ♀ ♂.
Diadromus varicolor var. intermedius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 [p. 361, ♀ ♂.

CINXAELOTUS

Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 367.
? Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1620.
κιξαλλεία, latrocinium.

Synon.: Herpestomus Berthoumieu.

erythrogaster Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia.
Cinxaelotus erythrogaster Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 367 n. 1, ♀ ♂.
Herpestomus erythrogaster Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 351 n. 10, ♀ ♂.

HERPESTOMUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 165.
ἕρπω, serpo; *στόμα*, os.

Synon.: Ichneumon Gravenhorst & auct.
Ischnus Provancher.
Phaeogenes Provancher.

attenuatus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon attenuatus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 359 n. 46, ♀.

Phygadeuon attenuatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 781 n. 46, ♀.
Herpestomus ? attenuatus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 186.
Herpestomus ? attenuatus Harrington, Canad. Entomol. XXIX. 1897 p. 43.

brunnicans Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Herpestomus brunnicans Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 25, ♀.
Herpestomus brunnicans Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 206, ♀.
Herpestomus brunnicans Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1890 p. 103 [n. 3, ♀.

brunnicornis (Grav.) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon brunnicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 145 n. 22, ♀ ♂.
Ichneumon brunnicornis Gravenhorst, Monita spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 9 n. 9.
Ichneumon brunnicornis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 136 n. 26, ♀ ♂.
Ichneumon brunnicornis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 134 n. 8, ♀ ♂.
Ichneumon brunnicornis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 133 n. 9.
Ichneumon brunnicornis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 164 n. 6.
Herpestomus brunnicornis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles VIII. 1844 (Tent.) p. 170 [n. 1, ♀ ♂.
Herpestoma brunnicornis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 44 n. 1, ♀ ♂.
Herpestomus brunnicornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 25, ♀ ♂.
Ichneumon brunnicornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 250 [n. 22, ♀ ♂.
Herpestomus brunnicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 53, ♀ ♂.
Herpestomus brunnicornis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 12 n. 1.
Herpestomus brunnicornis Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 377 n. 1, ♀ ♂.
Herpestomus brunneiventris Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1617 n. 1, ♀ ♂.
Herpestomus brunnicornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 347 n. 1, ♀.

distinctus Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Herpestomus distinctus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1887 p. 362, ♀.
Herpestomus distinctus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 349 n. 5, ♀.

flavicoxae Harrgt. — ♂ — Am.: Vancouvers Island.
Herpestomus flavicoxae Harrington, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 210, ♂.

furunculus Wesm. — ♀ — Eur.: Belgia.
Herpestomus furunculus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p 171 [n. 4, ♀.
Herpestomus furunculus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 348 n. 3, ♀.

gaullei Berth. — ♀ — Afr.: Algeria.
Herpestomus Gaullei Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 350 n. 8, ♀.

gracilicornis (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon gracilicornis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 56 n. 58, ♀.
Herpestomus gracilicornis Davis, Canad. Entomol. XXVII. 1895 p. 287.

impressus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Herpestomus impressus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 206, ♀.

marginatus (Prov.) Davis — ♂ — Am.: Canada.
Phygadeuon marginatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 56 n. 59, ♂.
Herpestomus marginatus Davis, Canad. Entomol. XXVII. 1895 p. 287.

nasutus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Belgia.
Herpestomus nasutus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 170 n. 2.
Herpestomus nasutus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1617 n. 2, ♀ ♂.
Herpestomus nasutus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 348 n. 2, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Hyponomeuta padella (Brischke), H. cognatella (Giraud).

var. **intermedius** Wesm. — ♀ — Eur.: Britannia, Belgia.
. Herpestomus intermedius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 171 [n. 3, ♀.
Herpestomus intermedius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 314 (Mant. [p. 77), ♀.
Herpestomus nasutus var. intermedius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 [p. 348, ♀.
orbus (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Phaeogenes orbus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 332 n. 11, ♂.
Phaeogenes orbus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 771 n. 11, ♂.
Phaeogenes orbus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 41 n. 11, ♂.
Herpestomus orbus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 186.
Herpestomus orbus Harrington, Canad. Entomol. XXIX. 1897 p. 43.
phaeocerus Wesm. — ♀ (♂) — Eur.: Gallia, Belgia, Germania.
Herpestomus phaeocerus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 172 [n. 6, ♀.
Herpestomus phaeocerus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 42 (Adn. p. 10), ♂.
Herpestomus phaeocerus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 350 n. 7, ♀(♂).
piriformis Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Ischnus pyriformis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 109.
Phaeogenes pyriformis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 206 n. 16, ♂.
Phaeogenes pyriformis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 40 n. 5, ♀ ♂.
Phaeogenes pyriformis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 309 n. 5, ♀ ♂.
Herpestomus pyriformis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 358.
plutellae Ashm.[1] — ♂ — Am.: Indiana.
Herpestomus Plutellae Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 396, ♂.
pudibundus Wesm. — ♀ — Eur.: Belgia.
Herpestomus pudibundus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 172 [n. 5, ♀.
Herpestomus pudibundus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 350 n. 6, ♀.
striatus Bridgm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Herpestomus striatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 145, ♀ ♂; T. 8 F. 1 & 2.
xanthops (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon xanthops Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 502 n. 207, ♂.
Ichneumon facialis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 590 n. 249, ♀.
Herpestomus facialis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 173 [n. 7, ♀.
Herpestomus facialis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 315 (Mant. p. 78), ♀ ♂.
Herpestomus spec. Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 75.
Herpestomus facialis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 53, ♂.
Herpestomus facialis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 12 n. 2.
Herpestomus xanthops Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 378 n. 2, ♀ ♂.
Herpestomus facialis Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1618 n. 3, ♀ ♂.
Herpestomus xanthops Berthoumieu, Ann soc. entom. France LXV. 1896 p. 349 n. 4, ♀ ♂.
var. **arridens** (Grav.) Wesm. — ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon arridens Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 501 n. 206, ♂.
Ichneumon arridens Stephens, Illustr. Brit Entom. Mandib. VII. 1835 p. 193 n. 178, ♂.
Ichneumon arridens Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 62 n. 206, ♂.
Herpestomus xanthops var. arridens Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 379.
Herpestomus xanthops var. arridens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 [p. 349, ♂.
var. **pusillator** (Grav.) Holmgr. — ♂ — Eur. bor. & centr.
. Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 70 n. 346.
? Ichneumon pallidus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2720 n. 391.
? Ichneumon notator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 260 n. 3751.

[1]) *Lep.*: Plutella cruciferarum (Ashmead).

Ichneumon pusillator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 605 n. 258, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon pusillator Ratzeburg, Ichneum d. Forstinsect. I. 1844 p. 135 n. 13, ♂ [excl. ♀].
Herpestomus xanthops var. pusillator Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 379.
Herpestomus xanthops var. pusillator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 [p. 349, ♂.

TYCHERUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 192 n. 14.
τυχηρός, fortuitus.

Species exstat.

AETHECERUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 166.
αἰθήεις, exustione niger; κέρας, cornu.

Synon.: Diadromus Bridgman.
Ichneumon Gravenhorst.
Phaeogenes Destephani, Bridgman.

discolor Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia, Gallia. [[excl. ♀].
Aethecerus discolor Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 204 n. 3, ♂
? Aethecerus frontatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 205 [n. 4, ♀.
Aethecerus discolor Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 328 (Mant. p. 91), ♂ [[excl. ♀].
Aethecerus discolor Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 36, ♀ ♂.
Aethecerus discolor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 59, ♀ ♂.
Aethecerus discolor Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 413 n. 1, ♀ ♂.
Aethecerus discolor Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1640 n. 3, ♀ ♂.
Aethecerus discolor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 364 n. 4, ♀ ♂.
dispar Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia, Gallia.
Ichneumon ischiomelinus var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 608 n. 259, ♂.
Aethecerus dispar Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 203 [n. 1, ♀ ♂.
Aethecerus dispar Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 327 (Mant. p. 90), ♀ ♂.
Aethecerus dispar Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 36, ♀ ♂.
Aethecerus dispar Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 59, ♂.
Aethecerus dispar Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 414 n. 2, ♀ ♂.
Aethecerus dispar Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1639 n. 1, ♀ ♂.
Aethecerus dispar Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 364 n. 5, ♀ ♂.
var. **albipictus** Berth. — ♂ — Eur.
Aethecerus dispar var. albipictus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 365, ♂.
var. **frontatus** Holmgr. — ♀ — Eur. [n. 4, ♀.
? Aethecerus frontatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 205
Aethecerus dispar var. frontatus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 415.
Aethecerus dispar var. frontatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 365, ♀.
erythrocerus (Grav.) Wesm. — ♂ — Eur.: Italia.
Ichneumon erythrocerus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 356 n. 102, ♂.
Ichneumon erythrocerus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 610 n. 260, ♂.
Aethecerus erythrocerus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 75 [n. 260.
Aethecerus erythrocerus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 366 n. 11, ♂.

exilis Wesm. — ♂ — Eur.: Belgia.
Aethecerus exilis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 328 (Mant. p. 91) n. 3b, ♂.
Aethecerus exilis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 365 n. 6, ♂.

graniger Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Aethecerus graniger Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1641 n. 6, ♀ ♂.

longior Berth. — ♀ — Eur.: Sicilia. [1896 p. 366 n. 9, ♀.
Aethecerus (Phaeogenes) longior (Destefani) Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV.

longulus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania, Belgia, Gallia. [n. 6, ♀.
Aethecerus longulus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 206
Aethecerus longulus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 208, ♀.
Aethecerus longulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 59, ♀.
Diadromus formosus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 149, ♀; T. 8 F. 5.
Aethecerus longulus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 150.
Phaeogenes formosus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 80, ♀.
Aethecerus longulus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 83, ♀.
Aethecerus longulus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1642 n. 9, ♀ ♂.
Aethecerus longulus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 365 n. 8, ♀.

nitidus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Belgia, Gallia.
Aethecerus nitidus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 204 n. 2, ♀ ♂.
Aethecerus nitidus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 327 (Mant. p. 90), ♀ ♂.
Aethecerus nitidus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 47 n. 1, ♀ ♂.
Aethecerus nitidus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 149, ♀.
Aethecerus nitidus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 83, ♀ ♂.
Aethecerus nitidus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1640 n. 2, ♀ ♂.
Aethecerus nitidus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 363 n. 3, ♀ ♂.

pallidicoxa Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota. [[excl. ♂].
Aethecerus discolor Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 204 n. 3, ♀
Aethecerus discolor Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 328 (Mant. p. 91), ♀
Aethecerus pallicoxa Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1640 n. 4, ♀ ♂. [[excl. ♂].

placidus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Belgia.
Aethecerus placidus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 206 n. 5, ♀.
Aethecerus placidus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 37, ♀.
Aethecerus placidus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 59, ♀.
Aethecerus placidus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1641 n. 5, ♀ ♂.
Aethecerus placidus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 365 n. 7, ♀.

porcellus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Aethecerus porcellus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 417 n. 4, ♀.
Aethecerus porcellus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1641 n. 8.
Aethecerus porcellus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 366 n. 10, ♀.

regius Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Pyrenaei montes; Afr.: Algeria.
Aethecerus regius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 419 (Ot. p. 68) n. 1, ♂.
Aethecerus regius Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1642 n. 10, ♀.
Aethecerus regius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 362 n. 1, ♀ ♂.

rugifrons Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia.
Aethecerus rugifrons Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 416 n. 3, ♀ ♂.
Aethecerus rugifrons Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1641 n. 7, ♀ ♂.
Aethecerus rugifrons Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 363 n. 2, ♀ ♂.

OIORRHINUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 166 [Oiorhinus].
οἶος, solus; *ῥίς*, nasus.

Synon.: Herpestomus Bridgman & Fitch.

pallidipalpis Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia. [n. 1, ♀♂.
Oiorhinus pallipalpis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 202
Oiorhinus pallipalpis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 326 (Mant. p. 89), ♀♂.
Oiorhinus pallipalpis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 36, ♀ ♂.
Oiorhinus pallipalpis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 208, ♂.
Oiorhinus pallipalpis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 59, ♀.
Herpestomus striatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 145, ♀ ♂; T. 8 F. 1 (♂) &
Herpestomus striatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 12. [F. 2 (♀).
Oiorhinus pallipalpis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 82, ♀ ♂.
Oiorhinus pallipalpis Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 408 n. 1, ♀ ♂.
Oiorhinus pallipalpis Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1628 n. 1, ♀ ♂.
Oiorhinus pallidipalpis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 345, ♀ ♂.

MISETUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 166.
μισέω, odi.

oculatus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Gallia.
Misetus oculatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 212 n. 1, ♂.
Misetus oculatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 420 (Ot. p. 69) n. 1, ♀.
Misetus oculatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 59, ♂.
Misetus oculatus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 410 n. 1, ♀ ♂.
Misetus oculatus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1611 n. 1, ♀ ♂.
Misetus oculatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 60, ♀.
Misetus oculatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 345, ♀ ♂.
var. **obscurus** Berth. — ♂ — Eur.
Misetus oculatus var. obscurus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 345, ♂.

EPITOMUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 192 n. 8.
Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1625.
ἐπίτομος, praecisus.

parvus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Epitomus parvus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1626 n. 1, ♀ ♂.

HEMICHNEUMON

Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 410 (Ot. p. 59).
ἡμι, semi; Ichneumon, nom. propr. Hymen.

Synon.: Hemiteles Ratzeburg.
Hypocryptus Harrington.

elongatus (Ratzbg.) Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Hemiteles elongatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 154 n. 15, ♀.

[1]) *Lep.:* Psyche viciella (Brischke), Taleporia politella (Mocsáry).

Hemichneumon subdolus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 411 (Ot. p. 60) n. 1, ♀ ♂.
Hemichneumon subdolus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 59, ♀ ♂.
Hemichneumon elongatus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 358 n. 1, ♀ ♂.
Hemichneumon elongatus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1611 n. 1, ♀ ♂.
Hemichneumon elongatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 392 n. 1, ♀ ♂.

fuscipes Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Hemichneumon fuscipes Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1612 n. 2, ♀.

suspectus Wesm. — ♀ — Eur.: Belgia.
Hemichneumon suspectus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 412 (Ot. p. 61) n. 2, ♀.
Hemichneumon suspectus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 392 n. 2, ♀.

vancouverensis Harrgt. — ♂ — Am.: Vancouvers Island.
Hypnocryptus Vancouverensis Harrington, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 248, ♂.
Hemichneumon Vancouverensis Harrington, Canad. Entomol. XXIX. 1897 p. 43, ♂.

TRACHYARUS

Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1612.
τραχόω, durum reddo.

corvinus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia.
Trachyarus corvinus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1612 n. 1, ♀ ♂.

DIASCHISASPIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 192 n. 6.
διασχίζω diffindo; *ἀσπίς*, scutum.

campoplegoides Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Diaschisaspis campoplegoides Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 354 n. 1, ♀ ♂.
Diaschisaspis campoplegoides Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 392, ♀ ♂.

ORONOTUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 166.
ὄρος = *ὀῤῥός*, perinaeum; *νῶτος*, dorsum.

Synon.: Ichneumon Stephens.
Phygadeuon Gravenhorst.

albomaculatus Ashm. — ♂ — Am.: Texas.
Oronotus albomaculatus Ashmead, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIII. 1896 p. 205, ♂.

binotatus (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Phygadeuon binotatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 721 n. 199, ♂.
Ichneumon binotatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 147 n. 57, ♂.
Oronotus coarctatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 214 [n. 1, ♀ ♂.
Phygadeuon binotatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 51 n. 84, ♂.
Oronotus binotatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 481 (Doc. p. 41), ♂.
Oronotus coarctatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 57, ♀ ♂; T. 37 F. 8 (♂) & 9 (♀).
Oronotus binotatus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 83 n. 1, ♀ ♂.
Oronotus binotatus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 356 n. 1, ♀ ♂.
Oronotus binotatus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1626 n. 1, ♀ ♂.
Oronotus binotatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 387, ♀ ♂.

thoracicus Costa — Eur.: Sardinia.
Oronotus thoracicus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 13. 1885 p. 24.

DIACRITUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 191 n. 4.
διάκριτος, discretus.

Synon.: Echthrus Provancher.
Euxorides Davis.
Mesoleptus Cresson, Provancher.
Mesostenus Provancher.

rufipes (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada.
? Mesoleptus muliebris Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 102, ♂.
? Mesoleptus variabilis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 115.
Mesostenus rufipes Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 263.
Mesoleptus rufipes Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 226 n. 10, ♀.
? Mesoleptus muliebris Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 227 n. 11, ♂.
Echthrus pediculatus Provancher, Natural. Canad. XII. 1880 p. 99 n. 5, ♀.
Mesoleptus rufipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 399 n. 10, ♀.
? Mesoleptus muliebris Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 400 n. 11, ♂.
Echthrus pediculatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 487 n. 5, ♀.
Mesostenus pluricinctus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 76 n. 8, ♀.
Echthrus pediculatus Harrington, Canad. Entomol. XXV. 1893 p. 32, ♀.
Euxorides ? pediculatus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 190.
Diacritus rufipes Davis, Canad. Entomol. XXVII. 1895 p. 288, ♀ (♂).

APAELETICUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 165.
ἀπαιολάω, perturbare.

Synon.: Ichneumon Gravenhorst.

bellicosus Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Apaeleticus bellicosus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 166 [n. 1, ♀♂.
Apaeleticus bellicosus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 324 (Plat. p. 30), [♀♂; Tab. F. 11 (♀).
Apaeleticus bellicosus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 413 (Misc. p. 54)
Apaeleticus bellicosus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 336 n. 1, ♀ ♂. [n. 1, ♂.
Apaeleticus bellicosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 52, ♂.
Apaeleticus bellicosus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 209 n. 1, ♀ ♂.
Apaeleticus bellicosus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 126 n. 1.
Apaeleticus bellicosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 335 n. 2, ♀ ♂.
var. **balearicus** Kriechb. — ♀ — Eur.: Mallorca.
Apaeleticus Balearicus Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 241 n. 5, ♀.
Apaeleticus bellicosus var. Balearicus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 [p. 335, ♀.
brevicornis Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Apaeleticus brevicornis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 203 n. 36, ♂.
Apaeleticus brevicornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 336 n. 7, ♂.
detritus Holmgr. — ♂ — Eur.: Tirolia.
Apaeleticus detritus Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 181 n. 38, ♂.
Apaeleticus detritus Kriechbaumer, Ber. naturw. med. Ver. Innsbruck XI. 1880/81 p. 10 n. 39.
Apaeleticus detritus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 335 n. 3, ♂.
flammeolus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia, Belgia, Germania, Helvetia.
Apaeleticus flammeolus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 168 [n. 2, ♀.

Apaeleticus flammeolus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 326 (Plat. p. 32), ♀.
Apaeleticus flammeolus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 338 n. 3, ♀.
Apaeleticus flammeolus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 1. 1888 p. 105, ♂.
Apaeleticus flammeolus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 126 n. 3, ♀ [excl. ♂].
Apaeleticus flammeolus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 334 n. 1, ♀♂.

inclytus Wesm. — ♂ — Eur.: Gallia, Germania.
Apaeleticus inclytus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 328 (Plat. p. 34), ♂.
Apaeleticus inclytus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 25, ♂.
Apaeleticus inclytus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 52, ♂.
Apaeleticus flammeolus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 126 n. 3, ♂ [excl. ♀].
Apaeleticus inclytus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 336 n. 6, ♂.

inimicus (Grav.) Wesm. — ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Italia.
Ichneumon inimicus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 342 n. 83, ♂.
Ichneumon inimicus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 508 n. 212, ♂.
Apaeleticus inimicus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 327 (Plat. p. 33), ♂.
Apaeleticus inimicus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 340 n. 4, ♂.
Apaeleticus inimicus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 52, ♂.
Apaeleticus inimicus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 336 n. 5, ♂.

kriechbaumeri Costa — ♂ — Eur.: Sardinia.
Apaeleticus Kriechbaumeri A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli XXIII. 1884 p. 170, ♂.
Apaeleticus Kriechbaumeri A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 13. 1885 p. 22, ♂.

mesostictus (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon mesostictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 504 n. 209, ♂.
Apaeleticus longicornis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 325 (Plat. p. 31), ♀.
Apaeleticus longicornis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 414 (Misc. p. 55) n. 2, ♂.
Apaeleticus mesostictus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 62 n. 209.
Apaeleticus longicornis Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 337 n. 2, ♀ ♂.
Apaeleticus melostictus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 126 n. 2.
Apaeleticus mesostictus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 335 n. 4, ♀♂.

sardous Costa — ♀ — Eur.: Sardinia.
Apaeleticus Sardous A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli XXIII. 1884 p. 170, ♀.
Apaeleticus Sardous A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 13. 1885 p. 22, ♀.

HETERISCHNUS

Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 83.
ἑτερός, alter; Ischnus, nom. propr. Hymen.

Synon.; Ichneumon Müller, Gravenhorst, Stephens.
Ischnus Wesmael.

pulex (Müll.) Wesm. — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon murex O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 155 n. 1798.
Ichneumon pulex O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 155 n. 1807.
Ichneumon brevicornis Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 11 n. 15.
Ichneumon brevicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 146 n. 23, ♀.
Ichneumon (Ischnus) pulex Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 652 n. 283.
Ichneumon brevicornis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 136 n. 27, ♀.
Ischnus pulex Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 17 n. 23, ♀.
Heterischnus pulex Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 83 n. 283, ♀.
Ichneumon brevicornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVI. 1866 p. 251 n. 23, ♀.

Heterischnus brevicornis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 84 n. 1, ♀.
Heterischnus pulex Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 388, ♀.

rufipes (Wesm.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Belgia, Germania.
Ischnus rufipes Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 332 (Mant. p. 95) n. 4, ♂.
Ischnus rufipes Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 83 n. 3, ♂.
Ischnus rufipes Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 353, ♀ ♂.
Ischnus (Heterischnus) rufipes Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1625 n. 6, ♀.
Ischnus rufipes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 390 n. 4, ♂.

ISCHNUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 638 n. 3.
ἰσχνός, gracilis.

Synon.: Bassus Fabricius.
Ichneumon Fabricius & auct.

americanus Ashm. — ♀ — Am.: Kansas.
Ischnus Americanus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 394, ♀.

anomalus Wesm. — ♂ — Eur.: Belgia.
Ischnus anomalus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 421 (Ot. p. 70) n. 1, ♂.
Ischnus anomalus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 391 n. 8, ♂.

attenuatus Tosqu. — ♀ — Afr.: Senegal.
Ischnus attenuatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 119 n. 2, ♀.

balearicus Kriechb. — ♂ — Eur.: Mallorca.
Ischnus? Balearicus Kriechbaumer, Anal. soc. hist. nat. Españ. XXIII. 1894 p. 242 n. 8, ♂.
Ischnus Balearicus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 391 n. 9, ♂.

coxator Thoms. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Ischnus coxator Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1624 n. 4, ♂.

debilis Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon (Ischnus) debilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 650 n. 281, ♀.
Ischnus debilis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 82 n. 281.
Ischnus debilis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 390 n. 5, ♀.

filiformis Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon (Ischnus) filiformis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 651 n. 282, ♂.
Ischnus filiformis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 83 n. 282.

geniculatus Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Caffraria.
Ischnus geniculatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 117 n. 1, ♀ ♂.

melanopygus Holmgr. — ♀ ♂ — Afr.: Cap.
Ischnus melanopygus Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 396 n. 11, ♀ ♂.

montanus Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Ischnus montanus Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1897 p. 256 n. 36, ♀.

nigricollis Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia, Gallia.
Ischnus nigricollis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 216 [n. 3, ♀.
Ischnus nigricollis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 43 (Adn. p. 11), ♂.
Ischnus nigricollis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 432 (Misc. p. 73) [n. 1, ♀ ♂.
Ischnus nigricollis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 37, ♀ ♂.
Ischnus nigricollis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 208, ♀.
Ischnus nigricollis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 60, ♀ ♂.
Ischnus nigricollis Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 83 n. 1, ♀ ♂.
Ischnus nigricollis Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 352 n. 2, ♀ ♂.

Ischnus nigricollis Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1623 n. 1, ♀ ♂.
Ischnus nigricollis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 390 n. 3, ♀ ♂.

nigrinus Gir.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Ischnus nigrinus Giraud, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 p. 394 n. 4, ♀ ♂.
Ischnus nigrinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 391 n. 7, ♀ ♂.

proximus Costa — ♀ — Eur.: Sardinia.
Ischnus proximus A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli XXIII. 1884 p. 171, ♀.
Ischnus proximus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 13. 1885 p. 23, ♀.

pulchellus Thoms. — ♀ ♂ — Eur. mer.
Ischnus pulchellus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1625 n. 5, ♀ ♂.

ridibundus Costa — ♀ ♂ — Eur.: Sardinia.
Ischnus ridibundus A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli XXIII. 1884 p. 170, ♀.
Ischnus ridibundus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 13. 1885 p. 23, ♀ ♂.

rufobrunneus Berth. — ♀ — Eur.: Alpes maritimae.
Ischnus rufobrunneus Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1898 p. 334 n. 47, ♀.

thoracicus Grav.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Gallia.
Ichneumon (Ischnus) thoracicus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 647 n. 279, ♀ ♂.
Ischnus thoracicus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 215 n. 1, ♀ ♂.
Ischnus thoracicus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 82 n. 279.
Ischnus thoracicus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 83 n. 2, ♀ ♂.
Ischnus thoracicus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 354, ♀ ♂.
Ischnus thoracicus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1624 n. 3, ♀ ♂.
Ischnus thoracicus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 389 n. 1, ♀ ♂.

tineidarum Gir.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Austria, Italia.
Ischnus tineidarum Giraud, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 p. 393 n. 3, ♀ ♂.
Ischnus tineidarum Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 391 n. 6, ♀ ♂.

truncator (Fabr.) Grav.[4] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon colorator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 196 n. 197.
? Ichneumon colorator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 217 n. 64.
Ichneumon truncator Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 222 n. 81-82.
Ichneumon truncator Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II 1801 p. 49; T. 11 F. 6.
Ichneumon truncator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 57 n. 39.
Bassus truncator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 98 n. 17.
Ichneumon truncator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 358 n. 105, ♀.
Ichneumon truncator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon truncator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 307.
Ichneumon (Ischnus) truncator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 649 n. 280, ♀.
Ichneumon (Ischnus) truncator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 306 n. 19, ♂.
Ischnus truncator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 215 n. 2, ♂.
Ischnus truncator Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 82 n. 280.
Ischnus elegans Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXIX. 1868 p. 258 n. 14, ♂.
Ischnus truncator Giraud, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 p. 396 n. 5, ♂.
Ischnus truncator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 60, ♀.
Ischnus truncator Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 349 n. 1, ♀ ♂.
Ischnus truncator Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1624 n. 2, ♀ ♂.
Ischnus truncator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 389 n. 2, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Coleophora lugduniella (Giraud).
[2]) *Lep.:* Acyptilia pentadactyla (Brischke).
[3]) *Lep.:* Talaeoporia politella, T. pseudobombycella, Argyresthina nitidella, A. pan-[zerella (Giraud).
[4]) *Lep.:* Bombyx lanestris (Mocsáry).

var. **pictipes** Kriechb. — ♀ — Eur.: Mallorca.
Ischnus pictipes Kriechbaumer, Anal. soc. hist. nat. Españ. XXIII. 1894 p. 242 n. 9, ♀.
Ischnus truncator var. pictipes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 390, ♀.

36. *Subfam.* **Alomyinae**

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 144 & 194.

ALOMYA

Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 83.
ἄλλος, alius; μυῖα, musca (?).

Synon.: Ichneumon Fabricius & auct. ant.
Cryptus Fabricius.

cruentator Panz.! — Eur.: Germania.
Alomya cruentator Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 P. 102 T. 21.
Alomya cruentator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 942 n. 96.

debellator (Fabr.) Panz. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon debellator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 333 n. 37, ♀.
Ichneumon Fischeri Schrank, Beitr. z. Naturg. 1776 p. 89 n. 54.
Ichneumon debellator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 427 n. 41, ♀.
Ichneumon Fischeri Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 356 n. 718, ♂.
Ichneumon debellator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 263 n. 49, ♀.
Ichneumon ovator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 266 n. 83, ♂.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 67 n. 296.
Ichneumon debellator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 161 n. 81, ♀.
Ichneumon Fischeri Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 163 n. 89.
Ichneumon debellator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2685 n. 115, ♀.
Ichneumon Fischeri Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2688 n. 125.
Ichneumon ovator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2692 n. 147, ♂.
Ichneumon trituberculatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2708 n. 346.
Ichneumon debellator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 354, ♀.
Ichneumon debellator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 178 n. 68, ♀.
Ichneumon Fischeri Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 220 n. 86.
Ichneumon debellator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 152 n. 78, ♀.
Ichneumon ovator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 163 n. 122, ♂.
Ichneumon debellator Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801, ♀; P. 78 T. 13.
Ichneumon ovator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 66 n. 68, ♂.
Cryptus debellator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 82 n. 47, ♀.
Ichneumon ovator Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 179 n. 4, ♂.
Alomyia debellator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 84, ♀.
Ichneumon debellator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110, ♀.
Ichneumon (Alomyia) debellator Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 7, ♀.
Alomyia ovator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. Curios. IX. 1818 p. 287, ♂.
Ichneumon debellator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257, ♀.
Ichneumon ovator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 270, ♂.
Ichneumon debellator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 299, ♀.
Ichneumon ovator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 366, ♂.
Ichneumon ovator Trentepol, Isis 1826 p. 223 n. 40, ♂.
Alomya ovator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 697, ♂.
Alomya ovator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 398 n. 1, ♀ ♂.

Alomya ovator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 273 n. 1, ♀ ♂.
Alomya ovator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 311, ♀ ♂.
Alomyia ovator Westwood, Introd. mod. classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 58.
Alomyia ovator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 217, ♀ ♂.
Ichneumon (Alomya) ovator Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed.3a Insect. II. 1849; T.111 F.7.
Alomya ovator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 48 n. 1, ♀ ♂.
Alomyia debellator Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 84 n. 1, ♀ ♂.
var. **nigra** Grav. — ♂ — Eur. centr.
Alomya nigra Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 698.
Alomya nigra Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 405 n. 2, ♂.
Alomya nigra Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 294 n. 3, ♂.
Alomyia nigra Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 239 n. 1, ♂.
var. **semiflava** Steph. — ♀ — Eur.: Britannia.
Alomya semiflava Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 274 n. 2, ♀.
var. **victor** Curt. — ♀ — Eur.: Britannia.
Alomyia victor Curtis, Brit. Entom. III. 1826 p. 120; T. 120.
Alomyia victor Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 697, ♀.
petiolaris Spin. — ♂ — Am.: Chile.
Alomyia petiolaris Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. 1851 p. 511 n. 1, ♂.

37. *Subfam.* Haeresiarchinae

Ashmead, Smith: Insects of New Jersey 1900 p. 567.

STENODONTUS

Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 346 n. 32.
στενός, angustus; *ὀδοῦς*, dens.

Synon.: Gnathoxys Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 165
γνάθος, maxilla; *ὀξύς*, acer. [[nec Westwood 1842 Coleopt.].
Ichneumon Gravenhorst, Taschenberg.

marginellus (Grav.) Berth. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon marginellus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 192 n. 48, ♂.
Ichneumon marginellus Gravenhorst, Monita spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 14 n. 27.
Gnathoxys marginellus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 168 [n. 1, ♂.
(Gnathoxys) marginellus Wesmael, Bull. acad. sc. Bélgique XXII. P. 2. 1855 p. 415 (Misc. [p. 56) n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon marginellus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 281 n. 48, ♂.
Gnathoxys marginellus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 52, ♀.
Gnathoxys marginellus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 85, ♀ ♂.
Gnathoxys marginellus Jacobs, Ann. soc. entom. Belgique XXXI. 1887 C. R. p. XLVI.
Gnathoxys marginellus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 382 n. 1, ♀ ♂.
Gnathoxys marginellus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1615 n. 1, ♀ ♂.
Stenodontus marginellus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 346, ♀ ♂.
nasutus (Wesm.) Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Germania, Hungaria; Afr.: Algeria.
Gnathoxys nasutus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 413 (Ot. p. 62) n. 1, ♀ ♂.
Gnathoxys nasutus Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1890 p. 383, ♀ ♂.
Gnathoxys nasutus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 1616 n. 2, ♀ ♂.
Gnathoxys nasutus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 116, ♂.
Stenodontus nasutus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 346, ♀ ♂

tristis (Brischke) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Gnathoxys tristis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 31, ♂.
Stenodontus tristis m.

RHEXIDERMUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 192 n. 12.
ῥῆξις, fissio; *δέρμα*, pellis.
Species exstat.

HAERESIARCHES

Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 93 [Heresiarches].
αἵρεσις, praejudicum; *ἄρχομαι*, incipio.

Synon.: Hepiopelmus Wesmael.

eudoxius Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Belgia, Gallia. [n. 3, ♂.
Hepiopelmus eudoxius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 142
Hepiopelmus eudoxius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 137 (Ambl. p. 63) [n. 3, ♂.
Heresiarches eudoxius Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 93, ♀ ♂.
Heresiarches eudoxius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 480 (Doc. p. 40), ♀ ♂.
Heresiarches eudoxius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 517, ♀ ♂.
Heresiarchus eudoxius Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 27.

PLAGIOTRYPES

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 20.
πλάγιος, obliquus; *τρυπάω*, fodio.

Synon.: Amblyteles Cresson.
Ichneumon Say.

concinnus (Say) Cress. — ♂ — Am.: Indiana.
Ichneumon concinnus Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 68 n. 2, ♂ [false ♀].
Ichneumon concinnus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 374 n. 2.
Amblyteles ? concinnus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 194 n. 34, ♂ [non ♀].
Plagiotrypes concinnus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 20.

38. *Subfam.* Listrodrominae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 144 & 194.

LISTRODROMUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 111.
λιστρόω, perpolire.

Synon.: Ichneumon Gravenhorst, Desvignes.

cabrerai Berth. — ♀ — Eur.: Hispania.
Listrodromus Cabrerai Berthoumieu, Rev. sc. Bourbonnais IX. 1896 p. 196, ♀.
Listrodromus Cabrerai Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 303, ♀.
nycthemerus (Grav.) Wesm. [1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Belgia, Gallia, Germania, Italia.
Ichneumon nycthemerus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 320 n. 56, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Lycaena argiolus (Bignell).

Ichneumon nycthemerus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 399 n. 155, ♀.
Ichneumon quinqueguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 626 n. 269, ♂.
Listrodromus nycthemerus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 146 n. 1, ♀.
(Listrodromus) nycthemerus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 139 (Ambl. [p. 65) n. 1, ♀ ♂; Tab. F. 13 (♀).
Ichneumon nycthemerus Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 18 n. 112, ♀ ♂.
Listrodromus nycthemerus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 22, ♀.
Listrodromus nycthemerus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVI. 1870 p. 461 [n. 1, ♀ ♂.
Listrodromus quinqueguttatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p.131 n. 1, ♀ ♂.
Listrodromus nycthemerus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 123 n. 1.
Listrodromus nycthemerus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 59, ♀.
Listrodromus nycthemerus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2100 n. 1.
Listrodromus nycthemerus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 303, ♀ ♂.
Ichneumon nycthemerus Marshall, Monthly Entom. Magaz. XXXIII. 1897 p. 235.

ERADHA

Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 213.
Etymol. obscura.

trichiosoma Cam. — ♂ — As.: India.
Eradha trichiosoma Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 214, ♂.

NEOTYPUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 194 n. 1.
νέος, novus; *τύπος*, forma.

Synon.: Cryptus Fabricius, Gravenhorst.
Ichneumon Fabricius & auct. ant.
Listrodromus Wesmael & auct.

intermedius Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania.
Neotypus intermedius Mocsáry, Magy. Akad. Termész. Értek. XIII. P. 11. 1883 p. 10 n. 11, ♀.
Neotypus Bolivari Berthoumieu, Rev. sc. Bourbonnais VII. 1894 p. 181, ♂.
Neotypus intermedius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 304 n. 3, ♀ ♂.
lapidator (Fabr.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon lapidator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 160 n. 111, ♀.
Cryptus lapidator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 84 n. 57.
Ichneumon nobilitator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 235 n. 3727, ♀.
Ichneumon lapidator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♀ ♂.
Ichneumon nobilitator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. Curios. IX. 1818 p. 284, ♀.
Ichneumon lapidator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 263.
Ichneumon lapidator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 316.
Ichneumon lapidatorius Trentepol, Isis 1826 p. 77 n. 21.
Ichneumon nobilitator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 627 n. 270, ♀.
Listrodromus lapidator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 147.
Listrodromus lapidator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 140 (Ambl. p. 66) [n. 2, ♀ [excl. synon.].
Listrodromus nobilitator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 405 (Ot. p. 53) n. 1, ♀.
Listrodromus lapidator Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 79 n. 1, ♀.
Listrodromus lapidator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 461 n. 2, ♀ ♂.

Neotypus lapidator Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 292 n. 2, ♀ ♂.
Listrodromus lapidator Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 43; T. 27 F. 8.
Listrodromus lapidator Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 131 n. 2, ♀ ♂.
Neotypus nobilitator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2100 n. 1.
Neotypus lapidator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 304 n. 2, ♀ ♂.

melanocephalus (Gmel.) Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 60 n. 178c.
Ichneumon melanocephalus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2687 n. 251, ♀.
Cryptus lapidator Gravenhorst, Magaz. f. Entom. IV. 1821 p. 264 n. 5, ♀ ♂.
Ichneumon lapidator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 628 n. 271, ♀ ♂.
Listrodromus lapidator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 404 (Ot. p. 53) n. 2, ♀.
Listrodromus melanocephalus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) [p. 81 n. 2, ♀.
Listrodromus nobilitator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 461 [n. 3, ♀ ♂
Neotypus melanocephalus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 292 n. 1, ♀ ♂.
Listrodromus melanocephalus Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 43; T. 27 F. 7.
Neotypus melanocephalus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 122 n. 1.
Neotypus nobilitator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2100 n. 2.
Neotypus melanocephalus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 304 n. 1, ♀ ♂.

semirufus Kriechb. — ♀ — Afr. or. [n. 3, ♀.
Neotypus semirufus Kriechbaumer, Magretti: Ann. mus. civ. Genova XXVI. 1884 p. 527
Neotypus semirufus Kriechbaumer, Magretti: Bull. soc. entom. Ital. XV. 1884 p. 242, ♀.

PATROCLUS

Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 104.
Nom. propr.

Synon.: Ichneumon Marshall.

nigrocaeruleus Cress. — ♀ — Am.: Mexico, Venezuela. [n. 1, ♀.
Ichneumon (Patroclus) nigrocoeruleus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 104
Ichneumon nigrocoeruleus Marshall, Ann. soc. entom. France LXI. 1892 p. 61 n. 46, ♀.

toltecus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon Toltecus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 17 n. 33, ♀ ♂.
Ichneumon (Patroclus) Toltecus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 105 n. 3, ♀ ♂.
Patrocles Toltecus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 34. 1884 Hymen. I. p. 136 n. 3.

venezuelensis Cam. — ♀ — Am.: Venezuela.
Patroclus (Ichneumon) Venezuelensis Cameron, Proc. Manchester Philos. Soc. XXVI. 1888 [p. 128, ♀.

CRESSONIANUS

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 20.
E. T. Cresson, nom. propr.

Synon.: Ichneumon Cresson.
Patroclus Cresson.

lectus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon lectus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 18 n. 35, ♀ ♂.
Ichneumon (Patroclus) lectus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 105 n. 2, ♀ ♂.
Patroclus lectus Cresson, Biol. Centr.-Amer. P. 34. 1884 Hymen. I. p. 136 n. 2.
Cressonianus lectus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 20.

JOPPITES

Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 511 n. 1.
Joppa, nom. propr. Hymen.

Synon.: Celmis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 71.
Etymol. obscura.
Pseudojoppa Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 4 n. 4.
ψευδής, fallax; Joppa, nom. propr. Hymen.
Ichneumon Fabricius & auct. ant.

blandita Tosqu. — ♀ — Afr.: Algeria.
Celmis blanditus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 72 n. 1, ♀.
Joppites blanditus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 425.

instructor (Fabr.) D. T. — ♀ ♂ — Eur. mer.; Afr. fere tota.
Ichneumon instructor Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 154 n. 87.
Ichneumon instructor Coquebert, Illustr. inconogr. Insect. II. 1801 p. 49; T. 11 F. 8.
Ichneumon instructor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 66 n. 63.
Ichneumon instructor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258.
Ichneumon instructor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 307.
Ichneumon instructor Trentepol, Isis 1829 p. 812 n. 56, ♀.
Joppa apicalis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 295 n. 50, ♀.
Ichneumon xanthomelas Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 309 n. 17, ♀.
Ichneumon xanthomelas Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 332 n. 397, ♀; T. 18 F. 11.
Ichneumon dimidiatus Guérin, Lefebure: Voy. Abyssinie VI. 1848 P. 4. p. 347; T. 7 F. 1.
Joppa apicalis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 206 n. 21, ♀ ♂.
Joppites xanthomelas Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 511, ♀ ♂.
Ichneumon xanthomelas Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 34 n. 15, ♀.
Joppites apicalis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 425.
Jopites apicalis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 393.
Celmis apicalis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 74 n. 2, ♂.
Joppites apicalis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 425.
Joppa instructor Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 65.
Joppa apicalis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 65.
Joppites instructor m.

CTENOCHARES

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 191 n. 17.
κτείς, pecten; χαρίεις, venustus.
Species exstat.

39. *Subfam.* Ichneumoninae

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 144 & 149.

TRICHOLABUS

Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2113.
θρίξ, capillus; λαμβάνω, capio.

Synon.: Bassus Gravenhorst, Holmgren, Brischke.
Ichneumon Fabricius, Thunberg.
Pimpla Fabricius, Gravenhorst.
Platylabus Thomson.

femoralis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Platylabus (Tricholabus) femoralis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2114 n. 2, ♀ ♂.
strigator (Fabr.) Thoms. — ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon strigator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 173 n. 166.
Pimpla strigator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 117 n. 25.
Pimpla strigator Gravenhorst, Magaz. f. Entom. IV. 1821 p. 268 n. 7, ♂.
Ichneumon strigator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon strigator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 337.
Bassus strigator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 330 n. 9, ♂.
Bassus strigator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 83 n. 5, ♂.
Bassus strigator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. I. 2. 1856 P. 5. (Tryph.) p. 363 n. 24, ♂.
Bassus strigator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg XI. 1871 p. 105, ♂.
Bassus strigator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 112, ♂.
Bassus strigator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1891 p. 63, ♂.
Platylabus (Tricholabus) strigatorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2113 n. 1.

PLATYLABUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 150.
πλατύς, latus; λαμβάνω, capio.

Synon.: Ectopius Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 14.
ἐκτόπιος, peregrinus.
Cryptus Gravenhorst, Hartig, Desvignes.
Hoplismenus Gravenhorst, Stephens, Fonscolombe, Costa.
Ichneumon Fabricius & auct.
Ischnus Destefani, Provancher.
Mesoleptus Gravenhorst.
Phygadeuon Provancher.

afer Kriechb. — ♂ — Eur.: Italia.
Platylabus afer Kriechbaumer, Magretti: Ann. mus. civ. Genova XXVI. 1884 p. 527 n. 4, ♂.
Platylabus afer Kriechbaumer, Magretti: Bull. soc. entom. Ital. XV. 1884 p. 242.
albinus (Grav.) Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Hoplismenus albinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 424 n. 9, ♀.
Hoplismenus errabundus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 425 n. 10, ♂.
Platylabus errabundus Wesmael, Nov. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 162 [n. 14, ♂.
Platylabus errabundus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 312 (Mant. p. 75), ♀.
Platylabus errabundus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 1. 1853 p. 319 (Plat. p. 25), ♀ ♂.
Platylabus albinus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 87 n. 9.
Platylabus errabundus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 23, ♀ ♂.
Platylabus errabundus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 205, ♀ ♂.
Platylabus errabundus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 465 n. 14 [♀ ♂.
Platylabus errabundus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 328 n. 16, ♀ ♂.
Platylabus errabundus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 51, ♂.
Platylabus errabundus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 208 n. 12.
Platylabus errabundus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 125 n. 12.
Platylabus albinus Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. IX. 1890 p. 140.
Platylabus albinus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2110 n. 19, ♀ ♂.
Platylabus errabundus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 326 n. 32, ♀ ♂

---

[1]) *Lep.:* Anticles sinuata, A. rubidata (Brischke).

auriculatus Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Platylabus auriculatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 200 n. 34, ♂.
Platylabus auriculatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 317 n. 8, ♀ ♂.
bakeri Davis — ♂ — Am.: Michigan.
Platylabus Bakeri Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 352, ♂.
borealis Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Platylabus borealis Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 324 n. 13, ♀.
Platylabus borealis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2111 n. 23.
Platylabus rufiventris var. borealis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 324, ♀.
californicus Cress. — ♀ — Am.: California.
Platylabus Californicus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 201 n. 10, ♀.
Platylabus Californicus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 357, ♀.
canadensis Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Platylabus Canadensis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 200 n. 4, ♀.
clarus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Massachusets, New Hampshire.
Ichneumon clarus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 297, ♀.
Platylabus clarus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 199 n. 1, ♀ ♂.
concinnus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Platylabus concinnus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1235 n. 1, ♀ ♂.
Platylabus concinnus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2109 n. 17.
consors Cress. — ♂ — Am.: California.
Platylabus consors Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 200 n. 3, ♂.
Platylabus consors Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 356, ♂.
cothurnatus (Grav.) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Hoplismenus cothurnatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 426 n. 11, ♀.
Hoplismenus orbitatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 428 n. 12, ♂.
Platylabus cothurnatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 157 [n. 6, ♀.
Platylabus cothurnatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 312 (Plat. p. 18), ♀.
Platylabus cothurnatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 87 n. 12.
Platylabus cothurnatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 23, ♀.
Platylabus cothurnatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 464 n. 7, ♀ ♂.
Platylabus cothurnatus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 330 n. 18, ♀.
Platylabus cothurnatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 51, ♂.
Platylabus cothurnatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 124 n. 7.
Platylabus cothurnatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1891 p. 59, ♂.
Platylabus cothurnatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2106 n. 5.
Platylabus cothurnatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 328 n. 37, ♀ ♂.
crococephalus Tosqu. — ♀ — Afr.: Caffraria.
Platylabus crococephalus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 114 n. 4, ♀.
cyaneiviridis Thoms. — ♂ — Eur.: Suecia.
Platylabus uranius Thomson, Opusc. entom. P. 16. 1892 p. 1773 n. 4, ♂ [non Dalman].
Platylabus cyaneoviridis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2105 n. 3.
daemon Wesm.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Belgia, Germania.
Platylabus Daemon Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 163 n. 15, ♂.
Platylabus Daemon Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 316 (Plat. p. 22), ♂.
Platylabus Daemon Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 52, ♀ ♂.
Platylabus Daemon Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 326 n. 4, ♂.

---

[1] *Lep.:* Panolis piniperda (Brischke).
[2] *Lep.:* Bupalus piniaria (Brischke).

decipiens Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota. [n. 10b, ♀.
Platylabus decipiens Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 310 (Mant. p. 73)
Platylabus decipiens Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 319 (Plat. p. 25), ♀ ♂.
Platylabus decipiens Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 24, ♀.
Platylabus decipiens Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 465 n. 15, ♀ ♂.
Platylabus decipiens Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 325 n. 14, ♀ ♂.
Platylabus decipiens Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 52, ♀.
Ischnus Minai Destefani, Natural. Sicil. IV. 1885 p. 187 n. 5, ♀ ♂.
Platylabus decipiens Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2111 n. 25.
Platylabus decipiens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 324 n. 27, ♀ ♂.

dimidiatus (Grav.) Wesm.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Hoplismenus dimidiatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 421 n. 7, ♀ ♂.
Phygadeuon discedens Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 673 n. 171, ♂.
Platylabus dimidiatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 160 [n. 11, ♀ ♂.
Platylabus dimidiatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 311 (Mant. p. 74), ♀ ♂.
Hoplismenus dimidiatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 362 n. 2, ♀ ♂.
Platylabus dimidiatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 321 (Plat. p. 27), ♀ ♂.
Platylabus dimidiatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 409 (Ot. p. 58) n. 2, ♂.
Platylabus dimidiatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 466 n. 18, ♀ ♂.
Platylabus dimidiatus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 332 n. 20, ♀ ♂.
Platylabus dimidiatus var. discedens Marshall, Catal. Brit. Hymen. III. 1872 p. 27 n. 10.
Platylabus dimidiatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 208 n. 10.
Platylabus dimidiatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 126 n. 16.
Platylabus dimidiatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2113 n. 30.
Platylabus dimidiatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 329 n. 40, ♀ ♂.

dolorosus (Grav.) Wesm.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania.
Ichneumon dolorosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 204 n. 57, ♀.
Ichneumon dolorosus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 7 n. 3.
Ichneumon dolorosus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 148 n. 59.
Platylabus sollicitus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 156 n. 5, ♀.
Platylabus dolorosus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 308 (Mant. p. 71), ♀ ♂.
Platylabus dolorosus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 311 (Plat. p. 17), ♀ ♂.
Platylabus dolorosus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 23, ♀.
Ichneumon dolorosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 289 n. 57, ♀.
Platylabus dolorosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 463 n. 5, ♀ ♂.
Platylabus dolorosus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 312 n. 4, ♀ ♂.
Paltylabus dolorosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 51, ♀ ♂.
Platylabus dolorosus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 207 n. 3.
Platylabus dolorosus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 125 n. 8.
Platylabus dolorosus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2106 n. 6.
Platylabus dolorosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 315 n. 5, ♀ ♂.

eurygaster Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Platylabus eurygaster Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 320 n. 9, ♂.
Platylabus eurygaster Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 319 n. 13, ♂.

---

1) *Lep.:* Siona dealbata (Tischbein).

2) *Lep.:* Melanippe fluctuata (Brischke), Depressaria heracliana, D. depressella (Noie, Rondani), Melanippe montanata (Bignell).

3) *Lep.:* Cidaria silaceata (Bridgman).

faustus Tosqu. — ♂ — Afr.: Togo.
Platylabus faustus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 112 n. 3, ♂.
fornicatus Kriechb. — ♀ — Eur.: Austria.
Platylabus fornicatus Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 482, ♀.
Platylabus fornicatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 317 n. 9, ♀.
foxii Davis — ♂ — Am.: New Jersey.
Platylabus Foxi Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 353, ♂.
frustratae Kriechb.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Rhodus.
Platylabus frustatae Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 34, ♀ ♂.
Platylabus frustatae Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 319 n. 15, ♀ ♂.
fugator (Grav.) Wesm. — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon fugator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 254 n. 3723, ♀.
Ichneumon tenuicornis var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 115 n. 5.
Platylabus fugator Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 11 n. 5, ♀.
Platylabus fugator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 320 n. 17, ♀.
geometrae Berth. — ♂ — Eur.: Gallia.
Platylabus Geometrae Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VII. 1894 p. 181, ♂.
Platylabus Geometrae Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 318 n. 12, ♂.
giganticus D. T. — ♂ — Am.: Canada.
Hemiteles gigas Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 59 n. 19, ♂ [nec Kriechbaumer].
Platylabus gigas Davis, Canad. Entomol. XXVII. 1895 p. 288.
Platylabus giganticus m.
gigas Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania.
Platylabus gigas Kriechbaumer, Entom. Nachr. XII. 1886 p. 244 n. 3, ♀.
Platylabus gigas Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 318 n. 11, ♀.
histrio Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Belgia, Germania, Hungaria.
Platylabus histrio Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 412 (Misc. p. 53) n. 1, ♂.
Platylabus varipedalis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 408 (Ot. p. 57) n. 1, ♀ ♂.
Platylabus histrio Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 463 n. 4, ♂.
Platylabus histrio Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 1. 1888 p. 58, ♂.
Platylabus histrio Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 26, ♀.
Platylabus histrio Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 316 n. 6, ♀ ♂.
var. **erberi** Tischb. — ♂ — Eur.: Dalmatia.
Platylabus Erberi Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XX1X. 1868 p. 256 n. 12, ♂.
Platylabus histrio var. Erberi Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 26, ♂.
Platylabus histrio var. Erberi Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 316, ♂.
incabus Davis — ♀ — Am.: Idaho.
Platylabus incabus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 352, ♀.
insperatus Tosqu. — ♂ — Afr.: Togo.
Platylabus insperatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 108 n. 1, ♂.
intermedius Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Platylabus intermedius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 334 n. 9-10, ♂.
Platylabus intermedius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 319 n. 14, ♂.
iridipennis (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon iridipennis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 194 n. 50, ♀ ♂.
Ichneumon iridipennis Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 11 n. 12.
Ichneumon iridipennis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 145 n. 52.
Platylabus iridipennis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 313 (Plat. p. 19), ♀ ♂ [non 1844 & 1848].

---

1) *Lep.:* Cidaria frustata (Kriechbaumer).

Platylabus iridipennis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 23, ♀ ♂.
Platylabus iridipennis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 205, ♀ ♂.
Ichneumon iridipennis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 283 n. 50, ♀ ♂.
Platylabus iridipennis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 124 n. 3, ♀ ♂.
Platylabus iridipennis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2108 n. 12.
Platylabus pedatorius var. iridipennis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 [p. 322, ♀ ♂.
laetepictus (Costa) Kriechb. — ♀ — Eur.: Italia.
Ichneumon laetepictus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli I. P. 2. 1863 p. 36, ♀; T. 2 F. 10.
Platylabus laetepictus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 210 n. 1, ♀.
Platylabus laetepictus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 331 n. 46, ♀.
lariciatae Kriechb. [1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Platylabus lariciatae Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 202 n. 35, ♀ ♂.
Platylabus lariciatae Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 321 n. 18, ♀ ♂.
larvator (Grav.) Wesm. — ♂ — Eur.: Helvetia, Germania, Austria.
Mesoleptus larvator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 25 n. 15, ♂. [Tab. F. 9.
Platylabus varipictus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 317 (Plat. p. 23), ♂;
Platylabus larvator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 410 (Ot. p. 59) n. 3, ♂.
Platylabus larvator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 464 n. 11, ♂.
Platylabus larvator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 327 n. 36, ♂.
latiscapus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Platylabus latiscapus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2110 n. 20, ♀ ♂.
lativentris Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Platylabus lativentris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2109 n. 16, ♀ ♂.
eucogrammus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Hungaria, Russia. [♀ ♂.
Platylabus leucogrammus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 316 (Plat. p. 22),
Platylabus leucogrammus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 23, ♀ ♂.
Platylabus leucogrammus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 464 n. 10,
Platylabus leucogrammus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 315 n. 6, ♀ ♂. [♀ ♂.
Platylabus leucogrammus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 51, ♀ ♂.
Platylabus leucogrammus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 125 n. 9.
Platylabus leucogrammus Thomson, Opusc. entom. P. 15. 1891 p. 2107 n. 8.
Platylabus leucogrammus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 327 n. 35, ♀ ♂.
lineolatus (Prov.) Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Ichneumon lineolatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 82.
Phygadeuon rufipes Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 181.
Platylabus lineolatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 201 n. 11, ♀.
Platylabus lineolatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 38 n. 6, ♀.
Platylabus lineolatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 306 n. 6, ♀.
maestificus Berth. — ♂ — Eur.: Ural.
Platylabus moestificus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 316 n. 7, ♂.
magnificus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Platylabus magnificus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 36 n. 8, ♀.
massajae Grib. — ♂ — Afr. or.
Platylabus Massajae Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 344 n. 9, ♂.
Platylabus Massajae Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 254 n. 1, ♂.
Platylabus Massajae Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 110 n. 2, ♂.
montanus Cress. — ♀ — Am.: New Hampshire.
Platylabus montanus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 200 n. 5, ♀.

---

1) *Lep.:* Eupithecia lariciata (Kriechbaumer).

muticus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Platylabus muticus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2112 n. 26, ♀ ♂.
nigricollis Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Gallia. [n. 12, ♀ ♂.
Platylabus nigricollis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 161
Platylabus nigricollis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 311 (Mant. p. 74), ♀ ♂.
Platylabus nigricollis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 321 (Plat. p. 27), ♀ ♂.
Platylabus nigricollis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 24, ♀.
Platylabus nigricollis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 466 n. 19, ♀ ♂.
Platylabus nigricollis Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 208 n. 11.
Platylabus nigricollis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 125 n. 15, ♀ ♂.
Platylabus nigricollis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 3. 1891 p. 59, ♂.
Platylabus nigricollis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2113 n. 29.
Platylabus nigricollis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 330 n. 41, ♀ ♂.
nigrocyaneus (Grav.) Wesm.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Belgia, Gallia, Germania.
Ichneumon nigrocyaneus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 117 n. 6, ♀.
Ichneumon nigrocyaneus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 6 n. 3.
Ichneumon nigrocyaneus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 129 n. 6, ♀.
Platylabus armatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 155 n. 2, ♀.
Platylabus armatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 309 (Plat. p. 15), ♀.
Platylabus nigrocyaneus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 12 [n. 6, ♀ ♂.
Ichneumon nigrocyaneus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 234 n. 6, ♀.
Platylabus armatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 463 n. 2, ♀.
Platylabus nigrocyaneus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 207 n. 4.
Platylabus nigrocyaneus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2105 n. 2.
Platylabus nigrocyaneus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 313 n. 1, ♀ ♂.
opacitas Davis — ♂ — Am.: Idaho.
Platylabus opacitas Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 353, ♂.
opaculus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [(Mant. p. 72).
Platylabus pedatorius var. 1 & 1b Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 309
Platylabus opaculus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 124 n. 5, ♀ ♂.
Platylabus opaculus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2108 n. 11.
Platylabus opaculus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2404 n. 11.
Platylabus opaculus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 322 n. 21.
orbitalis (Grav.) Wesm.[3]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon subalbellus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 338 n. 126b, ♀.
Ichneumon orbitalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 490 n. 203, ♂.
Ichneumon subalbellus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 171 n. 120.
Ichneumon orbitalis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 191 n. 173, ♂.
Platylabus orbitalis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 158 [n. 8, ♀ ♂.
Platylabus orbitalis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 318 (Plat. p. 24), ♀ ♂.
Platylabus subalbellus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 39 n. 126b.
Platylabus orbitalis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 24, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Hyponomeuta padella (Bridgman).
2) *Lep.:* Fidonia piniaria (Rondani), Trachea piniperda (Ratzeburg), Plusia festucae (Stephens).
3) *Lep.:* Fidonia piniaria (Perris), Lobophora sexalata, Thera juniperata, Melanippe fluctuata (Brischke).

Platylabus orbitalis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 465 n. 12, ♀ ♂.
Platylabus orbitalis Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 322 n. 11, ♀ ♂.
Platylabus orbitalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 52, ♂.
Platylabus orbitalis Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 208 n. 7.
Platylabus orbitalis Parfitt, Rep. & Trans. Devon. Assoc. XIII. 1881 p. 255.
Platylabus orbitalis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2110 n. 21.
Platylabus orbitalis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 324 n. 29, ♀ ♂.

var. **persecutor** (Grav.) Wesm. — ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon persecutor Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 491 n. 203b, ♂.
Ichneumon persecutor Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 191 n. 174.
Platylabus persecutor Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 62 n. 203b.
Platylabus orbitalis var. persecutor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 325, ♂.

ornatus (Prov.) Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon ornatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 181, ♀.
Platylabus ornatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 200 n. 7, ♀.
Platylabus ornatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 36 n. 3, ♀.
Platylabus ornatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 305 n. 3, ♀.

pacificus Harrgt. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Platylabus pacificus Harrington, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 210, ♀.

pactor Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Platylabus pactor Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 164 n. 16, ♀ ♂.
Platylabus pactor Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 313 (Mant. p. 76) n. 16, ♀ ♂.
Platylabus pactor Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 42 (Adn. p. 10), ♀ ♂.
Platylabus pactor Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 321 (Plat. p. 27), ♀ ♂.
Platylabus pactor Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 413 (Misc. p. 54) n. 3, ♀.
Platylabus pactor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 466 n. 20, ♀ ♂.
Platylabus pactor Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 331 n. 19, ♀ ♂.
Platylabus pactor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 52, ♂.
Platylabus pactor Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 208 n. 14.
Platylabus pactor Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 126 n. 15, ♀.
Platylabus pactor Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2112 n. 28, ♀ ♂.
Platylabus pactor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 330 n. 42, ♀ ♂.

pallididens Wesm. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Platylabus pallidens Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 320 (Plat. p. 26), ♀.
Platylabus pallidens Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 465 n. 16, ♀.
Platylabus pallidens Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 323 n. 12, ♀.
Platylabus pallidens Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2111 n. 24.
Platylabus pallidens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 325 n. 30, ♀.

pedatorius (Fabr.) Wesm.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon pedatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 133 n. 4, ♂.
Ichneumon pedatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 55 n. 6, ♂.
Ichneumon pedatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♀.
Ichneumon pedatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256, ♂.
Ichneumon pedatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 295, ♂.
Ichneumon pedatorius Trentepol, Revis. crit. gen. Ichneum. 1825 p. 20 n. 7.

---

[1]) *Lep.:* Eupithecia absynthiaria (Brischke), E. minutata (Bridgman).

[2]) *Lep.:* Hibernia defoliaria (Brischke), Eupithecia sobrinata, E. subnotata (Bignell), E. innotata, E. scopariata (Brischke, Giraud), E. nanata, E. exiguata, E. pimpinellata (Brischke), Pelurga comitata (Gravenhorst), Thera firmata (Bridgman).

Ichneumon pedatorius Trentepol, Isis 1826 p. 67 n. 7, ♀.
Ichneumon pedatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 180 n. 44, ♀ ♂.
Ichneumon pedatorius Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 11 n. 12.
Ichneumon pedatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 142 n. 45.
Ichneumon pedatorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 302 n. 6. [n. 7, ♀ ♂.
Platylabus pedatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 158
Platylabus pedatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 309 (Mant. p. 72), ♀ ♂.
Platylabus pedatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 312 (Plat. p. 18), ♀ ♂.
Platylabus pedatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 43 n. 2, ♀ ♂.
Ichneumon obator Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 5 n. 30, ♂.
Platylabus pedatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 23, ♀.
Ichneumon pedatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 273 n. 44, ♀ ♂.
Platylabus pedatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 464 n. 8, ♀ ♂.
Platylabus pedatorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 317 n. 7, ♀ ♂.
Platylabus pedatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 51, ♂.
Ichneumon obator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 102 n. 135, ♂.
Platylabus pedatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 207 n. 6.
Platylabus pedatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 123 n. 2.
Platylabus pedatorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2107 n. 10.
Platylabus pedatorius Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1895 p. 37.
Platylabus pedatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 321 n. 19, ♀ ♂.

phaleratus (Hal.) Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Ichneumon phaleratus Haliday, Ann. of Nat. Hist. II. 1839 p. 112, ♀.
Ichneumon phaleratus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 216 n. 137, ♀ ♂.
Platylabus phaleratus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 332 n. 47, ♀ ♂.

pullus Wesm. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Platylabus pullus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 315 (Plat. p. 21), ♀.
Platylabus pullus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 464 n. 9, ♀.
Platylabus pullus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 321 n. 10, ♀.
Platylabus pullus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2109 n. 15.
Platylabus pullus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 322 n. 23, ♀.

pumilio Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Lapponia, Suecia, Germania.
Platylabus pedatorius auct. p. p.
Platylabus pumilio Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 319 n. 8, ♀.
Platylabus pumilio Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 124 n. 4, ♀ ♂.
Platylabus pumilio Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2108 n. 13.
Platylabus pumilio Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 322 n. 22, ♀.

punctifrons Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Platylabus punctifrons Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 124 n. 6, ♀ ♂.
Platylabus punctifrons Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2108 n. 14, ♀ ♂.
Platylabus punctifrons Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 322 n. 20, ♀ ♂.

quadricarinatus (Prov.) Cress. — ♂ — Am.: Canada.
Phygadeuon quadricarinatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 180.
Platylabus quadricarinatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 201 n. 9, ♂.
Platylabus quadricarinatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 37 n. 5, ♂.
Platylabus quadricarinatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 306 n. 5, ♂.

ratzeburgii (Htg.) Berth.[1] — ♀ — Eur.: Germania.
Cryptus Ratzeburgii Hartig, Fortschr. Forstw. I. 2. 1838 p. 263.

---

[1] *Lep.*: Bombyx pini, Geometra liturata, G. fulvata (Ratzeburg).

Cryptus Ratzeburgii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 139 n. 2, ♀.
Cryptus Ratzeburgii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 123 n. 2.
Ichneumon Ratzeburgii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 173 n. 44, ♀.
Platylabus Ratzeburgii Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 331 n. 45, ♀.

rubellus (Gmel.) Berth.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Lapponia, Suecia.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 64 n. 261.
Ichneumon rubellus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2704 n. 316.
Ichneumon rubellus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 138 n. 16, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon rubellus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 9 n. 9, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon rubellus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 134 n. 21, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon rubellator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 361 n. 12, ♂.
Ectopius rubellus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 14, ♂.
Ichneumon rubellus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 245 n. 16, ♂.
Platylabus Thedenii Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 329 n. 17, ♀ ♂.
Platylabus Thedenii Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 207, ♀ ♂.
Ectopius rubellus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 84 n. 1, ♂.
Platylabus rubellus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 328 n. 39, ♀ ♂.

rubricapensis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Platylabus rubricapensis Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 329 n. 7, ♀.
Platylabus rubricapensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 768 n. 7, ♀.

ruficornis Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Platylabus ruficornis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 38 n. 13, ♀ ♂.

rufiventris Wesm.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Belgia, Germania, Hungaria.
? Ichneumon Wienkeri Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 138 n. 22, ♀ ♂.
Platylabus rufiventris Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 159 [n. 9, ♀.
Platylabus rufiventris Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 310 (Mant. p. 73), ♀ ♂.
Platylabus rufiventris Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 42 (Adn. p. 10), ♂.
Platylabus rufiventris Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 418 (Plat. p. 24), ♀ ♂; [Tab. F. 10 (♀).
Platylabus rufiventris Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 23, ♀.
? Platylabus Wienkeri Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 24, ♂.
Platylabus rufiventris Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 205, ♂.
Platylabus rufiventris Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 465 n. 13, ♀ ♂.
Platylabus rufiventris Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 208.
Platylabus rufiventris Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 123 n. 10, ♀ ♂.
Platylabus rufiventris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 2111 n. 22.
Platylabus rufiventris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 323 n. 26, ♀ ♂.

rufus Wesm.[3] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Hoplismenus pictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 418 n. 5, ♂ [excl. ♀].
Platylabus rufus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 154 n. 1, ♀.
Platylabus rufus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 307 (Mant. p. 70), ♂.
Platylabus rufus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 309 (Plat. p. 15), ♀ ♂.
Platylabus rufus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 43 n. 1, ♀ ♂.
Platylabus rufus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 413 (Misc. p. 54) n. 2, ♂.
Platylabus rufus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 86 n. 5.

---

[1]) *Lep.:* Emmelesia unifasciaria (Bridgman).
[2]) *Lep.:* Halia wawaria (Brischke), Macaria liturata (Wesmael).
[3]) *Lep.:* Cabera pusaria (Bridgman).

· Platylabus pictus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 463 n. 1, ♀♂.
· Platylabus rufus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 314 n. 5, ♀ ♂.
Platylabus pictus Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXI.. 1878 p. 157 n. 5, ♂; T. 9 F. 2.
Platylabus rufus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 208 n. 1.
Platylabus rufus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 123 n. 11, ♀ ♂.
Platylabus rufus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2107 n. 9.
Platylabus rufus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 314 n. 3, ♀ ♂.

var. **nigriventris** Berth. — ♂ — Eur.
Platylabus rufus var. nigriventris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 314, ♂.

var. **solutus** Berth. — ♀ — Eur.
Platylabus rufus var. solutus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 314, ♀.

scutellatus (Prov.) Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Ischnus scutellatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 111.
Platylabus scutellatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 200 n. 2, ♂.
Platylabus scutellatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 36 n. 1, ♂.
Platylabus scutellatus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 329 n. 1, ♂.
Platylabus scutellatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 304 n. 1, ♂ & p. 769 [n. 1, ♀.

semirufus (Desv.) Bridgm. & Fitch — ♀ — Eur.: Britannia.
Cryptus (Hoplismenus) semirufus Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 50 n. 7, ♀.
Platylabus remirufus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 208 n. 13.
Platylabus semirufus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 331 n. 44, ♀.

signatus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon signatus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 282.
Platylabus signatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 200 n. 6, ♀.
Platylabus signatus Provancher, Natural. Canad. XII. 1879 p. 36 n. 2, ♀.
Platylabus signatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 305 n. 2, ♀.

stålii Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania, Gallia.
Platylabus Stålii Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 327 n. 15, ♀.
Platylabus Stålii Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 51, ♀.
. Platylabus Stålii Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2109 n. 18.
Platylabus Stålii Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 326 n. 33, ♀.

sternoleucus Wesm. — ♂ — Eur.: Belgia, Germania.
Platylabus iridipennis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 162 [n. 13, ♂ [non 1843].
Platylabus iridipennis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 312 (Mant. p. 75), ♂.
Platylabus sternoleucus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 314 (Plat. p. 20), ♂.
Platylabus sternoleucus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 323 n. 25, ♂.

submarginatus Magr.[1] — ♂ — Eur.: Italia.
Platylabus submarginatus (Kriechbaumer) Magretti, Atti soc. ital. sc. nat. XXXVI. 1896 [p. 83, ♂.

suborbitalis Kriechb. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Platylabus suborbitalis Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 55 n. 9, ♀.
Platylabus suborbitalis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 325 n. 31, ♀.

tenuicornis (Grav.) Wesm.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon tenuicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 115 n. 5, ♀♂ [excl. varr.].
Ichneumon tenuicornis Gravenhorst, Monita spec. nigr. Iconeum. 1829 p. 6 n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon tenuicornis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 128 n. 5.
· Platylabus niger Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 155 n. 3, ♀.
Platylabus niger Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 310 (Plat. p. 16), ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Zonosoma punctaria (Magretti).
2) *Lep.:* Platypteryx curvatula (Brischke).

Platylabus tenuicornis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 10 n. 5, ♀ ♂.
Platylabus tenuicornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 23, ♂.
Ichneumon tenuicornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 232 n. 5, ♀ ♂.
Platylabus tenuicornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 463 n. 3, ♀ ♂.
Platylabus tenuicornis Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 308 n. 2, ♀ ♂.
Platylabus tenuicornis Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 207 n. 2.
Platylabus tenuicornis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 123 n. 1.
Platylabus niger Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 199 n. 33.
Ichneumon tenuicornis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 199 n. 33.
Platylabus tenuicornis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2106 n. 4.
Platylabus tenuicornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 320 n. 16, ♀ ♂.

thoracicus Cress. — ♀ ♂ — Am: Canada, United States.
Hoplismenus thoracicus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 288 n. 1, ♂.
Phygadeuon impressus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 281, ♀.
Platylabus thoracicus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 201 n. 8, ♀ ♂.
Platylabus thoracicus Provancher, Natural. Canad. XII. 1879 p. 37 n. 4, ♂.
Platylabus thoracicus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 306 n. 4, ♂.

var. **erythropygus** Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon erythropygus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 79, ♂.
Platylabus thoracicus var. erythropygus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 37.
Platylabus thoracicus var. erythropygus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 [p. 306, ♀.

transversus Bridgm.[1] — ♂ — Eur.: Britannia.
Platylabus transversus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 412, ♂.
Platylabus transversus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 323 n. 24, ♂.

tricingulatus (Grav.) Wesm.[2] — ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon tricingulatus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 341 n. 82, ♂.
Ichneumon tricingulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 505 n. 210, ♂.
Ichneumon tricingulatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 193 n. 179, ♂.
Platylabus tricingulatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 160 [n. 10, ♂.
Platylabus tricingulatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 321 (Plat. p. 27), ♂.
Platylabus tricingulatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 23, ♂.
Platylabus tricingulatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 465 n. 17, ♂.
Platylabus tricingulatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 52, ♂.
Platylabus tricingulatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 208 n. 9.
Platylabus tricingulatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 125 n. 13.
Platylabus tricingulatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2112 n. 27.
Platylabus tricingulatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 328 n. 38, ♂.

uranius (Dalm.) Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon uranius Dalman, Anal. entom. 1823 p. 96 n. 9, ♀.
Platylabus uranius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 308 n. 1, ♀.
Platylabus uranius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2104 n. 1.
Platylabus uranius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 313 n. 2, ♀.

variegatus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Belgia.
Platylabus variegatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 156 [n. 4, ♂.
Platylabus variegatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 311 (Plat. p. 17), ♂.
Platylabus variegatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 464 n. 6, ♂.

---

[1] *Lep.:* Cidaria sagittata (Bridgman).
[2] *Lep.:* Eupithecia pulchellata (Bignell).

Platylabus variegatus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 310 n. 3, ♀ ♂.
Platylabus variegatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 207 n. 5.
Platylabus variegatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1895 p. 2107 n. 7.
Platylabus variegatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 314 n. 4, ♀ ♂.

vibicariae Kriechb.[1] — ♀ — Eur.: Austria inf.
Platylabus vibicariae Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 34.
Platylabus vibicariae Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 324 n. 28, ♀.

volubilis (Grav.) Bridgm. & Fitch[2] — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Cryptus volubilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 507 n. 58, ♂.
Platylabus volubilis Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 208 n. 8.
Platylabus volubilis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 330 n. 43, ♀ ♂.

ERISTICUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 13.

ἐριστικός, iurgiosus.

Synon.: Ichneumon Gravenhorst & auct.

apicalis Ashm. — ♂ — Am.: Wisconsin.
Eristicus apicalis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 388, ♂.

basilaris Ashm. — ♀ — Am.: Wisconsin.
Eristicus basilaris Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 389, ♀.

binotatus Ashm. — ♀ — Am.: Wisconsin.
Eristicus binotatus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 389, ♀.

cinctus Ashm. — ♀ — Am.: Wisconsin.
Eristicus cinctus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 389, ♀.

clericus (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia, Belgia, Germania, Hungaria.
Ichneumon clericus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 140 n. 18, ♂.
Ichneumon fabricator var. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 186 n. 46.
Ichneumon clericus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 11 n. 12.
Ichneumon clericus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 135 n. 23.
Eristicus clericus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 13, ♀ ♂.
Ichneumon clericus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 139 & 140 (Mant. p. 7).
Ichneumon eucephalus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 333 (Mant. p. 96), ♀ ♂.
Eristicus ? clericus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 15 n. 18, ♂.
Ichneumon clericus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 10, ♀.
Ichneumon clericus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 247 n. 18, ♂.
Ichneumon clericus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 399 n. 107, ♀ ♂.
Ichneumon clericus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 41, ♀.
Ichneumon clericus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 102 n. 79, ♀ ♂.
Ichneumon clericus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 225 n. 1, ♀ ♂.

erythrogaster Ashm. — ♀ — Am.: Wisconsin.
Eristicus erythrogaster Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 388, ♀.

minutus Ashm. — ♀ — Am.: Wisconsin.
Eristicus minutus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 388, ♀.

---

1) *Lep.:* Pellonia vibricaria (Kriechbaumer).
2) *Lep.:* Psyche viciella (Bridgman).

EURYLABUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 150.
εὐρύς, latus; λαμβάνω, capio.

Synon.: Mischophorus Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 54.
μίσχος, pediculus; φέρω, fero.
Catadelphus Berthoumieu.
Ichneumon Gravenhorst.

andrei Berth. — ♂ — Eur. centr.
Eurylabus Andrei Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 309 n. 2, ♂.

agilis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Eurylabus agilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 201 n. 1, ♀ ♂.

commodus Davis — ♂ — Am.: Washington.
Eurylabus commodus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 354, ♂.

dirus Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota; Afr.: Algeria.
Ichneumon tristis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 136 n. 15, ♂ [excl. ♀].
Eurylabus dirus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 307 (Plat. p. 13), ♂; [Tab. F. 5 (♂) & 6.
Eurylabus dirus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 406 (Ot. p. 55) n. 2, ♂.
Eurylabus dirus Sauveur, Ann. soc. entom. Belge V. 1861 p. 69.
Eurylabus dirus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 462 n. 2, ♀ ♂.
Eurylabus dirus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 302 n. 1, ♀.
Eurylabus dirus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 206 n. 2, ♂.
Eurylabus dirus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2102 n. 1.
Eurylabus dirus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 310, ♀ ♂.

elongatus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Eurylabus elongatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 205, ♀.

larvatus (Christ) Wesm.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota; Afr.: Algeria.
Ichneumon larvatus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 348, ♀; T. 35 F. 5.
Ichneumon larvatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 160 n. 30, ♀ [non ♂].
Ichneumon larvatus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 12 n. 21.
Eurylabus larvatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 406 (Ot. p. 55) n. 3, ♀.
Ichneumon larvatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 259 n. 30, ♀.
Eurylabus larvatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 463 n. 3, ♀.
Eurylabus larvatus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 303 n. 2, ♀.
Eurylabus larvatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 206 n. 4, ♀ ♂.
Eurylabus larvatus Möller, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 94, ♀ ♂.
Catadelphus Pestrei Berthoumieu, Revue d'entom. IX. 1892 p. 45-56.
Mischophorus flavosignatus Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 54 n. 8, ♂.
Eurylabus vinulator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2102 n. 2.
Eurylabus larvatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 307 n. 1, ♀ ♂.

var. **intrepidus** Wesm. — ♀ — Eur.: Belgia. [n. 1, ♀.
Eurylabus intrepidus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 410 (Misc. p. 51)
Eurylabus larvatus var. intrepidus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 [p. 308, ♀.

---

1) *Lep.:* Bombyx crataegi (Giraud), Eriogaster lanestris (Bridgman), Taeniocampa opima (Mocsáry).

2) *Lep.:* Harpya vinula (Giraud, Mocsáry), Stauropus fagi (Vollenhoven).

os rufus Davis — ♀ — Am.: Illinois.
Eurylabus os rufus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 353, ♀.
rufiventris Berth. — ♂ — Afr.: Algeria.
Eurylabus ruficornis Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VII. 1894 p. 181, ♂.
Eurylabus ruficornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 309 n. 3, ♂.
separatus Davis — ♂ — Am.: Illinois.
Eurylabus separatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 353, ♂.
torvus Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon rufipes Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 131, ♀ [excl. ♂].
Eurylabus torvus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 151 n. 1, ♀ ♂.
Eurylabus torvus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 42 (Adn. p. 10), ♀.
Eurylabus torvus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 304 (Plat. p. 10) [n. 1, ♀ ♂; Tab. F. 4 (♀).
Eurylabus torvus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 305 n. 3, ♀ ♂.
Eurylabus torvus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 206 n. 1, ♀ ♂.
Eurylabus torvus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2102 n. 3.
Eurylabus torvus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 309 n. 4, ♀ ♂.
tristis (Grav.) Wesm.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon tristis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 136 n. 15, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon tristis Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 10 n. 10.
Ichneumon tristis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 134 n. 20, ♀ [non ♂].
Eurylabus corvinus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 152 [n. 2, ♀.
Eurylabus corvinus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 305 (Plat. p. 11) n. 2, ♀.
Eurylabus tristis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XX. P. 3. 1853 p. 307 (Plat. p. 13), ♀ ♂.
Eurylabus tristis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 405 (Ot. p. 54) n. 1, ♀ ♂.
Eurylabus tristis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 22, ♀ ♂.
Ichneumon tristis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 243 n. 15, ♂.
Eurylabus tristis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 462 n. 1, ♀ ♂.
Eurylabus tristis Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 306 n. 4, ♀ ♂.
Eurylabus tristis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 50, ♂.
Eurylabus tristis Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 206 n. 3, ♀ ♂.
Eurylabus tristis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2102 n. 4.
Eurylabus tristis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 310 n. 5, ♀ ♂.

RHYSSOLABUS

(Kriechbaumer) Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 402.
ῥισός, rugosus; λαβή, petiolus.

Synon.: Platymischus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXIX. 1868 p. 257 [non Westwood].
πλατύς, latus; μίσχος, pediculus.

bassicus (Tischb.) Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Tirolia.
Platymischus bassicus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXIX. 1868 p. 257 n. 13, ♀.
Platymischus bassicus Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 181 n. 37, ♂.
Platymischus bassicus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2098 n. 1, ♀ ♂.
Rhyssolabus bassicus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 306, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Lithosia rubricollis (Marshall).
2) *Lep.:* Trachea piniperda, Dianthoecia capsincola (Brischke), D. carpophaga (Giraud).

EPIOPELMUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 111 [Hepiopelmus].
ἤπιος, mitis; πέλμα, palma.

Synon.: Amblyteles Holmgren, Rudow, Berthoumieu.
Ichneumon Linné & auct.

apicalis Brischke — ♂ — Eur.: Borussia.
Hepiopelmus apicalis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 30, ♂.

aureosericeus Taschbg. — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon melanogaster var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 209 n. 61, ♀.
Hepiopelmus aureosericeus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 316 n. 61, ♀.

leucostigmus (Grav.) Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon leucostigmus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 327 n. 65, ♂.
Ichneumon melanogaster Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 209 n. 61, ♀ [p. p.].
Ichneumon melanogaster Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 15 n. 32 [p. p.].
Ichneumon leucostigmus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 446 n. 176, ♂.
Hepiopelmus leucostigmus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 141 n. 1, ♀♂.
Ichneumon melanogaster Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 57 n. 10, ♀ [p. p.].
Hepiopelmus leucostigmus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 41 (Adn. p. 9), ♀.
Hepiopelmus leucostigmus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 137 (Ambl. [p. 63) n. 1, ♀♂.
Hepiopelma leucostigma Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 42 n. 1, ♀♂.
Hepiopelmus leucostigmus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 21, ♀.
Ichneumon melanogaster Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 294 [n. 61 [p. p.].
Hepiopelmus leucostigmus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 460 n. 1, [♀♂.
Amblyteles incorruptus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 239 n. 17, ♀.
Hepiopelmus leucostigmus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 280 n. 1, ♀ ♂.
Hepiopelmus leucostigmus Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 43; T. 27 F. 5.
Hepiopelmus leucostigmus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 111 n. 61, ♀♂.
Hepiopelmus leucostigmus Holmgren, Entom. Tidsskr. III. 1882 p. 87-89.
Amblyteles palliventris Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 88 n. 10, ♀.
Hepiopelmus leucostigmus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2098 n. 1.
Amblyteles leucostigmus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 633 n. 92, ♀♂.

var. **melanogaster** (Gmel.) D. T. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 57 n. 143.
Ichneumon melanogaster Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2678 n. 224.
Ichneumon melanogaster Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 209 n. 61, ♀ [p. p.].
Ichneumon melanogaster Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 15 n. 32 [p. p.].
Ichneumon melanogaster Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 57 n. 10, ♀ [p. p.].
Ichneumon melanogaster Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1876 p. 294 [n. 61 [p. p.].
Amblyteles leucostigmus var. melanogaster Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. [1895 p. 634, ♀♂.
Epiopelmus leucostigmus var. melanogaster m.

var. **quadriguttatus** Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Hepiopelmus leucostigmus var. quadriguttata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 [p. 202 n. 48, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Simyra albovenosa (Holmgren), Oedonestis potatoria (Bignell).

ANISOBAS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 111 & 145.
ἄνισος, impar; βαίνω, incedo.

Synon.: Hepiopelmus Wesmael.
Ichneumon Gravenhorst, Stephens, Fonscolombe.

buccatus Kriechb. — ♀ — Eur.: Hispania.
Anisobas buccatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 241, ♀.
Anisobus buccatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 301 n. 6, ♀.

cephalotes Kriechb.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Hungaria.
Anisobas cephalotes Kriechbaumer, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 242, ♀ ♂.
Anisobas cephalotes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 302 n. 7, ♀ ♂.

cingulatorius (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon cingulatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 309 n. 42, ♂.
Ichneumon cingulatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 340 n. 128, ♀ ♂.
Anisobas cingulatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 145 n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon cingulatorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 64 n. 24, ♀ ♂.
Ichneumon cingulatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 139 & 305 (Mant. [p. 68), ♀ ♂.
Anisobas cingulatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 138 (Ambl. p. 64) [n. 2, ♀ ♂.
Anisobas cingulatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 204, ♀ ♂.
Anisobas cingulatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 461, ♀ ♂.
Anisobas cingulatorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 288 n. 1, ♀ ♂.
Anisobas cingulatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 122 n. 4, ♀ ♂.
Anisobas cingulatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 300 n. 2, ♀ ♂.

flaviger Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Hepiopelmus flaviger Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 220 [n. 4, ♀.
Anisobas flaviger Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 138 (Ambl. p. 64) n. 1, ♀.
Anisobas flaviger Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 92, ♂.
Anisobas flaviger Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 299 n. 1, ♀ ♂.

hostilis (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon hostilis Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 309 n. 41, ♀.
Ichneumon hostilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 339 n. 127, ♀.
Ichneumon hostilis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 171 n. 121, ♀.
Anisobas rebellis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 145 n. 2, ♀.
Ichneumon rebellis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 139 & 305 (Mant. [p. 68), ♀ ♂.
Anisobas rebellis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 138 (Ambl. p. 64) n. 3, ♀ ♂.
Anisobas rebellis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 22, ♀ ♂.
Anisobas hostilis Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 131 n. 1.
Anisobas hostilis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 121 n. 1, ♀ ♂.
Anisobas rebellis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2089 n. 1.
Anisobas hostilis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2099 n. 2.
Anisobas hostilis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 301 n. 4, ♀ ♂.

laticeps Berth. — ♀ — Afr.: Algeria, Marocco.
Anisobas laticeps Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VIII. 1895 p. 161, ♀.
Anisobas laticeps Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 302 n. 8, ♀.

---

[1] *Lep.:* Lycaena jolas (Mocsáry).

parviceps Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Anisobas parviceps Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 122 n. 3, ♀.
Anisobas parviceps Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 300 n. 3, ♀.
platystylus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia.
Anisobas platystylus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 122 n. 2, ♀ ♂ [err.].
Anisobas platylabus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2099 n. 3.
Anisobas platystylus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1894 p. 301 n. 5, ♀ ♂.
quadrinotatus Kriechb. — ♀ — Afr.: Loango.
Anisobas quadrinotatus Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 44 n. 3, ♀.

HYBOPHORUS

Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVI. 1875 p. 281.
ὕβος, gibbus; φέρω, porto.

Synon.: Hoplismenus Wesmael.
Ichneumon Gravenhorst, Tischbein, Berthoumieu.

aulicus (Grav.) Tischb. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia, Germania, Volhynia.
Ichneumon aulicus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 562 n. 235, ♂.
Hoplismenus aulicus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 396 (Ot. p. 45) n. 4, ♂.
Ichneumon flavipetiolatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 436 n. 132, ♂.
Hybophorus aulicus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVI. 1875 p. 281 n. 2, ♀ ♂.
Ichneumon flavipetiolatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 287 n. 18, ♂.
Ichneumon auxifer Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 288 n. 19, ♂.
Ichneumon auxifer Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 591 n. 35, ♀.
Ichneumon auxifer Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2401.
Hybophorus aulicus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 291, ♀ ♂.

AMBLYTELES

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 111.
ἀμβλύς, obtusus; τέλος, finis.

Synon.: Ctenichneumon Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2082.
κτεῖς, pecten; Ichneumon, nom. propr. Hymen.
Pseudamblyteles Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XIII. 1900 p. 18.
ψευδής, falsus; Amblyteles, nom. propr. Hymen.
Spilichneumon Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2080.
σπῖλος, macula; Ichneumon, nom. propr. Hymen.
Crypturus Lamarck.
Cryptus Panzer.
Hepiopelmus Wesmael, Taschenberg, Vollenhoven, Bridgman & [Fitch.
Hoplismenus Cresson.
Ichneumon Linné & auct. ant.
Protichneumon Thomson.
Trogus Nurque.

adsentator Tischb. — ♂ — Eur.: Austria, Germania.
Amblyteles adsentator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 184 n. 30, ♂.
Amblyteles adsentator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 170 n. 17, ♂.
adventor Berth. — ♀ — Afr.: Tunisia.
Amblyteles adventor Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 43, ♀.
Amblyteles adventor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France XLIV. 1895 p. 609 n. 51, ♀.

aemulus Berth. — ♀ — Afr.: Algeria.
Amblyteles aemulus Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VIII. 1895 p. 161, ♀.
Amblyteles aemulus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France XLV. 1896 p. 398, ♀.
albomarginatus Kriechb. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Amblyteles albomarginatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 45, ♂.
Amblyteles albomarginatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France XLIV. 1895 p. 622 n. 73, ♂.
alpestris Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Amblyteles alpestris Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 229 n. 10, ♂.
Amblyteles alpestris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France XLIV. 1895 p. 614 n. 62, ♂.
amatorius (Müll.) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Linné, Act. Suec. 1736 p. 126 n. 24.
Ichneumon LX Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768; T. 116 F. 6.
? Ichneumon ambulatorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 329 n. 10, ♀.
Ichneumon amatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 151 n. 1758, ♀.
? Ichneumon ambulatorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 422 n. 10, ♀.
? Ichneumon ambulatorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 260 n. 11, ♀.
? Ichneumon ambulatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 139 n. 13, ♀.
? Ichneumon ambulatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2676 n. 81, ♀.
? Ichneumon ambulatorius Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 37 n. 747, ♀.
? Ichneumon ambulatorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 349, ♀.
? Ichneumon ambulatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 166 n. 12, ♀.
Ichneumon ambulatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 139 n. 26, ♀.
Ichneumon laboratorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 142 n. 36, ♂.
Ichneumon ambulatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 58 n. 22, ♀.
Ichneumon laboratorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 61 n. 33, ♂.
Ichneumon laboratorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 111, ♂.
Ichneumon ambulatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 111, ♀ ♂.
Ichneumon ambulatorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 58 n. 747, ♀.
Ichneumon ambulatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253, ♀.
Ichneumon laboratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277, ♀.
Ichneumon ambulatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 288, ♀.
Ichneumon laboratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 355, ♂.
Ichneumon ambulatorius v. d. Höven, Bijdr. naturk. Wet. I. 1826 p. 438 n. 10, ♀.
Ichneumon ambulatorius Trentepol, Isis 1826 p. 231 n. 48, ♀.
Ichneumon laboratorius Trentepol, Isis 1826 p. 232 n. 49, ♂.
Ichneumon amatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 315 n. 112, ♀.
Ichneumon luctatorius var. 4 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 414, ♂.
Ichneumon laboratorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 962 n. 118, ♂.
Ichneumon laboratorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 168 n. 112, ♂.
Ichneumon amatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 168 n. 113, ♀.
Ichneumon amatorius Curtis, Brit. Entom. XVI. 1839 p. 724, ♀; T. 724.
Amblyteles amatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 123 [n. 17, ♀ ♂.
Amblyteles amatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique Annexe 1854 p. 85 (Ambl. p. 11),
Amblyteles amatorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 219 n. 4, ♀ ♂. [n. 7, ♀ ♂.
Amblyteles amatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 414 n. 9, ♀ ♂.
Amblyteles amatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 47, ♀ ♂.
Amblyteles amatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 61 & 79 n. 7, ♀ ♂.
Amblyteles amatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 n. 117 n. 17, ♀ ♂.

[1]) *Lep.:* Polysphaenis sericatae, Agrotis linogrisea (Mocsáry), Noctua polyodon (Boie).

Ichneumon (Amblyteles) amatorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2097 n. 21, ♀ ♂.
Amblyteles amatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France XLIV. 1895 p. 626 n. 80, ♀ ♂.

ammonius (Grav.) Taschbg. — ♀ — Eur. centr.
Ichneumon Ammonius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 301 n. 31, ♀ [non ♂].
Ichneumon Ammonius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 279 n. 92, ♀ [non ♂].
Ichneumon Ammonius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 160 n. 92.
Ichneumon Ammonius Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 33 n. 92, ♀ [non ♂].
Amblyteles Ammonius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 452 n. 27, ♀ [non ♂].
Amblyteles Ammonius Jacoby, Ann. soc. entom. Belgique XXXI. 1887 C. R. p. XLIII, ♀.
Ichneumon Ammonius Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 290 n. 24, ♀.
Amblyteles Ammonius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 648 n. 114, ♀.

amputatorius (Panz.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon XXXIX Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 73 F. 9.
Ichneumon LIII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768; T. 103 F. 4.
? Ichneumon erectorius Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 221 n. 63-64, ♂.
? Ichneumon erectorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 65 n. 56, ♂.
Ichneumon amputatorius Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 89, ♀ ♂.
Ichneumon culpator Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 113, ♀.
? Ichneumon erectorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♂.
Ichneumon amputatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 344 n. 85, ♂.
? Ichneumon erectorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277, ♂.
? Ichneumon erectorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 353, ♂.
? Ichneumon erectorius Trentepol, Isis 1826 p. 218 n. 35.
Ichneumon amputatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 523 n. 217, ♀ ♂.
Ichneumon amputatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 194 n. 182.
Amblyteles amputatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 132 n. 28, ♀ ♂.
Amblyteles amputatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 302 (Mant. p. 65), ♀ ♂.
Amblyteles amputatorius Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 64 n. 217.
Ichneumon (Ctenichneumon) amputatorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2084 n. 1.
Amblyteles fossorius var. amputatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France XLIV. 1895 p. 588, ♀ ♂.

anceps Cress. — ♀ ♂ — Am.: Connecticut, Delaware.
Ichneumon anceps Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 309, ♀ ♂.
Amblyteles anceps Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 193 n. 32, ♀ ♂.

angustus Berth. — ♀ — As.: Transcaspia.
Amblyteles angustus Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 43, ♀.
Amblyteles angustus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 611 n. 55, ♀.

anurus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Amblyteles anurus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 114 n. 10, ♀ ♂.
Ichneumon (Amblyteles) anurus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2095 n. 13, ♀ ♂.
Amblyteles anurus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France XLIV. 1896 p. 637 n. 97, ♀ ♂.

apiatus Tosqu. — ♀ — Afr.: Caffraria.
Amblyteles apiatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 95 n. 12, ♀.

arduus Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia.
Amblyteles arduus Berthoumieu, Rev. sc. nat. Bourbonnais IX. 1896 p. 195, ♀ ♂.
Amblyteles arduus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France XLV. 1896 p. 398, ♀ ♂.

armatorius (Först.) Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota; Afr.: Algeria.
Ichneumon LXXX Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 2. 1769; T. 183 F. 7.
Ichneumon armatorius Förster, Nov. spec. Insect. 1771 p. 82 n. 82, ♂.
Ichneumon fasciatorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 330 n. 17, ♂.
Ichneumon fasciatorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 423 n. 17, ♂.
Ichneumon fasciatorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 261 n. 21, ♂.
? Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 63 n. 248.
Ichneumon fasciatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 149 n. 43, ♂.
Ichneumon notatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 159 n. 73.
Ichneumon fasciatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2680 n. 93, ♂.
Ichneumon dimicatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2680 n. 198, ♂.
? Ichneumon quadrimaculatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2702 n. 304.
Ichneumon fasciatorius Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 38 n. 749, ♂.
Ichneumon bidentorius Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 39 n. 751 ♂.
Ichneumon armatorius Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 39 n. 752, ♂.
Ichneumon fasciatorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 338, ♂.
Ichneumon fasciatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 170 n. 32, ♂.
Ichneumon bidentorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 172 n. 40, ♂.
Ichneumon signatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 216 n. 52.
Ichneumon fasciatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 143 n. 39, ♂.
Ichneumon quadrimaculatus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 283 n. 2090, ♀.
Ichneumon fasciatorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 53 n. 23, ♂.
Ichneumon fasciatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 61 n. 36, ♂.
Ichneumon fasciatorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca II. 1807 p. 59 n. 749, ♂.
Ichneumon bidentorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 60 n. 751, ♂.
Ichneumon armatorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 60 n. 752, ♂.
Ichneumon fasciatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♂.
Ichneumon fasciatorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. Curios. IX. 1818 p. 284, ♂.
Ichneumon quadrimaculatus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 317 n. 52, ♀.
Ichneumon fasciatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 317 n. 53, ♂.
Ichneumon nugatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277.
Ichneumon nugatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 354.
Ichneumon fasciatorius Trentepol, Isis 1826 p. 79 n. 24.
Ichneumon fasciatorius Germar, Fauna Insect. Europ. P. 14. 1828; Tab. 18, ♂.
Ichneumon quadrimaculatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 370 n. 172 [recte 142], ♀.
Ichneumon fasciatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 376 n. 144, ♂ [excl. ♀].
? Ichneumon quadrimaculatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1014 n. 202.
Ichneumon fasciatorius Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 380 n. 839, ♂.
Ichneumon diversorius (Marshall) Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 175 [n. 129, ♀.
? Ichneumon quadrimaculatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 176 n. 132.
Ichneumon fasciatorius (♂) & quadrimaculatus (♀) Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. P. 2. [1839 p. 448 & 449, ♀ ♂.
Amblyteles fasciatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 113 [n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon quadrimaculatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 66 [n. 232, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Brotolonia meticulosa (Taschenberg), Vanessa Atalanta, Saturnia carpini, Agrotis Ashworthii (Bignell), A. fimbria (Mocsáry), A. segetum (Marshall), Xylophasia rurea, Mamestra brassicae, Tryphaena orbona (Bignell), T. pronuba (Bridgman), Noctua brunnea (Bignell), N. xanthographa (Mosley).

Ichneumon fasciatorius Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 332 n. 394, ♂.
Ichneumon quadrimaculatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 68 n. 32, ♀.
Ichneumon fasciatorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 69 n. 34, ♂.
Amblyteles fasciatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 84 (Ambl. p. 10) [n. 5, ♀ ♂.
Amblyteles armatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 39 n. 1, ♀ ♂.
Amblyteles fasciatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 16, ♀ ♂.
Ichneumon fasciatorius Hagen, Stettin. entom. Zeitg. XXII. 1861 p. 284 n. 103, ♀.
Amblyteles regius Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXIX. 1868 p. 251 n. 7, ♀ ♂.
Amblyteles fasciatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 414 n. 6, ♀ ♂.
Amblyteles fasciatorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 218 n. 3, ♀ ♂.
Amblyteles fasciatorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 10; T. 7 F. 1 (♂) & 2 (♀.
Amblyteles fasciatorius Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXI. 1877 [p. 50.
Amblyteles fasciatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 47, ♂.
Amblyteles armatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 77 n. 5, ♀ ♂.
Amblyteles fasciatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 116 n. 15.
Ichneumon (Amblyteles) fasciatorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2094 n. 9.
Amblyteles armatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 618 n. 66, ♀ ♂.

ater (Luc.) Berth. — ♂ — Afr.: Algeria.
?? Ichneumon ater Lucas, Explor. sc. Algérie. 1849 p. ??
Amblyteles? ater Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 653 n. 124, ♂.

ater Wesm. — ♀ — Eur.: Germania, Helvetia.
Amblyteles ater Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 407 (Misc. p. 49) n. 2, ♀.
Amblyteles ater Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 454 n. 35, ♀.
Amblyteles ater Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 613 n. 60, ♀.

var. **punctatus** Berth. — ♀ — Eur.: Germania, Helvetia. [1895 p. 614, ♀.
Amblyteles ater var. punctatus (Kriechbaumer) Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV.

aterrimus Brischke![1]) — ♀ — Eur.: Germania.
Amblyteles aterrimus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 19, ♀.

aterrimus Tischb. — ♂ — Eur.: Graecia.
Amblyteles aterrimus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 36 n. 26, ♂ [non Brischke].
Amblyteles aterrimus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 167 n. 11.
Amblyteles aterrimus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 615 n. 63, ♂.

atratorius (Fbr.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia, Belgia, Germania, Austria, Italia.
Ichneumon atratorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 134 n. 8, ♀.
Ichneumon atratorius Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 156 n. 478, ♀.
Ichneumon atratorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 56 n. 10, ♀.
Ichneumon atratorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♀.
Ichneumon viridatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 324 n. 62, ♂.
Ichneumon atratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255, ♀.
Ichneumon atratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 295, ♀.
Ichneumon atratorius Trentepol, Isis 1826 p. 76, ♀.
Ichneumon viridatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 428 n. 168, ♀ ♂.
Ichneumon atratorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 891 n. 25, ♀.
Ichneumon viridatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 184 n. 153, ♀ ♂.
Amblyteles viridatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 295 (Mant. p. 58) [n. 2b, ♂ (♀).
Amblyteles viridatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 89 (Ambl. p. 15) [n. 13, ♂.

---

1) *Lep.:* Pygaera curtula (Brischke).

Amblyteles atratorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 89 (Ambl. p. 15) [n. 14, ♀.
Ichneumon atratorius Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 53 [n. 168, ♀ ♂.
Amblyteles viridatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 416 [n. 14, ♀ ♂.
Amblyteles notatorius Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 178 n. 28.
Amblyteles atratorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 61 & 78 n. 11, ♀.
Ichneumon (Amblyteles) atratorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2096 n. 17.
Amblyteles atratorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 624 n. 76, ♀ ♂.

var. **orientalis** Berth. — ♀ — As.: Syria. [p. 625, ♀.
Amblyteles atratorius var. orientalis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895

auxifer Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Amblyteles auxifer Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 82 n. 4, ♀.

belangeri Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Amblyteles Belangeri Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 190 n. 11, ♀.
Amblyteles Belangeri Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 8 n. 8, ♀.
Amblyteles Belangeri Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 297 n. 8, ♀.

bellemitus Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Amblyteles bellemitus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 90 n. 13, ♀ ♂.

bicingulatus (Grav.) Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon bicingulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 297 n. 101, ♀.
Ichneumon bicingulatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 36 n. 101.
? Amblyteles interruptus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 237 n. 15, ♀.
? Amblyteles interruptus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 113 n. 4, ♀.
Amblyteles bicingulatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 629 n. 84, ♀ ♂.

bicolor Rdw.! — ♀ — Eur.: Italia, Graecia.
Amblyteles bicolor Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 133 n. 32, ♀.

bicolor Kriechb. — ♀ (♂) — Eur.: Gallia; Afr.: Algeria.
Amblyteles bicolor Kriechbaumer, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 240, ♀.
Amblyteles bicolor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 602 n. 37, ♀ (♂).

bifasciatus (Prov.) Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Ichneumon bifasciatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 75.
Amblyteles bifasciatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 190 n. 14, ♀.
Amblyteles bifasciatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 9 n. 9, ♀.
Amblyteles bifasciatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 297 n. 9, ♀.

binotatus Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Helvetia.
Amblyteles binotatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 350 n. 39, ♀ ♂.
Amblyteles binotatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 25, ♂.
Amblyteles binotatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 614 n. 61, ♀ ♂.

bipunctatus Rdw.! — ♀ — Eur.: Gallia.
Amblyteles bipunctatus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 121 n. 19, ♀.

bizonatus Rdw.! — ♀ — Eur.: Gallia.
Amblyteles bizonatus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 135 n. 36, ♀.

bolivari Berth. — ♀ — Eur.: Hispania.
Amblyteles Bolivari Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VII. 1894 p. 179, ♀.
Amblyteles Bolivari Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 603 n. 38, ♀.

borealis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Amblyteles borealis Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 328 n. 22, ♀.
Amblyteles borealis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 767 n. 22, ♀.

caeruleator (Zett.) Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Germania.
Ichneumon coeruleator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 359 n. 5, ♀ ♂.
Amblyteles coeruleator Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1871 p. 278 n. 43, ♀ ♂. [♀♂.
Ichneumon (Amblyteles) Diasemae Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVIII. 1877 p. 497,
Amblyteles Diasemae Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 184 n. 29, ♀ ♂.
Amblyteles coeruleator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 30, ♂.
Amblyteles caeruleator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 597 n. 32, ♀ ♂.

camelinus Wesm.[2] — ♀ ♂ — Eur. centr.
? Ichneumon calceatorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 80 T. 15.
? Cryptus calceatorius Panzer, Krit. Rev. II. 1806 p. 69.
? Ichneumon calceatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♂.
Ichneumon castigator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 124 n. 107, ♀ [excl. ♂].
? Ichneumon calceatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1072 n. 303.
Ichneumon compunctor Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. ?, ♂.
Amblyteles camelinus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 129 [n. 25, ♀.
Amblyteles camelinus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 299 (Mant. [p. 62), ♀ (♂).
Amblyteles camelinus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 122 (Ambl. p. 48) [n. 39, ♀♂.
Amblyteles camelinus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 402 (Ot. p. 51) n. 5, ♀.
Amblyteles camelinus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 17, ♀.
Amblyteles camelinus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 460 (Doc. p. 20) [n. 1, ♀ ♂.
Amblyteles camelinus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 455 n. 41, ♀ ♂.
? Amblyteles ineptus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 273 n. 39, ♀ ♂.
Amblyteles camelinus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 48, ♀♂.
? Ichneumon brunnipes Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 23 n. 6, ♂.
Amblyteles camelinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 594 n. 25, ♀♂.

var. **brischkei** Berth. — ♀ — Eur.: Germania.
Amblyteles camelinus var. Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 48.
Amblyteles camelinus var. Brischkei Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 594, ♀.

var. **malignus** Tischb.[3] — ♂ — Eur.: Austria.
Amblyteles malignus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXIX. 1868 p. 254 n. 10, ♂.
Amblyteles camelinus var. rufomaculata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 162 n. 1.
Amblyteles camelinus var. malignus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 594, ♂.

capitatus Berth. — ♀ — As.: Transcaspia.
Amblyteles capitatus Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 43, ♀.
Amblyteles capitatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 610 n. 52, ♀.

carnifex Kriechb. — ♀ ♂ — As.: Turcestania.
Amblyteles carnifex Kriechbaumer, Termész. Füzet. VI. 1882 p. 149 n. 11, ♀ ♂.
Amblyteles carnifex Berthomieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 605 n. 42, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Plusia diasemae (Tischbein).

2) *Lep.:* Vanessa cardui, V. antiopa (Taschenberg, Kriechbaumer), V. xanthomelas, V. polychlorus, V. atalanta, V. urticae, V. prorsa, V. Jo (Kriechbaumer, Mocsáry), Sphinx elpenor (Mocsáry).

3) *Lep.:* Vanessa cardui (Kriechbaumer).

castanopygus (Steph.) Bridgm. & Fitch [1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Gallia, Helvetia, [Germania.
Ichneumon castanopyga Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 197 n. 192.
Amblyteles rubriventris Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 116 (Ambl. p. 42) [n. 33, ♀ ♂.
Amblyteles rubriventris Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 453 n. 32, ♀ ♂.
Amblyteles rubriventris Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 254 n. 25, ♀ ♂.
Amblyteles castaneopygus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 81 n. 25, ♀ ♂.
Amblyteles rubriventris Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 113 n. 5.
Ichneumon (Amblyteles) rubriventris Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2094 n. 10, ♀ ♂.
Amblyteles castanopygus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 607 n. 46, ♀ ♂.

castigator (Fabr.) Wesm. [2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon XXXVI Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 72 F. 4.
? Ichneumon certator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 157 n. 1822.
Ichneumon LXXXV Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. III. 1779; T. 221 F. 3.
? Ichneumon abrogator Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 367 n. 740, ♀.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 61 n. 199.
? Ichneumon abrogator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 183 n. 146.
? Ichneumon abrogator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ᵃ I. 5. 1790 p. 2697 n. 171.
? Ichneumon adustus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ᵃ I. 5. 1790 p. 2699 n. 268.
? Ichneumon cardui Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ᵃ I. 5. 1790 p. 2711 n. 187.
? Ichneumon abrogator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 222 n. 93.
Ichneumon castigator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 166 n. 135, ♀ ♂.
? Ichneumon cardui Schrank, Fauna Boica II. P. 2. 1802 p. 272 n. 2070, ♀ ♂.
? Ichneumon ruficingulus Schrank, Fauna Boica II. P. 2. 1802 p. 275 n. 2073, ♀.
? Ichneumon pulsator Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 186.
Ichneumon castigator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 68 n. 77, ♀ ♂.
Ichneumon castigator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♀ ♂.
Ichneumon castigator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 283 n. 6, ♀ ♂.
Ichneumon castigator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 274, ♀ ♂.
Ichneumon castigator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 348, ♀ ♂.
Ichneumon castigator Trentepol, Revis. crit. gen. Ichneum. 1825 p. 22 n. 10, ♀ ♂.
Ichneumon castigator Trentepol, Isis 1826 p. 69 n. 10. [& var. 1].
Ichneumon castigator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 124 n. 10 [non 20], ♂ [excl. ♀
? Ichneumon abrogator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 987 n. 147, ♀.
Ichneumon castigator Gravenhorst, De spec. nigris Ichneum. 1829 p. 9 n. 7, ♀ ♂.
Ichneumon castigator Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 380 n. 738.
Ichneumon castigator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 131 n. 11.
Ichneumon castigator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 360 n. 10, ♀ ♂.
Ichneumon castigator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 302 n. 3. [n. 24, ♀ ♂.
Amblyteles castigator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 129
Ichneumon castigator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 53 n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon castigator Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 478 n. 6.
Amblyteles castigator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 123 (Ambl. p. 49)
Ichneumon castigator Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 89 n. 9, ♂. [n. 40, ♀ ♂.
Ichneumon castigator Kolenati, Jahresh. naturw. Sect. mähr.-schles. Ges. f. Ackerbau etc. [f. 1858 p. 45 n. 9.

---

1) *Lep.:* Dasypolia templi (Newman), Xanthia cerago (Bignell).

2) *Lep.:* Vanessa atalanta (Brischke etc.), V. Jo (Giraud, Stephens), V. cardui (Schrank, Stephens), Mamestra oleracea (Kriechbaumer), Gortyna flavago (Marshall), Cucullia absynthi (Boie), Cleora viduaria (Ratzeburg), Nonagria sparganii (Mocsáry).

Amblyteles castigator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 17, ♀♂.
Ichneumon castigator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 237 n. 10, ♀♂.
Amblyteles castigator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 455 n. 42, ♀♂.
Amblyteles castigator Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 272 n. 38, ♀♂.
? Amblyteles cardui Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. III. P. 9. 1872 p. 477.
Amblyteles castigator Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 60 n. 27, ♀♂.
Ichneumon (Ctenichneumon) castigator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2087 n. 10.
Amblyteles castigator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 595 n. 27, ♀♂.

caucasicus Berth. — ♀ — As.: Caucasus.
Amblyteles Caucasicus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 603 n. 39, ♀.

celsus Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Caffaria.
Amblyteles celsus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 87 n. 8, ♀♂.

cerinthius (Grav.) Marsh.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia, Italia.
Ichneumon cerinthius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 303 n. 34, ♀.
Ichneumon cerinthius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 284 n. 95, ♀.
Ichneumon cerinthius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 961 n. 95, ♀.
Ichneumon cerinthius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 60 n. 16, ♀.
Amblyteles cerinthius Marshall, Entom. M. Magaz. XIV. 1878 p. 278, ♂ (♀).
Amblyteles cerinthius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 78, ♀♂.
Amblyteles cerinthius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 638 n. 98, ♀.

chalybeatus (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Helvetia, Hungaria.
Ichneumon chalybeatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 448 n. 178, ♀ [false ♂].
Amblyteles chalybeatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 58 n. 178, ♀.
Amblyteles chalybeatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 454 n. 37, ♀.
Ichneumon chalybeatus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXIV. [1880 p. 99–103, ♂.
Amblyteles chalybeatus Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VII. P. 8. 1887 [p. 307, ♂.
Amblyteles chalybeatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 632 n. 90, ♀♂.

var. **quadriguttatus** Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Amblyteles quadriguttatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 202 n. 48, ♀♂.
Amblyteles chalybeatus var. quadriguttatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. [1895 p. 632, ♀.

citrinus (Prov.) D. T. — ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon citrinus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 31 n. 85, ♂.
Hepiopelmus citrinus Davis, Canad. Entomol. XXVII. 1895 p. 287.
Amblyteles citrinus m.

collaris Rdw.! — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Amblyteles collaris Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 124 n. 24, ♀♂.

coloradensis Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Amblyteles Coloradensis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 193 n. 28, ♀.

concitor Tosqu. — ♂ — Afr.: Caffaria.
Amblyteles concitor Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 84 n. 6, ♂.

conspurcatus (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia, Belgia, Helvetia, Italia, [Hungaria.
Ichneumon conspurcatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 409 n. 161, ♂.
Amblyteles conspurcatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 107 (Ambl. p. 33) [n. 29, ♂; Tab. F. 5 (♂) & 6.
Amblyteles conspurcatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 453 n. 30, ♂.
Amblyteles conspurcatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 61 & 81 n. 24, ♂.
Amblyteles conspurcatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 601 n. 34, ♀♂.

---

[1]) *Lep.:* Acherontia atropos (Marshall).

var. **bipustulatus** Wesm. — ♀ — Eur. centr. [n. 30, ♀.
Amblyteles bipustulatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 113 (Ambl. p. 39)
Amblyteles bipustulatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 453 n. 31, ♀.
Amblyteles conspurcatus var. bipustulatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. [1895 p. 601, ♀.
var. **duponchelii** (Fonsc.) D. T. — ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon conspurcatus var. Duponchelii (Fonscolombe) Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. [Annexe 1854 p. 142 (Ambl. p. 68), ♂; Tab. F. 7.
Amblyteles conspurcatus var. Duponchelii m.
var. **nigripes** (Grav.) Berth. — ♂ — Eur. centr.
Ichneumon nigripes Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 476 n. 193, ♂.
Ichneumon nigripes Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 402 n. 48, ♂.
Ichneumon nigripes Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 142 (Ambl. p. 68), ♂; [Tab. F. 8 (♂) & 9.
Amblyteles conspurcatus var. nigripes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 602, ♂.
contractus Ashm. — ♀ — Am.: Alaska.
Amblyteles contractus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 392, ♀.
contristans Rdw. — ♀ — Eur.: Germania.
Amblyteles contristans Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 89 n. 11, ♀.
cookii Ashm. — ♀ — Am.: Michigan.
Amblyteles Cookii Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 392, ♀.
coracinus Berth. — ♀ — Eur.: Hispania, Gallia; Afr.: Algeria.
Amblyteles coracinus Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VII. 1894 p. 179, ♀.
Amblyteles coracinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 596 n. 29, ♀.
crispatorius (L.) Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon crispatorius Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 561 n. 12, ♀.
Ichneumon crispatorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 399 n. 1588, ♀.
Ichneumon crispatorius Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 930 n. 11, ♀.
Ichneumon crispatorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 329 n. 13, ♀. [T. 26 F. 3.
Ichneumon crispatorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 846 n. 11, ♀;
Ichneumon crispatorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 422 n. 13, ♀.
Ichneumon crispatorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 261 n. 16, ♀.
Ichneumon crispatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 138 n. 11, ♀.
Ichneumon crispatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2677 n. 11, ♀.
Ichneumon crispatorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 352, ♀.
Ichneumon crispatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 167 n. 18, ♀.
Ichneumon crispatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 134 n. 9, ♀.
Ichneumon crispatorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 50 n. 6, ♀.
Ichneumon crispatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 56 n. 11, ♀.
Ichneumon crispatorius Trentepol, Isis 1826 p. 217 n. 34, ♀.
Ichneumon xanthius Gravenhorrst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 392 n. 151, ♂.
Ichneumon crispatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 936 n. 89.
Ichneumon xanthius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 178 n. 138.
Amblyteles xanthius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 296 (Mant. p. 59), ♂ [[excl. ♀].
Amblyteles crispatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 91 (Ambl. p. 17) [n. 17, ♀♂.
Amblyteles crispatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 472 (Doc. p. 32) [n. 5, ♀♂.
Amblyteles crispatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 449 n. 18, [♀♂.

[1]) *Lep.:* Macaria lituraria (Rondani).

Amblyteles crispatorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 240 n. 18, ♀ ♂.
Amblyteles crispatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 61, 78 & 79 n. 14, ♀ ♂.
Amblyteles crispatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 113 n. 6, ♀ ♂.
Amblyteles bicuspis Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 42.
Ichneumon (Amblyteles) crispatorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2095 n. 14.
Amblyteles crispatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 625 n. 77, ♀ ♂.

var. **lichtensteinii** (Tischb.) Berth. — ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon Lichtensteini Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 291 n. 26, ♂.
Amblyteles crispatorius var. Lichtensteini Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 626, ♂.

var. **rufatorius** (Grav.) Berth. — ♀ — Eur. centr.
Ichneumon rufatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 388 n. 148, ♀.
Ichneumon rufatorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 173 n. 45, ♀.
Amblyteles crispatorius var. rufatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 626, ♀.

var. **tricoloreus** (Christ) Berth. — ♀ — Eur. centr.
Ichneumon tricoloreus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 349, ♀; T. 35 F. 8.
Ichneumon tricoloreus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 880 n. 11.
Amblyteles crispatorius var. tricoloreus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 626, ♀.

var. **xanthius** Wesm. — ♀ ♂ — Eur. centr.
Amblyteles xanthius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 120 [n. 10, ♀ ♂.
Amblyteles xanthius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 296 (Mant. p. 59), ♀ [(excl. ♂).
Ichneumon nemoralis Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 292 n. 27, ♂.
Amblyteles crispatorius var. xanthius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 626, ♀ ♂.

croceiventris Rdw.! — ♀ — Eur.: Lusitania, Gallia.
Amblyteles croceiventris Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 122 n. 21, ♀.

culpatorius (L.) Taschbg.[1] — ♀ ♂ — Eur.
Ichneumon culpatorius Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 561 n. 9.
Ichneumon culpatorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 398 n. 1583.
Ichneumon extensorius Ström, Trondhiemske Selsk. Skrift. III. 1765 p. 376 & 418 n. 42.
Ichneumon culpatorius Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 931 n. 6.
Ichneumon culpatorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 328 n. 6.
Ichneumon culpatorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 845 n. 6.
Ichneumon culpatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 153 n. 1775.
Ichneumon culpatorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 421 n. 6.
Ichneumon culpatorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 259 n. 6.
Ichneumon culpatorius Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. Nya Saml. III. 1788 p. ?
Ichneumon culpatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 136 n. 6.
Ichneumon culpatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2675 n. 6.
Ichneumon culpatorius Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 37 n. 743.
Ichneumon culpatorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 351.
Ichneumon culpatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 169 n. 6.
Ichneumon culpatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 133 n. 5.
Ichneumon culpatorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 49 n. 3.
Ichneumon culpatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 55 n. 7.
Ichneumon culpatorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 57 n. 743.
Ichneumon culpatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♀ ♂.
Ichneumon culpatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 342 n. 84, ♀ ♂.
Ichneumon culpatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 254.

---

[1]) *Lep.:* Melitaea maturna (Taschenberg), Selina ramosa (Fallou).

Ichneumon culpatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 292.
Ichneumon culpatorius Trentepol, Isis 1826 p. 217 n. 33, ♀.
Ichneumon culpatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 513 n. 215, ♀ ♂.
Ichneumon culpatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 194 n. 181.
Ichneumon culpatorius Boie, Arch. f. Naturg. II. P. 1. 1836 p. 42 n. 20.
Ichneumon culpatorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 409 n. 58, ♂.
Amblyteles culpatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 450 n. 20, [♀ ♂.

var. **oblongatus** (Tischb.) Berth. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon oblongatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 434 n. 129, ♂.
Amblyteles culpatorius var. oblongatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 606, ♂.

curticrus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon curticrus Provancher, Addit. faun. Canad. Hymén. 1888 p. 360, ♀.
Amblyteles curticrus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 186.

damryi Pic — Eur.: Sardinia.
Amblyteles Damryi Pic, Revue sc. Bourbonnais XII. 1899 p. 101.

debilis Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania.
Amblyteles debilis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XII. 1886 p. 242 n. 2, ♀.
Amblyteles debilis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 636 n. 94, ♀.

declinatorius Berth. — ♀ — Eur.: Ural.
Amblyteles declinatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 630 n. 86, ♀.

detritus (Brullé) Cress. — ♀ — Am.: Canada, Carolina, Delaware.
Ichneumon detritus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 302 n. 5, ♀.
Ichneumon syphax Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 181 n. 69, ♀.
Amblyteles detritus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 192 n. 22, ♀.
Amblyteles detritus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 11 n. 14, ♀.
Amblyteles detritus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 299 n. 14, ♀.

devylderi Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Gallia.
Amblyteles inspector var. 1 Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 130 n. 27, ♀.
Amblyteles Devylderi Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 269 n. 36, ♀.
Amblyteles ineptus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 273 n. 39, ♀ ♂.
Amblyteles Devylderi Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 49, ♀.
Ichneumon (Ctenichneumon) Devylderi Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2086 n. 6.
Amblyteles Devylderi Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 583 n. 3, ♀.

dirus Mocs.[1]) — ♀ — Eur.: Hungaria.
Amblyteles dirus Mocsáry, Magy. Tud. Akad. Math. & Termész. Közlem. XX. P. 2. 1885 [p. 119 n. 155, ♀.
Amblyteles dirus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 585 n. 7, ♀.

distycus Berth. — ♀ — As.: Caucasus.
Amblyteles distycus Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VII. 1894 p. 180.
Amblyteles distycus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 632 n. 89, ♀.

diversipes Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Amblyteles diversipes Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1897 p. 255 n. 29, ♀.

divisorius (Grav.) Wesm.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota; Afr.: Algeria.
Ichneumon divisorius Gravenhorst, Mem accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 335 n. 75, ♂.
Ichneumon perileucus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 227 n. 71, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon divisorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 470 n. 190, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon perileucus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 16 n. 38, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon perileucus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 152 n. 70, ♀ [excl. ♂].

---

1) *Lep.:* Toxocampa limosa (Mocsáry).
2) *Lep.:* Nonagria sparganii (Ratzeburg), Hadena adusta (Brischke).

Ichneumon divisorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 189 n. 167.
Amblyteles divisorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 133 [n. 30, ♀ ♂.
Ichneumon divisorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 401 n. 46, ♀ ♂.
Amblyteles divisorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 127 (Ambl. p. 53) [n. 43, ♀ ♂.
Amblyteles divisorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 41 n. 8, ♀ ♂.
Amblyteles divisorius Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 27 n. 72.
Amblyteles divisorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 18, ♀ ♂.
Ichneumon perileucus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 305 n. 71, [♀ [excl. ♂].
Amblyteles divisorius Taschenberg, Zeitschr. f. d ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 457 n. 46, ♀ ♂.
Amblyteles divisorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 258 n. 29, ♀ ♂.
Amblyteles divisorius Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 179 n. 33, ♀.
Amblyteles divisorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 81 n. 29, ♀ ♂.
Ichneumon (Ctenichneumon) divisorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2084 n. 2.
Amblyteles divisorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France XLIV. 1895 p. 585 n. 8, ♀ ♂.

var. **edictorius** (L.) Berth. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon edictorius Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 562 n. 19.
Ichneumon edictorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 401 n. 1596.
Ichneumon edictorius Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 932 n. 19.
Ichneumon edictorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 331 n. 24.
Ichneumon edictorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 848 n. 19.
Ichneumon edictorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 424 n. 24.
Ichneumon edictorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 262 n. 30.
Ichneumon edictorius Villers, C. Linnaei Entom. IV. 1789 p. 147 n. 37.
Ichneumon edictorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2681 n. 19.
Ichneumon edictorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 343.
Ichneumon edictorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 173 n. 44.
Ichneumon edictorius Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 146 n. 52.
Ichneumon edictorius Dwigubsky, Prim. faun. Mosquens. 1802 p. 156 n. 573.
Cryptus edictorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 77 n. 26.
Ichneumon edictorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♂.
Ichneumon edictorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 292 n. 20, ♂.
Ichneumon edictorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 280.
Ichneumon edictorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 363.
Ichneumon edictorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 228 n. 72, ♂.
? Ichneumon edictorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 924 n. 70, ♀.
Cryptus edictorius Trentepol, Isis 1829 p. 828 n. 11, ♀.
Ichneumon edictorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 152 n. 71.
Ichneumon edictorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 306 n. 72, ♂.
Amblyteles divisorius var. edictorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 586, ♂.

var. **sannio** (Grav.) D. T. — ♂ — Eur.
Ichneumon (Ischnus) sannio Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 646 n. 278, ♂.
Ischnus sannio Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 207 n. 2.
Amblyteles divisorius var. sannio m.

var. **sedulus** (Grav.) D. T. — ♀ — Eur.
Cryptus sedulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 701 n. 50b, ♀.
Cryptus sedulus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 282 n. 15, ♀.
Amblyteles divisorius var. sedulus m.

dromedarius Rdw.! — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Amblyteles dromedarius Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 87 n. 8, ♀ ♂.

efferus Wesm. — ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon messorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 411 n. 60, ♂ [excl. ♀].
Amblyteles efferus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 116 (Ambl. p. 42) [n. 32, ♂.
Amblyteles efferus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 615 n. 65, ♂.

egregius (Grav.) Wesm. — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon egregius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 314 n. 111, ♀.
Amblyteles egregius Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 37 n. 111, ♀.
Amblyteles egregius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 414 n. 8, ♀.
Ichneumon (Amblyteles) egregius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2092 n. 4.
Amblyteles egregius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 637 n. 96, ♀.

electus Cress. — ♂ — Am.: Canada, Connecticut.
Ichneumon electus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 304, ♂.
Ichneumon nitidus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 79, ♂.
Amblyteles electus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 191 n. 20, ♂.
Amblyteles electus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 10 n. 13, ♂.
Amblyteles electus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 299 n. 13, ♂.

equitatorius (Panz.) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon equitatorius Kob & Panzer, Wurmtrockniss 1786 p. 26 n. 19, ♂; T. 2 F. 19.
Ichneumon equitatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2679 n. 90, ♂.
Ichneumon antennatorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801, ♀; P. 73 T. 13.
Ichneumon mediatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 60 n. 32.
Cryptus antennatorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 70, ♀.
Ichneumon antennatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♀.
Ichneumon equitatorius Gravenhorst, Mém. accad. sc. Torino XXIV. 1820 n. 321 n. 58, ♀.
Ichneumon mediatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277.
Ichneumon mediatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 354.
Ichneumon mediatorius Trentepol, Isis 1826 p. 233 n. 50.
Ichneumon equitatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 405 n. 158, ♂.
Ichneumon antennatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 511 n. 214, ♀.
Ichneumon equitatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 180 n. 143, ♀.
Amblyteles antennatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 130 n. 26, ♀.
Ichneumon equitatorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 397 n. 39, ♂.
Ichneumon antennatorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 410 n. 59, ♀.
Amblyteles equitatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 300 (Mant. [p. 63), ♀ ♂.
Amblyteles antennatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 92 (Ambl. p. 18) [n. 18, ♀ ♂.
Amblyteles equitatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 16, ♀.
Amblyteles antennatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 450 [n. 19, ♂.
Amblyteles equitatorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 243 n. 19, ♀ ♂.
Amblyteles equitatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 47, ♀.
Amblyteles equitatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 61 & 80 n. 15, ♀ ♂.
Amblyteles equitatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 113 n. 7.

---

[1]) *Lep.:* Trachea piniperda (Ratzeburg).

Amblyteles rufus Destefani, Natural. Sicil. IV. 1885 p. 186 n. 4, ♀.
Ichneumon (Amblyteles) equitatorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2095 n. 15.
Amblyteles equitatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 605 n. 40, ♀ ♂.
var. **commutatus** Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia. [p. 604, ♀.
Amblyteles equitatorius var. commutatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
var. **flaviceps** (Tischb.) Berth. — ♂ — Eur.: Germania, Littorale; As.: Syria.
Ichneumon flaviceps Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 28 n. 13, ♂.
Ichneumon flaviceps Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 330 n. 57. [p. 604, ♂.
Amblyteles equitatorius var. flaviceps Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
var. **nigricaudus** Berth. — ♀ — Eur. [p. 604, ♀.
Amblyteles equitatorius var. nigricaudus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
var. **subniger** Berth. — ♀ — Eur. [p 604, ♀.
Amblyteles equitatorius var. subniger Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
erythromerus Rdw.! — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Amblyteles erythromerus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 88 n. 9, ♀ ♂.
erythropygus Kriechb. — ♀ — As.: Turcestania.
Amblyteles erythropygus Kriechbaumer, Termész. Füzet. VI. 1882 p. 149 n. 12, ♀.
Amblyteles erythropygus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 606 n. 44, ♀.
erythropygus Rdw.![1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Amblyteles erythropygus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 91 n. 16, ♀ ♂.
excultorius D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia, Tirolia. [[nec Cresson].
Amblyteles excultus Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 180 n. 37, ♀ ♂
Amblyteles excultus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 627 n. 81, ♂.
Amblyteles excultorius m.
excultus Cress. — ♀ — Am.: Canada, New Jersey.
Ichneumon excultus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 293, ♀.
Amblyteles excultus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 188 n. 1, ♀.
Amblyteles excultus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 5 n. 1, ♀.
Amblyteles excultus Provancher, Faun. entom Canada. Hymén. 1883 p. 294 n. 1.
expunctatus Cress. — ♂ — Am.: Canada, Colorado.
Ichneumon expunctatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia I. 1862 p. 290.
Ichneumon obliteratus Cresson, Proc. entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 147 n. 21, ♂.
Amblyteles expunctatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 189 n. 6, ♂.
Trogus Provancheri Burque, Natural. Canad. XI. 1879 p. 128, ♂.
Amblyteles expunctus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 327 n. 20, ♂.
Amblyteles expunctus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 766 n. 20, ♂.
fabricii (Schrank) Taschbg. — ♀ — Eur.: Gallia, Germania, Austria.
Ichneumon Fabricii Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 267 n. 2062 [recte 2063], ♀.
Ichneumon Fabricii Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 616 n. 264, ♀. [n. 13, ♀.
Ichneumon melanocerus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 377 (Misc. p. 18)
Ichneumon Fabricii Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 77 n. 264.
Ichneumon melanocerus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 6, ♀.
Ichneumon melanocerus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 386 n. 61, ♀.
Amblyteles Fabricii Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 458 n. 48, ♀.
Ichneumon melanocerus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 39, ♀.
Ichneumon melanocerus Kriechbaumer, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 121-124.
Amblyteles Fabricii Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 640 n. 103, ♀.
flavocinctus (Desv.) Bridgm. & Fitch — ♂ — Eur.: Britannia.
Ichneumon flavocinctus Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 22 n. 125.

---

[1]) *Lep.:* Bombyx salicis (Rudow).

Amblyteles flavocinctus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 61 n. 10, ♂.
Amblyteles flavocinctus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 144.
Amblyteles flavocinctus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 653 n. 125, ♂.

flavolaetus Berth. — ♀ — As.: Caucasus.
Amblyteles flavolaetus Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 41, ♀.
Amblyteles flavolaetus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 621 n. 70, ♀.

flavopictus Rdw.! — ♀ — Eur.: Gallia.
Amblyteles flavopictus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 121 n. 20, ♀.

fossorius (L.) Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon fossorius Linné, Syst. nat. Ed. 10a I. 1758 p. 562 n. 21, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon fossorius Brünnich, Prodr. insectol. Siaelland 1761 p. 18.
Ichneumon fossorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2a 1761 p. 401 n. 1599.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 345 n. 55.
Ichneumon fossorius Linné, Syst. nat. Ed. 12a I. 2. 1767 p. 933 n. 22.
Ichneumon fossorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 332 n. 28.
Ichneumon fossorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 849 n. 22.
Ichneumon gladiatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 154 n. 1783, ♂.
Ichneumon fossorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 154 n. 1788, ♂.
Ichneumon fossorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 425 n. 29.
Ichneumon fuscipes Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 412 n. 56.
Ichneumon fossorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 262 n. 36.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 58 n. 159.
Ichneumon fossorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 148 n. 41.
Ichneumon fossorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2682 n. 22.
Ichneumon trichrous Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2683 n. 235.
Ichneumon fossorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 344.
Ichneumon fossorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 174 n. 52.
Ichneumon fossorius Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 149 n. 64.
Ichneumon fossorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 55 n. 32.
Ichneumon fossorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 65 n. 55.
Ichneumon fossorius Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 187 n. 31.
Ichneumon fossorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♂.
Ichneumon fossorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 283.
Ichneumon fossorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 285 n. 10, ♀ [excl. ♂ [& synon.].
Ichneumon fossorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 280.
Ichneumon fossorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 364.
Ichneumon fossorius Trentepol, Revis. crit. gen. Ichneumon. 1825 p. 23 n. 12.
Ichneumon fossorius Trentepol, Isis 1826 p. 71 n. 12.
Ichneumon fossorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 164 n. 32, ♀ [excl. ♂ & synon.].
Ichneumon fossorius Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 9 n. 7 & p. 12 n. 22, ♀.
Ichneumon fossorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 139 n. 35, ♂.
Ichneumon crassicornis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 140 n. 37, ♀.
Ichneumon fossorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 1840 p. 303 n. 5.
Ichneumon fossorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 55 n. 6, ♀ ♂.
Amblyteles fossorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 301 (Mant. p. 64) [n. 27b, ♀.
Amblyteles fossorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 125 (Ambl. p. 51) [n. 42, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Hadena baltica, H. adusta (Bridgman, Brischke), Leucania lithargyria (Giraud), Vanessa Antiopa (Ratzeburg).

Amblyteles fossorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 40 n. 6, ♀ ♂.
Amblyteles fossorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 17, ♀ ♂.
Ichneumon fossorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 261 n. 32, ♀ ♂.
Amblyteles fossorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 457 n. 45, ♀ ♂.
Amblyteles fossorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 262 n. 32, ♀ ♂.
Amblyteles fossorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 48, ♀ ♂.
Amblyteles fossorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 60 & 81 n. 28, ♀ ♂.
Amblyteles fossorius Thomson, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1888 p. 120 n. 29.
Amblyteles fossorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 587 n. 12, ♀ ♂.

var. **flavator** Tischb. — ♂ — Eur.: Germania.
Amblyteles flavator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 292 n. 350, ♂.
Amblyteles flavator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 164 n. 4, ♂.
Amblyteles fossorius var. flavator Berthomieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 588, ♂.

var. **pallidipes** (Grav.) Berth. — ♀ ♂ — Eur.
Ichneumon pallipes Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 293 n. 22, ♂.
Ichneumon perileucus var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 227 n. 71, ♀ [nec ♂].
Ichneumon pallipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 233 n. 75, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon pallipes Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 16 n. 38, ♂.
Ichneumon pallipes Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 153 n. 74, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon pallipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 308 n. 75, ♀ ♂.
Amblyteles fossorius var. pallidipes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 588, ♀ ♂.

fraternus Cress. — ♂ — Am.: Massachusetts.
Amblyteles fraternus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 192 n. 26, ♂.

fulvocaudatus Tosqu. — ♂ — Afr.: Hadda Galla.
Amblyteles fulvocaudatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 76 n. 1, ♂.

fumipennis Rdw.! — ♀ ♂ — Eur. mer.
Amblyteles fumipennis Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 85 n. 3, ♀.
Amblyteles fumipennis Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 86 n. 6, ♀ ♂ [nec p. 85 n. 3].

funereus (Fourcr.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 338 n. 40.
Ichneumon funereus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 406 n. 40, ♀.
Ichneumon comitator var. 2 Razoumowsky, Hist. nat. Jorat. I. 1789 p. 215 n. 246.
Ichneumon funereus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 141 n. 21, ♂.
Ichneumon funerarius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 169 n. 28, ♂.
Ichneumon funereus Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 114 n. 249, ♂.
Ichneumon molitorius var. e & f Schrank, Fauna Boica II. 1. 1802 p. 274 n. 2072, ♀.
Ichneumon funerarius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 53 n. 20, ♂.
Ichneumon molitorius var. Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 55 n. 5, ♀.
Ichneumon funereus Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 283, ♂.
Ichneumon funereus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 205 n. 58, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon perileucus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 227 n. 71, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon funereus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 15 n. 32, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon perileucus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 16 n. 38, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon funereus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 148 n. 60, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon perileucus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 152 n. 70, ♂ [[excl. ♀].
Amblyteles funereus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 136 [n. 34, ♀ ♂.
Amblyteles funereus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 131 (Ambl. p. 57) [n. 47, ♀ ♂.

Amblyteles funereus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 42 n. 10, ♀ ♂.
Amblyteles funereus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 23 n. 58.
Amblyteles funereus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 18, ♀ ♂.
Ichneumon funereus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 290 n. 58, ♀ ♂.
Ichneumon perileucus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 305 n. 71, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon funereus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 459 n. 52, ♀ ♂,
Amblyteles funereus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 270 n. 37, ♀ ♂.
Amblyteles funereus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 49, ♀.
Amblyteles funereus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 60 n. 34, ♀ ♂.
Ichneumon (Ctenichneumon) funereus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2087 n. 9.
Amblyteles funereus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 591 n. 18, ♀ ♂.

fuscipennis Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon erythrogaster Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. ?
Amblyteles fuscipennis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 138 n. 37, ♀.
Amblyteles fuscipennis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 304 (Mant. p. 67), ♀ ♂.
Amblyteles fuscipennis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 133 (Ambl. p. 59) n. 50, ♀ ♂.
Amblyteles fuscipennis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 19, ♀ ♂.
Amblyteles fuscipennis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 459 n. 55, ♀.
Amblyteles fusorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 256 n. 27, ♀ ♂.
Amblyteles fusorius Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 178 n. 32, ♀.
Amblyteles fusorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 80 & 81 n. 37, ♀ ♂.
Amblyteles fuscipennis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 120 n. 30.
Ichneumon (Protichneumon) fuscipennis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1901 n. 5.
Amblyteles fuscipennis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 582 n. 1, ♂.

gibbosus Berth. — ♂ — Eur.: Alpes.
Amblyteles gibbosus Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1899 p. 137 n. 53, ♂.

glaucatorius (Fabr.) Wesm.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 69 n. 298.
? Ichneumon albiventris Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2708 n. 349.
Ichneumon glaucatorius Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 136 n. 16.
Ichneumon glaucatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 57 n. 14.
Ichneumon glaucatorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 61.
Ichneumon glaucatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♀ ♂.
Ichneumon glaucatorius Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 P. 100 T. 11.
Ichneumon glaucatorius Gravenhorst, Magaz. f. Entom. IV. 1821 p. 263 n. 4, ♀ ♂.
Ichneumon glaucatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253.
Ichneumon glaucatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 290.
Ichneumon glaucatorius Trentepol, Isis 1826 p. 75 n. 18, ♀.
Ichneumon glaucatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 433 n. 170, ♀ ♂.
Ichneumon glaucatorius Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 380 n. 842.

---

1) *Lep.:* Sphinx ligustri, Sph. convolvuli, Miselia oxyacanthae, Macroglossa stellatarum, M. fusciformis (Mocsáry), Sphinx porcellus, Sph. elpenor (Brischke), Sph. atropos (Desbrochers), Callimorpha dominula (Boie), Mamestra pisi? (Kriechbaumer).

2) *Lep.:* Cucullia verbasci, C. argentea, C. artemisiae, Anarta Myrtilli (Brischke), Dianthoecia compta (Mocsáry).

Amblyteles fossorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 40 n. 6, ♀ ♂.
Amblyteles fossorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 17, ♀ ♂.
Ichneumon fossorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 261 n. 32, ♀ ♂.
Amblyteles fossorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 457 n. 45, ♀ ♂.
Amblyteles fossorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 262 n. 32, ♀ ♂.
Amblyteles fossorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 48, ♀ ♂.
Amblyteles fossorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 60 & 81 n. 28, ♀ ♂.
Amblyteles fossorius Thomson, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1888 p. 120 n. 29.
Amblyteles fossorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 587 n. 12, ♀ ♂.

var. **flavator** Tischb. — ♂ — Eur.: Germania.
Amblyteles flavator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 292 n. 350, ♂.
Amblyteles flavator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 164 n. 4, ♂.
Amblyteles fossorius var. flavator Berthomieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 588, ♂.

var. **pallidipes** (Grav.) Berth. — ♀ ♂ — Eur.
Ichneumon pallipes Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 293 n. 22, ♂.
Ichneumon perileucus var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 227 n. 71, ♀ [nec ♂].
Ichneumon pallipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 233 n. 75, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon pallipes Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 16 n. 38, ♂.
Ichneumon pallipes Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 153 n. 74, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon pallipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 308 n. 75, ♀ ♂.
Amblyteles fossorius var. pallidipes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 588, ♀ ♂.

fraternus Cress. — ♂ — Am.: Massachusetts.
Amblyteles fraternus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 192 n. 26, ♂.

fulvocaudatus Tosqu. — ♂ — Afr.: Hadda Galla.
Amblyteles fulvocaudatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 76 n. 1, ♂.

fumipennis Rdw.! — ♀ ♂ — Eur. mer.
Amblyteles fumipennis Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 85 n. 3, ♀.
Amblyteles fumipennis Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 86 n. 6, ♀ ♂ [nec p. 85 n. 3].

funereus (Fourcr.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 338 n. 40.
Ichneumon funereus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 406 n. 40, ♀.
Ichneumon comitator var. 2 Razoumowsky, Hist. nat. Jorat. I. 1789 p. 215 n. 246.
Ichneumon funereus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 141 n. 21, ♂.
Ichneumon funerarius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 169 n. 28, ♂.
Ichneumon funereus Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 114 n. 249, ♂.
Ichneumon molitorius var. e & f Schrank, Fauna Boica II. 1. 1802 p. 274 n. 2072, ♀.
Ichneumon funerarius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 53 n. 20, ♂.
Ichneumon molitorius var. Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 55 n. 5, ♀.
Ichneumon funereus Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 283, ♂.
Ichneumon funereus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 205 n. 58, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon perileucus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 227 n. 71, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon funereus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 15 n. 32, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon perileucus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 16 n. 38, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon funereus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 148 n. 60, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon perileucus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 152 n. 70, ♂ [[excl. ♀].
Amblyteles funereus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 136 [n. 34, ♀ ♂.
Amblyteles funereus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 131 (Ambl. p. 57) [n. 47, ♀ ♂.

Amblyteles funereus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 42 n. 10, ♀ ♂.
Amblyteles funereus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 23 n. 58.
Amblyteles funereus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 18, ♀ ♂.
Ichneumon funereus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 290 n. 58, ♀ ♂.
Ichneumon perileucus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 305 n. 71, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon funereus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 459 n. 52, ♀ ♂,
Amblyteles funereus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 270 n. 37, ♀ ♂.
Amblyteles funereus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 49, ♀.
Amblyteles funereus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 60 n. 34, ♀ ♂.
Ichneumon (Ctenichneumon) funereus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2087 n. 9.
Amblyteles funereus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 591 n. 18, ♀ ♂.

fuscipennis Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon erythrogaster Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. ?
Amblyteles fuscipennis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 138 n. 37, ♀.
Amblyteles fuscipennis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 304 (Mant. p. 67), ♀ ♂.
Amblyteles fuscipennis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 133 (Ambl. p. 59) n. 50, ♀ ♂.
Amblyteles fuscipennis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 19, ♀ ♂.
Amblyteles fuscipennis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 459 n. 55, ♀.
Amblyteles fusorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 256 n. 27, ♀ ♂.
Amblyteles fusorius Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 178 n. 32, ♀.
Amblyteles fusorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 80 & 81 n. 37, ♀ ♂.
Amblyteles fuscipennis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 120 n. 30.
Ichneumon (Prolichneumon) fuscipennis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1901 n. 5.
Amblyteles fuscipennis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 582 n. 1, ♂.

gibbosus Berth. — ♂ — Eur.: Alpes.
Amblyteles gibbosus Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1899 p. 137 n. 53, ♂.

glaucatorius (Fabr.) Wesm.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 69 n. 298.
? Ichneumon albiventris Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2708 n. 349.
Ichneumon glaucatorius Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 136 n. 16.
Ichneumon glaucatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 57 n. 14.
Ichneumon glaucatorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 61.
Ichneumon glaucatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♀ ♂.
Ichneumon glaucatorius Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 P. 100 T. 11.
Ichneumon glaucatorius Gravenhorst, Magaz. f. Entom. IV. 1821 p. 263 n. 4, ♀ ♂.
Ichneumon glaucatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253.
Ichneumon glaucatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 290.
Ichneumon glaucatorius Trentepol, Isis 1826 p. 75 n. 18, ♀.
Ichneumon glaucatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 433 n. 170, ♀ ♂.
Ichneumon glaucatorius Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 380 n. 842.

---

[1] *Lep.:* Sphinx ligustri, Sph. convolvuli, Miselia oxyacanthae, Macroglossa stellatarum, M. fusciformis (Mocsáry), Sphinx porcellus, Sph. elpenor (Brischke), Sph. atropos (Desbrochers), Callimorpha dominula (Boie), Mamestra pisi? (Kriechbaumer).

[2] *Lep.:* Cucullia verbasci, C. argentea, C. artemisiae, Anarta Myrtilli (Brischke), Dianthoecia compta (Mocsáry).

Ichneumon glaucatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 185 n. 155.
Ichneumon eximius Stephens, Ilustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 186 n. 159.
Amblyteles glaucatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 122 [n. 15, ♀ ♂.
Ichneumon glaucatorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 399 n. 42, ♀ ♂.
Amblyteles glaucatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 99 (Ambl. p. 25) [n. 20, ♀ ♂.
Amblyteles glaucatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 407 (Misc. [p. 48) n. 1.
Amblyteles glaucatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 16, ♀ ♂; [var. ♀.
Amblyteles glaucatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 450 n. 21, [♀ ♂.
Amblyteles glaucatorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 227 n. 9, ♀ ♂.
Amblyteles glaucatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 47, ♀ ♂.
Amblyteles glaucatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 78 n. 17, ♀.
Amblyteles glaucatorius Woldstedt, Horae soc. entom. Ross. XVI. 1881 p. 62.
Amblyteles glaucatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 117 n. 20.
Ichneumon (Amblyteles) glaucatorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2096 n. 18.
Amblyteles glaucatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 631 n. 88, ♀ ♂.

var. **hispanicus** Berth. — ♀ — Eur.: Hispania.
Amblyteles glaucatorius var. Hispanicus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 631, ♀.

var. **spoliatus** Berth. — ♂ — Eur.
Amblyteles glaucatorius var. spoliatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 631, ♂.

gratiosus Kriechb. — ♀ — As.: Turcestania.
Amblyteles gratiosus (Mocsáry) Kriechbaumer, Termész. Füzet. VI. 1882 p. 150 n. 13, ♀.
Amblyteles gratiosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 609 n. 49, ♀.

gravenhorstii Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota. [Linné].
Ichneumon extensorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 266 n. 89, ♂ [excl. ♀, nec
Ichneumon Gravenhorstii Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique III. 1836 p. 337-341, ♀ ♂; Fig.
Amblyteles Gravenhorstii Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 127 n. 21, ♀ ♂.
Amblyteles Gravenhorstii Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 297 (Mant. [p. 60), ♀ ♂.
Amblyteles Gravenhorstii Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 100 (Ambl. [p. 26) n. 24, ♀ ♂.
Amblyteles Gravenhorstii Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 39 n. 3, ♀ ♂.
Amblyteles Gravenhorstii Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 37 n. 122.
Amblyteles Gravenhorstii Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 17, ♀ ♂.
Amblyteles Gravenhorsti Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 451 n. 25, [♀ ♂.
Amblyteles Gravenhorsti Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 230 n. 11, ♀ ♂.
Amblyteles Gravenhorstii Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 79 n. 21, ♀ ♂.
Amblyteles Gravenhorsti Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 643 n. 108, ♀ ♂.

var. **flavolaetus** Berth. — ♂ — Eur. centr.
Amblyteles Gravenhorsti var. flavolaetus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. [1895 p. 644, ♂.

gynandromorphus Rdw.! — ♀ ♂ — Eur. mer.
Amblyteles gynandromorphus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 134 n. 34, ♀ ♂.

haereticus Wesm.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Germania, Helvetia, Austria.
Ichneumon melanogaster var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 210, ♀.

---

[1] *Lep.:* Leucania vitellina (Kriechbaumer), Gortyna flavago (Brischke).
[2] *Lep.:* Vanessa urticae (Giraud), Agrotis comis (Kriechbaumer).

Ichneumon funereus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 205 n. 58, ♀ [nec ♂].
Amblyteles haereticus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 120 (Ambl. p. 46) [n. 37, ♀.
Amblyteles haereticus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 401 (Ot. p. 50) n. 3, ♀.
Amblyteles haereticus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 23 n. 58.
Amblyteles haereticus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 455 n. 39, ♀.
Amblyteles haereticus Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 31, ♂.
Amblyteles haereticus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 596 n. 30, ♀♂.

helveticus Pic — Eur.: Helvetia.
Amblyteles Helveticus Pic, Revue sc. Bourbonnais XII. 1899 p. 102.

hermaphroditus Taschbg. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania.
Amblyteles (camelinus & fossorius) hermaphroditus Taschenberg, Berlin. entom. Zeitschr. [XIV. 1870 p. 425-426 & 456, ♀.
Amblyteles hermaphroditus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 456 [n. 44, ♀♂.
Amblyteles hermaphroditus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 589 n. 16, [♀♂.

hiulcus Cress. — ♀ — Am.: British Columbia.
Amblyteles Hiulcus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 194 n. 33, ♀.
Amblyteles Hiulcus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 355, ♀.

homocerus Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; Afr.: Algeria.
Ichneumon castigator var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 126 n. 10 [non 20].
Amblyteles homocerus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 121 (Ambl. p. 47) [n. 38, ♀ ♂.
Amblyteles homocerus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 91, ♀♂.
Amblyteles homocerus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 455 n. 40, ♀♂.
Amblyteles homocerus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 595 n. 28, ♀ ♂.

hudsonicus Cress. — ♀ — Am.: Hudsons Bay.
Amblyteles Hudsonicus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 192 n. 25, ♀.

hungaricus Tischb.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Amblyteles Hungaricus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXIX. 1868 p. 253 n. 9, ♀.
Amblyteles Hungaricus Kriechbaumer, Termész. Füzet. VI. 1882 p. 148 n. 9, ♂.
Amblyteles Hungaricus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 630 n. 87, ♀♂.

var. **meridionalis** Berth. — ♀ — Eur.: Sicilia.
Amblyteles Hungaricus var. meridionalis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. [1895 p. 631, ♀.

var. **nigriventris** Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Amblyteles Hungaricus var. nigriventris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 631, ♀♂.

japonicus Kriechb. — ♀ ♂ — As.: Japonia.
Amblyteles Japonicus Kriechbaumer, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1893/94 p. 128 n. 7, ♀♂.

illaetabilis Cress. — ♂ — Am.: Georgia.
Amblyteles illaetabilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 190 n. 12, ♂.

impolitus Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania; Afr.: Algeria.
Amblyteles impolitus Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VII. 1894 p. 179, ♀ ♂.
Amblyteles impolitus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 602 n. 35, ♀ ♂.

improvisus Cress. — ♂ — Am.: Canada, New Jersey.
Ichneumon improvisus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 296, ♂.
Amblyteles improvisus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 189 n. 4, ♂.
Amblyteles improvisus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 6 n. 4, ♂.
Amblyteles improvisus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 295 n. 4, ♂.

---

1) *Lep.:* Argynnis paphia (Bignell).
2) *Lep.:* Smerinthus ocellatus (Mocsáry).

indistinctus (Prov.) Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Ichneumon indistinctus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 75.
Amblyteles indestinctus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 192 n. 24, ♀.
Amblyteles indistinctus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 11 n. 16, ♀.
Amblyteles indistinctus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 300 n. 16, ♀.

indocilis Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Belgia, Germania.
? Ichneumon salicatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 295 n. 24, ♂.
? Ichneumon salicatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 245 n. 79, ♀ ♂.
? Ichneumon salicatorius Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 17 n. 39.
? Ichneumon salicatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 155 n. 79.
Amblyteles indocilis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 126 [n. 20, ♀ ♂.
Amblyteles indocilis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 297 (Mant. p. 60), ♀.
Amblyteles indocilis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 85 (Ambl. p. 11) [n. 8, ♀ (♂ ?).
Amblyteles indocilis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 28 n. 79.
Amblyteles indocilis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 415 n. 10, ♀ ♂.
Amblyteles indocilis Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 248 n. 21, ♀.
Amblyteles indocilis Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 43, ♀; T. 27 F. 4.
Amblyteles indocilis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 117 n. 21, ♀ ♂.
Ichneumon (Amblyteles) indocilis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2097 n. 23.
Amblyteles indocilis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 652 n. 123, ♀ (♂).

inermis Berth. — ♀ — Eur.: Gallia, Helvetia.
Amblyteles inermis Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 42.
Amblyteles inermis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 626 n. 78, ♀.

inflatus Berth. — ♀ — Afr.: Algeria.
Amblyteles inflatus Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1897 p. 256 n. 30, ♀.

infractorius (L.) Wesm.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia, Germania, Hungaria; As.: [Caucasus.
Ichneumon infractorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 398 n. 1584.
Ichneumon XI Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1. 1766; T. 20 F. 9.
Ichneumon infractorius Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 931 n. 7.
Ichneumon infractorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 328 n. 9.
Ichneumon infractorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 845 n. 7.
Ichneumon infractorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 151 n. 1754.
Ichneumon infractorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 422 n. 9.
Ichneumon infractorius Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 346 n. 699, ♂.
Ichneumon infractorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 260 n. 10.
Ichneumon infractorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 136 n. 7.
Ichneumon infractorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2676 n. 7.
Ichneumon infractorius Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 37 n. 744.
Ichneumon infractorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 351.
Ichneumon infractorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 166 n. 11.
Ichneumon infractorius Fabricius, Entom. Syst. II. 1793 p. 138 n. 25.
Ichneumon infractorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 78 T. 9.
Ichneumon infractorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 51 n. 11.
Ichneumon infractorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 58 n. 21.
Ichneumon infractorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 63.
Ichneumon infractorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 58 n. 744.

---

[1]) *Lep.:* Arctia fuliginosa L. (Rondani).
[2]) *Lep.:* Agrotis tritici (Rondani), A. corticae (Taschenberg).

Ichneumon infractorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♀.
Ichneumon infractorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284.
Ichneumon infractorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 315 n. 50, ♀♂.
Ichneumon infractorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 254.
Ichneumon infractorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 290.
Ichneumon infractorius Trentepol, Isis 1826 p. 82 n. 27.
Ichneumon volutatorius Trentepol, Isis 1826 p. 83 n. 28, ♂.
Ichneumon infractorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 363 n. 140, ♀ ♂.
Ichneumon infractorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 882 n. 14.
Ichneumon infractorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 172 n. 124.
Amblyteles infractorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 121 [n. 12, ♀♂.
Ichneumon infractorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 68 n. 31, ♂.
Amblyteles infractorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 85 (Ambl. p. 11) [n. 6, ♀♂.
Amblyteles infractorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 414 n. 7.
Amblyteles infractorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 77 & 78 n. 6, ♀♂.
Amblyteles infractorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 621 n. 71, ♀♂.

var. **nigricaudus** Berth. — ♀ ♂ — Eur.
Amblyteles infractorius var. nigricaudus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 621, ♀♂.

infuscatus Berth. — ♀ — Afr.: Algeria.
Amblyteles infuscatus Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VII. 1894 p. 179.
Amblyteles infuscatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 588 n. 14, ♀.

injucundus Wesm. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Amblyteles injucundus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 119 (Ambl. p. 45) [n. 35, ♀.
Amblyteles injucundus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 454 n. 34, ♀.
Amblyteles injucundus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 255 n. 26, ♀.
Amblyteles injucundus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 604 n. 41, ♀.

insidiator (Fonsc.) Berth. — ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon insidiator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 66 n. 28, ♂.
Amblyteles? insidiator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 654 n. 126, ♂.

inspector Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Amblyteles inspector Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 130 [n. 27, ♀♂ [excl. var. 1 & 5].
Amblyteles inspector Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 300 (Mant. p. 63), ♀♂.
Amblyteles inspector Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 40 (Adn. p. 8), ♂.
Amblyteles inspector Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 123 (Ambl. p. 49) [n. 41, ♀♂.
Amblyteles inspector Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 17, ♀.
Amblyteles inspector Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 542 (Doc. p. 48) n. 7, ♀.
Amblyteles inspector Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 455 n. 43, ♀♂.
Amblyteles inspector Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 264 n. 33, ♀ ♂.
Amblyteles inspector Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 48, ♂.
Ichneumon (Ctenichneumon) inspector Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2085 n. 5.
Amblyteles inspector Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 588 n. 13, ♀♂.

var. **brischkei** Berth. — ♂ — Eur.
Amblyteles inspector var. Brischkei Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 588, ♂.

var. **nigriventris** Berth. — ♀ ♂ — Eur.
Amblyteles inspector var. nigriventris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 588, ♀♂.

insuetus Tosqu. — ♀ — Afr.: Sierra Leone.
Amblyteles insuetus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 91 n. 10, ♀.

interruptus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Alpes.
Amblyteles interruptus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 237 n. 15, ♀.
Ichneumon trialbatus Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VI. P. 1. 1880 p. 13, ♂.
Amblyteles interruptus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 113 n. 4, ♀.
Ichneumon trialbatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 625 n. 102, ♂.
Ichneumon (Amblyteles) interruptus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2083 n. 8, ♀♂.
Amblyteles interruptus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2404 n. 8, ♂.
Amblyteles interruptus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII. 1897 p. 43.

johansonii Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Hungaria, Russia.
Amblyteles Johansoni Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 236 n. 14, ♀.
Amblyteles Johansoni Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 43; T. 27 F. 3.
Amblyteles Johansoni Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 179 n. 35, ♀.
Amblyteles Johansoni Mocsáry, Magy. Tud. Akad. Math. & Termész. Közlem. XX. P. 2. 1885 [p. 111 n. 139, ♀♂.
Amblyteles Johansoni Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 118 n. 25, ♀♂.
Amblyteles Johansoni Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 288 n. 24, ♂.
Ichneumon (Spilichneumon) Johansoni Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2090 n. 7.
Amblyteles Johansoni Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 646 n. 110, ♀♂.

isenschmidii Kriechb. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Amblyteles Isenschmidii Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VII. P. 8. 1887 p. 308, [♀.
Amblyteles Isenschmidi Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 648 n. 115, ♀.

italicus Rdw.! — ♀ — Eur.: Italia.
Amblyteles Italicus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 133 n. 32, ♀.

jucundus Kriechb. — ♀ (♂) — Eur.: Hungaria.
? Ichneumon aciculator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 172 n. 38, ♂.
Amblyteles jucundus Kriechbaumer, Termész. Füzet. VI. 1882 p. 148 n. 10, ♀.
Amblyteles jucundus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 607 n. 45, ♀.

kriechbaumeri Mosc. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Amblyteles Kriechbaumeri Mocsáry, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 209 n. 1, ♂.
Amblyteles Kriechbaumeri Mocsáry, Magy. Tud. Akad. Math. & Termész. Közlem. XX. P. 2. [1885 p. 117 n. 151, ♂.
Amblyteles Kriechbaumeri Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 597 n. 31, ♂.

lapponicus Holmgr. — ♀ — Eur.: Lapponia, Suecia.
Amblyteles Lapponicus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 274 n. 40, ♀.
Ichneumon (Amblyteles) Lapponicus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2093 n. 7.
Amblyteles Lapponicus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 593 n. 24, ♀.
Amblyteles Lapponicus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2404 n. 7, ♀.

latebricola Wesm. — ♀ — Eur.: Belgia, Germania, Russia.
Amblyteles latebricola Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 115 [n. 4, ♀.
Amblyteles latebricola Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 85 (Ambl. p. 11) [n. 9, ♀.
Amblyteles latebricola Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 415 n. 11, ♀.
Amblyteles latebricola Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 651 n. 120, ♀.

laticeps Rdw.! — ♀ — Eur.: Italia.
Amblyteles laticeps Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 134 n. 33, ♀.

laticinctus Rdw.! — ♀ — Eur.: Hispania.
Amblyteles laticinctus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 123 n. 23, ♀.

---

1) *Lep.:* Nonagria sparganii, N. arundinis (Mocsáry).

lethifer Mosc.[1]) — ♂ — Eur.: Hungaria.
Amblyteles lethifer Mocsáry, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 210 n. 3, ♂. [n. 150, ♂.
Amblyteles lethifer Mocsáry, Magy. Tud. Akad. Math. & Termész. Közlem. XX. P. 2. 1885 p. 115
Amblyteles laetifer Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 592 n. 20, ♂ [err.].
limnophilus Thoms.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Fennia, Germania.
Ichneumon subcylindricus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 321 n. 117, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon subcylindricus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 169 n. 115, [♂ [excl. ♀].
Ichneumon subcylindricus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 231 n. 70b,
Amblyteles Gravenhorsti var. subcylindricus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 [p. 109.
Amblyteles limnophilus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 119 n. 26, ♀ ♂.
Ichneumon (Spilichneumon) limnophilus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2089 n. 4.
Amblyteles limnophilus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 646 n. 111, ♀ ♂.
var. **brischkei** Berth. — ♂ — Eur.: Germania. [p. 647, ♂.
Amblyteles limnophilus var. Brischkei Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
lissonotus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Amblyteles lissonotus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 260 n. 30, ♀.
Amblyteles lissonotus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France XLIV. 1895 p. 586 n. 9, ♀.
litigiosus Wesm.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Gallia, Helvetia, Germania.
Ichneumon culpatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 513, ♀ [excl. ♂ & varr., [nec Fabricius].
Amblyteles litigiosus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 92 (Ambl. p. 18) [n. 19, ♀ ♂.
Ichneumon gradarius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 80 n. 46, ♂ [excl. ♀].
Amblyteles litigiosus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 252 n. 24, ♀ ♂.
Proclitus litigiosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1880 p. 203, ♀.
Amblyteles litigiosus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 61 & 80 n. 16, ♀ ♂.
Amblyteles litigiosus Kriechbaumer, Entom. Nachr. VII. 1881 p. 1-6 n. 3, ♂.
Amblyteles litigiosus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 n. 26, ♂.
Amblyteles culpatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 112 n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon (Amblyteles) litigiosus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2093 n. 5, ♀ ♂.
Amblyteles litigiosus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXI. 1895 p. 37.
Amblyteles culpatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 605 n. 43, ♀ ♂.
longicornis (Brischke) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Hepiopelmus longicornis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 58, ♂.
Amblyteles longicornis m.
longigena Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Amblyteles longigena Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 112 n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon (Amblyteles) longigena Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2093 n. 6.
Amblyteles longigena Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 626 n. 79, ♀ ♂.
longimanus Wesm. — ♀ (♂) — Eur.: Germania, Austria, Italia.
Amblyteles longimanus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 397 (Ot. p. 46) n. 1, ♀.
Amblyteles longimanus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 413 n. 2, ♀.
? Amblyteles rufoniger Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 35 n. 23, ♂.
Amblyteles rufoniger Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 166 n. 8.
Amblyteles longimanus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 607 n. 47, ♀ (♂).

---

1) *Lep.:* Dianthoecia silenes (Mocsáry).
2) *Lep.:* Nonagria typhiae, N. sparganii, Gortyna flavago (Brischke).
3) *Lep.:* Melitaea maturna (Taschenberg), Setina ramosa (Fallou).

lotharingicus Rdw.! — ♀ — Eur.: Gallia, Germania.
Amblyteles Lotharingicus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 130 n. 26, ♀.
luctus Cress. — ♂ — Am.: Canada, Colorado.
Ichneumon tenebrosus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 145 n. 18, ♂ [non Wesmael].
Ichneumon luctus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 250 n. 8.
Ichneumon mellipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 295, ♂.
Amblyteles luctus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 190 n. 13, ♂.
Amblyteles luctus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 8 n. 8b, ♂.
Amblyteles luctus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 297 n. 8b, ♂.
ludovicus Cam. — As.: India.
Amblyteles Ludovicus Cameron, Proc. & Trans. Nat. Hist. Soc. Glasgow (2) I. P. 3. 1887 p. 272.
lusitanus Wesm. — ♂ — Eur.: Lusitania.
Amblyteles Lusitanus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 115 (Ambl. p. 41) [n. 31, ♂.
Amblyteles Lusitanus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 615 n. 64, ♂.
macilentus Berth. — ♂ — Eur.: Gallia, Hispania.
Amblyteles macilentus Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1898 p. 332 n. 40, ♂.
macrocephalus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Amblyteles macrocephalus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 34 n. 24, ♂.
maestus Mocs. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Amblyteles moestus Mocsáry, Magy. Tud. Akad. Math. & Termész. Közlem. XX. P. 2. 1885 [p. 123 n. 164, ♂.
Amblyteles moestus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 592 n. 21, ♂ [err.].
magnus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Colorado.
Ichneumon magnus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 258 n. 41, ♂.
Amblyteles magnus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 191 n. 16, ♀.
marginator Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Amblyteles marginatus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 328 n. 21, ♀.
Amblyteles marginatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 767 n. 21, ♀.
margineguttatus (Grav.) Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Belgia, Germania.
Ichneumon margineguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 393 n. 152, ♂.
Ichneumon oratorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 394, ♀ [excl. ♂ & var. 1, ♀].
Amblyteles margineguttatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 121 n. 11, ♂ [excl. ♀].
Amblyteles margineguttatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 85 (Ambl. [p. 11) n. 10, ♀.
Amblyteles margineguttatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 48 [n. 152, ♂ [excl. ♀].
Amblyteles margineguttatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 415 [n. 12, ♀ ♂.
Amblyteles margineguttatus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 221 n. 5, ♀ ♂.
Amblyteles margineguttatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 78 n. 9, ♀ ♂.
Amblyteles margineguttatus, Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 116 n. 14.
Ichneumon (Amblyteles) margineguttatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2094 n. 12, ♀ ♂.
Amblyteles margineguttatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 650 [n. 118, ♀ ♂.
var. **novitius** Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Amblyteles novitius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 86 (Ambl. p. 12) [n. 11, ♀ ♂; Tab. F. 10 (♀).
Amblyteles margineguttatus var. novitius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 78.
massiliensis Berth. — ♂ — Eur.: Gallia.
? Amblyteles Massiliensis Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 132 n. 30, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Noctua brunnea (Bignell).

Amblyteles Massiliensis Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VII. 1894 p. 180.
Amblyteles Massiliensis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 595 n. 26, ♂.

mauritanicus Rdw.! — ♀ — Afr.: Algeria.
Amblyteles Mauritanicus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 131 n. 28, ♀.

melanocastanus (Grav.) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon semiannulatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 179 n. 76.
Ichneumon melanocastanus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 351 n. 94, ♀ ♂.
Ichneumon restaurator var. a Trentepol, Isis 1826 p. 237.
Ichneumon melanocastanus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 553 n. 231, ♀ ♂.
Ichneumon melanocastanus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 197 n. 191.
Ichneumon melanocastanus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 135 n. 33, ♀ ♂ [excl. var. 1 & 2].
Amblyteles melanocastanus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 40 (Adn. p. 8), ♀ ♂.
Amblyteles melanocastanus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 131 (Ambl. p. 57) n. 46, ♀ ♂.
Amblyteles melanocastaneus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 41 n. 9, ♀ ♂.
Amblyteles melanocastaneus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 459 n. 50, ♀ ♂.
Amblyteles melanocastanus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 267 n. 35, ♀ ♂.
Amblyteles melanocastanus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 81 n. 32, ♀ ♂.
Amblyteles melanocastaneus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 584 n. 4, ♀ ♂.

messorius (Grav.) Wesm.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon messorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 345 n. 86, ♀.
Ichneumon messorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 529 n. 219, ♀ [excl. ♂].
Amblyteles messorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 134 n. 31, ♀ ♂.
Ichneumon messorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 411 n. 60, ♀ [excl. ♂].
Amblyteles messorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 130 (Ambl. p. 56) p. 44, ♀ ♂.
Amblyteles messorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 457 n. 47, ♀ ♂.
Amblyteles messorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 261 n. 31, ♀ ♂.
Ichneumon melanocastanus Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 179 n. 34, ♀.
Amblyteles messorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 48, ♂.
Amblyteles messorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 80 & 81 n. 30, ♀ ♂.
Ichneumon (Ctenichneumon) messorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2085 n. 3.
Amblyteles messorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 586 n. 10, ♀ ♂.

monitorius (Panz.) Wesm.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia, Germania, Hungaria, Russia.
Ichneumon XXXV Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 83 F. 7.
Ichneumon XXXVII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 72 F. 5.
Ichneumon LXXXIV Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. III. 1779; T. 205 F. 6.
Ichneumon LXXXVI Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. III. 1779; T. 223 F. 7.
Ichneumon mercatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 143 n. 41.
Ichneumon mercatorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 78 T. 11.
Ichneumon monitorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 80 T. 13.

---

[1] *Lep.:* Taeniocampa cruda (Giraud), Cucullia chamomillae (Mocsáry), Dianthoecia cucubali (Bridgman).

[2] *Lep.:* Plusia asclepiadis (Moscáry).

[3] *Lep.:* Smerinthus populi (Giraud), Perigrapha cincta (Mocsáry), Noctua pronuba (Boie).

Ichneumon vaginatorius (recte mercatorius) Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 61 n. 38.
Ichneumon mercatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 62 n. 38.
Ichneumon monitorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 62.
Ichneumon mercatorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 65.
Ichneumon monitorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♀.
Ichneumon mercatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♂.
Ichneumon mercatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 316 n. 51, ♂.
Ichneumon venditor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 266.
Ichneumon mercatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279.
Ichneumon venditor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 322.
Ichneumon mercatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 361.
Ichneumon interruptus Trentepol, Isis 1826 p. 80 n. 25, ♀.
Ichneumon mercatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 369 n. 141, ♂.
Ichneumon monitorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 373 n. 143, ♀ ♂.
Ichneumon mercatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 953 n. 108.
Ichneumon mercatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 173 n. 125.
Ichneumon monitorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 175 n. 130.
Amblyteles monitorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 114 [n. 2, ♀ ♂.
Ichneumon monitorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 68 n. 33, ♀.
Amblyteles monitorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 84 (Ambl. p. 10) [n. 4, ♀ ♂.
Amblyteles monitorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 414 n. 5, ♀ ♂.
Amblyteles monitorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 78 n. 4, ♀ ♂.
Amblyteles monitorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 622 n. 74, ♀ ♂.

var. **fulvicornis** Berth. — ♂ — Eur.: Gallia.
Amblyteles monitorius var. fulvicornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 623, ♂.

montanus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Colorado.
Ichneumon montanus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 141 n. 10, ♀ ♂.
Ichneumon montanus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 249 n. 2, ♀.
Amblyteles montanus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 188 n. 2, ♀ ♂.
Amblyteles montanus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 327 n. 19, ♀ ♂.
Amblyteles montanus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 766 n. 19, ♀ ♂.

montivagus Berth. — ♀ — Eur.: Alpes.
Amblyteles montivagus Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais IX. 1896 p. 196, ♀.
Amblyteles montivagus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 398, ♀.

mormonus Cress. — ♀ — Am.: Utah.
Amblyteles Mormonus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 190 n. 9, ♀.
Amblyteles Mormonus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 355, ♀.

muticus Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Alpes.
Amblyteles muticus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 90 n. 14, ♀ ♂.

negatorius (Fabr.) Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota; As. bor.
—— Borowski, Gemeinn. Naturg. 1787 p. 32 n. 2; T. 57 A Fig. 2.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 58 n. 160.
? Ichneumon ochromelas Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2683 n. 236.
? Ichneumon pulchellus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 342; T. 34 F. 4.
Ichneumon negatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 141 n. 35.
Ichneumon ornatorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 73 T. 15.
Ichneumon negatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 60 n. 31.

---

[1]) *Lep.:* Noctua brunnea (Giraud).

Ichneumon ornatorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 63.
Ichneumon negatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 111, ♂.
Ichneumon negatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277.
Ichneumon negatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 355.
Ichneumon negatorius Trentepol, Isis 1826 p. 230 n. 47.
Ichneumon sartorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 308 n. 107, ♀.
Ichneumon ornatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 311 n. 110, ♂.
Ichneumon pulchellus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 966 n. 123.
Ichneumon sartorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 166 n. 108, ♀.
Ichneumon ornatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 167 n. 111, ♂.
Ichneumon ornatorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 363 n. 22, ♂.
Ichneumon ornatorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 304 n. 12. [n. 29, ♀♂.
Amblyteles negatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 133
Amblyteles negatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 303 (Mant. p. 66), ♀♂.
Amblyteles negatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 101 (Ambl. p. 27) [n. 25, ♀♂.
Amblyteles negatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 41 n. 7, ♀♂.
Amblyteles negatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 17, ♀♂.
Amblyteles negatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 451 n. 26, ♀♂.
Amblyteles negatorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 251 n. 23, ♀♂.
Amblyteles negatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 48, ♀♂.
Amblyteles negatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 79 n. 22, ♀♂.
Amblyteles negatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 117 n. 19, ♀♂.
Ichneumon (Amblyteles) negatorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2097 n. 22.
Amblyteles negatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 640 n. 102, ♀♂.

var. **nigricornis** Berth. — ♀ — Eur. [p. 640, ♀.
Amblyteles negatorius var. nigricornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895

var. **nubilus** Berth. — ♀ — Eur. [p. 640, ♀.
Amblyteles negatorius var. nubilus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895

nigrifrons Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Tirolia, Italia.
Amblyteles nigrifrons Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 179 n. 36, ♀♂.
Amblyteles nigrifrons Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 636 n. 95, ♀♂.

nitens (Christ) D. T.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon nitens Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 350, ♀; T. 35 F. 9.
Ichneumon nitens Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284, ♀.
Ichneumon mesocastanus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 334 n. 74, ♂.
Ichneumon mesocastanus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 469 n. 189, ♂.
Ichneumon nitens Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 476 n. 194, ♀. [n. 32, ♀♂.
Amblyteles mesocastanus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 135
Amblyteles mesocastanus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 131 (Ambl. p. 57) [n. 45, ♀♂.
Amblyteles mesocastanus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 409 (Misc. [p. 50) n. 4, ♂.
Amblyteles mesocastanus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 18, ♀♂.
Amblyteles mesocastanus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 458 [n. 49, ♀♂.
Amblyteles mesocastanus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 266 n. 34, ♀♂.
Amblyteles mesocastanus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 80 & 81 n. 31, ♀♂.

---

[1]) *Lep.:* Caradrina cubicularis (Taschenberg), Trichiura crataegi (Gravenhorst), Aglossa pinguinalis? (Vollenhoven).

Ichneumon (Ctenichneumon) mesocastanus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2087 [n. 8, ♀ ♂.
Amblyteles mesocastaneus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 589 n. 15
Amblyteles nitens m. [nec 16].
var. **nigrocastaneus** (Berth.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.
Amblyteles mesocastaneus var. nigrocastaneus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV.
Amblyteles nitens var. nigrocastaneus m. [1895 p. 589, ♀ ♂.
var. **vespertinus** (Christ) D. T. — ♀ ♂ — Eur.
? Ichneumon glabratorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 154 n. 1789.
Ichneumon vespertinus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 342, ♂; T. 34 F. 5.
Ichneumon molitorius var. h Schrank, Fauna Boica II. 1. 1802 p. 275 n. 2072.
Ichneumon vespertinus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 16 n. 38, ♂.
Ichneumon vespertinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 234 n. 76, ♂.
Ichneumon mesocastaneus var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 469 n. 189, ♂.
Ichneumon vespertinus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 154 n. 75, ♂.
Ichneumon mesocastaneus var. Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 135 n. 32, ♂.
Ichneumon vespertinus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 27 n. 76, ♂.
Ichneumon vespertinus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 309 n. 76, ♂.
Amblyteles mesocastaneus var. vespertinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV.
Amblyteles nitens var. vespertinus m. [1895 p. 589, ♂.
nitidus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Amblyteles nitidus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 19, ♀.
nonagriae Holmgr.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Amblyteles Nonagriae Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 232 n. 12, ♀ ♂.
Amblyteles Celsiae Tischbein, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 258, 277, ♀ ♂ & 311, ♀.
Amblyteles Celsiae Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 182 n. 27, ♀ ♂.
Amblyteles Nonagriae Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 118 n. 24.
Ichneumon (Spilichneumon) Celsiae Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2090 n. 8.
Amblyteles Nonagriae Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 639 n. 101, ♀ ♂.
nortonii Cress. — ♀ — Am.: Connecticut.
Ichneumon Nortoni Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 304, ♀.
Amblyteles Nortoni Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 192 n. 21, ♀.
Amblyteles Nortoni Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 328 n. 23, ♀.
Amblyteles Nortoni Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 768 n. 23, ♀.
nubivagus Cress.[2]) — ♂ — Am.: Canada, Colorado. [Wesmael].
Ichneumon consimilis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 163 n. 41, ♂ [non
Amblyteles nubivagus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 193 n. 27, ♂.
Amblyteles nubivagus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 12 n. 17, ♂.
Amblyteles nubivagus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 301 n. 17, ♂.
var. **juxtus** Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Ichneumon juxtus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 163 n. 42, ♂.
Ichneumon aequalis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 76.
Amblyteles nubivagus var. juxta Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 193.
obesus Berth. — ♀ ♂ — As.: Algeria.
Amblyteles obesus Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais IX. 1896 p. 196, ♂.
Amblyteles obesus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 397, ♂.
Amblyteles obesus Pic, Bull. soc. entom. France 1898 p. 353, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Nonagria paludicola (Holmgren), Jaspidea celsiae (Tischbein, Mocsáry).
[2]) *Lep.:* Cucullia intermedia (Speyer).

occisor (Fabr.) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon occisor Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 142 n. 37, ♂.
Ichneumon marginatorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 73 T. 14 (♂).
Ichneumon occisorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 61 n. 34, ♂.
Ichneumon marginatorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 66, ♂.
Ichneumon occisorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♂.
Ichneumon occisorius Gravenhorst, Magaz. f. Entom. IV. 1821 p. 261 n. 2, ♂.
Ichneumon occisorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278, ♂.
Ichneumon occisorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 355, ♂.
Ichneumon occisorius Trentepol, Isis 1826 p. 222 n. 39, ♂.
Ichneumon sanguinatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 295 n. 100, ♀ [non ♂].
Ichneumon occisorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 389 n. 149, ♂.
Ichneumon marginatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 961, ♂. [[non ♂].
Ichneumon sanguinatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 164 n. 102, ♀
Ichneumon occisorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 178 n. 137, ♂.
Amblyteles occisorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 122 [n. 16, ♀ ♂.
Ichneumon sanguinatorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 61 n. 19, ♀ [[non ♂].
Ichneumon occisorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 70 n. 37, ♂.
Amblyteles occisorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 296 (Mant. p. 59), ♀ ♂.
Amblyteles occisorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 40 (Adn. p. 8), ♂.
Amblyteles occisorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 100 (Ambl. p. 26) [n. 23, ♀ ♂.
Ichneumon sanguinatorius Kolenati, Jahresh. naturw. Sect. mähr.-schles. Ges. f. Acker- [bau etc. f. 1858 p. 46 n. 11.
Amblyteles occisorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 16, ♀ ♂.
Amblyteles occisorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 470 (Doc. p. 30) [n. 4, ♀ ♂.
Amblyteles occisorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 451 n. 24, ♀ ♂.
Amblyteles occisorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1874 p. 233 n. 13, ♀ ♂.
Amblyteles occisorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 43, ♀ ♂; T. 27 F. 1 (♂) & 2 (♀).
Amblyteles occisorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 78–80 n. 20, ♀ ♂.
Amblyteles occisorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 118 n. 23, ♀ ♂.
Ichneumon (Spilichneumon) occisorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2089 n. 3.
Amblyteles occisorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 645 n. 109, ♀ ♂.
var. **nigrinior** Berth. — ♂ — Eur. [p. 646, ♂.
Amblyteles occisorius var. nigrinior Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
var. **nigrinus** Berth. — ♂ — Eur. [p. 646, ♂.
Amblyteles occisorius var. nigrinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
var. **rufinus** Berth. — ♂ — Eur. [p. 645, ♂.
Amblyteles occisorius var. rufinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
oratorius (Fabr.) Wesm.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 57 n. 145.
? Ichneumon dealbatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2678 n. 226.
Ichneumon oratorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 138 n. 24.

---

1) *Lep.:* Gortyna flavago (Rondani, Eversmann).

2) *Lep.:* Agrotis brunnea (Giraud, Taschenberg), Noctua festucae (Vollenhoven), Aplecta nebulosa (Bignell), Saturnia pavonia (Bridgman).

Ichneumon oratorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 80 T. 10.
Ichneumon oratorius Fabricius Syst. Piez. 1804 p. 58 n. 20.
Ichneumon oratorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 62.
Ichneumon oratorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♂.
Ichneumon oratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253.
Ichneumon oratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 290.
Ichneumon molitorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 258, ♀ [p. p., non Linné].
Ichneumon oratorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 394 n. 153, ♀ ♂.
Ichneumon oratorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 179 n. 139.
Amblyteles oratorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 116 [n. 5, ♀♂.
Amblyteles oratorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 87 (Ambl. p. 13, [n. 12, ♀♂.
Amblyteles oratorius Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 31 n. 87.
Amblyteles oratorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 16, ♀♂.
Amblyteles oratorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 415 n. 13, ♀♂.
Amblyteles oratorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 223 n. 6, ♀ ♂.
Amblyteles oratorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 61, 78 & 79 n. 8, ♀♂.
Amblyteles oratorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 116 n. 13, ♀♂.
Ichneumon (Amblyteles) oratorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2094 n. 11, ♀♂.
Amblyteles oratorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 649 n. 117, ♀♂.

var. **atramentarius** (Grav.) Berth. — ♂ — Eur.: Britannia, Germania.
Ichneumon atramentarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 397 n. 153b, ♂.
Ichneumon atramentarius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 179 n. 140.
Ichneumon oratorius var. atramentarius Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 [(Rem.) p. 48 n. 153b.
Amblyteles oratorius var. atramentarius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 650, ♂.

var. **bipunctus** Berth. — ♀ ♂ — Eur.
Amblyteles oratorius var. bipunctus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 650, ♀♂.

ormenus Cress. — ♀ — Am.: Canada, Pennsylvania.
Ichneumon Ormenus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 141 n. 12, ♀.
Amblyteles Ormenus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 190 n. 10, ♀.
Amblyteles Ormenus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 8 n. 7, ♀.
Amblyteles Ormenus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 297 n. 7, ♀.

ornatus Cress. — ♀ — Am.: New York.
Hoplismenus ornatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1869 p. 92, ♀.
Amblyteles ? ornatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 194 n. 35, ♀.

palliatorius (Grav.) Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon palliatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 385 n. 147, ♀ ♂.
Ichneumon palliatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 145 n. 53.
Amblyteles palliatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 118 [n. 8, ♀♂.
Ichneumon palliatorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 69 n. 36, ♂.
Amblyteles palliatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 82 (Ambl. p. 8 [n. 1, ♀♂.
Amblyteles palliatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 39 n. 2, ♀♂.
Amblyteles palliatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 413 n. 1, ♀♂.
Amblyteles palliatorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 214 n. 1, ♀ ♂.
Amblyteles palliatorius Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 141 n. 292, ♀♂.

---

1) *Lep.:* Mamestra tincta (Mocsáry).

Amblyteles palliatorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 10, ♀♂; T. 7 F. 4 (♂) & 5 (♀).
Amblyteles aequivocus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 34 n. 22, ♂.
? Amblyteles rufoniger Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 35 n. 23.
Amblyteles palliatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 78 n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon gemmatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 173 n. 11, ♂.
Amblyteles palliatorius Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLIII. 1882 p. 480 n. 10, ♀♂.
Amblyteles palliatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 112 n. 2, ♀♂.
Amblyteles aequivocus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 165 n. 7, ♂.
Amblyteles rufoniger Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 166 n. 8, ♂.
Ichneumon (Amblyteles) palliatorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2092 n. 3.
Amblyteles palliatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 618 n. 67, ♀♂.
Pseudamblyteles palliatorius Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 18.

var. **defensorius** (Vill.) Wesm. — ♂ — Eur.
Ichneumon defensorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 156 n. 65.
Ichneumon defensorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 214 n. 46.
Ichneumon defensorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 408 n. 160, ♂.
Ichneumon defensorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 181 n. 145.
Ichneumon defensorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 161 (Mant. p. 28), ♂.
Amblyteles palliatorius var. defensorius Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 [(Rem.) p. 49 n. 160, ♂.
Amblyteles palliatorius var. defensorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 619, ♂.

var. **erythropygus** (Grav.) Berth. — ♂ — Eur.
Ichneumon erythropygus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 381 n. 145b.
Ichneumon erythropygus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 177 n. 135.
Ichneumon? (Amblyteles?) infinitus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 30 n. 15, ♂.
Amblyteles palliatorius var. erythropygus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 619, ♂.

var. **ochraceus** (Tischb.) Berth. — ♀ ♂ — Eur. centr.
Ichneumon ochraceus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 426 n. 83, ♂.
Ichneumon laetus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 178 n. 21, ♂.
Amblyteles palliatorius var. ochraceus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 619, ♀♂.

var. **spoliator** Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Amblyteles spoliator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 117 [n. 7, ♀♂.
Amblyteles spoliator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 83 (Ambl. p. 9) n. 3, ♀♂.
Amblyteles spoliator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 414 n. 4, ♀♂.
Amblyteles spoliator Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 216 n. 2, ♀ ♂.
Amblyteles spoliator Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 79 & 81 n. 3, ♀ ♂.
Amblyteles palliatorius var. spoliator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 619, ♀♂.

pallidicornis (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Gallia, Belgia, Germania.
Ichneumon pallidicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 294 n. 99, ♀ ♂.
Ichneumon pallidicornis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 164 n. 101.
Amblyteles pallidicornis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 121 n. 13, ♀♂.
Amblyteles pallidicornis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 100 (Ambl. p. 26) [n. 21, ♀♂.
Amblyteles pallidicornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 450 n. 22, [♀♂.
Amblyteles pallidicornis Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 226 n. 8, ♀ ♂.
Amblyteles pallidicornis Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 79 n. 18, ♀ ♂.
Ichneumon (Amblyteles) pallidicornis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2097 n. 20.
Amblyteles pallidicornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 628 n. 83, ♀♂.

pandur Kriechb. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Amblyteles pandur Kriechbaumer, Termész. Füzet. VI. 1882 p. 147 n. 8, ♀.
Amblyteles pandur Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 612 n. 58, ♀.
panzeri Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Belgia, Germania, Austria, Hungaria.
Ichneumon XLIX Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 84 F. 8.
Ichneumon laboratorius Panzer, Nomencl. 1804 p. 98, ♂.
Ichneumon laboratorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 317 n. 114, ♂.
? Ichneumon fumigator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 537, ♀ [p. p.]. [♀♂.
Amblyteles Panzeri Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 136 n. 35,
Amblyteles Panzeri Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 303 (Mant. p. 66), ♂.
Amblyteles Panzeri Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 132 (Ambl. p. 58; [n. 48, ♀♂.
Amblyteles Panzeri Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 91, ♂.
Amblyteles Panzeri Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 469 (Doc. p. 29; [n. 3, ♀♂.
Amblyteles Panzeri Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 459 n. 53, ♀♂.
Amblyteles Panzeri Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 61 & 82 n. 35, ♀ ♂.
Amblyteles Panzeri Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 590 n. 17, ♀ ♂.
var. **immarginatus** Berth. — ♂ — Eur. [p. 590, ♂.
Amblyteles Panzeri var. immarginatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
var. **nigricans** Berth. — ♀ — Eur.
Amblyteles Panzeri var. nigricans Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 590, ♀.
var. **vexillarius** Tischb. — ♂ — Eur.: Germania.
Amblyteles vexillarius Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 293 n. 355, ♂.
Amblyteles vexillarius Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 164 n. 5, ♂. [♂.
Amblyteles Panzeri var. vexillarius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 590
pedatus Berth. — ♀ — Eur.: Ural. [n. 57, ♀.
Amblyteles pedatus (Eversmann) Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 611
perluctuosus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Amblyteles perluctuosus Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 10.
Amblyteles perluctuosus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 189 n. 5, ♀ [non ♂].
Amblyteles perluctuosus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 6 n. 3, ♀.
Amblyteles perluctuosus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 295 n. 3, ♀.
perplexus Tosqu. — ♀ — Afr.: Caffraria.
Amblyteles perplexus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 78 n. 2, ♀.
picii Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Amblyteles Pici Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VII. 1894 p. 180.
Amblyteles Pici Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 610 n. 54, ♀.
politus Wesm. — ♀ — Eur.: Germania, Helvetia. [n. 3, ♀.
Amblyteles politus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 408 (Misc. p. 49;
Amblyteles politus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 454 n. 36, ♀.
Amblyteles politus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 611 n. 56, ♀.
polyxanthus Kriechb. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Amblyteles polyxanthus Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. III. P. 3. 1869 p. 129, ♀.
Amblyteles polyxanthus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 638 n. 99, ♀.
proteus (Christ) Wesm.[2]) — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.; As.: Japonia.
—— Albin, Nat. Hist. Engl. Insects 1720 p. ?

[1]) *Lep.:* Agrotis exclamationis (Bignell), A. segetum (auct. plur.).
[2]) *Lep.:* Sphinx elpenor, Sph. pinastri (auctores multi), Smerinthus populi (Vollenhoven), Mamestra tincta (Mocsáry).

Ichneumon proteus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 347, ♀; T. 35 F. 2.
Ichneumon laminatorius Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 220 n. 33-34, ♂.
Ichneumon laminatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 60 n. 28, ♂.
Ichneumon proteus Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 283, ♀.
Ichneumon laminatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 280, ♂.
Ichneumon laminatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 363, ♂.
Ichneumon laminatorius Trentepol, Revis. crit. gen. Ichneum. 1825 p. 16 n. 1.
Ichneumon laminatorius Trentepol, Isis 1826 p. 62 n. 1, ♂.
Ichneumon proteus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 217 n. 66, ♀.
Ichneumon laminatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 218 n. 67, ♂.
Ichneumon proteus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 15 n. 36.
Ichneumon laminatorius Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 16 n. 37.
Ichneumon laminatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 150 n. 65, ♂.
Ichneumon proteus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 150 n. 66, ♀.
Ichneumon proteus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 134 n. 16, ♀.
Amblyteles proteus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 137 n. 36, ♀.
Ichneumon proteus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 169 n. 25.
Amblyteles laminatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 132 (Ambl. p. 58) [n. 49, ♀♂.
Ichneumon proteus Kawall, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 230 n. 14, ♀.
Amblyteles laminatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 19, ♀♂.
Ichneumon proteus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 301 n. 66, ♀.
Ichneumon laminatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 301 n. 67, ♂.
Amblyteles laminatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 459 n. 54, [♀♂.
Amblyteles laminatorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 276 n. 42, ♀♂.
Amblyteles proteus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 60 n. 36, ♀♂.
Amblyteles laminatorius Holmgren, Entom. Tidsskr. V. 1884 p. 96.
Ichneumon (Protichneumon) laminatorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1901 n. 6.
Amblyteles laminatorius Kriechbaumer, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig XIX./XXI. 1893/94. [1895 p. 127 n. 5, ♀.
Amblyteles laminatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 583 n. 2, ♀♂.

proximus Tischb. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Amblyteles proximns Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 36 n. 24, ♀.
Amblyteles proximus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 166 n. 9, ♀.
Amblyteles proximus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 610 n. 53, ♀.

punctus (Grav.) Thoms.[1]) — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
? Ichneumon deceptor Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 784 n. 746; T. 40 F. 746.
? Ichneumon deceptor Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 142 n. 25.
? Ichneumon deceptor Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 345.
? Ichneumon deceptor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 212 n. 31.
? Ichneumon deceptor Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 308 n. 40, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon punctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 323 n. 119, ♂.
Ichneumon deceptor Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 332 n. 126, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon punctus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 169 n. 116, ♂.
Ichneumon deceptor Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 170 n. 119, ♀.
Ichneumon deceptorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 365 n. 29, ♀.
Ichneumon punctus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 49 n. 43, [♀♂.
Ichneumon deceptor Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 63 n. 23, ♂.
Ichneumon punctus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 29 n. 85.

---

[1]) *Lep.:* Caradrina kadenii (Mocsáry).

Ichneumon punctus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 386 n. 60, ♀ ♂.
Ichneumon punctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 39, ♀.
Ichneumon punctus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 181 n. 29, ♀ ♂.
Ichneumon punctus Holmgren, Entom. Tidskr. I. 1880 p. 81 n. 65-66, ♀ ♂.
Ichneumon punctus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 23 n. 35, ♀ ♂.
Ichneumon (Amblyteles) punctus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2091 n. 1.
Amblyteles punctus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 648 n. 116, ♀ ♂.

var. **leucomelas** (Grav.) Berth. — ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Belgia, Gallia, Germania, [Hungaria.
Ichneumon leucomelas Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 255 n. 85, ♂ [excl. ♀].
Amblyteles punctus var. leucomelas Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 649, ♂.

quadrimaculatus Rdw.! — ♀ — Eur.: Italia.
Amblyteles quadrimaculatus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 89 n. 12, ♀.

quadripunctorius (Müll.) Berth.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota; Afr.: Algeria.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 345 n. 54.
Ichneumon XLVI Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 83 F. 6.
Ichneumon L Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 84 F. 9.
Ichneumon quadripunctorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 153 n. 1773.
Ichneumon constellatus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 412 n. 55.
Ichneumon sugillatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 168 n. 1.
Ichneumon notatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 171 n. 37.
Ichneumon natatorius Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 219 n. 17-18.
Ichneumon sugillatorius Dwigubsky, Prim. faun. Mosquens. 1802 p. 164 n. 569.
Ichneumon sugillatorius var. Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 49 n. 1.
Ichneumon notator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 54 n. 25.
Ichneumon bipunctatus Schrank, Fauna Boica II. 1802 p. 279 n. 2080, ♂.
Ichneumon sugillatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 54 n. 1.
Ichneumon natatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 57 n. 16.
Ichneumon sugillatorius Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 187 n. 32.
Ichneumon natatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♀.
Ichneumon natatorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284.
Ichneumon xanthozosmus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 318 n. 54, ♂.
Ichneumon natatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 325 n. 63, ♀.
Ichneumon natatorius Gravenhorst, Magaz. f. Entom. IV. 1821 p. 262 n. 3, ♀.
Ichneumon natatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon moratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255, ♀.
Ichneumon natatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 287.
Ichneumon moratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 295, ♀.
Ichneumon sugillatorius Trentepol, Isis 1826 p. 72 n. 15.
Ichneumon notatorius Trentepol, Isis 1826 p. 73 n. 16, ♀.
Ichneumon xanthozosmus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 383 n. 146, ♂.
Ichneumon bidentorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 426 n. 167, ♂.
Ichneumon natatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 429 n. 169, ♀ ♂.
Ichneumon bidentorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 183 n. 152.
Ichneumon natatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 184 n. 154.
Ichneumon natatorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 360 n. 9, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Tryphaena interjecta, T. orbona, T. pronuba (Giraud, Kriechbaumer, Mocsáry), T. fimbria (Bignell), Chariptera viridana (Walch), Polia polymita (Mocsáry), Agrotis comes (Kriechbaumer).

Amblyteles natatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 114 [n. 3, ♀♂.
Ichneumon xanthozosmus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 69 n. 35, ♂.
Ichneumon natatorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 398 n. 41, ♀.
Amblyteles natatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 294 (Mant. p. 57), ♀♂.
Amblyteles natatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 338 (Mant. [p. 101), ♀♂.
Ichneumon bidentorius Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3a Insect. II. 1849; T. 111 F. 6.
Amblyteles natatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 90 (Ambl. p. 16) (n. 15, ♀♂.
Ichneumon natatorius Kolenati, Jahresh. naturw. Sect. mähr.-schles. Ges. f. Ackerbau etc. [f. 1858 p. 45 n. 7.
Amblyteles natatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 475 (Doc. p. 35) n. 6, [♀♂; Tab. F. 1-4 (♀).
Amblyteles xanthozosmus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 482 (Doc. [p. 42), ♂; Tab. F. 5 & 6.
Amblyteles natatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 416 n. 15, ♀♂.
Amblyteles natatorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 245 n. 20, ♀ ♂.
Amblyteles natatorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 10; T. 7 F. 3.
Amblyteles notatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 60 & 61 n. 12, ♀♂.
Ichneumon bidentarius Canestrini & Berlese, Atti soc. Venet.-Trentin. VII. P. 1. 1881 p. 73; [T. 7 F. 13.
Amblyteles xanthozosmus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 113 n. 8, ♀♂.
Amblyteles natatorius Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1234 n. 1.
Ichneumon (Amblyteles) quadrinotatorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2096 n. 16.
Amblyteles quadripunctorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 623 n. 75, [♀♂.
Amblyteles natatorius Montgomery, Entom. M. Magaz. 1899 p. 273, ♀.

var. **bidentorius** (Fabr.) Berth. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon XXV Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 52 F. 5.
Ichneumon bidentorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 331 n. 21.
Ichneumon jubilatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 151 n. 1757.
Ichneumon LXXXIX Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. III. 1779; T. 233 F. 5.
Ichneumon bidentorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 424 n. 21.
Ichneumon bidentorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 262 n. 26.
Ichneumon bidentorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 150 n. 45.
Ichneumon bidentorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2681 n. 96.
Ichneumon citreus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 318; T. 33 F. 5.
Ichneumon bidentorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 145 n. 47.
Ichneumon bidentorius Panzer, Faun. Insect. German. IV. 1797 P. 45 T. 15.
Ichneumon bidentorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 63 n. 43.
Ichneumon bidentorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♂.
Crypturus bidentorius Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 142 n. 7.
Ichneumon bidentorius Trentepol, Isis 1826 p. 81 n. 26, ♀.
Ichneumon bidentorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 946 n. 100.
Crypturus bidentorius Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2a IV. 1835 p. 353 n. 7.
Amblyteles quadripunctorius var. bidentorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. [1895 p. 624, ♂.

var. **carens** Berth. — ♂ — Eur.
Amblyteles quadripunctorius var. carens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 624, ♂.

var. **indecoratus** Berth. — ♀ — Eur.
Amblyteles quadripunctorius var. indecoratus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. [1895 p. 624, ♀.

var. **infestorius** (Fonsc.) Berth. — ♀ — Eur.
Ichneumon infestorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 58 n. 12, ♀.
Amblyteles quadripunctorius var. infestorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. [1895 p. 624, ♀.
var. **mediatorius** (Panz.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon mediatorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 80 T. 7.
Amblyteles mediatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 114 n. 9, ♀♂.
Amblyteles quadripunctorius var.? mediatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France [LXIV. 1895 p. 624, ♀♂.
quebecensis (Prov.) Cress. — ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon Quebecensis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 77.
Amblyteles Quebecensis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 191 n. 18, ♂.
Amblyteles Quebecensis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 10 n. 12, ♂.
Amblyteles Quebecensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 299 n. 12, ♂.
quinquecinctus Kriechb. — ♀ ♂ — As.: Turcestania.
Amblyteles quinquecinctus (Mocsáry) Kriechbaumer, Termész. Füzet. VI. 1882 p. 146 n. 6, ♀♂.
Amblyteles quinquecinctus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 621 n. 72, [♀♂.
var. **caucasicus** Berth. — ♀ — As.: Caucasus.
Amblyteles quinquecinctus var. Caucasicus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. [1895 p. 622, ♀.
radoszkowskii Berth. — ♀ — As.: Russia.
Amblyteles Radoszkowski Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 43, ♀.
Amblyteles Radoszkowskii Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 608 n. 48, ♀.
regalis Cress. — ♂ — Am.: United States.
Ichneumon regalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 295, ♂.
Amblyteles ultus var. regalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 189.
Amblyteles ultus var. regalis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 7, ♂.
Amblyteles regalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 296, ♂.
repentinus (Grav.) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon repentinus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 334 n. 73, ♀.
Ichneumon menstrualis Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 346 n. 87, ♂.
Ichneumon repentinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 467 n. 188, ♀.
Ichneumon menstrualis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 532 n. 220, ♂.
Ichneumon repentinus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 189 n. 165.
Amblyteles melanocastaneus var. 2 Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 [(Tent.) p. 135 n. 33, ♀♂.
Ichneumon repentinus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 400 n. 45, ♂.
Amblyteles repentinus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 403 (Ot. p. 52) n. 6, ♀♂.
Amblyteles repentinus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 18, ♀♂.
Amblyteles repentinus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 458 n. 51, ♀♂.
Amblyteles repentinus Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 10, ♂; T. 7 F. 8.
Amblyteles repentinus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 80 & 81 n. 33, ♀ ♂.
Ichneumon (Ctenichneumon) repentinus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2086 n. 7.
Amblyteles repentinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 584 n. 5, ♀♂.
var. **menstrualis** Berth. — ♂ — Eur.
? Ichneumon menstrualis Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 346 n. 87, ♂.
? Ichneumon menstrualis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 532 n. 220, ♂.
Amblyteles repentinus var. menstrualisBerthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 585, ♂.
restitutor Wesm. — ♀ — Eur.: Belgia, Germania.
Amblyteles margineguttatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 121 n. 11, ♀ [excl. ♂].

[1]) *Lep.:* Cucullia chamomillae (Mocsáry).

Amblyteles margineguttatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 85 (Ambl. [p. 11) n. 10, ♀.
Amblyteles restitutor Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 48 n. 152.
Amblyteles restitutor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 651 n. 119, ♀.

robustus Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Ichneumon robustus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 298, ♀.
Amblyteles robustus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 191 n. 15, ♀.
Amblyteles robustus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 9 n. 10, ♀.
Amblyteles robustus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 298 n. 10, ♀.

rubrocinctus (Luc.) Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Ichneumon rubrocinctus Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 333 n. 398, ♂.
Amblyteles rubrocinctus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 80 n. 3, ♀.

rubroater (Ratzbg.) Vollenh.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon rubroater Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 167 n. 20, ♀ ♂.
Amblyteles rubroater Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 10, ♀; T. 7 F. 9.
Amblyteles rubroater Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 49, ♀ ♂.
Amblyteles rubroater Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 591 n. 19, ♀ ♂.

rufescens Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania.
Amblyteles rufescens Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1898 p. 332 n. 39, ♀ ♂.

ruficornis Rdw.! — ♀ — Eur.: Alpes.
Amblyteles ruficornis Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 92 n. 17, ♀.

rufipes Rdw.! — ♀ — Eur.: Lusitania, Gallia, Dalmatia, Sicilia.
Amblyteles rufipes Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 87 n. 7, ♀.

rufizonatus Cress. — ♀ — Am.: Canada, New Jersey.
Ichneumon rufizonatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 183 n. 72, ♀.
Ichneumon Marianopolitanensis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 81.
Amblyteles rufizonatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 191 n. 17, ♀.
Amblyteles rufizonatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 10 n. 11, ♀.
Amblyteles rufizonatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 298 n. 11, ♀.

rusticus Berth. — ♀ — Eur.: Caucasus.
Amblyteles rusticus Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1898 p. 332 n. 39, ♀.

rutilatus Tosqu. — ♀ — Afr.: Scioa.
Amblyteles rutilatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 93 n. 11, ♀.

satanas Kriechb. — ♀ — As.: Japonia.
Amblyteles satanas Kriechbaumer, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1892/94 p. 127 n. 6, ♀

scutellaris Pic — Eur.: Sardinia.
Amblyteles scutellaris Pic, Revue sc. Bourbonnais XII. 1899 p. 102.

semicaeruleus Cress. — ♀ — Am.: Canada, Vancouvers Island.
Ichneumon semicoeruleus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 302, ♀.
Amblyteles semicoeruleus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 192 n. 23, ♀.
Amblyteles semicoeruleus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 11 n. 15, ♀.
Amblyteles semicoeruleus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 300 n. 15, ♀.

septemguttatus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia, Germania.
Ichneumon septemguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 320 n. 116, ♂.
Ichneumon septemguttatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 169 n. 114.
Ichneumon septemguttatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.)]p. 47 n. 40, ♂.
Amblyteles Wesmaeli Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXIX. 1868 p. 253 n. 8, ♀.

---

1) *Lep.:* Panolis piniperda (Brischke).

var. **infestorius** (Fonsc.) Berth. — ♀ — Eur.
Ichneumon infestorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 58 n. 12, ♀.
Amblyteles quadripunctorius var. infestorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. [1895 p. 624, ♀.
var. **mediatorius** (Panz.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon mediatorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 80 T. 7.
Amblyteles mediatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 114 n. 9, ♀ ♂.
Amblyteles quadripunctorius var.? mediatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France [LXIV. 1895 p. 624, ♀ ♂.
quebecensis (Prov.) Cress. — ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon Quebecensis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 77.
Amblyteles Quebecensis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 191 n. 18, ♂.
Amblyteles Quebecensis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 10 n. 12, ♂.
Amblyteles Quebecensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 299 n. 12, ♂.
quinquecinctus Kriechb. — ♀ ♂ — As.: Turcestania.
Amblyteles quinquecinctus (Mocsáry) Kriechbaumer, Termész. Füzet. VI. 1882 p. 146 n. 6, ♀ ♂.
Amblyteles quinquecinctus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 621 n. 72, [♀ ♂.
var. **caucasicus** Berth. — ♀ — As.: Caucasus.
Amblyteles quinquecinctus var. Caucasicus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. [1895 p. 622, ♀.
radoszkowskii Berth. — ♀ — As.: Russia.
Amblyteles Radoszkowski Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 43, ♀.
Amblyteles Radoszkowskii Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 608 n. 48, ♀.
regalis Cress. — ♂ — Am.: United States.
Ichneumon regalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 295, ♂.
Amblyteles ultus var. regalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 189.
Amblyteles ultus var. regalis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 7, ♂.
Amblyteles regalis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 296, ♂.
repentinus (Grav.) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon repentinus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 334 n. 73, ♀.
Ichneumon menstrualis Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 346 n. 87, ♂.
Ichneumon repentinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 467 n. 188, ♀.
Ichneumon menstrualis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 532 n. 220, ♂.
Ichneumon repentinus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 189 n. 165.
Amblyteles melanocastaneus var. 2 Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 [(Tent.) p. 135 n. 33, ♀ ♂.
Ichneumon repentinus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 400 n. 45, ♂.
Amblyteles repentinus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 403 (Ot. p. 52) n. 6, ♀ ♂.
Amblyteles repentinus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 18, ♀ ♂.
Amblyteles repentinus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 458 n. 51, ♀ ♂.
Amblyteles repentinus Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 10, ♂; T. 7 F. 8.
Amblyteles repentinus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 80 & 81 n. 33, ♀ ♂.
Ichneumon (Ctenichneumon) repentinus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2086 n. 7.
Amblyteles repentinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 584 n. 5, ♀ ♂.
var. **menstrualis** Berth. — ♂ — Eur.
? Ichneumon menstrualis Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 346 n. 87, ♂.
? Ichneumon menstrualis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 532 n. 220, ♂.
Amblyteles repentinus var. menstrualisBerthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 585, ♂.
restitutor Wesm. — ♀ — Eur.: Belgia, Germania.
Amblyteles marginеguttatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 121 n. 11, ♀ [excl. ♂].

---

[1]) *Lep.:* Cucullia chamomillae (Mocsáry).

Amblyteles margineguttatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 85 (Ambl. [p. 11) n. 10, ♀.
Amblyteles restitutor Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 48 n. 152.
Amblyteles restitutor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 651 n. 119, ♀.

robustus Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Ichneumon robustus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 298, ♀.
Amblyteles robustus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 191 n. 15, ♀.
Amblyteles robustus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 9 n. 10, ♀.
Amblyteles robustus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 298 n. 10, ♀.

rubrocinctus (Luc.) Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Ichneumon rubrocinctus Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 333 n. 398, ♂.
Amblyteles rubrocinctus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 80 n. 3, ♀.

rubroater (Ratzbg.) Vollenh.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon rubroater Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 167 n. 20, ♀ ♂.
Amblyteles rubroater Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 10, ♀; T. 7 F. 9.
Amblyteles rubroater Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 49, ♀ ♂.
Amblyteles rubroater Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 591 n. 19, ♀ ♂.

rufescens Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania.
Amblyteles rufescens Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1898 p. 332 n. 39, ♀ ♂.

ruficornis Rdw.! — ♀ — Eur.: Alpes.
Amblyteles ruficornis Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 92 n. 17, ♀.

rufipes Rdw.! — ♀ — Eur.: Lusitania, Gallia, Dalmatia, Sicilia.
Amblyteles rufipes Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 87 n. 7, ♀.

rufizonatus Cress. — ♀ — Am.: Canada, New Jersey.
Ichneumon rufizonatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 183 n. 72, ♀.
Ichneumon Marianopolitanensis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 81.
Amblyteles rufizonatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 191 n. 17, ♀.
Amblyteles rufizonatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 10 n. 11, ♀.
Amblyteles rufizonatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 298 n. 11, ♀.

rusticus Berth. — ♀ — Eur.: Caucasus.
Amblyteles rusticus Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1898 p. 332 n. 39, ♀.

rutilatus Tosqu. — ♀ — Afr.: Scioa.
Amblyteles rutilatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 93 n. 11, ♀.

satanas Kriechb. — ♀ — As.: Japonia.
Amblyteles satanas Kriechbaumer, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1892/94 p. 127 n. 6, ♀

scutellaris Pic — Eur.: Sardinia.
Amblyteles scutellaris Pic, Revue sc. Bourbonnais XII. 1899 p. 102.

semicaeruleus Cress. — ♀ — Am.: Canada, Vancouvers Island.
Ichneumon semicoeruleus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 302, ♀.
Amblyteles semicoeruleus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 192 n. 23, ♀.
Amblyteles semicoeruleus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 11 n. 15, ♀.
Amblyteles semicoeruleus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 300 n. 15, ♀.

septemguttatus (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia, Germania.
Ichneumon septemguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 320 n. 116, ♂.
Ichneumon septemguttatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 169 n. 114.
Ichneumon septemguttatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.)]p. 47 n. 40, ♂.
Amblyteles Wesmaeli Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXIX. 1868 p. 253 n. 8, ♀.

---

1) *Lep.:* Panolis piniperda (Brischke).

Ichneumon septemguttatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 385 [n. 57, ♂.
Ichneumon septemguttatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 181 n. 58, ♀.
Amblyteles Wesmaeli Kriechbaumer, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 89-93.
Amblyteles septemguttatus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1234 n. 2.
Amblyteles septemguttatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 644 n. 108, [♀♂.
severus Rdw.! — ♀ — Eur.: Gallia, Sicilia.
Amblyteles severus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 131 n. 29, ♀.
sexzonatus Rdw.! — ♀ — Eur.: Sicilia.
Amblyteles sexzonatus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 123 n. 22, ♀.
sibiricus Mocs. — ♂ — As.: Sibiria.
Amblyteles Sibiricus Mocsáry, Tijdschr. v. Entom. XXI. 1878 n. 199 n. 3, ♂.
Amblyteles Sibiricus Kriechbaumer, Termész. Füzet. VI. 1882 p. 147 n. 7, ♂.
siculus Rdw.! — ♀ — Eur.: Sicilia.
Amblyteles Siculus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 120 n. 18, ♀.
similaris (Prov.) Davis — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon similaris Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 26, ♂.
Ichneumon similaris Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 157 n. 66, ♂.
Ichneumon similaris Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 298 n. 25, ♂.
Ichneumon similaris Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 274 n. 25, ♂.
Ichneumon adjunctus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 29 n. 82, ♀.
Amblyteles similis Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 185.
simplicidens Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Amblyteles simplicidens Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 120 n. 28, ♀♂.
Ichneumon (Spilichneumon) simplicidens Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2090 n. 6.
Amblyteles simplicidens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 643 n. 105, ♀♂.
slavicekii (Kriechb.) Berth. — ♀ — Eur.: Morawia.
Probolus Slaviceki Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 264 n. 60, ♀.
Amblyteles Slaviceki Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 609 n. 50, ♀.
spilosomae Mocs.[1]) — ♀ — Eur.: Hungaria. [p. 106 n. 128, ♀.
Amblyteles spilosomae Mocsáry, Magy. Tud. Akad. Math. & Termész. Közlem. XX. P. 2. 1885
Amblyteles spilosomae Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 652 n. 122, ♀.
sputator (Fabr.) Wesm.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Belgia, Germania, Austria, Hungaria.
Ichneumon sputator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 153 n. 81.
Ichneumon sputator Panzer, Faun. Insect. German. II. 1794 P. 19 T. 20.
Ichneumon sputator Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 159 n. 491.
Ichneumon sputator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 66 n. 61.
Ichneumon sputator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 110, ♀ ♂.
Crypturus sputator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 141 n. 5.
Ichneumon sputator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284.
Ichneumon sputator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 348 n. 91, ♀♂.
Ichneumon sputator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon sputator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 299.
Ichneumon sputator Trentepol, Isis 1826 p. 216 n. 32, ♀.
Ichneumon sputator v. d. Höven, Bijdr. natuurk. Wet. I. 1826 p. 440 n. 13.
Ichneumon sputator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 542 n. 226, ♀ ♂.
Crypturus sputator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2a IV. 1835 p. 353 n. 5.
Ichneumon sputator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 195 n. 186.

---

1) *Lep.:* Spilosoma menthastri (Mocsáry).
2) *Lep.:* Plusia gamma (Taschenberg).

Amblyteles sputator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 128 [n. 23, ♀ ♂.
Amblyteles sputator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 298 (Mant. p. 61), ♀ ♂.
Amblyteles sputator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 120 (Ambl. p. 46) [n. 36, ♀ ♂.
Amblyteles sputator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 454 n. 38, ♀ ♂.
Amblyteles sputator Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 10, ♂; T. 7 F. 7.
Amblyteles sputator Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 81 & 82 n. 26, ♀ ♂.
Amblyteles sputator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 593 n. 23, ♀ ♂.

var. **nigriventris** Berth. — ♂ — Eur. [p. 593, ♂.
Amblyteles sputator var. nigriventris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895

var. **solutus** Berth. — ♂ — Eur.
Amblyteles sputator var. solutus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 593, ♂.

stadaconensis (Prov.) Cress. — ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon Stadaconensis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 50.
Amblyteles Stadaconensis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 189 n. 8, ♂.
Amblyteles Stadaconensis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 7 n. 6, ♂.
Amblyteles Stadaconensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 296 n. 6, ♂.

stagnicola Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Amblyteles stagnicola Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 119 n. 27, ♀ ♂.
Ichneumon (Spilichneumon) stagnicola Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2089 n. 5, ♀ ♂.
Amblyteles stagnicola Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 648 n. 113, ♀ ♂.

strigatorius (Grav.) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon strigatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 352 n. 136, ♀ ♂.
Amblyteles strigatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 138 [n. 38, ♀ ♂.
Amblyteles strigatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 41 (Adn. p. 9), ♂.
Amblyteles strigatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 134 (Ambl. p. 60) [n. 51, ♀ ♂.
Amblyteles strigatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 19, ♀.
Amblyteles strigatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 460 n. 56, ♀ ♂.
Amblyteles strigatorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 275 n. 41, ♀ ♂.
Amblyteles strigatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 49, ♀.
Amblyteles strigatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 79 & 80 n. 38, ♀ ♂.
Amblyteles strigatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 120 n. 31.
Amblyteles strigatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 629 n. 85, ♀ ♂.

var. **concolor** Berth. — ♂ — Eur. [p. 630, ♂.
Amblyteles strigatorius var. concolor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895

subfuscus Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Ichneumon subfuscus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 173 n. 56, ♀.
Amblyteles subfuscus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 193 n. 31, ♀.

subrufus Cress. — ♀ — Am.: Virginia.
Ichneumon subrufus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 168 n. 49, ♀.
Amblyteles subrufus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 193 n. 29, ♀.
Amblyteles subrufus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 12 n. 18, ♀.
Amblyteles subrufus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 301 n. 18, ♀.

subsericans (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon fossorius Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. p. 562 n. 21, ♂ [non Fabr.].
Ichneumon subsericans Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 285 n. 9.

---

[1]) *Lep.:* Heliothis dipsacea (Giraud).

Ichneumon pedestrinus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 296 n. 25, ♀.
Ichneumon subsericans Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 161 n. 31, ♀ ♂.
Ichneumon subsericans Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 12 n. 22.
Ichneumon cognatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 139 n. 36, ♂.
Amblyteles subsericans Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 128 [n. 22, ♀ ♂.
Amblyteles subsericans Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 91 (Ambl. p. 17) [n. 16, ♀ ♂.
Amblyteles subsericans Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 40 n. 4, ♀ ♂.
Ichneumon subsericans Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 260 n. 31, ♀ ♂.
Amblyteles subsericans Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 416 n. 16, [♀ ♂.
Amblyteles subsericans Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 249 n. 22, ♀ ♂.
Amblyteles subsericans Kriechbaumer, Entom. Nachr. I. 1875 p. 109-112, 117-118 & 128.
Amblyteles subsericans Lallemand, Ann. soc. entom. Belgique XXI. 1878 C.R. p. CCLXXXV.
Amblyteles subsericans Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 60 & 61 n. 13, ♀ ♂.
Amblyteles subsericans Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 117 n. 16.
Ichneumon (Amblyteles) subsericans Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2097 n. 24.
Amblyteles subsericans Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 651 n. 121, ♀ ♂.
Amblyteles subsericans Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2404 n. 24.

var. **elongatus** Brischke — ♀ — Eur.
Amblyteles subsericans var. elongatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. [1878 p. 47, ♀.
Amblyteles subsericans var. elongator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 652, ♀.

sulphureopictus Rdw.! — ♀ ♂ — Eur.: Alpes.
Amblyteles sulphureopictus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 91 n. 15, ♀ ♂.

suturalis (Say) Cress. — ♀ — Am. bor.
Ichneumon suturalis Say, Boston Journ. Nat. Hist. I P. 3. 1836 p. 227 n. 1.
Ichneumon suturalis Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 685 n. 1.
Ichneumon propinquus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 172 n. 55, ♀.
Amblyteles suturalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 193 n. 30.
Amblyteles suturalis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 13 n. 19, ♀.
Ichneumon suturalis Thomas, 10th Rep. State Entomol. Illinois f. 1880. 1881 p. 41.
Amblyteles suturalis Provancher, Faun. entom. Canad. Hymén. 1883 p. 301 n. 19, ♀.
Amblyteles superbus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 35 n. 25, ♀.

syrensis Tischb. — ♀ ♂ — Eur.: Naxos, Tinos.
Amblyteles Syraensis Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXI. 1874 p. 143 n. 305, ♀ ♂.
Amblyteles Syrensis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 163 n. 2.
Amblyteles Syrensis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 620 n. 69, ♀ ♂.

taos Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Amblyteles Taos Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 191 n. 19, ♀.

tardus Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Amblyteles tardus Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1897 p. 255 n. 28, ♀.

tauricus Kriechb.[1] — ♀ — Eur.
Amblyteles Tauricus Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofm. Wien III. 1888 p. 32, ♀.
Amblyteles Tauricus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 585 n. 6, ♀.

tetricus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Amblyteles tetricus Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 10.
Amblyteles tetricus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 188 n. 3, ♀.
Amblyteles tetricus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 6 n. 2, ♀ ♂.
Amblyteles tetricus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 294 n. 2, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Chariclea taurica, Scutellaria peregrina (Kriechbaumer).

tischbeinii Berth. — ♂ — Eur.: Italia, Helvetia, Tirolia.
Amblyteles ater Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLIII. 1882 p. 483 n. 11, ♂ [nec Wesmael].
Amblyteles Tischbeini Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 587 n. 11, ♂.

torontosus Davis — ♀ — Am.: Canada.
Amblyteles torontosus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 351, ♀.

tricolor Davis — ♀ ♂ — Am.: Dakota.
Amblyteles tricolor Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1897 p. 351, ♀ ♂.

trifasciatus (Grav.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia, Germania.
? Ichneumon sarcitorius Sulzer, Kennz. d. Insect. 1761 p. 48; T. 18 F. 115.
Ichneumon sarcitorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 344; T. 34 F. 6.
Ichneumon trifasciatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 380 n. 145, ♂.
Ichneumon fasciatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 376 n. 144, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon trifasciatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 176 n. 133, ♂.
Ichneumon triangulator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 177 n. 134, ♂.
Amblyteles trifasciatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 119 [n. 9, ♀ ♂.
Amblyteles trifasciatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 82 (Ambl. p. 8) [n. 2, ♀ ♂.
Amblyteles trifasciatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 413 n. 3, ♀ ♂.
Amblyteles trifasciatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 33 n. 21, ♀ ♂.
Amblyteles trifasciatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 78 n. 2, ♀ ♂.
Amblyteles trifasciatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 620 n. 68, ♀ ♂.

triguttatus Rdw.! — ♀ — Eur.: Gallia.
Amblyteles triguttatus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 135 n. 35, ♀.

tristis Rdw.! — ♀ — Eur.: Lusitania, Gallia.
Amblyteles tristis Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 129 n. 25, ♀.

truncicola Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia, Italia.
Amblyteles truncicola Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 115 n. 11, ♀ ♂.
Amblyteles frustrator Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 42, ♀.
Amblyteles paganus Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 42, ♀.
Ichneumon (Amblyteles) truncicola Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2092 n. 2, ♀ ♂.
Amblyteles truncicola Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 644 n. 107, ♀ ♂.
Amblyteles truncatula Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2404 n. 2.

tuberosus Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Amblyteles tuberosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 647 n. 112, ♀.

ultus Cress. — ♂ — Am.: Canada, Connecticut, Virginia.
Ichneumon ultus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 295, ♂.
Amblyteles ultus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 189 n. 7, ♂.
Amblyteles ultus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 7 n. 5, ♂.
Amblyteles ultus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 296 n. 5, ♂.

unidentatus Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania.
Amblyteles unidentatus Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VII. 1894 p. 180.
Amblyteles unidentatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 602 n. 36, ♀ ♂.

uniguttatus (Grav.) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; Afr.: Algeria; As.: Syria.
Ichneumon uniguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 310 n. 109, ♀ ♂.
Ichneumon uniguttatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 167 n. 110.
Amblyteles uniguttatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 124 [n. 18, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Abrostola urticae, A. triplasia (Giraud).

Amblyteles uniguttatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 297 (Mant. [p. 60), ♀ ♂.
Amblyteles uniguttatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 102 (Ambl. p. 28) [n. 26, ♀ ♂.
Ichneumon uniguttatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 17 n. 32, ♂.
Amblyteles uniguttatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 57 [n. 115 & p. 64 n. 219.
Amblyteles uniguttatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 n. 17, ♂.
Amblyteles uniguttatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 462 (Doc. p. 22,
Ichneumon antennatorius Marshall, Entom. M. Magaz. V. 1868 p. 170. [n. 2, ♀ ♂.
Amblyteles uniguttatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 452 n. 28, ♀ ♂.
Ichneumon uniguttatus H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.
Amblyteles uniguttatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVI. 1875 p. 274 n. 1, ♀ ♂.
Amblyteles uniguttatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 48, ♂.
Amblyteles uniguttatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 79-82 n. 23, ♀ ♂.
Amblyteles uniguttatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 183 n. 28, ♀ ♂.
Amblyteles uniguttatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 163 n. 3, ♂.
Amblyteles uniguttatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 600 n. 33 &

var. **atripes** (Grav.) Berth. — ♀ — Eur.: Italia. [p. 641 n. 104, ♀ ♂.
Ichneumon atripes Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 307 n. 39, ♀.
Ichneumon atripes Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 309 n. 108, ♀.
Ichneumon atripes Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 167 n. 109.
Amblyteles uniguttatus var. atripes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895

var. **flavifemur** (Tischb.) Berth. — ♂ — Eur.: Gallia, Austria. [p. 642, ♀.
Ichneumon flavifemur Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 427 n. 65, ♂.
Amblyteles uniguttatus var. flavifemur Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895

var. **flavolimbatus** (Grav.) Berth. — ♂ — Eur. centr. [p. 601, ♂.
Ichneumon flavolimbatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 316 n. 113, ♂.
Amblyteles uniguttatus var. flavolimbatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. [1895 p. 642, ♂.

var. **fumigator** (Grav.) Berth.[1] — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; Afr. bor.; As. occ.
? Ichneumon agilis Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 369; T. 39 F. 4.
Ichneumon fumigator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 537 n. 223, ♀ [p. p.].
? Ichneumon agilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1034 n. 232.
Amblyteles alternator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 36 n. 25, ♀.
Amblyteles alternator Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 31, ♂.
Amblyteles alternator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 167 n. 10, ♀.
Amblyteles uniguttatus var. fumigator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895

var. **goedartii** (Grav.) Wesm.[2] — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer. [p. 600, ♀.
—— Goedart, Mathem. & hist. nat. Insect. 1662 p. 137; T. 58.
Ichneumon Goedarti Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 474 n. 192, ♀.
Ichneumon Goedarti Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 187 n. 168.
Amblyteles Goedarti Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 125 n. 19.
Ichneumon Goedarti Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 401 n. 47.
Amblyteles Goedarti Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 107 (Ambl. p. 33 [n. 28, ♀.
Amblyteles Goedarti Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 453 n. 29, ♀.
Amblyteles uniguttatus var. Goedarti Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 600, ♀ ♂.

---

[1] *Lep.:* Agrotis decora (Kriechbaumer).
[2] *Lep.:* Leuconea spec. (Rondani).

var. **gracilis** (Brischke) Berth. — ♂ — Eur.: Germania.
Amblyteles gracilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 49, ♂.
Amblyteles uniguttatus var. gracilis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 592 n. 22, ♂.
var. **ignotus** (Fonsc.) Wesm. — ♂ — Eur.: Gallia.
? Ichneumon neglectus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 408 n. 56, ♂.
Ichneumon ignotus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 409 n. 57, ♂.
Amblyteles ignotus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 106 (Ambl. p. 32) [n. 27, ♂.
Amblyteles uniguttatus var. ignotus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 601, ♂.
var. **impressus** Tischb. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Amblyteles impressus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 37 n. 27, ♂.
Amblyteles impressor Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 167 n. 12, ♂.
Amblyteles uniguttatus var. impressus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 601, ♂.
var. **interruptus** (Grav.) Berth. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon interruptus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 319 n. 115, ♂.
Ichneumon interruptus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 182 n. 127, ♂.
Amblyteles uniguttatus var. interruptus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 642, ♂.
var. **praedator** (Fonsc.) Berth. — ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon praedator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 61 n. 20, ♂.
Amblyteles uniguttatus var. praedator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 642, ♂.
var. **pratensis** (Grav.) Berth. — ♂ — Eur.
Ichneumon pratensis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 212 n. 62, ♂.
Ichneumon pratensis Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 12 n. 23.
Ichneumon pratensis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 149 n. 62.
Ichneumon pratensis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 297 n. 62, ♂.
Amblyteles uniguttatus var. pratensis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 642, ♂.
var. **quadricingulatus** (Grav.) Tischb. — ♂ — Eur.
Ichneumon quadricingulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 297 n. 102, ♂.
Amblyteles quadricingulatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 289 n. 324, ♂.
Amblyteles uniguttatus var. quadricingulatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. [1895 p. 642, ♂.
var. **rufinus** Berth. — ♂ — Eur.
Amblyteles uniguttatus var. rufinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 642, ♂.
var. **sibilans** (Grav.) Berth. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon sibilans Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 528 n. 218, ♂.
Amblyteles uniguttatus var. sibilans Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 601, ♂.
var. **stygius** Berth. — ♀ — Eur.
Amblyteles uniguttatus var. stygius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 601, ♀.
var. **subfasciatus** (Tischb.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Austr. inf., Tinos, Graecia.
Amblyteles subfasciatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 38 n. 28, ♂.
Amblyteles interjectus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 38 n. 29, ♀.
Amblyteles subfasciatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 169 n. 13, ♂.
Amblyteles interjectus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 169 n. 14, ♀.
Amblyteles uniguttatus var. interjectus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 641, ♀ ♂.
Amblyteles uniguttatus var. subfasciatus m.
unilineatus (Grav.) Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Germania, Austria.
Ichneumon (Ischnus) unilineatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 641 n. 276, ♀.
Trogus rufescens Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 388 n. 5, ♂. [[non ♂].
Amblyteles unilineatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 398 (Ot. p. 47) n. 2, ♀ ♂.
Amblyteles unilineatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 449 n. 17, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Nonagria paludicola (Kriechbaumer).

Amblyteles unilineatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 47, ♀.
Amblyteles unilineatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 638 n. 100, ♀♂.

var. **ligatorius** Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Ural.
Amblyteles unilineatus var. ligatorius (Eversmann) Berthoumieu, Ann. soc. entom. France [LXIV. 1895 p. 639, ♀♂.

vadatorius (Ill.) Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon sarcitorius var. β Linné, Fauna Suec. Ed. 2 1761 p. 397 n. 1580, ♀.
Ichneumon XL Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 74 F. 4.
Ichneumon sarcitorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 327 n. 3.
Ichneumon sarcitorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 152 n. 1764.
Ichneumon laboratorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 152 n. 1770.
Ichneumon pictus Schrank, Beitr. z. Naturg. 1776 p. 88 n. 51.
Ichneumon sarcitorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 421 n. 3.
Ichneumon pictus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 348 n. 702, ♂.
Ichneumon pictus Schrank, Neu. Magaz. Liebh. Entom. I. 3. 1782 p. 291 n. 701.
Ichneumon raptorius Panzer, Kob: Wurmtrocknis 1786; T. 2 F. 13.
Ichneumon sarcitorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 259 n. 3.
Ichneumon saturatorius Borowski, Naturg. d. Thierr. VIII. 1787 p. 57 A. 1.
Ichneumon pictus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 141 n. 19.
Ichneumon pictus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2677 n. 86.
Ichneumon sanguineus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 349; T. 35 F. 7.
Ichneumon pictus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 220 n. 81.
Ichneumon sarcitorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 134 n. 7.
Ichneumon sarcitorius Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 155 n. 477.
Ichneumon ambulatorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 78 T. 10, ♂ [non Fabr.].
Ichneumon pictus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 278 n. 2079.
Ichneumon sarcitorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 56 n. 9.
Ichneumon ambulatorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 63.
Ichneumon sarcitorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca 1807 p. 58 n. 746 nota, ♀.
Ichneumon vadatorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca 1807 p. 58 n. 747 nota, ♂.
Ichneumon vadatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 306 n. 38, ♀ ♂.
Ichneumon sarcitorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon sarcitorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 287.
Ichneumon sarcitorius Trentepol, Isis 1826 p. 230 var. a & b.
Ichneumon vadatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 304 n. 106, ♀ ♂.
Ichneumon sarcitorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 897 n. 31.
Ichneumon vadatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 166 n. 106.
Amblyteles vadatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 122 [n. 14, ♀ ♂.
Ichneumon vadatorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 62 n. 21, ♂.
Amblyteles vadatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 100 (Ambl. p. 26) [n. 22, ♀ ♂.
Amblyteles vadatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 451 n. 23, ♀ ♂.
Amblyteles vadatorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 225 n. 7, ♀ ♂.
Amblyteles vadatorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 2. 1875 p. 10, ♂; T. 7 F. 6.
Amblyteles vadatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 79 n. 19, ♀ ♂.
Amblyteles vadatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 117 n. 18, ♀ ♂.
Ichneumon (Amblyteles) vadatorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2096 n. 19.
Amblyteles vadatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 627 n. 82, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Agrotis segetum (Brischke), Tryphaena pronuba (Boie, Vollenhoven).

varianus Tosqu. — ♂ — Afr.: Caffraria.
Amblyteles varianus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 97 n. 13, ♂.
variegatorius (Panz.) Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Belgia, Germania, Austria, Russia.
Ichneumon variegatorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 73 T. 11, ♀.
Ichneumon notatorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 80 T. 9, ♂.
Ichneumon notatorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 61, ♀ ♂.
Ichneumon notatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♂.
Ichneumon variegatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♀.
Ichneumon designator Trentepol, Isis 1826 p. 86 n. 31, ♂.
Ichneumon flavoguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 442 n. 174, ♀ ♂.
Ichneumon variegatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 888 n. 22.
Ichneumon notatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 889 n. 23.
Ichneumon flavoguttatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 185 n. 157.
Hepiopelmus variegatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 141 n. 2, ♀ ♂.
Hepiopelmus variegatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 137 (Ambl. p. 63) [n. 2, ♀ ♂.
Hepiopelmus flavoguttatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 461 [n. 2, ♀ ♂.
Hepiopelmus variegatorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 6. 1878 p. 43; T. 27 F. 6.
Hepiopelmus variegatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 111 n. 60.
Amblyteles variegatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 632 n. 91, ♀ ♂.
varilpes Rdw.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Amblyteles varipes Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 86 n. 5, ♀ ♂.
vastatorius Tosq. — ♀ — Afr.: Cap.
Amblyteles vastatorius Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 89 n. 9, ♀.
vaticinator Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Amblyteles vaticinator Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 83 n. 5, ♀.
violaceus Rdw. — ♀ ♂ — Eur.: Italia, Graecia.
Amblyteles violaceus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 84 n. 2, ♀ ♂.
vulnifer Tosqu. — ♂ — Afr.: Caffraria.
Amblyteles vulnifer Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 86 n. 7, ♂.
zonatus Rdw.! — ♀ — Eur.: Gallia.
Amblyteles zonatus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 130 n. 26, ♀.

ANISOPYGUS

Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 36.
ἄνισος, inaequalis; πυγή, nates.

Synon.: Amblyteles Wesmael.
Hepiopelmus Thomson.
Ichneumon Gravenhorst, Wesmael.

pseudonymus (Grav.) Kriechb.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia, Belgia, Germania, Hungaria.
Ichneumon nigritarius var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 114, ♂.
Ichneumon pseudonymus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 76 [p. 74, ♀ ♂.
Ichneumon pseudonymus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 171 (Mant. p. 38), ♀.
Amblyteles pseudonymus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 402 (Ot. p. 51) [n. 4, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Ocneria dispar (Rudow).
2) *Lep.:* Clostera anachoreta (Taschenberg), Pygaera curtula (Brischke), P. reclusa (Kriechbaumer), Hylophila prasina (Mocsáry).

Amblyteles pseudonymus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 10 n. 4.
Amblyteles pseudonymus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 453 n. 33,
Amblyteles pseudonymus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 238 n. 16, ♀ ♂. [♀♂.
Amblyteles pseudonymus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 116 n. 12.
Anisopygus pseudonymus Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 36, ♂.
Hepiopelmus pseudonymus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2098 n. 2.
Amblyteles pseudonymus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 612 n. 59, ♀ ♂.

var. **albostriatus** (Tischb.) D. T. — ♂ — Eur.: Germania.
Amblyteles albostriatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 185 n. 31, ♂ [excl. ♀].
Amblyteles pseudonymus var. nigricornis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 171 [n. 18, ♂.
Amblyteles pseudonymus var. albostriatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. [1895 p. 613, ♂.
Anisopygus pseudonymus var. albostriatus m.

var. **leucopsis** (Berth.) D. T. — ♂ — Eur.: Gallia.
Amblyteles pseudonymus var. leucopsis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 613, ♂.
Anisopygus pseudonymus var. leucopsis m.

PSEUDAMBLYTELES

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 18.
ψευδής, falsus; Amblyteles, nom. propr. Hymen.
Vide genus Amblyteles.

SPILICHNEUMON

Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2082 & 2087.
σπῖλος, macula; Ichneumon, nom. propr. Hymen.
Vide genus Amblyteles.

CTENICHNEUMON

Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2082 & 2083.
κτείς, pecten; Ichneumon, nom. propr. Hymen.
Vide genus Amblyteles.

HYPOMECUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 111.
ὑπό, sub; μῆκος, longitudo.

Synon.: Mesoleptus Gravenhorst, Stephens.
Platylabus Thomson.

quadriannulatus (Grav.) Kriechb.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Mesoleptus quadriannulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 13 n. 5, ♂.
Mesoleptus quadriannulatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 212 n. 2, ♂.
Hypomecus albitarsis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 147 [n. 1, ♀ ♂.
Hypomecus albitarsis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 41 (Adn. p. 9), ♀.
Hypomecus albitarsis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 140 (Ambl. p. 66) [n. 1, ♀ ♂; Tab. F. 14 (♀), 15, 16 (♂) & 17.
Hypomecus albitarsis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 410 (Misc. p. 51) n. 1.

---

[1]) *Lep.:* Cidaria luctuosa, C. berberaria, Cabera trilineatia (Brischke).

Hypomecus albitarsis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 22, ♀.
Hypomecus albitarsis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 204, ♀ ♂.
Hypomecus albitarsis Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 295 n. 1, ♀ ♂.
Hypomecus albitarsis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 50, ♀ ♂.
Hypomecus albitarsis Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 132 n. 1.
Hypomecus quadriannulatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 46 n. 4, ♀ ♂.
Platylabus (Hypomecus) albitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2114 n. 1.
Hypomecus albitarsis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 298, ♀ ♂.

var. **carens** Berth. — ♀ — Eur.
Hypomecus albitarsis var. carens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 299, ♀.
Hypomecus quadriannulatus var. carens m.

LIMERODES

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 111.
λιμηρός, esuriens; εἶδος, visus.

Synon.: Ichneumon Boie.

arctiventris (Boie) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon arctiventris Boie, Naturh. Tidsskr. III. 1841 p. 319 n. 6, ♀ ♂. [n. 1, ♀.
Limerodes ophioniventris Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 112
Limerodes arctiventris Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 294 (Mant. p. 57), ♀ ♂.
Limerodes arctiventris Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 77 (Ambl. p. 3) [n. 1, ♀ ♂; Tab. F. 1 (♀), 2, 3 (♀) & 4.
Limerodes arctiventris Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 16, ♀.
Limerodes arctiventris Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 204, ♂.
Limerodes arctiventris Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 297 n. 1, ♀ ♂.
Limerodes arctiventris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. V. P. 3. 1878 p. 47, ♀ ♂.
Limerodes arctiventris Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 60 n. 1, ♀ ♂.
Limerodes arctiventris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 578, ♀ ♂.

BARICHNEUMON

Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1959.
βαρύς, gravis; Ichneumon, nom. propr. Hymen.

Vide genus Ichneumon.

CRATICHNEUMON

Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1945.
κράτος, robur; Ichneumon, nom. propr. Hymen.

Vide genus Ichneumon.

MELANICHNEUMON

Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1954.
μέλας, niger; Ichneumon, nom. propr. Hymen.

Vide genus Ichneumon.

---

[1] *Lep.*: Hydrilla arcuosa (Boie), Apamea suffuruncula, Tapinostola elymi (Brischke), Miana litterosa (Bridgman).

ICHNEUMON

Linné, Syst. nat. (Ed. 1ª 1735) Ed. 10ª I. 1758 p. 343 n. 314 & p. 360 n. 215.
ἰχνεύμων, nom. propr.; ἰχνεύω, investigo.

Synon.: Aoplus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIII. 1874 p. 137.
α-ὁπλόν, in-armatus.
Brachypterus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 673 n. 6.
βραχύς, brevis; πτερόν, ala.
Eupalamus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 13.
εὖ, bene; παλάμη, palma.
Pterocormus Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 71.
πτερόν, ala; κορμός, truncus.

Amblyteles Wesmael, Holmgren, Brischke, Mocsáry, Kriechbaumer.
Crypturus Lamarck.
Cryptus Panzer, Fabricius, Latreille, Gravenhorst, Hartig, Ratzeburg,
Exephanes Tischbein.
Hoplismenus Gravenhorst, Cresson.
Joppa Brullé, Cresson, Smith, Provancher.
Ischnus Gravenhorst, Cresson.
Mesostenus Provancher.
Phygadeuon Gravenhorst, Hartig, Ratzeburg, Wesmael, Provancher.
Priocnemis W. F. Kirby, Waterhouse.
Sphex Poda, Scopoli.
Trogus Gravenhorst, Stephens, Ratzeburg, Brullé, Boie, Tischbein.

Subg.: Barichneumon Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1959.
βαρύς, gravis; Ichneumon, nom. propr. Hymen.
Coelichneumon Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1901.
κοῖλος, cavus; Ichneumon, nom. propr. Hymen.
Cratichneumon Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1945.
κράτος, robur; Ichneumon, nom. propr. Hymen.
Melanichneumon Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1954.
μέλας, niger; Ichneumon, nom. propr. Hymen.
Protichneumon Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1899.
πρῶτος, primus; Ichneumon, nom. propr. Hymen.
Stenichneumon Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1964.
στενός, angustus; Ichneumon, nom. propr. Hymen.

abactus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon Abactus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 127 n. 74, ♂.

abaculus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon Abaculus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 124 n. 54, ♂.

abdominator Steph.! — ♂ — Eur.: Britannia.
Ichneumon abdominator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 202 n. 208, ♂.
Ichneumon abdominator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 214 n. 109, ♂.

abeillei Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon Abeillei Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 540 n. 19, ♀.

abjectus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon abjectus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 122 n. 48, ♂.

abieticola Ratzbg.![1] — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon abieticola Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 165 n. 10, ♂.
abitus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon abitus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 125 n. 55, ♂.
ablutus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon ablutus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 113 n. 9, ♀.
abnormis Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Hoplismenus abnormis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 26 n. 13, ♀.
Ichneumon abnormalis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 n. 128 n. 84, ♀.
abortivus Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Ichneumon abortivus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 499 n. 30, ♀.
abruptorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon abruptorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279.
Ichneumon abruptorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 360.
absconditus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon absconditus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 31 n. 85, ♂.
acclivus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Hoplismenus acclivus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 25 n. 10, ♂.
Ichneumon acclivus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 128 n. 79, ♂.
acerbus Cress. — ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon acerbus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 293, ♂.
Ichneumon acerbus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 146 n. 21, ♂.
Ichneumon acerbus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 291 n. 8, ♂.
Ichneumon acerbus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 267 n. 8, ♂.
aceti muscorum Christ! — Eur.: Germania.
Ichneumon aceti muscorum Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 371.
acicularis Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 360 n. 88.
Ichneumon acicularis Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 424 n. 89.
Ichneumon acicularis Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 214 n. 263.
Ichneumon acicularis Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 203 n. 195.
Ichneumon acicularis Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 66 n. 84.
Ichneumon acicularis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1033 n. 230.
aciculator Ratzbg.![2] — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon aciculator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 172 n. 38, ♂.
acosmus Kriechb. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Ichneumon acosmus Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VI. P. 1. 1880 p. 14, ♂.
Ichneumon acosmus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 628 n. 111, ♂.
actista Cam. — ♂ — Austr.
Ichneumon actista Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 P. 1. p. 8, ♂.
actuosus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon actuosus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 117 n. 25, ♂.
acuticornis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon acuticornis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2396 n. 44b, ♀ ♂.
additus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon additus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 114 n. 12, ♂.

---

1) *Lep.:* Ephippiphora dorsana L.
2) *Lep.:* Trachea piniperda (Ratzeburg).

adpressorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon adpressorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 254.
Ichneumon adpressorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 292.
aelvanus Cam. — ♂ — As.: India.
Ichneumon aelvanus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 13. p. 8, ♂.
aemulator Trent.! — Eur.
Ichneumon aemulator Trentepol, Isis 1826 p. 238 n. 59.
aequicalcar Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ichneumon aequicalcar Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1231 n. 12, ♀.
Ichneumon aequicalcar Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1943 n. 78.
Ichneumon aequicalcar Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 579 n. 10, ♀.
aequicinctus Spin. — ♂ — Am.: Chile.
Ichneumon aequicinctus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 473 n. 1, ♂.
affirmatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon affirmatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253.
Ichneumon affirmatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 287.
agilis Christ! [1]) — Eur.: Germania.
Ichneumon agilis Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 369; T. 39 F. 4.
Ichneumon agilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 1034 n. 232.
agnitus Cress. — ♀ — Am.: United States.
Ichneumon agnitus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 n. 151 n. 27, ♀.
Ichneumon agnitus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 148 n. 29, ♀.
agraensis Cam. — ♂ — As.: India.
Ichneumon Agraensis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 13, ♂.
agrestorius Swed.! — Austr.: Tahiti.
Ichneumon agrestorius Swederus, Svensk. Vet.-Akad. Handl. VIII. 1787 p. 279 n. 32.
Ichneumon agrestorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2679 n. 341.
albator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon albator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon albator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 300.
albatorius Fabr.! — ♀ ♂ — As.: Java.
Ichneumon albatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 137 n. 21.
Ichneumon albatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 58 n. 19.
Ichneumon albatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 254.
Ichneumon albatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 290.
Ichneumon albatorius Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 307 n. 13, ♀ ♂.
albibucca Tischb. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon albibucca Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 135 n. 245, ♂.
albicans Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 68 n. 320.
Ichneumon albicans Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2717 n. 366.
Ichneumon albicans Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1039 n. 243.
albicillus Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon albicillus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 287 n. 13, ♂.
Ichneumon albicillus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 177 n. 41, ♂.
Ichneumon albicillus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 7 n. 6.
Ichneumon albicillus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 141 n. 42, ♂.
Ichneumon albicillus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 56 n. 8, ♂.
Ichneumon albicillus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 21 n. 41, ♂.

[1]) = ? Pompilus spec. an Ichneumon fumigator (Gravenhorst).

Ichneumon albicillus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 271 n. 41, ♂.
Ichneumon albicillus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 39, ♀♂.
Ichneumon albicillus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 103 n. 11, ♂.
Ichneumon albicillus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 550 n. 38, ♂.

albicinctus Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon albicinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 509 n. 213, ♀ ♂.
Ichneumon albicinctus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VIII. 1835 p. 193 n. 180.
Ichneumon albicinctus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 101 [n. 108, ♀♂.
Ichneumon albicinctus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 171 n. 35, ♀♂.
Ichneumon albicinctus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 36 n. 25, ♀♂.
Ichneumon albicinctus Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 362 n. 42, ♂.
Ichneumon albicinctus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 14, ♀♂.
Ichneumon albicinctus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 203 n. 121, ♀ ♂.
Ichneumon albicinctus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 203, ♀♂.
Ichneumon lautus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXIX. 1868 p. 250 n. 5, ♂.
Ichneumon albicinctus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 410 n. 154, ♀♂.
Ichneumon albicinctus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 45, ♀♂.
Ichneumon albicinctus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 211 n. 106, ♂.
Ichneumon albicinctus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 111 n. 103.
Ichneumon (Barichneumon) albicinctus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1961 n. 6.
Ichneumon albicinctus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 562 n. 16, ♀♂.

albicollis Wesm. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon albicollis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 371 (Ot. p. 20) n. 18, ♀♂.
Ichneumon albicollis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 6, ♀ ♂.
Ichneumon albicollis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 388 n. 69, ♀♂.
Ichneumon albicollis Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 29 n. 33-34, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon gradarius Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 76 n. 46, ♂.
Ichneumon albicollis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 5 n. 41, ♀ ♂.
Ichneumon albicollis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1922 n. 20.
Ichneumon albicollis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 649 n. 148, ♀♂.

albidipes Walk. — ♂ — As.: Japonia.
Ichneumon albidipes Walker, Cistula entom. I. P. 11. 1874 p. 301 n. 1, ♂.

albiger Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon albiger Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 56 n. 50, ♀.
Ichneumon albiger Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 7, ♀.
? Ichneumon tempestivus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 74 n. 42, ♀ ♂.
Ichneumon albiger Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 78 n. 44, ♀.
Ichneumon albiger Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 21 n. 28, ♀ ♂.
Ichneumon albiger Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1925 n. 27.
Ichneumon albiger Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 653 n. 154, ♀♂.

albilarvatus Grav. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Ichneumon albilarvatus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 352 n. 96, ♂.
Ichneumon albilarvatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 563 n. 236, ♂.
Ichneumon albilarvatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 198 n. 195.
Ichneumon albilarvatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 106 [n. 115, ♀ ♂.
Ichneumon albilarvatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 15, ♀♂.

---

[1]) *Lep.:* Hypsipetes ruberata, Eupithecia rectangulata (Bignell), Geometra lituraria, Fidonia piniaria (Ratzeburg, Brischke).

[♀♂.
Ichneumon albilarvatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 412 n. 165,
Ichneumon albilarvatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1879 p. 46, ♀.
Ichneumon albilarvatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 211 n. 82, ♀♂.
Ichneumon albilarvatus Möller, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 93, ♀♂.
Ichneumon albilarvatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 16 n. 78, ♂.
Ichneumon (Cratichneumon) albilarvatus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1953 n. 20.
Ichneumon albilarvatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 280 n. 102, ♀♂.
var. **obscurior** Berth. — ♂ — Eur. [p. 281, ♂.
Ichneumon albilarvatus var. obscurior Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
albinus Grav. — ♀♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon albinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 156 n. 28, ♀.
Ichneumon albinus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 12 n. 19. [♀♂.
Ichneumon albinus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 82 n. 83,
Ichneumon albinus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 173 (Mant. p. 40), ♀♂.
Ichneumon albinus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 257 n. 28, ♀.
Ichneumon albinus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 403 n. 124, ♀♂.
Ichneumon albinus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 107 n. 90, ♀♂.
Ichneumon albinus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. 1891 p. 57, ♀.
Ichneumon (Melanichneumon) albinus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1957 n. 7.
Ichneumon albinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 238 n. 18, ♀♂.
var. **caelebs** Berth. — ♂ — Eur.
Ichneumon albinus var. coelebs Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 239, ♂.
albipectus Brullé — ♂ — Am.: Cuba.
Ichneumon albipectus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 306 n. 11, ♂.
Ichneumon albipectus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 14, ♂.
albipes Fourcr.![1] — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 328 n. 15.
—— Degeer, Mém. hist. Insect. II. 1. 1771 p. 585; T. 27 F. 26.
—— Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 1779 p. 704; T. 27 F. 26.
Ichneumon albipes Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 398 n. 15.
Ichneumon albipes Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 214 n. 259.
Ichneumon albipes Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 207 n. 7.
Ichneumon albipes Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 68 n. 92.
Ichneumon albipes Vallot, Mém. acad. sc. Dijon 1836 p. 210.
albipictus Grav. — ♀♂ — Eur.: Gallia, Belgia, Germania, Italia.
Ichneumon albipictus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 319 n. 55, ♂.
Ichneumon albipictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 397 n. 154, ♂. [♀♂.
Ichneumon albipictus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 88 n. 90,
Ichneumon albipictus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 404 n. 132, ♀♂.
Ichneumon albipictus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 239 n. 20, ♀♂.
Ichneumon albipictus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII. 1897 p. 44.
var. **multipictus** Berth. — ♂ — Eur. [p. 240, ♂.
Ichneumon albipictus var. multipictus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
var. **obsoletus** Berth. — ♀ — Eur. [p. 240, ♀.
Ichneumon albipictus var. obsoletus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
albiscuta Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia, Gallia, (Germania).
? Ichneumon sexarmillatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 8 n. 41, ♀.
Ichneumon (Cratichneumon) albiscuta Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1946 n. 2, ♀.
Ichneumon (Cratichneumon) albiscuta Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2404 n. 2.

---

[1]) *Hymen.:* Tenthredo xylostei (Vallot).

albivalvus Berth. — ♂ — Eur.: Hispania; Afr.: Algeria.
Ichneumon albivalvus Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais IX. 1896 p. 193.
Ichneumon albivalvus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 396, ♂.

alboguttatus Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon alboguttatus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 280 n. 2, ♀.
Ichneumon alboguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 112 n. 3, ♀.
Ichneumon multicinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 453 n. 183, ♂.
Ichneumon alboguttatus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 6 n. 2, ♀.
Ichneumon alboguttatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 128 n. 3, ♀.
Ichneumon alboguttatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 34 [n. 23, ♀.
Ichneumon alboguttatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 149 (Mant. [p. 16), ♀.
Ichneumon multicinctus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 368 (Ot. p. 17) [n. 16, ♀ ♂.
Ichneumon multicinctus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 5, ♀ ♂.
Ichneumon multicinctus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 202, ♀.
Ichneumon multicinctus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 379 [n. 30, ♀ ♂.
Ichneumon multicinctus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 102 & 214 n. 24, ♀.
Amblyteles albostriatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 185 n. 31, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon alboguttatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 349 n. 38, ♀.
Amblyteles albostriatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 171 n. 18, ♀.
Ichneumon multicinctus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 563 n. 68, ♀ ♂.
Ichneumon multicinctus var. alboguttatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. [1894 p. 563, ♀.

var. **nigrinus** Berth. — ♀ — Eur.
Ichneumon multicinctus var. nigrinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 563, ♀.
Ichneumon alboguttatus var. nigrinus m.

albomarginatus Cress. — ♂ — Am.: Canada, Missouri.
Ichneumon albomarginatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 297, ♂.
Ichneumon albomarginatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 160 n. 78, ♂.
Ichneumon albomarginatus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 299 n. 28, ♂.
Ichneumon albomarginatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 275 n. 28, ♂.

albosignatus Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon periscelis Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 292 n. 2103, ♀.
Ichneumon albosignatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 167 n. 33, ♂.
Ichneumon saturatorius var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 238, ♀.
Ichneumon albosignatus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 7 n. 6.
Ichneumon albosignatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 140 n. 39.
Ichneumon albosignatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 83 [n. 84, ♀ ♂.
Ichneumon albosignatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 170 n. 28, ♀ ♂.
Ichneumon albosignatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 174 (Mant. [p. 41), ♀ ♂.
Ichneumon albosignatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 18 [n. 33, ♂.
? Ichneumon albosignatus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 182 n. 109, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Porthesia auriflua (Mocsáry).
2) *Lep.:* Zerene grossulariata (Ratzeburg).

Ichneumon albosignatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 264 n. 33, ♂.
Ichneumon albosignatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 403 [n. 125, ♀ ♂.
Ichneumon redimitus Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 173 n. 17, ♂.
Ichneumon albosignatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 107 n. 87, ♀ ♂.
Ichneumon (Melanichneumon) albosignatus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1957 n. 8.
Ichneumon albosignatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 236 n. 13, ♀ ♂.

var. **punctus** Berth. — ♂ — Eur. [p. 236, ♂.
Ichneumon albosignatus var. punctus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895

albus Forcr. — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 360 n. 87.
Ichneumon albus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 423 n. 88.
Ichneumon albus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 214 n. 262.
Ichneumon albus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 200 n. 178.
Ichneumon albus Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 63 n. 73.
Ichneumon albus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1090 n. 335.

allapsus Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Ichneumon allapsus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 256 n. 27, ♂.
Ichneumon allapsus Cresson, Trans. Amer. Soc. VI. 1877 p. 176 n. 153, ♂.

alpestris Holmgr. — ♀ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon alpestris Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 90 n. 53, ♀.
Ichneumon alpestris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 579 n. 9, ♀.

alpicola Kriechb.[1] — ♀ ♂ — Eur. bor., centr. & or.
Ichneumon alpicola Kriechbaumer, Mitth. schweiz. entom. Ges. III. 9. 1872 p. 482, ♀ ♂.
Ichneumon vafer Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 286 n. 16, ♂.
Ichneumon conjugalis Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 172 n. 13, ♂.
Ichneumon brevicornis Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 174 n. 14, ♂.
Ichneumon alpicola Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 36, ♀.
Ichneumon alpicola Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 198 n. 46, ♂.
Ichneumon alpicola Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 563 n. 70, ♀ ♂.
Ichneumon alpicola var. conjugalis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 564, ♂.
Ichneumon brevicornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 591 n. 36, ♂.

altercator Wesm. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania, Italia, Russia. [n. 35, ♀.
Ichneumon altercator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 405 (Misc. p. 46
Ichneumon altercator Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 195 n. 116, ♀.
Ichneumon altercator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 411 n. 161, ♀.
Ichneumon altercator Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 16 n. 76.
Ichneumon (Stenichneumon) altercator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1967 n. 11.
Ichneumon altercator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 560 n. 12, ♀.

alternans (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon alternans Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 358 n. 44, ♀.
Phygadeuon alternans Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 780 n. 44, ♀.
Ichneumon alternans Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 186.

altipeta Kriechb. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Ichneumon altipeta Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VII. 1887 p. 303, ♀.
Ichneumon altipeta Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 643 n. 137, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Plusia divergens? Setina spec. (Kriechbaumer).

alvarado Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon Alvarado Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 7 n. 10, ♂.
Ichneumon Alvarado Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 125 n. 57, ♀.
Ichneumon Alvarado Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 175 n. 111; [T. 7 F. 24.

amabilis Gir.! — ♀ — Eur.: Italia.
Ichneumon amabilis Giraud, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 20, ♀.

amator Rossi! — Eur.: Italia.
Ichneumon amator Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 118 n. 258.

ambiguorius Vill.! — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon ambiguorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 157 n. 67.
Ichneumon ambiguus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 215 n. 48.
Ichneumon ambiguorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 934 n. 85, ♀.

ambulator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon ambulator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 266.
Ichneumon ambulator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 324.

amecus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon Amecus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 123 n. 52, ♂.

amphibolus Kriechb. — ♀ — Austria inf.
Ichneumon amphibolus Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 26, ♀.
Ichneumon amphibolus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 585 n. 24, ♀.

ampliventris Berth. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Ichneumon ampliventris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 558 n. 56, ♀ ♂.

analis Grav. — ♀ — Eur. centr.
Ichneumon analis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 621 n. 266, ♀.
Ichneumon analis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 205 n. 218.
Ichneumon analis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 163 (Mant. p. 30) n. 60b, ♀.
Ichneumon analis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 77 n. 266.
Ichneumon analis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 394 n. 92, ♀.
Ichneumon analis Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 183 n. 66, ♀.
Ichneumon analis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 584 n. 22, ♀.

analogus Berth. — ♀ — Eur.: Italia.
Ichneumon analogus Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VII. 1894 p. 179, ♀.
Ichneumon analogus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 569 n. 26, ♀.

anator Fabr. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 58 n. 151.
? Ichneumon biscutatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2679 n. 233.
Ichneumon anator Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 169 n. 149.
Cryptus anator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 87 n. 74.
Cryptus anator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 264 n. 3770.
Ichneumon anator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284.
Ichneumon anator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 297 n. 26, ♀ ♂.
Ichneumon dealbator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 272.
Ichneumon dealbator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 341.
Ichneumon anator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 250 n. 81, ♀.
Ichneumon anator Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 17 n. 40.
Ichneumon anator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 156 n. 81.
Ichneumon anator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 361 n. 16, ♀ ♂. [♀ ♂.
Ichneumon anator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 220 n. 92b,
Ichneumon anator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 176 (Mant. p. 43), ♀.

Ichneumon anator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 39 (Adn. p. 7), ♂.
Ichneumon anator Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 29 n. 80.
Ichneumon anator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 12, ♀ ♂.
Ichneumon anator Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 181 n. 108, ♀ ♂.
Ichneumon anator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 405 n. 135, ♀ ♂.
Ichneumon anator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 105 n. 93, ♀ ♂.
Ichneumon anator Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 108 n. 91, ♀ ♂.
Ichneumon (Barichneumon) anator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1960 n. 1.
Ichneumon anator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 235 n. 11, ♀ ♂.

var. **microcerus** Grav. — ♀ — Eur.
Ichneumon microcerus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 249 n. 80, ♀.
Ichneumon microcerus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 17 n. 40.
Ichneumon microcerus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 156 n. 80.
Ichneumon anator var. microcerus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 235, ♀.

anatorius Berth. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Ichneumon anatorius Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1899 p. 136 n. 50, ♀.

anceps Vill.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon anceps Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 204 n. 227.
Ichneumon anceps Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 219 n. 77.
Icheumon anceps Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 935 n. 87.

ancipterus Desv. — ♀ — Eur.: Britannia.
Ichneumon ancipterus Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 19 n. 114, ♀.
Ichneumon ancipiterus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 179 n. 111.

andrei Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon Andrei Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 659 n. 169, ♀.

angulatorius Müll.[1]) — Eur.: Dania.
Ichneumon angulatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 154 n. 1784.
Ichneumon angulatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 951 n. 105.

angustatus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia, Germania, Hungaria.
Ichneumon raptorius var. a Trentepol, Isis 1826 p. 228.
Ichneumon militaris Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 310 & 342, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon militaris Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 172.
? Ichneumon albicaudatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 62 n. 22, ♂.
Ichneumon angustatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 180 (Mant. p. 47 [n. 100[b].
Ichneumon albicaudatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 338 (Mant. [p. 101), ♂.
Ichneumon angustatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1853 p. 400 (Misc. p. 41) [n. 31, ♀ ♂.
Ichneumon angustatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 40 [n. 129, ♂.
Ichneumon angustatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 14, ♀.
Ichneumon angustatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 408 n. 146, ♀ ♂.
Ichneumon angustatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 44, ♀.
Ichneumon angustatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 181 n. 95, ♀ ♂.
Ichneumon angustatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 241 n. 22, ♀ ♂.

---

[1]) = ? Tryphon bilineatus an Tr. pruinosus aut Cremastus interruptor an Lissonota striata (Gravenhorst).

angustorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon angustorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 280.
Ichneumon angustorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 366.
animosus Cress. — ♂ — Am.: Colorado, New Mexico.
Ichneumon animosus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 164 n. 43, ♂.
Ichneumon animosus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1877 p. 176 n. 151, ♂.
var. **rubellus** Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Ichneumon rubellus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 254 n. 21, ♂.
Ichneumon animosus var. rubellus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1877 p. 176.
annulator Grav.! — Eur.
Ichneumon annulator var. a Trentepol, Isis 1826 p. 239.
Ichneumon annulator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 971 n. 128b.
annulator Fabr.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 340 n. 43.
Ichneumon viator Scopoli, Entom. Carn 1763 p. 284 n. 747; T. 40 F. 747.
Ichneumon culex O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 155 n. 1797.
Ichneumon viator Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 354 n. 715, ♂.
Ichneumon tibialis Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 407 n. 44.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 60 n. 185.
Ichneumon viator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 163 n. 88.
Ichneumon tibialis Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 164 n. 93.
Ichneumon viator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2687 n. 122.
Ichneumon clavipes Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2688 n. 257.
Ichneumon viator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 180 n. 81.
Ichneumon viator Rossi, Mant. Insect. II. 1792 p. ? n. 86.
Ichneumon annulator Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 151 n. 72.
Ichneumon culex Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 296 n. 2115, ♀.
Ichneumon viator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 57 n. 44.
Ichneumon annulator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 65 n. 59.
Ichneumon viator Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 185 n. 25.
Ichneumon annulator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 255 n. 3724.
Ichneumon annulator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♀.
Ichneumon annulator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 283.
Ichneumon annulator Gravenhorst, Magaz. f. Entom. IV. 1821 p. 259 n. 1, ♀.
Ichneumon annulator Trentepol, Isis 1826 p. 238 n. 59 [excl. var. a].
Ichneumon nigritarsis Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 6 n. 3, ♂.
Ichneumon annulator Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 11 n. 16.
Ichneumon annulator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 147 n. 24, ♀ [excl. var. 2 & 3].
Ichneumon viator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 900 n. 33, ♀.
Ichneumon nigritarsis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 128 n. 4, ♂.
Ichneumon annulator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 137 n. 29.
Ichneumon annulator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 303 n. 4.
Ichneumon annulator Schiödte, Naturh. Tidsskr. IV. 1843 p. 106 n. 3.
Ichneumon annulator Ratzeburg, Forstinsecten III. 1844 p. 27. [♀ ♂.
Ichneumon annulator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 67 n. 64,
Ichneumon annulator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 166 (Mant. p. 32), ♀.
Ichneumon infidus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 166 (Mant. p. 33), ♀ ♂.
Ichneumon curvinervis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 33 n. 18, ♀ ♂.
Ichneumon annulator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 9, ♀.

---

1) *Lep.:* Macaria lituraria, M. piniaria, Noctua piniperda (Ratzeburg).

Ichneumon curvinervis Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 144 n. 84, ♀ ♂.
Ichneumon infidus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 202, ♀ ♂.
Ichneumon annulator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 252 n. 24, ♀.
Ichneumon annulator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 396 n. 98, ♀ ♂.
Ichneumon curvinervis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 41, ♀ ♂.
Ichneumon curvinervis Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 103 n. 72, ♀ ♂.
Ichneumon infidus Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 86 n. 81-82.
Ichneumon annulator Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 12 n. 61, ♀ ♂.
Ichneumon (Cratichneumon) annulator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1951 n. 15.
Ichneumon annulator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 262 n. 60, ♀ ♂.

annulator Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon annulator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 157 n. 1830.

annulatorius Fabr.[1]) — ♂ — Eur.
Ichneumon annulatorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 330 n. 20.
Ichneumon annulatorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 423 n. 20.
Ichneumon annulatorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 261 n. 24.
Ichneumon annulatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 149 n. 44.
Ichneumon annulatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2680 n. 94.
Ichneumon annulatorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 339.
Ichneumon annulatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 171 n. 35.
Ichneumon annulatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 143 n. 43.
Ichneumon annulatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 62 n. 40.
Ichneumon annulatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♂.
Ichneumon annulatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279.
Ichneumon annulatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 362.
Ichneumon annulatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 944 n. 98.
Ichneumon annulatorius Trentepol, Isis 1829 p. 812 n. 30, ♂.

annulatus Prov. — ♂ — Am.: Canada, Massachusetts.
Mesostenus annulatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 265.
Ichneumon annulatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 180 n. 172, ♂.
Ichneumon annulatus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 363 n. 62, ♂.
Ichneumon annulatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 288 n. 62, ♂.

annulipes Cress. — ♀ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon annulipes Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 170 n. 52, ♀.
Ichneumon pusillus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 171 n. 53, ♀.
Ichneumon annulipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 180 n. 174, ♀.
Ichneumon annulipes Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 325 n. 78, ♀.
Ichneumon annulipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 765 n. 78, ♀.
Ichneumon annulipes Davis, Canad. Entomol. XXVII. 1895 p. 287.

anotylus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ichneumon (Cratichneumon) anotylus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2403 n. 12b, ♀.

anthracinus Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Ichneumon anthracinus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 477 n. 5, ♀.

anthrax D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon anthracinus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 27 n. 12, ♀ ♂ [nec Spinola].
Ichneumon anthracinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 544 n. 26, ♀ ♂.
Ichneumon anthrax m.

anticus Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 355 n. 77.

---

[1]) = ? Ephialtes albicinctus (Gravenhorst).

Ichneumon anticus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 420 n. 78.
Ichneumon generosus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 211 n. 24.
Ichneumon anticus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1023 n. 215.
antigai Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania.
Ichneumon Antigai Berthoumieu, Rev. sc. Bourbonn. IX. 1896 p. 194.
Ichneumon Antigai Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 394, ♀ ♂.
antonii Kriechb. — ♂ — Eur.: Tirolia.
Ichneumon Antonii Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 309 n. 1, ♂.
apertus Cress. — ♀ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon apertus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 293, ♀.
Ichneumon apertus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 147 n. 20, ♀.
aphidiphagus Schrank! — Eur.: Bavaria.
Ichneumon aphidiphagus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 308 n. 2147.
apicalis Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Ichneumon apicalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 152 n. 28, ♂.
Ichneumon apicalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 157 n. 64, ♂.
apicalis Wiedem.! — ♂ — Afr.: Cap.
Ichneumon apicalis Wiedeman, Anal. entom. 1824 p. 9, ♂.
apparitor Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon apparitor Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VII. 1894 p. 178, ♀.
Ichneumon apparitor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 264 n. 62, ♀.
appetens Kaw.! — ♀ — Eur.: Russia.
Ichneumon appetens Kawall, Bull. soc. natural. Moscou XLI. P. 4. 1868 p. 509 n. 7, ♀.
appropinquans Cam. — ♀ — As.: Ceylon.
Ichneumon appropinquans Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 5, ♀.
approximans Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon approximans Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 32 n. 87, ♂.
apricus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Belgia, Germania, Italia.
Ichneumon apricus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 350 n. 93, ♂.
Ichneumon apricus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 553 n. 230, ♂.
Ichneumon apricus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 197 n. 190, ♂.
Amblyteles speciosus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 116 [n. 6, ♀ [excl. ♂].
Amblyteles intersertor Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 118 (Ambl. p. 44) [n. 34, ♀.
Ichneumon apricus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 65 n. 230, ♂.
Ichneumon apricus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 412 n. 166, ♀ ♂.
Ichneumon apricus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 213 n. 103, ♀ ♂.
Ichneumon apricus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 200.
Ichneumon apricus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 288 n. 116, ♀ ♂.
apterus Brünn.! — Eur.: Suecia.
Insectum apterum Brünnich, Prodr. insectol. Siaelland. 1761 p. 30 n. 21; T. 17[a b].
Insectum apterum Gravenhorst, Monogr. Ichneum. pedestr. 1815 p. 107 n. 2.
Ichneumon apterum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1095 n. 341.
aranearum Retz.! — Eur.: Suecia, Gallia.
—— Degeer, Mém. hist. Insect. II. 1. 1771 p. 863 n. 7; T. 30 F. 1-3.
—— Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 178 n. 7; T. 30 F. 1-3.
Ichneumon aranearum Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 69 n. 277.
Ichneumon aranearum Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 211 n. 246.
Ichneumon aranearum Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 203 n. 192.
Ichneumon aranearum Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 66 n. 83.

arctobius Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ichneumon arctobius Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2399 n. 71c, ♀.
arcuatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon arcuatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279.
Ichneumon arcuatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 361.
ardates Cam. — ♀ — As.: India.
Ichneumon ardates Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 13. p. 7, ♀.
argentipilosus Cam. — ♀ ♂ — Am.: Guatemala, Panama.
Ichneumon argentipilosus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 34. 1884 Hymen. I. p. 143 n. 13, ♀ ♂.
ariel Cam. — ♂ — Am.: Guatemala.
Ichneumon Ariel Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 38. 1885 Hymen. I. p. 183 n. 134, ♂; T. 8 F. 14.
aries Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Helvetia. [152 n. 3, ♀ [nec Christ].
Ichneumon aries Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXIX. 1875 p. 149 &
Ichneumon alius Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 28 n. 12, ♀.
Ichneumon aries Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 203 n. 18, ♂.
Ichneumon aries Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 151 n. 26, ♂.
Ichneumon aries Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 610 n. 73, ♀ ♂.
arista Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon arista Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 16 n. 29, ♂.
armillatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon armillatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 281.
Ichneumon armillatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 368.
armillatus Wesm. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon armillatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 218, ♂.
Ichneumon armillatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 275 n. 81, ♂.
arrogans Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon arrogans Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 115 n. 15, ♀ ♂.
arrogator Taschbg.! — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon arrogator Taschenberg, Berlin. entom. Zeitschr. VI. 1862 p. 195 n. 6, ♂.
artaxidia Cam. — ♀ — Austr.
Ichneumon Artaxidia Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 P. 1. p. 13, ♀.
artifex Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon artifex O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 155 n. 1803.
asilatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon asilatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 280.
Ichneumon asilatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 362.
assimulator Swed.! — Am. bor.
Ichneumon assimulator Swederus, Svensk. Vet.-Akad. Handl. VIII. 1787 p. 280 n. 34.
Ichneumon assimilator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2706 n. 338.
associator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon associator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon associator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 301.
astarte Cam. — ♂ — Am.: Guatemala. [T. 7 F. 5.
Ichneumon Astarte Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 34. 1884 Hymen. I. p. 139 n. 4, ♂;
astutus Holmgr. — ♀ ♂ — Am.: California.
Ichneumon astutus Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 394 n. 7, ♂.
Ichneumon astutus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 208, ♀ ♂.
ater Cress. — ♀ — Am.: New York.
Ichneumon ater Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 137 n. 6, ♀.
Ichneumon ater Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 146 n. 19, ♀.

aterrimus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Ichneumon aterrimus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 30 n. 83, ♀.

atrator Fabr.! — ♀ ♂ — Eur.
Ichneumon atrator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 266 n. 82.
Ichneumon atrator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2692 n. 146.
Ichneumon atrator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 187 n. 120.
Ichneumon atrator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 165 n. 131.
Ichneumon atrator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 60 n. 56.
Ichneumon atrator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 67 n. 73.
Ichneumon atrator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♂.
Ichneumon melanator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 275.
Ichneumon melanator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 349.
Ichneumon atrator Trentepol, Isis 1826 p. 76 n. 19, ♀.
Ichneumon atrator Trentepol, Isis 1829 p. 809 n. 14, ♀.
Ichneumon atrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 969 n. 125.

atrator Thunbg.! — Afr.: Cap.
Ichneumon atrator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon atrator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 303.

atratus Schrank! — ♀ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon atratus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 303 n. 2133, ♀.

atratus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 60 n. 189.
Ichneumon atratus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2688 n. 259.

atrifrons Cress. — ♀ — Am.: Pennsylvania, Illinois.
Ichneumon atrifrons Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 157 n. 34, ♀.
Ichneumon atrifrons Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 298.
Ichneumon atrifrons Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 165 n. 97, ♀.

atrox Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Ichneumon atrox Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 151 n. 42, ♀.

attiguus Tosqu. — ♂ — Afr.: Caffraria.
Ichneumon attiguus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 47 n. 22, ♂.

audax Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Ichneumon audax Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 143 n. 15, ♂.
Ichneumon audax Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 156 n. 59, ♂.

aureipes Berth. — ♂ — Afr.: Algeria.
Ichneumon aureipes Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais IX. 1896 p. 194.
Ichneumon aureipes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 393, ♂.

australis Brullé — ♀ — Austr.: Tasmania.
Ichneumon australis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 309 n. 18, ♀.

austriacus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Austria.
Ichneumon austriacus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 570 n. 240, ♀ ♂.
Ichneumon austriacus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 67 n. 240.

aveator Panz.! — Eur.: Germania.
Ichneumon aveator Panzer, Faun. Insect. German. VIII. 1805 P. 94 T. 14.

avidus Kaw.! — ♂ — Eur.: Russia.
Ichneumon avidus Kawall, Bull. soc. natural. Moscou XLI. P. 4. 1868 p. 510 n. 9, ♂.

axillatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon axillatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 276.
Ichneumon axillatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 350.

azotus Cress. — ♂ — Am.: Delaware, Massachusetts, Virginia.
Ichneumon azotus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 150 n. 26, ♂.
Ichneumon azotus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 154 n. 54, ♂.
aztecus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon Aztecus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 20 n. 38, ♂.
Ichneumon Aztecus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 38. 1885 Hymen. I. p. 182 n. 141, ♂; T. 8 [F. 18.
baeticus Spin. — ♂ — Eur.: Hispania.
Ichneumon Baeticus Spinola, Ann. soc. entom. France (2) I. 1843 p. 123 n. 1, ♂.
balearicus Kriechb. — ♀ — Eur.: Mallorca.
Ichneumon Balearicus Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 240 n. 2.
Ichneumon Balearicus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 396, ♀.
balteatus Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon balteatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 48 [n. 41, ♀♂.
Ichneumon balteatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 386 n. 58, ♀♂.
Ichneumon balteatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 430 n. 108, ♀♂.
Ichneumon balteatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 289 n. 22, ♀.
Ichneumon balteatus Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 80 n. 59.
Ichneumon balteatus Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1402 n. 2, ♀ ♂.
Ichneumon balteatus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1936 n. 58.
Ichneumon balteatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 604 n. 58, ♀♂.
var. **zonellus** Holmgr. — ♂ — Eur.
Ichneumon zonellus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 100 n. 59, ♂.
Ichneumon balteatus var. zonellus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 604, ♂.
barbifrons Holmgr. — ♂ — Eur.: Tirolia.
Ichneumon barbifrons Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 173 n. 14, ♂.
Ichneumon barbifrons Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 580 n. 13, ♂.
basiglyptus Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Italia.
Ichneumon basiglyptus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 294, ♀.
Ichneumon basiglyptus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 557 n. 8, ♀♂.
basilaris Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon basilaris Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 426 n. 97.
Ichneumon basilaris Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 142 n. 22.
batis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon Batis Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 82 n. 65-66, ♂.
Ichneumon Batis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1933 n. 52.
Ichneumon Batis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 609 n. 71, ♀ ♂.
beatus Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon beatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 38. 1885 Hymen. I. p. 177 n. 119, ♀; T. 8 F. 17.
belfragii Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Ichneumon Belfragii Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 156, ♂.
Ichneumon Belfragii Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 170 n. 116, ♂.
bellatorius Oliv.! — Am.: Guyana.
Ichneumon bellatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 169 n. 8.
bellatulus Cam. — ♂ — Am.: Mexico, Panama.
Ichneumon bellatulus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 34. 1884 Hymen. I. p. 141 n. 8, ♂; [T. 7 F. 7.
bellipes Wesm. — ♀ ♂ — Eur. centr.
Ichneumon bellipes Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 38 n. 30, [♀ ♂.
Ichneumon bellipes Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 369 (Misc. p. 10) n. 4, ♀

---

[1]) *Lep.:* Melitaea cinxia (Giraud), Orgyia pudibunda (Rondani).

Ichneumon bellipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 382 n. 42, ♀♂.
Ichneumon bellipes Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 180 n. 49, ♀.
Ichneumon bellipes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 621 n. 95, ♀♂.

berthoumieui Pic — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon Berthoumieui Pic, Bull. soc. entom. France 1899 p. 9, ♀.

betulae Ström! — Eur.: Dania.
Ichneumon Betulae Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. Nya Saml. III. 1788.

biannulatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon biannulatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 n. 254.
Ichneumon biannulatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 292.

biannulatus Grav. — ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon biannulatus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 293 n. 21, ♂.
Ichneumon biannulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 230 n. 73, ♂.
Ichneumon biannulatus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 16 n. 38, ♂.
Ichneumon biannulatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 152 n. 72, ♂.
Ichneumon biannulatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 306 n. 73, ♂.
Ichneumon (Coelichneumon) biannulatus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1907 n. 14.
Ichneumon comitator var. biannulatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 543, ♂.

bicinctorius Thunbg.! — Afr.: Cap.
Ichneumon bicinctorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Ichneumon bicinctorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 357.

bicinctus Füessly! — Eur.: Helvetia.
Ichneumon bicinctus Füessly, Verz. schweiz. Insect. 1775 p. 49 n. 944.
Ichneumon bicinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 960 n. 116.

bicingulatus Schrk.! — Eur.: Germania.
Ichneumon bicingulatus Schrank, Gistl: Faunus N. F. I. 1837 p. 13.

bicolor Vill. — Eur.: Italia.
Ichneumon bicolor Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 204 n. 226.
Ichneumon bicolor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 219 n. 76.
Ichneumon bicolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1079 n. 316.

bicolorus L.! — Afr.
Ichneumon bicolorus Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 938 n. 58.
Ichneumon bicolorus Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 858 n. 58.
Ichneumon bicolor Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2710 n. 58.
Ichneumon bicolorus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 197 n. 167.

bidentatorius Christ! — Eur.: Germania.
Ichneumon bidentatorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 339.

bidentorius Thunbg.! — Eur.: Britannia.
Ichneumon bidentorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Ichneumon bidentorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 357.

bifarius Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon bifarius Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 41 n. 12, ♀.
Ichneumon bifarius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 562 n. 15, ♀.

bifasciator Thunbg.! — Am.: Guyana.
Ichneumon bifasciator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258.
Ichneumon bifasciator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 305.

bifasciatus Fourcr.! — Eur.: Gallia, Italia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 337 n. 37.
Ichneumon bifasciatus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 405 n. 37.
Ichneumon bifasciatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 192 n. 184.

Ichneumon bifasciatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 209 n. 18.
Ichneumon bifasciatus Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 120 n. 263.
Ichneumon bifasciatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 975 n. 133.

bifasciatus Say — Am.: Indiana.
Ichneumon bifasciatus Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 72 n. 10.
Ichneumon bifasciatus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 377 n. 10.
Ichneumon bifasciatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 209.

bifossatus Berth. — ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon bifossatus Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 39 n. 9, ♂.

biguttulatus Kriechb. — ♀ (♂) — Eur.: Germania, Gallia.
? Ichneumon bipunctorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 154 n. 76, ♂.
Ichneumon biguttulatus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXIX. 1875 [p. 149 & 150 n. 1, ♀.
? Ichneumon bipunctorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 214 n. 113, ♂.
Ichneumon biguttulatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 8 n. 40, ♀.
Ichneumon biguttulatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 539 n. 17, ♀ (♂).

billimekii Cam. — ♂ — Am.: Mexico. [F. 6.
Ichneumon Bilimeki Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 34. 1884 Hymen. I. p. 140 n. 6, ♂; T. 7

bilineatus Gmel.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon comitator Sulzer, Abgek. Gesch. Insect. I. 1776 p. 190, ♀; T. 26 F. 14 [nec Linné].
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 61 n. 196.
Ichneumon bilineatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2698 n. 265, ♂.
Ichneumon comitator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 354, ♀; T. 36 F. 3.
Ichneumon bilineatus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 283 n. 7, ♀ ♂.
Ichneumon bilineatus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 7 n. 6.
Ichneumon bilineatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 127 n. 11, ♀ ♂ [p. p.].
Ichneumon nigerrimus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 130 n. 10, ♂.
Ichneumon bilineatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 132 n. 14, ♀ ♂.
Ichneumon bilineatus Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 260. [♀ ♂.
Ichneumon bilineatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 26 n. 11,
Ichneumon bilineatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 54 n. 4, ♀.
Ichneumon bilineatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 145 & 336 (Mant. [p. 12 & 99), ♀ ♂.
Ichneumon bilineatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 12 n. 11.
Ichneumon bilineatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 4, ♀.
Ichneumon bilineatus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 35 n. 19, ♀ ♂.
Ichneumon bilineatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 239 n. 11, ♀ ♂.
Ichneumon bilineatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 375 n. 17, ♀ ♂.
Ichneumon bilineatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 354 n. 27, ♀ ♂.
Ichneumon bilineatus Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 31, ♀; T. 20 F. 3.
Ichneumon bilineatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 38, ♀ ♂.
Ichneumon bilineatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 101 n. 2, ♀.
Ichneumon nigerrimus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 102 n. 133, ♂.
Ichneumon (Coelichneumon) bilineatus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1908 n. 15.
Ichneumon bilineatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 554 n. 46, ♀ ♂.

var. **rufipedator** Grav. — Eur.
Ichneumon bilineatus var. rufipedator (Ziegler) Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 130.

---

[1]) *Lep.:* Cosmia abluta, Abraxas grossulariata (Vollenhoven), Bryophila glandifera (Bignell).

bilunulatus Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. tota; Afr.: Algeria.
Ichneumon bilunulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 331 n. 125, ♀.
Ichneumon sexlineatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 487 n. 201, ♂.
Ichneumon sexlineatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 190 n. 191.
Ichneumon Troscheli Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 138 n. 23, ♂.
Ichneumon bilunulatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 98 [n. 103, ♀♂.
Ichneumon Troschelii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 135 n. 28.
Ichneumon bilunulatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 182 (Mant. p. 49), ♀♂.
Ichneumon sexlineatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 171 n. 37.
Ichneumon bilunulatus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 187 n. 112, ♀ ♂. [♀♂.
Ichneumon bilunulatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 409 n. 149,
Ichneumon bilunulatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 44, ♀♂.
Ichneumon bilunulatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 181 & 212 n. 97, ♀♂.
Ichneumon bilunulatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 110 n. 99, ♀♂.
Ichneumon bilunulatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 27.
Ichneumon bilunulatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 249 n. 399, ♀♂.
var. **punctus** Berth. — ♂ — Eur. [p. 249, ♂.
Ichneumon bilunulatus var. punctus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
var. **subannulatus** Berth. — ♂ — Eur. [p. 249, ♂.
Ichneumon bilunulatus var. subannulatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
var. **triplex** Berth. — ♂ — Eur. [p. 249, ♂.
Ichneumon bilunulatus var. triplex Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
bimacularis D. T. — ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon bimaculatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 357, ♂.
Ichneumon bimacularis m.
bimaculator Thunbg.! — Afr.: Cap.
Ichneumon bimaculator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258.
Ichneumon bimaculator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 304.
bimaculatus Schrk.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon bimaculatus Schrank, Beitr. z. Naturg. 1776 p. 86 n. 48.
Ichneumon bimaculatus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 347 n. 700, ♂.
Ichneumon bimaculatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 140 n. 17.
Ichneumon bimaculatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2677 n. 88.
Ichneumon bimaculatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 220 n. 80.
Ichneumon bimaculatorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 80 T. 8.
Ichneumon bimaculatorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 60.
Ichneumon bimaculatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♂.
Ichneumon bimaculatus Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284.
Ichneumon saturatorius var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 238, ♂.
Ichneumon saturatorius var. 4 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 239, ♀.
Ichneumon bimaculatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 65 n. 61, ♀♂.
Ichneumon bimaculator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 9, ♀♂.
Ichneumon bimaculatorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 137 n. 80, ♀ ♂.
Ichneumon bimaculatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 394 [n. 94, ♀♂.
Ichneumon bimaculatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 106 n. 80, ♀♂.

---

1) *Lep.:* Orgyia pudibunda (Rondani), Trachea piniperda (Ratzeburg), Hadena baltica [(Brischke).
2) *Lep.:* Tryphaena fimbria (Ratzeburg).

Ichneumon (Melanichneumon) bimaculatorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1956 n. 2.
Ichneumon bimaculatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 227 n. 3, ♀♂.
bimaculatus Smith — ♀ — As.: Turcestania.
Ichneumon bimaculatus Smith, Scient. Res. 2d Yarkand Miss. 1878 p. 20 n. 57, ♀.
bimembris Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Ichneumon bimembris Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 8.
Ichneumon bimembris Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 150 n. 38, ♀.
Ichneumon bimembris Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 293 n. 13, ♀.
Ichneumon bimembris Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 269 n. 13, ♀.
binarius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon binarius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 276.
Ichneumon binarius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 350.
binotator Thunbg. — Eur.: Suecia.
Ichneumon binotator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 268.
Ichneumon binotator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 329.
bioculatus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, New Hampshire.
Ichneumon bioculatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 158 n. 70, ♀ ♂.
bipunctator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon bipunctator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 267.
Ichneumon bipunctator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 329.
bipunctatus Schrk.! — Eur.: Bavaria.
Ichneumon bipunctatus Schrank, Gistl: Faunus N. F. I. 1837 p. 13.
bipunctatus Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Ichneumon bipunctatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 253 n. 18, ♂.
Ichneumon bipunctatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 161 n. 82, ♂.
var. **festus** Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Ichneumon festus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 257 n. 31, ♂.
Ichneumon bipunctatus var. festus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 161.
bipunctorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon bipunctorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 261.
Ichneumon bipunctorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 367.
bipustulatus Waterh. — Am.
Ichneumon bipustulatus Waterhouse, Aid Ident. Insect. P. 27. 1886; T. 169 F. 3.
bisignatus Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon bisignatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 410 n. 161b, ♂.
Ichneumon bisignatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 181 n. 147, ♂.
Ichneumon bisignatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 49 n. 161b, ♂.
Ichneumon bisignatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 381 n. 40, ♀♂.
Ichneumon bisignatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 431 n. 111, ♀♂.
Ichneumon bisignatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 289 n. 21, ♂.
Ichneumon bisignatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 215 n. 41, ♂.
Ichneumon bisignatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 629 n. 113, ♂.
bispinatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon bispinatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 254.
Ichneumon bispinatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 293.
bistrigosus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ichneumon bistrigosus Holmgren, Entom. Tidskr. I. 1880 p. 25 n. 20-21, ♀.
Ichneumon (Coelichneumon) bistrigosus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1910 n. 22.
Ichneumon bistrigosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 555 n. 50, ♀.

---

[1] *Lep.:* Vanessa urticae (Bignell).

bituberculatus Bouché! [1]) — Eur.: Germania.
Ichneumon bituberculatus Bouché, Naturg. d. Insect. 1834 p. 141 n. 9.
bizonatus Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Ichneumon bizonatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 160 n. 38, ♀.
Ichneumon bizonatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 159 n. 73, ♀.
blanchardii Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Ichneumon Blanchardi Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 350, ♀.
blandicus Cam. — ♂ — Am.: Guatemala.
Ichneumon blandicus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 38. 1885 Hymen. I. p. 181 n. 135, ♂.
blandii Cress. — ♂ — Am.: Pennsylvania.
Ischnus Blandii Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 188 n. 5, ♂.
Ichneumon Blandii Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 160 n. 79, ♂.
bleusei Pic — ♀ — Afr.: Algeria.
Ichneumon Bleusei Pic, Bull. soc. entom. France 1898 p. 352, ♀.
bohemanii Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr. [nec Linné].
Ichneumon designatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 440 n. 137, ♀ [excl. ♂,
Ichneumon designatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 186 n. 158, ♀ [[excl. ♂].
Ichneumon designatorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 304 n. 15, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon designatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 29 n. 16, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon designatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 147 (Mant. p. 14), [♀ [excl. ♂].
Ichneumon designatorius Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 54, ♀ [[excl. ♂].
Ichneumon Bohemani Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 14 n. 4, ♀.
Ichneumon Bohemani Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 273 n. 1, ♂.
Ichneumon Bohemani Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 214 n. 5, ♀.
Ichneumon Bohemani Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 13 n. 2, ♀ ♂.
Ichneumon Bohemani Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VII. P. 8. 1887 p. 301, ♂.
Ichneumon (Coelichneumon) Bohemani Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1902 n. 1.
Ichneumon Bohemani Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 329 n. 10, ♀ ♂.
boreellus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon boreellus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2396 n. 43b, ♀ ♂.
brachyurus Schrk.! — ♀ — Eur.
Ichneumon brachyurus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 352 n. 711, ♀.
Ichneumon brachyurus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 154 n. 57.
Ichneumon brachyurus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2683 n. 111.
Ichneumon brachyurus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 220 n. 84.
Ichneumon brachyurus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 940 n. 93a, ♀.
breviatorius Fabr.! — Am. mer.
Ichneumon breviatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 78 n. 29.
Ichneumon breviatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 276.
Ichneumon breviatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 351.
brevicaudus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon brevicaudus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 54 n. 54, ♀.
Ichneumon brevicaudus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 186.
brevicillus Tosqu. — ♀ — Afr.: Zanzibar.
Ichneumon brevicillus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 39 n. 18, ♀.

---

[1]) *Hymen.:* Tenthredo perla (Bouché).

brevicinctor Say — ♀ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon brevicinctor Say, Amer. Entom. II. 1825 p. 49; T. 22 F. 1.
Ichneumon brevicinctor Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 228 n. 5.
Ichneumon brevicinctor Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 49; T. 22 F. 1.
Ichneumon brevicinctor Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 686 n. 5.
Ichneumon brevicinctor Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 150 n. 40.
Ichneumon brevicinctor Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 294 n. 14, ♀.
Ichneumon brevicinctor Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 270 n. 14, ♀.
brevigena Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon brevigena Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 19 n. 22, ♀ ♂.
Ichneumon brevigena Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1920 n. 15.
Ichneumon brevigena Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 599 n. 55, ♀.
brevipennis Cress.[1] — ♀ — Am.: Colorado, United States.
Ichneumon brevipennis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 174 n. 57, ♀.
Ichneumon brevipennis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 182 n. 184, ♀.
Ichneumon brevipennis Riley, 9th Ann. Rep. Insect. Missouri 1877 p. 55.
Ichneumon brevipennis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 428 n. 90, ♀.
var. **obsoletus** Ril. — ♀ — Am.: Missouri.
Ichneumon obsoletus Riley, 9th Ann. Rep. Insect. Missouri 1877 p. 55.
Ichneumon brevipennis var. obsoletus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 182 [n. 184, ♀.
brevis Tischb. — ♂ — Eur.: Austria.
Ichneumon brevis Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 437 n. 133, ♂.
Ichneumon brevis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 630 n. 117, ♂.
bronteus Cress. — ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon Bronteus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 144 n. 17, ♂.
Ichneumon Bronteus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 156 n. 58, ♂.
Ichneumon Bronteus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 297 n. 23, ♂.
Ichneumon Bronteus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 273 n. 23, ♂.
brounii Cam. — ♂ — Austr.
Ichneumon Brouni Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 No. 1 p. 17, ♂.
bruneolus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 69 n. 329.
Ichneumon brunneolus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2718 n. 375.
Ichneumon brunneolus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1042 n. 250.
bruneipes Tischb.[2] — ♂ — Eur.: Helvetia.
Ichneumon brunnipes Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 23 n. 6, ♂.
Ichneumon brunnipes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 560 n. 61, ♂.
buccator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon buccator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon buccator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 340.
bucculentus Wesm.[3] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon luctatorius var. 9b Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 418, ♂ [non Linné].
Ichneumon bucculentus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 61 [n. 56, ♀ ♂.
Ichneumon bucculentus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 61 (Mant. p. 29), ♀ ♂.
Ichneumon bucculentus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 60 n. 34, ♀ ♂.
Ichneumon bucculentus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 392 n. 85, [♀ ♂.

---

[1] *Lep.:* Leucania albilinea (Guérin).
[2] = ? Amblyteles camelinus (Wesmael).
[3] *Lep.:* Charaeas graminis (Gutheil).

Ichneumon bucculentus Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 399 n. 25, ♀.
Ichneumon glaucus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 285 n. 13, ♀.
Ichneumon bucculentus Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 171 n. 10.
Ichneumon bucculentus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 180 (♀) & 215 (♂) n. 35.
Ichneumon bucculentus Holmgren, Entom. Tidskr. I. 1880 p. 30 n. 34, ♀ ♂.
Ichneumon bucculentus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 19 n. 23.
Ichneumon bucculentus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1223 n. 4.
Ichneumon bucculentus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 181 n. 29, ♂.
Ichneumon bucculentus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 57, ♂.
Ichneumon bucculentus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1917 n. 9.
Ichneumon bucculentus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 645 n. 141, ♀ ♂.

var. **similis** Berth. — ♀ ♂ — Eur. fere tota. [p. 646, ♂.
Ichneumon bucculentus var. similis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894

buddha Cam. — ♀ — As.: Ceylon.
Ichneumon Buddha Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 No. 4. p. 7, ♀.

bulimorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon bulimorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255.
Ichneumon bulimorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 295.

burrus Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Ichneumon burrus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 14, ♀.

buyssonii Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon Buyssoni Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 39 n. 8, ♂.
Ichneumon Buyssoni Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 285 n. 110, ♀ ♂.

caedator Grav. — ♀ (♂?) — Eur. bor. & centr.
Ichneumon caedator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 285 n. 96, ♀.
Ichneumon caedator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 162 n. 97.
? Ichneumon intricator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 372 (Misc. p. 13) [n. 8, ♀.
Ichneumon caedator Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 34 n. 96.
? Ichneumon decipiens Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 69 n. 38, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon caedator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 383 n. 48, ♀.
Ichneumon caedator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 282 n. 8, ♀ ♂.
Ichneumon caedator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 180 n. 55, ♀.
? Ichneumon caedator Kriechbaumer, Termész. Füzet. VI. 1882 p. 144 n. 4, ♂.
Ichneumon caedator Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 22 n. 31, ♀ [excl. ♂?].
Ichneumon caedator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1915 n. 4.
Ichneumon caedator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 656 n. 162, ♀ (♂?).

caelestis Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon coelestis Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 427 n. 99.
Ichneumon coelestis Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 142 n. 23.

caeruleus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon coeruleus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 149 n. 25, ♀.
Ichneumon coeruleus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 146 n. 23, ♂.
Ichneumon coeruleus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 292 n. 9, ♀ ♂.
Ichneumon coeruleus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 268 n. 9, ♀ ♂.

calcatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon calcatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 254.
Ichneumon calcatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 291.

calceator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon calceator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273.
Ichneumon calceator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 345.

caliginosus Cress.[1] — ♀ — Am.: Canada, Colorado, Illinois.
Ichneumon caliginosus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 144 n. 16, ♀.
Ichneumon caliginosus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 147 n. 27, ♀.
Ichneumon caliginosus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 321 n. 68, ♀.
Ichneumon caliginosus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 760 n. 68, ♀.
Ichneumon caliginosus Howard, Scudder: Butterflies U. S. 1889 p. 1876, ♀.
calitergus Cress. — ♀ — Am.: Maine.
Ichneumon calitergus (Harris) Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 299, ♀.
Ichneumon calitergus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 160 n. 76, ♀.
callicerus Grav.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota. [& var. 1].
Ichneumon callicerus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 311 n. 44, ♀ [excl. ♂.
Ichneumon gracilicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 291, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon callicerus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 343 n. 130, ♀ [excl. ♂ & var. 1].
Ichneumon callicerus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 96 [n. 101, ♀.
Ichneumon callicerus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 39 (Adn. p. 7), ♀.
Ichneumon plurialbatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 397 (Misc. p. 38, [n. 30, ♀ ♂.
Ichneumon gracilicornis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 35 [n. 130, ♂.
Ichneumon callicerus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 41 [n. 130, ♀ ♂.
Ichneumon plurialbatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 14, ♀ ♂.
Ichneumon callicerus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 184 n. 110, ♀ ♂.
Ichneumon plurialbatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 203, ♀.
Ichneumon callicerus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 408 n. 147, ♀ ♂.
Ichneumon callicerus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 181 n. 94, ♀ ♂.
Ichneumon callicerus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 109 n. 97, ♀ ♂.
Ichneumon (Barichneumon) callicerus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1962 n. 7.
Ichneumon callicerus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 251 n. 44, ♀ ♂.
caloscelis Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon Ammonius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 301 n. 31, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon Ammonius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 279 n. 92, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon Ammonus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 160 n. 92, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon caloscelis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 59 n. 52, ♀.
Ichneumon caloscelis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 37 (Adn. p. 5), ♂.
Ichneumon caloscelis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 33 n. 92.
Ichneumon caloscelis Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 102 n. 60, ♀ ♂.
Ichneumon caloscelis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 391 n. 80, ♀ ♂.
Ichneumon caloscelus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 180 (♀) & 215 (♂) n. 54.
Ichneumon caloscelis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1937 n. 60.
Ichneumon caloscelis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 608 n. 69, ♀ ♂.
var. **zonalis** Kriechb. — ♀ — Eur.: Helvetia, Bavaria. [XXIX. 1875 p. 157, ♀.
Ichneumon caloscelis var. zonalis Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg
Ichneumon caloscelis var. zonalis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 609, ♀.
canadensis Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Ichneumon Canadensis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 308, ♀.

---

[1] *Lep.:* Basilarchia archippus (Howard).
[2] *Lep.:* Hadena adusta (Brischke).

Ichneumon Canadensis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 177 n. 159, ♀.
Ichneumon Canadensis Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 361 n. 57, ♀.
Ichneumon Canadensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 287 n. 57, ♀.

cannabis Scop.! — ♀ — Eur.
Ichneumon cannabis Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 288 n. 759; T. 41 F. 760.
Ichneumon cannabis Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 368.
Ichneumon cannabis Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 214 n. 40.
Ichneumon cannabis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 939 n. 91, ♀.
Ichneumon cannabis Vallot, Mém. acad. sc. Dijon 1836 p. 244.

capensis Thunbg.! — Afr.: Cap.
Ichneumon Capensis Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon Capensis Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 314.

capito Kriechb. — ♀ — Eur.: Helvetia, Hungaria.
Ichneumon capito Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. III. P. 9. 1872 p. 484, ♀.
Ichneumon capito Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 572 n. 86, ♀.

capreolus Berth. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Ichneumon capreolus Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1899 p. 135 n. 49, ♀.

captorius Thoms. — ♀ ♂ — Eur. centr., Suecia.
Ichneumon captorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 7 n. 48, ♀ ♂.
Ichneumon captorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1937 n. 62.
Ichneumon captorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 616 n. 83, ♀ ♂.
Ichneumon captorius Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2397 n. 62.

carbonarius Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 69 n. 331.
Ichneumon carbonarius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2719 n. 377.
Ichneumon carbonarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1042 n. 251.

carbonator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon carbonator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon carbonator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 300.

carinator Fabr.! — Eur.: Italia.
Ichneumon carinator Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 225 n. 127-128.
Ichneumon carinator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 67 n. 70.
Ichneumon carinator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 264.
Ichneumon carinator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 317.
Ichneumon carinator Trentepol, Isis 1826 p. 238 n. 58.
Ichneumon carinator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1014 n. 205.

carinifrons Cam. — ♀ — Am.: Mexico, Panama.
Ichneumon carinifrons Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 35. 1885 Hymen. I. p. 160 n. 31, ♀.

castaneus Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 64 n. 250.
Ichneumon bipunctatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2703 n. 305.
Ichneumon castaneus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 352 n. 95, ♀.
Ichneumon castaneus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 558 n. 234, ♀.
Ichneumon bipunctatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1035 n. 234.
Ichneumon castaneus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 199 n. 197.
Ichneumon castaneus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 77 [n. 76, ♀ ♂.
Ichneumon castaneus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 171 (Mant. p. 38), ♀ ♂.
Ichneumon castaneus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 394 (Misc. p. 35) [n. 27, ♀.
Ichneumon castaneus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 11, ♀.

Ichneumon castaneus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 197 n. 118, ♀ ♂.
Ichneumon castaneus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 203, ♀.
Ichneumon castaneus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 401 n. 115, ♀ ♂.
Ichneumon castaneus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 42, ♀ ♂.
Ichneumon castanea Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 211 n. 100, ♀ ♂.
Exephanes rufoniger Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 167 n. 2, ♀.
Exephanes nigrifemur Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 169 n. 5, ♀.
Ichneumon castaneus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 16 n. 74, ♀ ♂
Exephanes rufoniger Kriechbaumer, Entom Nachr. XIX. 1893 p. 327 n. 2, ♀.
Exephanes nigrifemur Kriechbaumer, Entom. Nachr. 1893 p. 328 n. 5, ♀.
Ichneumon (Stenichneumon) castaneus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1967 n. 10.
Ichneumon castaneus Berthoumieu, Ann. soc. entom France LXIV. 1895 n. 565 n. 22, ♀ ♂.
Ichneumon (Stenichneumon) castaneus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2404 n. 10

var. **flaviger** Berth. — ♀ — Eur.
Ichneumon castaneus var. flaviger Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 566, ♀.

var. **pulchricornis** Grav. — ♀ — Eur.
Ichneumon pulchricornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 564 n. 237, ♀.
Ichneumon castaneus var. pulchricornis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 [(Rem.) p. 66 n. 237.
Ichneumon castaneus var. pulchricornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 566, ♀.

var. **subniger** Berth. — ♀ ♂ — Eur.
Ichneumon castaneus var. subniger Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 566, ♀ ♂.

castoldii Costa — Eur.: Sardinia.
Ichneumon Castoldii A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p. 13.
Ichneumon Costoldii A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 113.

castor Cam. — ♀ — Am.: Costa Rica.
Ichneumon castor Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 34. 1884 Hymen. I. p. 137 n. 1, ♀.

caudatus Prov. — ♀ — Am.: Canada, Massachusetts.
? Phygadeuon terminalis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 284 [non Cresson].
Ichneumon caudatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 82.
Ichneumon caudatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 173 n. 133, ♀.
Ichneumon caudatus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 358 n. 49, ♀.
Ichneumon caudatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 283 n. 49, ♀.

causticus Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [T. 8 F. 3.
Ichneumon causticus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 156 n. 42, ♀.

cavator Oliv.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon cavator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 196 n. 201.
Ichneumon cavator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 218 n. 68.
Ichneumon cavator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 986 n. 144.

cavator Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon cavator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 157 n. 1823.
Ichneumon cavator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 986 n. 145.

cavillosus Tosqu. — ♂ — Afr.: Congo.
Ichneumon cavillosus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 28 n. 12, ♂.

cayennator Thunbg.! — Am.: Guinea.
Ichneumon cayennator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon cayennator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 337.

celatus Cam. — Am.: Mexico.
Ichneumon eelatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 35. 1885 Hymen. I. p. 150 n. 32; T. 7 F. 13.

censor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon censor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 269.
Ichneumon censor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 333.
centralis Cam. — ♀ — Am.: Costa Rica. [T. 8 F. 15.
Ichneumon centralis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36/37. 1885 Hymen. I. p. 179 n. 107, ♀;
centrator Say — ♀ — Eur.: Canada, United States.
Ichneumon centrator Say, Amer. Entom. II. 1825 p. 49; T. 22 F. 3.
Ichneumon fortis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 79.
Ichneumon centrator Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 144 n. 11, ♀.
Ichneumon centrator Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 291 n. 6, ♀.
Ichneumon centrator Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 267 n. 6, ♀.
centrosus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon centrosus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 8 n. 12, ♂.
centummaculatus Christ[1]) — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon centummaculatus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 345, ♀; T. 34 F. 7.
Ichneumon multiguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 436 n. 171, ♂.
Ichneumon centummaculatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 886 n. 19, ♀.
Ichneumon multiguttatus Boie, Naturh. Tidsskr. III. 1841 p. 316 n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon multiguttatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 364 (Ot. p. 13) n. 11, ♂.
Ichneumon multiguttatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 56, ♀ ♂.
Ichneumon multiguttatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 4, ♀ ♂.
Ichneumon multiguttatus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 18 n. 7, ♀ ♂.
Ichneumon multiguttatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 451 (Doc. p. 11) [n. 6, ♀ ♂.
Ichneumon multiguttatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 377 [n. 22, ♀ ♂.
Ichneumon centummaculatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 349 n. 5, ♀ ♂.
Ichneumon multiguttatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 38, ♀ ♂.
Ichneumon centummaculatus Woldstedt, Horae soc. entom. Ross. XVI. 1881 p. 63.
Ichneumon centummaculatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 12 n. 1, ♀.
Ichneumon (Coelichneumon) centummaculatus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1902 n. 2.
Ichneumon centummaculatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 528 n. 9, [♀ ♂.
ceparum Schrk.! — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon ceparum Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 284 n. 2092, ♀ ♂.
Ichneumon ceparum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1029 n. 226, ♀ ♂.
cephalator Vill.! — ♀ — Eur.
Ichneumon cephalator Villers, C. Linnaei Entom. IV. 1789 p. 195 n. 196.
Ichneumon cephalator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 217 n. 63.
Ichneumon cephalator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1081 n. 319.
cephalotes Cress. — Am.: Mexico.
Ichneumon cephalotes Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 123 n. 49, ♀.
cerasi L.! — Eur.
Ichneumon cerasi Linné, Mant. plant. II. 1771 App. p. 226.
Ichneumon cerasi Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. Suppl. 1776 p. 319 n. 22a.
cerebrosus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon cerebrosus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 88, ♀.
Ichneumon cerebrosus Kriechbaumer, Entom. Nachr. VII. 1881 p. 57 n. 4.
Ichneumon cerebrosus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 23 n. 37, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Acronycta psi (Boie), Noctua spec. (Brischke).

Ichneumon cerebrosus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 278, ♂.
Ichneumon cerebrosus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1936 n. 59.
Ichneumon cerebrosus Berthomieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 648 n. 146, ♀♂.
Ichneumon cerebrosus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2397 n. 59.

certator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon certator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 266.
Ichneumon certator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 322.

cervinus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 70 n. 353.
Ichneumon cervinus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2721 n. 398.
Ichneumon cervinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1077 n. 311.

cervulus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon cervulus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 83.
Ichneumon cervulus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 171 n. 122, ♂.
Ichneumon cervulus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 356 n. 44, ♂.
Ichneumon cervulus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 282 n. 44, ♂.

cespitator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon cespitator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 269.
Ichneumon cespitator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 332.

cessator Müll.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon cessator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 158 n. 1833, ♀.
Ichneumon custodiator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 166 n. 136.
Ichneumon custodiator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 68 n. 78.
Ichneumon custodiator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♀.
Ichneumon custodiator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 272.
Ichneumon custodiator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 341.
Ichneumon custodiator Trentepol, Revis. crit. gen. Ichneum. 1825 p. 23 n. 11.
Ichneumon custodiator Trentepol, Isis 1826 p. 70 n. 11, ♀.
Ichneumon cessator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 155 n. 27, ♀.
Ichneumon cessator Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 9 n. 7.
Ichneumon calceatorius Stephens, Catal. Brit. Insects 1829 p. ?
Ichneumon cessator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 138 n. 32.
Ichneumon cessator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 40 [n. 33, ♀♂.
Ichneumon cessator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 6, ♀.
Ichneumon cessator Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 123 n. 73, ♀ ♂.
Ichneumon cessator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 256 n. 27, ♀♂.
Ichneumon cessator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 382 n. 46, ♀♂.
Ichneumon cessator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 39, ♀ ♂.
Ichneumon cessator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 102 n. 63, ♀ ♂.
Ichneumon cessator Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 83 n. 73, ♀.
Ichneumon cessator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1940 n. 72.
Ichneumon cessator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 588 n. 29, ♀ ♂.

var. **impollutus** Berth. — Eur.
Ichneumon cessator var. impollutus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 588.

cestus Cress. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Ichneumon cestus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 182 n. 182, ♀.
Ichneumon cestus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 353, ♀.

---

[1] *Lep.:* Vanessa polychloros (Brischke), Acronycta psi (Giraud).

chalco Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon chalco Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 7 n. 9, ♂.
chalybaeus Cress. — ♀ — Am.: Massachusetts.
Ichneumon chalybaeus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 146 n. 22, ♀.
championii Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [T. 7 F. 17.
Ichneumon Championi Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 159 n. 52, ♀;
chernetis Schrk.! — Eur.: Bavaria.
Ichneumon chernetis Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 308 n. 2148.
chiapus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon chiapus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 112 n. 6, ♂.
chichimenus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon chichimenus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 19 n. 36, ♂.
chionomus Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Belgia, Germania, Hungaria.
Ichneumon callicerus var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 343, ♂.
Ichneumon incubitor var. 1 Gravenhorst, Ichneum Europ. I. 1829 p. 617, ♀. [♀♂.
Ichneumon chionomus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 91 n. 95,
Ichneumon chionomus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 177 (Mant. p. 44), ♀.
Ichneumon chionomus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 13.
Ichneumon chionomus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 406 n. 139, ♀♂.
Ichneumon chionomus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 44, ♀♂.
Ichneumon chionomus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 181 & 183 n. 89, ♀♂.
Ichneumon chionomus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 244 n. 29, ♀♂.
chiriquensis Cam. — ♂ — Am.: Panama.
Ichneumon Chiriquensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 34. 1884 Hymen. I. p. 140 n. 7, ♂.
chirothecator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon chirothecator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon chirothecator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 301.
cholulu Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon cholulu Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 5 n. 7, ♀.
chrysogaster Gmel.[2]) — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 65 n. 270.
Ichneumon chrysogaster Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2705 n. 323.
Ichneumon chrysogaster Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1013 n. 201.
chrysopus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 66 n. 286.
Ichneumon chrysopus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2706 n. 337.
Ichneumon chrysopus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1007 n. 189.
chrysostomus Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ichneumon chrysostomus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2400 n. 79ᵇ, ♀.
cimex Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon cimex O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 155 n. 1808.
cincticornis Cress. — ♀ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon cincticornis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 139 n. 7, ♀.
Ichneumon cincticornis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 143 n. 7, ♀.
Ichneumon cincticornis Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 290 n. 4, ♀.
Ichneumon cincticornis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 266 n. 4, ♀.
cinctitarsis Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon varipes Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 50 [non Grav.].

---

1) *Lep.:* Hadena adusta (Brischke).
2) = ? Bracon spec. (Gravenhorst).

Ichneumon cinctitarsis Provancher, Natural. Canada. IX. 1876 p. 7, ♂.
Ichneumon cinctitarsis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 156 n. 60, ♂.
Ichneumon cinctitarsis Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 297 n. 24, ♂.
Ichneumon cinctitarsis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 273 n. 24, ♂

cinctor Kriechb. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Ichneumon cinctor Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 48.
Ichneumon cinctor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 626 n. 106, ♂.

cinctorius Steph. — ♂ — Eur.: Britannia. [Fabricius.
Ichneumon cinctorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 189 n. 166, ♂ non
Ichneumon cinctorius Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 25 n. 141, ♂.
Ichneumon cinctorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 212 n. 115, ♂.

cinctus Dwig.! — Eur.
Ichneumon cinctus Dwigubski, Prim. faun. Mosquens. 1802 p. 166 n. 580.
Ichneumon cinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1069 n. 294.

cingulator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon cingulator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 275.
Ichneumon cingulator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 348.

cingulatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon cingulatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Péterbourg VIII. 1822 p. 255.
Ichneumon cingulatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 293.

cingulatorius Weber! — Eur.: Batavia.
Ichneumon cingulatorius Weber, Observ. entom. 1801 p. 100 n. 1.

cintranus Berth. — ♀ — Eur.: Hispania, Lusitania.
Ichneumon cintranus Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 38 n. 6, ♀.
Ichneumon cintranus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 593 n. 43, ♀.

cinxiae Kriechb.[1] — ♀ — Eur.: Austria inf.
Ichneumon Cinxiae Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 480, ♀.
Ichneumon Cinxiae Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 617 n. 87, ♀.

circes Boie[2] — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon Circes Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 90 n. 13, ♂.

circulator Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon (Ctenichneumon) circulator Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2085 n. 4, ♀ ♂.

circumflexus Christ! — Eur.
Ichneumon circumflexus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 360. [p. 965 n. 20.
Ichneumon circumflexus Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805
Ichneumon circumflexus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1084 n. 323.

citator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon citator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 269.
Ichneumon citator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 333.

citatus Prov. — ♂ — Am.: Canada, New Hampshire.
Ichneumon citatus Provancher, Natural. Canad. IX. 1875 p. 8.
Ichneumon citatus Cresson Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 148 n. 32, ♂.
Ichneumon citatus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 293 n. 11, ♂.
Ichneumon citatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 269 n. 11, ♂.

citimus Cress. — ♂ — Am.: New Hampshire.
? Ichneumon torvinus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 292, ♂.
? Ichneumon torvinus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 144 n. 9, ♂.
Ichneumon citimus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 144 n. 10, ♂.

---

1) *Lep.:* Melitaea Cinxia (Dorfmeister).
2) *Lep.:* Papilio Circe (Boie).

citrifrons Cress. — ♂ — Am.: Connecticut, Pennsylvania, Mexico.
Ichneumon citrifrons Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 307, ♂.
Ichneumon citrifrons Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 171 n. 125, ♂.
citrinops Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon citrinops Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 388 (Ot. p. 37) n. 38, ♂.
Ichneumon citrinops Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 246 n. 55, (♀) ♂.
Ichneumon citrinops Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 274 n. 80, ♀ ♂.
citrinus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon citrinus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 114 n. 13, ♂.
clarigator Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia, Belgia. [n. 116, ♀.
Ichneumon clarigator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 107
Ichneumon clericus var. 1 Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 139 & 140 (Mant. p. 7).
Ichneumon clarigator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 392 (Misc. p. 33) [n. 26, ♀ ♂.
Ichneumon clarigator Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 161 n. 96, ♀ ♂. [♀ ♂.
Ichneumon clarigator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 399 n. 108,
Ichneumon clarigator Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 14 n. 67, ♀ ♂.
Ichneumon (Cratichneumon) clarigator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1949 n. 8.
Ichneumon clarigator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 287 n. 115, ♀ ♂.
var. **subniger** Berth. — ♀ — Eur. [♀.
Ichneumon clarigator var. subniger Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 288,
clavator Thunbg.! — Afr.: Cap.
Ichneumon clavator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258.
Ichneumon clavator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 304.
clavipes Möll. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ichneumon clavipes Möller, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 92, ♀.
Ichneumon clavipes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 271 n. 75, ♀.
clitellarius Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ichneumon clitellarius Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 31 n. 35-36, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon clitellarius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 643 n. 136, ♀.
Ichneumon clitellarius Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2392, ♀ [excl. ♂].
clotho Cam. — ♀ — As.: Mussoori.
Ichneumon Clotho Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 1, ♀; T. 3 F. 1.
clypeator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon clypeator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon clypeator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 338.
coactus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon (Coelichneumon) coactus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1908 n. 16, ♀ ♂.
coalitorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon coalitorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Ichneumon coalitorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 358.
coccinellae Schrk.! — Eur.: Bavaria.
Ichneumon coccinellae Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 310 n. 2155.
coccineus Christ! — Eur.
Ichneumon coccineus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 365; T. 38 F. 6.
cognator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon cognator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon cognator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 344.
cognatorius Smith — ♀ ♂ — As.: Japonia.
Ichneumon cognatorius Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 287 n. 2, ♀ ♂.

cognatus Fonsc.! — ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon cognatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 418 n. 69, ♂.
colensii Cam. — ♀ — Austr.: New Zealand.
Ichneumon Colensii Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 P. 1. p. 15, ♀.
collector Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon collector Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon collector Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 339.
coloratus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 71 n. 368.
Ichneumon coloratus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2722 n. 410.
comes Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon comes Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 158 n. 35, ♂.
Ichneumon comes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 301.
Ichneumon comes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 162 n. 85, ♂.
Ichneumon comes Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 350 n. 30, ♀.
Ichneumon comes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 276 n. 30, ♀.
comis Wesm. — ♂ — Eur.: Germania, Italia.
Ichneumon comis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 390 (Ot. p. 39) n. 40, ♂.
Ichneumon comis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 564 n. 18, ♂.
comitator L.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Réaumur, Mém. hist. Insect. VI. 1742 p. ?; T. 29 F. 1-4.
—— Degeer, Mém. hist. Insect. I. 1752 p. ?; T. 24 F. 10.
Ichneumon comitator Linné, Syst. nat. Ed. 10a 1758 p. 563 n. 23, ♀.
Ichneumon comitator Brünnich, Prodr. insectol. Siaelland 1761 p. 18.
Ichneumon comitator Linné, Fauna Suec. Ed. 2a 1761 p. 402 n. 1600, ♀.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 338 n. 39.
Ichneumon spec. Gronov, Acta Helvet. V. 1762 p. 152 n. 387.
Ichneumon comitator Ström, Trondhiemske Selsk. Skrift. III. 1765 p. 378 & 420 n. 44.
Ichneumon comitator Linné, Syst. nat. Ed. 12a I. 2. 1767 p. 933 n. 24.
Ichneumon comitator Berkenhout, Outlin. Nat. Hist. Gr. Britain I. 1769 p. 164 n. 3.
Ichneumon comitator Linné, Pand. Rybyens. 1771 p. 15.
Ichneumon comitator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 333 n. 34.
Ichneumon comitator Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 849 n. 24.
Ichneumon auspex O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 154 n. 1792.
—— Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. I. 2. 1778 p. 93 & 4. 1778 p. 31; T. 24 F. 10.
Ichneumon comitator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 426 n. 37.
Ichneumon comitator Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 353 n. 712, ♂.
Ichneumon comitator Linné, Amoen. acad. VIII. 1785 p. 87.
Ichneumon comitator Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 406 n. 39.
Ichneumon comitator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 263 n. 45.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 63 n. 232.
Ichneumon comitator Razoumowski, Hist. nat. Jorat. I. 1789 p. 214 n. 246, var. 1 [excl.
Ichneumon comitator Römer, Gen. Insect. 1789 p. 58; T. 26 F. 14. [var. 2 & 3].
Ichneumon comitator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 159 n. 74.
Ichneumon comitator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2685 n. 24.
Ichneumon fasciatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2701 n. 294.
Ichneumon comitator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 41 n. 757.
Ichneumon comitator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 176 n. 64.

---

[1]) *Lep.:* Trachea piniperda, Cleora viduaria (Ratzeburg), Fidonia piniaria (Hartig), Abraxes grossulariata, Bombyx spec. (Stephens), Plusia gamma (Rondani).

Ichneumon comitator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 151 n. 71.
Ichneumon comitator Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 159 n. 489.
Ichneumon comitator Panzer, Faun. Insect. German. VI. 1799 P. 71 T. 14.
Ichneumon comitator Dwigubsky, Prim. faun. Mosquens. 1802 p. 156 n. 574.
? Ichneumon molitorius Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 273 n. 2072, var. d.
Ichneumon comitator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 56 n. 36.
Ichneumon comitator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 65 n. 58.
Ichneumon comitator Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 185 n. 23.
Ichneumon comitator C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- u. Baumhölzer II. 7. 1807 p. 364.
Ichneumon comitator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 63 n. 757.
Ichneumon comitator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♀ ♂.
Ichneumon comitator Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 8.
Ichneumon comitator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 279 n. 1, ♀.
Ichneumon fasciatus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 281 n. 4, ♂.
Ichneumon comitator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon comitator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 301.
Ichneumon comitatorius Trentepol, Revis. crit. gen. Ichneum. 1825 p. 17 n. 2.
Ichneumon comitatorius Trentepol, Isis 1826 p. 63 n. 2, ♂ [excl. var.].
Ichneumon comitator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 108 n. 2, ♀ [excl. var.].
Ichneumon fasciatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 119 n. 8, ♂.
Ichneumon comitator Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 6 n. 2, ♀.
Ichneumon fasciatus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 7 n. 5, ♂.
Ichneumon comitator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 127 n. 2, ♀.
Ichneumon fasciatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 129 n. 8, ♂.
Ichneumon comitator Zetterstedt, Lappon. I. 1838 p. 359 n. 2, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon comitator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 302 n. 1.
Ichneumon comitator Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 57.
Ichneumon comitator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 30 [n. 17, ♀♂.
Ichneumon comitator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 134 & 304 n. 10, ♀.
Ichneumon comitator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 52 n. 1, ♀.
Ichneumon comitator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 133 n. 12.
Ichneumon comitator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 2. 1849 p. 379, ♀ ♂.
Ichneumon comitator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 164 n. 5.
Ichneumon comitator Hagen, Stettin. entom. Zeitg. XXII. 1861 p. 284 n. 104, ♀.
Ichneumon comitator Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 31 n. 16, ♀ ♂.
Ichneumon comitator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 229 n. 2, ♀.
Ichneumon fasciatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 234 n. 8, ♂.
Ichneumon comitator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 377 n. 24, ♀♂.
Ichneumon comitator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 352 n. 24, ♀ ♂.
Ichneumon comitator Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 32, ♂; T. 20 F. 5.
Ichneumon comitator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 38, ♀♂.
Ichneumon comitator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 101 n. 17, ♀ ♂.
Ichneumon comitator Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 24 n. 16, ♀ ♂.
Ichneumon comitator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 29, ♂.
Ichneumon (Coelichneumon) comitator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1906 n. 11.
Ichneumon comitator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 542 n. 24, ♀♂.

var. **specularis** Tischb. — ♀ — Eur.: Germania.

Ichneumon specularis Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 170 n. 7, ♀.
Ichneumon comitator var. specularis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 543, ♀.

commissator Smith — ♂ — As.: Borneo.

Ichneumon commissator Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 118 n. 2, ♂.

compactor Thunbg.! — Eur.: Suecia.

Ichneumon compactor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273.
Ichneumon compactor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 343.

compactus (Cress.) D. T. — ♀ — Am.: Illinois.

Pezomachus compactus Cresson, Canad. Entomol. IV. 1872 p. 63, ♀.
Pterocormus compactus Cresson, Synops. Hymen. North America 1887 p. 199.
Ichneumon compactus m.

compar Cress. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.

Ichneumon compar Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 175 n. 147.
Ichneumon compar Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 351, ♀.

completus Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.

Ichneumon completus Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VII. 1894 p. 178, ♀.
Ichneumon completus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 245 n. 41, ♀.

comptulus Tosqu. — ♀ — Afr.: Togo.

Ichneumon comptulus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 37 n. 17, ♀.

comptus Say — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.

Ichneumon comptus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 229 n. 7, ♀ ♂.
Ichneumon comptus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 686 n. 7.
Ichneumon comptus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 165 n. 96, ♂.
Ichneumon comptus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 353 n. 37, ♂.
Ichneumon comptus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 279 n. 37, ♂.

compunctator Müll.! — Eur.: Dania.

Ichneumon compunctator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 156 n. 1810.

computatorius Müll.[1] — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.

Ichneumon computatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 152 n. 1769, ♀.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 58 n. 164.
Ichneumon fuscatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2684 n. 239.
Ichneumon computatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 298 n. 28, ♀.
? Ichneumon fuscatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 170 n. 35, ♂.
? Ichneumon semiorbitalis var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 212.
Ichneumon computatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 256 n. 86, ♀.
? Ichneumon computatorius Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 12 n. 23, ♂.
Ichneumon computatorius Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 17 n. 39, ♀.
Ichneumon computatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 158 n. 87, ♀.
Ichneumon computatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 50 [n. 44, ♀.
Ichneumon computatorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 59 n. 13, ♀.
Ichneumon computatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 152 (Mant. [p. 19), ♀.
? Ichneumon fuscatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 403 (Misc. p. 44) [n. 33, ♀.
? Ichneumon fuscatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 388 (Ot. p. 37) n. 37, ♀.
? Ichneumon fuscatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 19 n. 34.
Ichneumon computatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 6, ♀.
Ichneumon computatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 202, ♂.
? Ichneumon fuscatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 266 n. 35, ♂.
Ichneumon bicoloripes Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXIX. 1868 p. 249 n. 2, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Orgyia pudibunda (Tischbein).

Ichneumon computatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 386 [n. 62, ♀.
Ichneumon computatorius Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 419 n. 55, ♀ ♂.
Ichneumon computatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 105 & 179 (♀) & [212 (♂) n. 30.
Ichneumon computatorius Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 28 n. 30, ♀.
Ichneumon computatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 19 n. 21, ♀ ♂.
Ichneumon computatorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1920 n. 14.
Ichneumon computatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 598 n. 54, ♀ ♂.
var. **insolitus** Berth. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Ichneumon computatorius var. insolitus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 599, ♀ ♂.
conciliator Rossi! — ♂ — Eur.: Italia.
Ichneumon conciliator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 47 n. 775, ♂.
Ichneumon conciliator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 71 n. 775.
Ichneumon conciliator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 979 n. 137ᵇ, ♂.
condecoratus Grav. — ♀ — Eur. mer.?
Ichneumon condecoratus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 631 n. 272, ♀.
Ichneumon condecoratus Kriechbaumer, Stettin. entom. Zeitg. XXXVI. 1875 p. 41 n. 4.
Ichneumon condecoratus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII. 1897 p. 119.
confirmatus Cress. — ♀ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon confirmatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 178 n. 162, ♀.
confusaneus Cam. — ♀ — As.: Ceylon.
Ichneumon confusaneus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 No. 4 p. 9, ♀.
confusorius Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. var. b Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 343 n. 49.
Ichneumon tripunctatus var. b Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 343 n. 50.
Ichneumon raptorius var. Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 135 n. 2.
Ichneumon extensorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 346.
Ichneumon confusorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 300 n. 30, ♀.
Ichneumon confusorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 276 n. 90, ♀ [excl. var.].
Ichneumon confusorius Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 18 n. 44, ♀.
Ichneumon confusorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 160 n. 90, ♀.
Ichneumon luctatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 57 [n. 51, ♀ ♂ [excl. var.].
Ichneumon confusorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 58 n. 33, ♀ ♂.
Ichneumon retectus Tischbein, Stestin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 421 n. 63, ♀.
Ichneumon crassicornis Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 421 n. 64, ♀.
Ichneumon confusorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 179 & 215 n. 34, ♀ ♂.
Ichneumon confusorius Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 29 n. 33, ♀ ♂.
Ichneumon confusorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 5 n. 40, ♀ ♂.
Ichneumon confusorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1921 n. 17.
Ichneumon confusorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 639 n. 129, ♀ ♂.
Ichneumon confusorius Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2394 n. 17.
coniger Tischb. — ♀ — Eur.: Austria inf.
Ichneumon coniger Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 284 n. 10, ♀.
Ichneumon coniger Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 598, ♀.

---

[1] *Lep.:* Dicranura bicuspis (Marshall), Nonagria nexa (Brischke), N. sparganii (Vollenhoven), Gortyna flavago (Boie, Brischke), Tryphaena pronuba & Noctua bella (Stephens), Cucullia santonii (Wullschlegel).

conjunctor Panz.! — Eur.: Bavaria.
Ichneumon LXXXVII. Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. III. 1779; T. 224 F. 10.
Ichneumon conjunctor Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 188.
connatus Spin. — ♂ — Am.: Chile.
Ichneumon connatus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 476 n. 3, ♂.
conopsator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon conopsator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon conopsator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 339.
consanguineus Smith — ♂ — Austr.: New Zealand.
Ichneumon consanguineus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 476, ♂.
Ichneumon consanguineus Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 120, ♂.
consanguinosus D. T. — ♂ — Am.: Mexico. [n. 40, ♂ [nec Smith].
Ichneumon consanguineus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 155
Ichneumon consanguinos m.
consecutorius Vill.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon consecutorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 156 n. 64.
Ichneumon consectatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 214 n. 45.
Ichneumon consecutorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 925 n. 71, ♀.
consignatorius Thunbg. — Eur.: Suecia.
Ichneumon consignatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Ichneumon consignatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 356.
consignatus Cress. — ♂ — Am.: Virginia, Massachusetts.
Ichneumon consignatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 298, ♂.
Ichneumon consignatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 160 n. 77, ♂.
consimilis Wesm. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon bilineatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 127 n. 11 [p. p.].
Ichneumon consimilis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 22 [n. 2, ♀.
Ichneumon consimilis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 359 (Ot. p. 8) n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon consimilis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 12 n. 11, ♂.
Ichneumon consimilis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 373 n. 22, ♀ ♂.
Ichneumon consimilis Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 22 n. 4, ♀ ♂.
Ichneumon consimilis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1221 n. 2, ♀ ♂.
Ichneumon consimilis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 551 n. 40, ♀ ♂.
var. **caelerator** Tischb. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Ichneumon caelareator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 171 n. 8, ♂.
Ichneumon consimilis var. caelerator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 551, ♂.
conspersus Holmgr. — ♀ ♂ — Afr.: Cap.
Ichneumon conspersus Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 393 n. 6, ♀ ♂.
conspiratus Smith — ♀ — Austr.: New Zealand.
Ichneumon conspiratus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 475, ♀.
Ichneumon conspiratus Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 120, ♀.
conspurcatus Steph.! — Eur.: Britannia.
Ichneumon conspurcatus Stephens, Illustr. Brit Entom. Mandib. VII. 1835 p. 181 n. 146.
constrictus Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 350 n. 64.
Ichneumon constrictus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 415 n. 65
Ichneumon constrictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1034 n. 231.
contrarius Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Pyrenaei montes.
Ichneumon contrarius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 604 n. 58^b, ♀ ♂.
Ichneumon contrarius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 604.

contrectator Kaw.! — ♀ — Eur.: Russia.
Ichneumon contrectator Kawall, Bull. soc. natural. Moscou XLI. 4. 1868 p. 508 n. 5, ♀.
coquebertii Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon X Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1766; T. 20 F. 8.
? Ichneumon fusorius Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. I. 1799 p. 12; T. 11 F. 5 [non Linné].
Ichneumon exspectorius var. Panzer, Nomencl. 1804 p. 29. [♀ ♂.
Ichneumon fusorius var. Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 24,
Ichneumon Coqueberti Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 144 (Mant. p. 11) n. 9ᵇ
[& p. 335, ♀ ♂.
Ichneumon Coqueberti Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 36 (Adn. p. 4), ♂.
Ichneumon fusorius var. 1 Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 363 (Ot. p. 12)
[n. 9, ♀ ♂.
Ichneumon Coqueberti Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 64, ♀ ♂.
Ichneumon Coqueberti Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 13 n. 3, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon Coqueberti Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 375 n. 15, ♀ ♂.
Ichneumon Coqueberti Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 348 n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon Coqueberti Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1874 p. 5, ♂; T. 2 F. 7.
Ichneumon Coqueberti Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 38, ♀ ♂.
Ichneumon Coqueberti Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 211 n. 4, ♀ ♂.
Ichneumon Coqueberti Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 Versl. p. XV.
Ichneumon Coqueberti Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 14 n. 7.
Ichneumon Coqueberti Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 523 n. 3, ♀ ♂.
corax Berth. — ♀ — Afr.: Algeria.
Ichneumon corax Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 542 n. 23, ♀.
var. **dorsoniger** Berth. — ♀ ♂ — Eur. [p. 524, ♀ ♂.
Ichneumon Coqueberti var. dorsoniger Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894
corculatorius Vill.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon corculatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 158 n. 70; T. 8 F. 3.
Ichneumon corculatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 175 n. 54.
Ichneumon corculatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 950 n. 102.
cordatus Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Ichneumon cordatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 146 n. 20, ♂.
Ichneumon cordatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 153 n. 51, ♂.
cordiger Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Ichneumon cordiger Kriechbaumer, Termész. Füzet. VI. 1882 p. 145 n. 5, ♀ ♂.
Ichneumon cordiger Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 242 n. 24, ♀ ♂.
corfitzii Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon Corfitzi Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1530 n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon Corfitzi Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 610 n. 72, ♀ ♂.
cornicula Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Italia, Dalmatia. [n. 3, ♀.
Ichneumon cornicula Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 368 (Misc. p. 10)
Ichneumon cornicula Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 386 (Ot. p. 35) n. 34, ♀ ♂.
Ichneumon cornicula Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 11, ♂.
Ichneumon cornicula Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 379 n. 31, ♀ ♂.
Ichneumon (Melanichneumon) cornicula Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2080.
Ichneumon cornicula Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 560 n. 10, ♀ ♂.
corruptor Oliv.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon corruptor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 180 n. 78.
Ichneumon corruptor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 908 n. 46, ♀.

---

[1]) *Lep.*: Callimorpha dominula (Boie), Melanippe luctuata (Bridgman).

corruscator Schrank![1]) — ♀ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon corruscator Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 268 n. 2065, ♀.
Ichneumon corruscator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 974 n. 131, ♀.
corruscator L.[2]) — ♀ ♂ — Eur. centr & mer.
Ichneumon corruscator Linné, Syst. nat. Ed. 10a I. 1758 p. 402 n. 1606.
Ichneumon corruscator Linné, Fauna Suec. Ed. 2a 1761 p. 563 n. 29.
Ichneumon corruscator Linné, Syst. nat. Ed. 12a I. 2. 1767 p. 934 n. 31.
? Ichneumon corruscator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 336 n. 49.
Ichneumon corruscator Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 851 n. 31.
Ichneumon ambulator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 157 n. 1825.
? Ichneumon corruscator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 430 n. 59.
? Ichneumon corruscator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 265 n. 71.
Ichneumon corruscator Villers, C. Linnaei Entom. 1789 p. 166 n. 97.
Ichneumon corruscator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2690 n. 31.
Ichneumon corruscator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 43 n. 764.
Ichneumon corruscator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 366.
Ichneumon corruscator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 185 n. 108.
? Ichneumon corruscator Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 161 n. 115.
? Ichneumon corruscator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 59 n. 51.
? Ichneumon corruscator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 66 n. 66.
Ichneumon corruscator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 66 n. 764.
Ichneumon corruscator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♂.
? Ichneumon corruscator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p 273.
? Ichneumon corruscator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 343.
? Ichneumon corruscator Trentepol, Isis 1826 p. 66 n. 5, ♂.
Ichneumon corruscator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 133 n. 14, ♂.
Ichneumon corruscator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 973 n. 130.
Ichneumon corruscator Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 9 n. 8.
Ichneumon corruscator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 133 n. 18.
Ichneumon corruscator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 71 [n. 68, ♀ ♂.
Ichneumon corruscator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 54 n. 5, ♂.
Ichneumon corruscator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 170 (Mant. p. 37), [♀ ♂.
Ichneumon binotatus Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 23 n. 127, ♂.
Ichneumon corruscator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 242 n. 14, ♂.
Ichneumon corruscator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 398 [n. 104, ♀ ♂.
Ichneumon corruscator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 102 (♂), 213 (♀) & [215 (♂) n. 75.
Ichneumon binotatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 215 n. 112, ♂.
Ichneumon Pyrenaeus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLIII. 1882 p. 478 n. 7, ♂.
Ichneumon corruscator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 265 n. 66, ♀ ♂.
var. **alacer** Grav. — ♂ — Eur.
Ichneumon alacer Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 533 n. 221, ♂.
Ichneumon corruscator var. alacer Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem. [p. 64 n. 221.
Ichneumon corruscator var. alacer Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 266. ♂.
var. **luridus** Grav. — ♂ — Eur.
Ichneumon luridus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 406 n. 159, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Bracon esse videtur (Gravenhorst).
[2]) *Lep.:* Agriopis aprilina (Gravenhorst), Noctua rustica (Hartlieb).

Ichneumon luridus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 180 n. 144.
Ichneumon corruscator var. luridus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 266, ♂.

corsus Kriechb. — ♀ — Eur.: Corsica.
Ichneumon Corsus Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 23, ♀.
Ichneumon Corsus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 663 n. 179, ♀.

corvinipennis Berth. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Ichneumon corvinipennis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 393, ♀ ♂.

corvinus Cress. — ♀ — Am.: Canada, New Hampshire.
Ichneumon corvinus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 145 n. 16, ♀.
Ichneumon corvinus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 321 n. 69, ♀.
Ichneumon corvinus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 761 n. 69, ♀.

costaricensis Cam. — Am.: Costa Rica.
Ichneumon Costaricensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 34. 1884 Hymen. I. p. 138 n. 3; T. 7 [F. 3.

costator Thunbg.! — Afr.: Cap.
Ichneumon costator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 260.
Ichneumon costator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 309.

cothurnatus Schrk.! — ♀ ♂ — Eur. centr.
Ichneumon cothurnatus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 355 n. 716, ♂.
Ichneumon cothurnatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 163 n. 86.
Ichneumon cothurnatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2687 n. 123.
Ichneumon cothurnatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 220 n. 85.
Ichneumon cothurnatus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 290 n. 2103, ♀.
Ichneumon cothurnatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 911 n. 50, ♂.

crassator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon crassator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon crassator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 302.

crassifemur Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon crassifemur Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 18 n. 18, ♀ ♂.
Ichneumon crassifemur Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 639 n. 128, ♀ ♂.
Ichneumon crassifemur Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1917 n. 7.

crassigena Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon crassigena Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 152 n. 27, ♀.
Ichneumon crassigena Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 646 n. 142, ♀.

crassipes Fourcr.! — Eur.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 329 n. 18.
Ichneumon crassipes Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 399 n. 18.
Ichneumon crassipes Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 188 n. 168.
Ichneumon grossipes Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 207 n. 8.
Ichneumon grossipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 984 n. 142.

crassitarsis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
? Ichneumon insidiosus Kriechbaumer, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 122-129, ♂ [non Wesmael].
Ichneumon crassitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1925 n. 30, ♀ ♂.
Ichneumon crassitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2394 n. 30.

crassiusculus Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Ichneumon crassiusculus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 497 n. 29, ♀.

crassorius Desv. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Ichneumon crassorius Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 10, ♀ ♂.
Ichneumon crassorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 214 n. 206, ♀ ♂.

crassus Bechst. & Scharf.! — Eur.
Ichneumon crassus Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 965 [n. 20ᵇ.

creditor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon creditor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 270.
Ichneumon creditor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 335.
crenatus Berth. — ♂ — As.: Caucasus.
Ichneumon crenatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 571 n. 84, ♂.
creperus Cress. — ♂ — Am.: Canada, Virginia.
Ichneumon creperus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 298, ♂.
Ichneumon creperus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 167 n. 104, ♂.
Ichneumon creperus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 354 n. 40, ♂.
Ichneumon creperus Provancher, Faun. entom. Canad. Hymén. 1883 p. 280 n. 40, ♂.
cretatus Grav. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Ichneumon cretatus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 329 n. 68, ♀ ♂.
Ichneumon cretatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 451 n. 181, ♀ ♂.
Ichneumon albifrons Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 144 n. 49, ♂.
Ichneumon vexator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 27 n. 12, ♀.
Ichneumon cretatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 146 (Mant. p. 13), ♀ ♂.
Ichneumon vexator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 146 (Mant. p. 13), ♀.
Ichneumon cretatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 376 n. 18, ♀ ♂.
Ichneumon cretatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 38, ♀.
Ichneumon albifrons Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 104 n. 110, ♂.
Ichneumon cretatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 554 n. 47, ♀ ♂.
cribrator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon cribrator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 264.
Ichneumon cribrator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 318.
cribricollis Spin. — ♂ — Am.: Chile.
Ichneumon cribricollis Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 490 n. 21, ♂.
crispatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia. [citat.].
Ichneumon crispatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252 [excl.
Ichneumon crispatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 287.
Ichneumon crispatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 899 n. 32b.
criticus Tischb. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon criticus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 175 n. 15, ♂.
Ichneumon repetitor var. criticus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 647, ♂.
croceatorius Vill.! — Eur.
Ichneumon croceatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 143 n. 28 [excl. cit.].
Ichneumon croceatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 964 n. 120.
croceipes Wesm. — ♀ ♂ — Eur. centr. [p. 46, ♀.
Ichneumon insidiosus var. 1 Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.)
Ichneumon defensorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 59 [n. 53, ♂ [non Gravenhorst].
Ichneumon croceipes Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 161 (Mant. p. 28 [n. 53, ♂.
Ichneumon erythromerus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 370 (Ot. p. 19) n. 17, ♀.
Ichneumon croceipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 7, ♂.
Ichneumon croceipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 391 n. 81.
Ichneumon croceipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 40, ♂.
Ichneumon examinator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 26 n. 10, ♀.
Ichneumon croceipes Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 292 n. 50.
Ichneumon croceipes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 612 n. 77, ♀ ♂.
cruciator Vill.! — Eur.
Ichneumon cruciator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 197 n. 205.

Ichneumon cruciator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 218 n. 72.
Ichneumon cruciator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1026 n. 221, ♀ ♂.

crudosus Cress. — ♂ — Am.: California.
Ichneumon crudosus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 175 n. 148.
Ichneumon crudosus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 351, ♂.

cruentatus Christ! — Eur.
Ichneumon cruentatus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 355; T. 36 F. 4.
Ichneumon cruentatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 912 n. 51.

cryptorius Zett. — ♂ — Eur.: Lapponia.
Ichneumon cryptorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 365 n. 32, ♂.

cubensis Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Ichneumon Cubensis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 13, ♀.

cubicularis Desv. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Ichneumon cubicularis (Curtis) Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 15 n. 100, ♀ ♂.
Ichneumon cubicularis Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 182 n. 118, ♀ ♂.

cubitorius Thunbg.! — Eur.
Ichneumon cubitorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p 280.
Ichneumon cubitorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 365.

culminator Thunbg. — Eur.
Ichneumon culminator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258.
Ichneumon culminator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 301.

culpator Schrk.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 341 n. 47.
Ichneumon alni Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 409 n. 48.
Ichneumon culpator Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 277 n. 2077, ♀.
Ichneumon spectator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 257 n. 3738.
Ichneumon culpator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 350 n. 92, ♀.
Ichneumon culpator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 548 n. 227, ♀.
Ichneumon alni Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 912 n. 52.
Ichneumon culpator Gravenhorst, Beitr. z. Entom. Schles. I. 1829 p. 6 n. 3, ♀; T. 1 F. 5.
Ichneumon culpator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 196 n. 187, ♀.
Ichneumon culpator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 82 [n. 82, ♀ ♂.
Ichneumon culpator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 173 (Mant. p. 40), ♀ ♂.
Ichneumon culpator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 35 n. 22, ♀ ♂.
Ichneumon culpator Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 26 n. 144, ♀ ♂.
Ichneumon culpator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 11, ♀ ♂.
Ichneumon culpator Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 44 n. 25, ♀ ♂.
Ichneumon culpator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 402 n. 123, ♀.
Ichneumon culpator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 42.
Ichneumon culpator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 213 n. 23, ♀ ♂.
Ichneumon (Stenichneumon) culpator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1985 n. 1.
Ichneumon culpator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 566 n. 75, ♀ ♂.
Ichneumon culpator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 66 n. 5.

var. **ater** Berth. — ♀ ♂ — Eur.
Ichneumon culpator var. ater Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 566, ♀ ♂.

var. **fumigator** (Grav.) Berth. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon agilis Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 369; T. 39 F. 4. [[excl. ♀].
Ichneumon fumigator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 347 n. 89, ♂

---

[1]) *Lep.:* Melitaea athalia (Taschenberg), Setina aurita (Giraud), Trichiura crataegi (Rondani).

Ichneumon fumigator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 537 n. 223, ♂ [excl. ♀].
? Ichneumon agilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1034 n. 232.
Ichneumon fumigator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 195 n. 18.
Ichneumon fumigator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 412 n. 61, ♀♂.
Amblyteles fumigator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 204, ♂.
Ichneumon culpator var. fumigator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 566, ♂.

cultratus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 61 n. 204.
Ichneumon cultratus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2699 n. 272.
Ichneumon cultratus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1006 n. 187.

cunctator Müll.! — Eur.
Ichneumon cunctator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 158 n. 1834.
Ichneumon cunctator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1078 n. 314.

cupido D. T. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon cupidus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 115 n. 16, ♀ ♂
Ichneumon cupido m. [[nec Kawall].

cupidus Kaw. — ♀ — Eur.: Russia.
Ichneumon cupidus Kawall, Bull. soc. natural. Moscou XLI. P. 4. 1868 p. 508 n. 6, ♀.

cupitus Cress. — ♂ — Am.: California.
Ichneumon cupitus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 175 n. 146, ♂.
Ichneumon cupitus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 350, ♂.

curator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon curator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
Ichneumon curator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 298.

curiatus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon curiatus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 112 n. 7, ♀ ♂.

cursor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon cursor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
Ichneumon cursor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 298.

cursorius Zett.! — ♀ — Eur.: Lapponia.
Ichneumon cursorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 365 n. 31, ♀.

cursorius Smith — ♀ ♂ — As.: Japonia.
Ichneumon cursorius Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 388 n. 4, ♀ ♂.

curtatus Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 349 n. 62.
Ichneumon curtatus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 415 n. 63.

curtituberculatus Cam. — Am.: Mexico. [n. 36; T. 7 F. 11.
Ichneumon curtituberculatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 153

curtorius Thunbg.! — Eur.: Fennia.
Ichneumon curtorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 280.
Ichneumon curtorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 364.

curtulus Kriechb. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Ichneumon curtulus Kriechbaumer, Termész. Füzet. VI. 1882 p. 144 n. 2, ♀.
Ichneumon curtulus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 614 n. 81, ♀.

curtus Schrk.! — ♀ — Eur.
Ichneumon curtus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 163 n. 87.
Ichneumon curtus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2688 n. 124.
Ichneumon curtus Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 42 p. 761.
Ichneumon curtor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 180 n. 80.
Ichneumon curtus Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 64 n. 761.
Ichneumon curtus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 917 n. 60, ♀.

curvus Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon curvus O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 159 n. 1850.
cyanator Thunbg.! — Afr.: Cap.
Ichneumon cyanator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 272.
Ichneumon cyanator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 341.
cyaneiventris Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota. [nec Linné].
Ichneumon sugillatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 437 n. 172, ♂ [excl. ♀,
Ichneumon sugillatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 185 n. 156, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon sugillatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 28 [n. 14, ♀ ♂ [excl. varr.].
Ichneumon cyaniventris Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 58, ♀ ♂.
Ichneumon cyaniventris Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 17 n. 6, ♀ ♂.
Ichneumon cyaniventris Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 376 n. 20, ♀ ♂.
Ichneumon cyaniventris Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 214 n. 7, ♀ ♂.
Ichneumon (Coelichneumon) cyaniventris Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1903 n. 5.
Ichneumon cyaniventris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 527 n. 6, ♀ ♂.
cylindricus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 62 n. 222.
Ichneumon cylindricus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2700 n. 286.
Ichneumon cylindricus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1056 n. 273.
cynthiae Kriechb.[2]) — ♀ — Eur.: Tirolia.
Ichneumon Cynthiae Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 24, ♀.
Ichneumon Cynthiae Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 593 n. 41, ♀.
dakota Cress. — ♂ — Am.: Dakota Terr.
Ichneumon Dakota Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 302, ♂.
Ichneumon Dakota Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 161 n. 80, ♂.
deauratus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 65 n. 263.
Ichneumon deauratus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2704 n. 318.
Ichneumon deauratus Gravenhorst, Ichneumon. Europ. III. 1829 p. 1037 n. 237.
debitor Thunbg. — Eur.: Suecia.
Ichneumon debitor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 269.
Ichneumon debitor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 333.
decemmaculatus Cam. — ♂ — Am.: Panama.
Ichneumon decemmaculatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 34. 1884 Hymen. I. p. 143 n. 12, ♂.
deceptorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon deceptorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon deceptorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 286.
deceptus Smith — ♀ — Austr.: New Zealand.
Ichneumon deceptus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 477, ♀.
Ichneumon deceptus Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1882 p. 121, ♀.
decipiens Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon decipiens Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 69 n. 38, ♂ [excl. ♀].
? Ichneumon caedator Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 22 n. 31, ♂? [excl. ♀?].
Ichneumon decipiens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 656 n. 163, ♂.
declinans Kriechb. — ♀ ♂ — Patria?
Ichneumon declinans Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII. 1897 p. 120, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Odontopera bidentata (Bignell).
2) *Lep.:* Melitaea Cynthia (Rogenhofer).

decorator Vill.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon decorator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 195 n. 195.
Ichneumon decorator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 341.
Ichneumon decorator Olivier, Encycl. méthod. Insect VII. 1792 p. 217 n. 62.
Ichneumon decorator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1065 n. 290.
decoratus Prov. — ♂ — Am.: Canada, Massachusetts.
Ichneumon decoratus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 83.
Ichneumon decoratus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 171 n. 123, ♂.
Ichneumon decoratus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 356 n. 45, ♂.
Ichneumon decoratus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 282 n. 45, ♂.
decorius Thunbg.! — Eur.
Ichneumon decorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 276.
Ichneumon decorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 350.
decorosus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon decorosus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 8 n. 11, ♂.
decrescens Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon decrescens Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 13 n. 4, ♀ ♂.
Ichneumon (Coelichneumon) decrescens Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1903 n. 4.
Ichneumon decrescens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 528 n. 8, ♀ ♂.
decurtatus Wesm. — ♀ — Eur. centr.
Ichneumon decurtatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 54 [n. 47, ♀.
Ichneumon decurtatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 388 n. 68, ♀.
Ichneumon decurtatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 655 n. 161, ♀.
Ichneumon decurtatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 357.
defraudator Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Belgia, Gallia, Germania, Hungaria.
Ichneumon sedulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 492 n. 204, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon defraudator (Knoch) Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 494, ♀.
Ichneumon sedulus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 191 n. 175, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon defraudator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 78 [n. 77, ♀ ♂.
Ichneumon sedulus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 407 n. 55, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon defraudator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 11, ♀.
Ichneumon defraudator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 402 [n. 118, ♀ ♂.
Ichneumon defraudator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 42, ♀.
? Ichneumon sedulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 44, ♂.
Ichneumon defraudator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 211 n. 101, ♀ ♂.
Ichneumon defraudator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 566 n. 23, ♀ ♂.
degeeri Bechst. & Scharfenbg.! — Eur.: Germania.
Ichneumon Degeeri Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 956 [n. 3.
degeeri Grav.![1]) — Eur.
—— Degeer, Mém. hist. Insect. I. 1752 p. 332; T. 23 F. 10.
—— Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. I. 1778 p. 580; T. 23 F. 10.
Ichneumon Degeeri Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 894 n. 27.
delicator Thunbg.! — Am.
Ichneumon delicator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon delicator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 307.
delicatus Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Ichneumon delicatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 253 n. 19, ♂.
Ichneumon delicatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 167 n. 107, ♂.

[1]) *Lep.:* Bombyx vinulae (Gravenhorst).

delictor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon delictor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon delictor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 319.
deliratorius L.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon deliratorius Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 562 n. 20.
Ichneumon molitorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 399 n. 1587, ♀ [p. p.].
Ichneumon deliratorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 401 n. 1597.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 344 n. 53.
Ichneumon deliratorius Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 932 n. 20.
Ichneumon deliratorius Fabricius, Syst. Entom. 1775 p. 332 n. 27.
Ichneumon deliratorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 848 n. 20.
Ichneumon deliratorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 153 n. 1781.
Ichneumon alternatus Schrank, Beitr. z. Naturg. 1776 p. 87 n. 49.
Ichneumon deliratorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 425 n. 28.
Ichneumon deliratorius Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 350 n. 706, ♂.
Ichneumon deliratorius Schrank, Neu. Magaz. Liebh. Entom. I. P. 3. 1782 p. 292 n. 706.
Ichneumon palmarius Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 411 n. 54.
Ichneumon deliratorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 262 n. 35.
Ichneumon deliratorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 147 n. 38.
Ichneumon deliratorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2682 n. 20.
Ichneumon deliratorius Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 40 n. 753.
Ichneumon deliratorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 344.
Ichneumon deliratorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 174 n. 51.
Ichneumon inflictorius Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 111 n. 245.
Ichneumon deliratorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 148 n. 58.
Ichneumon molitorius Panzer, Faun. Insect. German. II. 1794 P. 19 T. 6.
Ichneumon deliratorius Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 159 n. 488.
Ichneumon molitorius Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 273 n. 2072, ♀ ♂.
Ichneumon deliratorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 55 n. 31.
Ichneumon deliratorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 64 n. 51.
Ichneumon deliratorius Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 187 n. 34.
Ichneumon molitorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 60.
Ichneumon molitorius Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 255 n. 3725-26.
Ichneumon deliratorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 61 n. 753.
Ichneumon deliratorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 283.
Ichneumon deliratorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 291 n. 19, ♂.
Ichneumon deliratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279 & 280.
Ichneumon deliratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 363.
Ichneumon molitorius Trentepol, Revis. crit. gen. Ichneum. 1825 p. 18 n. 3.
Ichneumon molitorius Trentepol, Isis 1826 p. 64 n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon multiannulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 223 n. 69, ♂.
Ichneumon molitorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 258 n. 87, ♀ ♂.
Ichneumon alternatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 929 n. 77.
Ichneumon multiannulatus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 16 n. 38.
Ichneumon deliratorius Trentepol, Isis 1829 p. 808 n. 2, ♀ ♂.
Ichneumon deliratorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 150 n. 67.
Ichneumon multiannulatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 151 n. 68.
Ichneumon cingulipes Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 157 n. 84.
Ichneumon deliratorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 359 n. 6, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Dicranura vinula (Marshall), Smerinthus populi, Mamestra oleracea (Mocsáry)

Ichneumon deliratorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 303 n. 8. [n. 28, ♀ ♂.
Ichneumon deliratorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 37
Ichneumon multiannulatus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 49 n. 28, ♀ ♂.
Ichneumon deliratorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 302 n. 68, ♀ ♂.
Ichneumon multiannulatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 303 [n. 69, ♂.
Ichneumon deliratorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 381 [n. 38, ♀ ♂.
Ichneumon multiannulatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 103 n. 27, ♀ ♂.
Ichneumon cingulipes Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 104 n. 116, ♀ ♂.
Ichneumon deliratorius Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 37 n. 43.
Ichneumon deliratorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1914 n. 2.
Ichneumon deliratorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 637 n. 125, ♀ ♂.

delphinus Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon delphinus Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 39 n. 7, ♀.
Ichneumon delphinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 279 n. 89, ♀.

democraticus Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [n. 65, ♀; T. 8 F. 10.
Ichneumon democraticus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymén. I. p. 167

dentatus Smith — ♀ — As.: Japonia.
Ichneumon dentatus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 391 n 12, ♀.

denticulator Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon denticulator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 158 n. 1841.

denticulator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon denticulator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 274.
Ichneumon denticulator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 346.

depressator Vill.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon depressator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 196 n. 199.
Ichneumon depressator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 218 n. 66.

depressorius Thunbg.! — Eur.: Suecia, Fennia.
Ichneumon depressorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 280.
Ichneumon depressorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 364.

depressus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 60 n. 180 & p. 66 n. 287.
Ichneumon depressus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2687 n. 253 & p. 2706 n. 339.
Ichneumon depressus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1039 n. 242.

derasus Wesm. — ♀ ♂ — Eur. bor., centr. & or.
Ichneumon comitator var. stigm. rufo Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 108, ♀.
Ichneumon derasus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 31 [n. 19, ♀ ♂.
Ichneumon derasus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 5, ♀.
Ichneumon derasus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 333 n. 17, ♀ ♂.
Ichneumon derasus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 377 n. 26, ♀ ♂.
Amblyteles carbonator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 294 n. 359, ♂.
Ichneumon derasus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 38, ♀ ♂.
Ichneumon derasus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 101 n. 18, ♀ ♂.
Ichneumon derasus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 57, ♂.
Ichneumon (Coelichneumon) derasus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1906 n. 12.
Amblyteles carbonator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 165 n. 6, ♂.
Ichneumon derasus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 555 n. 49, ♀ ♂.

var. **percussor** Tischb. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon percussor Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 274 n. 2, ♀.

Ichneumon percussor Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 21 n. 2, ♂.
Ichneumon derasus var. percussor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 555, ♀.
derogator Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Gallia, Belgia, Germania.
? Ichneumon albinotatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 507 n. 211, ♂.
? Ichneumon incubitor Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 617 n. 265, ♀ ♂.
Ichneumon derogator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 93 [n. 97, ♀ ♂.
Ichneumon derogator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 178 (Mant. p. 45), ♀ ♂.
Ichneumon derogator Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 186 n. 111, ♂.
Ichneumon derogator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 203, ♀.
Ichneumon derogator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 407 [n. 142, ♀ ♂.
Ichneumon derogator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 44, ♀ ♂.
Ichneumon derogator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 183 (♀) & 212 (♂) n. 96.
Ichneumon derogator Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 110 n. 98, ♀ ♂.
Ichneumon (Barichneumon) derogator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1962 n. 10.
Ichneumon derogator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 247 n. 34, ♀ ♂.
desjardinii Brullé — ♂ — Afr.: Bourbon.
Ichneumon Desjardinii Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 308 n. 15, ♂.
desinatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon desinatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 254.
Ichneumon desinatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 290.
desultorius Wesm. — ♂ — Eur. centr.
Ichneumon fuscipes var. 2 Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 23 [n. 7, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon desultorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 142 (Mant. p. 9) [n. 7b, ♂.
Ichneumon desultorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 538 n. 14, ♂.
detestator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon detestator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 269.
Ichneumon detestator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 332.
deustor Thunbg.! — Afr.: Algeria.
Ichneumon deustor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258.
Ichneumon deustor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 305.
deustus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 62 n. 224.
Ichneumon deustus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2701 n. 288.
Ichneumon deustus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 996 n. 165.
devastator Schrank! — Eur. centr.
Ichneumon devastator Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 367 n. 741, ♀.
Ichneumon devastator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2697 n. 172.
Ichneumon devastator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 222 n. 94.
Ichneumon devastator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1017 n. 208.
devinctor Say — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon devinctor Say, Amer. Entom. II. 1825 p. 48; T. 22 F. 2.
Ichneumon devinctor Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 230 n. 9.
Ichneumon devinctor Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 48; T. 22 F. 2.
Ichneumon devinctor Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 687 n. 9.
Ichneumon tibialis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 301 n. 2, ♀.
Ichneumon montivagus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 255 n. 25, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Macaria liturata (Ratzeburg), Trachea piniperda (Boie).

Ichneumon devinctor Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 174 n. 139, ♀ ♂.
Ichneumon devinctor Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 360 n. 54, ♀ ♂.
Ichneumon devinctor Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 286 n. 54, ♀ ♂.

dictator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon dictator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 269.
Ichneumon dictator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 333.

dictiosus Cress. — ♂ — Am.: Kansas.
Ichneumon dictiosus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 164 n. 95, ♂.

didymator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon didymator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon didymator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 321.

didymus Grav. — ♀ (♂?) — Eur. bor. & centr.
Ichneumon didymus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 265 n. 87b, ♀.
? Ichneumon bisignatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 410 n. 161b, ♂.
? Ichneumon bisignatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 181 n. 147, ♂.
Ichneumon didymus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 32 n. 87b, ♀.
? Ichneumon bisignatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 49 n. 161b, ♂.
? Ichneumon bisignatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 381 n. 40, ♀ ♂.
Ichneumon didymus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 387 n. 66, ♀.
Ichneumon didymus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 430 n. 110, ♀.
? Ichneumon bisignatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 431 n. 111, ♀ ♂.
? Ichneumon bisignatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 289 n. 21, ♂.
? Ichneumon bisignatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 215 n. 41, ♂.
Ichneumon didymus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 594 n. 44, ♀.
? Ichneumon bisignatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 629 n. 113, ♂.

difficilis Cress. — ♂ — Am.: California, Vancouvers Island.
Ichneumon difficilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 176 n. 150, ♂.
Ichneumon difficilis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 351, ♂.

digestor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon digestor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 267.
Ichneumon digestor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 328.

digitator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon digitator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
Ichneumon digitator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 298.

digrammus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Gallia, Germania, Italia.
Ichneumon digrammus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 288 n. 14, ♂.
Ichneumon digrammus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 179 n. 43, ♂.
Ichneumon digrammus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 11 n. 12.
? Ichneumon albosignatus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 182 n. 109, ♀ ♂ [nec auct.].
Ichneumon digrammus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 273 n. 43, ♂.
Ichneumon digrammus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p. 13, ♂.
? Ichneumon nudicoxa Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 107 n. 89, ♀ ♂.
Ichneumon nudicoxis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 237 n. 15, ♀ ♂.

dilatator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon dilatator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon dilatator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 338.

dilatatorius Thunbg.! — Eur.: Germania.
Ichneumon dilatatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 289.
Ichneumon dilatatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 360.

dilector Thunbg.! — Eur.
Ichneumon dilector Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273.
Ichneumon dilector Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 337.
dilucidus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon dilucidus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 112 n. 8, ♀ ♂.
Ichneumon dilucidus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 35. 1885 Hymen. I. p. 145 n. 20.
dimidiator Fabr.! — Eur.: Germania.
Ichneumon dimidiator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 427 n. 43.
Ichneumon dimidiator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 264 n. 51.
Ichneumon dimidiator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 162 n. 83.
Ichneumon dimidiator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2686 n. 117.
Ichneumon dimidiator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 179 n. 73.
Ichneumon dimidiator Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 153 n. 82.
Ichneumon dimidiator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 66 n. 62.
Ichneumon dimidiator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258.
Ichneumon dimidiator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 306.
Ichneumon dimidiator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 909 n. 48.
dimidiatus Steph.! — ♀ — Eur.: Britannia. [F. 4.
Ichneumon dimidiatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 173 n. 127; T. 39
Ichneumon dimidiatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 216 n. 120, ♀.
dipsacanae Schrk.![1] — Eur.: Bavaria.
Ichneumon dipsacanae Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 302 n. 2130, ♂.
Ichneumon dipsacanae Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 974 n. 132.
dipsaci Schrk.! — Eur.: Bavaria.
Ichneumon dipsaci Schrank, Fauna Boica II. 1. 1802 p. 308 n. 2149.
director Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon director Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 270.
Ichneumon director Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 335.
discoensis Fox — Am.: (Groenlandia), Disco Ins.
Ichneumon Discoensis Fox, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1892 p. 134.
discolor Thunbg.! — Am.: Guiana.
Ichneumon discolor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 261.
Ichneumon discolor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 311.
discolor Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 60 n. 184.
Ichneumon discolor Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2688 n. 256.
Ichneumon discolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 903 n. 38.
discors Berth. — ♀ — Afr.: Marocco.
Ichneumon discors Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1899 p. 135 n. 48, ♀.
discretus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 68 n. 317.
Ichneumon discretus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2717 n. 363.
Ichneumon discretus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1057 n. 275.
discriminator Wesm.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Gallia, Hispania.
Ichneumon luctatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 411 n. 162, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon discriminator Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 51 [n. 162, ♀.
Ichneumon discriminator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 390 n. 75, ♀.

---

1) *Lep.:* Tortrix dipsacana (Schrank).
2) *Lep.:* Vanessa urticae (Kriechbaumer).

Ichneumon discriminator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 278 n. 6, ♀.
Ichneumon discriminator Kriechbaumer, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 209-213 n. 2, ♂.
Ichneumon discriminator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 624 n. 101, ♀♂.

discus Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Ichneumon discus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 168 n. 48, ♂.
Ichneumon discus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 176 n. 152, ♂.

dispar Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon dispar Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
Ichneumon dispar Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 297.

disparilis Cress. — ♀ — Am.: Connecticut.
Ichneumon disparilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 307, ♀.
Ichneumon disparilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 183 n. 188, ♀.

disparis (Poda) Berth.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Sphex disparis Poda, Insect. mus. Graec. 1761 p. 107 n. 3.
Sphex crassicornis Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 291 n. 769; T. 41 F. 769.
Ichneumon XVI Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1766; T. 20 F. 14.
Ichneumon LXXI Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768; T. 135 F. 4.
Ichneumon ferrugineus Schrank, Beitr. z. Naturg. 1776 p. 88 n. 52.
Ichneumon XCII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. III. 1779; T. 244 F. 5.
Ichneumon ferrugineus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 345 n. 697, ♂.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 59 n. 175.
Ichneumon ferrugineus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 141 n. 20; T. 8 F. 1.
Ichneumon ferrugineus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2678 n. 89.
Ichneumon flavipes Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2687 n. 247.
Ichneumon ictericus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 341; T. 34 F. 2.
Ichneumon ferrugineus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 219 n. 79.
Ichneumon flavatorius Fabricius, Entom. system. IV. 1794 p. 456 n. 54-55.
Ichneumon flavatorius Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 220 n. 54-55.
Ichneumon flavatorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 78 T. 12, ♂.
Ichneumon ferrugineus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 280 n. 2082.
Ichneumon culpatorius Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 280 n. 2083, ♂.
Ichneumon sociatorius Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 199.
Ichneumon flavatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 63 n. 46.
Ichneumon flavatorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 66, ♂.
Ichneumon flavatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♂.
Ichneumon flavatorius Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 P. 100 T. 12, ♀.
Ichneumon flavatorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284.
Ichneumon flavatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 330 n. 70, ♀♂.
Ichneumon fulvatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 276.
Ichneumon fulvatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 351.
Ichneumon flavatorius Trentepol, Isis 1826 p. 220 n. 37.
Trogus flavatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 382 n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon flavator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2a IV. 1835 p. 350 n. 10.
Trogus flavatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 271 n. 5.
Trogus flavatorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 310 n. 2.
Ichneumon (Trogus) flavatorius Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 27 n. 25; T. 6 F. 14.
Trogus flavatorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 130 n. 2, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Ocneria dispar (Poda et auct.), Smerinthus tiliae (Stephens), Liparis salicis (Boie), L. monacha (Ratzeburg, Kawall).

Ichneumon flavatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 88
Trogus flavatorius Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 91 n. 16. [n. 91, ♀ ♂.
Ichneumon flavatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 12, ♀ ♂.
Ichneumon flavatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 405 n. 133, ♀ ♂.
Ichneumon flavatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 43, ♀ ♂.
Ichneumon flavatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 216 n. 91, ♀ ♂.
Ichneumon disparis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 287 n. 114, ♀ ♂.

dissector Thunbg.! — As.: Japonia.
Ichneumon dissector Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 272.
Ichneumon dissector Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 341.

dissimilis Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia, Germania, Italia.
Ichneumon dissimilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 190 n. 47.
Ichneumon dissimilis Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 10 n. 11.
Ichneumon dissimilis Schummel, Übers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1834. 1835 [p. 91, ♀.
Ichneumon dissimilis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 144 n. 50.
Ichneumon jocularis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 165 (Mant. p. 32) [n. 71b, ♀.
Ichneumon zephyrus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 389 (Ot. p. 38) n. 39, ♂.
Ichneumon dissimilis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 21 n. 47, ♀.
Ichneumon punctifrons Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 141 n. 82, ♂.
Ichneumon jocularis Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 206, ♀. [& p. 312 n. 47b, ♀.
Ichneumon dissimilis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 279 n. 47, ♀ ♂.
Ichneumon dissimilis Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 86 n. 82, ♀ ♂.
Ichneumon punctifrons Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 101 n. 70, ♀ ♂.
Ichneumon dissimilis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 293 n. 51.
Ichneumon (Cratichneumon) dissimilis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1950 n. 13.
Ichneumon dissimilis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 273 n. 79, ♀ ♂.
Ichneumon dissimilis var. jocularis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 274, ♀.
Ichneumon dissimilis var. punctifrons Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 274, ♂.

dissimulator Tischb.[1]) — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon dissimulator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 172 n. 10, ♂.
Ichneumon dissimulator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 592 n. 39, ♂.

dissimulator (Steph.) Marsh.! — ♂ — Eur.: Britannia.
Trogus dissimulator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 272 n. 7, ♂.
Ichneumon dissimulator Marshall, Catal. Brit. Hymen. 1872 p 17 n. 121.
Ichneumon dissimulator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 215 n. 121, ♂.

dissonus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Hoplismenus dissonus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 23 n. 6, ♀.
Ichneumon dissonus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 127 n. 69.

distentor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon distentor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 274.
Ichneumon distentor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 347.

distichor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon distichor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon distichor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 337.

distinctor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon distinctor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon distinctor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 300.

---

[1]) *Lep.:* Nonagria paludicola (Tischbein).

divergens Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. bor., Germania.
Ichneumon divergens Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 93 n. 55, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon divergens Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1229 n. 10, ♂.
Ichneumon divergens Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1930 n. 46.
Ichneumon divergens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 622 n. 97, ♀.

diversicolor Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 71 n. 370.
Ichneumon diversicolor Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2722 n. 412.
Ichneumon diversicolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1071 n. 301.

diversipes Walk. — ♂ — As.: Japonia.
Ichneumon diversipes Walker, Cistula entom. I. P. 11. 1874 p. 302 n. 2, ♂.

diversor Wesm. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon diversor Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 371 (Misc. p. 13 [n. 6. ♀.
Ichneumon diversor Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 55 n. 31, ♀.
Ichneumon divergens Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 93 n. 55, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon diversor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 394 n. 93, ♀.
Ichneumon horridator var. Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 425 n. 82, ♂.
Ichneumon diversor Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 290 n. 24, ♂.
Ichneumon diversor Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 5 n. 42, ♀ ♂.
Ichneumon diversor Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1223 n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon diversor Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1915 n. 5.
Ichneumon diversor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 647 n. 145, ♀ ♂.

dolitarus Smith — ♂ — As.: Japonia.
Ichneumon doliturus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 388 n. 3, ♂.

dorsalis Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Ichneumon dorsalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 177 n. 62, ♀.
Ichneumon dorsalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 175 n. 143, ♀.

dorsator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon dorsator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 267.
Ichneumon dorsator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 326.

dorsosignatus Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Russia; As.: Transcaspia.
Ichneumon dorsosignatus (Eversmann) Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 564 n. 72, ♀ ♂.

drewsenii Ratzbg.! — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon Drewsenii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 135 n. 30, ♀ ♂.

dubitatus Desv. — ♀ — Eur.: Britannia.
Ichneumon dubitatus Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 20 n. 115, ♀.
Ichneumon dubitatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 179 n. 122, ♀.

ductor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon ductor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 269.
Ichneumon ductor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 332.

dumeticola Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon dumeticola Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 203 n. 56, ♂.
Ichneumon dumeticola Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 15 n. 31.
Ichneumon dumeticola Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 147 n. 58.
Phygadeuon piniperdae Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 260, ♀ ♂.
Ichneumon (Phygadeuon) piniperdae Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 28 n. 28; T. 6 F. 15.
Phygadeuon piniperdae Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 145 n. 3, ♀ ♂; T. 6 F. 15.
Ichneumon dumeticola Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 86 [n. 87, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Lithosia quadra (Giraud, Bellier), Trachea piniperda (Ratzeburg).

Ichneumon dumeticola Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 172 n. 42, ♀.
Ichneumon piniperdae Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 173 n. 43.
Ichneumon dumeticola Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 12, ♂.
Ichneumon dumeticola Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 169 n. 101, ♀ ♂.
Ichneumon dumeticola Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 203, ♂.
Ichneumon dumeticola Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 288 n. 56, ♂.
Ichneumon dumeticola Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 404 [n. 128, ♀ ♂.
Ichneumon dumeticola Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 43, ♂.
Ichneumon dumeticola Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 105 & 214 n. 85, ♀ ♂.
Ichneumon dumeticola Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 107 n. 86, ♀ ♂.
Ichneumon (Melanichneumon) dumeticola Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1957 n. 5.
Ichneumon dumeticola Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 235 n. 12, ♀ ♂.

duplicator Thunbg.! — Am.
Ichneumon duplicator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 272.
Ichneumon duplicator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 342.

duplicatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon duplicatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277.
Ichneumon duplicatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 352.

duplicatus Say — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon duplicatus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 230 n. 10, ♀ ♂.
Ichneumon duplicatus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 688 n. 10, ♀ ♂.
Ichneumon duplicatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 309, ♀ ♂.
Ichneumon lobatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 77.
Ichneumon duplicatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 180 n. 171, ♂.
Ichneumon duplicatus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 362 n. 61, ♂.
Ichneumon duplicatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 288 n. 61, ♂.

durus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon durus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 125 n. 56, ♂.

ebeninus Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon ebeninus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 284 n. 109, ♀.

eburnifrons Wesm. — ♂ — Eur. centr.
Ichneumon eburnifrons Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 367 (Ot. p. 16) n. 14, ♂.
Ichneumon eburnifrons Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 571 n. 83, ♂.

edictorius Schrk.! — ♂ — Eur.: Austria.
Ichneumon edictorius Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 352 n. 709, ♂.
Ichneumon molitorius var. g Schrank, Fauna Boica II. P. 2. 1802 p. 274 n. 2072.
Ichneumon edictorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 945 n. 99.

elegans Grav.! — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon elegans Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 571 n. 241, ♀.
Ichneumon elegans Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 68 n. 241.

elephas Brauns — ♀ — Eur.: Hungaria.
Ichneumon elephas Brauns, Termész. Füzet. XIX. 1896 p. 270 n. 1, ♀.
Ichneumon elephas Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 395, ♀.

elevator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon elevator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 266.
Ichneumon elevator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 323.

emancipatus Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon emancipatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 46 [n. 38, ♀.
Ichneumon emancipatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 152 (Mant. p. 19), ♀.
Ichneumon emancipatus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 98 n. 58, ♀ ♂ [p. p.].

Exephanes propinquus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 371 n. 3, ♀.
Ichneumon emancipatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 385 n. 55, ♀.
Ichneumon rugosus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 435 n. 130, ♂.
Ichneumon propinquus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 133 n. 242, ♂.
Ichneumon rugosus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 289 n. 20, ♂.
Ichneumon ramiformis Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 176 n. 17, ♂.
Ichneumon opacus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 176 n. 18, ♂.
Ichneumon hostificus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 179 n. 22, ♂.
Ichneumon emancipatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 7 n. 47, ♀ (♂).
Ichneumon emancipatus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1935 n. 50.
Ichneumon emancipatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France XLIII. 1894 p. 618 n. 88, ♀♂.

emarginatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon emarginatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 280.
Ichneumon emarginatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 363.

encaustus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon encaustus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 4 n. 4, ♀.

enervator L.! — Eur.
Ichneumon enervator Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 565 n. 43.
Ichneumon enervator Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 405 n. 1621.
Ichneumon enervator Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 936 n. 47.
Ichneumon enervator Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 855 n. 47.
Ichneumon opifex O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 155 n. 1795.
Ichneumon enervator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 171 n. 112.
Ichneumon enervator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2695 n. 47.
Ichneumon enervator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 374.
Ichneumon enervator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon enervator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 299.
Ichneumon enervator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 922 n. 69.

ensator Thunbg.! — Am. mer.
Ichneumon ensator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon ensator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 306.

ephippiatus D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon ephippium Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 47 n. 27, ♀ [non Smith].
Ichneumon ephippium Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 16 n. 13, ♀♂.
Ichneumon (Stenichneumon) ephippium Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1965 n. 4.
Ichneumon epiphium Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 567 n. 78, ♀♂
Ichneumon ephippiatus m. [[err. typogr.].

ephippium Smith — ♀ — As.: Celebes.
Ichneumon ephippium Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 59 n. 3, ♀.

epicus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon epicus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 121 n. 46, ♂.

erectorius Trent.! — Eur.
Ichneumon erectorius var. a Trentepol, Isis 1826 p. 218.
Ichneumon erectorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 940 n. 93ᵇ.

eremitatorius Zett. — ♀ ♂ — Eur. bor. & or.
Ichneumon deceptor var. 4 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 336 n. 126, ♀.
Ichneumon eremitatorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 364 n. 26, ♂.
Ichneumon stigmatorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 364 n. 27, ♀. [♀.
Ichneumon ignobilis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 374 (Misc. p. 16) n. 11,
Ichneumon dolosus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 404 (Misc. p. 46) n. 34, ♀.
Ichneumon dolosus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 379 (Ot. p. 28) n. 26, ♀.

Ichneumon stigmatorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 116 n. 68, ♀ ♂.
Ichneumon ignobilis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 393 n. 90, ♀.
Ichneumon dolosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 411 n. 160, ♀.
? Ichneumon perhiematus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 428 n. 93, ♀.
Ichneumon stigmatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 40, ♀.
Ichneumon stigmatorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1942 n. 75.
Ichneumon stigmatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 581 n. 16, ♀ ♂.
Ichneumon stigmatorius var. dolosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 582, ♀.
Ichneumon stigmatorius var. ignobilis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894

var. **pallidus** Berth. — ♂ — Eur. [p. 582, ♂.
Ichneumon stigmatorius var. pallidus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894

eros Cam. — Am.: Guatemala. [p. 582, ♂.
Ichneumon eros Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 35. 1885 Hymen. I. p. 149 n. 30; T. 7 F. 14.

erraticus Berth. — ♂ — Eur.: Gallia, Helvetia.
Ichneumon melanostigma var. ? Kriechbaumer, Termész. Füzet. VI. 1882 p. 144 n. 3, ♂.
Ichneumon erraticus Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 38 n. 5, ♂.
Ichneumon erraticus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 626 n. 105, ♂.

var. **nigriventris** Berth. — ♂ — Eur. [p. 626, ♂.
Ichneumon erraticus var. nigriventris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894

erythraeus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia, Germania, Austria, Italia.
Ichneumon erythraeus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 357 n. 164, ♀.
Ichneumon erythraeus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 632 n. 273, ♀.
Ichneumon erythraeus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 206 n. 220.
Ichneumon erythraeus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 80 n. 275, ♂.
Ichneumon erythraeus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 216 n. 107, ♀ ♂.
Ichneumon erythraeus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 229 n. 7, ♀ ♂.

var. **afer** Berth. — ♂ — Afr.: Algeria.
Ichneumon erythraeus var. afer Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 230, ♂.

var. **erythrogaster** Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 64 n. 259.
Ichneumon erythrogaster Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2704 n. 314.
Ichneumon lacteator var. erythrogaster Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 619.

erythrogaster Holmgr. — ♂ — Afr.: Cap.
Ichneumon erythrogaster Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 393 n. 5, ♂.

erythromelas Mac Lachl. — Am.: Hayes Sound.
Ichneumon erythromelas Mac Lachlan, Journ. Linn. Soc. Zool. XIV. 1877 p. 106.

erythrurus Spin. — ♂ — Eur.: Hispania.
Ichneumon erythrurus Spinola, Ann. soc. entom. France (2) I. 1843 p. 124 n. 2, ♂.

esurialis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Hoplismenus esurialis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 25 n. 11, ♀ ♂.
Ichneumon esurialis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 128 n. 76, ♀ ♂.

eumerus Wesm. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Ichneumon raptorius var. 6 Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 45.
Ichneumon eumerus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 374 (Ot. p. 23) n. 20, ♀.
Ichneumon eumerus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 385 n. 52, ♀.
Ichneumon eumerus Kriechbaumer, Entom. Nachr. VII. 1881 p. 117 n. 5, ♀ ♂.
Ichneumon eumerus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 616 n. 85, ♀ ♂.

eurycerus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon eurycerus Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1528 n. 2, ♀ ♂.
Ichneumon eurycerus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1923 n. 22.
Ichneumon eurycerus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 607 n. 66, ♀ ♂.

evanidus Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon evanidus Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 37 n. 3, ♀.
Ichneumon evanidus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 623 n. 96, ♀.
eversmannii Berth. — ♀ — Eur.: Russia.
Ichneumon Eversmanni Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 565 n. 73, ♀.
evonymi Gmel.! — Eur.: Russia.
Ichneumon spec. Lepechin, Tageb. Reise russ. Reich. I. 1774 p. 219; T. 17 F. 1-2.
Ichneumon evonymi Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2714 n. 209.
Ichneumon evonymi Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 959 n. 115.
excarptus Tosqu. — ♂ — Afr.: Scioa.
Ichneumon excarptus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 29 n. 13, ♂.
excuratus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon excuratus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 n. 119 n. 39, ♂.
exhilaratus Smith — ♂ — Austr.
Ichneumon exhilaratus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 477, ♂.
Ichneumon exhilaratus Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 121, ♂.
exilicornis Wesm. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr. [p. 45.
Ichneumon raptorius var. 4 Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.;
Ichneumon exilicornis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 375 (Ot. p. 24) n. 21, ♀.
Ichneumon exilicornis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 9 n. 52.
Ichneumon exilicornis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1232 n. 14, ♂.
Ichneumon exilicornis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1939 n. 68.
Ichneumon exilicornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 617 n. 86, ♀♂.
exlex Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon exlex O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 155 n. 1805.
Ichneumon exlex Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 915 n. 57.
exoticus Schrk.! — ♂ — Eur.
Ichneumon exoticus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 374 n. 756, ♂.
Ichneumon exoticus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1789 p. 2711 n. 193.
Ichneumon exoticus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 223 n. 103.
Ichneumon exoticus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1083 n. 322, ♂.
expansor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon expansor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 274.
Ichneumon expansor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 347.
expulsor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon expulsor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 263.
Ichneumon expulsor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 316.
exquisitor D. T. — ♂ — Afr.: Caffraria.
Ichneumon exquisitus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 15 n. 5, ♂ [nec Cresson].
Ichneumon exquisitor m.
exquisitus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon exquisitus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 12 n. 21, ♀ ♂.
Ichneumon exquisitus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 38. 1885 Hymen. I. p. 179 n. 130; T. 7
exsiccator Rossi! — Eur.: Italia. [F. 25.
Ichneumon exsiccator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 44 n. 765.
Ichneumon exsiccator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 214 n. 43.
Ichneumon exsiccator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 66 n. 765.
Ichneumon exsiccator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 985 n. 143.
exspectatorius Panz. — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon X Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. 1766; T. 20 F. 8.

Ichneumon exspectatorius Panzer, Nomencl. 1804 p. 29.
Ichneumon erythrogaster Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 188 n. 164, ♀.
Ichneumon exspectatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 211 n. 123, ♀.

extensor Latr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 359 n. 86.
Ichneumon extensor Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 423 n. 87.
Ichneumon extensor Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 60 n. 59 [excl. Synon.].
Ichneumon extensor Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 180 n. 7.
Ichneumon extensor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 980 n. 138b.

extensor Schrk.? — ♀ — Eur.: Austria.
? Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 359 n. 86.
? Ichneumon extensor Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 423 n. 87.
Ichneumon extensor Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 270 n. 2068, ♀.
Ichneumon extensor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 981 n. 139.

extensorius L.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Rajus, Hist. Insect. 1710 p. 253 n. 8.
—— Linné, Acta Upsal. 1736 p. 126 n. 23.
—— Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 980, ♀.
Ichneumon extensorius Linné, Syst. nat. Ed. 10a I. 1758 p. 561 n. 8, ♀.
Ichneumon luctatorius Linné, Syst. nat. Ed. 10a I. 1758 p. 561 n. 14, ♂.
? Sphex annularis Poda, Insect. mus. Graec. 1761 p. 107 n. 4.
Ichneumon extensorius Brünnich, Prodr. insectol. Siaelland. 1761 p. 17, ♀.
Ichneumon extensorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2a 1761 p. 398 n. 1581, ♀.
Ichneumon luctatorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2a 1761 p. 399 n. 1590, ♂.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 341 n. 49, p. 344 n. 52 & p. 347 n. 59.
Ichneumon extensorius Linné, Syst. nat. Ed. 12a I. 2. 1767 p. 930 n. 4, ♀.
Ichneumon luctatorius Linné, Syst. nat. Ed. 12a I. 2. 1767 p. 931 n. 13, ♂.
Ichneumon luctatorius Berkenhout, Outlin. Nat. Hist. Gr. Britain I. 1769 p. 164 n. 1, ♂.
Ichneumon extensorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 327 n. 4, ♀.
Ichneumon luctatorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 329 n. 15, ♂.
Ichneumon extensorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 845 n. 4, ♀.
Ichneumon luctatorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 847 n. 13, ♂.
Ichneumon extensorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 152 n. 1766, ♀.
Ichneumon luctatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 153 n. 1776, ♂.
Ichneumon XCIII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. III. 1779, ♂; T. 244 F. 6.
Ichneumon extensorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 421 n. 4, ♀.
Ichneumon luctatorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 423 n. 15, ♂.
Ichneumon raptorius Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 345 n. 696, ♂.
Ichneumon extensorius Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 346 n. 698, ♂.
Ichneumon raptorius Schrank, Neu. Magaz. Liebh. Entom. I. 3. 1782 p. 291 n. 696.
Ichneumon tripunctatus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 410 n. 50.
Ichneumon vorax Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 411 n. 53.
Ichneumon compressus Fourcroy, Entom. Paris. 1785 p. 414 n. 60.
Ichneumon extensorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 259 n. 4, ♀.
Ichneumon luctatorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 261 n. 18, ♂.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 59 n. 163b.
Ichneumon extensorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 135 n. 4, ♀.
Ichneumon luctatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 144 n. 31, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Vanessa polychloros (Kees, Gravenhorst), V. urticae, Satyrus janira (Ratzeburg, Giraud), Polyommatus circe (Rondani), Lycaena cyllarus (Goureau).

Ichneumon extensorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2675 n. 4, ♀.
Ichneumon luctatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2680 n. 13, ♂.
Ichneumon auratus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2684 n. 238.
Ichneumon raptorius Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 36 n. 741, ♀.
Ichneumon raptorius var. Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 36 n. 741 [excl. spec.].
Ichneumon extensorius Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 36 n. 742, ♀.
Ichneumon luctatorius Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 38 n. 748, ♂.
Ichneumon luctatorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 342, ♂.
Ichneumon raptorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 168 n. 2.
Ichneumon extensorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 168 n. 4, ♀.
Ichneumon motatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 168 n. 19.
Ichneumon croceatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 168 n. 23.
Ichneumon luctatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 170 n. 29, ♂.
Ichneumon luctatorius Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 115 n. 252, ♂.
Ichneumon extensorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 134 n. 10, ♀.
Ichneumon luctatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 141 n. 33, ♂.
Ichneumon extensorius Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 156 n. 479, ♀.
Ichneumon raptorius Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 277 n. 2076, ♀ ♂.
Ichneumon extensorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 50 n. 7, ♀.
Ichneumon crocatorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 52 n. 17.
Ichneumon luctatorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 53 n. 21, ♂.
Ichneumon extensorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 56 n. 12, ♀.
Ichneumon luctatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 60 n. 29, ♂.
Ichneumon luctatorius Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 186 n. 26, ♂.
Ichneumon extensorius Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 186 n. 29, ♀.
Ichneumon raptorius Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 186 n. 30.
Ichneumon vexatorius Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 257 n. 3733.
Ichneumon lusorius Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 257 n. 3734.
Ichneumon luctatorius Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 257 n. 3737, ♂.
Ichneumon raptorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 56 n. 741, ♀.
Ichneumon extensorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 57 n. 742, ♀.
Ichneumon luctatorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 59 n. 748, ♂.
Ichneumon luctatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♂.
Ichneumon extensorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 111, ♀ ♂.
Ichneumon luctatorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284, ♂.
Ichneumon extensorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284, ♀.
Ichneumon extensorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 299 n. 29, ♀.
Ichneumon luctatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 322 n. 59, ♂.
Ichneumon erratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 254, ♀.
Ichneumon raptorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255.
Ichneumon extensorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255, ♂.
Ichneumon luctatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277, ♂.
Ichneumon erratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 292.
Ichneumon extensorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 293, ♀.
Ichneumon raptorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 294.
Ichneumon luctatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 353, ♂.
Ichneumon luctatorius Trentepol, Isis 1826 p. 219 n. 36, ♂.
Ichneumon extensorius Trentepol, Isis 1826 p. 227 n. 44, ♀.
Ichneumon raptorius Trentepol, Isis 1826 p. 228 n. 45.
Ichneumon extensorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 266 n. 89, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon luctatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 411 n. 162, ♂ [excl. ♀],

Ichneumon extensorius Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 380 n. 843, ♀.
Crypturus extensorius Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2a IV. 1835 p. 353 n. 3, ♀.
Ichneumon extensorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 159 n. 89, ♀.
Ichneumon luctatorius Stephens. Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 182 n. 148, ♂.
Ichneumon extensorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique 1836 p. 337-341.
Ichneumon luctatorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 363 n. 24, ♀ ♂.
Ichneumon extensorius×luctatorius Westwood, Magas. of Nat. Hist. N. S. II. 1838 p. 393.
Ichneumon luctatorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 136 n. 18, ♀ ♂.
Ichneumon extensorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 55 [n. 48, ♀.
Ichneumon luctatorius Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 332 n. 395, ♂.
Ichneumon extensorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 155 & 337 (Mant. [p. 22 & 100), ♀.
Ichneumon luctatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 159 (Mant. [p. 26), ♀ ♂.
Ichneumon luctatorius Kolenati, Jahresh. naturw. Sect. mähr.-schles. Ges. f. Ackerbau etc. f. [1858 p. 45 n. 6, ♂.
Ichneumon extensorius Kolenati, Jahresh. naturw. Sect. mähr.-schles. Ges. f. Ackerbau etc. [f. 1858 p. 45 n. 10, ♀.
Ichneumon extensorius Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 40 [n. 129, ♀.
Ichneumon extensorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 6, ♀.
Ichneumon luctatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 7, ♀ ♂.
Ichneumon luctatorius Hagen, Stettin. entom. Zeitg. XXII. 1861 p. 283 n. 102.
Ichneumon luctatorius Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXII. 1861 p. 428; T. 1 F. 3.
Ichneumon luctatorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 76 n. 43, ♀ ♂.
Ichneumon extensorius A. Costa, Ann. Mus. Zool. Napoli IV. (1864) 1867 p. 11 n. 88, ♀.
Ichneumon extensorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 388 n. 70, ♀.
Ichneumon luctatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 389 [n. 74, ♀ ♂.
Ichneumon retractus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 419 n. 57, ♀.
Ichneumon retractus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 285 n. 12, ♀.
Ichneumon luctatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 40, ♀ ♂.
Ichneumon luctatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 180 & 215 n. 42, ♀ ♂.
Ichneumon extensorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 23 n. 38, ♀ ♂.
Ichneumon extensorius Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 9-16, ♂.
Ichneumon lutatorius Thomson, Opusc. entom. P. 13. 1889 p. 1401 n. 1.
Ichneumon extensorius Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 286 n. 22, ♂.
Ichneumon extensorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1924 n. 25.
Ichneumon extensorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 650 n. 149, ♀ ♂.
Ichneumon extensorius Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 99-113 & 355.
Ichneumon extensorius Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 312.

externus Berth. — ♀ — Afr.: Algeria.
Ichneumon externus Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VIII. 1895 p. 161, ♀.
Ichneumon externus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 396, ♀.

extrematis Cress. — ♀ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon extrematis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 149 n. 24, ♀.
Phygadeuon niger Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 280.
Ichneumon extrematis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 150 n. 41, ♀.
Ichneumon extrematis Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 294 n. 15, ♀.
Ichneumon extrematis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 270 n. 15, ♀.

extremator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon extremator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon extremator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 299.
fabricator Fabr.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 62 n. 213, p. 63 n. 240 & p. 63 n. 244.
? Ichneumon versicolor Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2700 n. 278.
? Ichneumon leucostoma Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2702 n. 298.
? Ichneumon quadricolor Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2702 n. 301.
Ichneumon fabricator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 166 n. 138.
Ichneumon fabricator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 68 n. 80.
Ichneumon fabricator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♂.
Ichneumon fabricator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 283.
Ichneumon fabricator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273.
Ichneumon fabricator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 344.
Ichneumon fabricator Trentepol, Revis. crit. gen. Ichneum. 1825 p. 21 n. 14.
Ichneumon fabricator Trentepol, Isis 1826 p. 72 n. 14, ♂.
Ichneumon annulator var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 147, ♀.
Ichneumon fabricator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 185 n. 46, ♂.
Ichneumon fabricator Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 14 n. 26.
Ichneumon fabricator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 143 n. 47.
Ichneumon fulvipes Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 144 n. 48, ♀.
Ichneumon fabricator Imhof & Labram, Insect. d. Schweiz II. 1838 T. 22 F. 1 (♂) & 2 (♀).
Ichneumon fabricator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 360 n. 11, ♂.
Ichneumon Hartigii Ratzeburg, Forstinsect III. 1844 p. 27.
Ichneumon annulator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 132 n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon Hartigii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 132 n. 7 & p. 133 n. 6, ♂.
Ichneumon extinctus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 133 n. 3, ♀.
Ichneumon fabricator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 69 n. 66, [♀♂.
Ichneumon annulator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 131 n. 1.
Ichneumon fabricator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 168 & 338 (Mant. [p. 35 & 101), ♀ ♂.
Ichneumon extinctus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 162 n. 2, ♀.
Ichneumon fabricator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 169 n. 26.
Ichneumon fabricator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 33 n. 17, ♀ ♂.
Ichneumon fabricator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 9, ♀ ♂.
Ichneumon fabricator Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 142 n. 83, ♀ ♂.
Ichneumon fabricator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 275 n. 46, ♂.
Ichneumon fabricator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 445 & 446 (Doc. [p. 5 & 6) n. 1 & 3, ♀ ♂.
Ichneumon fabricator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 397 [n. 101, ♀ ♂.
Ichneumon fabricator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 41, ♀ ♂.
Ichneumon fabricator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 101 n. 71, ♀ ♂.
Ichneumon fabricator Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 12 n. 60, ♀ ♂.
Ichneumon fabricator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 57, ♂.
Ichneumon (Cratichneumon) fabricator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1951 n. 14.
Ichneumon fabricator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 259 n. 56, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Orgyia pudibunda, Macaria lituraria (Ratzeburg), Notodonta dromedarius (Marshall), Axylia putris, Cymatophora or, Retinia pinicolana (Bridgman), Trachea piniperda (Hartig), Fidonia piniaria (Ratzeburg), Cheimatobia brumata (Rudow).

var. **impugnator** Wesm. — ♂ — Eur.: Belgia. [n. 69, ♂.
Ichneumon impugnator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 72
Ichneumon fabricator var. impugnator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
var. **spiracularis** Tischb. — ♀ ♂ — Eur.: Germania. [p. 260, ♂.
Ichneumon spiracularis Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 181 n. 25, ♂.
Ichneumon fabricator var. spiracularis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
var. **sponsus** Berth. — ♂ — Eur. [p. 260, ♀ ♂.
Ichneumon fabricator var. sponsus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
fabricatorius Müll.! — Eur.: Dania. [p. 260, ♂.
Ichneumon fabricatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 154 n. 1790.
facetus Cress. — ♂ — Am.: Virginia, Illinois.
Ichneumon facetus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 311, ♂.
Ichneumon facetus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 184 n. 197, ♂.
faciator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon faciator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 266.
Ichneumon faciator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 323.
faciens Davis — ♂ — Am.: Idaho.
Ichneumon faciens Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 350, ♂.
factor D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Tirolia. [nec Cresson].
Ichneumon facetus Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 175 n. 21, ♀ ♂
Ichneumon facetus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 582 n. 18, ♀ ♂.
Ichneumon factor m.
falcifer Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 66 n. 288.
Ichneumon falcifer Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2707 n. 342.
Ichneumon falcifer Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1080 n. 317.
falculator Oliv.! — ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon falculator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 194 n. 191.
Ichneumon falculator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 216 n. 57.
Ichneumon falculator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1080 n. 318, ♂.
falsarius Oliv.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon falsarius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 168 n. 20.
Ichneumon falsarius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 52 n. 15.
Ichneumon falsarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 876 n. 5.
falsator Vill.! — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon falsator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 164 n. 91; T. 8 F. 4.
Ichneumon simulator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 180 n. 82.
Ichneumon falsator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 905 n. 41, ♀.
falsificus Wesm. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr. [♀ ♂.
Ichneumon falsificus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles VIII. 1844 (Tent.) p. 25 n. 10,
Ichneumon falsificus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 19 n. 8, ♀ ♂.
Ichneumon falsificus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 201, ♀.
Ichneumon falsificus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 375 n. 16, ♀ ♂.
Ichneumon falsificus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 38, ♀.
Ichneumon (Coelichneumon) falsificus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1905 n. 8.
Ichneumon falsificus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 551 n. 41, ♀ ♂.
falsus Cam. — ♂ — Austr.
Ichneumon falsus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 No. 1. p. 18, ♂.
famelicus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon famelicus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 14 n. 25, ♂.

fastidiosissimus Cam. — ♂ — Am.: Panama. [n. 149, ♂.
Ichneumon fastidiosissimus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 186
faunus Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon faunus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 249 n. 80b, ♂.
Ichneumon faunus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 17 n. 41, ♂. [♀♂.
Ichneumon faunus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 66 n. 63,
Ichneumon faunus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 165 (Mant. p. 32), ♀ ♂.
Ichneumon faunus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 387 (Misc. p. 28 [n. 22, ♀.
Ichneumon faunus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 9, ♂.
Ichneumon faunus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 135 n. 79, ♀ ♂.
Ichneumon faunus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 202, ♀.
Ichneumon faunus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 455 (Doc. p. 15) n. 9, ♀ ♂.
Ichneumon faunus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 395 n. 96, ♀♂.
Ichneumon faunus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 102 n. 68, ♀ ♂.
Ichneumon faunus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 180 n. 24, ♀.
Ichneumon faunus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 106 n. 82.
Ichneumon (Melanichneumon) faunus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1958 n. 10.
Ichneumon faunus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 228 n. 5, ♀ ♂.
var. **leucopygus** Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon leucopygus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 156 n. 29, ♀.
Ichneumon leucopygus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 12 n. 19.
Ichneumon leucopyga Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 138 n. 33.
Ichneumon leucopygus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 258 n. 29, ♀.
Ichneumon faunus var. leucopygus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 228.
var. **rufatus** Berth. — ♀ — Eur. [♀♂.
Ichneumon faunus var. rufatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 228, ♀.
femorator Kby.! — Eur.: Britannia.
Ichneumon femorator Kirby, Monogr. apum Angl. II. 1802 p. 253, nota.
femorator Steph.! — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Ichneumon femorator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 200 n. 201.
Ichneumon femorator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 213 n. 124, ♀ ♂.
femoratorius Thunbg.! — Eur.: Britannia.
Ichneumon femoratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253.
Ichneumon femoratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 289.
femoratus Vill.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon femoratus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 204 n. 225.
Ichneumon femoratus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 219 n. 75.
Ichneumon femoratus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 1075 n. 307.
fenestrator Zett.! — ♀ — Eur.: Lapponia.
Ichneumon fenestrator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 361 n. 14, ♀.
feralis Cress. — ♀ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon feralis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 300, ♀.
Ichneumon feralis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 159 n. 72, ♀.
Ichneumon feralis Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 349 n. 29, ♀.
Ichneumon feralis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 275 n. 29, ♀.
ferreus Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon lineator var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 120 n. 9, ♀.
Ichneumon bilineatus var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 127 n. 11, ♂.

---

1) *Lep.:* Hydroecia leucographa (Mocsáry).

Ichneumon ferreus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 171 n. 36, ♂.
Ichneumon ferreus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 7 n. 6.
Ichneumon ferreus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 22 n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon lineator var. ferreus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 22 n. 11, ♀ ♂.
Ichneumon ferreus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 267 n. 36, ♂.
Ichneumon ferreus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 373 n. 5, ♀ ♂.
Ichneumon ferreus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 352 n. 17, ♀ ♂.
Ichneumon ferreus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 544 n. 27, ♀ ♂.

var. **numeratus** Berth. — ♂ — Eur.

Ichneumon ferreus var. numeratus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 545, ♀.

var. **restaurator** Fabr.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.

? Ichneumon curtus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 355 n. 717, ♀.
Ichneumon restaurator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 165 n. 133 [p. p.].
Ichneumon restaurator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 67 n. 74 [p. p.].
Ichneumon restaurator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 112, ♂.
Ichneumon restaurator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 288 n. 15, ♂.
Ichneumon restitutor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 275 [p. p.].
Ichneumon restitutor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 349 [p. p.].
Ichneumon restauratorius Trentepol, Isis 1826 p. 237 n. 57.
Ichneumon restaurator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 197 n. 52, ♂ [p. p.].
Ichneumon restaurator Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 7 n. 6 [p. p.].
Ichneumon restaurator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 22 [n. 4, ♀ ♂ [p. p.].
Ichneumon restaurator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 29 [n. 2, ♀ ♂ [p. p.].
Ichneumon restaurator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 284 [n. 52, ♂ [p. p.].
Ichneumon restaurator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 373 [n. 7, ♀ ♂ [p. p.].
Ichneumon restaurator Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 31, ♂; T. 20 F. 2 [p. p.].
Ichneumon ferreus var. restaurator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 545, [♀ ♂.

var. **rufescens** Berth. — ♀ — Eur.

Ichneumon ferreus var. rufescens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 545, ♀.

var. **separator** Fonsc. — ♀ — Eur.: Gallia.

Ichneumon separator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 405 n. 52, ♀.
Ichneumon ferreus var. separator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 545, ♀.

var. **serenus** Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.

Ichneumon serenus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 337 n. 79, ♀ ♂.
Ichneumon serenus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 484 n. 199, ♀ ♂.
Ichneumon serenus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 190 n. 170, ♀ ♂.
Ichneumon serenus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 23 n. 5, ♀ ♂.
? Ichneumon lacrymator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 403 n. 50, ♂ [p. p.].
Ichneumon serenus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 406 n. 53, ♂.
Ichneumon serenus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 334 (Mant. p. 97).
Ichneumon serenus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 360 (Ot. p. 9) n. 4, ♀ ♂.
Ichneumon serenus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 3, ♀ ♂.
Ichneumon serenus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 201, ♀.
Ichneumon serenus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 373 n. 8, ♀ ♂.
Ichneumon ferreus var. serenus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 545, [♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Bryophila glandifera (Rondani).

ferrugator Kby.! — ♀ ♂ — Am. arct.
Ichneumon ferrugator Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV. 1837 p. 258 n. 358, ♀ ♂.
Ichneumon ferrugator Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 207.
ferrugator Fabr.! — ♀ ♂ — Am.: Carolina, Pennsylvania.
? Ichneumon ferrugator Swederus, Svensk. Vet.-Akad. Handl. VIII. 1787 p. 280 n. 33; T. 4 F. 2.
? Ichneumon ferrugator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2706 n. 340.
Ichneumon ferrugator Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 154 n. 89.
Ichneumon ferrugator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 66 n. 64.
Ichneumon ferrugator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258.
Ichneumon ferrugator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 304.
Joppa ferrugator Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 295 n. 49, ♀ ♂.
Ichneumon trogiformis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 175 n. 59, ♂.
Joppa ferrugator Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc II. 1869 p. 91.
Ichneumon ferrugator Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 208, ♀ ♂.
ferruginator Perty! — Am. mer.
Ichneumon ferruginator Perty, Delect. anim. artic. Brasil. 1833 p. 133; T. 26 F. 15.
ferruginatorius Brünn.! — Eur.: Dania.
Ichneumon ferruginatorius Brünnich, Pantoppidan: Danske Atlas 1763 p. 457 n. 8.
Ichneumon ferruginatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 154 n. 1791.
Ichneumon ferruginatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 967 n. 124.
ferruginosus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 60 n. 182 & p. 67 n. 305.
Ichneumon ferruginosus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2688 n. 254 & p. 2709 [n. 356.
Ichneumon ferruginosus Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 283.
Ichneumon sputator var. ferruginosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 546.
Ichneumon ferruginosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1065 n. 327.
festinatorius Zett. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Ichneumon festinatorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 366 n. 34, ♀.
figulus Er. — ♀ — As.: Sibiria.
Ichneumon figulus Erichson, Middendorff: Reise in Sibirien II. P. 1. 1851 p. 64 n. 126, ♀.
filatus Tischb. — ♀ — Eur.: Carinthia.
Amblyteles filatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 39 n. 30, ♀.
Amblyteles filatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 169 n. 15.
Ichneumon filatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 659 n. 171, ♀.
fimbricator Thunbg.! — Afr.: Cap.
Ichneumon fimbricator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon fimbricator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 308.
finitimus Cress. — ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon finitimus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 304, ♂ [non ♀].
Ichneumon finitimus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 170 n. 120, ♂ [non ♀].
Ichneumon finitimus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 356 n. 43, ♂.
Ichneumon finitimus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 281 n. 43, ♂.
var. **apicalis** (Prov.) Cress. — ♂ — Am.: Canada.
Mesostenus apicalis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 266.
Ichneumon finitimus var. apicalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 170, ♂.
fissurator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon fissurator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 261.
Ichneumon fissurator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 310.
flamaryi Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon Flamaryi Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1897 p. 255 n. 26, ♀ ♂.

flavaginis Boie![1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon flavaginis Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 89 n. 12, ♀ ♂.
flavescens Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 70 n. 341.
Ichneumon flavescens Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2720 n. 386.
Ichneumon flavescens Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1013 n. 200.
flavicornis Cress. — ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon flavicornis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 140 n. 9, ♂.
Ichneumon flavicornis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 144 n. 12.
Ichneumon flavicornis Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 291 n. 7, ♂.
Ichneumon flavicornis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 267 n. 7, ♂.
flavifrons Preyssl.! — Eur.: Bohemia.
Ichneumon flavifrons Preyssler, Sammlg. physik. Aufs. III. 1793 p. 232.
flavifrons Vall.![2]) — Eur.: Gallia.
Ichneumon flavifrons Vallot, Mém. acad. sc. Dijon 1836 p. 244.
flavifrons Schrk.! — ♀ ♂ — Eur. centr.
Ichneumon flavifrons Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 363 n. 731, ♀ ♂.
Ichneumon flavifrons Schrank, Neu. Magaz. Liebh. Entom. I. 3. 1782 p. 294 n. 731.
Ichneumon flavifrons Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 182 n. 144.
Ichneumon flavifrons Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2697 n. 168.
Ichneumon flavifrons Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 276 n. 2074.
Ichneumon flavifrons Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 976 n. 134, ♀ ♂.
flaviger Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon flaviger Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 42, ♀.
Ichneumon flavoniger Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 284 n. 108, ♀ [err. !].
flavipes Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon flavipes Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 427 n. 100.
Ichneumon flavipes Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 191 n. 178.
flavitarsis Smith — ♂ — As.: Japonia.
Ichneumon flavitarsis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 389 n. 5, ♂.
flaviventris Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 64 n. 254.
Ichneumon flaviventris Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2703 n. 310.
Ichneumon flaviventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1036 p. 235.
flavizonatus Cress. — ♂ — Am.: Canada, United States. [[non ♀].
Ichneumon flavizonatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 156 n. 33, ♂
Ichneumon multor (Harris) Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 299, ♂.
Ichneumon flavizonatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 164 n. 94, ♂.
Ichneumon flavizonatus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 353 n. 36, ♂.
Ichneumon flavizonatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 279 n. 36, ♂.
flavomaculatus Luc. — ♂ — Afr.: Algeria.
Ichneumon flavomaculatus Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 333 n. 399, ♂.
Ichneumon flavomaculatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 290 n. 120, ♂.
flavovarius Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Ichneumon flavovarius Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 14, ♂.
flebilis Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Ichneumon flebilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 181 n. 178, ♀.

---

1) *Lep.:* Nonagria flavago, N. cannae (Boie).
2) *Lep.:* Noctua persicariae (Vallot).

flexorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon flexorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 276.
Ichneumon flexorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 351.
foersteri Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Germania. [n. 112b, ♂.
Ichneumon Försteri Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 185 (Mant. p. 57;
Ichneumon pseudocryptus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 392 (Ot. p. 41) n. 42, ♀.
Ichneumon Försteri Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 275 n. 82, ♂.
forcicatus Vill.! — ♀ ♂ — Eur.
Ichneumon forcicatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 203 n. 222.
Ichneumon forcicatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 218 n. 73.
Ichneumon forcicatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1075 n. 306, ♀ ♂.
forreri Cam. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon Forreri Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 35. 1885 Hymen. I. p. 151 n. 33, ♂; T. 7 F. 15.
fortipes Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Belgia, Germania, Russia.
Ichneumon fortipes Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 175 (Mant. p. 42) n. 89b, ♀.
Ichneumon fortipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 404 n. 131, ♀.
Ichneumon fortipes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 286 n. 112, ♀.
Ichneumon (Melanichneumon) fortipes Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2403 n. 1b, ♀.
Ichneumon fortipes Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 311, ♂.
fortispina Cam. — ♂ — Am.: Guatemala. [T. 8 F. 24.
Ichneumon fortispina Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 185 n. 148, ♂;
fraternarius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon fraternarius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 276.
Ichneumon fraternarius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 351.
fraudatorius Vill.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon fraudatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 144 n. 30.
Ichneumon fraudatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 169 n. 25.
Ichneumon fraudatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 876 n. 6.
frequentorius Zett.! — ♀ — Eur.: Lapponia.
Ichneumon frequentorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 366 n. 35, ♀.
freyi Kriechb. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Ichneumon Freyi Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VI. P. 1. 1880 p. 12, ♀.
Ichneumon Freyi Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 662 n. 176, ♀.
frictorius Fabr.! — ♀ — Am. mer.
Ichneumon frictorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 58 n. 23.
Ichneumon frictorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon frictorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 289.
Ichneumon frictorius Trentepol, Isis 1829 p. 814 n. 59, ♀.
frischii Bechst. & Scharfenbg.! — Eur.: Germania. [n. 37.
Ichneumon Frischii Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 973
frivolus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon frivolus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 11 n. 18, ♂.
frontalis Guér.! — Afr.: Abyssinia, Cap.
Ichneumon frontalis Guérin, Lefebure: Voy. Abyssinie VI. 1846 P. 4. p. 346; T. 7 F. 2.
frontalis Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 326 n. 10.
Ichneumon frontalis Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 396 n. 10.
Ichneumon tricolor Razoumowsky, Hist. nat. Jorat. I. 1789 p. 216 n. 251.
? Ichneumon flavifrons Villers, C. Linnai Entom. III. 1789 p. 1821 n. 44.
Ichneumon generator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 185 n. 110.

Ichneumon generator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 59 n. 53.
Ichneumon frontalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 977 n. 135.

frontator Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon frontator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 64 n. 25, ♂.
Ichneumon frontator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 289 n. 119, ♂.

frontator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon frontator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 266.
Ichneumon frontator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 324.

frontorius Thunbg.! — Eur.
Ichneumon frontorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Ichneumon frontorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 357.

fugitivus Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Belgia, Gallia, Germania.
Ichneumon fugitivus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 552 n. 229, ♂.
Ichneumon fugitivus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 196 n. 189.
Ichneumon pyrrhopus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 198 n. 194. [♂.
? Ichneumon fabricator var. 11 Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 168 (Mant. p. 35),
Ichneumon corruscator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 34 n. 19, ♀ [[non Linné].
Ichneumon fugitivus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 383 (Ot. p. 32) n. 30, ♂.
Ichneumon rutilans Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 152 n. 90, ♀ ♂.
Ichneumon fugitivus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 448 (Doc. p. 8) n. 4, ♂.
Ichneumon fugitivus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 397 n. 102, ♀ ♂.
Ichneumon fugitivus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1888 p. 12 n. 63, ♀ ♂.
Ichneumon (Cratichneumon) fugitivus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1952 n. 17.
Ichneumon fugitivus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 266 n. 67, ♀ ♂.

fuligator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon fuligator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258.
Ichneumon fuligator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 302.

fuliginosus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 70 n. 350.
Ichneumon fuliginosus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2720 n. 395.
Ichneumon fuliginosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1013 n. 199.

fulvicornis Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon fulvicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 422 n. 163, ♂.
Ichneumon fulvicornis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 182 n. 149, ♂.
Ichneumon fulvicornis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 279-281, ♂.
Ichneumon fulvicornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 632 n. 124, ♂.

fulvidactylus Kriechb. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Ichneumon fulvidactylus Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 52 n. 5, ♂.
Ichneumon fulvidactylus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 627 n. 108 [[non 106], ♂.

fulvopictus Ashm. — ♂ — Am.: Missouri.
Ichneumon fulvopictus Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 391, ♂.

fulvoscutellatus Steph.! — ♀ — Eur.: Britannia.
Ichneumon fulvoscutellatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 162 n. 96.
Ichneumon fulvoscutellatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 182 n. 125, ♀.

fumatipennis Tosqu. — ♂ — Afr.: Cap.
Ichneumon fumatipennis Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 35 n. 16, ♂.

fumipennis Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Italia.
Ichneumon fumipennis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 589 n. 248, ♀.

---

1) *Lep.:* Retina pinicolana (Doubleday).

Ichneumon fumipennis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique. VIII. 1859 (Rem.) p. 71 n. 248
Ichneumon fumipennis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 406 n. 141, ♀♂.
Ichneumon fumipennis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 242 n. 25, ♀.
fumosus Fourcr.! — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 353 n. 72.
Ichneumon fumosus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 418 n. 73.
Ichneumon fumosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 990 n. 153, ♀.
fundator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon fundator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273.
Ichneumon fundator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 345.
funebris Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 66 n. 284.
Ichneumon funebris Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2706 n. 336.
funebris Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon funebris Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 39 n. 21, ♀ ♂.
Ichneumon funebris Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 275 n. 5, ♂.
Ichneumon funebris Holmgren, Entom. Tidskr. I. 1880 p. 25 n. 21, ♂.
Ichneumon funebris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 550 n. 39, ♀ ♂.
var. **leucopis** Berth. — ♀ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon funebris var. leucopis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 551, ♀.
funestus Cress. — ♀ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon funestus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 166 n. 46, ♀.
Ichneumon haesitans Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 80.
Ichneumon funestus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 179 n. 168, ♀.
Ichneumon funestus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 362 n. 59, ♀.
Ichneumon funestus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 287 n. 59, ♀.
fuscatus Grav. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon fuscatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2684 n. 239.
Ichneumon fuscatus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 12 n. 23, ♂.
Ichneumon fuscatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 170 n. 35, ♂.
Ichneumon semiorbitalis var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 212.
Ichneumon computatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 50 n. 44, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon fuscatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 403 (Misc. p. 44) [n. 33, ♀.
Ichneumon fuscatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 388 (Ot. p. 37) n. 37, ♀.
Ichneumon fuscatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 19 n. 35.
Ichneumon fuscatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 266 n. 35, ♂.
Ichneumon fuscatus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1939 n. 70.
fuscescens Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 69 n. 327.
Ichneumon fuscescens Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2718 n. 373.
Ichneumon fuscescens Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1041 p. 248.
fuscicornis Schrk.! — ♀ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon fuscicornis Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 299 n. 2123, ♀.
Ichneumon fuscicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1004 n. 183, ♀.
Ichneumon fuscicornis Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXIII. 1880 Versl. p. XV.
fuscicornis Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 59 n. 166.
Ichneumon fuscicornis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2684 n. 241.
Ichneumon fuscicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 928 n. 75.

fuscifrons Cress. — ♀ — Am.: United States.
Ichneumon fuscifrons Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 166 n. 45, ♀.
Ichneumon fuscifrons Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 307, ♀.
Ichneumon fuscifrons Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 177 n. 161, ♀.
fuscipes Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 69 n. 322.
Ichneumon fuscipes Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2718 n. 368.
Ichneumon fuscipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1040 n. 244.
fuscipes Gmel.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 59 n. 168.
Ichneumon fuscipes Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2684 n. 242, ♂.
Ichneumon fuscipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 224 n. 70, ♀ ♂ [excl. var. 2, ♂].
Ichneumon fuscipes Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 16 n. 38, ♂.
Ichneumon fuscipes Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 151 n. 69.
Ichneumon fuscipes Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 23 [n. 7, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon fuscipes Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 142 (Mant. p. 9), ♀ ♂.
Ichneumon fuscipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 4, ♀ ♂.
Ichneumon fuscipes Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 40 n. 22, ♀ ♂.
Ichneumon fuscipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 303 n. 70, ♀ ♂.
Ichneumon fuscipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 374 n. 11, ♀ ♂.
Ichneumon fuscipes Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 103 n. 20, ♀ ♂.
Ichneumon (Coelichneumon) fuscipes Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1905 n. 9.
Ichneumon fuscipes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 537 n. 3, ♀ ♂.
var. **subguttatus** Grav. — ♀ ♂ — Eur.
Ichneumon subguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 449 n. 179, ♀ ♂.
Ichneumon subguttatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 187 n. 160.
Ichneumon subguttatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 59 n. 179.
Ichneumon fuscipes var. subguttatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 [p. 201, ♂.
Ichneumon fuscipes var. subguttatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 538, ♀ ♂.
fuscocastaneus Grav. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon fuscocastaneus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 486 n. 200, ♂.
Ichneumon fuscocastaneus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 61 [n. 200, ♂.
Ichneumon fuscocastaneus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 289 n. 118, ♂.
fusorius L.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon fusorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 401 n. 1598, ♂ [non Wesmael].
Ichneumon spec. Schaeffer, Elem. entom. 1766 p. 72; F. 1.
Ichneumon fusorius Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 933 n. 21.
Ichneumon LVIII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768; T. 114 F. 1.
Ichneumon fusorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 332 n. 26.
Ichneumon fusorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 849 n. 21.
Ichneumon fusorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 424 n. 27.
Ichneumon fusorius Borowsky, Naturg. d. Thierr. VIII. 1787 p. 33 n. 4.
Ichneumon fusorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 262 n. 33.
Ichneumon fusorius Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. Nya Saml. III. 1788 p. ?

---

[1]) *Lep.:* Noctuidae (Brischke).
[2]) *Lep.:* Chaerocampa porcellus (Bignell), Smerinthus populi, Sm. ocellatus (Bouché), Sphinx pinastri, Sph. ligustri (Ratzeburg, Brischke), Tryphaena pronuba (Giraud).

Ichneumon fuscus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 148 n. 39.
Ichneumon fusorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 148 n. 40.
Ichneumon fusorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2682 n. 21.
Ichneumon fusorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 340; T. 34 F. 1.
Ichneumon fusorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 174 n. 48.
Ichneumon fusorius Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 147 n. 55.
Ichneumon lentorius Panzer, Faun. Insect. German. VI. 1799 P. 71 T. 11.
Ichneumon fusorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 54 n. 28.
Ichneumon fusorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 64 n. 47.
Ichneumon fugatorius Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 122.
Ichneumon lentorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 64.
Ichneumon lentorius C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- u. Baumhölzer II. 5. 1807 p. 218.
Ichneumon lentorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 112, ♀.
Ichneumon fusorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 112, ♂.
Ichneumon fusorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284.
Ichneumon lentorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284.
Ichneumon fusorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 331 n. 71.
Ichneumon fusorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 276.
Ichneumon fusorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 350.
Ichneumon fusorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 457 n. 186, ♀ ♂.
Ichneumon pisorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 462 n. 187, ♀ ♂.
Ichneumon fusorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 187 n. 162.
Ichneumon pisorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 188 n. 163, ♀ ♂.
Ichneumon fusorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 363 n. 20, ♀ ♂.
Ichneumon fusorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 304 n. 16; T. 2 F. 6.
Ichneumon pisorius Ratzeburg, Forstinseten III. 1844 p. 27; T. 6 F. 5.
Ichneumon pisorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 137 n. 20, ♀ ♂.
Ichneumon pisorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Belgique XVIII. 1844 (Tent.) p. 24 [n. 8, ♀ ♂.
Ichneumon pisorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 400 n. 44, ♀.
Ichneumon pisorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 134 n. 24.
Ichneumon fusorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 143 (Mant. p. 10.) ♀.
Ichneumon pisorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 171.
Ichneumon pisorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 363 (Ot. p. 12) n. 8, ♀ ♂.
Ichneumon pisorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 10 n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon pisorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 375 n. 14, ♀ ♂.
Ichneumon pisorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1874 p. 5; T. 2 F. 6 (♀).
Ichneumon pisorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 38, ♀ ♂.
Ichneumon pisorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 211 n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon pisorius Holmgren, Entom. Tidskr. VII. 1886 p. 43 n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon fusorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 14 n. 5.
Ichneumon fusorius A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. 7. 1886 p. 14.
Ichneumon (Protichneumon) fusorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1900 n. 1.
Ichneumon fusorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 525 n. 5, ♀ ♂.

var. **mediofulvus** Berth. — ♀ ♂ — Eur.

Ichneumon fusorius var. mediofulvus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 525, ♀ ♂.

var. **multipictus** Berth — ♀ — Eur.

Ichneumon fusorius var. multipictus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 525, ♀.

galenus Cress. — ♂ — Am.: Canada, United States.

Ichneumon galenus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 292, ♂.
Ichneumon galenus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 143 n. 8, ♂.

Ichneumon galenus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 290 n. 5, ♂.
Ichneumon galenus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 266 n. 5, ♂.
gallerucarum Rond.![1]) — Eur.: Italia.
Ichneumon gallerucarum Rondani, Bull. comm. agrar. Parma. III. 1870 p. 140.
gasterator Steph.! — ♀ — Eur.: Britannia.
Ichneumon gasterator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 199 n. 196.
Ichneumon gasterator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 213 n. 126, ♀.
gastritor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon gastritor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 260.
Ichneumon gastritor Thunberg. Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 309.
gayi Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Ichneumon Gayi Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 488 n. 18, ♀.
gelitorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon gelitorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Ichneumon gelitorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 358.
gemellus Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon gemellus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 14 n. 29.
Ichneumon gemellus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 201 n. 55, ♂.
Ichneumon gemellus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 147 n. 56. [♀? ♂.
Ichneumon gemellus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 33 n. 22,
Ichneumon gemellus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 148 (Mant. p. 15), ♀ ♂.
Ichneumon gemellus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 36 (Adn. p. 4), ♀.
Ichneumon gemellus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 13 n. 13?
[& p. 21 n. 43.
Ichneumon gemellus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 5, ♂.
Ichneumon gemellus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 131 n. 77, ♀ ♂.
Ichneumon gemellus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 286 n. 55, ♂.
Ichneumon gemellus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 540 (Doc. p. 46)
[n. 12, ♀ ♂.
Ichneumon gemellus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 378 n. 28, ♀ ♂.
Ichneumon gemellus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 39, ♀ ♂.
Ichneumon gemellus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 102 n. 65, ♀ ♂.
Ichneumon gemellus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 108 n. 92.
Ichneumon (Barichneumon) gemellus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1960 n. 2.
Ichneumon gemellus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 226 n. 2, ♀ ♂.
Ichneumon (Barichneumon) gemellus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2403 n. 2, ♀.
var. **analogus** Berth. — ♂ — Eur. [p. 227, ♂.
Ichneumon gemellus var. analogus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
var. **opticus** Grav. — ♂ — Eur.
Ichneumon opticus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 131 n. 13, ♂.
Ichneumon opticus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 7 n. 6.
Ichneumon opticus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 132 n. 16.
Ichneumon opticus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 241 n. 13, ♂.
Ichneumon gemellus var. opticus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 227, ♂.
gemillatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon gemillatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277.
Ichneumon gemillatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 354.
geminus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 59 n. 174.

---

[1]) *Col.:* Galleruca xanthomelaena (Rondani).

Ichneumon geminus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2685 n. 246.
Ichneumon geminus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 930 n. 78.
generosus Smith — ♂ — As.: Japonia.
Ichneumon generosus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 387 n. 1, ♂.
germanus Cress. — ♀ — Am.: Massachusetts, Virginia.
Ichneumon germanus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 143 n. 4, ♀.
gestator Thunbg.! — As.: India.
Ichneumon gestator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon gestator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 312.
gesticulator Thunbg.! — Eur.: Suecia, Fennia.
Ichneumon gesticulator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 266.
Ichneumon gesticulator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 325.
gestuosus Cress. — ♀ — Am.: British Columbia, New Hampshire.
Ichneumon gestuosus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 156 n. 62, ♀.
gibbator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon gibbator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 270.
Ichneumon gibbator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 336.
gibberius Thunbg.! — Eur.: Britannia.
Ichneumon gibberius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 263.
Ichneumon gibberius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 315.
gibbosus Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon gibbosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 43, ♀.
Ichneumon gibbosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 288 n. 117, ♀.
gibbulus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon gibbulus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) IV. 1886 p. 22 n. 30, ♀ ♂.
Ichneumon gibbulus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1925 n. 28.
Ichneumon gibbulus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 653 n. 156, ♀ ♂
gigantor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon gigantor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 272.
Ichneumon gigantor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 340.
gigas Laxm.! — As.: Sibiria. [F. 10.
Ichneumon gigas Laxman, Nov. comment. acad. sc. Petropol. XIV. 1. 1759 p. 600 n. 11; T. 25
glabrator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon glabrator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon glabrator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 307.
globulator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon globulator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 266.
Ichneumon globulator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 322.
godmanii Cam. — ♂ — Am.: Guatemala. [T. 7 F. 18.
Ichneumon Godmani Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 157 n. 47, ♂;
godwin-austenii Cam. — ♀ — Am.: Indiana.
Ichneumon Godwin-Austeni Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 13. p. 8, ♀.
gracilentissimus D. T. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon gracilentus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 16 n. 28, ♀ [non
Ichneumon gracilentissimus m. [Wesmael.
gracilentus Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota. [n. 49, ♀ ♂.
Ichneumon gracilentus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 55
Ichneumon gracilentus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 156 (Mant. p. 23), ♀ ♂.
Ichneumon gracilentus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXX. 1854 p. 31 n. 11, ♀ ♂.

---

[1] *Lep.:* Noctua festiva (Bignell), Nonagria sparganii (Vollenhoven).

Ichneumon gracilentus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 7, ♀ ♂.
Ichneumon gracilentus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 64 n. 36, ♀ ♂.
Ichneumon gracilentus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 202, ♀.
Ichneumon gracilentus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 389 n. 73, ♀ ♂.
Ichneumon gracilentus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 40, ♀ ♂.
Ichneumon gracilentus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 180 & 215 n. 37, ♀ ♂.
Ichneumon adscendens Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 178 n. 20, ♂.
Ichneumon gracilentus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 21 n. 27, ♀ ♂.
Ichneumon gracilentus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1924 n. 26.
Ichneumon gracilentus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 651 n. 152, ♀ ♂.

var. **improbus** Tischb. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon improbus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 177 n. 19, ♂.
Ichneumon gracilentus var. improbus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 652, ♂.

var. **quadrilineatus** Tischb. — ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon quadrilineatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 175 n. 16, ♂.
Ichneumon gracilentus var. quadrilineatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. [1894 p. 652, ♂.

var. **vicinus** Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia.
Ichneumon vicinus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 67 n. 37, ♀ ♂.
Ichneumon gracilentus var. vicinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 652, ♀ ♂.

gracilicornis Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon gracilicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 290 n. 98, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon jocerus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 326 n. 121, ♂.
Ichneumon gracilicornis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 162 n. 96 [recte 99].
Ichneumon jocerus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 170 n. 117.
Ichneumon gracilicornis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 41 [n. 34, ♀ ♂.
Ichneumon gracilicornis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 60 n. 18.
Ichneumon gracilicornis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 151 (Mant. p. 18), ♂.
Ichneumon gracilicornis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 386 (Misc. [p. 27) n. 20, ♂.
Ichneumon jocerus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 28 n. 79.
Ichneumon gracilicornis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgiqne VIII. 1859 (Rem.) p. 35 n. 98.
Ichneumon gracilicornis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 6, ♀.
Ichneumon gracilicornis Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 95 n. 56, ♀ ♂.
Ichneumon emancipatus Holmgren, Ichnenm. Suec. I. 1864 p. 98 n. 58, ♀ ♂ [p. p.].
Ichneumon gracilicornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 383 [n. 47, ♀ ♂.
Ichneumon gracilicornis Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 433 n. 112, ♀ ♂.
Ichneumon gracilicornis Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 180 & 212 n. 50, ♀ ♂.
Ichneumon emancipatus Kriechbaumer, Ber. naturw. med. Ver. Innsbruck XI. 1881 p. 5 n. 16.
Ichneumon gracilicornis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 6 n. 45, ♀ ♂.
Ichneumon gracilicornis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1931 n. 48.
Ichneumon gracilicornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 619 n. 90, ♀ ♂.

var. **nigricaudus** Berth. — ♂ — Eur.
Ichneumon gracilicornis var. nigricaudus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. [1894 p. 619, ♂.

var. **nigroscutellatus** Berth. — ♂ — Eur.
Ichneumon gracilicornis var. nigroscutellatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. [1894 p. 619, ♂.

var. **stenocerus** Thoms. — ♀ — Eur.
Ichneumon stenocerus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 7 n. 46, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Melitaea cynthia (Berthoumieu).

Ichneumon stenocerus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1932 n. 49. [p. 619, ♀.
Ichneumon gracilicornis var. stenocerus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894
gradarius Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon culpatorius var. 5 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 517, ♂. [♀.
Ichneumon gradarius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 154 (Mant. p. 21) n. 4?.
Ichneumon refractorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 381 (Misc. p. 2?
[n. 17, ♂.
Ichneumon gradarius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 376 (Ot. p. 25) n. 22, ♀.
Ichneumon gradarius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 6, ♀.
Ichneumon gradarius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 80 n. 46, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon gradarius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 40, ♀.
Ichneumon gradarius Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 76 n. 46, ♀.
Ichneumon refractorius Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 77 n. 46-47, ♂.
Ichneumon gradarius Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLIII. 1882 p. 478 n. 6, ♀ ♂.
Ichneumon gradarius Nerén, Entom. Tidsskr. VI. 1885 p. 169.
Ichneumon gradarius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 6 n. 43, ♀ ♂.
Ichneumon gradarius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1919 n. 13.
Ichneumon gradarius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 648 n. 147, ♀ ♂.
Ichneumon gradarius var. refractorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894
var. **firmipes** Wesm.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Helvetia. [p. 649, ♂.
Ichneumon firmipes Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 377 (Ot. p. 26) n. 23, ♀.
Ichneumon firmipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 202, ♀.
Ichneumon firmipes Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 6 n. 44, ♀ ♂.
Ichneumon firmipes Nerén, Entom. Tidsskr. XIII. 1892 p. 67.
Ichneumon gradarius var. firmipes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894
gradatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia. [p. 649, ♀.
Ichneumon gradatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253.
Ichneumon gradatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 287.
grandicornis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Ichneumon grandicornis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 24 n. 39, ♀ ♂.
Ichneumon grandicornis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1921 n. 16.
Ichneumon grandicornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 603 n. 56, ♀.
grandis Brullé — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon grandis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 300 n. 1, ♀.
Ichneumon ambiguus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 161 n. 39, ♂.
Ichneumon regnatrix Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 178 n. 64, ♀.
Ichneumon ambiguus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 255 n. 24.
Ichneumon grandis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 173 n. 135, ♀ ♂.
Ichneumon grandis Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 359 n. 51, ♀ ♂.
Ichneumon grandis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 284 n. 51, ♀ ♂.
grassator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon grassator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
Ichneumon grassator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 297.
gratiosus Wesm.! — ♂ — Eur.: Belgia. [n. 117, ♂.
Ichneumon gratiosus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 107
Ichneumon gratiosus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 186 (Mant. p. 53), ♂.
gratus Wesm. — ♀ — Eur.: Germania, Helvetia.
Ichneumon deceptor var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 335, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Panolis piniperda (Brischke), Charaeas graminis (Tischbein).
[2]) *Lep.:* Charaeas graminis (Nerén).

Ichneumon gratus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 371 (Misc. p. 12) n. 7, ♀.
Ichneumon gratus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 389 n. 72, ♀.
Ichneumon gratus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 40, ♀.
Ichneumon gratus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1926 n. 33.
Ichneumon gratus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 657 n. 165, ♀.

gravenhorstii Fonsc. — ♀ (♂) — Eur.: Suecia, Gallia.
Ichneumon Gravenhorstii Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 412 n. 62.
? Ichneumon fabricator var. 11 Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 168 [(Mant. p. 35), ♀♂.
Ichneumon grandiceps Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 13 n. 64.
Ichneumon (Cratichneumon) grandiceps Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 n. 1953 n. 18.
Ichneumon Gravenhorsti Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 261 n. 57, ♀(♂).

gravipes Wesm. — ♀ ♂ — Eur. centr.
Ichneumon gravipes Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 379 (Misc. p. 20) [n. 15, ♀.
Ichneumon gravipes Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 171, ♀♂.
Ichneumon gravipes Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 78 n. 53-54, ♀ ♂.
Ichneumon gravipes Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1941 n. 73.
Ichneumon gravipes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 662 n. 176, ♀♂.

groenlandicus Lundb. — Am.: Groenlandia.
Ichneumon Groenlandicus Lundbeck, Vidensk. Meddel. 1896 p. 223.

grossulariatae Schrk.! — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon Grossulariatae Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 305 n. 2139, ♀ ♂.

grotei Cress. — ♂ — Am.: Colorado, Illinois.
Ichneumon Grotei Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 154 n. 31, ♂.
Ichneumon Grotei Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 167 n. 106, ♂.

guatemalensis Cam. — ♀ — Am.: Guatemala.
Ichneumon Guatemalensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 160 [n. 54, ♀; T. 7 F. 20.

guinor Thunbg.! — Am.: Guiana.
Ichneumon guinor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 274.
Ichneumon guinor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 330.

guttatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon guttatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253.
Ichneumon guttatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 289.

guttatus Tischb. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon guttatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 436, ♂.
Ichneumon raptorius var. 1 Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 324 n. 47.
Ichneumon guttatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 629 n. 114, ♂.

guttulator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon guttulator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 264.
Ichneumon guttulator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 318.

gymnogonus Kriechb. — ♂ — Eur.: Austria.
Ichneumon gymnogonus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXI. 1895 p. 237 n. 13b, ♂.

gyrator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon gyrator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 261.
Ichneumon gyrator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 311.

gyratorius Thunbg. — Eur.: Suecia.
Ichneumon gyratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon gyratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 286.

haematomerus Holmgr. — ♂ — Eur.: Tirolia.
Ichneumon haematomerus Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 178 n. 26, ♂.
Ichneumon haematomerus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 296, ♂.

haematonotus Wesm. — ♀ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon haematonotus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 89, ♀.
Ichneumon haematonotus Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 78 n. 49-50, ♀.
Ichneumon haematonotus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1928 n. 39.
Ichneumon haematonotus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 578 n. 8, ♀.

haematopus Schrk.! — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon haematopus Schrank, Bayer. Reise 1786 p. 260.
Ichneumon haematopus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2677 n. 84.
Ichneumon haematopus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 264 n. 2057, ♀ ♂.
Ichneumon haematopus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 987 n. 148, ♀ ♂.

haematopus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 66 n. 278.
Ichneumon haematopus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2705 n. 330.

haematostoma Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 60 n. 178.
Ichneumon haematostoma Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2687 n. 249.
Ichneumon haematostoma Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 917 n. 61.

haemorrhoicus Kriechb. — ♀ — Eur.: Sicilia, Hispania.
Ichneumon haemorrhoicus Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VII. 1887 p. 302, ♀.
Ichneumon haemorrhoicus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 661 n. 174, ♀.

haemorrhoidalis Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota; Afr.: Algeria.
Ichneumon haemorrhoidalis Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 348 n. 90, ♂.
Ichneumon haemorrhoidalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 539 n. 224, ♂.
Ichneumon castaniventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 556 n. 233, ♀.
Ichneumon haemorrhoidalis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 195 n. 184, ♂.
Ichneumon castaniventris Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 198 n. 193, ♀.
Ichneumon castaniventris Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 32 [n. 21, ♀ ♂.
Ichneumon castaniventris Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 147 & 336 [(Mant. p. 14 & 92), ♀ ♂.
Ichneumon castaniventris Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 30 n. 7, ♀ ♂.
Ichneumon castaniventris Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 37 n. 20, ♀ ♂. [♀ ♂.
Ichneumon castaniventris Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 378 n. 27,
Ichneumon castaneiventris Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 32, ♀ ♂; T. 20 F. 7.
Ichneumon castaneiventris Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 213 n. 19, ♀ ♂.
Ichneumon castanicauda Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 170 n. 6, ♂.
Ichneumon (Coelichneumon) castaneiventris Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1911 n. 23.
Ichneumon castaneiventris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 557 n. 54, [♀ ♂.

var. **anospilus** Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ichneumon anospilus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 15 n. 12, ♀.
Ichneumon (Coelichneumon) anospilus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1911 n. 25.
Ichneumon castaneiventris var. anospilus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 558, ♀.
Ichneumon haemorrhoidalis var. anospilus m.

var. **bicuspis** Kriechb.[1]) — ♂ — Eur.: Austria inf.
Ichneumon castaneiventris var. Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 36, ♂.
Ichneumon castaniventris var. bicuspis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 557, ♂.
Ichneumon haemorrhoidalis var. bicuspis m.

---

[1]) *Lep.:* Ophiusa craccae (Dorfmeister).

var. **nigricaudus** Berth. — ♀ ♂ — Eur.
Ichneumon castaneiventris var. nigricaudus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII.
Ichneumon haemorrhoidalis var. nigricaudus m. [1894 p. 557, ♀ ♂.
var. **secretus** Berth. — ♂ — Eur.
Ichneumon castaneiventris var. secretus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894
Ichneumon haemorrhoidalis var. secretus m. [p. 558, ♂.
var. **subniger** Berth. — ♂ — Eur.
Ichneumon castaneiventris var. subniger Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894
Ichneumon haemorrhoidalis var. subniger m. [p. 558, ♂.
haemorrhoidarius Thunbg.! — Eur.: Suecia, Russia.
Ichneumon haemorrhoidarius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon haemorrhoidarius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 286.
Ichneumon haemorrhoidarius Kawall, Stettin. entom. Zeitg. XVIII. 1857 p. 16.
haesitator Wesm. — ♀ ♂ — Eur. centr.
Ichneumon latrator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 353 n. 98, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon latrator Gravenhorrst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 572 n. 242, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon haesitator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 36 [n. 26, ♀.
Ichneumon haesitator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 150 (Mant. p. 17), ♀ ♂.
Ichneumon haesitator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 36 (Adn. p. 4), ♂.
Ichneumon haesitator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 380 n. 35, ♀ ♂.
Ichneumon haesitator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 213 n. 13, ♀.
Ichneumon haesitator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1945 n. 82.
Ichneumon haesitator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 573 n. 89, ♀ ♂.
haglundii Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon Haglundi Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 129 n. 76, ♀ ♂.
Ichneumon Haglundi Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1935 n. 55.
Ichneumon Haglundi Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 595 n. 46, ♀ ♂.
haruspex Müll.! — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon haruspex O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 155 n. 1802.
Ichneumon haruspex Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 298 n. 2120, ♀.
Ichneumon haruspex Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 910 n. 49, ♀.
heiligbrodtii Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Ichneumon Heiligbrodtii Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 168 n. 110, ♂.
hellensis Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon Hellensis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 1. 1888 p. 58, ♀ ♂.
helmsii Cam. — ♂ — Austr.
Ichneumon Helmsii Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 P. 1. p. 9, ♂.
helvipes Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon helvipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 297, ♀ ♂.
Phygadeuon ater Provancher, Natural. Canad. VIII. 1876 p. 317, ♂.
Ichneumon helvipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 158 n. 69, ♀ ♂.
Ichneumon helvipes Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 299 n. 27, ♀.
Ichneumon helvipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 275 n. 27, ♀.
heraclianae Bridgm.[2] — ♀ — Eur.: Britannia.
Ichneumon heraclianae Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1884 p. 421, ♀.
Ichneumon heraclianae Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 277 n. 86, ♀.

---

1) *Lep.:* Arctia fuliginosa (Bridgman, Billups).
2) *Lep.:* Depressaria heracliana (Fletcher).

hercynicus Kriechb. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon Hercynicus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 292, ♂.
Ichneumon Hercynicus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 254 n. 49, ♂.
hersilia Cam. — ♂ — Austr.: New Zealand.
Ichneumon Hersilia Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 P. 1. p. 7, ♂.
heterogonus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 70 n. 356.
Ichneumon heterogonus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2721 n. 401.
Ichneumon heterogonus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 999 n. 173.
hexaleucus Kriechb. — ♀ — Eur.: Tirolia.
Ichneumon hexaleucus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 67 n. 6, ♀.
hiator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon hiator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon hiator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 337.
hiemalis Cress. — ♀ — Am.: Aleutes Insulae.
Ichneumon hiemalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 180 n. 180, ♀.
Ichneumon hiemalis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 352, ♀.
hilaris Say — ♂ — Am.: Indiana.
Ichneumon hilaris Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 71 n. 7, ♂.
Ichneumon hilaris Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 376 n. 7.
hircinus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon gracilicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 290 n. 98 [p. p.].
Ichneumon hircinus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 110 n. 64, ♀ ♂.
Ichneumon hircinus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1938 n. 65.
Ichneumon hircinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 611 n. 75, ♀ ♂.
Ichneumon hircinus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2398 n. 65.
histricus Cress. — ♂ — Am.: Virginia.
Ichneumon histricus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 294, ♂.
Ichneumon histricus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 147 n. 28, ♂.
histrio Schrk.! — ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon histrio Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 265 n. 2060, ♂.
holsaticus Tischb. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon Holsaticus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 418, ♀.
Ichneumon Holsaticus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 134 n. 243, ♂.
Ichneumon Holsaticus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 637 n. 126, ♀.
honestus Cress. — ♂ — Am.: Virginia, Georgia.
Ichneumon honestus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 310, ♂.
Ichneumon honestus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 169 n. 111, ♂.
hortorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon hortorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 280.
Ichneumon hortorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 365.
hospitus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Illinois.
Ichneumon hospitus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 306, ♀ ♂.
Ichneumon hospitus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 171 n. 121, ♀ ♂.
humilis Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Belgia, Germania.
Ichneumon humilis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 384 (Ot. p. 33) n. 31, ♀.
Ichneumon humilis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 401 n. 117, ♀ ♂.
Ichneumon humilis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 204 n. 19, ♂.
Ichneumon humilis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 570 n. 28, ♀ ♂.

humillimus D. T. — ♀ — Am.: Canada.
? Phygadeuon terminalis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 284 [non Cresson].
Phygadeuon dorsalis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 285 [non Cresson].
Ichneumon humilis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 82 [non Wesmael].
Ichneumon humilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 172 n. 129, ♀.
Ichneumon humilis Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 358 n. 48, ♀.
Ichneumon humilis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 283 n. 48, ♀.
Ichneumon humillimus m.

huttonii Kby. — ♀ — Austr.: New Zealand.
Ichneumon Huttoni W. F. Kirby, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 44 n. 52, ♀.

hypocrita Cam. — ♂ — As.: Ceylon.
Ichneumon hypocrita Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 No. 4. p. 6, ♂.

hypolius Thoms. — ♀ — Eur.: Norvegia.
Ichneumon hypolius Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1226 n. 7, ♀.
Ichneumon hypolius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1923 n. 23.
Ichneumon hypolius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 605 n. 59, ♀.

jactator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon jactator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Péterscourg VIII. 1822 p. 267.
Ichneumon jactator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 325.

jalapensis Cam. — Am.: Mexico.
Ichneumon Jalapensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 35. 1885 Hymen. I. p. 152 n. 34.

jejunus Cress. — ♂ — Am.: United States.
Ischnus jejunus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 186 n. 1, ♂.
Ichneumon jenunus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 154 n. 52, ♂.

jemilleri Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon Jemilleri Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 263 n. 59, ♂.
Ichneumon Jemilleri Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 256 n. 53, ♂.

jesperi Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 9, ♀.
Ichneumon fusorius var. 1 Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 24
Ichneumon Coqueberti Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 13 n. 3, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon Jesperi Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 43 n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon (Protichneumon) Jesperi Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1902 n. 3, ♀ ♂.
? Ichneumon Jesperi Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1925 n. 29.
Ichneumon Jesperi Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 523 n. 2, ♀ ♂.

ignarus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon ignarus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 121 n. 44, ♂.

illacessitus Cam. — ♀ — Am.: Mexico. [T. 7 F. 21.
Ichneumon illacessitus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 163 n. 58, ♀;

illustris Kriechb. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Ichneumon illustris Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 49 n. 2, ♂.
Ichneumon illustris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 629 n. 115, ♂.

imitator Kriechb. — ♀ — Eur.: Hispania, Gallia.
Ichneumon imitator Kriechbaumer, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 239, ♀.
Ichneumon imitator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 247 n. 35, ♀.

imitator Oliv.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon imitator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 197 n. 202.
Ichneumon imitator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 218 n. 69.
Ichneumon imitator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 986 n. 146.

immaculatus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 60 n. 191.
Ichneumon immaculatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2698 n. 260.

hercynicus Kriechb. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon Hercynicus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 292, ♂.
Ichneumon Hercynicus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 254 n. 49, ♂.

hersilia Cam. — ♂ — Austr.: New Zealand.
Ichneumon Hersilia Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 P. 1. p. 7, ♂.

heterogonus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 70 n. 356.
Ichneumon heterogonus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2721 n. 401.
Ichneumon heterogonus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 999 n. 173.

hexaleucus Kriechb. — ♀ — Eur.: Tirolia.
Ichneumon hexaleucus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 67 n. 6, ♀.

hiator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon hiator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon hiator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 337.

hiemalis Cress. — ♀ — Am.: Aleutes Insulae.
Ichneumon hiemalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 180 n. 180, ♀.
Ichneumon hiemalis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 352, ♀.

hilaris Say — ♂ — Am.: Indiana.
Ichneumon hilaris Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 71 n. 7, ♂.
Ichneumon hilaris Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 376 n. 7.

hircinus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon gracilicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 290 n. 98 (p. p.).
Ichneumon hircinus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 110 n. 64, ♀ ♂.
Ichneumon hircinus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1938 n. 65.
Ichneumon hircinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 611 n. 75, ♀ ♂.
Ichneumon hircinus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2398 n. 65.

histricus Cress. — ♂ — Am.: Virginia.
Ichneumon histricus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 294, ♂.
Ichneumon histricus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 147 n. 28, ♂.

histrio Schrk.! — ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon histrio Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 265 n. 2060, ♂.

holsaticus Tischb. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon Holsaticus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 418, ♀.
Ichneumon Holsaticus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 134 n. 243, ♂.
Ichneumon Holsaticus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 637 n. 126, ♀.

honestus Cress. — ♂ — Am.: Virginia, Georgia.
Ichneumon honestus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 310, ♂.
Ichneumon honestus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 169 n. 111, ♂.

hortorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon hortorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 280.
Ichneumon hortorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 365.

hospitus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Illinois.
Ichneumon hospitus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 306, ♀ ♂.
Ichneumon hospitus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 171 n. 121, ♀ ♂.

humilis Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Belgia, Germania.
Ichneumon humilis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 384 (Ot. p. 33) n. 31, ♀.
Ichneumon humilis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 401 n. 117, ♀ ♂.
Ichneumon humilis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 204 n. 19, ♂.
Ichneumon humilis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 570 n. 28, ♀ ♂.

humillimus D. T. — ♀ — Am.: Canada.
? Phygadeuon terminalis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 284 [non Cresson].
Phygadeuon dorsalis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 285 [non Cresson].
Ichneumon humilis Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 82 [non Wesmael].
Ichneumon humilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 172 n. 129, ♀.
Ichneumon humilis Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 358 n. 48, ♀.
Ichneumon humilis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 283 n. 48, ♀.
Ichneumon humillimus m.

huttonii Kby. — ♀ — Austr.: New Zealand.
Ichneumon Huttoni W. F. Kirby, Trans. Entom. Soc. London 1881 p. 44 n. 52, ♀.

hypocrita Cam. — ♂ — As.: Ceylon.
Ichneumon hypocrita Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 No. 4. p. 6, ♂.

hypolius Thoms. — ♀ — Eur.: Norvegia.
Ichneumon hypolius Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1226 n. 7, ♀.
Ichneumon hypolius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1923 n. 23.
Ichneumon hypolius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 605 n. 59, ♀.

jactator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon jactator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Péterscourg VIII. 1822 p. 267.
Ichneumon jactator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 325.

jalapensis Cam. — Am.: Mexico.
Ichneumon Jalapensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 35. 1885 Hymen. I. p. 152 n. 34.

jejunus Cress. — ♂ — Am.: United States.
Ischnus jejunus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 186 n. 1, ♂.
Ichneumon jenunus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 154 n. 52, ♂.

jemilleri Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon Jemilleri Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 263 n. 59, ♂.
Ichneumon Jemilleri Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 256 n. 53, ♂.

jesperi Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 9, ♀.
Ichneumon fusorius var. 1 Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 24
Ichneumon Coqueberti Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 13 n. 3, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon Jesperi Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 43 n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon (Protichneumon) Jesperi Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1902 n. 3, ♀ ♂.
? Ichneumon Jesperi Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1925 n. 29.
Ichneumon Jesperi Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 523 n. 2, ♀ ♂.

ignarus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon ignarus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 121 n. 44, ♂.

illacessitus Cam. — ♀ — Am.: Mexico. [T. 7 F. 21.
Ichneumon illacessitus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 163 n. 58, ♀;

illustris Kriechb. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Ichneumon illustris Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 49 n. 2, ♂.
Ichneumon illustris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 629 n. 115, ♂.

imitator Kriechb. — ♀ — Eur.: Hispania, Gallia.
Ichneumon imitator Kriechbaumer, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 239, ♀.
Ichneumon imitator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 247 n. 35, ♀.

imitator Oliv.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon imitator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 197 n. 202.
Ichneumon imitator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 218 n. 69.
Ichneumon imitator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 986 n. 146.

immaculatus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 60 n. 191.
Ichneumon immaculatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2698 n. 260.

imminuitor Christ![1] — ♀ ♂ — Eur.
Ichneumon imminuitor Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 369; T. 39 F. 5.
Ichneumon imminuitor Holmgren, Ichneum. Suec. III. 1829 p. 991 n. 154, ♀ ♂.
immisericors Tischb. — ♀ — Eur.: Austria inf., Bavaria.
Ichneumon immisericors Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 285 n. 14, ♀.
Ichneumon immisericors Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 182 n. 30, ♀.
Ichneumon immisericors Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 620 n. 93, ♀.
immundus Tischb. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon immundus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLIII. 1882 p. 475 n. 1, ♂.
Ichneumon immundus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 214 n. 207, ♂.
impavidus Tosqu. — ♀ — Afr.: Sierra Leone.
Ichneumon impavidus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 21 n. 8, ♀.
imperialis Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 71 n. 367.
Ichneumon imperialis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2722 n. 409.
Ichneumon imperialis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1058 n. 279.
imperiosus Wesm. — ♀ — Eur.: Germania, Hungaria.
Ichneumon imperiosus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 361 (Ot. p. 10) n. 6, ♀.
Ichneumon imperiosus Berthoumieu, Ann. soc. entom France LXIII. 1894 p. 556 n. 52, ♀.
impressor Zett.[2] — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon impressor Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 361 n. 13, ♀.
Ichneumon nigricornis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 28 [n. 13, ♀ ♂.
Ichneumon impressor Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 30 n. 14, ♀ ♂.
Ichneumon inquilinus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 35 n. 18, ♂.
Ichneumon nigricornis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 376 n. 19, ♀ ♂.
Ichneumon impressor Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 101 n. 15, ♀ ♂.
Ichneumon impressor Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 24 n. 14, ♀.
Ichneumon impressor Nerén, Entom. Tidsskr. VI. 1885 p. 169.
Ichneumon impressor Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 15 n. 10.
Ichneumon (Coelichneumon) impressor Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1910 n. 21.
Ichneumon impressor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 541 n. 21, ♀ ♂.
Ichneumon impressor Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 354.
impressus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 65 n. 265.
Ichneumon impressus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2704 n. 320.
Ichneumon impressus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1037 n. 238.
impressus Thunbg.! — Eur.: Britannia.
Ichneumon impressus Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon impressus Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 314.
improvidus Smith — ♂ — Eur.: Japonia.
Ichneumon improvidus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 389 n. 7, ♂.
impudicatus Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon impudicatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 154 n. 39, ♀.
impudicus Berth. — ♀ — Eur.: Russia.
Ichneumon impudicus (Eversmann) Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 597 [n. 51, ♀.
impugnator Schrank — ♀ ♂ — Eur.: Austria.
Ichneumon impugnator Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 368 n. 744, ♀.
Ichneumon impugnator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 183 n. 147.

---

[1]) *Lep.:* Bombyx neustriae (Christ).
[2]) *Lep.:* Gortyna ochracea (Bridgman), Charaeas graminis (Thomson).

Ichneumon impugnator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2698 n. 174.
Ichneumon impugnator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 222 n. 96.
Ichneumon impugnator Schrank, Fauna Boica II. P. 2. 1802 p. 300 n. 2124, ♀ ♂.
Ichneumon impugnator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1051 n. 266, ♀ ♂.

incanescens Smith — ♀ — As. Japonia.
Ichneumon incanescens Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 390 n. 8, ♀.

incertorius Thunbg.! — Eur.
Ichneumon incertorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon incertorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 287.

incertus Sulz.! — Eur.: Helvetia.
Ichneumon incertus Sulzer, Abgek. Gesch. Insect. 1776 p. 199; T. 26 F. 16.

incomptus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Russia.
Ichneumon incomptus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 89 n. 52, ♀ ♂.
Ichneumon incomptus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 10 n. 56, ♀ ♂.
Ichneumon incomptus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 57, ♂.
Ichneumon incomptus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1929 n. 44.
Ichneumon incomptus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 578 n. 5, ♀ ♂.
Ichneumon incomptus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2396 n. 44.

inconstans Cress. — (♀) ♂ — Am.: Canada, Colorado.
Ichneumon inconstans Cresson, Proc. entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 153 n. 30, ♂.
Ichneumon inconstans Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 165 n. 98, ♂.
Ichneumon inconstans Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 323 n. 74, ♂ (♀).
Ichneumon inconstans Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 763 n. 74, ♂ (♀).

incrassator Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon incrassator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 157 n. 1826.
Ichneumon incrassator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1014 n. 204.

incrassatorius Vill.! — ♀ — Eur.: Italia.
Ichneumon incrassatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 158 n. 72.
Ichneumon incrassatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 215 n. 51.
Ichneumon incrassatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 939 n. 92, ♀.

incubitor L.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Linné, Acta Upsal. 1736 p. 125 n. 7.
Ichneumon incubitor Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 563 n. 25.
Ichneumon incubitor Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 402 n. 1602.
Ichneumon incubitor Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 933 n. 26.
Ichneumon incubitor Berkenhout, Outlin. Nat. Hist. Gr. Britain I. 1769 p. 165 n. 5.
Ichneumon incubitor Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 334 n. 40.
Ichneumon incubitor Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 850 n. 26.
Ichneumon vibex O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 154 n. 1793.
Ichneumon incubitor Fabricius, Reise n. Norwegen 1779 p. 64.
Ichneumon incubitor Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 427 n. 45.
Ichneumon incubitor Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 264 n. 53.
Ichneumon incubitor Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 160 n. 76.
Ichneumon incubitor Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2686 n. 26.
Ichneumon incubitor Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 42 n. 760.
Ichneumon incubitor Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 355; T. 36 F. 5.
Ichneumon incubitor Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 154 n. 86.
Ichneumon incubitor Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 159 n. 490.
Ichneumon incubitor Schrökenstein, Verz. d. Halbkäfer etc. 1802 p. 26 n. 76.

---

1) *Lep.:* Philobia lituraria (Ratzeburg).

Ichneumon incubitor Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 57 n. 41.
Cryptus incubitor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 83 n. 53.
Ichneumon incubitor Latreille, Hist. nat. Crust & Insect. XIII. 1805 p. 182 n. 13.
Cryptus incubitor Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 265 n. 3776.
Ichneumon incubitor Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 64 n. 760.
Ichneumon incubitor Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 111, ♀.
Ichneumon (Cryptus) incubitor Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 7.
Ichneumon incubitor Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 139 n. 11.
Ichneumon incubitor Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284.
Cryptus incubitor Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 287.
Ichneumon sedulus Gravenhorst, Mem accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 339 n. 81, ♂.
Ichneumon incubitor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon incubitor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 299.
Ichneumon simulatorius Trentepol, Isis 1826 p. 236 n. 56, ♂.
Ichneumon sedulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 492 n. 204, ♂ [excl. ♀.
Ichneumon incubitor Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 617 n. 265, ♀.
Ichneumon incubitor Trentepol, Isis 1829 p. 932 n. 47, ♀.
Ichneumon incubitor Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª IV. 1835 p. 351 n. 11
Ichneumon sedulus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 191 n. 175, ♂ [excl. ♀.
Ichneumon incubitor Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 205 n. 217.
Ichneumon incubitor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 135 n. 11, ♀.
Ichneumon sedulus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 407 n. 55, ♂ [excl. ♀.
Ichneumon sedulus A. Costa, Ric. entom. monti Partenii 1858 p. 19 & 27 n. 27.
Ichneumon incubitor Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 77 n. 265.
? Ichneumon sedulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 44, ♂.
Ichneumon incubitor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 44, ♀.
Ichneumon incubitor Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 110 n. 101, ♀♂.
Ichneumon (Barichneumon) incubitor Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1963 n. 12.
Ichneumon incubitor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 253 n. 47, ♀♂.
var. **punctus** Berth. — ♂ — Eur.
Ichneumon incubitor var. punctus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 254. ♂.
incubitor Schrk.! — ♀ — Eur.: Austria.
Ichneumon incubitor Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 354 n. 714, ♀.
Ichneumon incubitor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 922 n. 68, ♀.
incubitor Scop.! — ♀ — Eur.: Carnia.
Ichneumon incubitor Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 283 n. 745; T. 40 F. 745.
Ichneumon incubitor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 921 n. 67, ♀.
inculpator Oliv.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon inculpator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 184 n. 106.
Ichneumon inculpator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 58 n. 49.
incurvator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon incurvator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon incurvator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 320.
indagator Oliv.! — Eur.
Ichneumon indagator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 181 n. 87.
indemnis Cress. — ♀ ♂ — Am.: British Columbia.
Ichneumon indemnis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 172 n. 132, ♂.
Ichneumon indemnis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 349, ♀.
indivisor Thunbg.! —
Ichneumon indivisor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon indivisor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg XI. 1824 p. 329.

infernalis Grav.! — ♀ — Eur.: Italia.
Ichneumon infernalis Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 359 n. 106, ♀.
infestor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon infestor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273.
Ichneumon infestor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 344.
infidelis Cress. — ♂ — Am.: Connecticut, Massachusetts.
Ichneumon infidelis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 296, ♂.
Ichneumon infidelis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 155 n. 55, ♂.
infidus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia, Belgia, Germania. [n. 64.
? Ichneumon annulator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 67
Ichneumon infidus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 166 (Mant. p. 34), ♀ ♂.
? Ichneumon liostylus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 12 n. 62, ♀.
Ichneumon infidus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 262 n. 59, ♀ ♂.
inflammatorius Vill.! — ♀ ♂ — Eur.: Italia.
Ichneumon inflammatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 143 n. 27, ♀ ♂.
Ichneumon inflammatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 168 n. 22.
Ichneumon inflammatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 891 n. 24.
infucatus Cress. — ♂ — Am.: Colorado, California, Vancouvers Island.
Ichneumon infucatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 252 n. 17, ♂.
Ichneumon infucatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 166 n. 99, ♂.
infulatus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon infulatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 12 n. 20, ♀.
inops Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Russia.
Ichneumon inops Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 83 n. 73-74, ♀.
Ichneumon inops Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1940 n. 71.
?Ichneumon inops Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 593 n. 42, ♀.
inornatus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon inoratus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 120 n. 42, ♂.
inquietus Cam. — As.: Ceylon.
Ichneumon inquietus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 10.
inquinatus Wesm. — ♀ ♂ — Eur. centr.
Ichneumon salicatorius var. 5 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 245, ♀.
Ichneumon luctatorius var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 413, ♂.
Ichneumon inquinatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 53 [n. 46, ♀ ♂.
Ichneumon inquinatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 154 (Mant. [p. 21), ♀ ♂.
Ichneumon crassorius Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 10 n. 71, ♀ ♂.
Ichneumon inquinatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 458 (Doc. p. 18) [n. 10, ♀ ♂.
Ichneumon inquinatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 387 n. 67, ♀ ♂.
Ichneumon inquinatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 105 & 215 n. 40, ♀ ♂.
Ichneumon inquinatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 660 n. 173, ♀ ♂.
inquisitor Ol.! — Am.: Cayenna.
Ichneumon inquisitor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 181 n. 88.
insidiator Tischb. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon insidiator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 287 n. 17, ♂.
? Exephanes femoralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 36, ♀ ♂.
Ichneumon insidiator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 283 n. 24 & p. 340.
Ichneumon insidiator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 626 n. 104, ♂.

Ichneumon incubitor Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 57 n. 41.
Cryptus incubitor Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 83 n. 53.
Ichneumon incubitor Latreille, Hist. nat. Crust & Insect. XIII. 1805 p. 182 n. 13.
Cryptus incubitor Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 265 n. 3776.
Ichneumon incubitor Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 64 n. 760.
Ichneumon incubitor Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 111, ♀.
Ichneumon (Cryptus) incubitor Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 7.
Ichneumon incubitor Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 139 n. 11.
Ichneumon incubitor Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284.
Cryptus incubitor Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 287.
Ichneumon sedulus Gravenhorst, Mem accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 339 n. 81, ♂.
Ichneumon incubitor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon incubitor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 299.
Ichneumon simulatorius Trentepol, Isis 1826 p. 236 n. 56, ♂.
Ichneumon sedulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 492 n. 204, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon incubitor Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 617 n. 265, ♀.
Ichneumon incubitor Trentepol, Isis 1829 p. 932 n. 47, ♀.
Ichneumon incubitor Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2a IV. 1835 p. 351 n. 11.
Ichneumon sedulus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 191 n. 175, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon incubitor Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 205 n. 217.
Ichneumon incubitor Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 135 n. 11, ♀.
Ichneumon sedulus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 407 n. 55, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon sedulus A. Costa, Ric. entom. monti Partenii 1858 p. 19 & 27 n. 27.
Ichneumon incubitor Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 77 n. 265.
? Ichneumon sedulus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 44, ♂.
Ichneumon incubitor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 44, ♀.
Ichneumon incubitor Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 110 n. 101, ♀♂.
Ichneumon (Barichneumon) incubitor Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1963 n. 12.
Ichneumon incubitor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 253 n. 47, ♀♂.

var. **punctus** Berth. — ♂ — Eur.
Ichneumon incubitor var. punctus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 254, ♂.

incubitor Schrk.! — ♀ — Eur.: Austria.
Ichneumon incubitor Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 354 n. 714, ♀.
Ichneumon incubitor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 922 n. 68, ♀.

incubitor Scop.! — ♀ — Eur.: Carnia.
Ichneumon incubitor Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 283 n. 745; T. 40 F. 745.
Ichneumon incubitor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 921 n. 67, ♀.

inculpator Oliv.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon inculpator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 184 n. 106.
Ichneumon inculpator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 58 n. 49.

incurvator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon incurvator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon incurvator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 320.

indagator Oliv.! — Eur.
Ichneumon indagator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 181 n. 87.

indemnis Cress. — ♀ ♂ — Am.: British Columbia.
Ichneumon indemnis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 172 n. 132, ♂.
Ichneumon indemnis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 349, ♀.

indivisor Thunbg.! —
Ichneumon indivisor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon indivisor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg XI. 1824 p. 329.

infernalis Grav.! — ♀ — Eur.: Italia.
Ichneumon infernalis Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 359 n. 106, ♀.
infestor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon infestor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273.
Ichneumon infestor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 344.
infidelis Cress. — ♂ — Am.: Connecticut, Massachusetts.
Ichneumon infidelis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 296, ♂.
Ichneumon infidelis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 155 n. 55, ♂.
infidus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia, Belgia, Germania. [n. 64.
? Ichneumon annulator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p.67
Ichneumon infidus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 166 (Mant. p.34), ♀ ♂.
? Ichneumon liostylus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 12 n. 62, ♀.
Ichneumon infidus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 262 n. 59, ♀ ♂.
inflammatorius Vill.! — ♀ ♂ — Eur.: Italia.
Ichneumon inflammatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 143 n. 27, ♀ ♂.
Ichneumon inflammatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 168 n. 22.
Ichneumon inflammatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 891 n. 24.
infucatus Cress. — ♂ — Am.: Colorado, California, Vancouvers Island.
Ichneumon infucatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 252 n. 17, ♂.
Ichneumon infucatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 166 n. 99, ♂.
infulatus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon infulatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 12 n. 20, ♀.
inops Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Russia.
Ichneumon inops Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 83 n. 73-74, ♀.
Ichneumon inops Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1940 n. 71.
?Ichneumon inops Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 593 n. 42, ♀.
inornatus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon inoratus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 120 n. 42, ♂.
inquietus Cam. — As.: Ceylon.
Ichneumon inquietus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 10.
inquinatus Wesm. — ♀ ♂ — Eur. centr.
Ichneumon salicatorius var. 5 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 245, ♀.
Ichneumon luctatorius var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 413, ♂.
Ichneumon inquinatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 53 [n. 46, ♀ ♂.
Ichneumon inquinatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 154 (Mant. [p. 21), ♀ ♂.
Ichneumon crassorius Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 10 n. 71, ♀ ♂.
Ichneumon inquinatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 458 (Doc. p. 18) [n. 10, ♀ ♂.
Ichneumon inquinatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 387 n. 67, ♀ ♂.
Ichneumon inquinatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 105 & 215 n. 40, ♀ ♂.
Ichneumon inquinatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 660 n. 173, ♀ ♂.
inquisitor Ol.! — Am.: Cayenna.
Ichneumon inquisitor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 181 n. 88.
insidiator Tischb. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon insidiator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 287 n. 17, ♂.
? Exephanes femoralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 36, ♀ ♂.
Ichneumon insidiator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 283 n. 24 & p. 340.
Ichneumon insidiator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 626 n. 104, ♂.

insidiens Oliv.! — Eur.
Ichneumon insidiens Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 184 n. 101.
insidiosus Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon extensorius var. 2 & 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 269 n. 89, ♀.
Ichneumon insidiosus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 46 [n. 39, ♀.
Ichneumon insidiosus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 6, ♀.
Ichneumon emancipatus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 98 n. 58, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon insidiosus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 109 n. 63, ♀ ♂.
Ichneumon insidiosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 385 n. 56, ♀.
Ichneumon insidiosus Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 32; T. 20 F. 8.
? Ichneumon insidiosus Kriechbaumer, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 122-129, ♂.
Ichneumon insidiosus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1937 n. 63.
Ichneumon insidiosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 611 n. 76, ♀ ♂.
Ichneumon insidiosus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2398 n. 63.
var. **affector** Tischb. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Ichneumon affector Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 27 n. 11, ♀.
Ichneumon affector Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 329 n. 55, ♀.
Ichneumon insidiosus var. affectator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 612, ♀.
insignis Berth. — ♀ — Eur.: Italia.
Ichneumon insignis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 595 n. 47, ♀.
insignitus Costa — ♀ — Eur.: Sardinia.
Ichneumon insignitus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. P. 2. 1883 p. 99, ♀.
Ichneumon insignitus A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XV. 1884 p. 337.
insinuator Rossi! — Eur.: Italia.
Ichneumon insinuator Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 118 n. 259.
insolens Cress.[1]) — ♀ ♂ — Am.: United States.
Ichneumon insolens Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 302, ♀ ♂.
Joppa Canadensis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 336.
Ichneumon insolens Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 174 n. 141, ♀ ♂.
Ichneumon insolens Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 361 n. 56, ♀.
Ichneumon insolens Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 286 n. 56, ♀.
insolitus Walk. — ♀ ♂ — As.: Japonia.
Ichneumon insolitus Walker, Cistula entom. I. P. 11. 1874 p. 302 n. 4, ♀ ♂.
insperatus D. T. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Ichneumon instabilis Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1897 p. 255 n. 25, ♀ [nec Cresson].
Ichneumon insperatus m.
instabilis Cress.[2]) — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon instabilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 303, ♀ ♂.
Ichneumon instabilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 177 n. 160, ♀ ♂.
Ichneumon instabilis Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 358 n. 50, ♀ ♂.
Ichneumon instabilis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 284 n. 50, ♀ ♂.
Ichneumon instabilis Howard, Proc. Entom. Soc. Washington I. 1888 p. 95.
Ichneumon instabilis Howard, Scudder: Butterflies U. S. 1889 p. 1877, ♀ ♂.
instigator Rossi! — ♀ — Eur.: Italia.
—— Degeer, Mém. hist. Insect. III. 1773 p. 597 n. 3; T. 30 F. 18.
—— Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. III. 1780 p. 597; T. 30 F. 18.
Ichneumon instigator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 47 n. 774, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Vanessa antiopa (Harrington, Cresson).
[2]) *Lep.:* Oeneis semidea, Phyciodes tharos (Howard).

Ichneumon instigator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 181 n. 86.
Ichneumon instigator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 71 n. 774.
Ichneumon instigator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1019 n. 211, ♀.

insularis Smith — ♀ ♂ — As.: Key, Celebes.
Ichneumon insularis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 170 n. 1, ♀.
Ichneumon insularis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 59 n. 1, ♂.

intaminatus Cam. — ♂ — As.: Mussoori.
Ichneumon intaminatus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 3, ♂.

integratus Cam. — As.: India.
Ichneumon integratus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 11.

intentus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon intentus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 15 n. 27, ♂.

intermixtus Tischb. — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon intermixtus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 25 n. 8, ♀.
Ichneumon finitimus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 25 n. 9, ♀.
Ichneumon intermixtus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 613 n. 77b, ♀.

interruptor Thunbg.! — Eur.: Britannia, Suecia.
Ichneumon interruptor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 266.
Ichneumon interruptor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 324.

interruptorius Fabr.! — Eur.: Austria.
Ichneumon LXXXIV Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. 1768; T. 205 F. 6.
Ichneumon interruptorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 57 n. 17.
Ichneumon interruptorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 65.
Ichneumon interruptorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♀.
Ichneumon interruptorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253.
Ichneumon interruptorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 290.
Ichneumon interruptorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 884 n. 17.

intersector Tischb. — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon intersector Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXIX. 1868 p. 251 n. 6, ♀.
Ichneumon intersector Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 558 n. 9, ♀.

intersectus Fourcr. — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 348 n. 61.
Ichneumon intersectus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 414 n. 62.

intratorius Fabr.! — Afr.: Barbaria.
Ichneumon intratorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 132 n. 2.
Ichneumon intratorius Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 49; T. 11 F. 7.
Ichneumon intratorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 55 n. 3.
Ichneumon intratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255.
Ichneumon intratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 295.

intricator Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Tirolia.
Ichneumon intricator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 372 (Misc. p. 13). [n. 8, ♀.
? Ichneumon jucundus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXIX. 1868 p. 249 n. 4, ♂.
? Ichneumon jucundus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 438.
Ichneumon intricator Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 174 n. 19, ♀ ♂.
Ichneumon intricator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 654 n. 159, ♀ ♂.

intrudens Smith — ♀ — As.: Japonia.
Ichneumon intrudens Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 391 n. 13, ♀.

inurbanus Cress. — ♀ — Am.: Virginia, Colorado.
Ichneumon inurbanus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 302, ♀.
Ichneumon inurbanus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 173, ♀.

inutilis Wesm. — ♂ — Eur. [n. 19, ♂.
Ichneumon inutilis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 384 (Misc. p. 25)
Ichneumon inutilis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 592 n. 40, ♂.
invectus Smith — ♀ — Austr.: New Zealand.
Ichneumon invectus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 475, ♀.
Ichneumon invectus, Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 120, ♀.
inversus Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 358 n. 84.
Ichneumon inversus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 422 n. 85.
Ichneumon inversus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 191 n. 183.
Ichneumon inversus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1049 n. 263.
inversus Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon inversus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 363 n. 65, ♀.
Ichneumon inversus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 248 n. 37, ♀♂.
investigator Rossi! — Eur.: Italia.
Ichneumon investigator Rossi, Mant. Insect. II. 1792 App. p. ? n. 84.
Ichneumon investigator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 972 n. 129.
invisor Thunbg.! — Eur.: Britannia.
Ichneumon invisor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon invisor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 338.
invisus Tischb.! — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon invisus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 134 n. 244, ♂.
involutus Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Ichneumon involutus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 183 n. 73, ♀.
Ichneumon involutus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 169 n. 114, ♀.
jocosus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon jocosus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 53 n. 53, ♀.
Ichneumon jocosus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 187.
jodopterus Spin. — ♀ ♂ — Am.: Chile.
Ichneumon jodopterus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 476 n. 4, ♀ ♂.
irrigator Panz.! — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon irrigator Panzer, Faun. Insect. German. VI. 1799 P. 71 T. 16.
Cryptus irrigator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 70.
Ichneumon irrigator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 914 n. 56, ♀.
irrorator Smith — ♀ — As.: Japonia.
Ichneumon irrorator Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 390 n. 10, ♀.
ischioleucus Brullé — ♀ — Austr.: Tasmania.
Ichneumon ischioleucus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 310 n. 19, ♀.
jucundus Brullé[1]) — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon xanthorius var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 361 n. 139, ♂.
Ichneumon jucundus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 305 n. 10, ♀.
Ichneumon jucundus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 166 n. 102, ♀.
Ichneumon jucundus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 354 n. 39, ♀.
Ichneumon jucundus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 280 n. 39, ♀.
jugiosus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon jugiosus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 9 n. 13, ♀.
junceus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon junceus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 116 n. 18, ♂.

---

[1]) *Lep.*: Hadena devastatrix (Brace), Tephrosia extersaria (Bignell).

junior Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon junior Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273.
Ichneumon junior Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 343.
juniperinus Ström! — Eur.: Dania.
Ichneumon juniperinus Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. Nya Saml. III. 1788 p. ?
ixia Cam. — ♀ — Austr.
Ichneumon Ixia Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 P. 1. p. 13, ♀.
izucarus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon Izucarus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 114 n. 14, ♀ ♂.
labialis Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 356 n. 78.
Ichneumon labialis Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 420 n. 79.
Ichneumon labialis Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 211 n. 25.
Ichneumon labialis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1024 n. 216.
labiatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon labiatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 276.
Ichneumon labiatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 352.
laborator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon laborator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273.
Ichneumon laborator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 344.
labyrinthella Bjerk.![1]) — Eur.: Suecia.
Ichneumon labyrinthellae Bjerkander, Svensk. Vet.-Akad. nya Handl. XI. 1790 p. 132-135.
Ichneumon labyrinthellae Bjerkander, Svensk. Vet.-Akad. nya Handl. XI. 1792 p. 124-127.
lacrimans Prov. — ♂ — Am.: Canada, New Hampshire.
Ichneumon lachrymans Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 78.
Ichneumon lachrymans Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 171 n. 124, ♂.
Ichneumon lachrymans Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 357 n. 46, ♂.
Ichneumon lachrymans Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 282 n. 46, ♂.
lacrimator Fonsc. — ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon lacrymator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 403 n. 50, ♂.
Ichneumon lacrymator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 547 n. 32, ♂.
var. **calabrarius** Costa — ♂ — Eur.: Gallia, Italia.
Ichneumon Calabrarius A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli I. P. 2. 1863 p. 37, ♂; T. 2 F. 9.
Ichneumon Calabrarius A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 8. 1886 p. 31.
Ichneumon Calabrarius Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 210 n. 2, ♂.
Ichneumon Calabrarius A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 119.
Ichneumon lacrymator var. Calabrarius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 547, ♂.
laedator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon laedator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 264.
Ichneumon laedator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 318.
laetus Brullé — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon parata Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 228 n. 6 [non 1828].
Ichneumon laetus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 303 n. 7, ♀ ♂.
Ichneumon parata Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 686 n. 6.
Ichneumon laetus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 300.
Ichneumon laetus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 163 n. 88, ♂.
Ichneumon laetus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 351 n. 32, ♀ ♂.
Ichneumon laetus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 277 n. 32, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Phalaena sagitella, Ph. labyrinthella (Bjerkander).

lalandei Brullé — ♀ ♂ — Afr.: Cap.
Ichneumon Lalandei Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 307 n. 14, ♀.
Ichneumon Lalandei Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 395 n. 9, ♂.
Ichneumon Lalandei Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 19 n. 7, ♂.
lamentator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon lamentator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon lamentator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 301.
lancea D. T. — ♀ — Eur.: Bavaria. [Walker].
Ichneumon lanceolatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 259 n. 57, ♀ [nec
Ichneumon lanceolatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 273 n. 78, ♀.
Ichneumon lancea m.
lanceolatus Walk. — ♂ — As.: Japonia.
Ichneumon lanceolata Walker, Cistula entom. I. P. 11. 1874 p. 302 n. 3, ♂.
languidus Wesm. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Ichneumon luctuosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 200, ♂ [p. p.].
Ichneumon semiorbitalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 213, ♂. [n. 45, ♀♂.
Ichneumon languidus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 52
Ichneumon languidus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 22 n. 54, ♂.
Ichneumon languidus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 6, ♂.
Ichneumon languidus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 387 n. 64, ♀♂.
Ichneumon languidus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 40, ♀♂.
Ichneumon languidus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 104 n. 31, ♀ ♂.
Ichneumon languidus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1232 n. 13.
Ichneumon languidus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 597 n. 51, ♀♂.
var. **hispanicus** Berth. — ♂ — Eur.: Hispania. [p. 597, ♂.
Ichneumon languidus var. Hispanicus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894
var. **nigrocastaneus** Tischb. — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon nigrocastaneus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 180 n. 23, ♀.
Ichneumon nigrocastaneus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 338 n. 71.
Ichneumon languidus var. nigrocastaneus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII.
lanio Schrk.! — Eur.: Germania. [1894 p. 597, ♀.
Ichneumon lanio Schrank, Gistl: Faunus N. F. I. 1837 p. 14.
lanius Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon lanius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 499 n. 204b, ♂.
Phygadeuon terminatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 663 n. 164, ♀.
Ichneumon lanius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 192 n. 176.
Phygadeuon lanius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VIII. P. 1. 1840 p. 360. [♀♂.
Ichneumon lanius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 105 n. 114,
Ichneumom lanius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 15, ♀ ♂.
Ichneumon lanius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 158 n. 94, ♀ ♂.
Ichneumon lanius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 412 n. 164, ♀♂.
Ichneumon lanius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 46, ♀ ♂.
Ichneumon lanius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 211 n. 81, ♀ ♂.
Ichneumon lanius Möller, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 93, ♀.
Ichneumon lanius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 16 n. 79.
Ichneumon (Cratichneumon) lanius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1953 n. 21.
Ichneumon lanius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 297 n. 101, ♀ ♂.
lariae Curt.[1]) — ♀ — Am. arct., Groenlandia.
Ichneumon Lariae Curtis, Descr. Insects Cl. Ross. 2d Voy. 1831 App. p. LXI n. 1; Tab. A F. 1.

---

[1]) *Lep.:* Laria Rossii (Curtis).

Ichneumon Lariae Erichson, Wiegmann: Arch. f. Naturgesch. II. P. 1. 1836 p. 287 n. 3.
Ichneumon Lariae Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 207. [F. 11 & 11a.
Ichneumon Lariae Aurivillius, Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. XV. P. 4. 1893 p. 31 n. 16, ♀; T. 3

lariceus Cam. — Am.: Mexico.
Ichneumon lariceus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 35. 1885 Hymen. I. p. 147 n. 24; T. 7 F. 9.

larvicida Scharfbg.! — Eur.: Germania. [III. 1805 p. 972 n. 34.
Ichneumon larvicida Scharfenberg, Bechstein & Scharfenberg: Naturg. schädl. Forstinsect.

larvincola Scharfbg.! [1]) — Eur.: Germania. [III. 1805 p. 962 n. 17b.
Ichneumon larvincola Scharfenberg, Bechstein & Scharfenberg: Naturg. schädl. Forstinsect.
Ichneumon larvincola Bechstein, Forstinsectol. 1818 p. 144 n. 296 & p. 495 n. 10.
Ichneumon larvincola Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1032 n. 228.

lascivus Cress. — ♂ — Am.: Illinois.
Ichneumon lascivus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 309, ♂.
Ichneumon lascivus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 179 n. 167, ♂.

lateralis Kriechb. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Ichneumon lateralis Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VII. 1887 p. 305, ♂.
Ichneumon lateralis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 596 n. 49, ♂.

laterator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon laterator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 267.
Ichneumon laterator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 327.

laterătorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon lateratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279.
Ichneumon lateratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 362.

laterimacula Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Ichneumon laterimacula Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 481 n. 11, ♀.

lativentris Kriechb. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Ichneumon lativentris Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 51 n. 4, ♂.
Ichneumon lativentris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 627 n. 107, ♂.

latorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon latorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon latorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 285.

latrator Fabr. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon latrator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 431 n. 69, ♂.
Ichneumon latrator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 266 n. 85, ♂.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 68 n. 310.
Ichneumon latrator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 176 n. 123, ♂.
Ichneumon latrator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2692 n. 149, ♂.
Ichneumon crassipes Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2709 n. 361, ♀.
Ichneumon latrator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 188 n. 123, ♂.
Ichneumon latrator Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 167 n. 139, ♂.
Ichneumon oblongus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 295 n. 2113.
Ichneumon geniculator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 257 n. 3739.
Ichneumon latrator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 353 n. 98, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon latrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 572 n. 242, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon crassipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 622 n. 267, ♀.
Ichneumon latrator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 200 n. 202.
Ichneumon crassipes Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 206 n. 219.
Ichneumon latrator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 63 [n. 58, ♀ ♂ [excl. var.].

---

[1]) *Hymen.*: Tenthredo pinastri (Scharfenberg).

Ichneumon latrator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 162 (Mant. p. 29), ♀ ♂.
Ichneumon latrator Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 363 n. 43, ♂.
Ichneumon latrator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 7, ♀ ♂.
Ichneumon latrator Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 87 n. 51, ♀ ♂.
Ichneumon latrator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 202, ♂.
Ichneumon crassipes Marshall, Entom. M. Magaz. V. 1868 p. 155, ♀.
Ichneumon latrator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 393 n. 87, ♀ ♂.
Ichneumon latrator Marshall, Entomol. Annual f. 1874 p. 128.
Ichneumon latrator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 40, ♀ ♂.
Ichneumon latrator Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 57, ♀ ♂; F. 36 F. 45.
Ichneumon latrator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 182 (♀) & 213 (♂) n. 45.
Ichneumon latrator Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 9 n. 53, ♀ ♂.
Ichneumon latrator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1928 n. 40.
Ichneumon latrator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 576 n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon latrator Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2395 n. 40.

forma **means** Grav. — ♀ — Eur. centr.
Ichneumon (Brachypterus) means Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 675 n. 291, ♀.
Brachypterus means Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 210 n. 1; T. 40 F. 2.
Brachypterus means Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 306 n. 1.
Brachypterus means Westwood, Introd. mod. classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 57.
Brachypterus means Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 313 n. 1, ♀.
Pterocormus means Förster, Arch. f. Naturg. XVI. P. 1. 1850 p. 72, ♀.
Brachypterus means Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 84 n. 291; [Fig.
Pterocormus means Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 60, ♀ ♂.
Brachypterus means Marshall, Entom. M. Magaz. III. 1867 p. 190.
Pterocormus means Cameron, Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow II. 1875 p. 304.
Ichneumon latrator forma brachypterus Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 57, ♀; T. 36 F. 6.

lautipes Berth. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Ichneumon lautipes Berthoumieu, Rev. sc. Bourbonnais IX. 1896 p. 195.
Ichneumon lautipes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 397, ♂.

legator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon legator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 268.
Ichneumon legator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 331.

lenis Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon lenis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 20 n. 37, ♀.

lenoginator Rossi! — Eur.: Italia.
Ichneumon lenoginator Rossi, Mant. Insect. II. 1792 p. 124 n. 273.

leodacus Cam. — ♂ — Austr.
Ichneumon leodacus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 P. 1. p. 19, ♂.

lepidus Grav. [1]) — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon suavis Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 312 n. 47, ♀.
Ichneumon suavis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 348 n. 133, ♀ [excl. var. 1].
Ichneumon lepidus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 349 n. 134, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon lepidus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 98 n. 104, [♂ [excl. ♀].
Ichneumon lepidus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 66 n. 27, ♀.
Ichneumon lepidus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 44 n. 134.
Ichneumon lepidus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 177 n. 106, ♀ ♂.
Ichneumon lepidus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 409 n. 150, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Depressaria Heracliana (Bridgman).

Ichneumon lepidus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 44, ♀ ♂
Ichneumon lepidus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 181 n. 90, ♀ ♂.
Ichneumon lepidus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 109 n. 96, ♀ ♂.
Ichneumon (Barichneumon) lepidus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1962 n. 9.
Ichneumon lepidus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 246 n. 33, ♀ ♂

var. **fallax** (Grav.) D. T. — ♂ — Eur.
Ichneumon fallax Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 351 n. 135, ♂. [p.47 n.135.
Ichneumon lepidus var. fallax Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.)
Ichneumon lepidus var. fallax Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 246, ♂.
Ichneumon suavis var. fallax m.

leprieuri Spin. — ♀ — Am.
Ichneumon Leprieuri Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 166 n. 21, ♀.

leptoneurus Grav.! — ♀ ♂ — Eur.: Italia.
Ichneumon leptoneurus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 387 n. 140, ♀ ♂.

leptostigma Kriechb.[1] — ♂ — Eur.: Austria inf.
Ichneumon leptostigma Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 27, ♂.
Ichneumon leptostigmus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 606 n. 64, ♂.

leucacanthus Kaw.! — ♀ — Eur.: Russia.
Ichneumon leucacanthus Kawall, Bull. soc. natural. Moscou XLI. P. 4. 1868 p. 506 n. 2, ♀.

leucaniae Fitch — Am.: New York, Missouri.
Ichneumon Leucaniae Fitch, 6th Rep. Insects New York 1860 p. 126.
Ichneumon Leucaniae Riley, 2nd Ann. Rep. Insect. Missouri 1870 p. 53.
Ichneumon Leucaniae Riley, 8th Ann. Rep. Insect. Missouri 1876 p. 54.
Ichneumon Leucaniae Packard, 9th Rep. U. St. Geol. & Geogr. Surv. f. 1875. 1877 p. 706

leucocerus Grav.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon leucocerus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 289 n. 17, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon semiorbitalis Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 290 n. 18, ♂.
Ichneumon leucocerus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 208 n. 60, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon semiorbitalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 212 n. 63, ♂.
Ichneumon leucocerus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 6 n. 2, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon semiorbitalis Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 12 n. 23.
Ichneumon leucocerus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 148 n. 61, ♀ [[excl. ♂].
Ichneumon semiorbitalis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 149 n. 63.
Ichneumon leucocerus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 30 [n. 18, ♀ ♂ [excl. var. ♂].
Ichneumon leucocerus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 30 n. 6, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon leucocerus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 24 n. 60, ♀
Ichneumon semiorbitalis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 25 [n. 63, ♂.
Ichneumon leucocerus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 5, ♀ ♂.
Ichneumon leucocerus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 22 n. 10, ♀ ♂.
Ichneumon leucocerus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 202, ♂.
Ichneumon leucocerus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 293 n. 60, ♀ ♂.
Ichneumon semiorbitalis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 298 n. 63, ♂.
Ichneumon leucocerus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 453 (Doc. p. 13) [n. 7, ♀ ♂.
Ichneumon leucocerus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 377 n. 25, ♀ ♂.

---

[1] *Lep.:* Gnophus pullata? (Rogenhofer).
[2] *Lep.:* Acronycta megacephala (Giraud).

Ichneumon leucocerus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 350 n. 12, ♀ ♂.
Ichneumon leucocerus Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 32, ♂; T. 20 F. 6.
Ichneumon leucocerus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 38, ♀ ♂.
Ichneumon leucocerus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 103 n. 9, ♀ ♂.
Ichneumon (Coelichneumon) leucocerus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1904 n. 7.
Ichneumon leucocerus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 539 n. 16, ♀ ♂.

leucocheilus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Belgia, Germania.
Ichneumon leucocheilus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 89 [n. 92, ♂.
Ichneumon leucocheilus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 176 (Mant. [p. 43), ♀.
Ichneumon leucocheilus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 387 (Ot. p. 36) n. 35, ♂.
Ichneumon leucocheilus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 405 [n. 134, ♀ ♂.
Ichneumon leucocheilus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 251 n. 43, ♀ ♂.

leucocrepis Wesm. — ♂ — Eur.: Germania, Italia.
Ichneumon leucocrepis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 391 (Ot. p. 40) n. 41, ♂.
Ichneumon leucocrepis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 564 n. 19, ♂.

leucogastricus Schrk.! — ♀ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon leucogastricus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 289 n. 2101, ♀.
Ichneumon leucogastricus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1062 n. 285, ♀.

leucolomius Grav. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Ichneumon leucolomius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 479 n. 196, ♀.
Ichneumon salutator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 402 n. 49, ♀ [non [Rossi].
Ichneumon dissectus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 404 n. 51, ♂.
Ichneumon salutator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 336 (Mant. p. 99), ♀.
Ichneumon leucolomius Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 60 [n. 196, ♀.
Ichneumon leucolomius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 374 n. 9, ♀ ♂.
Ichneumon leucolomius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 570 n. 82, ♀ ♂.

leucomelanus Tischb. — ♂ — Eur.: Italia.
Ichneumon leucomelanus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLIII. 1882 p. 480 n. 9, ♂.
Ichneumon albipictus var. leucomelanus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1895 [p. 240, ♂.

leucomelas Ström! — Eur.: Dania.
Ichneumon leucomelas Ström, Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768 p. 350 n. 66.
Ichneumon albatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 152 n. 1760.
Ichneumon leucomelas Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 887 n. 21.

leucomelas Gmel.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon XIII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1766; T. 20 F. 11.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 57 n. 146 & 150.
Ichneumon leucomelas Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2679 n. 227.
? Ichneumon brachyacanthus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2679 n. 229.
? Ichneumon nigratorius Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 29 n. 11.
Ichneumon albolineatus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 328 n. 67, ♂.
Ichneumon leucomelas Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 255 n. 85, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon albolineatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 450 n. 180, ♂.
? Ichneumon brachyacanthus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 895 n. 28.
Ichneumon leucomelas Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 18 n. 43.
Ichneumon binotatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 147.

---

[1]) *Lep.:* Noctua brunnea (Bignell).

Ichneumon leucomelas Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 158 n. 85, ♀ [[excl. ♂].
Ichneumon albolineatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 187 n. 161, ♂.
Ichneumon leucomelas Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 87 [n. 88, ♀ ♂.
Ichneumon leucomelas Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 12, ♀ ♂.
Ichneumon leucomelas Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 170 n. 102, ♀ ♂. [♀ ♂.
Ichneumon leucomelas Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 404 n. 129,
Ichneumon leucomelas Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 43, ♀ ♂.
Ichneumon leucomelas Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 105 (♀) & 214 (♂) n. 86.
Ichneumon leucomelas Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 106 n. 84, ♀ ♂.
Ichneumon (Melanichneumon) leucomelas Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1956 n. 3.
Ichneumon leucomelas Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 239 n. 19, ♀ ♂.

var. **punctus** Berth. — ♀ — Eur. [p. 239, ♀.
Ichneumon leucomelas var. punctus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895

leucopalpus Preyssl.! — Eur.: Bohemia.
Ichneumon leucopalpus Preyssler, Sammlg. physik. Aufs. III. 1793 p. 173.
Ichneumon leucopalpus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 997 n. 168.

leucopeltis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ichneumon leucopeltis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1230 n. 11, ♀.
Ichneumon leucopeltis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1927 n. 35.
Ichneumon leucopeltis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 664 n. 181, ♀.

leucophthalmus Thunbg.! — Afr.: Cap.
Ichneumon leucophthalmus Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258.
Ichneumon leucophthalmus Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 304.

leucopis Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 69 n. 324.
Ichneumon leucopis Gmelin, Linné, Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2718 n. 370.
Ichneumon leucopis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1040 n. 245.

leucopsis Ashm. — ♂ — Am.: California.
Ichneumon leucopsis Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XII. 1890 p. 391, ♂.

leucorrhous Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 68 n. 307.
Ichneumon leucorrhous Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2709 n. 358.
Ichneumon leucorrhous Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1063 n. 286.

leucotarsus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 69 n. 328.
Ichneumon leucotarsus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2718 n. 374.
Ichneumon leucotarsus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1041 n. 249.

leucotrochus Kriechb. — ♀ — Afr.
Ichneumon leucotrochus Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 299 n. 4, ♀.

leucurus Kriechb. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Ichneumon leucurus Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 53 n. 7, ♂.
Ichneumon leucurus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 245 n. 32, ♂.

levicoxatus Berth. — ♀ — As.: Transcaspia.
Ichneumon levicoxa Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 40 n. 11, ♀.
Ichneumon levicoxatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 250 n. 41, ♀.

leviculus Cress. — ♂ — Am.: New York, Virginia.
Ichneumon leviculus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 170 n. 118, ♂.

levifrons Holmgr. — ♀ ♂ — Afr.: Cap.
Ichneumon laevifrons Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 392 n. 4, ♀ ♂.

levis Kriechb.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia, Austria inf.
Ichneumon laevis Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 28, ♀ ♂.
Ichneumon laevis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 611 n. 74, ♀ ♂.
leviusculus Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Ichneumon laeviusculus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 493 n. 25, ♀.
lewisii Cress. — ♀ — Am.: United States.
Ichneumon Lewisii Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 177 n. 63, ♀.
Ichneumon Lewisii Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 307.
Ichneumon Lewisii Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 175 n. 144, ♀.
var. **sandix** Cress. — ♀ — Am.: New York.
Ichneumon sandix Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 174 n. 58, ♀.
Ichneumon Lewisii var. sandix Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 307.
libens Cress. — ♂ — Am.: United States.
Ichneumon libens Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 181 n. 176, ♂.
licitatorius Er.! — Austr.: Tasmania.
Ichneumon licitatorius Erichson, Arch. f. Naturg. VIII. P. 1. 1841 p. 256 n. 222.
lictor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon lictor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 267.
Ichneumon lictor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 327.
ligatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon ligatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277.
Ichneumon ligatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 353.
limatus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Hoplismenus limatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 24 n. 8, ♂.
Ichneumon limatus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 127 n. 71.
limbatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon limbatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277.
Ichneumon limbatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg XI. 1824 p. 353.
limbatus Tischb. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon limbatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 23 n. 5, ♂.
Ichneumon limbatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 559 n. 60, ♂.
limbifrons Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Ichneumon limbifrons Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 182 n. 70, ♂.
Ichneumon limbifrons Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 171 n. 126, ♂.
limitaris Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon limitaris Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 9 n. 14, ♂.
linearis Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 334 n. 30.
Ichneumon linearis Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 403 n. 30.
Ichneumon linearis Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 189 n. 172.
Ichneumon linearis Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 208 n. 13.
lineator Fabr.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon lineator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 432 n. 73.
Ichneumon biguttatus Thunberg, Nov. acta soc. sc. Upsal. IV. 1784 p. 24 n. 41, ♀.
Ichneumon lineator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 267 n. 89.

---

1) *Lep.:* Setina spec. (Kriechbaumer).

2) *Lep.:* Cymatophora octogesima (Mocsáry), Nonagria geminipuncta (Weston), Ypsipetes elutata (Boie), Eurranthis plumistraria (Giraud), Bryophila glandifera (Taschenberg), Noctua spec. (Stephens), Tortrix crataegana (Goureau), Aglia tau (Rondani).

Ichneumon lineator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 176 n. 125, ♂.
Ichneumon biguttatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2688 n. 126, ♀.
Ichneumon lineator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2692 n. 151, ♂.
Ichneumon lineator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 189 n. 127, ♂.
Ichneumon nigrator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 150 n. 68, ♀.
Ichneumon lineator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 168 n. 145, ♂.
Ichneumon nigrator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 65 n. 57, ♀.
Ichneumon narrator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 67 n. 76, ♂.
Ichneumon lineator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 87 n. 70, ♂.
Ichneumon nigrator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♀.
Ichneumon lineator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 107, ♂.
Ichneumon lineator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 283, ♂.
Ichneumon nigrator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 283, ♀.
Ichneumon lineator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 282 n. 5, ♀ ♂.
Ichneumon biguttorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 254, ♀.
Ichneumon fuscatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 254, ♀.
Ichneumon lineator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273, ♂.
Ichneumon narrator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 275, ♂.
Ichneumon biguttorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 290, ♀.
Ichneumon fuscatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 291, ♂.
Ichneumon lineator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 345, ♂.
Ichneumon narrator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 349, ♂.
Ichneumon narrator Trentepol, Revis. crit. gen. Ichneum. 1825 p. 21 n. 8, ♂.
Ichneumon nigrator Trentepol, Revis. crit. gen. Ichneum. 1825 p. 21 n. 9, ♀.
Ichneumon narrator Trentepol, Isis 1826 p. 68 n. 8, ♂.
Ichneumon nigrator Trentepol, Isis 1826 p. 68 n. 9, ♀.
Ichneumon lineator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 120 n. 9, ♀♂ [excl. var. 3, ♀].
Ichneumon lineator Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 7 n. 6.
Ichneumon lineator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 130 n. 9. ♀ ♂.
Ichneumon lineator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 359 n. 1, ♀ ♂. [n 1, ♀♂.
Ichneumon lineator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 21
Ichneumon lineator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 53 n. 2, ♀ ♂,
Ichneumon lineator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1848 p. 302 n. 2.
Ichneumon lineator Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 12 n. 11.
Ichneumon lineator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 3, ♀ ♂.
Ichneumon lineator Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 23 n. 11, ♀ ♂.
Ichneumon lineator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 201, ♀.
Ichneumon lineator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 235 n. 9, ♀♂.
Ichneumon lineator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 372 n. 1, ♀♂.
Ichneumon lineator Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 31; T. 20 F. 1.
Ichneumon lineator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 37, ♀ ♂.
Ichneumon lineator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 102, 103 & 210 n. 10, ♂.
Ichneumon (Coelichneumon) lineator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1908 n. 17.
Ichneumon lineator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 543 n. 25, ♀ ♂.

var. **caerulescens** Tischb. — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon coerulescens Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 22 n. 3, ♀.
Ichneumon lineator var. coerulescens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 544, ♀.

var. **numeratus** Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon lineator var. numeratus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 544, ♀.

var. **restaurator** Fabr. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon curtus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 355 n. 717, ♀.

Ichneumon restaurator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 165 n. 133 [p. p.].
Ichneumon restaurator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 67 n. 74 [p. p.].
Ichneumon restaurator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 112, ♂.
Ichneumon restaurator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 288 n. 15, ♂.
Ichneumon restitutor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 275 [p. p.].
Ichneumon restitutor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 349 [p. p.].
Ichneumon restauratorius Trentepol, Isis 1826 p. 237 n. 57.
Ichneumon restaurator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 197 n. 52, ♂ [p. p.].
Ichneumon restaurator Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 7 n. 6 [p. p.].
Ichneumon restaurator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 22 [p. 4, ♀ ♂ [p. p.].
Ichneumon restaurator Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 29 n. 2, [♀ ♂ [p. p.].
Ichneumon restaurator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 284 [n. 52, ♂ [p. p.].
Ichneumon restaurator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 373 [n. 7, ♀ ♂ [p. p.].
Ichneumon restaurator Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 31, ♂; T. 20 F. 2 [p. p.].
Ichneumon lineator var. restaurator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 544, ♀ ♂.

lineatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon lineatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279.
Ichneumon lineatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 361.

lineolatus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 57 n. 140.
Ichneumon lineolatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2678 n. 223.
Ichneumon lineolatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 877 n. 7.

lingulater Vill.! — Eur.
Ichneumon lingulator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 194 n. 193; T. 8 F. 5.
Ichneumon lingulator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 217 n. 60.
Ichneumon lingulator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1001 n. 179.

liocnemis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon rufinus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 28 n. 13, ♀ ♂ [nec Gravenhorst].
Ichneumon liocnemis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1220 n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon (Coelichneumon) liocnemis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1909 n. 19.
Ichneumon liocnemis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 548 n. 34, ♀ ♂.

liostylus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
? Ichneumon annulator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 67 [n. 64, ♂.
Ichneumon liostylus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 12 n. 62, ♀ ♂.
Ichneumon (Cratichneumon) liostylus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1950 n. 12.
Ichneumon (Cratichneumon) liostylus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2402 n. 12.

literator Thunbg. — Eur.: Suecia.
Ichneumon literator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 272.
Ichneumon literator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 340.

lituratus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 70 n. 342.
Ichneumon lituratus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2720 n. 387.
Ichneumon lituratus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1042 n. 252.

lividicornis Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 70 n. 340 & p. 71 n. 361.
Ichneumon lividicornis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 n. 2719 n. 385.
Ichneumon lividicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1087 n. 330.

lividulus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Ichneumon lividulus Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 10, ♀.
Ichneumon lividulus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 174 n. 140, ♀.
Ichneumon lividulus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 360 n. 55, ♀.
Ichneumon lividulus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 286 n. 55, ♀.
lividus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 69 n. 336.
Ichneumon lividus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2719 n. 382.
Ichneumon lividus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1076 n. 309.
locutor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon locutor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 267.
Ichneumon locutor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 326.
lombardii Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon Lombardii Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 395, ♀.
longaevus Heer — Eur. [T. 13 F. 11.
Ichneumon longaevus Heer, Neu. Denkschr. schweiz. Ges. Naturw. XI. 1850 p. 166 n. 73;
Ichneumon longaevus Giebel, Deutschl. Petrefact. 1852 p. 647.
Ichneumon longaevus Giebel, Fauna d. Vorwelt II. 1856 p. 154.
longeareolatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon longeareolatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 21 n. 29, ♀♂.
Ichneumon longeareolatus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1924 n. 24. [♀♂.
Ichneumon longeareolatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 652 n. 153,
longicornis Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 72 n. 378. [n. 415.
Ichneumon longicornis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2716 n. 213 & p. 2722
longicornis Vill.! — Eur.
Ichneumon longicornis Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 215 n. 265; T. 8 F. 8.
Ichneumon longicornis Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 219 n. 78.
Ichneumon longicornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 971 n. 128, ♀ ♂.
longipalpis Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 64 n. 256.
Ichneumon longipalpis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2703 n. 312.
Ichneumon longipalpis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1007 n. 188.
longipes Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 60 n. 193.
Ichneumon longipes Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2698 n. 262.
longisectus Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon longisectus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 618 n. 89, ♀.
longulus Cress. — ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon longulus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 171 n. 54, ♂.
Ichneumon longulus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 182 n. 185, ♂.
lotatorius Fabr. — Austr.: New Zealand.
Ichneumon lotatorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 330 n. 16.
Ichneumon lotatorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 423 n. 16.
Ichneumon lotatorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 261 n. 19.
Ichneumon lotatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2680 n. 91.
Ichneumon lotatorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 339.
Ichneumon lotatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 170 n. 30.
Ichneumon lotatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 141 n. 34.
Ichneumon lotatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 60 n. 30.
Ichneumon lotatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277.

Ichneumon lotatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 353.
Ichneumon lotatorius Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 119.
Priocnemis Pascoei W. F. Kirby, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 20.
Priocnemis Pascoei Waterhouse, Aid. Identific. Insect. II. 1883; T. 137 F. 7.
Ichneumon lotatorius Fitch, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. XXXVI.

lotorius Vill.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon lotorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 157 n. 68.
Ichneumon lotorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 215 n. 49.
Ichneumon lotorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 935 n. 88.

luctor Thunbg. — Afr.: Cap.
Ichneumon luctor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 272.
Ichneumon luctor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 342.

ludis Schrk.! — ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon ludis Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 266 n. 2062, ♂.
Ichneumon ludis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 965 n. 122.

lugubrator Grav.! — ♂ — Am. bor.
Ichneumon lugubrator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 256 n. 3729.
Ichneumon lugubrator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 541 n. 225, ♂.
Ichneumon lugubrator Kriechbaumer, Stettin. entom. Zeitg. XXXVI. 1875 p. 41 n. 3.

lugubris Berth. — ♀ — Eur.: Belgia.
Ichneumon lugubris Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais IX. 1896 p. 194.
Ichneumon lugubris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 395, ♀.

lunuliger Kriechb. — ♂ — Eur.: Gallia, Germania.
Ichneumon lunuliger Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 293, ♂.
Ichneumon lunuliger Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 255 n. 51, ♂.

luteator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon luteator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon luteator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 308.

luteipes Wesm. — ♀ ♂ — Eur. centr.
Ichneumon luteipes Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 378 (Misc. p. 20) [n. 14, ♀.
Ichneumon luteipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 391 n. 78, ♀.
Ichneumon luteipes Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 290 n. 23, ♀.
Ichneumon luteipes Kriechbaumer, Entom. Nachr. VII. 1881 p. 134 n. 7, ♂.
Ichneumon luteipes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 662 n. 177, ♀♂.

var. **indiscretus** Wesm. — ♀ — Eur. centr.
Ichneumon indiscretus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 373 (Misc. p. 14) [n. 9, ♀.
Ichneumon indiscretus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 391 n. 79, ♀.
Ichneumon indiscretus Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 172 n. 12.
Ichneumon luteipes var. indiscretus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 662, ♀.

luteiventris Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon luteiventris Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 330 n. 69, ♂.
Trogus luteiventris Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 386 n. 4, ♂.
Trogus luteiventris Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 272 n. 6.
Ichneumon luteiventris Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VIII. P. 1. 1840 p. 360.
Ichneumon luteiventris Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 73 [n. 71, ♀♂.
Ichneumon relucens Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 11 n. 72, ♀.
Ichneumon luteiventris Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 455 (Doc. p. 15) [n. 8, ♀♂.
Ichneumon luteiventris Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 398 [n. 106, ♀♂.
Ichneumon indictus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 105 n. 208, ♂.

Ichneumon relucens Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 105 n. 140, ♀.
Ichneumon luteiventris Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 216 n. 77, ♀♂.
Ichneumon luteiventris Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 13 n. 66, ♀♂.
Ichneumon (Cratichneumon) luteiventris Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1946 n. 1.
Ichneumon luteiventris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 265 n. 65, ♀♂.

luteolus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 66 n. 281 & p. 67 n. 300.
Ichneumon luteolus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2706 n. 333 & p. 2708 n. 351.
Ichneumon luteolus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1039 n. 241.

lutescens Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 62 n. 319 & p. 67 n. 297.
Ichneumon lutescens Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2700 n. 284 & p. 2708 n. 348.
Ichneumon lutescens Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1055 n. 272 & p. 1085 n. 236.

lymphatus Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [T. 7 F. 19.
Ichneumon lymphatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 158 n. 50, ♀;

macellator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon macellator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon macellator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 320.

maceratorius Vill.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon maceratorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 157 n. 66.
Ichneumon maceratorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 215 n. 47.
Ichneumon maceratorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 926 n. 72.

machimia Cam. — ♀ — Austr.
Ichneumon Machimia Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 P. 1. p. 30, ♀.

machinatorius Rossi! — Eur.: Italia.
Ichneumon machinatorius Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 112 n. 246.
Ichneumon machinatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
Ichneumon machinatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 295.

macilentus Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Ichneumon macilentus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 249 n. 5, ♂.
Ichneumon macilentus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 145 n. 15, ♂.

macrocephalus Tosqu. — ♂ — Afr.: Caffaria.
Ichneumon macrocephalus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 43 n. 20, ♂.

macrocerophorus D. T. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon tempestivus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 74 n. 42, ♀ ♂.
Ichneumon macrocerus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 20 n. 26, ♀♂ [nec
Ichneumon macrocerus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1921 n. 18. [Spinola].
Ichneumon macrocerus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 639 n. 130, ♀♂.
Ichneumon macrocerophorus m.

macrocerus Spin. — Am.: Chile.
Ichneumon macrocerus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 484 n. 13.

macropus Schrk. — ♀ — Eur. centr.
Ichneumon macropus Schrank, Beitr. z. Naturg. 1776 p. 90 n. 55.
Ichneumon macropus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 364 n. 733, ♀.
Ichneumon macropus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 182 n. 145.
Ichneumon macropus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2697 n. 169.
Ichneumon macropus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 222 n. 92.
Ichneumon macropus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1027 n. 222, ♀.

mactator Thunbg.! — Eur.
Ichneumon mactator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 268.
Ichneumon mactator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 330.

maculatorius Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon maculatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 153 n. 1778.
Ichneumon maculatorius Ström, Norske Vidensk. Selsk. Skrift. IV. 1768 p. 350 n. 67.
Ichneumon maculatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 952 n. 107.

maculatus Christ! — ♀ — Eur.
Ichneumon maculatus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 337; T. 33 F. 3.
Ichneumon maculatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 957 n. 113, ♀.

maculicornis Steph.! — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Ichneumon maculicornis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 136 n. 28.
Ichneumon maculicornis Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 101 & 213 n. 129, ♀ ♂.

maculicoxa Spin. — ♂ ♀ — Am.: Chile.
Ichneumon maculicoxa Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 480 n. 9, ♀ ♂.

maculiferus Tischb. — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon maculiferus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLIII. 1882 p. 476 n. 2, ♀.
Ichneumon maculiferus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 587 n. 27, ♀.

maculifrons Steph.[1]) — ♂ — Eur.: Britannia.
Ichneumon maculifrons Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 133 n. 19.
Ichneumon maculifrons Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 102 n. 74, ♂.
Ichneumon maculifrons Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 290 n. 121, ♂.

maculipleuralis Cam. — ♀ — Am.: Mexico. [n. 37, ♀.
Ichneumon maculipleuralis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 153

maculiventris Desv. — ♀ — Eur.: Britannia.
Ichneumon maculiventris Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 5 n. 29.
Ichneumon maculiventris Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 101 n. 130, ♀.

maculosus (Smith) Cam. — ♂ — Am.: Costa Rica.
Joppa maculosa Smith, Descr. New Spec. Hymen. 1879 p. 233 n. 6, ♂.
Ichneumon maculosus Cameron, Entom. M. Magaz. XXI. 1884 p. 106. [T. 8 F. 6.
Ichneumon maculosus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 38. 1885 Hymen. I. p. 179 n. 128;

madritinus Berth. — ♀ — Eur.: Hispania.
Ichneumon Madritinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 545 n. 28, ♀.

maeklinii Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon Mäklini Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 127 n. 75, ♀ ♂.
Ichneumon Mäklini Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1934 n. 54.
Ichneumon Mäklini Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 590 n. 33, ♀ ♂.

maerens Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 64 n. 251.
Ichneumon moerens Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2703 n. 307.
Ichneumon moerens Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 997 n. 167.

maestus Grav. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Ichneumon (Ischnus) moestus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 653 n. 284, ♀.
Ichneumon moestus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 357 (Ot. p. 6) n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon moestus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 103 & 214 n. 12, ♀ ♂.
Ichneumon moestus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 553 n. 44, ♀ ♂.

magdalensis Prov. — Am.: Canada.
Ichneumon Magdalensis Provancher, Natural. Canad. XIX. 1890 p. 248.

magniceps Cress. — ♀ ♂ — Am.: Cuba.
Ichneumon magniceps Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 299, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Amphidasys prodromaria (Stephens).

magus Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Lapponia, Suecia, Germania, Russia.
Ichneumon magus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 389 (Misc. p. 30) n. 24,
Ichneumon magus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 148 n. 87, ♀ ♂. [♀ ♂.
Ichneumon magus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 396 n. 99, ♀ ♂.
Ichneumon (Cratichneumon) magus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1954 n. 23.
Ichneumon magus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 270 n. 73, ♀ ♂.
majus Cress. — ♀ — Am.: Massachusetts, Carolina.
Ichneumon majus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 307, ♀.
Ichneumon majus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 179 n. 169, ♀.
majusculus Tischb. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon majusculus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXIV. 1873 p. 424 n. 81, ♀.
Ichneumon majusculus Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 79 n. 55-56, ♀ ♂.
Ichneumon majusculus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1931 n. 47.
malacus Say[2]) — ♀ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon malacus Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 72 n. 8.
Ichneumon malacus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 227 n. 2.
Ichneumon malacus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 376 n. 8.
Ichneumon malacus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 685 n. 2.
Ichneumon afer Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 137 n. 5, ♀.
Ichneumon maurus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 75, ♀ [non Cresson].
Ichneumon malacus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 143 n. 6, ♀.
Ichneumon malacus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 290 n. 3, ♀.
Ichneumon malacus Osborn, Papilio II. 1882 p. 72.
Ichneumon malacus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 266 n. 3, ♂.
malignus Tischb. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon malignus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 173 n. 13, ♂.
Ichneumon malignus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 592 n. 38, ♂.
mamillator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon mamillator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 274.
Ichneumon mamillator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 346.
manicatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. bor.
Ichneumon manicatus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 114 n. 67, ♀ ♂.
Ichneumon manicatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 583 n. 19, ♀ ♂.
mannii Kriechb. — ♀ — As. min.
Ichneumon Manni Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 30, ♀.
Ichneumon Manni Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 248 n. 36, ♀.
marginatorius Rossi! — Eur.: Italia.
Ichneumon marginatorius Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 40 n. 754, ♂.
Ichneumon marginatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 171 n. 36.
Ichneumon marginatorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 62 n. 754, ♂.
Ichneumon marginatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 961 n. 117.
marginatus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 60 n. 192.
Ichneumon marginatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2698 n. 261.
Ichneumon marginatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1056 n. 274.
marginiscutellatus Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [n. 147, ♀.
Ichneumon marginiscutellatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 38. 1885 Hymen. I. p. 184

---

[1]) *Lep.:* Paedisca solandriana (Fletcher).
[2]) *Lep.:* Spilosoma virginia, Algeria syringae (Osborn).

maritus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon maritus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 16 n. 30, ♀ ♂.
matutinus Christ! — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon matutinus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 338; T. 33 F. 4.
Ichneumon matutinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 957 n. 112, ♂.
maurus Cress. — ♀ — Am.: Virginia, Carolina, Georgia.
Ichneumon maurus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 135 n. 1, ♀.
Ichneumon maurus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 142 n. 3, ♀.
maxillaris Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon maxillaris Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 276.
Ichneumon maxillaris Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 351.
mayri Tischb. — ♀ — Eur.: Germania, Austria inf.
Ichneumon Mayri Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 350 n. 14, ♀.
Ichneumon nigritarsis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 201 n. 17, ♀.
Ichneumon Mayri Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 541 n. 20, ♀.
medeae Kriechb.[1] — ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon medeae Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXI. 1895 p. 109 n. 77, ♂.
Ichneumon medeae Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 394, ♂.
medialis Wesm. — ♀ ♂ — Eur. centr. [n. 5, ♀.
Ichneumon medialis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 370 (Misc. p. 11;
Ichneumon medialis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 382 n. 43, ♀.
Ichneumon strangulator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 283 n. 9, ♂.
Ichneumon medialis Kriechbaumer, Entom. Nachr. VII. 1881 p. 133 n. 6, ♂.
Ichneumon medialis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 622 n. 96, ♀ ♂.
var. **orbitalis** Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon medialis var. orbitalis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 280, ♂.
subvar. **bipunctatus** Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon medialis subvar. bipunctata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 280, ♂.
subvar. **nigroclypeatus** Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon medialis subvar. nigroclypeata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 280, ♂.
var. **strangulator** Tischb. — ♀ — Eur. centr.
Ichneumon strangulator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 283 n. 9, ♀.
Ichneumon medialis var. strangulator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894
mediator Thunbg.! — Eur.: Suecia. [p. 622, ♀.
Ichneumon mediator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 269.
Ichneumon mediator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 332.
melanarius Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Belgia, Germania. [n. 89, ♀.
Ichneumon melanarius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 87
Ichneumon melanarius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 174 (Mant. p. 41), ♀ ♂.
Ichneumon melanarius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 38 (Adn. p. 6), ♀.
Ichneumon melanarius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 404
[n. 130, ♀ ♂.
Ichneumon melanarius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 285 n. 111, ♀ ♂.
melanobatus Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon melanobatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 266 n. 88, ♀.
Ichneumon horridator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 457 n. 185, ♂.
Ichneumon melanobatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 39
[n. 31, ♀.
Ichneumon horridator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 40
[n. 32, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Erebia aethiops Esp. = medea S. V. (Kriechbaumer).

Ichneumon melanobates Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 382 n. 44, ♀.
Ichneumon horridator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 382 n. 45, ♂.
? Ichneumon majusculus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 424 n. 81, ♀.
Ichneumon horridator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 425 n. 82, ♂.
Ichneumon melanobatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 31 n. 16, ♀.
Ichneumon majusculus Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 79 n. 55-56, ♀ ♂.
Ichneumon melanobatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 660 n. 172, ♀♂.

melanocephalus Fourcr.! — Eur.: Gallia.
—— Réaumur, Mém. hist. Insect. III. 1737 p. 34 n. 6.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist abr. Insect. II. 1762 p. 331 n. 22.
Ichneumon melanocephalus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 400 n. 22.
Ichneumon melanocephalus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 216 n. 269.
Ichneumon xanthopus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 197 n. 165.
Ichneumon melanocephalus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1074 n. 305.

melanocerus Ratzbg.[1] — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon melanocerus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 136 n. 15, ♂.

melanoleucus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 66 n. 283.
Ichneumon melanoleucus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2706 n. 335.
Ichneumon melanoleucus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 998 n. 170.

melanonotus Tosqu. — ♂ — Afr.: Cap.
Ichneumon melanonotus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 23 n. 9, ♂.

melanophthalmus Schrk.! — ♂ — Eur.: Austria.
Ichneumon melanophthalmus Schrank, Beitr. z. Naturg. 1776 p. 91 n. 57.
Ichneumon melanophthalmus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 374 n. 757, ♂.
Ichneumon melanophthalmus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 203 n. 221.
Ichneumon melanophthalmus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2711 n. 194.
Ichneumon melanophthalmus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 223 n. 104.

melanophthalmus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 65 n. 274.
Ichneumon melanophthalmus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2705 n. 327.
Ichneumon melanophthalmus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1039 n. 240.

melanopoda Cam. — ♂ — Am.: Guatemala.
Ichneumon melanopoda Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 157 n. 48, ♂.

melanopterus Spin. — Eur.: Hispania.
Ichneumon melanopterus Spinola, Ann. soc. entom. France (2) I. 1843 p. 120 n. 11.

melanopterus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 70 n. 355.
Ichneumon melanopterus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2721 n. 400.

melanopterus Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 334 n. 29.
Ichneumon melanopterus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 402 n. 29.
Ichneumon melanopterus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 189 n. 171.
Ichneumon melanopterus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 208 n. 12.

melanopygus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia, Germania.
Ichneumon melanopygus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 388 (Misc. [p. 29) n. 23, ♀♂.
Ichneumon melanopygus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 153 n. 91, ♀ ♂.

---

[1] *Lep.:* Liparis spec. (Ratzeburg).

[n. 97, ♀ ♂.
Ichneumon melanopygus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 395
Ichneumon melanopygus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 278 n. 87, ♀ ♂.

melanopyrrhus Steph.! — ♂ — Eur.: Britannia.
Ichneumon melanopyrrhus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 195 n. 185.
Ichneumon melanopyrrhus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 213 n. 131, ♂.

melanoscelis Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Ichneumon melanoscelis Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 488 n. 17, ♀.

melanosomus Wesm. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr. [p. 21) n. 16, ♂.
Ichneumon melanosomus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 380 (Misc.
Ichneumon melanosomus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 124 n. 73, ♀ ♂.
Ichneumon gravipes Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 171 n. 11, ♀ ♂.
Ichneumon melanosomus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 39, ♀.
Ichneumon melanosomus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 594 n. 45, ♀ ♂.

var. **trimaculatus** Taschbg. — ♀ — Eur. centr.
Ichneumon trimaculatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 387 p. 63, ♀.
Ichneumon melanosomus var. trimaculatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII.

melanostigma Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria, Gallia. [1894 p. 595, ♀.
Ichneumon melanostigma Kriechbaumer, Termész. Füzet. VI. 1882 p. 144 n. 3, ♂.
Ichneumon melanostigmus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 605

melanothorax Kriechb. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania, Gallia. [n. 61, (♀?) ♂.
Ichneumon melanothorax Kriechbaumer, Entom. Nachr. XII. 1886 p. 241 n. 1, ♀.
Ichneumon melanothorax Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 584 n. 21, ♀.
Ichneumon melanothorax Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2080.

melanotis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr. [p. 58, ♀.
Ichneumon luctatorius var. 8-9 Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.
Ichneumon melanotis Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 72 n. 40, ♀.
Ichneumon melanotis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 39, ♀.
Ichneumon melanotis Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 104 & 180 n. 39, ♀.
Ichneumon melanotis Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 76 n. 40, ♂.
Ichneumon melanotis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 19 n. 20, ♀ ♂.
Ichneumon melanotis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1917 n. 8.
Ichneumon melanotis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 644 n. 139, ♀ ♂.
Ichneumon melanotis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2392.

melanurus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 61 n. 206.
Ichneumon melanurus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2699 n. 274.
Ichneumon melanurus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1014 n. 203.

melanurus Kriechb. — ♂ — As.: Japonia. [p. 126 n. 3, ♂.
Ichneumon melanurus Kriechbaumer, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig XIX./XXI. 1893/94. 1895

melioratorius Fabr.! — Austr.: Ins. Otahaiti.
Ichneumon melioratorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 147 n. 56.
Ichneumon melioratorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 64 n. 49.
Ichneumon melioratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279.
Ichneumon melioratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 362.

mellinurus Wesm. — ♂ — Eur. centr. [n. 49ᵇ, ♂
Ichneumon mellinurus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 158 (Mant. p. 25
Ichneumon melanurus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1944 n. 79 [error.].
Ichneumon mellinurus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 631 n. 119, ♂.

memorator Wesm. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr. [n. 559, ♀.
Ichneumon memorator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 64
Ichneumon delator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 65 n. 60, ♂.

Ichneumon delator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 164 (Mant. p. 31), ♂.
Ichneumon memorator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 7, ♀.
Ichneumon memorator Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 86 n. 50.
Ichneumon memorator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 393 n. 89, ♀.
Ichneumon memorator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 40, ♀.
Ichneumon memorator Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 10 n. 55, ♀ ♂.
Ichneumon memorator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1929 n. 42.
Ichneumon memorator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 577 n. 4, ♀ ♂.

mendax Cress. — ♀ — Am.: Canada, Massachusetts.
Ichneumon mendax Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 149 n. 37, ♀.
Phygadeuon Guignardi Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 50 n. 47, ♀.
Ichneumon Guignardi Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 186.

mendicus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon mendicus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 120 n. 43, ♀.

meridionalis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Cuba.
Ichneumon meridionalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 12, ♀.
Ichneumon meridionalis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 111 n. 2, ♀ ♂.

merula Berth. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Ichneumon merula Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 542 n. 22, ♀ ♂.

merus Cress. — ♂ — Am.: Massachusetts, Virginia.
Ichneumon merus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 148 n. 33, ♂.

mesopyrrhus Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon mesopyrrhus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 261 n. 58, ♂.
Ichneumon mesopyrrhus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 255 n. 52, ♂.

mesostilpnus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon mesostilpnus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 107 n. 88, ♀ ♂.
Ichneumon (Melanichneumon) mesostilpnus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1958 n. 10.
Ichneumon mesostilpnus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 237 n. 14.

metaxanthus Htg.![1] — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon metaxanthus Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. 2. 1838 p. 261.
Ichneumon metaxanthus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 137 n. 19, ♂.

metidjensis Berth. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Ichneumon Metidjensis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 545 n. 29, ♀ ♂.

metriurus Spin. — ♀ ♂ — Am.: Chile.
Ichneumon metriurus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 486 n. 15, ♀ ♂.

mexicanus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon Mexicanus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 2 n. 1, ♀ ♂.

microcephalus Steph.! — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Ichneumon microcephalus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 158 n. 86.
Ichneumon microcephalus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 105 n. 132, ♀ ♂.

micropnygus Thoms. — Eur.: Suecia. [Tischbein].
Ichneumon spiracularis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 22 n. 33, ♀ ♂ [non
Ichneumon micropnygus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1927 n. 36.
Ichneumon circularis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 664 n. 182, ♀.

microstictus Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon microstictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 480 n. 197, ♀. [♀ ♂.
Ichneumon microstictus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 334 (Mant. p. 97),
Ichneumon microstictus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 60 [n. 197, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.*: Trachea piniperda (Hartig).

Ichneumon microstictus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 3, ♀.
Ichneumon lineatus var. microstictus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 24, ♀ ♂.
Ichneumon microstictus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 373 n. 4, ♀ ♂.
Ichneumon microstictus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 15 n. 9.
Ichneumon (Coelichneumon) microstictus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1909 n. 18.
Ichneumon microstictus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 576 n. 30, ♀ ♂.
middendorffii Er. — ♀ — As.: Sibiria.
Ichneumon Middendorfi Erichson, Middendorff: Reise in Sibirien II. 1. 1881 p. 63 n. 125, ♀.
militaris Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Italia.
Ichneumon militaris Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 310 n. 43, ♀ ♂.
Ichneumon militaris Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 342 n. 129, ♀ ♂.
Ichneumon militaris Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 172 n. 122.
Ichneumon extensorius var. 1 Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 337 (Mant. [p. 100.
Ichneumon militaris Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 180 n. 43, ♀.
Ichneumon militaris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 654 n. 158, ♀ ♂.
militaris Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon militaris Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 254.
Ichneumon militaris Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 291.
milvus Cress. — ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon milvus (Harris) Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 305, ♂.
Ichneumon Clopini Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 250.
Ichneumon milvus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 169 n. 112, ♂.
Ichneumon milvus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 355 n. 42, ♂.
Ichneumon milvus Provancher, Faun. entom. Canad. Hymén. 1883 p. 281 n. 42, ♂.
mimicus Cress. — ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon mimicus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 300, ♂.
Ichneumon mimicus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 163 n. 89, ♂.
Ichneumon mimicus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 351 n. 33, ♂.
Ichneumon mimicus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 277 n. 33, ♂.
mimus Berth. — ♀ — Eur.: Alpes.
Ichneumon mimus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXVIII. 1899 p. 136 n. 51, ♀.
minax Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Hoplismenus minax Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 23 n. 7, ♂.
Ichneumon minax Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 127 n. 70.
minutor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon minutor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 266.
Ichneumon minutor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 322.
minutorius Desv. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Ichneumon minutorius Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 22 n. 126, ♂.
Ichneumon minutorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 213 n. 205, ♂.
mitra Cam. — As.: Borneo.
Ichneumon mitra Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1807 P. 13. p. 12; T. 16 F. 6.
mixtus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 66 n. 282.
Ichneumon mixtus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2706 n. 334.
Ichneumon mixtus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1029 n. 225.
mölleri Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Ichneumon Mölleri Holmgren, Entom. Tidskr. V. 1884 p. 63, ♀ ♂.
Ichneumon Mölleri Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1944 n. 81.
Ichneumon Mölleri Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 563 n. 69, ♀ ♂.

molitorius L.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon molitorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 399 n. 1587, ♀ [p. p.].
Ichneumon molitorius Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 931 n. 10.
Ichneumon molitorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 329 n. 12.
Ichneumon molitorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 846 n. 10.
Ichneumon molitorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 152 n. 1768.
Ichneumon molitorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 422 n. 12.
Ichneumon molitorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 260 n. 13.
? Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 57 n. 150.
Ichneumon molitorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 137 n. 10.
Ichneumon molitorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2676 n. 10.
? Ichneumon brachyacanthus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I, 5. 1790 p. 2679 n. 229.
Ichneumon molitorius Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 37 n. 745.
Ichneumon molitorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 348; T. 35 F. 6.
Ichneumon molitorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 167 n. 15.
Ichneumon molitorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 133 n. 3.
Ichneumon molitorius Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 155 n. 476.
Ichneumon molitorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 49 n. 2.
Ichneumon molitorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 55 n. 5.
Ichneumon molitorius Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 185 n. 24.
Ichneumon molitorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 58 n. 745.
Ichneumon molitorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♀ ♂.
Crypturus molitorius Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 141.
Ichneumon molitorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284.
Ichneumon illuminatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 323 n. 60, [♂ [p. p.].
Ichneumon molitorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255.
Ichneumon molitorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 295.
Ichneumon molitorius v. d. Höven, Bijdr. natuurk. Wet. I. 1826 p. 438 n. 9.
Ichneumon molitorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 258 n. 87, ♀ ♂.
Ichneumon illuminatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 423 n. 164, ♂ [p. p.].
Ichneumon brachyacanthus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 895 n. 29.
Ichneumon molitorius Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 18 n. 44.
Crypturus molitorius Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª IV. 1835 p. 352 n. 2.
Ichneumon molitorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 159 n. 88.
Ichneumon molitorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 360 n. 7, ♀.
Ichneumon luctatorius var. Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 136 [n. 18, ♀.
Ichneumon molitorius Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 91 n. 18, ♂.
Ichneumon molitorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 52 n. 29, ♀ ♂.
Ichneumon molitorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 40, ♀ ♂.
Ichneumon molitorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 104 & 215 n. 28, ♀.
Ichneumon molitorius Néren, Entom. Tidsskr. VI. 1885 p. 169.
Ichneumon molitorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 18 n. 19, ♀ ♂.
Ichneumon molitorius Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 37 n. 43.
Ichneumon molitorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1916 n. 6.
Ichneumon molitorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 638 n. 127, ♀ ♂.

var. **discolor** Berth. — ♀ — Eur. fere tota.
Ichneumon molitorius var. discolor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 638, ♀.

---

1) *Lep.:* Noctua brunnea (Boie), Trachea piniperda (Ratzeburg, Brischke), Charaeas graminis (Nerén).

molorchi Oculus![1]) — Eur.
Ichneumon Molorchi Oculus, Feuille jeun. natural. XI. 1881 p. 150-151.
monitus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon monitus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 10 n. 16, ♀.
monospilus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon monospilus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2398 n. 71b, ♀ ♂.
monostagon Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon monostagon Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 287 n. 12, ♂.
Ichneumon monostagon Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 172 n. 38, ♂.
Ichneumon monostagon Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 12 n. 23.
Ichneumon monostagon Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 141 n. 41.
Ichneumon indagator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 84 [n. 85, ♀ ♂.
Ichneumon indagator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1849 p. 38 (Adn. p. 6), ♂.
Ichneumon indagator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 397 (Misc. p. 38 [n. 29, ♀ ♂.
Ichneumon monostagon Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 21 n. 38 [& p. 22 n. 54, ♂.
Ichneumon monostagon Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 167 n. 100, ♀ ♂.
Ichneumon monostagon Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 269 n. 38, ♂.
Ichneumon monostagon Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 403 [n. 126, ♀ ♂.
Ichneumon redimitus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 107 n. 223, ♂.
Ichneumon explorator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 274 n. 3, ♂.
Ichneumon percussor Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 21 n. 2, ♂.
Ichneumon consimilis var. explorator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 22 n. 4.
Ichneumon monostagon Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 104 n. 84, ♀ ♂.
Ichneumon monostagon Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 107 n. 85, ♀ ♂.
Ichneumon (Melanichneumon) monostagon Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1956 n. 4.
Ichneumon consimilis var. monostagon Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 551, ♂.
Ichneumon monostagon Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 237 n. 16, ♀ ♂.
var. **luctuosus** Grav. — ♂ — Eur.
Ichneumon luctuosus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 289 n. 16, ♂.
Ichneumon luctuosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 200 n. 54, ♂.
Ichneumon luctuosus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 14 n. 29.
Ichneumon luctuosus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 146 n. 55.
Ichneumon luctuosus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 303 n. 7.
Ichneumon luctuosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 285 n. 54, ♂.
Ichneumon monostagon var. luctuosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 238, ♂.
montezuma Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon Montezuma Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 13 n. 22, ♂.
moraguesii Kriechb. — ♀ — Eur.: Mallorca.
Ichneumon Moraguesi Kriechbaumer, Anal. soc. Españ. hist. nat. XXIII. 1894 p. 240 n. 3, ♀.
moratorius Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon moratorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 152 n. 1762.

---

1) *Lep.:* Necydalis ulmi (Oculus).
2) *Lep.:* Nonagria geminipuncta, N. sparganii (Vollenhoven), Spilosoma menthastri (Mocsáry).

mordax Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania. [& 153 n. 4, ♀.
Ichneumon mordax Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXIX. 1875 p. 149
? Ichneumon mordax Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXVI. 1880 [p. 83-86, ♂.
Ichneumon mordax Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 22 n. 34, ♀ ♂.
Ichneumon mordax Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1226 n. 6.
Ichneumon mordax Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 287 n. 23, ♂.
Ichneumon mordax Thomson, Opusc. entom. P. 14. 1890 p. 1528 n. 1, ♂.
Ichneumon mordax Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1923 n. 21.
Ichneumon mordax Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 651 n. 150, ♀ ♂.
mortuorum Rossi! — Eur.: Italia.
Ichneumon mortuorum Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 126 n. 278.
motivus Cam. — ♀ — Am.: Mexico. [T. 8 F. 16.
Ichneumon motivus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 176 n. 118, ♀;
mucronatus Prov. — ♂ — Am.: Canada, Virginia.
Ichneumon mucronatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 81.
Ichneumon mucronatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 183 n. 192, ♂.
Ichneumon mucronatus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 364 n. 66, ♂.
Ichneumon mucronatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 290 n. 66, ♂.
multicolor Gmel. — ♀ ♂ — Eur. centr.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 57 n. 144.
Ichneumon atratorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 142 n. 26; T. 8 F. 2.
Ichneumon multicolor Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2678 n. 225.
Ichneumon atratorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 169 n. 24.
Ichneumon multicolor Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 286 n. 11, ♂.
Ichneumon multicolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 168 n. 34, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon multicolor Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 7 n. 6.
Ichneumon multicolor Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 141 n. 40.
Ichneumon multicolor Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 18 n. 34, ♀.
Ichneumon multicolor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 265 n. 34, ♀ ♂.
Ichneumon multicolor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 373 n. 6, ♀.
Ichneumon multicolor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 559 n. 57, ♀.
multifarius Berth. — ♂ — Afr.: Algeria.
Ichneumon multifarius Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1897 p. 254 n. 24, ♂.
multipictus Grav. — ♀ — Eur. centr.
Ichneumon multipictus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 312 n. 46, ♀.
Ichneumon multipictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 347 n. 132, ♀.
Ichneumon multipictus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 43 n. 132, ♀.
Ichneumon decipiens Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 69 n. 38, ♀ ♂.
Ichneumon decipiens Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 31 n. 38.
Ichneumon multipictus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 180 n. 46, ♀.
Ichneumon multipictus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1927 n. 34.
Ichneumon multipictus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 658 n. 167, ♀.
multiplagiatus Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [♀; T. 8 F. 5.
Ichneumon multiplagiatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37 1885 Hymen. I. p. 164 n. 61,
mundatus Tosqu. — ♂ — Afr.: Scioa.
Ichneumon mundatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 31 n. 14, ♂.
mundulus Tosqu. — ♀ — Afr.: Caffraria.
Ichneumon mundulus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 41 n. 19, ♀.
munerator Oliv.! — As.: Sumatra.
Ichneumon munerator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 182 n. 94.

munerosus Cam. — ♂ — Am.: Mexico. [T. 7 F. 10.
Ichneumon munerosus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 159 n. 53, ♂;
munificus Cress. — ♂ — Am.: Canada, New York, Illinois. [Wesmael].
Ichneumon nobilis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 155 n. 32, ♂ [non
Ichneumon munificus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 162 n. 87, ♂.
Ichneumon munificus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 323 n. 73, ♂.
Ichneumon munificus Provancher, Faun. entom. Canad. Hymén. 1883 p. 762 n. 73, ♂.
munitus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon munitus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 21 n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon munitus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 127 n. 66.
munkii Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon Munki Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 365 n. 67, ♂.
Ichneumon Munki Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 628 n. 112, ♂.
murarius Börn.! — Eur.: Germania.
Ichneumon murarius Börner, Neu. Nachr. patriot. Ges. Schlesien III. 1782 p. 165-172.
mustela Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon mustela Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXI. 1895 p. 108 n. 76, ♀.
Ichneumon mustela Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 568 n. 24b, ♀.
Ichneumon mustela Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 397, ♀.
naevius Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 67 n. 293.
Ichneumon naevius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2708 n. 344.
Ichneumon naevius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1085 n. 325.
nanus Ratzbg.![1] — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon nanus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 133 n. 10, ♂.
nanus Cress. — ♀ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon nanus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1877 p. 184 n. 194, ♀.
Ichneumon nanus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 326 n. 80, ♀.
Ichneumon nanus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 765 n. 80, ♀.
napaeus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon napaeus Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 26 n. 23-24, ♂.
Ichneumon napaeus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 549 n. 35, ♂.
nasica Berth. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Ichneumon nasica Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 663 n. 180, ♀♂.
navus Say — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon navus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 229 n. 8, ♀ ♂.
Ichneumon navus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 687 n. 8.
Ichneumon cinctipes Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 51, ♀.
Ichneumon navus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1877 p. 147 n. 25, ♀ ♂.
Ichneumon navus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 292 n. 10, ♀ ♂.
Ichneumon navus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 268 n. 10, ♀ ♂.
nebulator Thunbg.! — Eur.: Britannia, Suecia.
Ichneumon nebulator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 261.
Ichneumon nebulator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 311.
necator Bechst. & Scharfbg.! — Eur.: Germania. [n. 14.
Ichneumon necator Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 960
Ichneumon necator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1030 n. 227.

---

[1]) *Col.:* Eccoptogaster scolytes (Ratzeburg).

nepotor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon nepotor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273.
Ichneumon nepotor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 345.

nerenii Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia. [n. 37, ♀ ♂ [p. p.].
Ichneumon raptorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 43
Ichneumon Nereni Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 8 n. 49, ♀ ♂.
Ichneumon Nereni Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1939 n. 67.

nestor Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon nestor Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 13 n. 23, ♀.

neutralis Cress. — ♂ — Am.: California.
Ichneumon neutralis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 149 n. 35, ♂.
Ichneumon neutralis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 349, ♂.

nigellus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 71 n. 362.
Ichneumon nigellus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2721 n. 405.
Ichneumon nigellus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1088 n. 331.

niger Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 338 n. 38.
Ichneumon niger Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 405 n. 38.
Ichneumon niger Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 214 n. 260.
Ichneumon nigritus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 203 n. 191.
Ichneumon nigritus Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 66 n. 82.

niger Scop.! — Eur.
Ichneumon niger Scopoli, Delic. faun. & flor. Insubr. I. 1786 p. 57.

nigrator Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon nigrator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 158 n. 1839.

nigratorius Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon nigratorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 151 p. 1756.

nigratorius Fabr.! — ♀ — Am. bor.
Ichneumon nigratorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 55 n. 4.
Ichneumon nigratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
Ichneumon nigratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 295.
Ichneumon nigratorius Trentepol, Isis 1829 p. 807 n. 1, ♀.
Ichneumon nigratorius Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 206, ♀.

nigratus Berth. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Ichneumon nigratus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 554 n. 48, ♀ ♂.

nigricans Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 63 n. 243.
Ichneumon nigricans Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2702 n. 300.
Ichneumon nigricans Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 997 n. 166.

nigricornis Spin. — Eur.: Hispania.
Ichneumon nigricornis Spinola, Ann. soc. entom. France (2) I. 1843 p. 121 n. 12.

nigricornis Berger! — Eur.: Gallia.
Ichneumon nigricornis Berger, Bull. soc. philom. Paris III. P. 79. 1803 p. 141.

nigrifemoratus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon nigrifemoratus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 122 n. 47, ♂.

nigripectus Brullé — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon nigripectus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 306 n. 12, ♀.

nigripes Prov. — ♂ — Am.: Canada.

Ichneumon nigripes Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 324 n. 76, ♂.
Ichneumon nigripes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 764 n. 76, ♂.

nigritarius Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.

? Ichneumon molitorius Schrank, Fauna Boica II. 1802 p. 273 n. 2072.
Ichneumon nigritarius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 281 n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon nigritarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 113 n. 4, ♂ [excl. var.].
Ichneumon annulator var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 112 n. 3, ♀ [p. p.].
Ichneumon nigritarius Ratzeburg, Forstinsecten III. 1844 p. 27 n. 26; T. 6 F. 4.
Ichneumon nigritarius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 134 n. 7; T. 6 F. 4.
Ichneumon nigritarius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 65 [n. 65, ♀ ♂ & p. 219.
Ichneumon nigratarius Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 305 n. 9, ♀.
Ichneumon nigritarius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 133 n. 8; T. 1 F. 4 & 11.
Ichneumon nigritarius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 167 (Mant. [p. 34), ♀ ♂.
Ichneumon nigritarius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 2. 1849 p. 379.
Ichneumon nigritarius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 163 n. 4, ♀ ♂.
Ichneumon nigritorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 33 n. 16, ♀ ♂.
Ichneumon nigritarius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 382 (Ot. p. 31) n. 29, ♂.
Ichneumon nigritarius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 9, ♀ ♂.
Ichneumon migratorius Hagen, Stettin. entom. Zeitg. XXII. 1861 p. 284 n. 105.
Ichneumon nigritarius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 138 n. 81, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon nigritarius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 202, ♀.
Ichneumon nigritarius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 231 n. 4, ♂.
Ichneumon nigritarius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 446 (Doc. [p. 6) n. 2, ♀.
Ichneumon nigritarius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 396 [n. 100, ♀ ♂.
Ichneumon nigritarius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 41, ♀ ♂.
Ichneumon nigritarius Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 85 n. 81.
Ichneumon nigritarius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 101 n. 69, ♀ ♂.
Ichneumon nigritarius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 11 n. 58, ♀ ♂.
Ichneumon nigritarius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. P. 4. 1891 p. 57, ♂.
Ichneumon (Cratichneumon) nigritarius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1949 n. 9.
Ichneumon nigritarius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 258 n. 55, ♀ ♂.

var. **aethiops** Grav.[2] — ♂ — Eur.

Ichneumon aethiops Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 130 n. 12, ♂.
Ichneumon aethiops Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 7 n. 6.
Ichneumon aethiops Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 132 n. 15.
Ichneumon aethiops Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 166 n. 16.
Ichneumon aethiops Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 241 n. 12, ♂.
Ichneumon nigritarius var. aethiops Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 259, ♂.

var. **brischkei** Berth. — ♀ — Eur.

Ichneumon nigritarius var. Brischkei Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 259, ♀.

---

[1] *Lep.:* Eriogaster lanestris, Angerona prunaria (Harris), Macaria liturata (Ratzeburg), M. signaria (Rondani), Fidonia piniaria (Ratzeburg, Brischke), Clostera reclusa (Vollenhoven), Trachea piniperda (Boie), Taeniocampa miniosa (Desvignes), Plusia gamma. P. festucae (Stephens), Abraxas grossulariata (Bignell).

[2] *Lep.:* Trachea piniperda, Fidonia piniaria (Ratzeburg).

nigrotergus Davis[1]) — Am. bor.
Ichneumon nigrotergus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 350.

nigrovariegatus (Prov.) Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon nigrovariegatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 182, ♀.
Ichneumon nigrovariegatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 172 n. 128, ♀.
Ichneumon nigrovariegatus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 357 n. 47, ♀.
Ichneumon nigrovariegatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1883 p. 283 n. 47, ♀.

nitidulator Thunbg.! — Eur.
Ichneumon nitidulator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon nitidulator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 348.

nitidulus Boie![2]) — Eur.: Germania.
Ichneumon nitidulus Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVIII. 1857 p. 197 n. 14.

nitrator Trent.! — Patria ?
Ichneumon nitrator Trentepol, Isis 1829 p. 810 n. 16, ♀.

nivatus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Belgia, Germania, Hungaria, Italia.
Ichneumon nivatus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 327 n. 66, ♂.
Ichneumon nivatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 447 n. 177, ♂. [♀♂.
Ichneumon nivatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 77 n. 75,
Ichneumon nivatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 400 n. 114, ♀♂.
Ichneumon nivatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 32 n. 18, ♀.
Ichneumon nivatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 267 n. 68, ♀ ♂.

var. **canescens** Berth. — ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon canescens Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 40 n. 11, ♂. [♂.
Ichneumon nivatus var. canescens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 268,

niveatus Desv.! — ♂ — Eur.: Britannia.
Ichneumon niveatus Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 25 n. 140, ♂.
Ichneumon niveatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 212 n. 134, ♂.

nobilis Wesm. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Ichneumon nobilis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 365 (Ot. p. 14) n. 12, ♂.
Ichneumon nobilis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 538 n. 15, ♀ ♂.

noerus Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Scioa.
Ichneumon noerus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 10 n. 3, ♀ ♂.

nordenströmii Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ichneumon Nordenströmi Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1897 p. 2399 n. 72^b, ♀.

notabilis Cam. — ♂ — Am.: Guatemala. [F. 20.
Ichneumon notabilis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 38. 1855 Hymen. I. p. 180 n. 132, ♂; T. 8

notatorius Thunbg.! — Eur.: Fennia.
Ichneumon notatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Ichneumon notatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 356.

notatus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 67 n. 304.
Ichneumon notatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13^a I. 5. 1790 p. 2709 n. 355.
Ichneumon notatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1070 n. 265 [recte 295].

nothus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon nothus Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 26 n. 22-23, ♂.
Ichneumon nothus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 549 n. 36, ♂.

---

1) *Lep.:* Trachea piniperda, Fidonia piniperda (Rondani).
2) *Lep.:* Noctua piniperda (Boie).

novazealandicus Cam. — ♀ — Austr.
Ichneumon Novazealandicus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 P. 1. p. 23, ♀.
novemalbatus Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria. [p. 149 & 151 n. 2, ♀.
Ichneumon novemalbatus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXIX. 1875
Ichneumon novemalbatus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXIV. [1880 p. 51-52, ♀.
Ichneumon novemalbatus Dalla Torre, Ber. naturw.-mediz. Ver. Innsbruck XII. 1881 Sitz.- [Ber. p. XXV.
Ichneumon novemalbatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 605 n. 60, ♀♂.
var. **biguttatus** Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria. [burg XXXIV. 1880 p. 52, ♂.
Ichneumon novemalbatus var. biguttatus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regens-
Ichneumon novemalbatus var. biguttatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 605, ♂.
var. **triguttatus** Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria. [burg XXXIV. 1880 p. 52, ♂.
Ichneumon novemalbatus var. triguttatus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regens-
Ichneumon novemalbatus var. triguttatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 605, ♂.
var. **uniguttatus** Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria. [burg XXXIV. 1880 p. 52, ♂.
Ichneumon novemalbatus var. uniguttatus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regens-
Ichneumon novemalbatus var. uniguttatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII.
nubeculosus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Italia. [1894 p. 605, ♂.
Ichneumon castaneus var. 5 Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 171 (Mant. p. 38),
Ichneumon nubeculosus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 196 n. 117, ♀ ♂. [♀♂.
Ichneumon nubeculosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 561 n. 13, ♀♂.
nubilus Brischke — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon nubilus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VII. 1891 p. 58, ♀ ♂.
nudator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon nudator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 263.
Ichneumon nudator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 316.
nudicoxa Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon albosignatus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 182 n. 109, ♀ ♂ [non auct.].
Ichneumon nudicoxa Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 107 n. 89, ♀ ♂.
Ichneumon (Melanichneumon) nudicoxa Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1958 n. 9.
nugatorius Fabr.! — ♂ — Eur.: Germania, Italia.
Ichneumon nugatorius Fabricius, Entom. system. IV. 1794 p. 455 n. 39-40.
Ichneumon nugatorius Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 220 n. 39-40.
Ichneumon nugatorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 80 T. 12.
Ichneumon nugatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 61 n. 35.
Ichneumon nugatorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 65.
Ichneumon nugatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♂.
Ichneumon fasciatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Ichneumon fasciatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 357.
Ichneumon nugator Trentepol, Isis 1826 p. 78 n. 23.
Ichneumon nugatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 954 n. 109.
numericus Cam. — ♂ — As.: India.
Ichneumon numericus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 12, ♂.
nuncius Cress. — ♂ — Am.: California.
Ichneumon nuncius Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 176 n. 155, ♂.
Ichneumon nuncius Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 352, ♂.
nuptatorius Fabr. — ♂ — Eu.: Selandia.
Ichneumon nuptatorius Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 148 n. 62.

Ichneumon nuptatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 64 n. 54.
Ichneumon nuptatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277.
Ichneumon nuptatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 354.
Ichneumon nuptatorius Trentepol, Isis 1829 p. 813 n. 44, ♂.

nyssaeus Holmgr. — ♂ — Eur.: Tirolia.
Ichneumon nyssaeus Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 174 n. 20, ♂.
Ichneumon nyssaeus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 580 n. 14, ♂.

obfuscator Thunbg.! — Eur.: Britannia, Suecia.
Ichneumon obfuscator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon obfuscator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 301.

obfuscatus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Musc. Leskean. 1788 p. 69 n. 334.
Ichneumon obfuscatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2719 n. 380.
Ichneumon obfuscatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 913 n. 54.

oblatorius Rossi! — Eur.: Italia.
Ichneumon oblatorius Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 114 n. 250.

obligator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon obligator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 270.
Ichneumon obligator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 334.

obliteratus Wesm.[1]) — ♀ — Eur. centr.
Ichneumon obliteratus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 376 (Misc. p. 17) [n. 12, ♀.
Ichneumon obliteratus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 394 n. 91, ♀.
Ichneumon obliteratus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 579 n. 11, ♀.

obscurator Panz.! — Eur.: Germania.
Ichneumon XVIII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1. 1766; T. 41 F. 10 & 11.
Ichneumon obscurator Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 58.
Ichneumon obscurator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 1004 n. 184.

obscuratorius Panz.! — Eur.: Germania.
Ichneumon obscuratorius Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 P. 102 T. 14.
Ichneumon obscuratorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 955 n. 110.

obscuripes Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon obscuripes Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 113 n. 66, ♀.
Ichneumon obscuripes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 606 n. 63, ♀.

obscuritarsis D. T. — ♀ — Eur: Germania.
Ichneumon obscuripes Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLIII. 1882 p. 477 n. 4, ♀ [nec Holm-gren].
Ichneumon obscuripes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 585 n. 25, ♀.
Ichneumon obscuritarsis m.

obscurus Fourcr.! — Eur.: Gallia, Italia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 333 n. 26.
Ichneumon obscurus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 401 n. 26.
Ichneumon obscurus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 189 n. 169.
Ichneumon obscurus Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 54 n. 794.
Ichneumon obscurus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 208 n. 10.
Ichneumon obscurus Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 81 n. 794.
Ichneumon obscurus Gravenhorst, Ichneum. Europ. 1829 p. 1022 n. 214.

obsessor Wesm.[2]) — ♀ ♂ — Eur. centr. & or.
Ichneumon salicatorius var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 246, ♂.

---

1) *Lep.:* Argynnis pales (Fallou).
2) *Lep.:* Euprepia plantaginis (Brischke), Arctia fuliginosa (Bridgman).

? Ichneumon formosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 613 n. 261, ♂.
Ichneumon salicatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 155, ♂.
Ichneumon obsessor Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 42 [n. 36, ♀ ♂.
Ichneumon obsessor Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 151 (Mant. p. 18), ♀.
Ichneumon formosus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 76 n. 261.
Ichneumon obsessor Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 384 n. 50, ♀♂.
Ichneumon obsessor Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 39, ♀.
Ichneumon formosus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 180 n. 53, ♀ ♂.
Ichneumon obsessor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 590 n. 32, ♀♂.
Ichneumon Mäklini var. formosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 590, [♀ ♂.

obsoletorius Costa — ♂ — Eur.: Sardinia.
Ichneumon obsoletorius Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli XXV. 1886 p. 53.
Ichneumon obsoletorius Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 8. 1886 p. 32, ♂.
Ichneumon obsoletorius Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 119.

obsoletorius Fabr.! — Eur.: Germania.
Ichneumon obsoletorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 140 n. 29.
Ichneumon obsoletorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 80 T. 11.
Ichneumon obsoletorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 59 n. 24.
Ichneumon obsoletorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 60.
Ichneumon obsoletorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♂.
Ichneumon obsoletorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253.
Ichneumon obsoletorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 289.
Ichneumon obsoletorius Trentepol, Isis 1826 p. 78 n. 22.
Ichneumon obsoletorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 885 n. 18.

obsoletus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 59 n. 177.
Ichneumon obsoletus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2687 n. 248.
Ichneumon obsoletus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 915 n. 58.

obtusator Thunbg.! — Eur.: Fennia.
Ichneumon obtusator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 270.
Ichneumon obtusator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 334.

occidentalis Harrgt. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Ichneumon occidentalis Harrington, Canad. Entomol. 1894 p. 210, ♀.

occiputalis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Hoplismenus occipitalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 24 n. 9, ♂.
Ichneumon occipitalis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 127 n. 75, ♀♂.

ochreatus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 60 n. 183.
Ichneumon ocreatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2688 n. 255.
Ichneumon ocreatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 902 n. 36, ♀.

ochrocephalus Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 355 n. 75.
Ichneumon ochrocephalus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 419 n. 76.
Ichneumon ochrocephalos Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 214 n. 264.
Ichneumon delator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 184 n. 107.

ochrocerus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 66 n. 275.
Ichneumon ochrocerus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2705 n. 328.
Ichneumon ochrocerus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 998 n. 169.

ochropis Gmel.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 57 n. 151.
Ichneumon ochropis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2679 n. 230.
Ichneumon ochropis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 182 n. 45, ♀ ♂.
Ichneumon ochropis Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 13 n. 25.
Ichneumon ochropis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 143 n. 46.
Ichneumon ochropis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 104 [n. 112, ♀ ♂.
Ichneumon ochropis Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 37 n. 27, ♀ ♂.
Ichneumon rubedinis Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 29 n. 167, ♀.
Ichneumon ochropis Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 14, ♀ ♂.
Ichneumon ochropis Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 193 n. 115, ♀ ♂.
Ichneumon ochropis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 274 n. 45, ♀ ♂.
Ichneumon ochropis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 411 n. 162, ♀ ♂.
Ichneumon ochropis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 46, ♀.
Ichneumon ochropis Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 103 n. 99, ♀ ♂.
Ichneumon rubedinis Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 216 n. 141, ♀.
Ichneumon ochropis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 15 n. 73, ♀ ♂.
Ichneumon (Stenichneumon) ochropis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1967 n. 12.
Ichneumon ochropis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 554 n. 2, ♀ ♂.

ochropus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 60 n. 178ᵇ.
Ichneumon ochropus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2687 n. 250.
Ichneumon ochropus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 902 n. 37.

oculator Oliv.! — Patria?
Ichneumon oculator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 190 n. 134.

odiosus Cress. — ♂ — Am.: California.
Ichneumon odiosus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 145 n. 17, ♂.
Ichneumon odiosus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 348, ♂.

ontariensis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Ichneumon Ontariensis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 30 n. 84, ♀.

opaculus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon opaculus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 115 n. 17, ♀ ♂.

opacus Tischb. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon opacus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 176 n. 18, ♂.
Ichneumon opacus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 333 n. 66, ♂.
Ichneumon opacus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 630 n. 118, ♂.

ophiusae Kriechb.[2]) — ♂ — Eur.: Austria inf.
Ichneumon Ophiusae Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 479, ♂.
Ichneumon Ophiusae Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 556 n. 53, ♂.

opiniosus Cam. — ♀ — Am.: Mexico. [T. 8 F. 11.
Ichneumon opiniosus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 166 n. 63, ♀.

opiparus Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon opiparus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 161 n. 55, ♀.

oppilatus Cam. — Am.: Mexico.
Ichneumon oppilatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 34. 1884 Hymen. I. p. 142 n. 9.

opulentus Taschbg. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Ichneumon opulentus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVIII. 1871 p. 307 n. 3, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Abraxas grossulariata (Brischke).
[2]) *Lep.:* Ophiusa lusoria (Rogenhofer).

Ichneumon guttatus Tischbein, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXIV. 1873 p. 436 n. 131, ♂.
Ichneumon guttatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 20 n. 1, ♀.
Ichneumon sylvanus Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 27 n. 23-24, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon Gerstaeckeri Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 142 n. 14, ♂.
Ichneumon Gerstaeckeri Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 292 n. 49, ♂.
Ichneumon opulentus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 529 n. 11, ♀♂.

orbitator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon orbitator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
Ichneumon orbitator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 296.

orizabensis Cam. — ♀ — Am.: Mexico. [T. 8 F. 21.
Ichneumon Orizabensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 38. 1885 Hymen. I. p. 183 n. 146, ♀;

ornatipes Cress. — ♂ — Am.: Virginia.
Ichneumon ornatipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 294, ♂.
Ichneumon ornatipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 156 n. 61, ♂.

orpheus Cress. — ♀ — Am.: Pennsylvania, Massachusetts.
Ichneumon Orpheus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 136 n. 2, ♀.
Ichneumon Orpheus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 142 n. 1, ♀.

osculator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon osculator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon osculator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 339.

otiosus Say — ♀ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon otiosus Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 69 n. 3.
Ichneumon otiosus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 228 n. 4.
Ichneumon otiosus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 374 n. 3.
Ichneumon otiosus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 686 n. 4.
Ichneumon otiosus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 155 n. 57, ♀.
Ichneumon otiosus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 297 n. 22, ♀.
Ichneumon otiosus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 273 n. 22, ♀.

ovinator Thunbg.! — Eur.
Ichneumon ovinator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 268.
Ichneumon ovinator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 352.

oviventris Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon oviventris Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 291, ♀.
Ichneumon oviventris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 596 n. 50, ♀.

pachymerus (Htg.) Ratzbg.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Belgia, Germania, Russia.
Phygadeuon pachymerus Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 261, ♀.
Phygadeuon pachymerus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 144 n. 1, ♀.
Ichneumon (Phygadeuon) pachymerus Ratzeburg, Forstinsect. III. 1844 p. 28, ♀.
Ichneumon trucidus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 97 [n. 102, ♀ ♂.
Ichneumon trucidus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 181 (Mant. p. 48), ♀♂.
Ichneumon pachymerus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 168 n. 21, ♀.
Ichneumon pachymerus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 408 [n. 148, ♀♂.
Ichneumon pachymerus Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 399 n. 26, ♀.
Ichneumon pachymerus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 44, ♀♂.
Ichneumon pachymerus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 241 n. 23, ♀♂.

---

1) *Lep.:* Panolis piniperda (Hartig).

pacificus Cam. — Austr.: Fernando Islands. [p. 204.
Ichneumon pacificus Cameron, Proc. & Trans. Nat. Hist. Soc. Glasgow (2) I. P. 3. 1885/86

padella Gour.![1]) — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon padella Goureau, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 243, ♀♂; T. 3 n. I F. 7 (♀)-9.

paganus Berth. — ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon paganus Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 38 n. 4, ♂.

pallens Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 69 n. 330.
Ichneumon pallens Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2719 n. 376.
Ichneumon pallens Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1043 n. 254.

pallescens Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 69 n. 325.
Ichneumon pallescens Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2718 n. 371.
Ichneumon pallescens Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1041 n. 246.

pallidator Thunbg. — Eur.
Ichneumon pallidator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon pallidator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 308.

pallidifrons Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon pallifrons Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 117 n. 7, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon annulator var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 147, ♀.
Ichneumon pallifrons Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 7 n. 4.
Ichneumon pallifrons Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 129 n 7, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon pallifrons Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 70 n. 67, ♀.
Ichneumon pallifrons Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 34 n. 20, ♀♂.
Ichneumon pallifrons Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 10, ♀ ♂.
Ichneumon pallifrons Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 146 n. 86, ♀ ♂.
Ichneumon pallifrons Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 234 n. 7, ♀♂.
Ichneumon pallifrons Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 397 n. 103, ♀♂.
Ichneumon pallifrons Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 102 & 103 n. 73, ♀.
Ichneumon pallifrons Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 13.
Ichneumon (Cratichneumon) pallifrons Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1952 n. 16.
Ichneumon pallifrons Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 263 n. 61, ♀♂.

pallidipectus Smith — As.: Celebes.
Ichneumon pallidipectus Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. VI. 1861 p. 62 n. 1.

palliditarsis Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon pallitarsis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 11 n. 59, ♀♂.
Ichneumon (Cratichneumon) pallitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1949 n. 10.
Ichneumon palliditarsis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 264 n. 64, ♀♂.

palpator Kaw.! — ♀ — Eur.: Russia.
Ichneumon palpator Kawall, Bull. soc. natural. Moscou LXI. P. 4. 1868 p. 507 n. 4, ♀.

palpatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon palpatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 280.
Ichneumon palpatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 364.

panamensis Cam. — ♂ — Am.: Panama. [T. 8 F. 4.
Ichneumon Panamensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 158 n. 49, ♂;

paradoxus Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Ichneumon paradoxus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 325 n. 77, ♀.
Ichneumon paradoxus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 764 n. 77, ♂.

---

1) *Lep.:* Hyponomeuta padella (Goureau).
2) *Lep.:* Trachea piniperda (Brischke).

parandus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon parandus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 124 n. 53, ♂.
parasiticus Deg.! — Eur.
—— Degeer, Mém. hist. Insect. I. 1752 p. ?; T. 36 F. 12.
Ichneumon parasiticus Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. I. 4. 1778 p. 29 & 137; T. 36 F. 12.
Ichneumon niger Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 68 n. 273.
paratus Say — ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon parata Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 68 n. 1 [non 1836].
Ichneumon parata Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 373 n. 1.
Ischnus paratus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 156.
Ichneumon paratus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 168 n. 108, ♂.
Ichneumon paratus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 355 n. 41, ♂.
Ichneumon paratus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 280 n. 41, ♂.
parsimonicus Cam. — ♂ — Am.: Mexico. [♂; T. 7 F. 23.
Ichneumon parsimonicus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 174 n. 108,
partitorius Fonsc.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon partitorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 413 n. 64.
partitus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 70 n. 343.
Ichneumon partitus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2720 n. 388.
Ichneumon partitus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1064 n. 289.
parviscopa Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon nigritarius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 138 n. 81, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon (Cratichneumon) parviscopa Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1950 n. 11, ♀♂.
parvulus Kriechb. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Ichneumon parvulus Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VII. P. 8. 1887 p. 306, ♀.
Ichneumon parvulus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 270 n. 72, ♀.
parvus Cress. — ♂ — Am.: United States.
Ichneumon parvus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 159 n. 36, ♂.
Ichneumon parvus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 163 n. 91, ♂.
passivus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon passivus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 113 n. 10, ♀.
pastinacae Ström! — Eur.: Dania.
Ichneumon pastinacae Ström, Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768 p. 351 n. 68.
Ichneumon simplex O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 155 n. 1796.
Ichneumon pastinacae Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 907 n. 45.
patellator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon patellator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 270.
Ichneumon patellator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 335.
patricius Hal.! — ♂ — Am. mer.
Ichneumon patricius Haliday, Trans. Linn. Soc. London XVII. P. 3. 1836 p. 317 n. 3, ♂.
Ichneumon patricius Cameron, Proc. Manchester Philos. Soc. XXVI. 1888 p. 127.
patruelis Holmgr. — ♀ (♂) — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon patruelis Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 164 n. 98, ♀.
Ichneumon patruelis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 272 n. 77, ♀ (♂).
pax D. T. — ♂ — Am.: Washington.
Ichneumon pacificus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 350, ♂ [nec Cameron].
Ichneumon pax m.
pector Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon pector Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon pector Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 309.

pectoralis Say — Am.: Indiana.
Ichneumon pectoralis Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 72 n. 9.
Ichneumon pectoralis Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 376 n. 9.
Ichneumon pectoralis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 208.
pectorator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon pectorator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 274.
Ichneumon pectorator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 346.
pectoratorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon pectoratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 280.
Ichneumon pectoratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 366.
pedalis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Colorado.
Ichneumon pedalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 141 n. 11, ♂.
Ichneumon pedalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 249, ♀ ♂.
Ichneumon pedalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 158 n. 67, ♀ ♂.
pedatorius Panz.! — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon pedatorius Panzer, Faun. Insect. German. V. 1799 P. 71 T. 12 [non P. 72 T. 2].
Ichneumon pedatorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 61.
Ichneumon pedatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 873 n. 2, ♀.
pedisequus Spin. — ♀ ♂ — Am.: Chile.
Ichneumon pedisequus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 485 n. 14, ♀ ♂.
pellionellae Retz.! — Eur.: Suecia.
—— Degeer, Mém. hist. Insect. II. 1. 1771 p. 875 n. 9; T. 30 F. 14-19.
—— Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 185 n. 9; T. 30 F. 14-19.
Ichneumon pellionellae Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 69 n. 279.
Ichneumon tinearum Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 211 n. 247.
Ichneumon tinearum Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 203 n. 193.
Ichneumon tinearum Duméril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 891 n. 5.
pendula Christ! — Eur.: Germania.
Ichneumon pendula Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 371; T. 39 F. 10.
·**pendulus** Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon pendulus O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 160 n. 1860.
penetrans Smith — ♀ — As.: Borneo.
Ichneumon penetrans Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 117 n. 1, ♀.
pentaleucus Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon pentaleucus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXI. 1895 p. 108 n. 75, ♀.
Ichneumon pentaleucus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 394, ♀.
pepticus Cress. — ♂ — Am.: Canada, New Jersey, Illinois.
Ichneumon pepticus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 148 n. 30, ♂.
Ichneumon pepticus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 322 n. 70, ♂.
Ichneumon pepticus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 761 n. 70, ♂.
perfidiosus Smith — ♂ — Austr.: New Zealand.
Ichneumon perfidiosus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 475, ♂; T. 4 F. 5.
Ichneumon perfidiosus Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 120, ♂.
Ichneumon perfidiosus Hudson, Entomologist XVI. 1883 p. 215-216.
perfidus Tischb. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon perfidus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 439 n. 147, ♂.
Ichneumon perfidus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 173 n. 12, ♂.
Ichneumon perfidus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 591 n. 34, ♂.
perfusorius Rossi! — Eur.: Italia.
Ichneumon perfusorius Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 116 n. 253.

perhiematus Tischb. — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon perhiematus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 428 n. 93, ♀.
Ichneumon perhiematus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 213 n. 203, ♀.
periscelis Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon pallifrons Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 117 n. 7, ♀ [p. p., excl. ♂].
Ichneumon periscelis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 32 [n. 20, ♀.
Ichneumon fuscipes var. 2 bis Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) [p. 27 n. 70, ♀.
Ichneumon periscelis Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 42 n. 23, ♀ ♂.
Ichneumon falcatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 353 n. 25, ♂.
Ichneumon dubius Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 275 n. 4, ♀.
Ichneumon periscelis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 38, ♂.
Ichneumon periscelis Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 101 n. 21, ♀ ♂.
Ichneumon (Coelichneumon) periscelis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1905 n. 10.
Ichneumon periscelis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 549 n. 37, ♀ ♂.
peritus Tosqu. — ♂ — Afr.: Caffaria.
Ichneumon peritus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 9 n. 2, ♂.
perredes Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon Perredes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 4 n. 5, ♀.
perscrutator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon perscrutator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon perscrutator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 301.
perscrutator Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Belgia. [n. 86, ♀ ♂.
Ichneumon perscrutator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 85
Ichneumon perscrutator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 12, ♂.
Ichneumon perscrutator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 404 n. 127, ♀.
Ichneumon perscrutator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 43, ♀ ♂.
Ichneumon perscrutator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 238 n. 17, ♀ ♂.
personatus Grav. — ♂ — Eur.: Fennia, Germania.
Ichneumon personatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 207 n. 59, ♂.
Ichneumon personatus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 15 n. 33.
Ichneumon personatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 23 n. 59, ♂.
Ichneumon personatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 14, ♂.
Ichneumon personatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 291 n. 59, ♂.
Ichneumon personatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 248 n. 56.
Ichneumon personatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 565 n. 21, ♂.
var. **elaverensis** Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia. [p. 565, ♂.
Ichneumon personatus var. Elaverensis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
perspicuus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Gallia, Italia.
Ichneumon perspicuus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 366 (Ot. p. 15) n. 13, ♀ ♂.
Ichneumon perspicuus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 380 n. 34, ♀ ♂.
Ichneumon perspicuus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 567 n. 77, ♀ ♂.
pervagus Cress. — ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon pervagus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 148 n. 31, ♂.
perversus Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon perversus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 364 n. 66, ♀ ♂.
Ichneumon perversus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 248 n. 38, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Noctuidae spec. (Brischke).

petiolatus Fourcr.! — Eur.
Ichneumon petiolatus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 428 n. 104.
Ichneumon petiolatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 191 n. 182.
petitorius Er. — Austr.: Tasmania.
Ichneumon petitorius Erichson, Arch. f. Naturg. VIII. P. 1. 1841 p. 255 n. 221.
petrinus Scudd. — Am.: Canada.
Ichneumon petrinus Scudder, Bull. U. St. Geol. Surv. III. 1877 p. 743.
Ichneumon petrinus Scudder, Fossil Insects N. Amer. II. 1890 p. 608; T. 5 F. 14 & 15.
petulcus Cress. — ♀ — Am.: California.
Ichneumon petulcus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 185 n. 200, ♀.
Ichneumon petulcus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 354, ♀.
phaedra Cam. — Am.: Guatemala.
Ichneumon Phaedra Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 35. 1885 Hymen. I. p. 146 n. 21.
phaeostigmus Wesm. — ♀ — Eur.: Germania, Gallia.
Ichneumon phaeostigmus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 373 (Ot. p. 22) n. 19, ♀.
Ichneumon phaeostigmus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 606 n. 62, ♀.
phalaenarum Bechst. & Scharfbg. — Eur.: Germania. [p. 974 n. 38.
Ichneumon phalaenarum Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805
phallii Scop.! — Eur.
Ichneumon Phalli Scopoli, Annus hist. nat. V. 1772 p. 121 n. 144.
phryganator Thunbg.! — Afr.: Cap.
Ichneumon phryganator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 272.
Ichneumon phryganator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 342.
phyllophorus L.! — Eur.
Ichneumon phyllophorus Linné, Fée: Ouvrag. posthum. 1832 p. 366.
picatus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 71 n. 357.
Ichneumon picatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2721 n. 402.
Ichneumon picatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1008 n. 191.
piceator Thunbg.! — Eur.: Britannia.
Ichneumon piceator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 264.
Ichneumon piceator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 317.
piceatorius Grav. — ♂ — Eur. centr.
Ichneumon piceatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 335 n. 76, ♂.
Ichneumon piceatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 473 n. 191, ♂. [p. 21, ♂.
Ichneumon piceatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 386 (Misc. p. 27)
Ichneumon piceatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 212 & 215 n. 51, ♂.
Ichneumon piceatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 592 n. 37, ♂.
piceatus — ♀ — Eur.: Austria inf.
Ichneumon piceatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 24 n. 7, ♀.
Ichneumon piceatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 559 n. 59, ♀.
piceipes Steph.! — ♀ — Eur.: Britannia.
Ichneumon picipes Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 204 n. 215.
Ichneumon picipes Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 213 n. 138, ♀.
piceus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 64 n. 253.
Ichneumon piceus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2703 n. 309.
Ichneumon piceus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1064 n. 288.
picii Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon Pici Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VII. 1894 p. 179, ♀.
Ichneumon Pici Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 251 n. 42, ♀.

picticollis Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon picticollis Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 204 n. 122, ♀.
Ichneumon picticollis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 556 n. 5, ♀.
pictifrons Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Ichneumon pictifrons Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 160 n. 37, ♂.
Ichneumon pictifrons Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 161 n. 81, ♂.
pictipes Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon pictipes Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 151 n. 89, ♀.
Ichneumon pictipes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 271 n. 74, ♀.
pictor Vill.! — Eur.
Ichneumon pictor Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 197 n. 203.
Ichneumon pictor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 218 n. 70.
Ichneumon pictor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1026 n. 220.
pictor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon pictor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon pictor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 306.
pictus Gmel.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Belgia, Gallia, Germania, Russia.
Ichneumon vaginatorius Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 705 (non Linné).
Ichneumon vaginatorius Schrank, Neu. Magaz. Liebh. Entom. I. 3. 1782 p. 292 n. 705.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 71 n. 358.
Ichneumon pictus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2721 n. 403.
Ichneumon pictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 418 n. 5, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon pictus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 933 n. 83.
Ichneumon rufescens Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 207 n. 223.
Cryptus Ratzeburgii Hartig, Jahresber. Fortschr. Forstw. I. P. 2. 1838 p. 263.
Cryptus Ratzeburgii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 139 n. 2, ♀. [♀.
Ichneumon exornatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 80 n. 80,
Ichneumon pictus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 220.
Ichneumon exornatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 172 (Mant. p. 39), ♀ ♂.
Ichneumon pictus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 38 (Adn. p. 6), ♂.
Ichneumon Ratzeburgii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 173 n. 44.
Ichneumon exornatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 394 (Misc. p. 35)
[n. 28, ♀ ♂.
Ichneumon exornatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 87 n. 5.
Ichneumon pictus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 199 n. 119, ♀ ♂.
Ichneumon exornatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 402 n. 121, ♀ ♂.
Ichneumon pictus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 42, ♀ ♂.
Ichneumon exornatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 104, ♀, 212, ♂ & 216
Ichneumon pictus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 16 n. 75. [n. 102, ♀.
Ichneumon exornatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. VIII. P. 1. 1892 p. 29, ♀ ♂.
Ichneumon (Stenichneumon) pictus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1967 n. 13.
Ichneumon pictus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 567 n. 24, ♀ ♂.
pilicornis Spin. — ♂ — Am.: Chile.
Ichneumon pilicornis Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 491 n. 22, ♂.
piliventris Cam. — ♂ — Am.: Guatemala. [T. 8 F. 19.
Ichneumon piliventris Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 38. 1885 Hymen. I. p. 179 n. 131, ♂;
pilosulus Prov. — ♀ — Am.: Canada, Massachusetts.
Ichneumon pilosulus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 25.

---

[1]) *Lep.:* Geometra juniperata (Taschenberg), Oeneria dispar (Mocsáry), Macaria liturata (Ratzeburg), Cidaria fulvata (Hartig).

Ichneumon pilosulus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 151 n. 44, ♀.
Ichneumon pilosulus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 295 n. 17, ♀.
Ichneumon pilosulus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 271 n. 17, ♀.

pinetorum Ratzbg.![1]) — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon pinetorum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 105 n. 9, ♂.

pini Ström! — Eur.: Dania.
Ichneumon pini Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. Nya Saml. III. 1788 p. ?

pisorius L.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Linné, Fauna Suec. 1746 p. 966 & 968.
Ichneumon pisorius Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 561 n. 13, ♀.
Ichneumon pisorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 399 n. 1589.
Ichneumon pisorius Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 931 n. 12.
Ichneumon pisorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 846 n. 12.
Ichneumon pisorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 151 n. 1755.
Ichneumon pisorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 260 n. 15.
Ichneumon pisorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 138 n. 12.
Ichneumon pisorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2677 n. 12.
Ichneumon pisorius Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 345 n. 753b, ♂.
Ichneumon pisorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 345.
Ichneumon pisorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 167 n. 17.
Ichneumon pisorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 140 n. 30.
Ichneumon pisorius Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 157 n. 483.
Ichneumon pisorius Walckenaer, Faun. Paris. II. 1802 p. 51 n. 13.
Ichneumon pisorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 59 n. 25.
Ichneumon pisorius Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 955 [n. 3.
Ichneumon pisorius Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 186 n. 27.
Ichneumon pisorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 62 n. 754-55, ♂.
Ichneumon pisorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 112, ♀.
Ichneumon pisorius Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 8.
Ichneumon pisorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 332 n. 72, ♀ ♂.
Ichneumon pisorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 251.
Ichneumon pisorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 285.
Ichneumon pisorius Trentepol, Isis 1826 p. 233 n. 51.
Ichneumon fusorius Trentepol, Isis 1826 p. 335 n. 54.
Ichneumon fusorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 933 n. 84, ♂.
Ichneumon pisorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 363 n. 21, ♀ ♂.
Ichneumon pisorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 14 n. 6.
Ichneumon similatorius Holmgren, Entom. Tidsskr. VII. 1886 p. 43 n. 2, ♀ ♂.
Ichneumon (Protichneumon) pisorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1900 n. 2 [non 1].
Ichneumon pisorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 524 n. 4, ♀ ♂.

pistorius Grav.[3]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon molitorius var. a Schrank, Fauna Boica II. 1. 1802 p. 274 n. 2072.
Ichneumon pistorius Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 16 n. 38.
Ichneumon deliratorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 219 n. 68, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon pistorius (Hellwig) Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 231 n. 74, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Trachea spec. (Ratzeburg).

[2]) *Lep.:* Smerinthus ocellatus, Sm. populi (Bouché), Sphinx ligustri (Ratzeburg), Sph. pinastri (Hartig, Rondani), Ptilodontis palpina, Tryphaena pronuba (Giraud), Hadena pisi (Ratzburg). — *Col.:* Curculio pistaciperda (Rondani).

[3]) *Lep.:* Orgyia pudibunda (Vollenhoven).

Ichneumon pistorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 153 n. 73.
Ichneumon pistorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 359 n. 4, ♀ ♂.
Ichneumon pistorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 81 n. 81,
Ichneumon pistorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 43 n. 24, ♀ ♂. [♀♂.
Ichneumon pistorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 307 n. 75, ♀♂.
Ichneumon pistorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 402 n. 122, ♀♂.
Ichneumon pistorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 42, ♂.
Ichneumon pistorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 103 n. 22, ♀ ♂.
Ichneumon (Stenichneumon) pistorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1965 n. 1.
Ichneumon pistorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 566 n. 76, ♀♂.

var. **atrocaeruleus** Tischb. — ♀ — Eur.: Dalmatia.
Ichneumon atrocoeruleus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXIX. 1868 p. 249 n. 3, ♀.
Ichneumon pistorius var. atrocoeruleus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894

var. **solutus** Berth. — ♂ — Eur. [p. 567, ♀.
Ichneumon pistorius var. solutus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 567,

placidulus D. T. — ♀ — Austr.: New Zealand. [♂.
Ichneumon placidus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 476, ♀ [nec Provancher].
Ichneumon placidus Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 121, ♀.
Ichneumon placidulus m.

placidus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon placidus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 76.
Ichneumon placidus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 174 n. 138, ♂.
Ichneumon placidus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 360 n. 53, ♂.
Ichneumon placidus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 285 n. 53, ♂.

placitus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon placitus Cresson, Proc. Acad. Sc. Philadelphia 1873 p. 121 n. 45, ♀.

plagiarius Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Belgia, Germania, Hungaria.
Ichneumon plagiarius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 180 (Mant. p. 47)
Ichneumon plagiarius Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 411, ♂. [n. 99[b], ♀.
Ichneumon plagiarius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 243 n. 27, ♀♂.

plantator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon plantator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
Ichneumon plantator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 299.

platyaspis Cam. — Am.: Mexico.
Ichneumon platyaspis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 154 n. 36.

platycerus Kriechb. — ♀ — As.: Japonia.
Ichneumon platycerus Kriechbaumer, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1893/94 p. 125 n. 1, ♀.

plebejus Hal.! — ♂ — Am.
Ichneumon plebejus Haliday, Trans. Linn. Soc. London XVII. P. 3. 1836 p. 316 n. 2, ♂.

pollux Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon pollux Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 34. 1884 Hymen. I. p. 138 n. 2, ♀.

polyonomus Wesm. — ♀ — Eur.: Germania, Russia.
Ichneumon latrator var. 4 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 575, ♀. [♀.
Ichneumon polyonomus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 69 n. 242.
Ichneumon polyonomus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 584 n. 23, ♀.

var. **fallax** Berth. — Eur. [p. 584.
Ichneumon polyonomus var. fallax Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894

polystictus Kriechb. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Ichneumon polystictus Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VII. P. 8. 1887 p. 307, ♂.
Ichneumon polystictus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 254 n. 50, ♂.

polyzonius Schrk.! — ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon polyzonius Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 261 n. 2050, ♂.
Ichneumon polyzonius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1053 n. 269.
polyzonius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon polyzonius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279.
Ichneumon polyzonius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 361.
pomilius Prov. — ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon pomilius Provancher, Natural. Canada. IX. 1877 p. 9.
Ichneumon pomilius Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 164 n. 93, ♂.
Ichneumon pomilius Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 352 n. 35, ♂.
Ichneumon pomilius Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 278 n. 35, ♂.
poplitaeus Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon poplitaeus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 426 n. 98.
porrectus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 72 n. 377.
Ichneumon porrectus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2710 n. 212 & p. 2722 [n. 414.
posticus Fourcr.! — Eur.: Britannia, Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 355 n. 76.
Ichneumon posticus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 419 n. 77.
Ichneumon profusor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 212 n. 23.
Ichneumon posticus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1003 n. 180.
praeceptor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon praeceptor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Péterbourg VIII. 1822 p. 270.
Ichneumon praeceptor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 334.
praedatorius Smith — As.: Celebes.
Ichneumon praedatorius Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 59 n. 2.
praedunculus Fonsc.! — ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon praedunculus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 416 n. 67, ♂.
praegniarius Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. centr.
Ichneumon praegniarius Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 170 n. 7, ♀♂.
Ichneumon praegniarius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 641 n. 134, ♀♂.
praestigiator Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Belgia, Germania.
Ichneumon praestigiator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 79 [n. 78, ♂.
Ichneumon deletus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 80 n. 79, ♀.
Ichneumon deletus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 172 (Mant. p. 39), ♀.
Ichneumon deletus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 38 (Adn. p. 6), ♀.
Ichneumon deletus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 11, ♀.
Ichneumon praestigiator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 402 n. 119, ♂.
Ichneumon deletus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 402 n. 120, ♀.
Aoplus inermis Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 137 n. 278, ♂.
Ichneumon deletus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 42, ♀.
Ichneumon deletus Kriechbaumer, Entom. Nachr. VII. 1881 p. 135 n. 8, ♂.
Ichneumon praestigiator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLIII. 1882 p. 479 n. 8, ♂.
Ichneumon deletus Möller, Entom. Tidsskr. IV. 1883 p. 92, ♀.
Ichneumon deletus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 16 n. 77.
Ichneumon praestigiator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 294 n. 52.
Ichneumon (Stenichneumon) deletus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1967 n. 9.
Ichneumon praestigiator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 568 n. 25, ♀♂.
praestolatorius Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon praestolatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 154 n. 1785.
Ichneumon praestolatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 952 n. 106.

praetorius Oliv.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon pretorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 168 n. 21.
Ichneumon pretorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 52 n. 16.
Ichneumon pretorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 895 n. 29.

praeustus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 69 n. 326.
Ichneumon praeustus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2718 n. 372.
Ichneumon praeustus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1041 n. 247.

pravus Cress.[1] — ♀ — Am.: Canada, Massachusetts.
Ichneumon pravus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 151 n. 45, ♀.
Ichneumon pravus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 295 n. 18, ♀.
Ichneumon pravus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 271 n. 18, ♀.

primatorius Forst.[2] — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon raptorius Brünnich, Prodr. insectol. Siaelland 1761 p. 17.
Ichneumon raptorius Brünnich, Pontoppidan. Danske Atlas 1766 p. 456 n. 2; T. 17.
Ichneumon primatorius Forster, Nov. spec. Insect. 1771 p. 81 n. 81.
Ichneumon raptorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 152 n. 1765.
Ichneumon primatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2678 n. 196.
Ichneumon bicinctus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 346; T. 35 F. 1.
Ichneumon grossorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 136 n. 17.
Ichneumon extensorius Panzer, Faun. Insect. German. II. 1794 P. 19 T. 17.
Ichneumon grossorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 78 T. 8.
Ichneumon grossorius Schröckenstein, Verz. d. Halbkäfer etc. 1802 p. 25 n. 64.
Ichneumon grossorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 57 n. 15.
Ichneumon extensorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 61.
Ichneumon grossorius Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 256 n. 3739.
Ichneumon grossorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 111, ♀ ♂.
Ichneumon grossorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284.
Ichneumon grossorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 304 n. 36, ♀.
Ichneumon grossorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon grossorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 287.
Ichneumon grossorius Trentepol, Isis 1826 p. 226 n. 43.
Ichneumon grossorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 298 n. 103, ♀.
Ichneumon flavolineatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 300 n. 104, ♂.
Ichneumon primatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 165 n. 103.
Ichneumon flavolineatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 165 n. 104.
Ichneumon grossorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 35 [n. 29, ♀ ♂.
Ichneumon grossorius Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 409; T. 65 F. 5.
Ichneumon grossorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 6, ♀ ♂.
Ichneumon grossorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 92 n. 54, ♀ ♂.
Ichneumon grossorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 381 n. 39, ♀ ♂.
Ichneumon primatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 180 & 215 n. 48, ♀ ♂.
Ichneumon grossorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1930 n. 45.
Ichneumon primatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 620 n. 94, ♀ ♂.

problema Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Ichneumon problema Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 496 n. 28, ♀.

---

1) *Lep.:* Fidonia faxonaria (Min.).
2) *Lep.:* Tryphaena fimbria (Bignell).

procax Cress. — ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon procax Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 170 n. 117, ♂.
procerus Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur.
Ichneumon procerus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 550 n. 228, ♂.
Ichneumon procerus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 196 n. 188.
Ichneumon derivator Wesmael, Nouv.mém.acad.sc.Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p.92 n.96, ♀.
Ichneumon procerus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 65 n. 228.
Ichneumon derivator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 203, ♂.
Ichneumon derivator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p.406 n.140, ♀ ♂.
Ichneumon derivator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 44, ♀ ♂.
Ichneumon derivator Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 110 n. 100, ♀ ♂.
Ichneumon (Barichneumon) derivator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1963 n. 11.
Ichneumon bilunulatus var. derivator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 249, ♀.
proletarius Wesm. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Ichneumon deceptor var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 335, ♀ ♂.
Ichneumon proletarius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 156 (Mant. p. 23) [n. 48b, ♀.
Ichneumon proletarius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 377 (Ot. p. 26) n. 24, ♀ ♂.
Ichneumon proletarius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 23 n. 36, ♀ ♂.
Ichneumon proletarius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1939 n. 69.
Ichneumon proletarius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 658 n. 168, ♀ ♂.
var. **rufipes** Kriechb. — ♀ — Eur.: Littorale.
Ichneumon proletarius var. rufipes Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1895 [p. 36, ♀.
prolixus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon prolixus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 118 n. 36, ♂.
promissorius Er. — ♀ ♂ — Austr.: Tasmania.
Ichneumon promissorius Erichson, Arch. f. Naturg. VIII. P. 1. 1841 p. 256 n. 223, ♀ ♂.
promptus Cress. — ♀ ♂ — Am.: New Hampshire, Massachusetts.
Ichneumon promptus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 152 n. 47, ♀ ♂.
propinquus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Hoplismenus propinquus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 22 n. 4, ♀.
Ichneumon propinquus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 127 n. 67.
propitius Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Ichneumon propitius Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 156, ♂.
Ichneumon propitius Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 182 n. 187, ♂.
protervus Holmgr. — ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon protervus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 205 n. 123, ♂.
Ichneumon protervus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 564 n. 20, ♂.
proximus (Prov.) Cress. — ♀ — Am.: Canada, New Hampshire.
Phygadeuon proximus Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 283.
Ichneumon proximus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 184 n. 193, ♀.
Ichneumon proximus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 365 n. 67, ♀.
Ichneumon proximus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 290 n. 67, ♀.
pseudocryptus Wesm.[2]) — ♀ — Eur.: Belgia, Germania.
Ichneumon pseudocryptus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 392 (Ot. p. 41) n. 42, ♀.
Ichneumon pseudocryptus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 281 n. 103, ♀.
pterelas Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon pterelas Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 34. 1884 Hymen. I. p. 142 n. 11, ♀; T. 7 F. 4.

---

[1]) *Lep.:* Fidonia piniaria (Brischke).
[2]) = ? I. Försteri Wesm.

puerilis Cress. — ♂ — Am.: Canada, Massachusetts.
Ichneumon puerilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 296, ♂.
Ichneumon mellicoxus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 48.
Ichneumon puerilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 158 n. 68, ♂.
Ichneumon puerilis Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 298 n. 26, ♂.
Ichneumon puerilis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 274 n. 26, ♂.
puerperae Mocs.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Ichneumon puerperae Mocsáry, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 209 n. 2, ♂.
Ichneumon puerperae Mocsáry, Magy. Tud. Akad. Math. & Termész. Közlem. XX. P. 1. 1885 [p. 77 n. 20, ♀ ♂; T. 1.
Ichneumon puerperae Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 556 n. 51, ♀♂.
puerulus Kriechb.[2]) — ♀ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon puerulus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 182 n. 31, ♀.
Ichneumon puerulus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 572 n. 87, ♀.
pulchellatus Bridgm.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia.
Ichneumon pulchellatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1889 p. 411, ♀ ♂.
Ichneumon pulchellatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 276 n. 84, ♀♂.
var. **exannulatus** Berth. — ♀ — Eur.: Helvetia. [p. 136, ♀.
Ichneumon pulchellatus var. exannulatus Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1899
pulcher Brullé — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon pulcher Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 304 n. 8, ♀ ♂.
Ichneumon pulcher Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 147 n. 24, ♀♂.
pulcherrimus D. T. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Ichneumon pulcher Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 32 n. 19, ♀ [nec Brullé].
Ichneumon pulcher Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 254 n. 48, ♀.
Ichneumon pulcherrimus m.
pulchratorius Thunbg.! — Afr.: Guinea.
Ichneumon pulcratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253.
Ichneumon pulcratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 288.
pullatus Cress.[4]) — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon pullatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 146 n. 19, ♂.
Ichneumon subcyaneus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 148 n. 22, ♀.
Ichneumon subcyaneus Riley, 3rd Ann. Rep. Insect. Missouri 1871 p. 69.
Ichneumon pullatus Riley, 3rd Ann. Rep. Insect. Missouri 1871 p. 69.
Ichneumon subcyaneus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 149 n. 34, ♀ ♂.
Ichneumon subcyaneus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 293 n. 12, ♀ ♂.
Ichneumon subcyaneus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 269 n. 12, ♀♂.
pullulatorius Zett.! — ♀ — Eur.: Lapponia.
Ichneumon pullulatorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 365 n. 33, ♀.
pulvinatus Kriechb.[5]) — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria. [p. 146, ♀.
Ichneumon pulvinatus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXVIII. 1874
Ichneumon pulvinatus Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 29, ♂.
Ichneumon pulvinatus Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 480, ♂.
Ichneumon pulvinatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 583 n. 20, ♀♂.

---

1) *Lep.:* Catocala puerpera (Mocsáry).
2) *Lep.:* Numeria pulveraria (Kriechbaumer).
3) *Lep.:* Eupithecia pulchellata (Bridgman).
4) *Lep.:* Spilosoma virginica (Fabricius). — *Hymen.:* Nematus ventralis (Say, Ashmead).
5) *Lep.:* Melitaea cinxia (Kriechbaumer).

punctatus Fourcr.! — ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 335 n. 31.
Ichneumon punctatus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 403 n. 31.
Ichneumon punctatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 209 n. 14.
Ichneumon punctatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 970 n. 126, ♂.
punctor Thunbg.! — Eur.
Ichneumon punctor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 259.
Ichneumon punctor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 307.
punctorius Müll.! — Eur. Dania.
Ichneumon punctorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 152 n. 1771.
punctulatus Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon punctulatus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 407 n. 43.
Ichneumon punctulatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 190 n. 173.
pupparum Fourcr.! — Eur.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 358 n. 83.
Ichneumon pupparum Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 422 n. 84.
Ichneumon pupparum Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 212 n. 29.
Ichneumon pupparum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1025 n. 218.
purgatorius Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon purgatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 153 n. 1772.
Ichneumon purgatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 887 n. 20.
purpurator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon purpurator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 270.
Ichneumon purpurator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 336.
purpuripennis Cress. — ♀ — Am.: California.
Ichneumon purpuripennis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 175 n. 145, ♀.
Ichneumon purpuripennis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 350, ♀.
pusillator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon pusillator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 267.
Ichneumon pusillator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 326.
putus Cress. — ♀ — Am.: Connecticut.
Ichneumon putus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 173 n. 134, ♀.
pygmaeus Poda! — Patria ?
Ichneumon pygmaeus Poda, Insect. mus. Graec. 1761 p. 104 n. 2.
pygmaeus Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Ichneumon pygmaeus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 350, ♀.
quadrialbatus Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Ichneumon quadrialbatus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 298 n. 27, ♀.
Ichneumon fossorius var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 165 [excl. ♀ fenn.].
Ichneumon quadrialbatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 252 n. 83, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon quadrialbatus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 17 n. 42, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon quadrialbatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 156 n. 82, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon quadrialbatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 42 n. 35, ♀.
Ichneumon quadrialbatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 151 (Mant. p. 18), ♀.

[1]) *Lep.:* Leucania evidens (Mocsáry).

Ichneumon quadrialbatus Wesmael, Mém.cour.acad.sc.Belgique VIII. 1859 p.29 (Rem.) n.83.
Ichneumon quadrialbatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 383 [n. 49, ♀ ♂.
Ichneumon quadrialbatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 104, 105 & 150 [n. 52, ♀ ♂.
Ichneumon quadrialbatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p.589 n.30, ♀ ♂.

quadriannellatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia. [[non Gravenhorst.
Ichneumon quadriannulatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 10 n. 57, ♀ ♂
Ichneumon quadriannellatus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1929 n. 43.
Ichneumon quaterannulatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p.577 n.3, ♀ ♂.
Ichneumon quadriannellatus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2395.

quadriannulatus Grav. — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon quadriannulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 556 n. 232, ♀.
Ichneumon quadriannulatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem. [p. 66 n. 232.
Ichneumon quadriannulatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 380 [n. 36, ♀.
Ichneumon quadriannulatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 539 n. 58.

quadriguttorius Thunbg.! — Eur.: Suecia. ♀.
Ichneumon quadriguttorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253.
Ichneumon quadriguttorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 286.

quadrimaculatus Costa! — Eur.: Italia.
Ichneumon quadrimaculatus A. Costa, Giambattisto Vico I. 1857 p. 41.

quadrinotatus Steph.! — ♀ — Eur.: Britannia.
Ichneumon quadrinotatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 163 n. 100.
Ichneumon quadrinotatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 182 n. 139, ♀.
Ichneumon quadrinotatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p.213 n. 204, ♀.

quadripes Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon quadripes Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 426 n. 96.
Ichneumon quadripes Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 190 n. 177.

quadripunctatus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon quadripunctatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 33 n. 88, ♂

quaesitorius L.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon quaesitorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 398 n. 1582.
Ichneumon quaesitorius Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 930 n. 5, ♀.
Ichneumon quaesitorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 328 n. 5.
Ichneumon quaesitorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 845 n. 5.
Ichneumon quaesitorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 421 n. 5.
Ichneumon quaesitorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 259 n. 5.
Ichneumon quaesitorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 136 n. 5.
Ichneumon quaesitorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2675 n. 5.
Ichneumon multicolor Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p.2678 n.225, ♂ [excl. ♀.
Ichneumon quaesitorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 351.
Ichneumon quaesitorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 169 n. 5.
Ichneumon quaesitorius Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 111 n. 244, ♂.
Ichneumon quaesitorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 136 n. 18.
Ichneumon quaesitorius Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 157 n. 482.

---

[1]) *Lep.:* Nonagria cannae (Bignell), N. typhae (Desvignes, Fitch), N. geminipuncta (Desvignes, Marshall).

Ichneumon quaesitorius Walckenaer, Faun. Paris. II. 1802 p. 51 n. 10.
Ichneumon quaesitorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 57 n. 18.
Ichneumon quaesitorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♀.
Ichneumon quaesitorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255.
Ichneumon quaesitorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 295.
Ichneumon quaesitorius Trentepol, Revis. crit. gen. Ichneum. 1825 p. 19 n. 4.
Ichneumon quaesitorius Trentepol, Isis 1826 p. 66 n. 4.
Ichneumon multicolor Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 9 n. 7, ♂.
Ichneumon multicolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 168 n. 34, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon quaesitorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 253 n. 84, ♀.
Ichneumon quaesitorius Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 17 n. 39.
Ichneumon multicolor Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 141 n. 40, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon quaesitorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 157 n. 83.
Ichneumon quaesitorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 304 n. 10.
Ichneumon paludator Desvignes, Trans. Entom. Soc. London (2) III. 1854 p. 44, ♀ ♂.
Ichneumon quaesitorius Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 18 [n. 34, ♀ ♂.
Ichneumon quaesitorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 6, ♂.
Ichneumon quaesitorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 121 n. 72, ♀ ♂.
Ichneumon quaesitorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 312 n. 34b.
Ichneumon quaesitorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 382 [n. 41, ♀ ♂.
Ichneumon quaesitorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 105 n. 62, ♀.
Ichneumon quaesitorius Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 83 n. 72, ♀.
Ichneumon quaesitorius Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLIII. 1882 p. 478 n. 5, ♂.
Ichneumon quaesitorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1934 n. 53.
Ichneumon quaesitorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 589 n. 31, ♀ ♂.

querceti Schrk.! — ♀ ♂ — Eur.
Ichneumon querceti Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 303 n. 2136, ♀ ♂.
Ichneumon querceti Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 951 n. 104, ♀ ♂.

quinquealbatus Kriechb. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Ichneumon quinquealbatus Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VIII. 6. 1890 [p. 235, ♂.
Ichneumon quinquealbatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 628 n. 110, [♂.

quinquenotatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
? Ichneumon quinquenotatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 284 n. 10, ♀.
Ichneumon quinquenotatus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1936 n. 57, ♀ ♂.
Ichneumon quinquenotatus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2397 n. 57, ♀ ♂.

raptor Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon raptor O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 158 n. 1836.
Ichneumon raptor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1006 n. 186.

raptorius Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon raptorius Linné, Syst. nat. Ed. 10a I. 1758 p. 561 n. 6.
? Ichneumon raptorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2a 1761 p. 397 n. 1579.
? Ichneumon raptorius Linné, Syst. nat. Ed. 12a I. 2. 1767 p. 930 n. 2.
? Ichneumon raptorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 327 n. 2.
? Ichneumon raptorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 844 n. 2.
? Ichneumon raptorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 421 n. 2.
? Ichneumon raptorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 259 n. 2.
? Ichneumon raptorius Razoumowski, Hist. nat. Jorat. I. 1789 p. 214 n. 244.

---

[1]) *Lep.:* Satyrus Janira (Brischke, Bridgman), Liparis monacha (Ratzeburg).

? Ichneumon raptorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 134 n. 2.
Ichneumon extensorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 136 n. 4 [excl. spec.].
? Ichneumon raptorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2675 n. 2.
? Ichneumon raptorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 351.
Ichneumon extensorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 165 n. 4 [excl. spec.].
? Ichneumon raptorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 132 n. 6.
? Ichneumon raptorius var. β Schrank, Fauna Boica II. 1. 1802 p. 277 n. 2076.
? Ichneumon raptorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 50 n. 4.
? Ichneumon raptorius Latreille, Dictionn. hist. nat. XI. 1804 p. 538.
? Ichneumon raptorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 56 n. 8. [n. 2.
? Ichneumon raptorius Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 955
? Ichneumon raptorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 109, ♀ ♂.
? Ichneumon raptorius Bechstein, Forstinsectol. 1818 p. 143 n. 288 & p. 491 n. 2.
Ichneumon raptorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 303 n. 35, ♂.
Ichneumon captorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255.
Ichneumon captorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 294.
Ichneumon raptorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 286 n. 97, ♀ ♂.
? Ichneumon raptorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 897 n. 32.
Ichneumon raptorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 162 n. 98.
Ichneumon raptorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 363 n. 25, ♀. [♀ ♂.
Ichneumon raptorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 43 n. 37,
Ichneumon raptorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 138 n. 24, ♂.
Ichneumon raptorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 60 n. 17, ♀.
Ichneumon raptorius Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 34 n. 97.
Ichneumon raptorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 104 n. 61, ♀ ♂.
Ichneumon raptorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 384 n. 51, ♀ ♂.
Ichneumon raptorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 39, ♀ ♂.
Ichneumon raptorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 181 & 212 n. 57, ♀ ♂.
? Ichneumon Nereni Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 8 n. 49, ♀ ♂.
Amblyteles raptorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 118 n. 22.
Ichneumon raptorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 615 n. 82, ♀ ♂.
Ichneumon (Spilichneumon) raptorius Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2068 n. 1.

var. **albicaudus** Berth. — ♂ — Eur.: Belgia. [p. 615, ♂.
Ichneumon raptorius var. albicaudus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894

var. **rufolineatus** Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon rufolineatus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 112 n. 65, ♀. [p. 615, ♀.
Ichneumon raptorius var. rufolineatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894

rarus Tischb. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon rarus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 427 n. 85, ♀.
Ichneumon rarus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 22 n. 32.
Ichneumon rarus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1926 n. 31.
Ichneumon rarus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 653 n. 155, ♀.

var. **thomsonii** Berth. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon rarus var. 1 Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 22 n. 32, ♀.
Ichneumon rarus var. Thomsoni Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 653.

recens Cress. — ♂ — Am.: Virginia.
Ichneumon recens Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 153 n. 50, ♂.

recticornis Rossi! — Eur.: Italia.
Ichneumon recticornis Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 51 n. 784.
Ichneumon regulator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 195 n. 155.
Ichneumon recticornis Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 75 n. 784.

rector Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon rector Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 268.
Ichneumon rector Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 330.
redactor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon redactor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273.
Ichneumon redactor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 343.
relator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon relator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 n. 264.
Ichneumon relator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 317.
repetitor Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Hispania.
? Ichneumon criticus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 175 n. 15, ♂.
Ichneumon repetitor Kriechbaumer, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 237, ♀ ♂.
Ichneumon repetitor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII 1894 p. 647 n. 144, ♀♂.
residuus Say — ♀ — Am.: United States.
Ichneumon residuus Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 73 n. 12.
Ichneumon residuus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 231 n. 11.
Ichneumon residuus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 377 n. 12.
Ichneumon residuus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 688 n. 11.
Ichneumon residuus Cresson, Trans. Amer. Soc. VI. 1877 p. 184 n. 196, ♀.
resinanae Ratzbg.! — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon resinanae Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 165 n. 14, ♂.
restrictus Cress. — ♂ — Am.: New York.
Ichneumon restrictus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 169 n. 115, ♂.
reticulator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon reticulator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon reticulator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 321.
retusorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon retusorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Ichneumon retusorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 355.
ridibundus Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon ridibundus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 329 n. 123, ♂.
Ichneumon ridibundus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 99 [n. 105, ♀♂.
Ichneumon hassicus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 135 n. 31, ♀.
Ichneumon ridibundus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 36 n. 26, ♀♂.
Ichneumon ridibundus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 38 n. 123.
Ichneumon ridibundus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 201 n. 120, ♀ ♂.
Ichneumon ridibundus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 409 n. 151, [♀♂.
Ichneumon ridibundus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 181 n. 104, ♀♂.
Ichneumon ridibundus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 109 n. 93.
Ichneumon (Barichneumon) ridibundus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1960 n. 3.
Ichneumon ridibundus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 554 n. 1, ♀♂.
var. **annulatus** Berth. — ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon ridibundus var. annulatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 554, ♂.
rimulosus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon simulosus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 16 n. 15, ♀♂ [err. typogr.].
Ichneumon (Stenichneumon) rimulosus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1966 n. 8, ♀♂.
Ichneumon rimulosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 548 n. 33, ♀♂.

---

[1]) *Lep.:* Cryptorrhynchus lapathi (Ratzeburg).

ringii Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia.
Ichneumon Ringii Holmgren, Entom. Tidskr. V. 1884 p. 64 n. 25-26, ♀ ♂.
Ichneumon Ringii Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1944 n. 80.
Ichneumon Ringii Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 572 n. 88, ♀ ♂.
rixator Schellenbg.! — Eur.: Helvetia.
Ichneumon rixator Schellenberg, Entom. Beitr. I. 1802 p. 23; T. 9 F. 1-7.
Ichneumon rixator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 992 n. 156.
rixosus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Hoplismenus rixosus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 20 n. 1, ♀.
Ichneumon rixosus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 126 n. 65, ♀.
rogenhoferi Kriechb.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Tirolia, Gallia.
Ichneumon Rogenhoferi Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 24, ♀ (♂).
Ichneumon Rogenhoferi Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 609 n. 70, ♀ ♂.
rosaceus Schrk. — Eur.: Bavaria.
Ichneumon rosaceus Schrank, Gistl: Faunus N. F. I. 1837 p. 14.
rothneyi Cam. — ♂ — As.: Ceylon.
Ichneumon Rothneyi Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 6, ♂; T. 3 F. 2
rotundator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon rotundator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon rotundator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 339.
rubens Fonsc.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Gallia.
Ichneumon rubens Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 407 n. 54, ♀.
Ichneumon rubens Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 365 (Misc. p. 7) n. 1, ♀.
Ichneumon rubens Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 362 (Ot. p. 11) n. 7, ♀ ♂.
Ichneumon rubens Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 374 n. 12, ♀ ♂.
Ichneumon rubens Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 196 n. 44, ♂ & p. 198 n. 45, ♀.
Ichneumon rubens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 522 n. 1, ♀ ♂.
var. **nigrocastaneus** Berth. — ♀ — Eur. [p. 523, ♀.
Ichneumon rubens var. nigrocastaneus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894
var. **notatus** Berth. — ♀ — Eur.
Ichneumon rubens var. notatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 523, ♀
rubicundus Cress.[3]) — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon rubicundus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 176 n. 60, ♀.
Ichneumon rubicundus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 184 n. 195, ♀ ♂.
Ichneumon rubicundus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 326 n. 79, ♂.
Ichneumon rubicundus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 765 n. 79, ♂.
rubicundus Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 352 n. 70.
Ichneumon rubicundus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 417 n. 71.
Ichneumon rubicundus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 214 n. 261.
Ichneumon excursor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 195 n. 154.
Ichneumon excursor Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 62 n. 67.
rubidus Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Caffaria.
Ichneumon rubidus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 45 n. 21, ♀ ♂.
rubiginator Thunbg.! — Afr.: Cap.
Ichneumon rubiginator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 260.
Ichneumon rubiginator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 309.

---

1) *Lep.:* Nemeophila plantaginis, Plusia divergens (Rogenhofer).
2) *Lep.:* Catocala elocata (Berthoumieu).
3) *Hymen.:* Lophyrus abietis (Walsh).

rubratorius Müll.![1]) — Eur.: Dania.
Ichneumon rubratorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 154 n. 1786.
Ichneumon rubratorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 935 n. 86.
rubricator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon rubricator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
Ichneumon rubricator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 295.
rubricornutus Christ! — Eur.: Germania.
Ichneumon rubricornutus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 347; T. 35 F. 3.
Ichneumon rubricornutus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 963 n. 119.
rubricosus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Gallia, Germania, Russia.
Ichneumon tenebrosus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 103 [n. 111, ♀ [p. p.].
Ichneumon rubricosus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 190 n. 113, ♀ ♂.
Ichneumon rubricosus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 15 n. 69, ♀.
Ichneumon (Cratichneumon) rubricosus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1948 n. 5.
Ichneumon rubricosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 556 n. 4, ♀ ♂.
rubricus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon rubricus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 358 n. 43, ♀.
Phygadeuon rubricus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 780 n. 43, ♀.
Ichneumon rubricus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 187.
rubripes Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Ichneumon rubripes Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 492 n. 24, ♀.
rudis Fonsc.[2]) — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; Afr.: Algeria.
Ichneumon rudis Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 55 n. 7, ♀.
Ichneumon vicinus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 56 n. 9, ♂.
Ichneumon rudis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 361 (Ot. p. 10) n. 5, ♀ ♂.
Ichneumon Kastneri Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVIII. 1871 p. 309 n. 4, ♀ ♂.
Ichneumon rudis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 552 n. 43, ♀ ♂.
rudolphii Holmgr. — ♀ — Eur.: Lapponia.
Ichneumon Rudolphi Holmgren, Entom. Tidsskr. V. 1884 p. 65 n. 71-72, ♀.
Ichneumon Rudolphii Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1938 n. 66.
Ichneumon Rudolphi Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 557 n. 6, ♀.
rufator Thunbg.! — Afr.: Cap.
Ichneumon rufator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258.
Ichneumon rufator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 305.
rufator Steph.! — ♂ — Eur.: Britannia.
Ichneumon rufator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 201 n. 203, ♂.
Ichneumon rufator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 214 n. 142, ♂.
ruficauda Wesm.[3]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon rufinus var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 481 n. 198, ♀.
Ichneumon ruficauda Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 23 [n. 6, ♀ ♂.
Ichneumon ruficauda Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 36 (Adn. p. 4), ♀.
Ichneumon ruficauda Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 4, ♀.
Ichneumon ruficauda Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 31 n. 15, ♀ ♂.
Ichneumon ruficauda Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 374 n. 10, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Trachea spec. (Rondani).
[2]) *Lep.:* Cnethocampa pityocampa (Buysson).
[3]) *Lep.:* Cosmia abluta (Mocsáry), C. trapezina (Brischke).

Ichneumon ruficauda Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N.F. IV. P.3. 1878 p.37, ♀♂.
Ichneumon ruficaudus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 211 n. 16, ♀ ♂.
Ichneumon (Coelichneumon) ruficauda Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1909 n. 20.
Ichneumon ruficaudus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 546 n. 31, ♀♂.

ruficeps Grav.[1]) — ♀ — Eur.: Britannia, Germania, Hungaria, Russia.
Ichneumon ruficeps Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 633 n. 274, ♀.
Ichneumon ruficeps Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 206 n. 221.
Ichneumon ruficeps Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 192 n. 114, ♀.
Ichneumon ruficeps Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 411 n. 159, ♀.
Ichneumon ruficeps Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 216 n. 98, ♀.
Ichneumon ruficeps Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 15 n. 70, ♀.
Ichneumon (Cratichneumon) ruficeps Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1948 n. 6.
Ichneumon ruficeps Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 555 n. 3, ♀.

var. **fucatus** Wesm. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ichneumon fucatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 403 (Misc. p. 44) n. 33, ♀.
Ichneumon fuscatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 388 (Ot. p. 37) n. 37, ♀.
Ichneumon ruficeps var. fucatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 555, ♀.

ruficollis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon ruficollis Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 79 n. 45, ♀.
Ichneumon ruficollis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 657 n. 166, ♀.
Ichneumon ruficollis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2395 n. 32b, ♀ ♂.

ruficornis Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 69 n. 337 & p. 70 n. 338.
Ichneumon ruficornis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2719 n. 383.
Ichneumon ruficornis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1076 n. 310 & p. 1087 n. 329.

rufidens Wesm. — ♀ — Eur. centr.
Ichneumon rufidens Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 49 n. 42, ♀.
Ichneumon rufidens Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 202, ♀.
Ichneumon rufidens Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 386 n. 59, ♀.
Ichneumon rufidens Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 180 n. 59, ♀.
Ichneumon rufidens Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 4. 1887 p. 87, ♀.
Ichneumon rufidens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 607 n. 67, ♀.

rufidorsatus Bridgm. — ♀ — Eur.: Britannia.
Ichneumon rufidorsatus Bridgman, Trans. Entom. Soc. London 1887 p. 361.
Ichneumon rufidorsatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 562 n. 14, ♀.

rufifrons Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon rufifrons Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 139 n. 17, ♀.
Ichneumon pallidatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 196 n. 51, ♂.
Ichneumon rufifrons Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 10 n. 11.
Ichneumon pallidatorius Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 14 n. 28.
Ichneumon rufifrons Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 134 n. 22.
Ichneumon pallidatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 177 n. 136.
Ichneumon rufifrons Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 104 n. 113, ♀♂.
Ichneumon rufifrons Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 37 n. 28, ♀♂.
Ichneumon rufifrons Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 15, ♀ ♂.
Ichneumon rufifrons Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 157 n. 93, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Selenia lunaria (Bignell).

[2]) *Lep.:* Cidaria ruptata (Brischke), C. corylata (Bridgman), Lithosia rubricollis (Giraud).

Ichneumon rufifrons Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 246 n. 17, ♀.
Ichneumon pallidatorius Taschenberg, Zeitschr.f.d.ges.Naturw. XXVII. 1866 p. 283 n. 51, ♂.
Ichneumon rufifrons Wesmael, Bull.acad.sc.Belgique (2) XXIV. 1867 p. 449 (Doc. p. 9) n. 5, ♀♂.
Ichneumon rufifrons Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 411 n. 163, ♀♂.
Ichneumon rufifrons Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 103 n. 80, ♀.
Ichneumon pallidatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 103 n. 80, ♂.
Ichneumon rufifrons Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 15 n. 71, ♀.
Ichneumon (Cratichneumon) rufifrons Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1948 n. 7.
Ichneumon rufifrons Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 269 n. 71, ♀♂.

rufigena Kriechb. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Ichneumon rufigena Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXIX. 1875 p. 149 [& 154 p. 5, ♀.
Ichneumon rufigena Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 651 n. 151, ♀.

rufinus Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur. centr.
? Ichneumon judex O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 155 n. 1800.
Ichneumon rufinus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 336 n. 78, ♀.
Ichneumon rufinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 481 n. 198, ♀ [excl. varr.].
Ichneumon rufinus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 36 [n. 27, ♀♂.
Ichneumon rufinus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 151 (Mant. p. 18), ♀♂.
Ichneumon rufinus Azambre, Ann. soc. entom. France (3) IV. 1856 Bull. p. XXV, ♀♂.
Ichneumon rufinus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 380 n. 37, ♀♂.
Ichneumon rufinus Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 24 n. 13, ♀.
Ichneumon rufinus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 210 n. 14, ♀ ♂.
Ichneumon rufinus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 16 n. 14.
Ichneumon rufinus A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p. 14.
Ichneumon (Stenichneumon) rufinus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1966 n. 7.
Ichneumon rufinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 569 n. 81, ♀♂.

var. **helleri** Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Alpes.
Ichneumon Helleri Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 167 n. 3, ♀♂.
Ichneumon rufinus var. Helleri Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 570, ♀♂.

var. **semirufus** Berth. — ♀ — Eur.
Ichneumon rufinus var. semirufus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 570, ♀.

rufipes Steph.! — Eur.: Britannia.
Ichneumon rufipes Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 131 n. 13.
Ichneumon rufipes Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 101 n. 143.

rufitarsis Smith — ♀ — As.: Japonia.
Ichneumon rufitarsis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 391 n. 11, ♀.

rufitibia Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Ichneumon rufitibia Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 487 n. 16, ♀.

rufiventris Brullé[2] — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon rufiventris Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 301 n. 4, ♀ ♂.
Ichneumon semicoccineus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 179 n. 65, ♂.
Ichneumon rufiventris Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 173 n. 137, ♀ ♂.
Ichneumon rufiventris Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 359 n. 52, ♀ ♂.
Ichneumon Hunterae Packard, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XXI. 1881 p. 22, ♀ ♂.
Ichneumon rufiventris Packard, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XXI. 1881 p. 23, ♂.

---

1) *Lep.:* Hemithea thymiaria (Bridgman), Ophiodes illunaris (Kirchner), Cidaria aestivaria (Brischke).

2) *Lep.:* Pyrameis cardui, P. huntera, Vanessa Melberti (Riley).

Ichneumon rufiventris Heustis, Canad. Entomol. XIII. 1881 p. 143-144.
Ichneumon rufiventris Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1884 p. 285 n. 52, ♀♂.
Ichneumon rufiventris Howard, Scudder: Butterflies U. S. 1889 p. 1875, ♀♂; T. 88 F. 1.
var. **californicus** Cress. — ♂ — Am.: New Jersey.
Ichneumon Californicus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 180 n. 66, ♂.
Ichneumon rufiventris var. Californicus Cresson, Synops. Hymen. North Amer. 1887 p. 184.
var. **incertus** Cress. — ♀ — Am.: New Jersey.
Ichneumon incertus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 183 n. 67, ♀.
Ichneumon rufiventris var. incertus Cresson, Synops. Hymen. North Amer. 1887 p. 186.
ruidosensis Cock. — Am.: Mexico.
Ichneumon Ruidosensis Cockerell, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) II. 1898 p. 456.
russatus Cress. — ♀ — Am.: Virginia.
Ichneumon russatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 183 n. 189, ♀.
Ichneumon russatus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 353, ♀.
russulus Tosqu. — ♂ — Afr.: Caffaria.
Ichneumon russulus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 26 n. 11, ♂.
rusticator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon rusticator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon rusticator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 338.
rutilus Cress. — ♀ — Am.: Virginia.
Ichneumon rutilus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 169 n. 51, ♀.
Ichneumon ? rutilus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 185 n. 201, ♀.
saevus Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Ichneumon saevus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 296, ♀.
Ichneumon saevus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 145 n. 18, ♀.
sagittator Rossi! — Eur.: Italia.
Ichneumon sagittator Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 122 n. 268.
saguenayensis Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon Saguenayensis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 356, ♂.
sagus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Illinois.
Ichneumon sagus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 294, ♀ ♂.
Ichneumon sagus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 152 n. 46, ♀ ♂.
sallaei Cam. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon Sallaei Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 162 n. 57, ♂.
saltator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon saltator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 274.
Ichneumon saltator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 347.
saltator Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon saltator O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 157 n. 1827.
Ichneumon saltator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 994 n. 159.
salutator Rossi! — Eur.
Ichneumon salutator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 40 n. 755.
Ichneumon salutator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 178 n. 71.
Ichneumon salutator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 62 n. 755.
Ichneumon salutator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 909 n. 47.
salvinii Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [F. 16.
Ichneumon Salvini Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 155 n. 41, ♀; T. 7
salvus Cress. — ♂ — Am.: Vancouvers Island.
Ichneumon salvus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 166 n. 100, ♂.
Ichneumon salvus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 349, ♂.

sanguinator Rossi[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia, Belgia, Germania, Hungaria.
Ichneumon sanguinator Rossi, Mant. Insect. App. 1792 App. p. ? n. 85.
Ichneumon sanguinator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 919 n. 63.
Ichneumon ruficollis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 206 n. 222, ♂.
Ichneumon discrepator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 102 [n. 110, ♀ ♂.
Ichneumon discrepator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 411 [n. 156, ♀ ♂.
Ichneumon sanguinator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 230 n. 8, ♀ ♂.
sanguinator Thunbg.! — As.: India or.
Ichneumon sanguinator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 260.
Ichneumon sanguinator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 310.
saphyrinus Spin. — ♀ ♂ — Am.: Chile.
Ichneumon saphyrinus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 489 n. 19, ♀ ♂.
sarcitorius L.[2]) — ♀ ♂ — Eur. tota.
Vespa Ichneumon Rajus, Hist. Insect. 1710 p. 255 n. 15.
—— Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 976.
Ichneumon sarcitorius Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 561 n. 7, ♀.
Ichneumon vaginatorius Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 562 n. 16, ♂.
Ichneumon sarcitorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 397 n. 1580, ♀.
Ichneumon vaginatorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 400 n. 1592, ♂.
Ichneumon sarcitorius Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 930 n. 3, ♀.
Ichneumon vaginatorius Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 932 n. 15, ♂.
Ichneumon XXVII, XXVIII & XXXI Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767 T. 61 F. 3, [4 & 7.
Ichneumon XLVIII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 83 F. 8.
Ichneumon vaginatorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 330 n. 19, ♂.
Ichneumon sarcitorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 844 n. 3, ♀.
Ichneumon vaginatorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 847 n. 15, ♂.
Ichneumon vaginatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 153 n. 1779, ♂.
Ichneumon curvatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 153 n. 1782, ♂.
Ichneumon vaginatorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 423 n. 19, ♂.
Ichneumon vaginator Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 349 n. 705, ♂.
Ichneumon bipartitus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 429 n. 106, ♀.
Ichneumon vaginatorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 261 n. 23, ♂.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 58 n. 161, ♂.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 59 n. 170, ♂.
Ichneumon vaginatorius Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. Nya Saml. III. 1788 p. ?, ♂.
Ichneumon sarcitorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 135 n. 3, ♀.
Ichneumon bipartitus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 142 n. 24, ♀.
Ichneumon vaginatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 145 n. 33, ♂.
Ichneumon sarcitorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2675 n. 3, ♀.
Ichneumon vaginatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2680 n. 15, ♂.
Ichneumon flavatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2684 n. 237, ♂.
Ichneumon tripunctatus Gmelin, Linné: Syst nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2684 n. 244, ♂.
Ichneumon vaginatorius Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 38 n. 750, ♂.
Ichneumon vaginatorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 343, ♂.
Ichneumon sarcitorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 168 n. 3, ♀.
Ichneumon vaginatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 171 n. 34, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Depressaria umbellana (Bridgman).
[2]) *Lep.:* Diloba caeruleocephala (Ratzeburg), Hydraecia leucographa (Mocsáry).

Ichneumon sarcitorius Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 113 n. 248, ♀.
Ichneumon vaginatorius Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 143 n. 42, ♂.
Ichneumon vaginatorius Cederhjelm, Fauna Ingric. prodr. 1798 p. 158 n. 485, ♂.
Ichneumon vaginatorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 79 T. 8 & 9.
Ichneumon vaginatorius Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 273 n. 2071, ♂.
Ichneumon sarcitorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 50 n. 5, ♀.
Ichneumon vaginatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 62 n. 39, ♂.
Ichneumon vaginatorius Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 186 n. 28, ♂.
Ichneumon vaginatorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 66, ♂.
Ichneumon farctor Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 261 n. 3750.
Ichneumon vaginatorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 59 n. 750, ♂.
Ichneumon vaginatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♂.
Ichneumon sarcitorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 111, ♀.
Ichneumon vaginatorius Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 8, ♂.
Ichneumon sarcitorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. Curios. IX. 1818 p. 284, ♀.
Ichneumon vaginatorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. Curios. IX. 1818 p. 284, ♂.
Ichneumon sarcitorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 305 n. 37, ♀.
Ichneumon vaginatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 313 n. 48, ♂.
Ichneumon vaginatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279, ♂.
Ichneumon vaginatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 359, ♂.
Ichneumon vaginatorius Trentepol, Isis 1826 p. 85 n. 30, ♂.
Ichneumon sarcitorius Trentepol, Isis 1826 p. 229 n. 46, ♀.
Ichneumon sarcitorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 302 n. 105, ♀.
Ichneumon vaginatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 357 n. 138, ♂.
Ichneumon sarcitorius Herrich-Schaeffer, Faun. Insect. German. 1829 P. 113 T. 12, ♀.
Ichneumon vaginatorius Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 380 n. 841, ♂.
Ichneumon sarcitorius Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 380 n. 844, ♀.
Ichneumon sarcitorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 165 n. 105, ♀.
Ichneumon vaginatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 174 n. 128, ♂.
Ichneumon vaginator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 362 n. 17, ♂.
Ichneumon sarcitorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 363 n. 23, ♀.
Ichneumon vaginatorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 304 n. 13, ♂.
Ichneumon sarcitorius Liebold, Zeitschr. f. Entom. IV. 1843 p. 388; T. 2 F. 7.
Ichneumon sarcitorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 60 [n. 54, ♀ ♂.
Ichneumon vaginatorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 67 n. 29, ♂.
Ichneumon vaginatorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. 1848 p. 135 n. 26, ♂.
Ichneumon lautatorius Desvignes, Catal. Brit. Ichneum. 1856 p. 18 n. 113, ♀ ♂.
Ichneumon sarcitorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 7, ♀ ♂.
Ichneumon sarcitorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 56 n. 32, ♀ ♂.
Ichneumon sarcitorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 458 (Doc. p. 20) [n. 11, ♀ ♂.
Ichneumon sarcitorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 391 n. 82, ♀ ♂.
Ichneumon sarcitorius Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 420 n. 59, ♀ ♂.
Ichneumon sarcitorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 57, ♀ ♂; T. 36 F. 1 (♂), 2 (var.) & 3 (♀).
Ichneumon vaginatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 179 & 216 n. 32, ♀.
Ichneumon lautatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 214 & 216 n. 128, ♀ ♂.
Ichneumon sarcitorius A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) II. P. 7. 1886 p. 14.
Ichneumon sarcitorius Buysson, Revue d'entom. XI. 1892 p. 258; T. 1 F. 1.
Ichneumon sarcitorius A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) V. P. 14. 1893 p. 16 n. 136, ♂.

Ichneumon sarcitorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1914 n. 3.
Ichneumon sarcitorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 646 n. 143, ♀ ♂.
Ichneumon solicitorius W. W. Smith, Entom. M. Magaz. XXXVI. 1900 p. 160.

var. **cingulatus** Berth. — ♀ — Eur. fere tota.
Ichneumon sarcitorius var. cingulatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 647, ♀.

var. **fuscipennis** Berth. — ♀ — Eur. fere tota.
Ichneumon sarcitorius var. fuscipennis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 647, ♀.

var. **mutabilis** Berth. — ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon sarcitorius var. mutabilis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 647, ♂.

saturator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon saturator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 271.
Ichneumon saturator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 337.

saturatorius L.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Degeer, Mém. hist. Insect. I. 1752 p. ?; T. 23 F. 16.
Ichneumon saturatorius Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 561 n. 11.
Ichneumon saturatorius Brünnich, Prodr. Insectol. Siaelland 1761 p. 17.
Ichneumon saturatorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 399 n. 1586.
Ichneumon nigratorius Brünnich, Danske Atlas 1766 p. 457 n. 6.
Ichneumon saturatorius Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 931 n. 9.
Ichneumon saturatorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 329 n. 11.
Ichneumon saturatorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 845 n. 9.
Ichneumon saturatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 152 n. 1767.
Ichneumon clavatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 153 n. 1774.
Ichneumon saturatorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 422 n. 11.
Ichneumon saturatorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 260 n. 12.
Ichneumon saturatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 137 n. 9.
Ichneumon saturatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2676 n. 9.
Ichneumon saturatorius Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 37 n. 746.
Ichneumon saturatorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 352.
Ichneumon saturatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 166 n. 13.
Ichneumon saturatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 135 n. 15.
Ichneumon saturator Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 157 n. 481.
Ichneumon saturatorius Dwigubsky, Prim. faun. Mosquens. 1802 p. 164 n. 570.
Ichneumon saturatorius Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 297 n. 2119, ♂.
Ichneumon saturatorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 50 n. 8.
Ichneumon saturatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 56 n. 13.
Ichneumon saturatorius Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 187 n. 33.
Ichneumon saturatorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 58 n. 746.
Ichneumon saturatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♀.
Ichneumon saturatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 294 n. 23, ♀ ♂.
Ichneumon saturatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255.
Ichneumon saturatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 295.
Ichneumon saturatorius Trentepol, Revis. crit. gen. Ichneum. 1825 p. 20 n. 6.
Ichneumon saturatorius Trentepol, Isis 1826 p. 67 n. 6, ♀.
Ichneumon saturatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 237 n. 77, ♀ ♂.
Ichneumon saturatorius Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 12 n. 19.
Ichneumon saturatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 154 n. 77.

---

[1]) *Lep.:* Dicranura vinula (Degeer, Réaumur), Meliana flammea, Calamia phragmitidis (Boie), Plusia gamma (Giraud), Nonagria typhae (Bignell).

Ichneumon saturatorius Boie, Arch. f. Naturg. II. 1. 1836 p. 41 n. 15, ♀ ♂.
Ichneumon saturator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 361 n. 15, ♀ ♂.
Ichneumon saturatorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 303 n. 9. [n. 62, ♀♂.
Ichneumon saturatorius Wesmael, Nov. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 66
Ichneumon saturatorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 58 n. 11, ♀.
Ichneumon saturatorius Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 89 n. 10, ♀.
Ichneumon saturatorius Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVIII. 1857 p. 197 n. 15.
Ichneumon saturatorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 133 n. 78, ♀ ♂.
Ichneumon saturatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 202, ♀.
Ichneumon saturatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 395 [n. 95, ♀ ♂.
Ichneumon saturatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 105 n. 67, ♀ ♂.
Ichneumon saturatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 106 n. 81, ♀.
Ichneumon (Melanichneumon) saturatorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1957 n. 6.
Ichneumon saturatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 227 n. 4, ♀♂.

var. **carnifex** Müll. — Eur.
Ichneumon carnifex O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 155 n. 1799. [p. 228.
Ichneumon saturatorius var. carnifex Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895

saucius Cress. — ♀ — Am.: Canada, Pennsylvania, Carolina.
Ichneumon saucius Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 137 n. 4, ♀.
Ichneumon saucius Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 293.
Ichneumon saucius Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 142 n. 2, ♀.
Ichneumon saucius Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 289 n. 1, ♀.
Ichneumon saucius Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 265 n. 1, ♀.

saundersii Cress. — ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon Saundersi Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 177 n. 158, ♂.

scopulator Berth. — ♀ — Eur.: Russia.
Ichneumon scopulator Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 37 n. 2, ♀.
Ichneumon scopulator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 603 n. 57, ♀.

scortator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon scortator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 269.
Ichneumon scortator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 331.

scelestus Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Ichneumon scelestus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 148 n. 23, ♀.
Ichneumon scelestus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 147 n. 26, ♀.

scibilis Cress. — ♂ — Am.: Illinois.
Ichneumon scibilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 183 n. 191, ♂.

scitulus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon scitulus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 193 n. 10, ♂.
Ichneumon scitulus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 310.
Ichneumon scitulus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 180 n. 175, ♂.
Ichneumon scitulus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 363 n. 63, ♂.
Cryptus flavipectus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 134 n. 10, ♀.
Ichneumon scitulus var. flavipectus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 361 & 783.
Ichneumon scitulus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 289 n. 63, ♂.
Cryptus flavipectus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 333 n. 10.

scriptifrons Cress. — ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon scriptifrons Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 144 n. 14, ♂.

scriptorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon scriptorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 276.
Ichneumon scriptorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 352.

scrutator Oliv.! — Am.: Cayenne.
Ichneumon scrutator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 182 n. 89.
sculpturatus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon sculpturatus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 107 n. 62, ♀ ♂.
Ichneumon sculpturatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 614 n. 80, ♀ ♂.
scutellaris Cress. — ♂ ♀ — Am.: Mexico.
Hoplismenus scutellaris Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 26 n. 12, ♂.
Ichneumon scutellaris Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 128 n. 77, ♀ ♂.
scutellator Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota; Afr.: Algeria.
Ichneumon scutellator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 175 n. 40, ♀ ♂.
Ichneumon scutellator Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 7 n. 6.
Ichneumon scutellator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 134 n. 17, ♂.
Ichneumon scutellator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 35 [n. 25, ♀ ♂.
Ichneumon scutellator Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 170 n. 29.
Ichneumon scutellator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 5, ♀.
Ichneumon scutellator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 270 n. 40, ♀ ♂.
Ichneumon scutellator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 379 n. 33, ♀ ♂.
Ichneumon scutellator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 103 & 211 n. 26, ♀ ♂.
Ichneumon scutellator Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 17 n. 16.
Ichneumon (Stenichneumon) scutellator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1966 n. 6.
Ichneumon scutellator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 568 n. 79, ♀ ♂.
var. **rufescens** Berth. — ♀ ♂ — Eur. [p. 568, ♀ ♂.
Ichneumon scutellator var. rufescens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894
sectator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon sectator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 266.
Ichneumon sectator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 325.
sectatorius Berth. — ♀ — Eur.: Russia. [n. 92, ♀.
Ichneumon sectatorius (Eversmann) Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 620
sedatus Tosqu. — ♂ — Afr.: Scioa.
Ichneumon sedatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 13 n. 4, ♂.
seditiosus Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Ichneumon seditiosus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 172 n. 131, ♀.
segmentosus Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon segmentosus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 428 n. 103.
Ichneumon segmentosus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 191 n. 181.
seisensis Kriechb. — ♂ — Eur.: Tirolia.
Ichneumon Seisensis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 330 & 366 n. 63, ♂.
Ichneumon Seisensis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 631 n. 121, ♂.
semiannulatus Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon semiannulatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. 1895 p. 111 n. 78, ♂.
Ichneumon semiannulatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 275 n. 80^b, ♂.
Ichneumon semiannulatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 396, ♂.
semicastaneus Berth. — ♀ — Afr.: Algeria.
Ichneumon semicastaneus Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1897 p. 254 n. 23, ♀.
semilevis Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Ichneumon semilaevis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 142 n. 13, ♀.
Ichneumon semilaevis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 157 n. 65, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Liparis chrysorrhoea (Réaumur), Abraxas grossulariata (Kawall), Trachea piniperda (Ratzeburg).

seminiger Cress. — ♀ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon seminiger Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 167 n. 47, ♀.
Ichneumon seminiger Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 181 n. 177, ♀.
Ichneumon seminiger Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 364 n. 64, ♀.
Ichneumon seminiger Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 289 n. 64, ♀.
semiobscurus Cam. — Am.: Guatemala.
Ichneumon semiobscurus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 34. 1884 Hymen. I. p. 139 n. 5.
semipictus Kriechb. — ♀ — Afr.: Port Natal.
Ichneumon semipictus Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 300 n. 5, ♀.
semirufus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia, Belgia, Germania, Hungaria, Italia.
Ichneumon semirufus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 338 n. 80, ♀.
Ichneumon semirufus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 488 n. 202, ♀ ♂ [excl. var. 1].
Ichneumon semirufus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 191 n. 172, ♀ ♂.
Ichneumon semirufus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 100 [n. 106, ♀ ♂.
Ichneumon semirufus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 387 (Ot. p. 36) n. 36, ♂.
Ichneumon semirufus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 61 n. 202, ♀.
Ichneumon semirufus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 410 n. 152, ♀ ♂.
Ichneumon semirufus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 211 n. 105, ♀ ♂.
Ichneumon semirufus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 278 n. 88, ♀ ♂.
var. **nigroscutatus** Berth. — ♂ — Eur. [p. 279, ♂.
Ichneumon semirufus var. nigroscutatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895
semissus Cress. — ♀ — Am.: California.
Ichneumon semissus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 183 n. 190, ♀.
Ichneumon semissus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 354, ♀.
sepiatorius Steph.! — Eur.: Britannia.
Ichneumon sepiatorius (Marshall) Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 140.
septemcinctorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon septemcinctorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 280.
Ichneumon septemcinctorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 363.
septentrionalis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon septentrionalis Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 82 n. 47, ♀ ♂.
Ichneumon septentrionalis Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 77 n. 41, ♂.
Ichneumon septentrionalis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1926 n. 32.
Ichneumon septentrionalis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 642 n. 140, [♀ ♂.
var. **mutabilis** Berth. — ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon septentrionalis var. mutabilis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. [1894 p. 645, ♂.
sequax Cress. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Ichneumon sequax Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 181 n. 179, ♀.
Ichneumon sequax Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 352, ♀.
serricornis Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Ichneumon serricornis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 13, ♂.
seticornis Tischb. — ♂ — Eur.: Germania, Hungaria.
Ichneumon seticornis Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXIX. 1868 p. 248 n. 1, ♂.
Ichneumon seticornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 571 n. 85, ♂.
sexalbatus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Belgia, Germania, Hungaria, Italia.
Ichneumon sexalbatus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 312 n. 45, ♀.
Ichneumon sexalbatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 346 n. 131, ♀.
Ichneumon lepidus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 349 n. 134, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon sedulus var. 5 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 496, ♂.

Ichneumon sexalbatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 95 [n. 99, ♀ ♂.
Ichneumon sexalbatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 65 n. 26, ♀.
Ichneumon sexalbatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 179 (Mant. p. 46), ♂.
Ichneumon sexalbatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 41 n. 131.
Ichneumon sexalbatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 13, ♀ ♂.
Ichneumon sexalbatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 407 n. 144, ♀ ♂.
Ichneumon sexalbatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 44, ♀ ♂.
Ichneumon sexalbatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 252 n. 45, ♀ (♂).
Ichneumon sexalbatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 68 n. 7.

var. **leucopsis** Kriechb. — ♂ — Eur.: Tirolia.
Ichneumon sexalbatus var. leucopsis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 69, ♂.

var. **multipictus** Kriechb. — ♂ — Eur.: Tirolia.
Ichneumon sexalbatus var. multipicta Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1899 p. 69, ♂.

sexannularis Berth. — ♀ — Eur.: Hispania.
Ichneumon sexannularis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 537 n. 12, ♀.

sexarmillatus Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon sexarmillatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVII. 1891 p. 8 n. 41, ♀.
? Ichneumon (Cratichneumon) albiscuta Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1946 n. 2, ♀.
Ichneumon sexarmillatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 234 n. 10, ♀.

sexcinctus Grav. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer. [Forster].
Ichneumon xanthorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 314 n. 49, ♂ [non
Ichneumon xanthorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 361 n. 139, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon sexcinctus Gravenhorst, Ichneum Europ. I. 1829 p. 454 n. 184, ♂.
Ichneumon xanthorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 173 n. 126, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon sexcinctus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 219, ♂.
Ichneumon sexcinctus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 381 (Ot. p. 30) n. 28, ♀ ♂.
Ichneumon sexcinctus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 392 n. 84, ♀ ♂.
Ichneumon sexcinctus Kriechbaumer, Stettin. entom. Zeitg. XXXVI. 1875 p. 386.
Ichneumon sexcinctus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 624 n. 100, ♀ ♂.

var. **obscurus** Berth. — ♀ — Eur. centr. & mer. [p. 624, ♀.
Ichneumon sexcinctus var. obscurus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894

sexguttatus Kriechb.[1] — ♂ — Eur.: Hungaria.
Ichneumon sexguttatus Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 52 n. 6, ♂.
Ichneumon sexguttatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 286 n. 113, ♂.

sicarius Grav.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Gallia, Belgia.
Ichneumon nigratorius Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 73 T. 12 [nec O. F. Müller].
Cryptus nigritorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 n. 69.
Ichneumon nigratorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♀.
Ichneumon sicarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 214 n. 64, ♀.
Ichneumon jugatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 452 n. 182, ♂.
Ichneumon nigratorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 872 n. 1, ♀.
Ichneumon sicarius Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 15 n. 34.
Ichneumon sicarius Drewsen, Arch. f. Naturg. II. 1. 1836 p. 38 n. 5, ♂.
Ichneumon nigrator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 359 n. 3, ♀ ♂. [♀ ♂.
Ichneumon sicarius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 74 n. 72,
Ichneumon sicarius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 35 n. 21, ♀ ♂.

---

1) = ? I. fortipes Wesm.

2) *Lep.:* Lithosia rubricollis (Boie), Fidonia piniaria (Brischke), Tephrosia extersaria (Bignell).

Ichneumon sicarius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 155 n. 92, ♀ ♂.
Ichneumon sicarius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 299 n. 64, ♀.
Ichneumon sicarius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 399 n. 109, ♀ ♂.
Ichneumon sicarius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 41, ♀ ♂.
Ichneumon jugatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 103 & 214 n. 78, ♀ ♂.
Ichneumon sicarius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 15 n. 72, ♀ ♂.
Ichneumon (Cratichneumon) sicarius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1947 n. 3.
Ichneumon sicarius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 268 n. 70, ♀ ♂.

siculus Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Sicilia.
Ichneumon Siculus Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VII. 1887 p. 304, ♀ ♂.
Ichneumon Siculus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 607 n. 65, ♀ ♂.

sieboldii Kriechb. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon Sieboldi Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 329 n. 62, ♂.
Ichneumon Sieboldi Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 631 n. 120, ♂.

signaticornis Kriechb. — ♂ — Eur.: Tirolia.
Ichneumon signaticornis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 331 & 366 n. 64, ♂.
Ichneumon signaticornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 631 n. 122, ♂.

signatipes Cress.[1]) — ♀ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon signatipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 308, ♀.
Ichneumon signatipes Riley, 3d Ann. Rep. Insect. Missouri 1871 p. 69.
Ichneumon signatipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 180 n. 173, ♀.

signator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon signator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 274.
Ichneumon signator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 346.

signatus Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon signatus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 428 n. 102.
Ichneumon signatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 191 n. 180.

silaceus Grav. — ♀ — Eur.: Germania, Pyrenaei montes.
Ichneumon silaceus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 278 n. 91, ♀.
Ichneumon silaceus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 160 n. 91.
Ichneumon silaceus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 33 n. 91.
Ichneumon silaceus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 385 n. 53, ♀.
Ichneumon silaceus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1933 n. 51.
Ichneumon silaceus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 608 n. 68, ♀.

silvanus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ichneumon sylvanus Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 27 n. 23-24, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon sylvanus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 17 n. 17.
Ichneumon (Stenichneumon) sylvinus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1965 n. 3 [err.].
Ichneumon sylvanus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 564 n. 71, ♀.

similans Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon similans Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 128 n. 78, ♂.

similatorius Fabr.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon IV Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1766, ♀; T. 6 F. 12.
Ichneumon X Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1766, ♀; T. 20 F. 8.
Ichneumon XXXV Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767, ♀; T. 70 F. 6.
Ichneumon exspectorius Fabricius, Entom. System. IV. 1794 p. 455 n. 30-31, ♀.
Ichneumon exspectorius Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 219 n. 30-31, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Spilosoma virginica (Riley).
[2]) *Lep.:* Melanippe luctuata (Brischke).

Ichneumon similatorius Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 221 n. 55-56, ♂.
Ichneumon similatorius Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 48, ♂; T. 11 F. 5.
Ichneumon similatorius Walckenaer, Fauna Paris II. 1802 p. 54 n. 29, ♂.
Ichneumon exspectatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 59 n. 26, ♀.
Ichneumon similatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 64 n. 48, ♂.
Ichneumon expectatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 112, ♀.
Ichneumon expectatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252, ♀.
Ichneumon similatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 276, ♂.
Ichneumon expectatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 287, ♀.
Ichneumon similatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 350, ♂.
Ichneumon expectorius Trentepol, Isis 1826 p. 235 n. 53, ♀.
Ichneumon fusorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 24 n. 9, [♀ ♂ [excl. var. 1, non Linné].
Ichneumon similatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 94 [n. 98, ♀♂.
Ichneumon fusorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 400 n. 43, ♀♂.
Ichneumon similatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 178 (Mant. [p. 45), ♀♂
Ichneumon fusorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 335 (Mant. p. 98), ♀♂.
Ichneumon fusorius Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 91 n. 17, ♂.
Ichneumon fusorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 363 (Ot. p. 12) n. 9, ♀♂.
Ichneumon fusorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 4, ♂.
Ichneumon similatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 13, ♀♂.
Ichneumon similatorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 11 n. 2, ♀ ♂.
Ichneumon similatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 203, ♀♂.
Ichneumon fusorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 375 n. 13, ♀♂.
Ichneumon similatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 407. [n. 143, ♀♂.
Amblyteles gigantorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 258 n. 28, ♀ ♂.
Ichneumon similatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 44, ♀♂.
Ichneumon similatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 211 n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon similatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 14 n. 8.
Ichneumon (Protichneumon) similatorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1900 n. 4.
Ichneumon pisorius var. gigantorius Berthoumieu, Ann. soc. entom France LXIII. 1894 [p. 525, ♀♂.

simplex Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 70 n. 354 & 359.
Ichneumon simplex Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2721 n. 399.
Ichneumon simplex Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1071 n. 300.

simulans Tischb. — ♂ — Eur.: Germania, Gallia.
Ichneumon simulans Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 428 n. 90, ♂.
Ichneumon simulans Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 578 n. 7, ♂.

singularis Berth. — ♀ ♂ — As.: Caucasus, Transcaspia.
Ichneumon singularis Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 37 n. 1, ♂.
Ichneumon singularis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 548 n. 33, ♀♂.

sinister Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Gallia.
Ichneumon leucocerus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 289 n. 17, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon leucocerus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 208 n. 60, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon leucocerus var. Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 30 n. 18, ♂.
Ichneumon sinister Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 148 (Mant. p. 115), ♂.
Ichneumon leucocerus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 30 n. 6, ♂ [excl. ♀].

Ichneumon sinister Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 367 (Misc. p. 8) n. 2, ♀.
Ichneumon sinister Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 24 n. 60, ♂.
Ichneumon sinister Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 20 n. 9, ♀ ♂.
Ichneumon sinister Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 378 n. 29, ♀ ♂.
Ichneumon sinister Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 103 n. 8, ♀ ♂.
Ichneumon (Coelichneumon) sinister Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1904 n. 6.
Ichneumon sinister Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 540 n. 18, ♀ ♂.

sinuatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon sinuatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277.
Ichneumon sinuatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 354.

sobrinus Tosqu. — ♂ — Afr.: Cap.
Ichneumon sobrinus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 24 n. 10, ♂.

solers Tosqu. — ♂ — Afr.: Scioa.
Ichneumon solers Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 17 n. 6, ♂.

solitarius Thunbg.! — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon solitarius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 254.
Ichneumon solitarius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 291.

solitarius Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon solitarius Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 118 n. 35, ♂.

solitus Cress. — ♀ — Am.: Colorado, British Columbia.
Ichneumon solitus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 144 n. 13, ♀.
Ichneumon solitus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 348, ♀.

sollicitorius Fabr. — Austr.: New Zealand.
Ichneumon sollicitorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 332 n. 30.
Ichneumon sollicitorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 425 n. 32.
Ichneumon sollicitorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 262 n. 39.
Ichneumon sollicitorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2682 n. 103.
Ichneumon sollicitorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 341.
Ichneumon sollicitorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 175 n. 57.
Ichneumon sollicitorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 148 n. 61.
Ichneumon sollicitorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 64 n. 53.
Ichneumon sollicitorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 277.
Ichneumon sollicitorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 353.
Ichneumon sollicitorius Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 120.

solutus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon solutus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 145 n. 85, ♀.
Ichneumon solutus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 264 n. 63, ♀.

sordator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon sordator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 269.
Ichneumon sordator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 333.

sordidulus Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Ichneumon sordidulus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 494 n. 26, ♀.

sordidus Wesm. — ♀ — Eur.: Gallia, Germania.
Ichneumon sordidus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 391 (Misc. p. 32) [n. 25, ♀.
Ichneumon sordidus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 399 n. 110, ♀.
Ichneumon sordidus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 557 n. 7, ♀.

sorex Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon sorex O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 155 n. 1806.

soror Cress. — ♀ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon soror Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 185 n. 75, ♀.

Ichneumon soror Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 185 n. 198, ♀.
Ichneumon soror Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 326 n. 81, ♀.
Ichneumon soror Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 766 n. 81, ♀.

speciosus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Belgia, Germania, Austria, Italia.
Ichneumon castaneus var. 3 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 559, ♀.
Ichneumon castaneus var. 5 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 560, ♂.
Amblyteles speciosus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 116 [n. 6, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon speciosus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 386 (Ot. p. 35) n. 35, ♀ ♂.
Ichneumon speciosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 401 n. 116, ♀ ♂.
Ichneumon rivalis Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 110 n. 241, ♂.
Ichneumon rivalis Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 174 n. 18, ♂.
Ichneumon speciosus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 200 n. 47.
Ichneumon speciosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 570 n. 28, ♀ ♂.

spectabilis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon spectabilis Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 174 n. 104, ♀ ♂.
Ichneumon spectabilis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 42, ♀.
Ichneumon spectabilis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 106 n. 83, ♀ ♂.
Ichneumon (Melanichneumon) spectabilis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1955 n. 1.
Ichneumon spectabilis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 240 n. 21, ♀ ♂.
Ichneumon (Melanichneumon) spectabilis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2403 n. 1, ♀.
Ichneumon spectabilis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII. 1897 p. 44.

sphegoides Schrank! — Eur.: Bavaria.
Ichneumon sphegoides Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 292 n. 2106.

spilomerus Kriechb. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Ichneumon spilomerus Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 29, ♂.
Ichneumon spilomerus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 276 n. 83, ♂.

spinicornis Schrank! — Eur.: Bavaria.
Ichneumon spinicornis Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 309 n. 2153.

spinulae Schrank! — ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon spinulae Schrank, Fauna Boica. II. 2. 1802 p. 305 n. 2140, ♂.

splendidus Spin. — ♀ ♂ — Am.: Chile.
Ichneumon splendidus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 490 n. 20, ♀ ♂.

splendidus Fabr.! — Eur.: Italia.
Ichneumon splendidus Fabricius, Entom. System. IV. 1794 p. 457 n. 211-212.

sponsatorius Fabr.! — Am. mer.
Ichneumon sponsatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 59 n. 27.
Ichneumon sponsatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon sponsatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 285.
Ichneumon sponsatorius Trentepol, Isis 1826 p. 236 n. 55.

spretus Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Ichneumon spretus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 481 n. 10, ♀.

spurius Wesm. — ♀ — Eur. centr.
Ichneumon incubitor var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 618, ♀.
Ichneumon spurius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 162 (Mant. p. 29) n. 58[b], ♀.
Ichneumon spurius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 7, ♀.
Ichneumon spurius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 393 n. 88, ♀.
Ichneumon spurius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 182 n. 47, ♀.
Ichneumon spurius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 580 n. 12, ♀.
Ichneumon spurius Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1897 p. 255.

steckii Kriechb. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Ichneumon Steckii Kriechbaumer, Mittheil. schweiz. entom. Ges. VII. P. 8. 1887 p. 303, ♀
Ichneumon Steckii Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 655 n. 160, ♀
stemmator Thunbg.! — ♀ ♂ — As.: China.
Ichneumon stemmator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 262.
Ichneumon stemmator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 313.
stenocarus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia, Helvetia.
Ichneumon stenocarus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 13 n. 65, ♀ ♂
Ichneumon (Cratichneumon) stenocarus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1953 n. 19
Ichneumon stenocarus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 261 n. 58, ♀ ♂.
Ichneumon (Cratichneumon) stenocarus Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2403 n. 19, ♂
stenogaster Boie! [1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon stenogaster Boie, Naturh. Tidsskr. III. 1841 p. 321 n. 8, ♀ ♂.
Ichneumon stenogaster Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 89 n. 11, ♀ ♂.
stigma Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 68 n. 319.
Ichneumon stigma Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2717 n. 365.
Ichneumon stigma Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1091 n. 336.
stigmator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon stigmator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 261.
Ichneumon stigmator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 311.
stilpnoides Ratzbg.! [2]) — Eur.
Ichneumon stilpnoides Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 166 n. 16.
stramentarius Grav. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Ichneumon stramentarius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 302 n. 32, ♀
Ichneumon stramentarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 281 n. 93, ♀.
Ichneumon stramentarius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 161 n. 93.
Ichneumon stramentarius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 304 n. 11.
Ichneumon luctatorius var. 13 Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent. [p. 58, ♀
Ichneumon stramentarius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 59 n. 15, ♀
Ichneumon stramentarius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 160 (Mant. [p. 27) n. 51^{b}, ♀
Ichneumon stramentarius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 390 n. 76, ♀
Ichneumon stramentarius Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 420 n. 61, ♀
Ichneumon stramentarius Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 168 n. 6, [♀ [excl. ♂].
Ichneumon stramentarius Kriechbaumer, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 157-165 n. 1, ♂.
Ichneumon stramentarius Kriechbaumer, Ber. naturw.-medic. Ver. Innsbruck XI. 1881 p. 2, [♂ [non Wesmael].
Ichneumon stramentarius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 640 n. 132, [♀ ♂.
stramineus Gmel.! — Eur.
Ichneumon stramineus Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 70 n. 345.
Ichneumon stramineus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2720 n. 390.
Ichneumon stramineus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 998 n. 171.
striatus Gmel.! — Eur.
Ichneumon striatus Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 64 n. 258 & p. 71 n. 361.

---

1) *Lep.:* Leucania pallens (Boie).
2) *Lep.:* Lita leucatella (Ratzeburg).

Ichneumon striatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2703 n. 313 & p. 2721 n. 404.
Ichneumon striatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 930 n. 79 & p. 1036 n. 236.
strigosus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 59 n. 169.
Ichneumon strigosus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2684 n. 243.
Ichneumon strigosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 941 n. 95.
strobilorum Ratzbg.! — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon strobilorum Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 134 n. 17, ♀.
stygicus Cress. — ♀ — Am.: Canada, Massachusetts.
Ichneumon signatipes Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 52 [non Cresson].
Ichneumon stygicus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 151 n. 43, ♀.
Ichneumon stygicus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 294 n. 16, ♀.
Ichneumon stygicus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 270 n. 16, ♀.
stylator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon stylator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 265.
Ichneumon stylator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 320.
suadus Cress. — ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon suadus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 160 n. 75, ♂.
Ichneumon suadus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 322 n. 71, ♂.
Ichneumon suadus Provancher, Faun. entom. Canad. Hymén. 1883 p. 761 n. 71, ♂.
subalpinus Holmgr. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ichneumon subalpinus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 84 n. 48, ♀.
Ichneumon subalpinus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1927 n. 37.
Ichneumon subalpinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 661 n. 175, ♀.
subannulatus Grav. — ♂ — Eur. centr. & mer.
Ichneumon subannulatus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 324 n. 61, ♂.
Ichneumon subannulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 424 n. 165, ♂.
Ichneumon subannulatus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXVIII. [1874 p. 146, ♂
Ichneumon subannulatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 282, ♂.
Ichneumon subannulatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 632 n. 123, ♂
subcylindricus Grav. — ♀ — Eur. centr.
Ichneumon subcylindricus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 321 n. 117, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon subcylindricus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 169 n. 115, [♀ [excl. ♂].
Ichneumon subcylindricus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 37 [n. 122, ♀.
Ichneumon subcylindricus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 388 [n. 70ᵇ, ♀ [excl. ♂].
Amblyteles subcylindricus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 47, [♀ [excl. ♂].
Ichneumon subcylindricus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 180 n. 56, ♀.
Ichneumon subcylindricus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 614 n. 79, ♀.
subdolus Cress. — ♀ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon subdolus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 298, ♀.
Ichneumon subdolus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 166 n. 101, ♀.
Ichneumon subdolus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 354 n. 38, ♀.
Ichneumon subdolus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 279 n. 38, ♀.
subfulvus Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Ichneumon subfulvus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 258 n. 36, ♀.
Ichneumon subfulvus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 181 n. 181, ♀.

subfumatus Cam. — ♀ — Am.: Guatemala.
Ichneumon subfumatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 35. 1885 Hymen. I. p. 146 n. 23, ♀.

sublatus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ischnus sublatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 186 n. 2, ♂.
Ichneumon sublatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 154 n. 53, ♀ ♂.
Ichneumon sublatus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 296 n. 20, ♀.
Ichneumon sublatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 272 n. 20, ♀.

var. **proximus** Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ischnus proximus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 187 n. 3, ♂.
Ichneumon sublatus var. proximus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 154.
Ichneumon sublatus var. proximus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 296, ♀.
Ichneumon sublatus var. proximus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 272 [n. 20, ♀.

sublutus Cam. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon sublutus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 164 n. 60, ♂.

submarginatus Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota; Afr.: Algeria.
Ichneumon submarginatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 244 n. 78, ♀.
Ichneumon submarginatus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 12 n. 19.
Ichneumon submarginatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 155 n. 78.
Ichneumon subreptorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 374 (Misc. p. 15) [n. 10, ♀.
Ichneumon submarginatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 25
Ichneumon subreptorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 125 n. 74, ♀ ♂. [n. 78.
Ichneumon submarginatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 385 [n. 54, ♀.
Ichneumon submarginatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 104 & 105 n. 64.
Ichneumon submarginatus Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 84 n. 74, ♀ ♂. [♀ ♂.
Ichneumon submarginatus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1937 n. 61.
Ichneumon submarginatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 596 n. 48, [♀ ♂.

subobsoletus Tischb. — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon subobsoletus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLIII. 1882 p. 476 n. 3, ♂.
Ichneumon subobsoletus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 588 n. 28, ♂.

subpinguis Cam. — ♀ — Am.: Guatemala.
Ichneumon subpinguis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 35. 1885 Hymen. I. p. 149 n. 29, ♀.

subquadratus Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota. [n. 58, ♀ ♂.
Ichneumon latrator var. 1-4 Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 63
Ichneumon subquadratus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 9 n. 54, ♀ ♂.
Ichneumon subquadratus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1928 n. 41.
Ichneumon subquadratus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 576 n. 2, ♀ ♂.

subsecivus Cam. — ♂ — Am.: Guatemala. [T. 8 F. 7.
Ichneumon subsecivus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 168 n. 67, ♂;

subspinosus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon subspinosus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 17 n. 32, ♂.

substitutor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon substitutor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 266.
Ichneumon substitutor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 324.

subtestaceus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 70 n. 349.
Ichneumon subtestaceus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2720 n. 394.
Ichneumon subtestaceus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 1057 n. 277.

succinctus Brullé — ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon succinctus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 301 n. 3, ♂.
Ichneumon succinctus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 174 n. 142, ♂.
suffraganeus Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [T. 8 F. 13.
Ichneumon suffraganeus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37 1885 Hymen. I. p. 165 n. 62, ♀;
suffultus Cam. — ♂ — Am.: Panama.
Ichneumon suffultus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 34. 1884 Hymen. I. p. 144 n. 15, ♂.
sugillatorius L.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
—— Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 965, ♂.
Ichneumon sugillatorius Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 561 n. 5, ♀.
Ichneumon designatorius Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 562 n. 18, ♂.
Ichneumon sugillatorius Brünnich, Prodr. insectol. Siaelland 1761 p. 17.
Ichneumon sugillatorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 397 n. 1578, ♀.
Ichneumon designatorius Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 401 n. 1595, ♂.
Ichneumon sugillatorius Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 930 n. 1.
Ichneumon designatorius Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 932 n. 18, ♂.
Ichneumon sugillatorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 327 n. 1.
Ichneumon designatorius Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 331 n. 23, ♂.
Ichneumon sugillatorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 843 n. 1.
Ichneumon designatorius Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 848 n. 18, ♂.
? Ichneumon dubitatorius Sulzer, Abgek. Gesch. Insect. I. 1776 p. 189 n. 57; T. 26 F. 11.
Ichneumon sugillatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 152 n. 1763.
Ichneumon sugillatorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 420 n. 1.
Ichneumon designatorius Fabricius Spec. Insect. I. 1781 p. 424 n. 23, ♂.
Ichneumon sugillatorius Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 344 n. 695.
Ichneumon sugillatorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 259 n. 1.
Ichneumon designatorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 262 n. 29, ♂.
Ichneumon sugillatorius Römer, Gen. Insect. 1789 p. 58; T. 26 F. 11.
Ichneumon sugillatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 139 n. 1.
Ichneumon designatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 147 n. 36, ♂.
Ichneumon sugillatorius Villers, C. Linnaei Entom. IV. 1789 p. 550 n. 1.
Ichneumon sugillatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2674 n. 1.
Ichneumon designatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2681 n. 18, ♂.
? Ichneumon dubitatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2681 n. 98.
Ichneumon sugillatorius Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 35 n. 740.
Ichneumon designatorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 343, ♂.
? Ichneumon dubitatorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 345; T. 34 F. 8.
Ichneumon sugillatorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 350.
Ichneumon sugillatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 168 n. 1.
Ichneumon designatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 173 n. 43, ♂.
Ichneumon sugillatorius Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 132 n. 1.
Ichneumon designatorius Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 146 n. 51, ♂.
Ichneumon sugillatorius Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 280 n. 2081, ♂.
Ichneumon sugillatorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 49 n. 1 [excl. var.].
Ichneumon moratorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 54 n. 2.
Ichneumon desigatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 63 n. 44, ♂.
Ichneumon sugillatorius Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 [p. 954 n. 1.
Ichneumon sugillatorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 59.
Ichneumon sugillatorius Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 56 n. 740.

---

[1]) *Lep.:* Liparis monacha (Ratzeburg.)

Ichneumon moratorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♂.
Ichneumon sugillatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♀.
Ichneumon sugillatorius Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 8.
Crypturus sugillatorius Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 141 n. 1.
Ichneumon sugillatorius Bechstein, Forstinsectol. 1818 p. 143 n. 287 & p. 401 n. 1.
Ichneumon sugillatorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. Curios. IX. 1818 p. 284.
Ichneumon sugillatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 326 n. 64, ♀.
Ichneumon sugillatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255.
Ichneumon designatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Ichneumon sugillatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 295.
Ichneumon designatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 356.
Ichneumon morator Trentepol, Isis 1826 p. 74 n. 17, ♀.
Ichneumon sugillatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 437 n. 172, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon designatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 440 n. 173, ♂ [excl. ♀].
Crypturus sugillatorius Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª IV. 1835 p. 352 n. 1.
Ichneumon sugillatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 185 n. 156, ♀.
Ichneumon sugillator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 360 n. 8, ♀ ♂. [[excl. ♂].
Ichneumon sugillatorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 137 n. 21, ♀ ♂.
Ichneumon sugillatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 28 n. 14.
Ichneumon guttiger Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 29 [n. 15, ♀ ♂.
Ichneumon guttiger Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 146 & 338 (Mant. p. 13 [& 101), ♀ ♂.
Ichneumon designatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 147 (Mant. [p. 14), ♂.
Ichneumon sugillatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 374 (Ot. p. 13) [n. 10, ♂.
Ichneumon sugillatorius Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 57, ♀ ♂.
Ichneumon sugillatorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 15 n. 5, ♀ ♂. [♀ ♂.
Ichneumon sugillatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 376 n. 21,
Ichneumon designatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 377 n. 23, ♀.
Ichneumon sugillatorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 32; T. 20 F. 4.
Ichneumon sugillatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 214 n. 6, ♀ ♂.
Ichneumon sugillatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 13 n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon (Coelichneumon) sugillatorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1903 n. 3.
Ichneumon sugillatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 327 n. 7, ♀ ♂.

var. **nuptus** Berth. — ♂ — Eur. [p. 528, ♂.
Ichneumon sugillatorius var. nuptus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894

var. **ornatus** Berth. — ♂ — Eur. [p. 328, ♂.
Ichneumon sugillatorius var. ornatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894

sulcatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon sulcatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279.
Ichneumon sulcatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 359.

sulcatus Berth. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Ichneumon sulcatus Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais IX. 1896 p. 195, ♀.
Ichneumon sulcatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 394, ♀.

sulcatus Razoum.! — Eur.: Helvetia.
Ichneumon sulcatus Razoumowski, Hist. nat. Jorat. I. 1789 p. 216 n. 252.

sulphuratus Kriechb. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Ichneumon sulphuratus Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 50 n. 3, ♂.
Ichneumon sulphuratus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 630 n. 116, ♂.

sulphureus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 71 n. 369.
Ichneumon sulphureus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2722 n. 411.
Ichneumon sulphureus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 999 n. 174.

surdus Tosq. — ♂ — Afr.: Scioa.
Ichneumon surdus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 7 n. 1, ♂.

suspicax Ratzbg.![1] — ♀ — Eur.
Ichneumon suspicax Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 166 n. 17, ♀.

suspiciator Oliv.! — Austr.: Trinitas Ins.
Ichneumon suspiciator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 194 n. 182.

suspiciosus Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon suspiciosus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 62 [n. 57, ♀.
Ichneumon computatorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 60 n. 30, ♀ ♂.
Ichneumon suspiciosus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 62 n. 35, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon suspiciosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 393 n. 86, ♀.
Ichneumon suspiciosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 40, ♀ ♂.
Ichneumon suspiciosus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 180 (♀) & 215 (♂) n. 36.
Ichneumon suspiciosus Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 30 n. 33 (♂ ?).
Ichneumon suspiciosus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 20 n. 24, ♀ ♂.
Ichneumon suspiciosus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1223 n. 5, ♀ ♂.
Ichneumon suspiciosus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 9-16, ♂.
Ichneumon suspiciosus Thomson, Opusc. entom. P. 18 1893 p. 1918 n. 10.
Ichneumon suspiciosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 642 n. 135, ♀ ♂.
Ichneumon suspiciosus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII. 1896 p. 99-103.

var. **quadrinotatus** Kriechb. — ♀ — Eur. fere tota.
Ichneumon suspiciosus var. quadrinotatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 348 [n. 5.
Ichneumon suspiciosus var. quadripunctatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. [1894 p. 642, ♀ [err.].

sutor Christ! — Eur.: Germania.
Ichneumon sutor Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 347; T. 35 F. 4.
Ichneumon sutor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 879 n. 10.

suturalis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon suturalis Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 97 n. 57, ♀ ♂.
Ichneumon suturalis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 619 n. 91, ♀ ♂.

suturator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon suturator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 267.
Ichneumon suturator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 328.

sycophantus Cam. — ♂ — Am.: Guatemala.
Ichneumon sycophantus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 35. 1885 Hymen. I. p. 146 n. 22, ♂; [T. 7 F. 8.

szechenyii Friv. — As.: China.
Ichneumon Szechenyi Frivaldszky, Termész. Füzet. XV. 1892 p. 126.

taeniola Fourcr. — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 356 n. 79.
Ichneumon taeniola Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 420 n. 80.
Ichneumon taeniola Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 211 n. 26.
Ichneumon taeniola Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1024 n. 217.

tanganus Kriechb. — ♀ — Afr.: Tanga.
Ichneumon Tanganus Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 298 n. 3, ♀.

taprobanae Cam. — ♂ — As.: Ceylon.
Ichneumon Tabrobanae Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 3, ♂.

---

[1] *Col.:* Saperda populnea (Rondani).

Ichneumon moratorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♂.
Ichneumon sugillatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 108, ♀.
Ichneumon sugillatorius Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 8.
Crypturus sugillatorius Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 141 n. 1.
Ichneumon sugillatorius Bechstein, Forstinsectol. 1818 p. 143 n. 287 & p. 401 n. 1.
Ichneumon sugillatorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. Curios. IX. 1818 p. 284.
Ichneumon sugillatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 326 n. 64, ♀.
Ichneumon sugillatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255.
Ichneumon designatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Ichneumon sugillatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 295.
Ichneumon designatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 356.
Ichneumon morator Trentepol, Isis 1826 p. 74 n. 17, ♀.
Ichneumon sugillatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 437 n. 172, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon designatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 440 n. 173, ♂ [excl. ♀].
Crypturus sugillatorius Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª IV. 1835 p. 352 n. 1.
Ichneumon sugillatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 185 n. 156, ♀
Ichneumon sugillator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 360 n. 8, ♀ ♂. [[excl. ♂].
Ichneumon sugillatorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 137 n. 21, ♀ ♂.
Ichneumon sugillatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 28 n. 14.
Ichneumon guttiger Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 29 [n. 15, ♀ ♂.
Ichneumon guttiger Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 146 & 338 (Mant. p. 13 [& 101), ♀ ♂.
Ichneumon designatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 147 (Mant. [p. 14), ♂.
Ichneumon sugillatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 374 (Ot. p. 13) [n. 10, ♂.
Ichneumon sugillatorius Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 57, ♀ ♂.
Ichneumon sugillatorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 15 n. 5, ♀ ♂. [♀♂.
Ichneumon sugillatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 376 n. 21,
Ichneumon designatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 377 n. 23, ♀.
Ichneumon sugillatorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 4. 1876 p. 32; T. 20 F. 4.
Ichneumon sugillatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 214 n. 6, ♀ ♂.
Ichneumon sugillatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 13 n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon (Coelichneumon) sugillatorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1903 n. 3.
Ichneumon sugillatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 327 n. 7, ♀ ♂.

var. **nuptus** Berth. — ♂ — Eur. [p. 528, ♂.
Ichneumon sugillatorius var. nuptus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894

var. **ornatus** Berth. — ♂ — Eur. [p. 328, ♂.
Ichneumon sugillatorius var. ornatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894

sulcatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon sulcatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279.
Ichneumon sulcatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 359.

sulcatus Berth. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Ichneumon sulcatus Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais IX. 1896 p. 195, ♀.
Ichneumon sulcatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 394, ♀.

sulcatus Razoum.! — Eur.: Helvetia.
Ichneumon sulcatus Razoumowski, Hist. nat. Jorat. I. 1789 p. 216 n. 252.

sulphuratus Kriechb. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Ichneumon sulphuratus Kriechbaumer, Termész. Füzet. XVII. 1894 p. 50 n. 3, ♂.
Ichneumon sulphuratus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 630 n. 116, ♂.

sulphureus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 71 n. 369.
Ichneumon sulphureus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2722 n. 411.
Ichneumon sulphureus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 999 n. 174.
surdus Tosq. — ♂ — Afr.: Scioa.
Ichneumon surdus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 7 n. 1, ♂.
suspicax Ratzbg.! [1]) — ♀ — Eur.
Ichneumon suspicax Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 166 n. 17, ♀.
suspiciator Oliv.! — Austr.: Trinitas Ins.
Ichneumon suspiciator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 194 n. 182.
suspiciosus Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota. [n. 57, ♀.
Ichneumon suspiciosus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 62
Ichneumon computatorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 60 n. 30, ♀ ♂.
Ichneumon suspiciosus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 62 n. 35, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon suspiciosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 393 n. 86, ♀.
Ichneumon suspiciosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 40, ♀ ♂.
Ichneumon suspiciosus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 180 (♀) & 215 (♂) n. 36.
Ichneumon suspiciosus Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 30 n. 33 (♂ ?).
Ichneumon suspiciosus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 20 n. 24, ♀ ♂.
Ichneumon suspiciosus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1223 n. 5, ♀ ♂.
Ichneumon suspiciosus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 9-16, ♂.
Ichneumon suspiciosus Thomson, Opusc. entom. P. 18 1893 p. 1918 n. 10.
Ichneumon suspiciosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 642 n. 135, ♀ ♂.
Ichneumon suspiciosus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIII. 1896 p. 99-103.
var. **quadrinotatus** Kriechb. — ♀ — Eur. fere tota. [n. 5.
Ichneumon suspiciosus var. quadrinotatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 348
Ichneumon suspiciosus var. quadripunctatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII.
sutor Christ! — Eur.: Germania. [1894 p. 642, ♀ [err.].
Ichneumon sutor Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 347; T. 35 F. 4.
Ichneumon sutor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 879 n. 10.
suturalis Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon suturalis Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 97 n. 57, ♀ ♂.
Ichneumon suturalis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 619 n. 91, ♀ ♂.
suturator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon suturator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 267.
Ichneumon suturator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 328.
sycophantus Cam. — ♂ — Am.: Guatemala. [T. 7 F. 8.
Ichneumon sycophantus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 35. 1885 Hymen. I. p. 146 n. 22, ♂;
szechenyii Friv. — As.: China.
Ichneumon Szechenyi Frivaldszky, Termész. Füzet. XV. 1892 p. 126.
taeniola Fourcr. — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 356 n. 79.
Ichneumon taeniola Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 420 n. 80.
Ichneumon taeniola Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 211 n. 26.
Ichneumon taeniola Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1024 n. 217.
tanganus Kriechb. — ♀ — Afr.: Tanga.
Ichneumon Tanganus Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 298 n. 3, ♀.
taprobanae Cam. — ♂ — As.: Ceylon.
Ichneumon Tabrobanae Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 3, ♂.

---

[1]) *Col.:* Saperda populnea (Rondani).

tartareus Spin. — ♀ ♂ — Am.: Chile.
Ichneumon tartareus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 475 n. 2, ♀ ♂.
taylori Harrgt. — ♀ — Eur.: Vancouvers Island.
Ichneumon Taylori Harrington, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 209, ♀ (?).
tenebricosus Gmel. — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 67 n. 291.
Ichneumon tenebricosus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2707 n. 343.
Ichneumon tenebricosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1084 n. 324.
tenebricus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon tenebricus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 15 n. 26, ♀ ♂.
tenebrosus Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Belgia, Germania, Hungaria, Russia.
Ichneumon personatus var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 207 n. 59, ♂.
Ichneumon tenebrosus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 103 [n. 111, ♀.
Ichneumon tenebrosus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 184 (Mant. p. 51), ♂.
Ichneumon tenebrosus Helmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 37 n. 26, ♀ ♂.
Ichneumon tenebrosus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 165 n. 99, ♀ ♂. [♀ ♂.
Ichneumon tenebrosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 411 n. 158,
Ichneumon tenebrosus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 46, ♀.
Ichneumon tenebrosus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 14 n. 68.
Ichneumon (Cratichneumon) tenebrosus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1947 n. 4.
Ichneumon tenebrosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 231 n. 9, ♀ ♂.
tentator Wesm. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania, Gallia.
Ichneumon tentator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 358 (Ot. p. 7) n. 2, ♀.
Ichneumon tentator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 373 n. 3, ♀.
Ichneumon tentator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 553 n. 45, ♀.
tentator Vill.! — Eur.
Ichneumon tentator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 196 n. 200.
Ichneumon tentator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 218 n. 67.
Ichneumon tentator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 970 n. 127.
tenthredinum Scharfbg.! — Eur. [p. 974 n. 39.
Ichneumon tenthredinum Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805
Ichneumon tenthredinum Bechstein, Forstinsectol. 1818 p. 145 n. 304 & p. 499 n. 18.
Ichneumon tenthredinum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 928 n. 76, ♀ ♂.
tenuicornis Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon tenuicornis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 9 n. 15, ♂.
tenuipes Berth. — ♀ — Afr.: Algeria.
Ichneumon tenuipes Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais 1896 p. 193, ♀.
Ichneumon tenuipes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 395 n. 8, ♀.
tenuitarsis Thoms. — ♀ — Eur.: Suecia.
Ichneumon (Coelichneumon) tenuitarsis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1907 n. 13, ♀.
tepanecus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon Tepanecus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 5 n. 6, ♀.
tepidus Cam. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon tepidus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 161 n. 56, ♂.
teres Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon teres Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 18 n. 34, ♂.
tergenus Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon tergenus Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 356 n. 103, ♀.
Ichneumon octoguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 325 n. 120, ♂.
Ichneumon tergenus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 615 n. 263, ♀ [excl. ♂].

Ichneumon tergenus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 205 n. 216.
Ichneumon tergenus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 89 [n. 93, ♀ ♂.
Ichneumon tergenus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 417 n. 68, ♀.
Ichneumon tergenus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XVI. P. 1. 1849 p. 39 (Adn. p. 7), ♂.
Ichneumon tergenus Holmgren, Svensk. Vet. Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 35 n. 23, ♀.
Ichneumon tergenus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 12.
Ichneumon tergenus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 179 n. 107, ♀ ♂.
Ichneumon tergenus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 203, ♂.
Ichneumon tergenus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 405 n. 136, ♀ ♂.
Ichneumon tergenus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 43, ♂.
Ichneumon octoguttatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 181 & 183 n. 92, ♀ ♂.
Ichneumon tergenus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 109 n. 94, ♀.
Ichneumon (Barichneumon) tergenus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1961 n. 4.
Ichneumon tergenus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 250 n. 40, ♀ ♂.

var. **funereus** Berth. — ♂ — Eur.
Ichneumon tergenus var. funereus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 250, ♂.

terminalis Cress. — ♀ — Am.: Delaware.
Ichneumon terminalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 184 n. 74, ♀.
Ichneumon terminalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 170 n. 119, ♀.

terminatorius Grav.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 344 n. 52.
? Ichneumon vorax Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 411 n. 53.
Ichneumon terminatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 302 n. 33, ♀.
Ichneumon terminatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 282 n. 94, ♀.
Ichneumon terminatorius Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 380 n. 840.
Ichneumon concinnatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 166 n. 107.
Ichneumon luctatorius var. 14 Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 58, ♀ ♂.
Ichneumon terminatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 160 (Mant. [p. 27) n. 51, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon terminatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 32 n. 13, ♀ ♂.
Ichneumon terminatorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 70 n. 39, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon terminatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 390 [n. 77, ♀ ♂.
Ichneumon terminatorius Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 428 n. 71, ♀ ♂.
Ichneumon terminatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 180, 215 & 216 [n. 38, ♀ ♂.
Ichneumon concinnatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 182 n. 117, ♀.
Ichneumon terminatorius Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 32 n. 39, ♂.
Ichneumon terminatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 20 n. 25, ♀ ♂.
Ichneumon terminatorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1919 n. 12.
Ichneumon terminatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 641 n. 133, ♀ ♂.

var. **olivieri** Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon terminatorius var. Olivieri Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 641, ♀.

terminatorius Panz.! — Eur.: Germania.
Ichneumon LXXIX Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 2. 1769; T. 180 F. 6.
Ichneumon terminatorius Panzer, Syst. Nomencl. 1804 p. 160.
Ichneumon terminatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 920 n. 65.

---

[1]) *Lep.:* Chariptera culta (Mocsáry).

terminatus (Prov.) Davis — ♀ — Am.: Canada.
Phygadeuon terminatus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 357 n. 42, ♀.
Phygadeuon terminatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymen. 1883 p. 780 n. 42, ♀.
Ichneumon terminatus Davis, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1894 p. 187.
ternator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon ternator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258.
Ichneumon ternator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 303.
ternatorius Steph.! — Eur.: Britannia.
Ichneumon ternatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 161 n. 94.
tertiarius Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 336 n. 34.
Ichneumon tertiarius Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 404 n. 34.
Ichneumon tertiarius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 209 n. 16.
Ichneumon tertiarius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1051n. 265.
testaceus Schrk.! — Eur.: Germania.
Ichneumon testaceus Schrank, Gistl: Faunus N. F. I. 1837 p. 14.
testatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon testatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 276.
Ichneumon testatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 349.
tetracanthus Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Ichneumon tetracanthus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 482 n. 12, ♀.
tetracinctorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon tetracinctorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 279.
Ichneumon tetracinctorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 359.
tetragonus Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon tetragonus Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 280.
Ichneumon tetragonus Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 365.
tetraguttorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon tetraguttorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253.
Ichneumon tetraguttorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 289.
texanus Cress. — ♂ — Am.: Texas.
Ichneumon Texanus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 159 n. 74, ♂.
textor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon textor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 270.
Ichneumon textor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 335.
tharotis Pack.[1] — ♀ — Am.: Massachusetts.
Ichneumon tharotis Packard, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XXI. 1881 p. 22, ♀.
theresae Berth. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Ichneumon Theresae Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais IX. 1896 p. 195, ♀.
Ichneumon Theresae Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 397, ♀.
tholiferus Berth. — ♂ — Afr.: Algeria.
Ichneumon tholiferus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 628 n. 109, ♂.
thomsonii Holmgr. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon Thomsoni Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 85 n. 49, ♀.
Ichneumon Thomsoni Holmgren, Entom. Tidskr. I. 1880 p. 77 n. 49, ♂.
Ichneumon Thomsoni Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1928 n. 38.
Ichneumon Thomsoni Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 659 n. 170, ♀ ♂.

---

[1] *Lep.:* Melitaea tharos (Packard).

thulensis Ruthe[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Islandia.
Ichneumon Thulensis Ruthe, Stettin. entom. Zeitg. XX. 1859 p. 363 n. 44, ♀ ♂.
Ichneumon Thulensis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 652 n. 157, ♀ ♂.
thyelma Cam. — Austr.
Ichneumon thyelma Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 P. 1. p. 22.
tibialis Brischke — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon tibialis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 46, ♀.
Ichneumon tibialis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 272 n. 76, ♀.
tibiator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon tibiator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon tibiator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 302.
tibiator Grav.! — ♂ — Eur.
Ichneumon tibiator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 284 n. 8, ♂.
Ichneumon tibiator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 151 n. 25, ♂.
Ichneumon tibiator Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 11 n. 17.
Ichneumon tibiator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 137 n. 30, ♂.
Ichneumon tibiator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 254 n. 25, ♂.
Ichneumon tibiator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 102 n. 144, ♂.
tibiatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon tibiatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 280.
Ichneumon tibiatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 365.
tinea Christ! — Eur.: Germania.
Ichneumon tinea Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 369; T. 39 F. 3.
tipularum Schrk.! — Eur.: Bavaria.
Ichneumon tipularum Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 310 n. 2156.
tipulatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon tipulatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 281.
Ichneumon tipulatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 366.
tischbeinii Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon nivatus var. 2 Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 105 n. 200, ♀!
Ichneumon Tischbeini Kriechbaumer, Entom. Nachr. XX. 1894 p. 342 n. 77, ♀.
Ichneumon Tischbeini Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 268 n. 69, ♀.
titubator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon titubator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 270.
Ichneumon titubator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 336.
toluco Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon Toluco Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 6 n. 8, ♂.
tornator Panz.! — Eur.: Bavaria.
Ichneumon XXIX Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 61 F. 5.
Ichneumon tornator Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 79.
Ichneumon tornator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1016 n. 206.
toros Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon toros Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 14 n. 24, ♀.
torpidus Wesm. — ♀ — Germania, Italia.
Ichneumon torpidus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 385 (Ot. p. 34) n. 32, ♀.
Ichneumon torpidus Wesmael, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 11, ♀.
Ichneumon torpidus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 42, ♀.
Ichneumon torpidus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 569 n. 27, ♀.
torquatus Vill.! — Eur.
Ichneumon torquatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 203 n. 223; T. 8 F. 7.

[1]) = ? I. gradarius Wesm.

Ichneumon torquatus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 198 n. 171.
Ichneumon torquatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1090 n. 334.

torsor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon torsor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 256.
Ichneumon torsor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 297.

torvinus Cress. — ♂ — Am.: Illinois.
Ichneumon torvinus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 292, ♂.
Ichneumon torvinus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 144 n. 9, ♂.

tosquinetii Kriechb. — ♀ — Eur.: Belgia.
Ichneumon Tosquineti Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXII. 1896 p. 358, ♀.
Ichneumon Tosquineti Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 396, ♀.

totonacus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon Totonacus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 10 n. 17, ♂.

tottor Thunbg.! — Afr.: Cap.
Ichneumon tottor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 272.
Ichneumon tottor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 341.

tragicus Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Ichneumon tragicus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 11 n. 19, ♂.

transversor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon transversor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 268.
Ichneumon transversor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 329.

triangulum Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 69 n. 332.
Ichneumon triangulum Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2719 n. 379.
Ichneumon triangulum Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1007 n. 190.

trichopus Schrk.! — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon trichopus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 289 n. 2100, ♀ ♂.
Ichneumon trichopus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 989 n. 150, ♀ ♂.

tricinctorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon tricinctorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p 278.
Ichneumon tricinctorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 357.

tricinctus Schrk.! — Eur.: Bavaria.
Ichneumon tricinctus Schrank, Neu. Magaz. Liebh. Entom. II. 1785 p. 327 n. 93.
Ichneumon tricinctus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1055 n. 271.

tricolor Schrk.! — ♀ ♂ — Eur. centr.
Ichneumon tricolor Schrank, Beitr. z. Naturg. 1776 p. 88 n. 50; T. 3 F. 18.
Ichneumon tricolor Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 351 n. 708, ♀ ♂.
Ichneumon tricolor Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2683 n. 109.
Ichneumon tricolorus Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 359.
Ichneumon tricolor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 220 n. 82.
Ichneumon tricolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 927 n. 74, ♀ ♂.

tricolorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon tricolorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Ichneumon tricolorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 358.

trifarius Berth. — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon trifarius Berthoumieu, Revue d'entom. XI. 1892 p. 40 n. 10, ♀.
Ichneumon trifarius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 243 n. 26, ♀.

trifasciator Thunbg.! — Am.: Guiana.
Ichneumon trifasciator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 268.
Ichneumon trifasciator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 331.

trilineatus Gmel.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 57 n. 148.
Ichneumon trilineatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2679 n. 228.
Ichneumon trilineatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 173 n. 39, ♀ ♂.
Ichneumon trilineatus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 7 n. 6, ♀ ♂.
Ichneumon trilineatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 142 n. 44, ♀ ♂.
Ichneumon trilineatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 35 [n. 24, ♀ ♂.
Ichneumon trilineatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 149 (Mant. p. 16), ♀ ♂.
Ichneumon Brischkii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 170 n. 27.
Ichneumon trilineatus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 30 n. 8, ♀ ♂.
Ichneumon trilineatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 368 (Ot. p. 17) n. 15, ♀ ♂.
Ichneumon trilineatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 5, ♀ ♂.
Ichneumon trilineatus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 46 n. 26, ♀ ♂.
Ichneumon trilineatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 269 n. 39, ♀ ♂.
Ichneumon trilineatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 379 n. 32, ♀ ♂.
Ichneumon trilineatus Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 39, ♀ ♂.
Ichneumon trilineatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 103 n. 25, ♀ ♂.
Ichneumon adulator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 172 n. 9, ♂.
Ichneumon (Stenichneumon) trilineatus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1966 n. 5.
Ichneumon trilineatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 569 n. 80, ♀ ♂.
var. **annulatus** Berth. — ♂ — Eur. [p. 569, ♂.
Ichneumon trilineatus var. annulatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894
var. **rufescens** Berth. — ♀ — Eur. [p. 569, ♀.
Ichneumon trilineatus var. rufescens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894
var. **umbraculosus** Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon umbraculosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 199 n. 53, ♀ ♂.
Ichneumon umbraculosus Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 7 n. 6, ♀ ♂.
Ichneumon umbraculosus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 146 n. 54, ♀ ♂.
Ichneumon umbraculosus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 285 [n. 53, ♀ ♂.
Ichneumon trilineatus var. umbraculosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894
triplicatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia. [p. 569, ♀ ♂.
Ichneumon triplicatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 253.
Ichneumon triplicatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 288.
triplicatus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Batavia.
Ichneumon (Amblyteles) septemguttatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 89-93.
Ichneumon (Spilichneumon) triplicatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2088 n. 2.
tripunctatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon tripunctatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 280.
Ichneumon tripunctatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 363.
tripunctor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon tripunctor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 266.
Ichneumon tripunctor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 323
trispilus Thoms. — ♀ — Eur. bor.
Ichneumon trispilus Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1228 n. 9, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Abraxas grossulariata (Ratzeburg, Holmgren, Bignell), Trachea piniperda (Brischke), Bryophila glandifera (Bignell).

[2]) *Lep.:* Arctia caja, Abraxas grossulariata (Stephens), Trachea piniperda, Tryphaena pronuba (Brichke).

Ichneumon trispilus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1918 n. 11.
Ichneumon trispilus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 640 n. 131, ♀.
trizonatus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon trizonatus Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 8, ♂.
Ichneumon trizonatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 162 n. 68, ♂.
Ichneumon trizonatus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 350 n. 31, ♂.
Ichneumon trizonatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 276 n. 31, ♂
trochantericus Fourcr.! — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 351 n. 66.
Ichneumon trochantericus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 416 n. 67.
Ichneumon trochantericus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1028 n. 224.
truculentus Cress. — ♀ — Am.: New Hampshire.
Ichneumon truculentus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 150 n. 39, ♀.
truncatulus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon truncatulus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 15 n. 11, ♀ ♂.
Ichneumon (Coelichneumon) truncatulus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1911 n. 21.
Ichneumon truncatulus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 558 n. 80, ♀ ♂.
trunculentus Cam. — Am.: Guatemala. [T. 8 F. 12.
Ichneumon trunculentus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 166 n. 64;
tuberculatus Kaw.! — ♂ — Eur.: Russia.
Ichneumon tuberculatus Kawall, Bull. soc. natural. Moscou XLI. P. 4. 1868 p. 506 n. 3, ♂.
tuberculipes Wesm. — ♀ ♂ — Eur. centr. [p. 51 n. 57, ♂.
Ichneumon luctatorius var. 4 Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.;
Ichneumon tuberculipes Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 152 & 153 (Mant. [p. 19 & 20) n. 45b, ♀ ♂.
Ichneumon cerebrosus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 91 [non Wesmael]. [♀ ♂.
Ichneumon tuberculipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 387 n. 65,
Ichneumon tuberculipes Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 430 n. 107, ♀ ♂.
Ichneumon cuneatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 284 n. 11, ♀.
Ichneumon cuneatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 31 n. 17, ♀.
Ichneumon tuberculipes Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 31 n. 17, ♀.
Ichneumon cerebrosus Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 29 n. 30-31, ♀ ♂.
Ichneumon tuberculipes Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 8 n. 51, ♀ ♂.
Ichneumon tuberculipes Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1935 n. 56. [♀ (♂?).
Ichneumon tuberculipes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 598 n. 53,
Ichneumon tuberculipes Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2396 n. 56.
var. **rufoniger** Berth. — ♀ ♂ — Eur. centr. [p. 598, ♀ ♂.
Ichneumon tuberculipes var. rufoniger Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894
tumidifrons Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Ichneumon tumidifrons Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 311, ♀.
Ichneumon tumidifrons Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 172 n. 130, ♀.
tumidulus Cam. — Am.: Mexico. [T. 7 F. 12.
Ichneumon tumidulus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 38. 1885 Hymen. I. p. 152 n. 35;
tunicatus Ström! — Eur.: Dania.
Ichneumon tunicatus Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. Nya Saml. III. 1788 p. ?
turca Schrk.! — ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon turca Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 294 n. 2111, ♂.
Ichneumon turca Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1003 n. 182, ♂.
turpiculus Cam. — ♂ — Am.: Mexico. [T. 7 F. 22.
Ichneumon turpiculus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 103 n. 59, ♂;

tuxtla Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon Tuxtla Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 17 n. 31, ♀.
tyrannus Schrk.! — Eur.: Austria.
Ichneumon tyrannus Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 347 n. 701, ♀.
Ichneumon tyrannus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 141 n. 18.
Ichneumon tyrannus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2677 n. 87.
Ichneumon tyrannus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 884 n. 16.
ulmanae Schrk.! — ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon ulmanae Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 300 n. 2127, ♂.
Ichneumon ulmanae Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 989 n. 151, ♂.
ultimus Cress. — ♀ — Am.: New Hampshire.
Ichneumon ultimus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 178 n. 164, ♀.
umbratorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon umbratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 278.
Ichneumon umbratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 355.
Ichneumon umbratorius Kawall, Stettin. entom. Zeitg. XVIII. 1857 p. 16.
uncinatus Cress. — ♀ — Am.: Canada.
Ichneumon uncinatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 159 n. 71, ♀.
unicinctatus D. T. — ♀ — Am.: Chile.
Ichneumon unicinctus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 479 n. 8, ♀ [nec Brullé].
Ichneumon unicinctatus m.
unicinctor Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon unicinctor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 263.
Ichneumon unicinctor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 315.
unicinctulus D. T. — ♂ — Afr.: Cap.
Ichneumon unicinctus Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 394 n. 8, ♂ [nec Brullé].
Ichneumon unicinctulus m.
unicinctus Brullé — ♀ — Afr.: Bourbon.
Ichneumon unicinctus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 308 n. 16, ♀.
unicolor Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 70 n. 352.
Ichneumon unicolor Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2721 n. 397.
Ichneumon unicolor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1071 n. 299.
unifasciatorius Say[1]) — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon unifasciatorius Say, Amer. Entom. II. 1825 p. 48; T. 22 F. 4.
Ichneumon niger Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 302 n. 6, ♀ ♂.
Ichneumon unifasciatorius Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 48; T. 22 F. 4.
Ichneumon unifasciatorius Riley, 3d Ann. Rep. Insect. Missouri 1871 p. 71.
Ichneumon unifasciatorius Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 155 n. 56, ♀♂.
Ichneumon unifasciatorius Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 296 n. 21, ♀ ♂.
Ichneumon unifasciatorius Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 272 n. 21, ♀♂.
unifasciatus Spin. — ♂ — Eur.: Hispania.
Ichneumon unifasciatus Spinola, Ann. soc. entom. France (2) I. 1843 p. 124 n. 3, ♂.
unipunctator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon unipunctator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 267.
Ichneumon unipunctator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 327.
ursula Cam. — ♀ — Austr.
Ichneumon ursula Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 P. 1. p. 16, ♀.

---

1) *Lep.:* Acronycta oblinita (Riley).

urticae Fourcr.! — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 357 n. 81.
Ichneumon urticae Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 421 n. 82.
Ichneumon urticae Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 211 n. 27.
Ichneumon urticae Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1003 n. 181, ♀.
urticarum Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon urticarum Holmgren, Entom. Tidskr. I. 1880 p. 23 n. 8-9, ♀ ♂.
Ichneumon urticarum Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 552 n. 42. ♀ ♂.
ustorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon ustorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 261.
Ichneumon ustorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 366.
ustulatus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 68 n. 318.
Ichneumon ustulatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2717 n. 364.
Ichneumon ustulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1057 n. 276.
ustus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon ustus Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 324 n. 75, ♀ ♂.
Ichneumon ustus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 763 n. 75. ♀.
utetes Cam. — ♀ — Austr.
Ichneumon utetes Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLII. 1898 P. 1. p. 21, ♀.
utilis Cress. — ♂ — Am.: United States.
Ichneumon utilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 311, ♂.
Ichneumon utilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 185 n. 199, ♂.
uxorius Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Ichneumon uxorius Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 310, ♀.
vacillans Cam. — ♂ — As.: Ceylon.
Ichneumon vacillans Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 4, ♂.
vacillatorius Grav.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon vacillatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 500 n. 205, ♀ ♂.
Ichneumon vacillatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 192 n. 177.
Ichneumon vacillatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent. p. 101 n. 107.
Ichneumon vacillatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 183 (Mant. p. 50), ♀ ♂.
Ichneumon vacillatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 403 (Misc. p. 44 n. 32), ♀.
Ichneumon vacillatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 14, ♀ ♂.
Ichneumon vacillatorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 160 n. 95, ♀ ♂.
Ichneumon vacillatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 203, ♂.
Ichneumon vacillatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 410 n. 153, ♀ ♂.
Ichneumon vacillatorius Bignell, Entomologist XI. 1878 p. 254-255.
Ichneumon vacillatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 45, ♀ ♂.
Ichneumon vacillatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 211 n. 83, ♀ ♂.
Ichneumon vacillatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 111 n. 102.
Ichneumon (Barichneumon) vacillatorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1961 n. 5.
Ichneumon vaccilatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 277 n. 85, ♀ ♂ [err. typogr.].
vacillatorius Rossi! — Eur.: Italia.
Ichneumon vacillatorius Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 113 n. 247.

---

[1]) *Lep.:* Depressaria heracliella (Bignell).

vafer Cress. — ♂ — Am.: New Hampshire.
Ichneumon vafer Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 78 n. 166, ♂.
vagans Prov. — Am.: Canada.
Ichneumon vagans Provancher, Natural. Canada. VII. 1875 p. 51, ♀.
Ichneumon vagans Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 153 n. 48.
Ichneumon vagans Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 295 n. 19, ♂.
Ichneumon vagans Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 271 n. 19, ♂.
vagator Scop.! — Eur.: Carnia.
Ichneumon vagator Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 288 n. 759.
Ichneumon vagator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 186 n. 160.
Ichneumon vagator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 368.
Ichneumon vagator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 214 n. 39.
Ichneumon vagator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 975 n. 133b, ♀.
validicornis Holmgr. — ♀ (♂) — Eur.: Norvegia. [p. 27).
Ichneumon luctatorius var. 5 Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 160 (Mant.
Ichneumon validicornis Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 73 n. 41, ♀.
Ichneumon validicornis Thomson, Opusc. entom. P. 12. 1888 p. 1227 n. 8, ♀ (♂?).
Ichneumon validicornis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1922 n. 19.
Ichneumon validicornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 643 n. 138,
Ichneumon validicornis Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2394 n. 19. [♀ (♂?).
var. **vivacior** Tischb. — ♀ ♂ — Eur. centr.
Ichneumon vivacior Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 424 n. 73, ♀.
Ichneumon vivacior Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 281 n. 7, ♀ ♂.
Ichneumon validicornis var. vivacior Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894
validus Berth. — ♀ — As.: Caucasus. [p. 644, ♀ ♂.
Ichneumon validus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 565 n. 74, ♀.
vallidolidensis Cam. — ♀ — Am.: Mexico. [n. 66, ♀; T. 8 F. 9.
Ichneumon Vallidolidensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 167
vancouveriensis Prov. — ♂ — Am.: Vancouvers Island.
Ichneumon Vancouveriensis Provancher, Canad. Entomol. XVII. 1885 p. 114, ♂.
Ichneumon Vancouveriensis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 33 n. 89, ♂.
vanessae Boie! — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon vanessae Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 90 n. 14, ♂.
varex Müll.! — ♀ — Eur.: Dania, Bavaria.
Ichneumon varex O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 155 n. 1801.
Ichneumon variabilis var. B Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 291 n. 2104.
Ichneumon variabilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 906 n. 42, ♀.
variabilis Schrk.! — ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon variabilis Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 291 n. 2104.
Ichneumon variabilis Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 877 n. 8, ♂.
varians Brischke — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon varians Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 8, ♂.
Ichneumon varians Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 202, ♂.
variegatorius Holmgr.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon albipictus var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 397 n. 154, ♂.
Ichneumon variegatorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 120 n. 71, ♀ [excl. citat.].
Ichneumon albiornatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 29 n. 14, ♂.
? Ichneumon maculiferus Tischbein, Stettin. entom Zeitg. XLIII. 1882 p. 476 n. 2, ♀.

---

1) *Lep.:* Limenitis populi (Korb), L. camilla (Steinheil).

Ichneumon variegatorius Kriechbaumer, Entom. Nachr. XV. 1889 p. 205 n. 20, ♀ ♂.
Ichneumon variegatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 587 n. 26, ♀ ♂.
Ichneumon variegatorius Thomson, Opusc. entom. P. 21. 1896 p. 2401.

variegatus Cress. — ♂ — Am.: United States.
Ichneumon variegatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 153 n. 29, ♂.
Ichneumon variegatus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 251 n. 15, ♂.
Ichneumon variegatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 167 n. 105, ♂.

varipes Grav. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon varipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 444 n. 175, ♂.
Ichneumon laevis Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 132 n. 2, ♂.
Ichneumon varipes Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 72 n. 70, ♀ ♂.
Ichneumon varipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 10, ♀ ♂.
Ichneumon varipes Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 149 n. 88, ♀ ♂.
Ichneumon varipes Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 203, ♀.
Ichneumon varipes Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 398 n. 105, ♀ ♂.
Ichneumon varipes Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 41, ♀ ♂.
Ichneumon varipes Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 102, 181 & 214 n. 76, ♀ ♂.
Ichneumon (Cratichneumon) varipes Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1954 n. 22.
Ichneumon varipes Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 229 n. 6, ♀ ♂.

variolosus Holmgr. — ♂ — Eur.: Germania, Tirolia.
Ichneumon variolosus Holmgren, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. 1878 p. 176 n. 22, ♂.
Ichneumon variolosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France XXIII. 1894 p. 578 n. 6, ♂.

var. **decimator** Grav. — ♀ — Eur.
Ichneumon decimator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 503 n. 208, ♀.
Ichneumon varipes var. decimator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 229, ♀.

varius Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon varius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 159 n. 1852.
Ichneumon varius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 995 n. 162.

varius Brünn.! — Eur.: Dania.
Ichneumon varius Brünnich, Pontoppidan Danske Atlas 1766 p. 457 n. 5.
Ichneumon variatorius O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 152 n. 1761.
Ichneumon varius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 881 n. 13.

varius Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 61 n. 208 & p. 62 n. 217.
Ichneumon varius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2699 n. 275 & p. 2700 n. 282.
Ichneumon varius Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 996 n. 163 & 164.

vecors Cress. — ♀ — Am.: Hudsons Bay.
Ichneumon ventralis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 308, ♀ [non Cresson 1865].
Ichneumon vecors Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 172 n. 127, ♀.

velatus Wesm.! — ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon velatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 383 (Misc. p. 25 n. 18, ♂.
Ichneumen velatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 626 n. 103, ♂.

velox Cress. — ♀ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon velox Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 185 n. 76, ♀.
Phygadeuon apicatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 180.
Phygadeuon Cressoni Provancher, Natural. Canad. VIII. 1876 p. 318.
Ichneumon velox Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 178 n. 163, ♀.
Ichneumon velox Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 361 n. 58, ♀.
Ichneumon velox Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 287 n. 58, ♀.

venator Schrk.! — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Ichneumon venator Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 359 n. 724, ♀.

Ichneumon venator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 168 n. 102.
Ichneumon venator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 44 n. 767.
Ichneumon venator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 188 n. 125.
Ichneumon venator Schrank, Fauna Boica II. P. 2. 1802 p. 265 n. 2059, ♀ ♂.
Ichneumon venator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 68 n. 767.
Ichneumon venator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 978 n. 137, ♀ & p. 1021 n. 212.

venator L.! — Eur.
Ichneumon venator Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 564 n. 33.
Ichneumon venator Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 404 n. 1612.
Ichneumon venator Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 934 n. 36.
Ichneumon venator Linné, Pand. Rybyens. 1771 p. 12.
Ichneumon venator Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 852 n. 36.
Ichneumon venator Linné, Amoen. acad. VIII. 1785 p. 87.
Ichneumon venator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2692 n. 36.
Ichneumon venator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 372.
Ichneumon venator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 978 n. 136.

ventralis Cress. — ♂ — Am.: Colorado. [Cresson 1867].
Ichneumon ventralis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 250 n. 14, ♂ [non
Ichneumon ventralis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 157 n. 63, ♂.

veraepacis Cam. — ♀ — Am.: Guatemala.
Ichneumon Veraepacis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 35. 1885 Hymen. I. p. 148 n. 25.

versabilis Cress.[1] — ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon versabilis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 161 n. 84, ♂.
Ichneumon versabilis Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 323 n. 72, ♂.
Ichneumon versabilis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 762 n. 72, ♂.
Ichneumon versabilis Howard, Scudder: Butterflies U. S. 1889 p. 1877, ♂; T. 88 F. 2.

versator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon versator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258.
Ichneumon versator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 303.

versutus Holmgr. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Ichneumon versutus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 117 n. 69, ♀ ♂.
Ichneumon versutus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1943 n. 76.
Ichneumon versutus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 582 n. 17, ♀ ♂.

vescus Prov. — ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon vescus Provancher, Natural. Canad. IX. 1877 p. 9, ♂.
Ichneumon vescus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 163 n. 92, ♂.
Ichneumon vescus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 352 n. 34, ♂.
Ichneumon vescus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 279 n. 34, ♂.

vestianellae Schrk.! — Eur.: Bavaria.
Ichneumon vestianellae Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 310 n. 2154.

vestigator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon vestigator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 275.
Ichneumon vestigator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 348.

vestigator Wesm. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon deceptor Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 308 n. 40, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon deceptor Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 332 n. 126, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon suavis var. 1 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 348, ♀. [n. 94, ♀ ♂.
Ichneumon vestigator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 90
Ichneumon vestigator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 177 (Mant. p. 44), ♀ ♂.

---

[1] *Lep.*: Polygonia faunus, Heodes hypophlaeas (Howard).

Ichneumon deceptor Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 39
[n. 126, ♂.
Ichneumon vestigator Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 43
[n. 133. ♀.
Ichneumon vestigator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 12, ♀ ♂.
Ichneumon vestigator Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 175 n. 105, ♀ ♂.
Ichneumon vestigator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 203, ♂.
Ichneumon vestigator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 406
[n. 138, ♀ ♂.
Ichneumon vestigator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 43, ♂.
Ichneumon vestigator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 181 n. 88, ♀ ♂.
Ichneumon vestigator Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 109 n. 95, ♀ ♂.
Ichneumon (Barichneumon) vestigator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1962 n. 8.
Ichneumon deceptor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 244 n. 30, ♀ ♂.

var. **obscurior** Berth. — ♀ — Eur.
Ichneumon deceptor var. obscurior Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 245.
Ichneumon vestigator var. obscurior m. [♀.

vexator Smith — ♀ — As.: Japonia.
Ichneumon vexator Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 390 n. 9, ♀.

vexator Thunbg.! — Eur.: Britannia, Suecia.
Ichneumon vexator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 269.
Ichneumon vexator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 332.

vexatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon vexatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 281.
Ichneumon vexatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 367.

viator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon viator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon viator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 302.

vibratorius Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon vibratorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon vibratorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 286.

viburnellae Schrk.! — Eur.: Bavaria.
Ichneumon viburnellae Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 309 n. 2152.

vicarius Wesm. — ♀ — Eur.: Germania. [n. 100. ♀.
Ichneumon vicarius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 96
Ichneumon vicarius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 407 n. 145. ♀.
Ichneumon vicarius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 253 n. 46. ♀

vicinator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon vicinator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 261.
Ichneumon vicinator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 312.

vicinus Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Ichneumon vicinus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 169 n. 50, ♀.
Ichneumon vininus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 182 n. 183, ♀.
Ichneumon vicinus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 32 n. 86, ♀.

victor Thunbg.! — Eur.: Britannia.
Ichneumon victor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 264.
Ichneumon victor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 318.

victor Scop.! — Eur. centr.
Ichneumon victor Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 287 n. 757; T. 41 F. 757.
Ichneumon victor Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 186 n. 158.
Ichneumon victor Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 367.

Ichneumon victor Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 213 n. 38.
Ichneumon victor Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1082 n. 321.
viduus Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Ichneumon viduus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 491 n. 23, ♀.
vigilans Christ! — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ichneumon vigilans Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 370; T. 39 F. 6, 7.
Ichneumon vigilans Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 991 n. 155, ♀ ♂.
vigilator Fabr.! — Afr. aequinoct.
Ichneumon vigilator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 426 n. 38.
Ichneumon vigilator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 263 n. 46.
Ichneumon vigilator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2685 n. 112.
Ichneumon vigilator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 177 n. 65.
Ichneumon vigilator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 151 n. 75.
Ichneumon vigilator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 65 n. 60.
Ichneumon vigilator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 257.
Ichneumon vigilator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 300.
vinctus Say — ♂ — Am.: Indiana.
Ichneumon vinctus Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 70 n. 4, ♂.
Ichneumon vinctus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 375 n. 4, ♂.
Ichneumon vinctus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 207, ♂.
vindex Müll.! — Eur.: Dania.
Ichneumon vindex O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 155 n. 1804.
Ichneumon vindex Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 921 n. 66.
vinnulus Cress. — ♂ — Am.: Pennsylvania, Virginia.
Ichneumon vinnulus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 189 n. 6, ♂.
Ichneumon vinnulus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 168 n. 109, ♂.
vinulatorius Thunbg.! — Eur.: Suecia, Germania.
Ichneumon vinulatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 254.
Ichneumon vinulatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St Pétersbourg IX. 1824 p. 291.
vinulentus Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Ichneumon vinulentus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 162 n. 40, ♂.
Ichneumon vinulentus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 176 n. 154, ♂.
viola Cress. — ♀ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon viola Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 137 n. 3, ♀.
Ichneumon viola Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 292.
Ichneumon viola Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc VI. 1877 p. 143 n. 5, ♀.
Ichneumon viola Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 289 n. 2, ♀.
Ichneumon viola Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 265 n. 2, ♀.
violaceipennis Spin. — ♂ — Am.: Chile.
Ichneumon violaceipennis Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 498 n. 7, ♂.
violator Thunbg.! — Afr.: Cap.
Ichneumon violator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 243.
Ichneumon violator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 303.
virescens Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon virescens Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 126 n. 64, ♀.
virginalis Wesm. — ♀ — Eur.: Belgia, Germania. [n. 109, ♀.
Ichneumon virginalis Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 101
Ichneumon virginalis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 410 n. 155, ♀.
Ichneumon virginalis Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 111 n. 104.
Ichneumon (Barichneumon) virginalis Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1963 n. 13.
Ichneumon virginalis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 563 n. 17, ♀.

virginicus Cress. — ♀ — Am.: Virginia.
Ichneumon Virginicus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 181 n. 66, ♀.
Ichneumon Virginicus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 177 n. 156, ♀.
virulentus Smith — ♀ — As.: Japonia.
Ichneumon virulentus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 389 n. 6, ♀.
vishnu Cam. — ♂ — As.: Ceylon.
Ichneumon Vishnu Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 8, ♂.
vitalis Cress. — ♀ — Am.: New York.
Ichneumon vitalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 149 n. 36, ♀.
vittatus Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 65 n. 271.
Ichneumon vittatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2705 n. 324.
Ichneumon vittatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1038 n. 239.
vittifrons Cress. — ♂ — Am.: Delaware, Virginia, Georgia.
Ichneumon vittifrons Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 143 n. 14, ♂.
Ichneumon vittifrons Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 153 n. 49, ♂.
vivax Cress. — ♀ — Am.: New Hampshire.
Ichneumon vivax Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 178 n. 165, ♀.
vocator Thunbg.! — Eur.: Suecia.
Ichneumon vocator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 268.
Ichneumon vocator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 330.
volens Cress. — ♂ — Am.: Canada, United States.
Ischnus volens Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 192 n. 9, ♂.
Ichneumon volens Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 182 n. 186, ♂.
Ichneumon volens Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 364 n. 65, ♂.
Ichneumon volens Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 289 n. 65, ♂.
volesus Cress. — ♀ — Am.: Massachusetts.
Ichneumon volesus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 304, ♀.
Ichneumon volesus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 169 n. 113, ♀.
vulcunalis Berth. — ♂ — Eur.: Gallia.
Ichneumon vulcunalis Berthoumieu, Bull. soc. entom. France 1898 p. 332 n. 37, ♂.
vulgivagus Spin. — Am.: Chile.
Ichneumon vulgivagus Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 495 n. 27.
vulneratorius Zett. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon vulneratorius Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 364 n. 28, ♀.
? Ichneumon Dahlbomi Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 380 (Ot. p. 29) n. 27, ♀.
Ichneumon vulneratorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 118 n. 70, ♀ ♂.
Ichneumon vulneratorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 181, 214 & 216, ♀ ♂.
Ichneumon vulneratorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1943 n. 77.
Ichneumon vulneratorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 581 n. 15, ♀ ♂.
var. **dahlbomii** Wesm. — ♀ — Eur. bor. & centr.
Ichneumon Dahlbomi Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 380 (Ot. p. 29) n. 27, ♀.
Ichneumon vulneratorius var. Dahlbomi Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 581, ♀.
vulpecula Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon vulpecula Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXIX. 1875 [p. 149 & 155 n. 6, ♀.
Ichneumon vulpecula Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 279 n. 100, ♀.
vultus Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Ichneumon vultus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 165 n. 44, ♂.
Ichneumon vultus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 177 n. 157, ♂.

w-album Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Ichneumon w-album Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III 1864 p. 191 n. 8, ♂.
Ichneumon w-album Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 309, ♀ ♂.
Ischnus variegatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 250.
Ichneumon w-album Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 179 n. 170, ♀ ♂.
Ichneumon w-album Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 362 n. 60, ♀ ♂.
Ichneumon w-album Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 288 n. 60, ♀ ♂.
walkeri Wesm. — ♀ — Eur.: Britannia, Germania.
Ichneumon Walkeri Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 183 (Mant. p. 50) n. 110b, [♀.
Ichneumon Walkeri Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 411 n. 157, ♀.
Ichneumon Walkeri Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 216 n. 108, ♀.
Ichneumon Walkeri Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 560 n. 11, ♀.
wilsonii Cress. — ♂ — Am.: United States.
Ischnus Wilsoni Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 188 n. 4, ♂.
Ichneumon Wilsoni Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 161 n. 83, ♂.
wuestnei Kriechb. — ♀ — Eur.: Germania.
Ichneumon Wüstnei Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 290, ♀.
Ichneumon Wüstnei Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 657 n. 164, ♀.
xanthogastricus Schrk.! — ♀ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon xanthogastricus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 288 n. 2099, ♀.
Ichneumon xanthogastricus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 988 n. 149, ♀.
xanthognathus Thoms. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Gallia.
Ichneumon xanthognathus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VII. 1887 p. 8 n. 50.
Ichneumon xanthognathus Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1938 n. 64.
Ichneumon xanthognathus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 616 n. 84, [♀ ♂.
xanthogrammus Ashm. — ♂ — Am.: Texas.
Ichneumon xanthogrammus Ashmead, Proc. U. St. Nat. Mus. XII. 1890 p. 390, ♂.
xanthomelas Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 68 n. 309 & p. 71 n. 371.
Ichneumon xanthomelas Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2709 n. 360 & p. 2722 [n. 413.
Ichneumon xanthomelas Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1070 n. 296 & 297.
xanthopsis Ashm. — ♂ — Am.: St. Louis.
Ichneumon xanthopsis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XII. 1890 p. 390, ♂.
xanthopus Schrk.! — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon xanthopus Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 262 n. 2052, ♀ ♂.
Ichneumon xanthopus Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1082 n. 320, ♀ ♂.
xanthorius Forst.[1] — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; Afr.: Algeria.
Ichneumon xanthorius Forster, Nov. spec. Insect. 1771 p. 83 n. 83, ♀.
Ichneumon xanthorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2678 n. 197.
Ichneumon xanthorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 314 n. 49, ♂.
Ichneumon xanthorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 361 n. 139, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon xanthorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 173 n. 126, ♀ [[excl. ♂].
Ichneumon xanthorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 61 [n. 55, ♀ ♂.
Ichneumon xanthorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 67 n. 30, ♀.
Ichneumon xanthorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 329 n. 83, ♀ ♂.
Ichneumon xanthorius Kriechbaumer, Stettin. entom. Zeitg. XXXVI. 1875 p. 386, ♀.
Ichneumon xanthorius Woldstedt, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXII. 1876 p. 399 n. 27, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Polyphaenis sericata, P. perspicua (Mocsáry), Dianthoecia irregularis (Bignell).

Ichneumon xanthorius Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 290 n. 25. ♀ ♂.
Ichneumon xanthorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 8. 1879 p. 57. ♀; T. 36 F. 7.
Ichneumon xanthorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 214 & 216 n. 33, ♀ ♂
Ichneumon xanthorius Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894 p. 11. ♀.
Ichneumon xanthorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 623 n. 99. ♀ ♂
var. **flavoniger** Grav. — ♂ — Eur. centr.
Ichneumon flavoniger Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 320 n. 57.
Ichneumon flavoniger Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 403 n. 157, ♂.
Ichneumon flavoniger Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 180 n. 14[illegible]
Ichneumon xanthorius var. flavoniger Kriechbaumer, Stettin. entom. Zeitg XXXVI. 18[illegible] [p. 3[illegible]
Ichneumon xanthorius var. flavoniger Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 18[illegible] [p. 624. ♂
var. **quadrifasciatus** Grav. — ♂ — Eur. centr.
Ichneumon quadrifasciatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 402 n. 156, ♂.
Ichneumon quadrifasciatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 179 n. 14[illegible]
Ichneumon quadrifasciatus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 304 n. 14.
Ichneumon quadrifasciatus Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 332 n. 396.
Ichneumon quadrifasciatus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France 2, V. 1847 p. 397 n. 3[illegible] ♂.
Ichneumon xanthorius var. quadrifasciatus Kriechbaumer, Stettin. entom. Zeitg. XXXVI [1875 p. 3[illegible]
Ichneumon xanthorius var. quadrifasciatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII [1894 p. 624. ♂.
xanthorrhoeus Hal. — ♂ — Am. mer.
Ichneumon xanthorrhoeus Haliday, Trans. Linn. Soc. London XVII. P. 3. 1836 p. 316 n. 1. ♂
xanthuros Gmel.! — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 71 n. 365.
Ichneumon xanthuros Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2722.
Ichneumon xanthuros Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 1058 n. 278.
xylostei Vall.![1]) — ♀ — Eur.: Gallia.
Ichneumon xylostei Vallot, Mém. acad. sc. Dijon 1836 p. 209, ♀.
yucatanensis Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon Yucatanensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 36./37. 1885 Hymen. I. p. 168 n. 6[illegible] [♀; T. 8 F. [illegible]
yum-yum Kriechb. — ♀ — As.: Japonia.
Ichneumon yum-yum Kriechbaumer, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1893/94 p. 126 n. 2, ♀
zacotecus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon Zacotecus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 116 n. 21. ♀.
zapotecus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon Zapotecus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 3 n. 3, ♀.
zaptlanus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon Zaptlanus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 119 n. 38. ♀.
zebratus Cress. — ♀ ♂ — Am.: United States.
Ichneumon zebratus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 299, ♀.
Ichneumon zebratus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. IV. 1872 p. 156, ♂.
Ichneumon zebratus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 163 n. 90. ♀ ♂.
zelotypus Cress. — ♂ — Am.: Virginia.
Ichneumon zelotypus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 299, ♂.
Ichneumon zelotypus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 167 n. 103. ♂
zonalis Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota; Afr.: Algeria. [p. p.
Ichneumon illuminatorius Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 323 n. 60. ♂

---

[1]) *Lep.:* Noctua persicariae (Vallot).
[2]) *Lep.:* Caradrina ambigua (Mocsáry).

Ichneumon zonalis Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 323 n. 118, ♀.
Ichneumon illuminatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 423 n. 164, ♂ [p. p.].
Ichneumon illuminatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 183 n. 150.
Ichneumon extensorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 59 n. 14, ♀.
Ichneumon illuminatorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 p. 398 n. 40, ♂.
Ichneumon extensorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 337 (Mant. p. 100).
Ichneumon zonalis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 378 (Ot. p. 27) n. 25, ♀ ♂.
Ichneumon terminatorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 70 n. 39, ♂ [excl. ♀].
Ichneumon zonalis Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 389 n. 71, ♀ ♂.
Ichneumon zonalis Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 80 n. 60-61, ♀ ♂.
Ichneumon illuminatorius Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. IX. 1890 p. 140.
Ichneumon zonalis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 613 n. 78, ♀ ♂.

STENICHNEUMON

Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1964.
στενός, angustus; Ichneumon, nom. propr.
Vide genus Ichneumon.

EUPALAMUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 13.
εὖ, bene; *παλάμη*, palma.

Synon.: Ichneumon Gravenhorst & auct.

lacteator (Grav.) Thoms. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon lacteator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 202 n. 55b.
Ichneumon lacteator Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 15 n. 30.
Ichneumon depexus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 75 n. 73, [♀ ♂ & p. 220.
Ichneumon depexus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 170 (Mant. p. 37), ♀ ♂.
Ichneumon lacteator Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 163 n. 97, ♀ ♂.
Ichneumon lacteator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 287 n. 55b, ♂.
Ichneumon lacteator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 400 n. 111, ♀ ♂.
Ichneumon lacteator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 46, ♀ ♂.
Ichneumon albatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XL. 1879 p. 33 n. 20, ♂.
Eupalamus lacteator Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 12 n. 2.
Eupalamus lacteator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1899 n. 4.
Ichneumon lacteator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 283 n. 107, ♀ ♂.

oscillator Wesm.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota. [Wesmael].
Ichneumon deliratorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 219 n. 68, ♂ [excl. ♀, non
Ichneumon pallipes Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 233, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon deliratorius Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 16 n. 38, ♂ [excl. ♀].
Eupalamus oscillator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 14 [n. 1, ♀ ♂.
Eupalamus oscillator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 141 (Mant. p. 8), ♂.
Ichneumon oscillator Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 172 n. 103, ♀ ♂.
Eupalamus oscillator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 442 (Doc. p. 2) n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon oscillator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 400 n. 112, ♀ ♂.
Ichneumon oscillator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 41, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Trichiura crataegi (Rondani).

Ichneumon oscillator Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 103 n. 87, ♀ ♂.
Eupalamus oscillator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1898 n. 1.
Ichneumon oscillator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 282 n. 105, ♀ ♂.

trentepohlii Wesm. — ♀ ♂ — Eur.: Belgia, Germania.
Ichneumon comitator var. α Trentepol, Isis 1826 p. 63 n. 2, ♂. [n. 2, ♀.
Eupalamus Trentepohlii Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 14
Ichneumon Trentepohli Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 10, ♀ ♂.
Ichneumon Trentepohli Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 400 n. 113, ♀.
Ichneumon Trentepohli Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 105 n. 199, ♀ ♂.
Eupalamus Trentepohlii Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1898 n. 3. [p. 283, ♀.
Ichneumon oscillator var. Trentepohli Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895

wesmaelii Thoms. — ♀ ♂ — Eur. bor. & centr. [p. 14.
Eupalamus oscillator var. b Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.)
Eupalamus Wesmaeli Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 12 n. 1, ♀ ♂.
Eupalamus Wesmaeli Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1898 n. 2, ♀ ♂.
Ichneumon Wesmaeli Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 283 n. 106, ♀.

DIPHYUS

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 184.
δίφυος, naturae duplex.

Synon.: Diphyes Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 184 [err. typogr.].

tricolor Kriechb. — ♀ — Eur.: Bavaria.
Diphyes tricolor Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 184, ♀.
Diphyes tricolor Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 291, ♀.

PITHOTOMUS

Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 32.
πίθος, dolium; *τομή*, segmentum.

rufiventris Kriechb. — ♀ — Eur.: Dobrusca.
Pithotomus rufiventris Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien III. 1888 p. 33, ♀.
Pithotomus rufiventris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 290, ♀.

EXEPHANES

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 13.
ἐκ-φαίνομαι, appareo.

Synon.: Octatomus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 186.
ὀκτάς, octonarius; *τομός*, scindens.
Ichneumon Gravenhorst & auct. ant.

amabilis Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Ichneumon (Exephanes?) amabilis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXI. 1895 p. 105 n. 73, ♂.
Exephanes amabilis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 576 n. 6, ♂.

var. **annulicornis** Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Exephanes amabilis var. annulicornis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXI. 1895 p. 106, ♂.
Exephanes amabilis var. annulicornis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895

caelebs Kriechb. — ♂ — Eur.: Germania. [p. 577, ♂.
Exephanes ? caelebs Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 289, ♂.
Exephanes caelebs Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 577 n. 8, ♂.

clypeatus Berth. — ♂ — Eur.: Sicilia.
Exephanes clypeatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 577 n. 9, ♂.

femoralis Brischke[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
? Ichneumon (Exephanes) Steinii Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 168 n. 22, [♀♂.
Exephanes femoralis Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 36, ♀♂.
Octatomus tricolor Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. LXII. 1881 p. 186 n. 32, ♀.
Octatomus tricolor Brischke, Entom. Nachr. VI. 1881 p. 216.
Exephanes femoralis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 575 n. 3, ♀ ♂.

fulvescens Vollenh. — Eur.: Batavia.
Exophanes fulvescens Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1874 p. 5; T. 2 F. 5.

hilaris (Grav.) Wesm.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Gallia, Germania, Hungaria, Italia, Corfu.
Ichneumon hilaris Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 328 n. 122, ♀.
Ichneumon ischioxanthus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 330 n. 124, ♂.
Ichneumon exulans Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 522 n. 216, ♂.
Ichneumon hilaris Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 170 n. 118, ♀.
Exephanes hilaris Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 17 [n. 1, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon ischioxanthus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) [p. 39 n. 124.
Ichneumon (Exephanes) hilaris Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 3, ♂.
Exephanes hilaris Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 371 n 2, ♀ ♂.
Exephanes hilaris Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1874 p. 4, ♀ ♂; T. 2 F. 4.
Exephanes hilaris Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 36, ♀ ♂.
Exephanes hilaris Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VI. 1886 p. 12.
Exephanes hilaris Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 289, ♂.
Exephanes hilaris Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1897 n. 2.
Exephanes hilaris Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1895 p. 35.
Exephanes hilaris Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 573 n. 1, ♀♂.

var. **bisignatus** Kriechb. — ♂ — Eur.: Germania.
Exephanes hilaris var. bisignata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 290, ♂.
Exephanes hilaris var. bisignata Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 574, ♂.

var. **marginalis** Kriechb. — ♂ — Eur.: Germania.
Exephanes hilaris var. marginalis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVI. 1890 p. 290, ♂.

var. **subnudus** Tischb. — ♀ — Eur.: Germania.
Exephanes subnudus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 168 n. 3, ♀.
Exephanes subnudus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 327 n. 3, ♀.
Exephanes hilaris var. subnudus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 574, ♀.

japonicus Cam. — ♀ — As.: Japonia.
Exephanes Japonicus Cameron, Proc. & Trans. Nat. Hist. Soc. Glasgow (2) I. P. 3. 1885/86 [p. 273, ♀.

macilentus Tischb. — ♀ — Eur.: Tirolia.
Exephanes macilentus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 168 n. 4, ♀.
Exephanes macilentus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 327 n. 4, ♀.
Exephanes macilentus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 578 n. 10, ♀.

munkii Kriechb. — ♂ — Eur.: Bavaria.
Exephanes Munki Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXI. 1895 p. 107 n. 74, ♂.
Exephanes Munki Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 577 n. 7, ♂.

nigrifemur Tischb. — ♀ — Eur.: Germania.
Exephanes nigrifemur Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. LXII. 1881 p. 169, ♀.

---

1) *Lep.:* Leucania elymi (Brischke).
2) *Lep.:* Tapinostola elymi (Vollenhoven), Miana arcuosa (Bridgman).

Exephanes nigrifemur Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 328 n. 5.
Ichneumon nigrifemur Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 244 n. 28, ♀.

occupator (Grav.) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon extensorius var. 5 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 270, ♀.
Ichneumon occupator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 425 n. 166, ♂.
Ichneumon occupator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 183 n. 151, ♂.
Exephanes occupator Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 17 [n. 2, ♀ ♂.
Exephanes occupator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 141 (Mant. p. 5), ♂.
Ichneumon occupator Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 52 n. 166.
Ichneumon (Exephanes) occupator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 [p. 3, ♂.
Exephanes occupator Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 8 n. 1, ♀ ♂.
Exephanes occupator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 201, ♀ ♂.
Limerodes occupator Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 204, ♂.
Exephanes occupator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 370 n. 1, ♀ ♂.
Exophanes occupator Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1874 p. 4, ♀ ♂; T. 2 F. 3a (♂) & 3b (♀).
Exophanes occupator Vollenhoven, Tijdschr. v. Entom. XXI. 1878 p. 156 n. 4.
Exophanes occupator Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 36, ♀ ♂.
Exephanes occupator Holmgren, Entom. Tidsskr. I. 1880 p. 22, ♀ ♂.
Ichneumon venustus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXVII. 1876 p. 286 n. 15, ♂.
Exephanes occupator Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1897 n. 1.
Exephanes occupator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 575 n. 4, ♀ ♂.

var. **contaminatus** (Grav.) Berth. — ♂ — Eur.
Ichneumon contaminatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 391 n. 150, ♂.
Ichneumon occupator var. contaminatus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 [(Rem.) p. 47 n. 150.
Exephanes occupator var. contaminatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 [p. 576, ♂.

rufulus Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Exephanes rufulus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 5, ♀.

uniguttatus Kriechb. — ♀ ♂ — Eur.: Bavaria.
Exephanes uniguttatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXI. 1895 p. 104 n. 72, ♀ ♂.
Exephanes uniguttatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 574 n. 2, ♀ ♂.

variegator Tischb. — ♀ — Eur.: Germania.
Exephanes variegator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLII. 1881 p. 166 n. 1, ♀.
Exephanes variegator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 327 n. 1.
Exephanes variegator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIV. 1895 p. 576 n. 5, ♀.

CHASMIAS

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 17.
χάσμη, hiatus.

Synon.: Chasmodes Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 13 [[nec Cuv. & Val. 1836].
χασμώδης, piger.
Cryptus Fabricius, Gravenhorst.
Ichneumon Fabricius & auct.

fortunatus (Tosqu.) D. T. — ♂ — Afr.: Scioa.
Chasmodes fortunatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 3, ♂.
Chasmias fortunatus m.

---

1) *Lep.:* Amblyptila acanthodactyla (Bridgman), Nonagria typhae (Holmgren, Brischke), N. sparganii (Vollenhoven).

lugens (Grav.) D. T. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon lugens Gravenhorst, Monit. spec. nigr. Ichneum. 1829 p. 15 n. 35.
Ichneumon lugens Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 215 n. 65, ♀ [excl. ♂].
Ichneumon fuscipes var. 2 Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 215 n. 70, ♂.
Ichneumon lugens Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 149 n. 64, ♀ [excl. ♂].
Chasmodes lugens Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 16 n. 2, ♀ ♂.
Chasmodes lugens Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 25 n. 65, ♂.
Ichneumon fuscipes Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 26 n. 70, ♂
Chasmodes lugens Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 6 n. 3, ♀ ♂. [[excl. var. 2b, ♀].
Ichneumon lugens Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 300 n. 65, ♀.
Chasmodes lugens Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 445 (Doc. p. 5) n. 2, ♀ ♂.
Chasmodes lugens Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 370 n. 3, ♀ ♂.
Chasmodes lugens Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1874 p. 4; T. 2 F. 2.
Chasmodes lugens Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 101 n. 2, ♀ ♂.
Ichneumon lugens Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1914 n. 1.
Chasmodes lugens Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 519 n. 3, ♀ ♂.
Chasmias lugens m.

motatorius (Fabr.) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon motatorius Fabricius, Syst. Entom. 1775 p. 329 n. 14.
Ichneumon motatorius Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 423 n. 14.
Ichneumon motatorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 261 n. 17.
Ichneumon motatorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 139 n. 14.
Ichneumon motatorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2677 n. 83.
Ichneumon motatorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 349.
Ichneumon motatorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1789 p. 68 n. 19.
Ichneumon motatorius Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 115 n. 251.
Ichneumon motatorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 135 n. 12.
Ichneumon motatorius Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 156 n. 480.
Ichneumon motatorius Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 52 n. 14.
Cryptus motatorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 71 n. 4.
Cryptus motatorius Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 265 n. 3777.
Ichneumon motatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 111, ♂.
Ichneumon motatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 255.
Ichneumon motatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 293.
Ichneumon motatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 353 n. 137.
Ichneumon motatorius Trentepol, Isis 1829 p. 933 n. 48, ♀.
Ichneumon motatorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 172 n. 123, ♀.
Ichneumon motatorius Boie, Naturh. Tidsskr. III. 1841 p. 319 n. 7, ♀ ♂.
Chasmodes motatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 15 [n. 1, ♀ ♂ [excl. var. 5 & 6].
Chasmodes motatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 141 (Mant. [p. 8), ♀ ♂.
Ichneumon (Chasmodes) motatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 [p. 2, ♀ ♂.
Chasmodes motatorius Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 4 n. 1, ♀ ♂.
Chasmodes motatorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 201, ♂.
Chasmodes motatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) XXIV. 1867 p. 444 (Doc. p. 4) [n. 1, ♂.
Chasmodes motatorius Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 369 n. 1, ♀ ♂.
Chasmodes motatorius Vollenhoven, Pinacogr. P. 1. 1874 p. 5; T. 2 F. 1.

---

[1]) *Lep.:* Noctua airae (Boie, Taschenberg), Nonagria geminipuncta (Weston).

Ichneumon importunus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 109 n. 240, ♀.
Amblyteles motatorius Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXI. 1877 p. 50.
Chasmodes motatorius Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 36, ♀ ♂.
Chasmodes motatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIII. 1880 p. 101 n. 1, ♀ ♂.
Chasmodes motatorius Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1896 n. 1.
Chasmodes motatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 518 n. 1, ♀ ♂.
Chasmias notatorius Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 17 [err. typogr.].

var. **nuptus** (Berth.) D. T. — ♂ — Eur.
Chasmodes motatorius var. nuptus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894
Chasmias motatorius var. nuptus m. [p. 518, ♂.

var. **transitorius** (Berth.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.
Chasmodes motatorius var. transitorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894
Chasmias motatorius var. transitorius m. [p. 518, ♀ ♂.

paludicola (Wesm.) D. T.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon motatorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 353 n. 137, ♀ [p. p.].
Chasmodes paludicola Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 356 (Ot. p. 3) n. 1, ♀ ♂.
Chasmodes paludicola Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 5 n. 2, ♀ ♂.
Chasmodes paludicola Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 269 n. 2, ♀ ♂.
Chasmodes paludicola Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1897 n. 2.
Chasmodes paludicola Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 518 n. 2, ♀ ♂.
Chasmias paludicola m.

CILLIMUS

Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 122.
Etymol. obscura.

adornatus Tosqu. — ♀ — Afr.: Delagoa Bai.
Cillimus adornatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 123 n. 1, ♀.

formosus Tosqu. — ♂ — Afr.: Scioa.
Cillimus formosus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 125 n. 2, ♂.

scitulus Tosqu. — ♀ — Afr.: Caffraria.
Cillimus scitulus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 128 n. 3, ♀.

HOPLISMENUS

Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 409.
Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 13.
ὅπλον, instrumentum.

Synon.: Rhysaspis Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 139.
ῥισός, rugosus; ἀσπίς scutum.
Cryptus Panzer, Gravenhorst, Blanchard.
Ichneumon Panzer, Jurine, Say, Provancher.
Peltastes Say.
Trogus Cresson.

animosus Tosqu. — ♀ — Afr.: Togo.
Hoplismenus animosus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 69 n. 11, ♀.

armatorius (Panz.) D. T.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon armatorius Panzer, Faun. Insect. German. VI. 1799 P. 70 T. 21, ♀.

---

[1]) *Lep.:* Nonagria typhae (Sichel, Boheman).
[2]) *Lep.:* Aspilates strigilaria (Brischke), Pararga maera (Giraud).

Cryptus armatorius Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 69, ♀.
Ichneumon armatorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 112, ♀.
Cryptus armatorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 287, ♀.
Hoplismenus perniciosus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 413 n. 3, ♀ ♂.
Hoplismenus perniciosus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 275.
Hoplismenus perniciosus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 108 [n. 1, ♀ ♂.
Hoplismenus perniciosus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 186 (Mant. [p. 53), ♀ ♂.
Hoplismenus perniciosus Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VIII. 1850 p. 361 [n. 1, ♀.
Hoplismenus perniciosus Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 38 [n. 1, ♀ ♂.
Hoplismenus perniciosus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 15, ♀.
Hoplismenus perniciosus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 208 n. 2, ♀ ♂.
Ichneumon bellicosus Destefani, Natural. Sicil. IV. 1885 p. 186 n. 3, ♀.
Hoplismenus perniciosus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2082 n. 4.
Ichneumon perniciosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 513 n. 2, ♀ ♂.

var. **albifrons** (Grav.) D. T. — ♂ — Eur.
Hoplismenus albifrons Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 417 n. 4, ♂.
Hoplismenus albifrons Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 275 n. 2.
Hoplismenus albifrons Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2081 n. 2.
Hoplismenus perniciosus var. albifrons Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 513, ♂.
Hoplismenus armatorius var. albifrons m.

var. **annulatus** (Berth.) D. T. — ♂ — Eur.
Hoplismenus perniciosus var. annulatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 513, ♂..
Hoplismenus armatorius var. annulatus m.

var. **bidentatus** (Gmel.) Grav. — ♂ — Eur.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 59 n. 171.
Ichneumon bidentatus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2685 n. 245.
Hoplismenus bidentatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 412 n. 2, ♂.
Hoplismenus bidentatus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1894 p. 2081 n. 3.
Hoplismenus perniciosus var. bidentatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 513, ♂.
Hoplismenus armatorius var. bidentatus m.

var. **maestus** Grav. — ♂ — Eur.
Hoplismenus moestus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 412 n. 1, ♀.
Cryptus (Hoplismenus) moestus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 311 n. 1.
Hoplismenus moestus Westwood, Introd. mod. classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 58.
Hoplismenus parniciosus var. moestus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 [p. 513, ♂.
Hoplismenus armatorius var. moestus m.

belliger Tosqu. — ♀ — Afr.: Togo.
Hoplismenus belliger Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 63 n. 8, ♀.

berthoumieui Pic — ♀ — Afr.: Algeria.
Hoplismenus Berthoumieui Pic, Bull. soc. entom. France 1897 p. 265, ♀.

cibdelus Tosqu. — ♂ — Afr.: Scioa.
Hoplismenus cibdelus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 52 n. 3, ♂.

complacitus Tosqu. — ♀ — Afr.: Togo.
Hoplismenus complacitus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 60 n. 7, ♀.

cordatus Tosqu. — ♂ — Afr.: Ouganda.
Hoplismenus cordatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 54 n. 4, ♂.

cornix Kriechb.[1]) — ♂ — Eur.: Styria.
Hoplismenus cornix Kriechbaumer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1890 p. 481, ♂.
Hoplismenus cornix Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 514 n. 5, ♂.
flavitarsis Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Trogus flavitarsis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 264 n. 2, ♂.
Hoplismenus flavitarsis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 185 n. 1, ♂.
fulgens Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Togo, Camerun, Guinea.
Hoplismenus fulgens Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 49 n. 1, ♀ ♂.
fulvidus Tosqu. — ♀ ♂ — Afr.: Guinea.
Hoplismenus fulvidus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 51 n. 2, ♀ ♂.
idoneus Tosqu. — ♀ — Afr.: Togo.
Hoplismenus idoneus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 56 n. 5, ♀.
lamprolabus Wesm. — ♀ — Eur.: Austria, Sabaudia.
Hoplismenus lamprolabus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 394 (Ot. p. 43) n. 2, ♀.
Hoplismenus lamprolabus Wesmael, Mém. cour. acad. sc. Belgique VIII. 1859 (Rem.) p. 90, ♀.
Hoplismenus lamprolabus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 515 n. 6, ♀.
lepidus Tosqu. — ♀ — Afr.: Cap.
Hoplismenus lepidus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 67 n. 10, ♀.
leucopygus Grav. — ♀ ♂ — Eur.
Hoplismenus leucopygus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 429 n. 13, ♀ ♂.
luteus Grav.[2]) — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Belgia, Germania, Italia.
Hoplismenus luteus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 420 n. 6, ♀. [♀ ♂.
Hoplismenus luteus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 187 (Mant. p. 54) n. 1b,
Hoplismenus luteus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 395 (Ot. p. 44) n. 3, ♀ ♂.
Hoplismenus luteus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 512 n. 1, ♀ ♂.
mikado Cam. — As.: Japonia.
Hoplismenus Mikado Cameron, Proc. & Trans. Nat. Hist. Soc. Glasgow (2) I. 3. 1885/86 p. 274.
morulus (Say) Cress.[3]) — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon morulus Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 73 n. 11.
Ichneumon morulus Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 227 n. 3.
Ichneumon (Peltastes) morulus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 377 n. 11.
Ichneumon morulus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 685 n. 3.
Ichneumon calcaratus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 49.
Hoplismenus morulus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 186 n. 2, ♀ ♂.
Hoplismenus morulus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 2 n. 1, ♂.
Hoplismenus morulus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 291 n. 1, ♂.
Hoplismenus morulus Howard, Scudder: Butterflies U. S. 1889 p. 1878, ♀ ♂; T. 88 F. 9.
obscurus Kriechb. — ♀ ♂ — As.: Japonia.
Hoplismenus obscurus Kriechbaumer, Sitzber. naturf. Ges. Leipzig 1893/94 p. 127 n. 4, ♀ ♂.
otomitus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Hoplismenus Otomitus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 21 n. 2, ♀.
pacificus Cress. — ♀ ♂ — Am.
Hoplismenus pacificus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 186 n. 3, ♀ ♂.
Hoplismenus pacificus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 354, ♀ ♂.
persibus Tosqu. — ♀ — Afr.: Scioa.
Hoplismenus persibus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 58 n. 6, ♀.

---

1) *Lep.:* Pararga maera (Kriechbaumer).
2) *Lep.:* Vanessa spec. (Giraud).
3) *Lep.:* Polygonia interrogationis, Euvanessa antiopa (Howard).

pica Wesm.[1] — ♀ — Eur.: Germania, Austria.
Hoplismenus pica Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XXII. P. 2. 1855 p. 406 (Misc. p. 47), ♀.
Hoplismenus pica Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 16, ♀.
Hoplomenus septemguttatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVIII. 1871 p. 310 [n. 5, ♀.
Hoplismenus pica Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig N. F. IV. P. 3. 1878 p. 46, ♀.
Hoplismenus pica Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 514 n. 4, ♀.
picturatus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Hoplismenus picturatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 22 n. 5, ♀.
plagiceps Kriechb. — ♀ — Afr. occ.
Hoplismenus plagiceps Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 43 n. 1, ♀.
rugosus (Tischb.) Berth. — ♂ — Eur.: Dalmatia.
Rhyssaspis rugosus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 139 n. 290, ♂.
Hoplismenus rugosus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 514 n. 3, ♂.
scutellatus (Prov.) Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Ichneumon scutellatus Provancher, Natural. Canad. VII. 1875 p. 78.
Hoplismenus scutellatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 186 n. 4, ♂.
Hoplismenus scutellatus Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 3 n. 2, ♀ ♂.
Hoplismenus scutellatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 291 n. 2, ♀ ♂.
stygicus Prov. — ♂ — Am.: Canada.
Hoplismenus stygicus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1886 p. 34 n. 4, ♂.
terrificus Wesm.[2] — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Belgia. [n. 1c, ♀ ♂.
Hoplismenus terrificus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 292 (Mant. p. 55)
Hoplismenus terrificus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 393 (Ot. p. 42) n. 1, ♀ ♂.
Hoplismenus terrificus Holmgren, Ichneum. Suec. I. 1864 p. 207 n. 1, ♀ ♂.
Hoplismenus terrificus Thomson, Opusc. entom. P. 19. 1893 p. 2081 n. 1.
Hoplismenus terrificus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 515 n. 7, ♀ ♂.
var. **albicans** Berth. — ♂ — Eur. [p. 515, ♂.
Hoplismenus terrificus var. albicans Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894
var. **solutus** Berth. — ♀ ♂ — Eur. [♀ ♂.
Hoplismenus terrificus var. solutus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 515,
transversus Davis — ♂ — Am.: Idaho.
Hoplismenus transversus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 351, ♂.
tricolor Kriechb. — ♂ — Afr. occ.
Hoplismenus tricolor Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 44 n. 2, ♂.
ungulatus Grav. — ♀ ♂ — Eur.
Hoplismenus ungulatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 430 n. 14, ♀ ♂.
uniguttatus Grav. — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Belgia, Gallia, Germania, Russia.
Hoplismenus uniguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 423 n. 8, ♀.
Hoplismenus uniguttatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 109 n. 2, ♀ ♂.
Hoplismenus uniguttatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 292 (Mant. p. 55),
Hoplismenus uniguttatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 295 n. 53. [♀ ♂.
Hoplismenus uniguttatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 516 n. 8, ♀ ♂.
var. **habermehlii** Berth. — ♂ — Eur.: Germania. [1894 p. 516, ♂.
Hoplismenus uniguttatus var. Habermehli, Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII.

---

1) *Lep.:* Vanessa atalanta (Giraud).

2) *Lep.:* Argynnis adippe (Fallou), Vanessa antiopa (Perris, Giraud), V. C-album (Sichel), V. urticae (Kriechbaumer).

variatus Tosqu. — ♀ — Afr.: Bogos.
Hoplismenus variatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 65 n. 9, ♀.

violentus (Grav.) Berth. — ♀ ♂ — Eur.: Belgia, Gallia, Germania, Italia, Hungaria.
Ichneumon violentus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 613 n. 262, ♂.
Hoplismenus infaustus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 110 [n. 3, ♀ ♂.
Hoplismenus infaustus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique XV. P. 1. 1848 p. 293 (Mant. p. 56), ♀ ♂.
Hoplismenus infaustus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 396 (Ot. p. 45) n. 5, ♂.
Ichneumon violentus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 405 n. 137, ♂.
Hoplismenus violentus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXIII. 1894 p. 516 n. 9, ♀ ♂.

40. *Subfam.* Joppinae

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 2.

OEDICEPHALUS

Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 27.
οἰδάω, intumesco; *κεφαλή*, caput.

Synon.: Ichneumon Cresson.
Trogus Cresson.

albomaculatus Ashm. — ♀ — Am.: California.
Oedicephalus albomaculatus Ashmead, Proc. Californ. Acad. VI. 1895 p. 548 n. 22, ♀.

albovarius Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Trogus ? albovarius Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 20, ♀.
Oedicephalus ? albovarius Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 27.

glucidatus Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [T. 8 F. 23.
Oedicephalus glucidatus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 188 n. 3, ♀;

gracilicornis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Oedicephalus gracilicornis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 28 n. 3, ♀ ♂.

longicornis Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Oedicephalus longicornis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 27 n. 1, ♀.

pusillus Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Trogus pusillus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 19, ♂.
Oedicephalus ? pusillus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 92.

sororius Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Oedicephalus sororius Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 28 n. 2, ♀.
Ichneumon (Oedicephalus) sororius Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 129 [n. 2, ♀.

vicinus Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Ichneumon (Oedicephalus) vicinus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 130 [n. 4, ♀.

ECCOPTOSAGE

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 4 n. 13.
Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 23 n. 13.
ἐκκόπτω, exscindo; *σάγη*, tegmen.

waagenii Kriechb. — ♀ — As.: Sikkim.
Eccoptosage Waagenii Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 31, ♀.

CRYPTOJOPPA

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 4 n. 12.
Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. LXIII. 1898 p. 23 n. 12.
κρυπτός, absconditus; Joppa, nom. propr. Hymen.

semicastanea Kriechb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Cryptojoppa semicastanea Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 31, ♀.

STENOLONCHE

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 5 n. 19.
Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 24 n. 19.
στενός, angustus; *λόγχη*, cuspis.

areolata Kriechb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Stenolonche areolata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 33 n. 1, ♀.
rufipectus Kriechb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Stenolonche rufipectus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 33 n. 3, ♀.
variicolor Kriechb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Stenolonche varicolor Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 33 n. 2, ♀.

HOPLOJOPPA

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 32.
Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 4 n. 15.
ὅπλον, arma; Joppa, nom. propr. Hymen.

parvispina Kriechb. — ♂ — Am.: Brasilia.
Hoplojoppa parvispina Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 32, ♂.

MICROSAGE

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 5 n. 18.
Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 23 n. 18.
μικρός, parvus; *σάγη*, tegmen.

olfersii Kriechb. — ♂ — Am.: Brasilia.
Microsage Olfersi Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 33 n. 2, ♂.
sieberi Kriechb. — ♂ — Am.: Brasilia.
Microsage Sieberi Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 33 n. 1, ♂.

TROGOMORPHA

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 15.
Trogus, nom. propr. Hymen.; *μορφή*, forma.

Synon.: Ichneumon Cresson.

trogiformis (Cress.) Ashm. — ♀ ♂ — Am.: United States.
Ichneumon trogiformis Cresson, Trans. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 175.
Ichneumon trogiformis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. I. 1867 p. 307.
Ichneumon trogiformis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 175 n. 149, ♀ ♂.
Trogomorpha trogiformis Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 15.

ISCHNOJOPPA

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 32.
ἰσχνός, gracilis; Joppa, nom. propr. Hymen.

Synon.: Ichneumon Fabricius & auct. ant.
Joppa Fabricius, Brullé, Kriechbaumer.

luteator (Fabr.) Kriechb. — ♀ ♂ — As.: India; Afr.: Senegal.
Ichneumon luteator Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 222 n. 87-88.
Joppa lutea Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 123 n. 9.
Ichneumon lutea Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284.
Ichneumon adspersor Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 258.
Ichneumon adspersor Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 306.
Ichneumon luteator Trentepol, Isis 1826 p. 221, nota.
Ichneumon luteator Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829 p. 919 n. 64.
Joppa rufa Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 294 n. 48, ♀ ♂.
Joppa lutea Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 153.
Ischnojoppa lutea Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 32.

CAMAROTA

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 4 n. 16.
Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 23 n. 16.
καμαρωτός, fornicatus.

thoracica Kriechb. — ♀ ♂ — Am.: Bogotá.
Camarota thoracica Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 32, ♀ ♂.

CATADELPHUS

Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 133.
κατά, desuper; ἀδελφός, frater.

Synon.: Ichneumon Fabricius & auct.

anceyi Berth. — ♂ — Afr.: Algeria.
Catadelphus Anceyi Berthoumieu, Revue sc. Bourbonnais VII. 1894 p. 181, ♂.
Catadelphus Anceyi Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 294 n. 2, ♂.
arrogator (Fabr.) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Germania, Italia, Hungaria.
Ichneumon LVII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768; T. 111 F. 1.
Ichneumon arrogator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 429 n. 54.
Ichneumon arrogator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 265 n. 66.
Ichneumon spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 61 n. 197.
Ichneumon arrogator Villers, C. Linnei Entom. III. 1789 p. 175 n. 120.
Ichneumon arrogator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2689 n. 135.
Ichneumon melanopterus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2698 n. 266.
Ichneumon arrogator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 43 n. 762.
Ichneumon arrogator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 183 n. 100.
Ichneumon arrogator Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 159 n. 107.
Ichneumon arrogator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 66 n. 65.
Ichneumon arrogator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 65 n. 762.
Ichneumon arrogator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 284.
Ichneumon arrogator Gravenhorst, Mem. accad. sc. Torino XXIV. 1820 p. 347 n. 88, ♂.

---

[1]) *Lep.:* Pterogon proserpina (Mocsáry).

Ichneumon arrogator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 269.
Ichneumon arrogator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 333.
Ichneumon arrogator Trentepol, Isis 1826 p. 222 n. 38.
Ichneumon arrogator Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 536 n. 222, ♂. [n. 1, ♂.
Catadelphus arrogator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe. 1854 p. 134 (Ambl. p. 60)
Catadelphus arrogator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique (2) II. 1857 p. 403 (Ot. p. 52) n. 1, ♀.
Catadelphus arrogator Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 51, ♀ ♂.
Catadelphus arrogator Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXVI. 1870 p. 460, ♀ ♂.
Catadelphus arrogator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 293 n. 1, ♀ ♂.

nigrocyaneus Tosqu. — ♀ — Afr.: Scioa.
Catadelphus nigrocyaneus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 103, ♀.

COELICHNEUMON

Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1901.
κοῖλος, cavus; Ichneumon, nom. propr. Hymen.
Vide genus Ichneumon.

PROTICHNEUMON

Thomson, Opusc. entom. P. 18. 1893 p. 1899.
πρῶτος, primus; Ichneumon, nom. propr. Hymen.
Vide genus Ichneumon.

AUTOMALUS

Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 111 & 144.
αὐτός, ipse; *ὁμαλός*, planus.

Synon.: Goedartia Boie, Naturh. Tidsskr. III. 1841 p. 318.
Goedart, nom. propr.
Ichneumon Ratzeburg.
Trogus Gravenhorst & auct.

alboguttatus (Grav.) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Trogus alboguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 695.
Trogus alboguttatus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 373 n. 1, ♀ ♂.
Trogus alboguttatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 269 n. 1.
Trogus alboguttatus Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 58.
Trogus alboguttatus Boie, Naturh. Tidsskr. III. 1841 p. 317 n. 4, ♀ ♂.
? Trogus (Goedartia) affinis Boie, Naturh. Tidsskr. III. 1841 p. 318 n. 5, ♀.
Goedartia alboguttatus Boie, Naturh. Tidsskr. III. 1841 p. 318.
Trogus alboguttatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 131 n. 3, ♀ ♂.
Ichneumon balticus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 135 n. 14, ♀ ♂.
Automalus alboguttatus Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) [p. 144 n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon balticus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. II. 1848 p. 134 n. 18.
Ichneumon balticus Boie, Stettin. entom. Zeitg. IX. 1848 p. 339 n. 2.
Ichneumon balticus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 169 n. 23. [♀ ♂.
Automalus albguttatus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 136 (Ambl. p. 62) n. 1,

---

[1]) *Lep.:* Dasychira pudibunda (Ratzeburg, Giraud, Boie, Bridgman), Thyatira batis, Liparis auriflua (Vollenhoven), Bombyx monacha (Ratzeburg).

Trogus albovittatus Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 91 n. 15.
Automalus alboguttatus Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 21, ♀ ♂.
Automalus alboguttatus Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 52, ♀ ♂.
Ichneumon alboguttatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXVII. 1866 p. 230 n. 3, ♀.
Automalus alboguttatus Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 286 n. 1, ♀ ♂.
Automalus alboguttatus Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 298 n. 379, ♀ ♂.
Automalus alboguttatus Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 131.
Automalus alboguttatus Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 121 n. 1, ♀ ♂.
Amblyteles dimidiativentris Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 85 n. 4, ♀.
Automalus alboguttatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 294, ♀ ♂.
Automalus alboguttatus Deprez, Ann. soc. entom. Belgique XL. 1896 p. 507, ♂.

TROGUS

Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 80.
τρώγω, rodo.

Synon.: Ichneumon Fourcroy & auct.
Joppa Cresson, Smith.

apicalis Cress. — ♀ — Am.: Georgia.
Trogus apicalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 197 n. 11, ♀.
apicatus Davis — ♀ — Am.: New Hampshire.
Trogus apicatus Davis, Trans. Amer. Entom. Soc. XXIV. 1898 p. 352, ♀.
arrogans Smith — ♀ — As.: Japonia.
Trogus arrogans Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 393 n. 1, ♀.
atrocaeruleus Cress. — ♀ — Am.: Louisiana.
Trogus atrocoeruleus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 92, ♀.
Trogus atrocoeruleus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 196 n. 6, ♀.
atrox Cress. — ♀ — Am.: Dakota.
Trogus atrox Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 93, ♀.
Trogus atrox Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 197 n. 10, ♀.
austrinus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Florida, Georgia.
Trogus austrinus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 92, ♀ ♂.
Trogus austrinus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 197 n. 12, ♀ ♂.
bicolor Rad. — As.: Korea.
Trogus bicolor Radoszkowsky, Horae soc. entom. Ross. XXI. 1887 p. 434.
bolteri Cress. — ♂ — Am.: Lake Superior.
Trogus Bolteri Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 95, ♂.
Trogus Bolteri Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 198 n. 16, ♂.
brullaei Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Trogus Brullaei Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 196 n. 8, ♀ ♂.
Trogus Brullei Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 34 n. 3, ♀.
Trogus Brullei Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 303 n. 3, ♀.
bruneipennis Smith — As.: Celebes.
Trogus brunneipennis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 59 n. 4.
buccatus Cress. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Trogus buccatus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 199 n. 21, ♀.
Trogus buccatus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 356, ♀.
canadensis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada.
Trogus Copei Cresson, Natural. Canad. VI. 1873 p. 335, ♀ ♂ [nec 1868].
Trogus Canadensis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 198 n. 18, ♀ ♂.

Trogus Canadensis Provancher, Natural. Canad. XII. 1879 p. 35 n. 5, ♀ ♂.
Trogus Canadensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 303 n. 5, ♀ ♂.
copei Cress. — ♂ — Am.: Canada, Virginia.
Trogus Copei Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 94, ♂.
Trogus Copei Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 198 n. 17, ♂.
Trogus Copei Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 329 n. 6, ♂.
Trogus Copei Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 768 n. 6, ♂.
edwardsii Cress. — ♂ — Am.: Vancouvers Island.
Trogus Edwardsii Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 195 n. 2, ♂.
Trogus Edwardsii Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1878 p. 356, ♂.
elegans Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Trogus elegans Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 94, ♀.
Trogus elegans Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 199 n. 22, ♀.
exaltatorius (Panz.) Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Britannia, Suecia, Germania, Belgia.
Ichneumon LCI Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. III. 1779; T. 242 F. 2.
Ichneumon exaltatorius Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 199.
Ichneumon lutorius var. 5 Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 378, ♀ ♂. [♀♂.
Trogus exaltatorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Belgique XVIII. 1844 (Tent.) p. 143 n. 2,
Trogus exaltatorius Holmgren, Svensk. Vet.-Akad. Handl. LXXV. 1854 p. 42 n. 1, ♀ ♂.
Trogus exaltatorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 135 (Ambl. p. 61) n. 2,
Trogus exaltatorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 285 n. 2, ♀. [♀♂.
Trogus exaltatorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 129.
Trogus exaltatorius Thomson, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 p. 121 n. 1.
Trogus exaltatorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 296 n. 2, ♀ ♂.
excellens Cam. — ♂ — Am.: Guatemala. [Tischbein].
Trogus excellens Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 190 n. 2, ♂ [non
fascipennis Cress. — ♀ — Am.: Texas.
Trogus fascipennis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 195 n. 3, ♀.
flavipennis Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Trogus flavipennis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 287 n. 1.
Trogus flavipennis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 196 n. 4, ♂.
fletcheri Harrgt. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Trogus Fletcheri Harrington, Canad. Entomol. XXVI. 1894 p. 245, ♀.
fulvipes Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Maine, New Hampshire.
Trogus fulvipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 39, ♂.
Trogus obsidianator Provancher, Natural. Canad. VI. 1873 p. 335, ♂.
Trogus fulvipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 195 n. 1, ♀ ♂.
Trogus fulvipes Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 13 n. 1, ♂.
Trogus fulvipes Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 302 n. 2, ♂.
latipennis Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Trogus latipennis Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 131 n. 1, ♀.
lutorius (Fabr.) Grav.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 330 n. 20.
Ichneumon VIII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1. 1766; T. 20 F. 6.
Ichneumon XCIV Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. III. 1779; T. 245 F. 5 & 6.
Ichneumon cirrogaster Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 348 n. 703, ♂.

---

1) *Lep.:* Sphinx ligustri (Giraud, Mocsáry, Bignell), Smerinthus ocellatus (Mocsáry etc.).
2) *Lep.:* Sphinx ligustri (Sichel), Sph. pinastri (Ratzeburg), Acherontia atropos (Curtis), Smerinthus ocellatus (Bignell), Sm. tiliae, Sm. populi, Papilio hospiton (Giraud), Deilephila lineata (Mocsáry), Macroglossa stellatarum (Rondani).

Ichneumon crocatus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 399 n. 20, ♀ ♂.
Ichneumon lutorius Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 262 n. 34, ♀ ♂.
Ichneumon pisorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 138 n. 12 [p. p.].
Ichneumon lutorius Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 152 n. 53.
Ichneumon cirrogaster Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 153 n. 55.
Ichneumon lutorius Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2682 n. 100.
Ichneumon cirrhogaster Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2683 n. 107.
Ichneumon pisorius Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 345 [p. p.].
Ichneumon lutorius Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 174 n. 49.
Ichneumon scutellaris Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 198 n. 169.
Ichneumon lutorius Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 147 n. 57.
Ichneumon fusorius Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 276 n. 2075, ♂.
Ichneumon cirrogaster, Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 281 n. 2084, ♂.
Ichneumon scutellaris Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 63 n. 71.
Ichneumon lutorius Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 64 n. 50.
Ichneumon pisorius Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 28 n. 6.
Ichneumon imperatorius Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 201.
Ichneumon obscuratorius Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 255 n. 3728.
Ichneumon lutorius Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 112, ♂.
Trogus lutorius Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 286.
Ichneumon lutorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 252.
Ichneumon lutorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 285.
Ichneumon lutorius Trentepol, Isis 1826 p. 234 n. 52.
Ichneumon lutorius Germar, Faun. Insect. Europ. P. 14 1828; Tab. 20.
Trogus lutorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 374 n. 2, ♀ ♂.
Trogus lutorius Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 270 n. 2.
Trogus lutorius Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 310 n. 1.
Trogus lutorius Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. I. 1844 p. 130 n. 1, ♀ ♂.
Trogus lutorius Wesmael, Nouv. mém. acad. sc. Bruxelles XVIII. 1844 (Tent.) p. 143 n. 1, ♀ ♂.
Trogus lutorius Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 237 n. 1, ♀ ♂.
Trogus lutorius Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe 1854 p. 134 (Ambl. p. 60) n. 1, ♀ ♂.
Ichneumon lutorius Boie, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 91 n. 15.
Trogus lutorius Brischke, Schrift. phys. ökon. Ges. Königsberg II. 1861 p. 21, ♀ ♂.
Trogus lutorius Holmgren, Ichneum. Suec. II. 1871 p. 285 n. 1, ♀ ♂.
Trogus lutorius Bignell, Entomologist XI. 1878 p. 274.
Trogus lutorius Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 129 n. 1, ♀ ♂.
Trogus excellens Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XLIII. 1882 p. 485 n. 13, ♂.
Trogus lutorius Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 295 n. 1, ♀ ♂.

var. **nigrocaudatus** (Retz.) Berth. — ♀ ♂ — Eur.
—— Degeer, Mém. hist. Insect. II. 1771 p. 848 n. 3; T. 29 F. 9.
—— Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 168 n. 3; T. 29 F. 9.
Ichneumon nigrocaudatus Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 68 n. 268.
Ichneumon nigrocaudatus Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 187 n. 161.
Ichneumon dessinator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 174 n. 50.
Ichneumon Atropos Curtis, Brit. Entom. V. 1828 p. 234 n. 17; T. 234.
Trogus lutorius Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 696.
Trogus atrocaudatus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 271 n. 3.
Trogus Atropos Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 271 n. 4.
Ichneumon Atropos Newport, Proc. Linn. Soc. London II. 1849 p. 54-55.
Ichneumon Atropos Newport, Proc. Linn. Soc. London VI. 1853 p. 213-214.
Ichneumon Atropos Newport, Trans. Linn. Soc. London XXI. P. 2. 1853 p. 85; T. 9-13.

Ichneumon Atropos Curtis, Farm Insects 1861 p. 443.
Trogus lutorius var. Atropos Bridgman & Fitch, Entomologist XIV. 1881 p. 129.
Trogus lutorius var. nigrocaudatus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 296, [♀ ♂.

marginipennis Cress. — ♂ — Am.: Dakota.
Trogus marginipennis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 93, ♂.
Trogus marginipennis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 196 n. 9, ♂.

mellosus Cress. — ♀ ♂ — Am.: New Mexico.
Trogus mellosus Cresson, Rep. geogr. & geol. Explor. & Surv. V. 1875 p. 708 n. 10, ♂.
Trogus mellosus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 198 n. 20, ♀.

nubilipennis Hald. — ♀ ♂ — Am. bor.
Trogus nubilipennis Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia III. 1846 p. 127 n. 9.
Trogus nubilipennis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 197 n. 13, ♀ ♂.

occidentalis Cress. — ♂ — Am.: Dakota.
Trogus occidentalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 93, ♂.
Trogus occidentalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 197 n. 14, ♂.

ornaticornis Cam. — ♂ — Am.: Guatemala. [T. 9 F. 2.
Trogus ornaticornis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 190 n. 3, ♂;

pepsoides Smith — ♀ — As.: China.
Trogus pepsoides Smith, Trans. Entom. Soc. London (2) II. P. 2. 1852 p. 33, ♀.

pulcherrimus Ashm. — ♂ — Am.: California.
Trogus pulcherrimus Ashmead, Proc. Californ. Acad. V. 1895 p. 547 n. 21, ♂.

quebecensis Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Trogus Quebecensis Provancher, Natural. Canad. VI. 1874 p. 335.
Trogus Quebecensis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 197 n. 15, ♀.
Trogus Quebecensis Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 34 n. 4, ♀.
Trogus Quebecensis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 303 n. 4, ♀

rileyi Cress. — ♀ — Am.: Illinois.
Trogus Rileyi Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 95, ♀.
Trogus Rileyi Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 198 n. 19, ♀.

thoracicus Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Trogus thoracicus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 18, ♂.

TRICYPHUS

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 4 n. 11.
Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 23 n. 11.
τρεῖς, tres; *κυφός*, curvus.

apicalis Kriechb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Tricyphus apicalis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 31 n. 1, ♀.

cuspidiger Kriechb. — ♀ — Am.: New Freiburg.
Tricyphus cuspidiger Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 30 n. 3, ♀

nigriventris Kriechb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Tricyphus nigriventris Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 31 n. 2, ♀.

vulpinus Szépl. — ♀ — Am. bor.
Tricyphus vulpinus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 288 n. 45, ♀.

MEGAJOPPA

Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 289.
μέγας, grandis; Joppa, nom. propr. Hymen.

Synon.: Joppa Brullé.

lineola (Brullé) Szépl. — ♀ — Am.: Brasilia.
Joppa lineola Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 279 n. 17, ♀.
Megajoppa lineola Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 289 n. 48, ♀.

HOLOJOPPA

Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 289.
ὅλος, omnis; Joppa, nom. propr. Hymen.

grandis Szépl. — ♀ — Am.: Bolivia.
Holojoppa grandis Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 289 n. 46, ♀.

CHREUSA

Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 209.
Etymol. obscura.

fulvipes Cam. — ♀ — As.: India.
Chreusa fulvipes Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 210, ♀.
lutea Cam. — ♀ — As.: India.
Chreusa lutea Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 212, ♀.

TETRAGONOCHORA

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 4 n. 10.
Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 23 n. 10.
τετράγωνος, quadrangulus; *χώρα*, spatium.

Synon.: Joppa Brullé, Cresson, Cameron.

annulata (Brullé) Kriechb. — ♀ — Am.: Guyana.
Joppa annulata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 282 n. 22, ♀.
Tetragonochora annulata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 29 n. 6, ♀.
bispina (Brullé) Kriechb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Joppa bispina Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 284 n. 27, ♀.
Tetragonochora bispina Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 28 n. 3, ♀.
brasiliensis Szépl. — ♀ — Am.: Brasilia.
Tetragonochora Brasiliensis Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 288 n. 44, ♀.
discifera Kriechb. — ♀ — Am.: Panama.
Tetragonochora discifera Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 30 n. 14, ♀.
flavonigra Kriechb. — ♂ — Am.: Surinam.
Tetragonochora flavonigra Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 29 n. 9, ♂.
lepida (Brullé) Kriechb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Joppa lepida Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 285 n. 28, ♀.
Tetragonochora lepida Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 28 n. 2, ♀.
maculicornis (Cam.) Kriechb. — ♀ — Am.: Panama.
Joppa maculicornis Cameron, Entom. M. Magaz. XXI. 1884 p. 105.
Joppa maculicornis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 196 n. 12.
Tetragonochora maculicollis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 29 n. 10, ♀.

maurator (Brullé) Kriechb. — ♀ ♂ — Am.: Carolina, Pennsylvania.
Joppa maurator (Bosc.) Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 287 n. 32, ♀ ♂.
Joppa maurator Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1869 p. 91.
Joppa maurator Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 209.
Tetragonochora maurator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 30 n. 12, ♀ ♂.
melanopyga (Brullé) Kriechb. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Joppa melanopyga Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 282 n. 23, ♀.
Tetragonochora melanopyga Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 29 n. 7, ♀ ♂.
metzii Kriechb. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Tetragonochora Metzi Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 29 n. 8, ♀ ♂.
polychroa (Brullé) Kriechb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Joppa polychroa Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 283 n. 25, ♀.
Tetragonochora polychroa Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 28 n. 1, ♀.
rufiventris (Brullé) Kriechb. — ♀ — Am.: Guyana.
Joppa rufiventris Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 283 n. 24, ♀.
Tetragonochora rufiventris Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 28 n. 4, ♀.
scutellata (Brullé) Kriechb. — ♀ ♂ — Am. mer.
Joppa scutellata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 285 n. 29, ♀ ♂.
Tetragonochora scutellata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 30 n. 13, ♀ ♂.
viridis (Brullé) Kriechb. — ♀ — Am.: Uruguay.
Joppa viridis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1864 p. 286 n. 30, ♀.
Tetragonochora viridis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 30 n. 11, ♀.
xanthogaster (Brullé) Kriechb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Joppa xanthogaster Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 284 n. 26, ♀.
Tetragonochora xanthogaster Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 29 n. 5, ♀.

PSILOMASTAX

Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXIX. 1868 p. 255.
ψιλός, calvus; μάσταξ, os.

Synon.: Dinotomus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 188 n. 2.
δῖνος, turbo; τόμος, tomus.
Ichneumon Schaeffer & auct. ant.
Trochus Trentepol [err. typogr.].
Trogus Panzer & auct. ant.

albescens Kriechb.[1] — ♀ — As.: Assam.
Psilomastax albescens Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 27 n. 10, ♂.
caeruleator (Fabr.) Kriechb.[2] — ♀ ♂ — Eur.
Ichneumon XXIII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1766 T. 50 F. 5.
Ichneumon coerulator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 68 n. 79, ♂.
Ichneumon coeruleator Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 134, ♂.
Ichneumon coeruleator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 80, ♂.
Ichneumon coeruleator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♀.
Ichneumon (Trogus) coerulator Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 8.
Trogus coeruleator Panzer, Fauna Insect. German. IX. 1809 P. 100 T. 13.
Ichneumon coerulator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 272.
Ichneumon coerulator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 341.
Ichneumon coerulator Trentepol, Isis 1826 p. 297 n. 63.

---

1) = ? Ps. orientalis Kriechbaumer ♂.
2) *Lep.:* Papilio machaon (Buysson, Boie, Mocsáry).

Trogus lapidator Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 391 n. 8.
Trogus lapidator Trentepol, Isis 1829 p. 815 n. 64, ♀.
Trogus coeruleator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 239 n. 3.
Psilomastax lapidator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe. 1854 p. 175 (Ambl. p. 61) [n. 3, ♂.
Psilomastax pyramidalis Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXIX. 1868 p. 255 n. 11, ♂ [non ♀, [nec var.].
Psilomastax lapidator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 296 n. 378, ♀ ♂.
Psilomastax lapidator Kriechbaumer, Stettin. entom. Zeitg. XXXVI. 1875 p. 39.
Psilomastax lapidator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XIII. 1882 p. 173-177.
Dinotomus lapidator Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 296 n. 1, ♀ ♂.
Psilomastax coerulator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 27 n. 6, ♀ ♂.

lapidator (Fabr.) Tischb.[1] — ♀ ♂ — Eur. centr. & merid.; Afr. bor.
? Ichneumon XXIII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1. 1766; T. 50 F. 5.
Ichneumon LXX Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768; T. 135 F. 3.
Ichneumon lapidator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 266 n. 79, ♂.
Ichneumon lapidator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2691 n. 144, ♂.
Ichneumon lapidator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 187 n. 117, ♂.
Ichneumon lapidator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 164 n. 128, ♂.
Ichneumon lapidator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 67 n. 69, ♂.
? Ichneumon coerulator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 68 n. 79, ♂.
? Ichneumon coeruleator Panzer, System. Nomencl. 1804 p. 134, ♂.
? Trogus coeruleator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 80, ♂.
Banchus venator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2 II. 1807 p. 67 n. 767 [non Fabricius].
Ichneumon lapidator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♀ ♂.
Ichneumon coeruleator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 106, ♀.
Joppa venator Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 191.
Ichneumon (Trogus) coerulator Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 8.
Trogus coeruleator Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 P. 100 T. 13.
Trogus coeruleator Gravenhorst, Nov. acta acad. nat. curios. IX. 1818 p. 286.
Ichneumon saxator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 272.
? Ichneumon coeruleator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 272.
Ichneumon saxator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 341.
? Ichneumon coeruleator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg XI. 1824 p. 341.
Trochus coeruleator Trentepol, Isis 1826 p. 297 n. 63.
Ichneumon lapidator Germar, Fauna Insect. Europ. P. 14 1828; T. 17.
Trogus fuscipennis Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 389 n. 7, ♀ ♂.
Trogus lapidator Trentepol, Isis 1829 p. 815 n. 64, ♀.
Trogus lapidator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 239 n. 2.
Trogus coeruleator Fonscolombe, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 p. 239 n. 3.
Trogus lapidator Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique. Annexe. 1854 p. 135 (Ambl. p. 61) n. 3, ♂.
Psilomastix pyramidalis Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXIX. 1868 p. 255 n. 11, ♂ [non ♀ [& var.].
Psilomastax lapidator Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 296 n. 378, ♀ ♂.
Psilomastax lapidator Kriechbaumer, Stettin. entom. Zeitg. XXXVI. 1875 p. 39.
Trogus (Psilomastax) fuscipennis Kriechbaumer, Stettin. entom. Zeitg. XXXVI. 1875 p. 40 n. 2.
Psilomastax lapidator Kriechbaumer, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 173-177. [p. 297, ♀.
Dinotomus lapidator var. fuscipennis Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896
Psilomastax lapidator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 27 n. 5, ♀ ♂.

---

[1]) *Lep.:* Papilio machaon (Buysson, Boie, Mocsáry) Argynnis pandora (Mocsáry).

obsidianator (Brullé) Kriechb.[1] — ♀ ♂ — Am.: Carolina, Pennsylvania.
Trogus obsidianator (Bosc.) Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 299 n. 2, ♀.
Trogus obsidianator Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 196 n. 7, ♀ ♂.
Trogus obsidianator Howard, Scudder: Butterflies U. S. 1889 p. 1879, ♀ ♂.
Psilomastax obsidianator Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 26 n. 3, ♀.

orientalis Kriechb.[2] — ♀ — As.: Assam.
Psilomastax orientalis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 27 n. 9, ♀.

pictus Kriechb.[3] — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Psilomastax pyramidalis Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXIX. 1868 p. 255 n. 11, ♀ [false ♂].
Psilomastax pyramidalis var. 2-5 Tischbein, Stettin. entom. Zeitg. XXXV. 1874 p. 296 [n. 378, ♀ ♂.
Psilomastax pictus Kriechbaumer, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 173-177, ♀ ♂.
Dinotomus pictus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 297 n. 3, ♀ ♂.
Psilomastax pictus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 27 n. 4, ♀ ♂.

pompeji Kriechb.[4] — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Psilomastax Pompeji Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 26 n. 1, ♀ ♂.

violaceus Mocs.[5] — ♀ ♂ — Eur.: Sardinia.
Psilomastax violaceus Mocsáry, Magy. Akad. Termész. Értek. XIII. P. 11. 1883 p. 10 n. 12, ♂.
Ichneumon Gastaldi A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli XXIV. 1885 p. 323.
Trogus cyaneipennis A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli XXIV. 1885 p. 323.
Trogus cyaneipennis A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli (2) II. 7. 1886 p. 14.
Trogus violaceus Rudow, Entom. Nachr. XIV. 1888 p. 84 n. 1, ♀.
Trogus cyaneipennis A. Costa, Bull. soc. entom. Ital. XXII. 1890 p. 113.
Psilomastax cyaneus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 101, ♀ ♂.
Psilomastax violaceus Mocsáry, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 208.
Dinotomus violaceus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 297 n. 2, ♀ ♂.
Psilomastax cyaneus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 26 n. 2, ♀ ♂.

vulpinus (Grav.) Kriechb.[6] — ♀ ♂ — Am. bor.
Trogus vulpinus Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829 p. 389 n. 6, ♀ ♂.
Trogus exesorius (Serveille) Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 298 n. 1, ♀ ♂; T. 43 F. 2.
Trogus (Psilomastax) vulpinus Kriechbaumer, Stettin. entom. Zeitg. XXXVI. 1875 p. 39 n. 1.
Trogus exesorius Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VI. 1877 p. 196 n. 5, ♀ ♂.
Trogus exesorius Provancher, Natural. Canad. XI. 1879 p. 34 n. 2, ♀ ♂.
Trogus exesorius Packard, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XXI. 1881 p. 21, ♀ ♂.
Trogus exesorius Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 303 n. 2, ♀ ♂.
Trogus exesorius Mundt, Canad. Entomol. XV. 1883 p. 89.
Trogus exesorius Clarkson, Canad. Entomol. XV. 1883 p. 162.
Trogus exesorius Howard, Scudder: Butterflies U. S. 1889 p. 1878, ♀ ♂; T. 88 F. 3.
Trogus vulpinus Berthoumieu, Ann. soc. entom. France LXV. 1896 p. 296.
Psilomastax vulpinus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXV. 1898 p. 27 n. 7, ♀ ♂.

xuthi Kriechb.[7] — ♀ ♂ — As.: Amur.
Psilomastax xuthi Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 27 n. 8, ♀ ♂.

---

1) *Lep.:* Pyrrharctia isabella (Weed), Papilio asterias (Riley), P. polyxenes (Howard).
2) = ? Ps. orientalis Kriechbaumer ♂.
3) *Lep.:* Apatura iris (Kriechbaumer).
4) *Lep.:* Ornithoptera pompejus (Kriechbaumer).
5) *Lep.:* Papilio hospiton (Mocsáry).
6) *Lep.:* Vanessa cardui, Jasoniades glaucus, Papilio polyxenes (Howard), P. ajax, P. marcellus, P. asterias, P. troilus, P. turnus (Riley).
7) *Lep.:* Papilio xuthus (Kriechbaumer).

TOSQUINETIA

Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 368.
Tosquinet, nom. propr.

Synon.: Obba Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 105 [nec Beck 1837].
Etymol. obscura.

caelata Tosq. — ♀ — Afr.: Senegambia.
Obba caelatus Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 106, ♀.

PEDINOPELTA

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 4 n. 8.
Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 22 n. 8.
πεδῖνος, in planitie vivens; *πέλτη*, pelta.

Synon.: Ichneumon Guérin.
Joppa Brullé.

gravenhorstii (Guér.) Kriechb. — ♀ ♂ — Am.: Surinam, Brasilia.
Ichneumon Gravenhorstii Guérin, Duperry: Voy. Coquille. Zool. II. 2. 1830 p. 197; T. 8 F. 6.
Joppa Gravenhorstii Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 277 n. 14, ♂.
Pedinopelta Gravenhorstii Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 26, ♀ ♂.

maculipennis Szépl. — ♀ — Am.: Bolivia.
Pedinopelta maculipennis Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 287 n. 40, ♀.

mocsaryi Szépl. — ♂ — Am.: Brasilia.
Pedinopelta Mocsáryi Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 287 n. 41, ♂.

orientalis Szépl. — ♀ — As.: Celebes.
Pedinopelta orientalis Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 288 n. 42, ♀.

ISCHNOPUS

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 3 n. 7.
Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 22 n. 7.
ἰσχνός, gracilis; *πούς*, pes.

bifasciatus Szépl. — ♂ — Am.: Brasilia.
Ischnopus bifasciatus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 286 n. 37, ♂.

longiceps Kriechb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Ischnopus longiceps Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 25 n. 1 (♀ ?).

melanurus Kriechb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Ischnopus melanurus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 26 n. 4, ♀.

olfersii Kriechb. — ♂ — Am.: Brasilia.
Ischnopus Olfersii Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 25 n. 2, ♂.
Ischnopus Olfersii Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 286 n. 36, ♀.

rufus Szépl. — ♀ — Am.: Brasilia (?).
Ischnopus rufus Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 287 n. 39, ♀.

scutellaris Szépl. — ♀ — Am.: Honduras.
Ischnopus scutellaris Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 286 n. 38, ♀.

taeniopterus Kriechb. — ♀ ♂ — Am.: Columbia, Brasilia.
Ischnopus taeniopterus Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 26 n. 35, ♀ ♂.

ROTHNEYIA

Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 19.
G. A. J. Rothney, nom. propr.

annulicornis Cam. — ♀ — As.: India.
Rothneyia annulicornis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 207, ♀.
wroughtonii Cam. — ♀ — As.: Mussoori. [F. 3.
Rothneyia Wroughtoni Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLI. 1897 P. 4. p. 19, ♀; T. 3

ABZARIA

Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 200.
Etymol. obscura.

latipetiolaris Cam. — Am.: Mexico.
Abzaria latipetiolaris Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 40. 1885 Hymen. I. p. 201; T. 9 F. 3.

HENICOPHATNUS

Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIX. 1894 p. 301.
ἑνικός, singularis; φάτνη, praesepe.

rufithorax Kriechb. — ♀ — Afr.: Tanga.
Henicophatnus rufithorax Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XIX. 1894 p. 301 n. 6, ♀.

ORTEZIA

Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 130.
Ortez, nom. propr.

Synon.: Ichneumon Cresson.
Joppa Cresson.

aciculata Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Joppa ? aciculata Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 30 n. 4, ♀ ♂.
Ichneumon (Ortezia) aciculata Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 130 n. 2, ♀ ♂.
egregia Cress. — ♀ — Am.: Mexico.
Joppa ? egregia Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 30 n. 3, ♀.
Ichneumon (Ortezia) egregia Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 130 n. 1, ♀.

POECILOJOPPA

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 3 n. 6.
Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 22 n. 6.
ποικίλος, varius; Joppa, nom. propr. Hymen.

annulicornis Szépl. — ♀ — Am.: Venezuela.
Poecilojoppa annulicornis Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 285 n. 34, ♀.
concolor Szépl. — ♀ — Am.: Bolivia.
Poecilojoppa concolor Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 286 n. 35, ♀.
histrio Kriechb. — ♀ — Am.: Columbia.
Poecilojoppa histrio Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 25, ♀.
Poecilojoppa histrio Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 163, ♀.

LINDIGIA

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 3 n. 5.
Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 22 n. 5.
Lindig, nom. propr.

varia Kriechb. — ♀ ♂ — Am.: Columbia.
Lindigia varia Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 25, ♀ ♂.
Lindigia varia Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 160, ♀ ♂.

ILEANTA

Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 204.
Etymol. obscura.

latitarsis Cam. — ♀ — As.: India.
Ileanta latitarsis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 205, ♀.

CONOPYGE

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 3 n. 4.
Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 22 n. 4.
κῶνος, conus; *πυγή*, pygidium.

Synon.: Ichneumon Cresson.
Joppa Brullé.

analis Kriechb. — ♀ ♂ — Am. centr.
? Joppa conica Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 286 n. 31, ♀.
? Ichneumon breviventris Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 12, ♂.
? Joppa conica Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 29 n. 1, ♀ ♂.
? Ichneumon conicus Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 110 n. 1, ♀ ♂.
? Ichneumon conicus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 187 n. 150, ♀ ♂; T. 8 [F. 22.
Conopyge analis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 25 n. 2, ♂.
Conopyge analis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 157 n. 2, ♂.
cinctipes Kriechb. — ♀ ♂ — Am. mer.
Conopyge cinctipes Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 24 n. 1, ♀ ♂.
Conopyge cinctipes Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 156 n. 1, ♀ ♂.
tibialis Kriechb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Conopyge tibialis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 24 n. 3, ♀.
Conopyge tibialis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 159 n. 3, ♀.

MACROJOPPA

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 2 n. 3.
Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 22 n. 3.
μακρός, grandis; Joppa, nom. propr. Hymen.

Synon.: Joppa Brullé, Smith, Cresson.
Trogus Cresson.

amazonica Kriechb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Macrojoppa Amazonica Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 24 n. 15, ♀.
Macrojoppa Amazonica Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 153 n. 15, ♀.
blandita (Cress.) Kriechb. — ♀ ♂ — Am. centr. & mer.
Trogus blandita Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 132 n. 2, ♀ ♂.
Joppa elegantula Smith, Descr. New Spec. Hymen. 1879 p. 233 n. 4, ♀ [nec Cresson].
Trogus elegantula Cameron, Entom. M. Magaz. XXI. 1884 p. 106.

Trogus blandita Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 191 n. 4, ♀♂; T. 9 F. 1.
Macrojoppa blandita Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 22 n. 1, ♀ ♂.
Macrojoppa blandita Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 135 n. 1, ♀♂.

var. **binotata** Kriechb. — ♀ ♂ — Am. centr. & mer.
Macrojoppa blandita var. binotata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 137, ♀♂.

var. **quadrinotata** Kriechb. — ♀ ♂ — Am. centr. & mer.
Macrojoppa blandita var. quadrinotata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 137, ♀♂.

var. **sexnotata** Kriechb. — ♀ ♂ — Am. centr. & mer.
Macrojoppa blandita var. sexnotata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 137, ♀♂.

bogotensis Kriechb. — ♀ ♂ — Am.: Columbia.
Macrojoppa Bogotensis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 23 n. 7, ♀ ♂.
Macrojoppa Bogotensis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 144 n. 7, ♀♂.

concinna (Brullé) Kriechb. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Joppa concinna Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 274 n. 8, ♀.
Macrojoppa concinna Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 23 n. 6, ♀ ♂.
Macrojoppa concinna Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 143 n. 6, ♀♂.

confusa Kriechb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Joppa picta var. Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 273 n. 6, ♀.
Macrojoppa confusa Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 22 n. 4, ♀.
Macrojoppa confusa Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 141 n. 4, ♀.

elegans (Brullé) Kriechb. — ♀ ♂ — Am.: Surinam, Brasilia.
Joppa elegans Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 274 n. 7, ♂.
Macrojoppa elegans Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 22 n. 8, ♀ ♂.
Macrojoppa elegans Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 145 n. 8, ♀ ♂.

fulva Kriechb. — ♂ — Am.: Brasilia.
Macrojoppa fulva Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 29 n. 13, ♂.
Macrojoppa fulva Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 151 n. 13, ♂.

haematogastra Szépl. — ♀ — Am.: Bolivia.
Macrojoppa haematogaster Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 284 n. 30, ♀.

inclyta (Cress.) Kriechb. — ♀ ♂ — Am.: Mexico, Columbia.
Joppa inclyta Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 29 n. 2, ♀.
Trogus inclyta Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 133 n. 3, ♀.
Macrojoppa inclyta Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 22 n. 5, ♂.
Macrojoppa inclyta Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 142 n. 5, ♂.

nigra Szépl. — ♀ — Am.: Chiriqui.
Macrojoppa nigra Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 283 n. 26, ♀.

nigrofasciata Kriechb. — ♀ — Am.: Columbia.
Macrojoppa nigrofasciata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 23 n. 12, ♀.
Macrojoppa nigrofasciata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 150 n. 12, ♀.

nigrosignata Kriechb. — ♀ — Am.: Bolivia.
Macrojoppa nigrosignata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 23 n. 10, ♀.
Macrojoppa nigrosignata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 147 n. 10, ♀.

polysticta Kriechb. — ♂ — Am. mer.
Macrojoppa polysticta Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 22 n. 2, ♂.
Macrojoppa polysticta Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 138 n. 2, ♂.

pulchra Szépl. — ♀ — Am.: Brasilia.
Macrojoppa pulchra Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 285 n. 31, ♀.

rufa (Brullé) Kriechb. — ♂ — Am.: Brasilia.
Joppa rufa Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 275 n. 9, ♂.
Macrojoppa? rufa Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 22 n. 8 nota, ♂.
Nacrojoppa? rufa Kriechbaumer, Berlin. entom. Nachr. XLIII. 1898 p. 154, ♂.

rufa Szépl. — ♀ — Am.: Bolivia.
Macrojoppa rufa Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 284 n. 29, ♀.
similis Szépl. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Macrojoppa similis Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 285 n. 33, ♀ ♂.
stapedifera Kriechb. — ♀ — Am.: Bolivia.
Macrojoppa stapedifera Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 23 n. 11, ♀.
Macrojoppa stapedifera Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 148 n. 11, ♀.
surinamensis Kriechb. — ♂ — Am.: Surinam.
Macrojoppa Surinamensis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 22 n. 3, ♂.
Macrojoppa Surinamensis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 139 n. 3, ♂.
taschenbergii Kriechb. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Macrojoppa Taschenbergii Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 23 n. 9, ♀ ♂.
Macrojoppa Taschenbergii Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 146 n. 9, ♀ ♂.
Macrojoppa Taschenbergii Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 284 n. 28, ♀.
trifasciata Kriechb. — ♀ — Brasilia.
Macrojoppa trifasciata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 24 n. 14, ♀.
Macrojoppa trifasciata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 152 n. 14, ♀.

CRYPTOPYGE

Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 22 n. 2.
Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 22 n. 2.
κρυπτός, absconditus; *πυγή*, pygidium.

Synon.: Joppa Duncan, Guérin, Brullé, Smith.
Trogus Cameron.

obtusa Kriechb. — ♀ — Am. mer.
Cryptogype obtusa Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 21 n. 2, ♀.
Cryptopyge obtusa Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 128 n. 2, ♀.
picta (Guér.) Kriechb. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
? Joppa picta Duncan, Introd. Entom. I. 1840 p. 314; T. 31 F. 3.
Joppa picta Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 409; T. 65 F. 7.
Joppa picta Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 273 n. 6, ♀ [excl. var.].
Joppa picta Guérin, Duperry: Voy. Coquille. Zool. II. 2. 1850 p. 198.
Cryptopyge picta Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 21 n. 1, ♀ ♂.
Cryptopyge picta Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 128 n. 1, ♀ ♂.
pulchripennis (Smith) Kriechb. — ♀ ♂ — Am.: Costa Rica, Panama, Columbia.
Joppa pulchripennis Smith, Descr. New Spec. Hymen. 1879 p. 232 n. 3, ♀.
Trogus pulchripennis Cameron, Entom. M. Magaz. XXI. 1884 p. 105 & 106.
Trogus pulchripennis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 191 n. 6; T. 8 F. 25.
Cryptopyge pulchripennis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 21 n. 3, ♀ ♂.
Cryptopyge pulchripennis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 125 n. 3, ♀ ♂.
testacea Szépl. — ♀ — As.: India.
Cryptopyge testacea Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 283 n. 25, ♀.
variegata Szépl. — ♀ — Am.: Bolivia.
Cryptopyge variegata Szépligeti, Termész. Füzet. 1900 p. 283 n. 23, ♀.

EUJOPPA

Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 282.
εὖ, bene; Joppa, nom. propr. Hymen.

kriechbaumeri Szépl. — ♀ — Am.: Brasilia.
Eujoppa Kriechbaumeri Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 282, ♀.

JOPPA

Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 120 n. 15.
Joppa, nom. propr. Hymen.

Synon.: Microjoppa Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 2 n. 1.
Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 21 n. 1.
μικρός, parvus; Joppa, nom. propr. Hymen.

Ichneumon Fabricius, Gmelin, Olivier, Thunberg.

acutipennis Brullé — ♂ — Am.: Brasilia.
Joppa acutipennis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 288 n. 35, ♂.
albipes (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa albipes Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 18 n. 64, ♀ ♂.
Microjoppa albipes Kriechbaumer, Berlin. entom Zeitschr. XLIII. 1898 p. 107 n. 64, ♀♂.
Joppa albipes m.
alternans Brullé — ♂ — Am.: Mexico.
Joppa alternans Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 278 n. 16, ♂.
annulipes Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Joppa annulipes Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 292 n. 43, ♀.
antennator Fabr. — ♀ ♂ — Am.: Guyana, Brasilia, Bolivia, Columbia.
Ichneumon antennator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 265 n. 64.
Ichneumon antennator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2689 n. 133.
Ichneumon antennator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 183 n. 98.
Ichneumon antennator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 158 n. 103.
Joppa antennata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 122 n. 6.
Ichneumon cornutus Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 261.
Ichneumon cornutus Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 312.
Joppa antennata Duncan, Introd. Entom. I. 1840 p. ?; T. 26 F. 24.
Joppa antennata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 270 n. 1, ♀♂; T. 43 F. 1.
Ichneumon (Joppa) antennata Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3ª Insect. II. 1849; [T. 111 F. 5.
Joppa antennata Desmarest, Chenu: Encycl. hist. nat. Annelles 1860, ♀; T. 12 F. 7.
Microjoppa antennata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 8 n. 12, ♀ ♂.
Microjoppa antennata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 53 n. 12, ♀♂.
Microjoppa antennata Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 278 n. 4.
armata Brullé — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Joppa armata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 290 n. 39, ♀ ♂.
atrata Fabr.! — Am. mer.
Joppa atrata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 123 n. 7.
Ichneumon despector Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 273.
Ichneumon despector Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 342.
atropos (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa Atropos Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 13 n. 38, ♀.
Microjoppa Atropos Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 78, ♀.
Joppa Atropos m.
aurata Fabr.! — Am. mer.
Joppa aurata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 121 n. 3.
Ichneumon aurator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 275.
Ichneumon aurator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 349.
aureomarginata (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: Bolivia.
Microjoppa aureomarginata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 15 n. 50, ♂.

Microjoppa aureomarginata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 91 n. 50, ♂.
Joppa aureomarginata m.

auripennis Brullé — ♀ — Am.: Guyana.
Joppa auripennis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 271 n. 3, ♀.

aurita (Kriechb.) D. T. — Am.: Surinam.
Microjoppa aurita Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 19 n. 74 nota.
Microjoppa aurita Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitg. XLIII. 1898 p. 38 n. 73 nota.
Joppa aurita m.

auronitens (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa auronitens Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 20 n. 76, ♀.
Microjoppa auronitens Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 119 n. 76, ♀.
Joppa auronitens m.

australensis Brullé — ♂ — Austr.
Joppa Australensis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 281 n. 20, ♂.

basinotata (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa basinotata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 14 n. 45, ♀.
Microjoppa basinotata Kriechbaumer, Berlin. entom. Nachr. XLIII. 1898 p. 86 n. 45, ♀.
Joppa basinotata m.

beskei (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa Beskei Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 11 n. 25, ♀.
Microjoppa Beskei Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 65 n. 25, ♀.
Joppa Beskei m.

bicolor (Szépl.) D. T. — ♂ — Am.: Chiriqui.
Microjoppa bicolor Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 277 n. 1, ♂.
Joppa bicolor m.

bilimekii (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Mexico.
Microjoppa Bilimekii Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 11 n. 24, ♀.
Microjoppa Bilimekii Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 65 n. 24, ♀.
Joppa Bilimekii m.

bimaculata Spin. — ♀ — Am.: Brasilia.
Joppa bimaculata Spinola, Mem. accad. sc. Torino (2) XIII. 1851 p. 37 n. 17, ♀.

binotulata (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa binotulata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 14 n. 47, ♂.
Microjoppa binotulata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 88 n. 47, ♂.
Joppa binotulata m.

biplagiata (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Mexico.
Microjoppa biplagiata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 13 n. 36, ♀.
Microjoppa biplagiata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 76 n. 36, ♀.
Joppa biplagiata m.

bisignata (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Mexico, Brasilia.
Microjoppa bisignata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 13 n. 39, ♀ ♂.
Microjoppa bisignata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 79 n. 39, ♀ ♂.
Joppa bisignata m.

boliviensis (Szépl.) D. T. — ♀ — Am.: Bolivia.
Microjoppa Boliviensis Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 280 n. 12, ♀.
Joppa Boliviensis m.

brasiliensis (Szépl.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa Brasiliensis Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 279 n. 9, ♀.
Joppa Brasiliensis m.

braunsii (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa Braunsii Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 8 n. 6, ♀.

Microjoppa Braunsii Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 46 n. 6, ♀.
Joppa Braunsii m.

brunnii (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa Brunnii Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 18 n. 63, ♀ ♂.
Microjoppa Brunnii Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 106 n. 63, ♀ ♂.
Joppa Brunnii m.

burmeisteri (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa Burmeisteri Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 8 n. 7, ♀.
Microjoppa Burmeisteri Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 47 n. 7, ♀.
Joppa Burmeisteri m.

caerulea Brullé — ♀ — Am. mer.
Joppa coerulea Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 294 n. 47, ♀.

carinifrons (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa carinifrons Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 18 n. 68, ♀.
Microjoppa carinifrons Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 111 n. 68, ♀.
Joppa carinifrons m.

castanea Brullé — ♀ — Am. mer.
Joppa castanea Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 287 n. 33, ♀.

chiriquensis Cam. — Am.: Panama.
Joppa Chiriquensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 199 n. 19.
Microjoppa Chiriquensis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 12 n. 33.
Microjoppa Chiriquensis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 74 n. 33.

cincta Brullé — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Joppa cincta Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 291 n. 40, ♀ ♂.

cinctipes (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa cinctipes Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 13 n. 41, ♀.
Microjoppa cinctipes Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 82 n. 41, ♀.
Joppa cinctipes m.

corrugata Tosqu. — ♂ — Afr.: Togo.
Joppa corrugata Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 99 n. 1, ♂.

cyanea Brullé — ♀ — Am.: Uruguay.
Joppa cyanea Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 277 n. 13, ♀.

cyaneipennis Brullé — ♀ ♂ — Am.: Uruguay.
Joppa cyanipennis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 276 n. 12, ♀ ♂.

decorata Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Joppa decorata Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 32 n. 6, ♂.

didymoneura (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa didymoneura Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 9 n. 15, ♀.
Microjoppa didymoneura Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 56 n. 15, ♀.
Joppa didymoneura m.

dimidiata Brullé — ♂ — Am.: Brasilia.
Joppa dimidiata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 271 n. 2, ♂.

diploneura (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Venezuela.
Microjoppa diploneura Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 9 n. 14, ♀.
Microjoppa diploneura Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 84 n. 14, ♀.
Joppa diploneura m.

discophora (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Columbia.
Microjoppa discophora Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 14 n. 44, ♀.
Microjoppa discophora Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 85 n. 44, ♀.
Joppa discophora m.

dorsalis Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Joppa dorsalis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 293 n. 45, ♀.
dorsata Fabr.! — Am. mer.
Joppa dorsata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 120 n. 1.
Ichneumon dorsatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 280.
Ichneumon dorsatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 363.
Joppa dorsata Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 327.
dorsosignata (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa dorsosignata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 15 n. 9 & p. 16 n. 51, ♀.
Microjoppa dorsosignata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 93 n. 51, ♀.
Joppa dorsosignata m.
dromedarius (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa dromedarius Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 16 n. 57, ♀ ♂.
Microjoppa dromedarius Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 99 n. 57, ♀ ♂.
Joppa dromedarius m.
elegans (Szépl.) D. T. — ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa elegans Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 281, ♂.
Joppa elegans m.
elegantula Cress. — ♂ — Am.: Mexico.
Joppa elegantula Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 32 n. 7, ♂.
Joppa elegantula Cresson, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 194 n. 3, ♂.
Microjoppa elegantula Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 20 n. 78, ♂.
Microjoppa elegantula Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 122 n. 78, ♂.
ephippium Brullé — ♀ — Afr.: Cap.
Joppa ephippium Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 280 n. 19, ♀.
femorata Fabr.! — Am. mer.
Joppa femorata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 121 n. 2.
Ichneumon fulgens Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 263.
Ichneumon fulgens Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 316.
fenestrata (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Bolivia.
Microjoppa fenestrata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 7 n. 3, ♀ ♂.
Microjoppa fenestrata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 43 n. 3, ♀ ♂.
Joppa fenestrata m.
flavipennis Brullé — ♀ — Afr.: Senegal.
Joppa flavipennis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 278 n. 15, ♀.
fuliginosa Brullé — ♀ — Am.: Brasilia ?
Joppa fuliginosa Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 291 n. 41, ♀.
fumibasis (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Surinam.
Microjoppa fumibasis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 11 n. 29, ♀.
Microjoppa fumibasis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 68 n. 29, ♀.
Joppa fumibasis m.
fumipennis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Joppa fumipennis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 32 n. 8, ♀ ♂.
Joppa fumipennis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 195 n. 5; T. 9 F. 11.
Microjoppa fumipennis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 7 n. 5, ♀ ♂.
Microjoppa fumipennis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 45 n. 5, ♀ ♂.
furcifera (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa furcifera Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 17 n. 59, ♀.
Microjoppa furcifera Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 101 n. 59, ♀.
Joppa furcifera m.

furcula (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: Surinam.
Microjoppa furcula Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 17 n. 62, ♂.
Microjoppa furcula Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 105 n. 62, ♂.
Joppa furcula m.

fuscata (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa fuscata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 7 n. 4, ♂.
Microjoppa fuscata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 44 n. 4, ♂.
Joppa fuscata m.

fuscipennis (Szépl.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa fuscipennis Szépligeti, Terméss. Füzet. XXIII. 1900 p. 277 n. 2, ♀.
Joppa fuscipennis m.

geminata (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa geminata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 19 n. 71, ♂.
Microjoppa geminata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 115 n. 71, ♂.
Joppa geminata m.

geniculata Cam. — Am. centr.
Joppa geniculata Cameron, Entom. M. Magaz. XXI. 1884 p. 105.
Joppa geniculata Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 199 n. 18.
Microjoppa geniculata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 12 n. 72 & p. 14 n. 32.
Microjoppa geniculata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 72.

hilaris Smith — Am.: Costa Rica.
Joppa hilaris Smith, Descr. New Spec. Hymen. 1879 p. 232 n. 1.
Joppa hilaris Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 197 n. 13.

hypoxantha (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa hypoxantha Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 9 n. 16, ♂.
Microjoppa hypoxantha Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 57 n. 16, ♂.
Joppa hypoxantha m.

incerta Cress.[1] — ♀ — Am.: Mexico.
Joppa incerta Cresson, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1873 p. 131 n. 3, ♀.

kriechbaumeri D. T. — ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa fuliginosa Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 12 n. 30, ♂ [nec Brullé].
Microjoppa fuliginosa Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 70 n. 30, ♂.
Joppa Kriechbaumeri m.

laminata (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa laminata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 8 n. 8, ♀ ♂.
Microjoppa laminata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 49 n. 8, ♀ ♂.
Joppa laminata m.

larvata (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Columbia.
Microjoppa larvata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 16 n. 55, ♀.
Microjoppa larvata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 97 n. 55, ♀.
Joppa larvata m.

limbata (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa limbata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 19 n. 70, ♀ ♂.
Microjoppa limbata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 113 n. 70, ♀ ♂.
Joppa limbata m.

lindigii (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: Columbia, Brasilia.
Microjoppa Lindigii Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 10 n. 22, ♂.
Microjoppa Lindigii Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 63 n. 22, ♂.
Joppa Lindigii m.

---

[1] = ? Joppa decorata Cress.

linearis (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa linearis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 17 n. 58, ♀ ♂.
Microjoppa linearis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 100 n. 58, ♀ ♂.
Joppa linearis m.

maculicollis Cam. — ♀ — Am.: Panama.
Joppa maculicollis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 200 n. 21, ♀.

maculicoxis (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa maculicoxis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 8 n. 13. ♀ ♂
Microjoppa maculicoxis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 54 n. 13, ♀ ♂.
Joppa maculicoxis m.

maculigera (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa maculigera Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 11 n. 26, ♀.
Microjoppa maculigera Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 66 n. 26. ♀.
Joppa maculigera m.

marginella Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Joppa marginella Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 292 n. 42, ♀.

melanaspis (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Columbia.
Microjoppa melanaspis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 12 n. 34, ♀ ♂.
Microjoppa melanaspis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 74 n. 34, ♀ ♂.
Joppa melanaspis m.

melanocephala Cam. — ♀ ♂ — Am.: Panama.
Joppa melanocephala Cameron, Entom. M. Magaz. XXI. 1884 p. 104, ♂.
Joppa melanocephala Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 193 n. 1, ♂; T. 9 F. 1.
Microjoppa melanocephala Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 18 n. 67, ♀ ♂.
Microjoppa melanocephala Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 110 n. 67, ♂.

melanosticta (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa melanosticta Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 15 n. 49, ♂.
Microjoppa melanosticta Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 90 n. 49, ♂.
Joppa melanosticta m.

melanostigma Cam. — Am. centr., Bungaba.
Joppa melanostigma Cameron, Entom. M. Magaz. XXI. 1884 p. 104.
Joppa melanostigma Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 195 n. 8; T. 9 F. 16.
Microjoppa melanostigma Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 16 n. 54.
Microjoppa melanostigma Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 96 n. 54.

mellea (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Columbia.
Microjoppa mellea Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 7 n. 2, ♀ ♂.
Microjoppa mellea Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 42 n. 2, ♀ ♂.
Joppa mellea m.

mesopyrrha (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa mesopyrrha Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 18 n. 66, ♂.
Microjoppa mesopyrrha Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 109 n. 66, ♂.
Joppa mesopyrrha m.

mesoxantha (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa mesoxantha Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 8 n. 9, ♀.
Microjoppa mesoxantha Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 50 n. 9. ♀
Joppa mesoxantha m.

minor (Szépl.) D. T. — ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa minor Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 281, ♂.
Joppa minor m.

modesta Smith — Am.: Costa Rica.
Joppa modesta Smith, Descr. New Spec. Hymen. 1879 p. 233 n. 5.

Joppa modesta Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 198 n. 16; T. 9 F. 8.
Microjoppa modesta Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 10 n. 18.
Microjoppa modesta Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 59 n. 18.

moritzii (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Venezuela.
Microjoppa Moritzii Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 19 n. 72, ♀.
Microjoppa Moritzii Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 115 n. 72, ♀.
Joppa Moritzii m.

nigriceps Cam. — ♀ — Am. centr.: Guatemala, Panama.
Joppa nigriceps Cameron, Entom. M. Magaz. XXI. 1884 p. 105.
Joppa nigriceps Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 197 n. 14, ♀; T. 9 F. 5.
Microjoppa nigriceps Kriechbaumer. Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 9 n. 10, ♀.
Microjoppa nigriceps Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 52 n. 10, ♀.

nigricoxis (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa nigricoxis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 10 n. 21, ♂.
Microjoppa nigricoxis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 62 n. 21, ♂.
Joppa nigricoxis m.

nigrofasciata (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa nigrofasciata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 17 n. 61, ♀.
Mirojoppa nigrofasciata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 103 n. 61, ♀.
Joppa nigrofasciata m.

nigronotata (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Bolivia.
Microjoppa nigronotata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 17 n. 60, ♀.
Microjoppa nigronotata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 102 n. 60, ♀.
Joppa nigronotata m.

noctilio (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa noctilio Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 11 n. 28, ♂.
Microjoppa noctilio Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 67 n. 28, ♂.
Joppa noctilio m.

nominator (Fabr.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Ichneumon nominator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 265 n. 63.
Ichneumon nominator Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 158 n. 102.
Joppa fasciata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 122 n. 5.
Ichneumon nominatorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 276.
Ichneumon nominatorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 351.
Joppa fasciipennis Brullé, Hist. nat. Insect. IV. 1846 p. 275 n. 10, ♂.
Microjoppa fasciata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 13 n. 37, ♀ ♂.
Microjoppa fasciata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 77 n. 37, ♀ ♂.
Microjoppa fasciata Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 278 n. 5, ♂.
Joppa nominator m.

obscura Fabr.! — Am. mer.
Joppa obscura Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 123 n. 8.
Ichneumon ecclipsorius Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 280.
Ichneumon ecclipsorius Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 363.

ornata Brullé — ♀ ♂ — Am.: Cayenne.
Joppa ornata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 272 n. 4, ♀.
Microjoppa ornata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 20 n. 75, ♀ ♂.
Microjoppa ornata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 118 n. 75, ♀ ♂.

parvula (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa parvula Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 10 n. 23, ♀.
Microjoppa parvula Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 64 n. 23, ♀.
Joppa parvula m.

picticollis Spin. — ♀ — Am. mer.
Joppa picticollis Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 163 n. 20, ♀.
polycesta Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Joppa polycesta Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 294 n. 46, ♀.
polyxantha (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa polyxantha Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 15 n. 48, ♀ ♂.
Microjoppa polyxantha Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 89 n. 48, ♀ ♂.
Joppa polyxantha m.
pulvinata (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: Columbia.
Microjoppa pulvinata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 10 n. 19, ♂.
Microjoppa pulvinata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 60 n. 19, ♂.
Joppa pulvinata m.
quadrilineata Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Joppa quadrilineata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 288 n. 34, ♀.
quadrilineolata (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Venezuela.
Microjoppa quadrilineolata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 19 n. 74, ♀.
Microjoppa quadrilineolata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 117 n. 74, [♀.
Joppa quadrilineolata m.
quadrinotata (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa quadrinotata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 21 n. 81, ♀.
Microjoppa quadrinotata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII, 1898 p. 124 n. 81, ♀.
Joppa quadrinotata m.
radians (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Columbia.
Microjoppa radians Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV 1898 p. 11 n. 27, ♀.
Microjoppa radians Kriechbaumer, Borlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 66 n. 27, ♀.
Joppa radians m.
rogersii Cam. — ♀ — Am. centr.: Costa Rica, Panama, Bolivia.
Joppa Rogersi Cameron, Entom. M. Magaz. XXI. 1884 p. 105.
Joppa Rogersi Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 198 n. 15.
Microjoppa Rogersi Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 9 n. 11, ♀.
Microjoppa Rogersi Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 52 n. 11, ♀.
rugosa Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Joppa rugosa Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 293 n. 44, ♀.
scutellaris (Szépl.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa scutellaris Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 279 n. 8, ♀.
Joppa scutellaris m.
securigera (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Panama.
Microjoppa securigera Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 14 n. 32, ♀ ♂.
Microjoppa securigera Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 74 n. 32, ♀ ♂.
Joppa securigera m.
semihyalina (Szépl.) D. T. — ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa semihyalina Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 282, ♂.
Joppa semihyalina m.
semirufa Brullé — ♀ — As.: Java.
Joppa semirufa Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 296 n. 51, ♀.
setigera (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa setigera Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 20 n. 77, ♀ ♂.
Microjoppa setigera Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 120 n. 77, ♀ ♂.
Joppa setigera m.
setosa (Szépl.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa setosa Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 281, ♀.
Joppa setosa m.

similis Szépl. — ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa similis Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 280, ♂.
Joppa similis m.
sinuata (Szépl.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa sinuata Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 279 n. 10, ♀.
Joppa sinuata m.
spinosa Brullé — Am.: Brasilia.
Joppa spinosa Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 289 n. 37.
striata Brullé — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Joppa striata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 290 n. 38, ♀ ♂.
strigulifera (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Columbia.
Microjoppa strigulifera Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 13 n. 35, ♀.
Microjoppa strigulifera Kriechbaumer, Berlin. entom. Nachr. XLIII. 1898 p. 75 n. 35, ♀.
Joppa strigulifera m.
subvittata (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa subvittata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 19 n. 69, ♀.
Microjoppa subvittata Kriechbaumer, Berlin. entom. Nachr. XLIII. 1898 p. 113 n. 69, ♀.
Joppa subvittata m.
sumichrastii Cress. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Joppa Sumichrasti Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1868 p. 31 n. 5, ♀ ♂. [F.7.
Joppa Sumichrasti Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 200 n. 20, ♀ ♂; T. 9
Microjoppa Sumichrasti Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 12 n. 31, ♀ ♂.
Microjoppa Sumichrasti Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 71 n. 31, ♀ ♂.
surinamensis (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Surinam.
Microjoppa Surinamensis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 15 n. 52, ♀.
Microjoppa Surinamensis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1868 p. 94 n. 52, ♀.
Joppa Surinamensis m.
suturalis Brullé — ♀ — Am.: Mexico.
Joppa suturalis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 281 n. 21, ♀.
szépligetii D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa flavipennis Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 280 n. 11, ♀ [nec Brullé].
Joppa Szépligetii m.
terminalis Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Joppa terminalis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 272 n. 5, ♀.
thoracica Brullé — ♀ ♂ — Am.: Brasilia, Guyana.
Joppa thoracica Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 276 n. 11, ♀ ♂.
Microjoppa thoracica Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 7 n. 1, ♀ ♂.
Microjoppa thoracica Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitchr. XLIII. 1898 p. 39 n. 1, ♀ ♂.
var. **fulvidorsis** (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa thoracica var. fulvidorsis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898
Joppa thoracica var. fulvidorsis m. [p. 41, ♀.
var. **lunuligera** (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa thoracica var. lunuligera Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898
Joppa thoracica var. lunuligera m. [p. 41, ♀ ♂.
var. **maculigera** (Kriechb.) D. T. — ♀ — Am.: Brasilia.
Microjoppa thoracica var. maculigera Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898
Joppa thoracica var. maculigera m. [p. 41, ♀.
var. **nigridorsis** (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa thoracica var. nigridorsis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898
Joppa thoracica var. nigridorsis m. [p. 41, ♀ ♂.

var. **transiens** (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa thoracica var. transiens Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 41, [♀ ♂.
Joppa thoracica var. transiens m.

triangulifera (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: Venezuela.
Microjoppa triangulifera Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 14 n. 43.
Microjoppa triangulifera Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 85.
Joppa triangulifera m.

tricinctus Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Trogus tricinctus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 19, ♀.
Joppa ? tricinctus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. II. 1869 p. 92.

tricolor Brullé — ♂ — Am.: Brasilia.
Joppa tricolor Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 289 n. 36, ♂.

undatipennis Costa — Patria ?
Joppa undatipennis Costa, Ann. Mus. Zool. Napoli II. (1862) 1864 p. 70 n. 2012.

unistriolata (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: Columbia.
Microjoppa unistriolata Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 10 n. 20, ♂.
Microjoppa unistriolata Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 61, ♂.
Joppa unistriolata m.

variabilis (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: Columbia.
Microjoppa variabilis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 10 n. 53 & p. 16 n. 53, ♂.
Microjoppa variabilis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 95 n. 53, ♂.
Joppa variabilis m.

varians (Kriechb.) D. T. — ♀ ♂ — Am.: Venezuela, Columbia.
Microjoppa varians Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 18 n. 65, ♀ ♂.
Microjoppa varians Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 108 n. 65, ♀ ♂.
Joppa varians m.

variipes Cam. — ♀ ♂ — Am.: Panama.
Joppa varipes Cameron, Entom. M. Magaz. XXI. 1884 p. 104.
Joppa varipes Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 193 n. 2, ♀ ♂; T. 9 F. 9.
Microjoppa varipes Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 21 n. 80, ♀ ♂.
Microjoppa varipes Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 123 n. 80, ♀ ♂.

variolosa Smith — ♀ — Am.: Costa Rica.
Joppa variolosa Smith, Descr. New Spec. Hymen. 1879 p. 232 n. 2.
Joppa variolosa Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 194 n. 4.
Microjoppa variolosa Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 21 n. 79.
Microjoppa variolosa Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 122 n. 79.

venezuelana (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: Venezuela.
Microjoppa Venezuelana Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 13 n. 40, ♂.
Microjoppa Venezuelana Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 81 n. 40, ♂.
Joppa Venezuelana m.

verecunda Tosqu. — ♂ — Afr.: Cap.
Joppa verecunda Tosquinet, Ichneum. d'Afrique 1896 p. 101 n. 2, ♂.

verticalis Fabr. — ♂ — Am. mer.
Joppa verticalis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 122 n. 4.
Ichneumon verticalis Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 276.
Ichneumon verticalis Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 349.
Microjoppa verticalis Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 19 n. 73, ♂.
Microjoppa verticalis Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 116 n. 73, ♂.

vespertilio (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa vespertilio Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 9 n. 17, ♂.

Microjoppa vespertilio Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XXIII. 1898 p. 59 n. 17, ♂.
Joppa vespertilio m.

wintherni (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa Wintherni Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 14 n. 46, ♂.
Microjoppa Wintherni Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 87 n. 46, ♂.
Joppa Wintherni m.

xanthocephala Brullé — ♀ — Afr.: Cap.
Joppa xanthocephala Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 280 n. 18, ♀.

xanthomelaena (Kriechb.) D. T. — ♂ — Am.: Columbia.
Microjoppa xanthomelaena Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 16 n. 56, ♂.
Microjoppa xanthomelaena Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 98 n. 56, ♂.
Joppa xanthomelaena m.

xanthostigma Cam. — ♂ — Am. centr.
Joppa xanthostigma Cameron, Entom. M. Magaz. XXI. 1884 p. 105.
Joppa xanthostigma Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 196 n. 9, ♂.

xanthostoma Cam. — ♂ — Am.: Columbia.
Joppa xanthostoma Cameron, Entom. M. Magaz. XXI. 1884 p. 105.
Joppa xanthostoma Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 39. 1885 Hymen. I. p. 198 n. 17, ♂; T. 9 F. 6.
Microjoppa xanthostoma Kriechbaumer, Entom. Nachr. XXIV. 1898 p. 14 n. 42, ♂.
Microjoppa xanthostoma Kriechbaumer, Berlin. entom. Zeitschr. XLIII. 1898 p. 83 n. 42, ♂.

zonata (Szépl.) D. T. — ♂ — Am.: Brasilia.
Microjoppa zonata Szépligeti, Termész. Füzet. XXIII. 1900 p. 278 n. 7, ♂.
Joppa zonata m.

GENERA ICHNEUMONINARUM SEDIS INCERTAE.

AGLYPHUS

Giraud, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 p. 411.
ἄγλυφος, non in-sculptus.

nigripennis Gir. — ♀ — Eur.: Italia.
Aglyphus nigripennis Giraud, Ann. soc. entom. France (5) I. 1871 p. 411 n. 16, ♀.

BANCHOPSIS

Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 34.
Banchus, nom. propr. Hymen; ὄψ, visus.

crassicornis Rdw. — ♀ ♂ — Eur. mer.
Banchopsis crassicornis Rudow, Soc. entom. I. 1886 p. 34, ♀ ♂.
Banchopsis crassicornis Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. VII. 1888 p. 220.

CRYPTOCENTRUM

W. Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV. 1837 p. 260 n. 153.
κρύπτω, abscondo; κέντρον, aculeus.

lineolatum Kby. — ♂ — Am. bor.
Cryptocentrum lineolatum W. Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV. 1837 p. 260 n. 360, ♂; T. 6 F. 1.

DOLICHOMITUS

Smith, Proc. Zool. Soc. London 1877 p. 411.
δόλιχος, longus; μίτος, filum.

longicauda Smith — ♀ — Am. mer.
Dolichomitus longicauda Smith, Proc. Zool. Soc. London 1877 p. 412, ♀; T. 44 F. 2 & 2ᵃ.

ICHNEUMONITES

Heer, Neu. Denkschr. schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 35.
Ichneumon, nom. propr. Hymen.

bellus Heer — Eur.: Helvetia. [T. 3 F. 19 & 20.
Ichneumonites bellus Heer, Neu. Denkschr. schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 35 n. 63b;

fusiformis Heer — Eur.: Croatia. [n. 63c; T. 3 F. 16.
Ichneumonites fusiformis Heer, Neu. Denkschr. schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 35

IDIOSTOLIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 190 n. 8.
ἴδιος, proprius; στολίς, stola.

Species exstat.

LITHOTORUS

Scudder, Tert. Foss. Insects N. Amer. II. 1890 p. 609.
λίθος, lapis; τόρος, penetrans.

cressonii Scudd. — Am.: Wyoming.
Lithotorus Cressoni Scudder, Tert. Foss. Insects N. Amer. II. 1890 p. 609; T. 10 F. 21.

MATARA

Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 395.
matara.

nigripennis Holmgr. — ♀ — Am.: Argentinia, Uruguay.
Matara nigripennis Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 395 n. 10, ♀; T. 8 F. 1.

MICROLEPTES

Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 679.
μικρός, parvus; λεπτός, tenuis.

splendidulus Grav. — ♀ — Eur.: Britannia.
Microleptes splendidulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 679, ♀.
Microleptes splendidulus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 211 n. 1; T. 40
Microleptes splendidulus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 306. [F. 3.
Microleptes splendidulus Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 57.
Microleptes spendidulus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 313 n. 1, ♀.
Microleptes splendidulus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 84 n. 1, ♀.

OPHIOGASTRA

Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 368.
Ophion, nom. propr. Hymen.; γαστήρ, venter.

Synon.: Ophiodes Hartig, Ber. naturw. Ver. Harz 1847 p. 18 [nec Wagler 1828].
Ophion, nom. propr. Hymen.; εἶδος, formis.

montanus (Htg.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ophiodes montanus Hartig, Ber. naturw. Ver. Harz 1847 p. 19, ♀ ♂.
Ophiogastra montana m.

PERITAENIUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 190 n. 5.
περί, circum; *ταινία*, taenia.
Species exstat.

THERACMION

Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXIX. 1872 P. 6. p. 99.
θήρα, venatio.

arcticus Holmgr. — ♀ ♂ — Am.: Groenlandia. [♀ ♂.
Theracmion arcticus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXIX. 1872 P. 6. p. 100,

TILGIDA

Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIV. P. 5. 1900 No. 15. p. 108.
Etymol. obscura.

albitarsis Cam. — ♂ — As.: India or.
Tilgida albitarsis Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIV. P. 5. 1900 No. 15. p. 109, ♂.

V. Fam. Agriotypidae Hal.

AGRIOTYPUS

(Walker) Curtis, Brit. Entom. IX. 1832 p. 389.
ἄγριος, agrestis; *τύπος*, typus.

Synon.: Crotopus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 353.
κρότος, crepitus; *πούς*, pes.

armatus Curt.[1]) — ♀ ♂ — Eur. centr.
Agriotypus armatus (Walker) Curtis, Brit. Entom. IX. 1832 p. 389, ♀ ♂; T. 389.
Agriotypus armatus Walker, Entom. Magaz. III. 1836 p. 412.
Agriotypus armatus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 314. [F. 14.
Agriotypus armatus Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 58; T. 75
Agriotypus armatus Kollar, Verh. zool. bot. Ver. Wien VII. 1857 p. 189.
Agriotypus armatus Siebold, Amtl. Ber. Naturf. Vers. Carlsruhe 1858 p. 211.
Crotopus abnormis Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 354, ♀ ♂.
Agriotypus armatus Siebold, Stettin. entom. Zeitg. XXII. 1861 p. 59-61.
Agriotypus armatus Hagen, Entom. Weekly Intellig. X. 1861 p. 148.
Agriotypus armatus Hagen, Entomol. Annual f. 1862 p. 23.
Agriotypus armatus Westwood, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1863 Proc. p. 170.
Agriotypus armatus Jordan, Entom. M. Magaz. I. 1865 p. 186.
Agriotypus armatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 138, ♀ ♂.
Agriotypus armatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 121.
Agriotypus armatus Klapálek, Entom. M. Magaz. XXV. 1889 p. 339; Fig.

---

[1]) *Trichopt.:* Silo nigricornis P. = Aspatherium picicorne Br. (Siebold), Silo pallipes Fabr., Odontocerum albicorne Scop. (Bridgman & Fitch).

ICHNEUMONITES

Heer, Neu. Denkschr. schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 35.
Ichneumon, nom. propr. Hymen.

bellus Heer — Eur.: Helvetia. [T. 3 F. 19 & 20.
Ichneumonites bellus Heer, Neu. Denkschr. schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 35 n. 63b;

fusiformis Heer — Eur.: Croatia. [n. 63c; T. 3 F. 16.
Ichneumonites fusiformis Heer, Neu. Denkschr. schweiz. Ges. Naturw. XXII. 1867 p. 35

IDIOSTOLIS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 190 n. 8.
ἴδιος, proprius; στολίς, stola.

Species exstat.

LITHOTORUS

Scudder, Tert. Foss. Insects N. Amer. II. 1890 p. 609.
λίθος, lapis; τόρος, penetrans.

cressonii Scudd. — Am.: Wyoming.
Lithotorus Cressoni Scudder, Tert. Foss. Insects N. Amer. II. 1890 p. 609; T. 10 F. 21.

MATARA

Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 395.
matara.

nigripennis Holmgr. — ♀ — Am.: Argentinia, Uruguay.
Matara nigripennis Holmgren, Eugenies Resa. Insect. 1868 p. 395 n. 10, ♀; T. 8 F. 1.

MICROLEPTES

Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 679.
μικρός, parvus; λεπτός, tenuis.

splendidulus Grav. — ♀ — Eur.: Britannia.
Microleptes splendidulus Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829 p. 679, ♀.
Microleptes splendidulus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 211 n. 1; T. 40
Microleptes splendidulus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 306. [F. 3.
Microleptes splendidulus Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 57.
Microleptes spendidulus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 313 n. 1, ♀.
Microleptes splendidulus Bridgman & Fitch, Entomologist XV. 1882 p. 84 n. 1, ♀.

OPHIOGASTRA

Ashmead, Canad. Entomol. XXXII. 1900 p. 368.
Ophion, nom. propr. Hymen.; γαστήρ, venter.

Synon.: Ophiodes Hartig, Ber. naturw. Ver. Harz 1847 p. 18 [nec Wagler 1828].
Ophion, nom. propr. Hymen.; εἶδος, formis.

montanus (Htg.) D. T. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ophiodes montanus Hartig, Ber. naturw. Ver. Harz 1847 p. 19, ♀ ♂.
Ophiogastra montana m.

PERITAENIUS

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXV. 1868 p. 190 n. 5.
περί, circum; *ταινία*, taenia.
Species exstat.

THERACMION

Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXIX. 1872 P. 6. p. 99.
θήρα, venatio.

arcticus Holmgr. — ♀ ♂ — Am.: Groenlandia. [♀ ♂.
Theracmion arcticus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XXIX. 1872 P. 6. p. 100,

TILGIDA

Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIV. P. 5. 1900 No. 15. p. 108.
Etymol. obscura.

albitarsis Cam. — ♂ — As.: India or.
Tilgida albitarsis Cameron, Mem. Manchester Soc. XLIV. P. 5. 1900 No. 15. p. 109, ♂.

V. Fam. **Agriotypidae** Hal.

AGRIOTYPUS

(Walker) Curtis, Brit. Entom. IX. 1832 p. 389.
ἄγριος, agrestis; *τύπος*, typus.

Synon.: Crotopus Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 353.
κρότος, crepitus; *πούς*, pes.

armatus Curt.[1]) — ♀ ♂ — Eur. centr.
Agriotypus armatus (Walker) Curtis, Brit. Entom. IX. 1832 p. 389, ♀ ♂; T. 389.
Agriotypus armatus Walker, Entom. Magaz. III. 1836 p. 412.
Agriotypus armatus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 314. [F. 14.
Agriotypus armatus Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 58; T. 75
Agriotypus armatus Kollar, Verh. zool. bot. Ver. Wien VII. 1857 p. 189.
Agriotypus armatus Siebold, Amtl. Ber. Naturf. Vers. Carlsruhe 1858 p. 211.
Crotopus abnormis Holmgren, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. XV. 1858 p. 354, ♀ ♂.
Agriotypus armatus Siebold, Stettin. entom. Zeitg. XXII. 1861 p. 59-61.
Agriotypus armatus Hagen, Entom. Weekly Intellig. X. 1861 p. 148.
Agriotypus armatus Hagen, Entomol. Annual f. 1862 p. 23.
Agriotypus armatus Westwood, Trans. Entom. Soc. London (3) I. 1863 Proc. p. 170.
Agriotypus armatus Jordan, Entom. M. Magaz. I. 1865 p. 186.
Agriotypus armatus Taschenberg, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXV. 1865 p. 138, ♀ ♂.
Agriotypus armatus Bridgman & Fitch, Entomologist XVII. 1884 p. 121.
Agriotypus armatus Klapálek, Entom. M. Magaz. XXV. 1889 p. 339; Fig.

---

[1]) *Trichopt.:* Silo nigricornis P. = Aspatherium picicorne Br. (Siebold), Silo pallipes Fabr., Odontocerum albicorne Scop. (Bridgman & Fitch).

Agriotypus major Klapálek, Entom. M. Magaz. XXV. 1889 p. 434.
Agriotypus armatus G. W. Müller, Zool. Jahrb. IV. Syst. 1889 p. 1132.
Agriotypus armatus G. W. Müller, Zool. Jahrb. V. Syst. 1891 p. 689-691.
Agriotypus armatus G. W. Müller, Naturw. Rundsch. VI. 1892 p. 167.
Agriotypus armatus Verhoeff, Entom. Nachr. XVIII. 1892 p. 4 n. 3.
Agriotypus armatus Klapálek, Arch. Landesdurchforschg. Böhmen VIII. P. 6. 1893 p. 52-54; [Fig. 14.
Agriotypus armatus Trybom, Entom. Tidsskr. XVII. 1896 p. 77-78.

VI. Fam. **Evaniidae** Latr.

1. *Subfam.* **Aulacinae**

Shuckard, Entomologist 1841 p. 121.

PRISTAULACUS

Kieffer, Ann. soc. entom. France LXVII. 1900 p. 813.
πρίστης, serra; Aulacus, nom. propr. Hymen.

Synon.: Aulacus Latreille & auct.

bimaculatus Kieff. — ♀ — As.: Daghestania.
Pristaulacus bimaculatus Kieffer, Ann. soc. entom. France LXVII. 1900 p. 815, ♀.
chlapowskii Kieff. — ♀ — Eur.: Russia.
Pristaulacus Chlapowskii Kieffer, Ann. soc. entom. France LXVII. 1900 p. 814, ♀.
morawitzii (Smw.) Kieff. — ♀ — As.: Transcaspia.
Aulacus Morawitzi Semenow, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXXV. 1892 p. 29 n. 4, ♀.
Pristaulacus Morawitzi Kieffer, Ann. soc. entom. France XLVII. 1900 p. 814.
patratii (Serv.) Kieff.[1] — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Aulacus striatus Latreille, Gen. Crust. & Insect. III. 1807 p. 386, ♀ [excl. Synon.].
Aulacus striatus Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 30 n. 1, ♀ [excl. Synon.].
Aulacus Patrati Serville, Ann. soc. entom. France II. 1833 p. 412, ♀; T. 15 Fig. C.
Aulacus Latreilleanus Nees, Hymen. Ichneum. affin. Monogr. I. 1834 p. 304 n. 2, ♀.
Aulacus Patrati Nees, Hymen. Ichneum. affin. Monogr. I. 1834 p. 319, ♀.
Aulacus Latreilleanus Imhof & Labram, Insect. d. Schweiz II. 1838, ♀ ♂; T. 21.
Aulacus obscuripennis Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 537, ♀.
Aulacus Patrati Shuckard, Entomologist 1841 p. 124 n. 2, ♀.
Aulacus Latreilleanus Shuckard, Entomologist 1841 p. 124 n. 4, ♀.
Aulacus Patrati Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 263 n. 3, ♀ ♂.
Aulacus obscuripennis Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 263 n. 4, ♀.
Aulacus Latreilleanus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 22 n. 3, ♀. [& 41, ♀.
Aulacus Latreilleanus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXII. 1878 p. 36
Aulacus Patrati Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXII. 1878 p. 36 &
Aulacus Latreilleanus Kriechbaumer, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 244, ♀. [41, ♀.
Aulacus Patrati Kriechbaumer, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 244, ♀.
Aulacus Patrati Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 505, ♀ ♂; T. 22 F. 10.
Pristaulacus Patrati Kieffer, Ann. soc. entom. France XLVII. 1900 p. 814.

---

[1]) *Hymen.:* Xiphydria annulata (Ratzeburg).

AULACUS

Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 89; T. 2 F. 3.
αὖλαξ, sulcus.

Synon.: Aulacinus Westwood, Trans. Entom. Soc. London 1868 p. 331.
αὖλαξ, sulcus; Aulacus, nom. propr. Hymen.
Aulacostethus Philippi, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 302.
Aulax, nom. propr. Hymen.; στῆθος, pectus.
Pammegischia Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 302; Fig. 1.
παμμέγας, grandissimus; ἰσχίον, coxa.

Bassus Fabricius.
Ichneumon Thunberg.

abbotii Westw. — ♀ ♂ — Am.: New Scotland, Georgia, Nevada, Colorado.
? Aulacus fasciatus Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 67, ♀.
? Aulacus fasciatus Nees, Hymen. Ichneum. affin. monogr. I. 1834 p. 320 n. 4, ♀.
? Aulacus fasciatus Shuckard, Entomologist 1841 p. 124 n. 3, ♀.
? Aulacus niger Shuckard, Entomologist 1841 p. 124 n. 6.
Aulacus Abbotii Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 538, ♀.
Aulacus ater Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 538, ♀.
Aulacus ater Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 265 n. 10, ♀.
? Aulacus fasciatus Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 266 n. 11, ♀.
Aulacus Abbotii Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 266 n. 12, ♀.
? Aulacus fasciatus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 373, ♀.
Aulacus occidentalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 255, ♀.
Aulacus consors Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 255, ♂.
Aulacus Abbotii Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 538, ♀ ♂.

ambiguus Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia.
Aulacus ambiguus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 530, ♀; T. 22 F. 143.

apicalis Westw. — ♀ — Austr.
Aulacus apicalis Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 538, ♀.
? Aulacus variegatus Shuckard, Entomologist 1841 p. 125 n. 9.
Aulacus apicalis Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 267 n. 17; T. 14 F. 7.
Aulacus apicalis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 516, ♀.

ater Guér. — ♀ — Am.: Mexico, Brasilia.
Aulacus ater Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 408 n. 1, ♀.
Aulacus Guérini Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 222.
Aulacus ater Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 522, ♀; T. 22 F. 139.

bicornutus Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia.
Aulacus bicornutus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 529, ♀; T. 22 F. 142.

bituberculatus Cam. — ♀ — As.: India.
Aulacus (Aulacinus) bituberculatus Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 [P. 3. p. 55, ♀.

burquei (Prov.) Schlett. — ♀ — Am.: Canada.
Pammegischia Burquei Provancher, Natural. Canad. XIII. 1883 p. 303, ♀; Fig. 1.
Pammegischia Burquei Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 752, ♀; Fig. 84.
Aulacus Burquei Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 540, ♀.

capitalis Schlett. — ♀ — Am.: Chile.
Aulacus capitalis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 520, ♀.

cingulatus Westw. — ♀ ♂ — Austr.
Aulacus cingulatus Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 538, ♀.
? Aulacus lateritius Shuckard, Entomologist 1841 p. 125 n. 8.

Aulacus cingulatus Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 267 n. 14, ♀.
?Aulacus lateritius Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 267 n. 15.
Aulacus cingulatus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 513, ♀ ♂; T. 22 F. 134.

compressus Spin.! — ♂ — Eur.: Liguria.
Aulacus compressus Spinola, Insect. Ligur. II. 1808 p. 48 n. 39, ♂.
Aulacus compressus Nees, Hymen. Ichneum. affin. Monogr. I. 1834 p. 305 n. 4.
Aulacus compressus Shuckard, Entomologist 1841 p. 125 n. 10.
Aulacus compressus Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. 1843 p. 264 n. 6, ♂.
Aulacus compressus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 22 n. 4, ♂.
Aulacus compressus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXII. 1878 p. 36 [& 41, ♂.
Aulacus compressus Kriechbaumer, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 243, ♂.
Aulacus compressus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 507, ♂.

cordatus Schlett. — ♀ — Austr.
Aulacus cordatus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 514, ♀; T. 22 F. 135.

esenbeckii Dahlb. — ♀ — Eur.: Suecia, Bavaria.
Aulacus Esenbecki Dahlbom, Isis 1837 p. 176, ♀.
Aulacus Esenbecki Kriechbaumer, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 244, ♀.
Aulacus calcaratus Kriechbaumer, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 244, ♀.
Aulacus Esenbecki Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXII. 1878 p. 37 [& 41, ♀.
Aulacus calcaratus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXII. 1878 p. 39, ♀.
Aulacus Esenbecki Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 502, ♀; T. 22 F. 149.

fasciatus Say![1] — ♀ — Am.: Ohio.
Aulacus fasciatus Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 67.
Aulacus fasciatus Nees, Hymen. Ichneum. affin. Monogr. I. 1834 p. 320 n. 4.
Aulacus fasciatus Shuckard, Entomologist 1841 p. 124 n. 3.
Aulacus ? fasciatus Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 266 n. 11.
Aulacus fasciatus Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 373.
Aulacus fasciatus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien V. 1889 p. 540, ♀.

firmus Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Aulacus firmus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 256, ♀.
Aulacus firmus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 537, ♀.

flavipennis Cam. — As.: Key.
Aulacus flavipennis Cameron, Proc. Manchester Philos. Soc. XXVI. 1888 p. 134.

flavoguttatus Westw. — ♀ ♂ — Austr.
Aulacus flavoguttatus Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 223, ♀ ♂.
Aulacus flavoguttatus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 516, ♀ ♂; T. 22 [F. 150.

formosus Westw. — ♀ ♂ — Austr.
Aulacus formosus Westwood, Trans. Entom. Soc. London 1868 p. 330 n. 2, ♀ ♂.
Aulacus formosus Westwood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 129 n. 2, ♀ ♂; T. 24 F. 5.
Aulacus formosus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 512, ♀ ♂; T. 22 F. 133.

fusiger Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia.
Aulacus fusiger Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 519, ♀; T. 22 F. 137.

galitae Grib.! — ♀ — Afr.: Galita.
Aulacus Galitae Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 339 n. 79, ♀.
Aulacus Galitae Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 507, ♀.

gloriator (Fabr.) Westw. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Austria, Balcan.
Bassus gloriator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 99 n. 24, ♀.
Ichneumon gloriator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 269, ♀.
Ichneumon gloriator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 332, ♀.

---

[1] = ? A. Abbotii Westwood (Schletterer).

Aulacus flagellatus (Dahlbom) Nees, Hymen. Ichneum. affin. Monogr. I. 1834 p. 305 n. 3, ♀.
Aulacus Erichsonii Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 537, ♂.
Aulacus flagellatus Shuckard, Entomologist 1841 p. 124 n. 5.
Aulacus gloriator Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 262 n. 2.
Aulacus Erichsonii Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 264 n. 5, ♂; T. 14 [F. 6.
Aulacus flagellatus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXII. 1878 [p. 36 & 41, ♀.
Aulacus flagellatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 244, ♀.
Aulacus fasciatus Kriechbaumer, Termész. Füzet. VI. 1882 p. 143 n. 1, ♂.
Aulacus gloriator Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 504, ♀ ♂; T. 22 F. 129.

haemorrhoidalis Westw. — ♀ — Am.: Brasilia.
Aulacus haemorrhoidalis Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 223, ♀.
Aulacus haemorrhoidalis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 527, ♀.

haemorrhoidellus Westw. — ♀ — Am.: Brasilia.
Aulacus haemorrhoidellus Westwood, Trans. Entom. Soc. London 1868 p. 331 n. 5, ♀.
Aulacus haemorrhoidellus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 527, ♀.

kohlii Schlett. — ♀ — Am.: Guyana.
Aulacus Kohlii Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 525, ♀.

maculatus Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia.
Aulacus maculatus Schletterer, Ann. naturh. Wien IV. 1889 p. 531, ♀; T. 22 F. 144.

maerens Westw. — ♀ — Austr.
Aulacus (Aulacinus) moerus Westwood, Trans. Entom. Soc. London 1868 p. 331 n. 7, ♀.
Aulacus (Aulacinus) moerens Westwood, Trans. entom. Oxon. 1874 p. 129, ♀; T. 24 F. 6.
Aulacus moerens Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 517, ♀.

magnificus Schlett. — ♀ ♂ — As.: Ceylon.
? Aulacus congener Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. 4. 1843 p. 267 n. 16, ♂.
Aulacus magnificus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 509, ♀ ♂.

melleus Cress. — ♀ — Am.: Nevada.
Aulacus melleus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 255, ♀.
Aulacus melleus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 537, ♀; T. 22 F. 147.

minor Cress. — ♀ ♂ — Am.: Nevada.
Aulacus minor Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VIII. 1880 Proc. p. VI.
Aulacus minor Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 534, ♀ ♂.

montanus Cress. — ♀ — Am.: Nevada.
Aulacus montanus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. 1879 p. 256, ♀.
Aulacus montanus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 533, ♀.

nobilis Westw. — ♀ — Am.: Brasilia.
Aulacus nobilis Westwood, Trans. Entom. Soc. London 1868 p. 329 n. 1, ♀.
Aulacus nobilis Westwood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 129 n. 1, ♀; T. 24 F. 4.
Aulacus nobilis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 520, ♀.

pacificus Cress. — ♀ — Am.: Vancouvers Island.
Aulacus pacificus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 256, ♀.
Aulacus pacificus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 535, ♀.

pallidipes Cress. — ♂ — Am.: Massachusetts.
Aulacus pallipes Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. XVII, ♂.
Aulacus pallipes Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 534, ♂.

pediculatus Schlett. — ♂ — Am.: Mexico, Brasilia.
? Aulacus hyalinipennis Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 538, ♂.
? Aulacus hyalinipennis Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. 4. 1843 p. 265 n. 9, ♂.
Aulacus pediculatus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 518, ♂.

resutorivorus Westw.[1]) — ♀ — Am.: Hudsons Bay.
Aulacus resutorivorus Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 224, ♀.
Aulacus resutorivorus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 538, ♀.

rubidus Schlett. — ♂ — Austr.
Aulacus rubidus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 510, ♂.

rubriventris (Phil.) Schlett. — ♀ — Am.: Chile.
Aulacostathus rubriventer Philippi, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 302 n. 5; T. 1 F. 4
Aulacus rubriventer Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 523, ♀; T. 22 F. 12

ruficeps Westw. — ♀ — Am.: Brasilia.
Aulacus ruficeps Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 224; T. 7 F. 3
Aulacus ruficeps Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 526, ♀.

ruficollis Cam. — ♀ — Am.: Guatemala.
Aulacus ruficollis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57./58. 1887 Hymen. I. p. 423 n. 2, ♀; T. 1[F. 1?]
Aulacus ruficollis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 521, ♀.

rufitarsis Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, California, Georgia, Nevada, Colorado, Rocky Mountains, British Columbia
Aulacus rufitarsis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 134 n. 1, ♀.
Aulacus bilobatus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 237 n. 2, ♂.
Aulacus editus Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. 1880 VII. Proc. p. V.
Aulacus abdominalis Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. 1880 VIII. Proc. p. V.
Aulacus rufitarsis Provancher, Natural. Canad. XIII. 1882 p. 302 n. 3, ♀.
Aulacus bilobatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 247 n. 2, ♂.
Aulacus rufitarsis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 751 n. 3, ♀.
Aulacus rufitarsis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 535, ♀ ♂.

rufitarsis Westw.! — ♀ — Austr.: Tasmania.
Aulacus rufitaris Westwood, Trans. Entom. Soc. London 1868 p. 330 n. 4, ♀.
Aulacus rufitarsis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 541, ♀.

rufus Westw. — ♀ — Austr.: Tasmania.
Aulacus rufus Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 538, ♀.
Aulacus rufus Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 266 n. 13, ♀.
Aulacus rufus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 511, ♀.

sibiricola Smw. — ♂ — As.: Sibiria.
Aulacus sibiricola Semenow, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXXV. 1892 p. 27 n. 2, ♂.

spinifer Westw. — ♀ — Am.: Brasilia.
Aulacus spinifer Westwood, Trans. Entom. Soc. London 1868 p. 331 n. 5.
Aulacus spinifer Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 532, ♀.

stephanoides Westw. — ♀ — Am.: Brasilia.
Aulacus stephanoides Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 537, ♀.
Aulacus stephanoides Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 265 n. 8, ♀.
Aulacus stephanoides Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 524, ♀.

stigmaterus Cress. — ♀ — Am.: New Jersey.
Aulacus stigmaterus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 134 n. 2, ♀.
Aulacus stigmapterus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 236 n. 1, ♀.
Aulacus stigmapterus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 247 n. 1, ♀.
Aulacus stigmaterus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 536, ♀.

stigmaticus Westw. — ♂ — As.: Ceylon, Singapore.
? Aulacus signatus Shuckard, Entomologist 1841 p. 124 n. 7, ♂.
? Aulacus signatus Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 268 n. 18, ♂.

---

[1]) *Col.:* Monochamnus resutorius (Westwood).

Aulacus stigmaticus Westwood, Trans. Entom. Soc. London 1868 p. 330 n. 3, ♂.
Aulacus stigmaticus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 509, ♂.

striatus Jur. 1) — ♀ ♂ — Eur.: Lapponia, Suecia, Germania, Austria, Helvetia, Russia.
Aulacus striatus Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 90, ♀; T. 7 F. 3.
Aulacus striatus Nees, Hymen. Ichneum. affin. Monogr. I. 1834 p. 304 n. 1.
Aulacus striatus Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 407 n. 1, ♀.
? Aulacus striatus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 300.
Aulacus striatus Shuckard, Entomologist 1841 p. 124 n. 1.
Aulacus striatus Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 262 n. 1, ♀.
Foenus (Aulacus) striatus Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3a Insect. II. 1849 T. 110 F. 4.
Aulacus exaratus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 22 n. 1, ♀ ♂.
Aulacus striatus Ratzeburg, Ichneum. d. Forstinsect. III. 1852 p. 22 n. 2.
Aulacus striatus Giraud, Verh. zool. bot. Ver. Wien IV. 1854 p. 605.
Aulacus exaratus Giraud, Verh. zool. bot. Ver. Wien IV. 1854 p. 605 n. 1.
Aulacus striatus Kawall, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 261 n. 27. [41, ♀ ♂.
Aulacus exaratus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXII. 1878 p. 37 &
Aulacus arcticus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXII. 1878 [p. 37, ♀ ♂.
Aulacus striatus Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXXII. 1878 p. 35 &
Aulacus exaratus Kriechbaumer, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 244, ♀ ♂. [41, ♀ (♂).
Aulacus striatus Kriechbaumer, Entom. Nachr. IV. 1878 p. 244, ♀ ♂.
Aulacus striatus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 501, ♀ ♂; T. 22 F. 127.

thoracicus Westw. — ♀ ♂ — Afr.: Cap.
Aulacus thoracicus Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 537, ♀ ♂. [♀ ♂.
Aulacus thoracicus (Klug) Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 265 n. 7,
Aulacus thoracicus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 508, ♀ ♂.

2. *Subfam.* Gasteruptioninae

Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus. XXIII. 1900 p. 7.

GASTERUPTION

Latreille, Préc. car. génér. Insect. 1796 p. 113 n. 12.
γαστήρ, venter; ὕπτιος, supinus.

Synon.: Foenus Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 210 & 240.
Nom. propr.
Ichneumon Linné & auct. ant.

aequale Schlett. — ♀ — Austr.
Gasteruption aequale Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 455, ♀.

aethiopicum Stadelm. — ♀ — Afr.: Aethiopia.
Gasteruption Aethiopicum Stadelmann, Entom. Nachr. XXI. 1895 p. 81 n. 2, ♀.

affectator (L.) Schlett. 2) — ♀ ♂ — Eur. fere tota; Afr. bor.; As. occ.; Am. bor.
Ichneumon affectator Linné, Syst. nat. Ed. 10a I. 1758 p. 566 n. 49.

---

1) *Hymen.:* Xiphydria dromedarius, X. camelus (Ratzeburg). — *Col.:* Purpuricenus Köhleri (Perris).

2) *Hymen.:* Osmia tridentata (Giraud), O. tricornis (Westwood), Prosopis signata (Frey-Gessner), Heriades truncorum, Chelostoma florisomne (Linné), Trypoxylon figulus (Giraud), Cemonus unicolor (Perez) etc.

Ichneumon affectator Linné, Fauna Suec. Ed. 2a 1761 p. 407 n. 1627.
Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 329 n. 17.
Ichneumon affectator Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 287 n. 756; T. 41 F. 756.
Ichneumon affectator Linné, Syst. nat. Ed. 12a I. 2. 1767 p. 937 n. 53.
Ichneumon XXVI Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767 T. 60 F. 4.
Ichneumon affectator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 340 n. 74.
Ichneumon affectator Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 856 n. 53.
Ichneumon affectator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 435 n. 93.
Ichneumon annularis Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 398 n. 17.
Ichneumon affectator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 268 n. 111.
Ichneumon affectator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 174 n. 118.
Ichneumon affectator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2696 n. 53.
Ichneumon affectator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 50 n. 782.
Ichneumon affectator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 375.
Ichneumon affectator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 194 n. 150.
Ichneumon assectator Petagna, Instit. entom. I. 1792 p. 365.
Ichneumon affectator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 178 n. 184.
Ichneumon assectator Cederhjelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 163 n. 506.
Foenus affectator Fabricius, Suppl. entom. System. 1798 p. 240 n. 2.
Foenus assectator Latreille, Hist. nat. Crust & Insect. III. 1802 p. 329.
Ichneumon assectator Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 263 n. 2056, ♀ ♂.
Foenus assectator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 75 n. 2.
Foenus assectator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 142 n. 2.
Ichneumon assectator Hentsch, Epit. entom. syst. 1804 p. 112.
Foenus assectator Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 195 n. 2.
Ichneumon assectator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 74 n. 782.
Foenus assectator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 88, ♀ ♂.
Ichneumon assectator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 264.
Ichneumon affectator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 318.
Foenus affectator Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 30, ♀ ♂.
Foenus assectator Curtis, Brit. Entom. IX. 1832 p. 423 n. 2, ♀; T. 423.
Foenus assectator Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 6. 1833 p. 76 n. 2, ♀ ♂.
Foenus assectator Nees, Hymen. Ichneum. affin. Monogr. I. 1834 p. 308 n. 2.
Foenus assectator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 120 n. 2.
Foenus assectator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 408 n. 2, ♀ ♂.
Foenus assectator Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 255 n. 2, ♀.
Foenus affectator Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 341 n. 416.
Foenus affectator Duméril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 893 n. 2.
Foenus montanus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 132 n. 3, ♀.
Foenus affectator Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 93, ♀ ♂.
Foenus affectator Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 477 n. 26.
Foenus affectator H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.
Foenus affectator Tournier, Ann. soc entom. Belgique XX. 1877 Compt. rend. p. IX, ♀ ♂.
Foenus minutus Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XX. 1877 Compt. rend. p. IX, ♀ ♂.
Foenus affectator Abeille, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 277, ♀ ♂.
Foenus minutus Abeille, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 277, ♀ ♂.
Foenus minutus Carpenter, Entomologist XIII. 1880 p. 89, ♀.
Foenus fumipennis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 848 n. 5, ♀ ♂.
Foenus assectator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 849 n. 7, ♀ ♂.
Foenus borealis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 849 n. 8, ♀ ♂.
Foenus nigritarsis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 849 n. 10, ♀ ♂.

Gasteruption assectator Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 276 n. 1, ♀ ♂; [T. 14 F. 4.
Gasteruption boreale Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 303 n. 4, ♀ ♂.
Gasteruption montanum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 309 n. 23, ♀.
Gasteruption nigritarse Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 310 n. 25, ♀ ♂.
Gasteruption affectator Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 397, ♀ ♂ & 479.
Foenus affectator Dominique, Bull. soc. sc. nat. Ouest de la France 1894 p. 211 n. 8, ♀ ♂.

albitarse Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia. [F. 119.
Gasteruption albitarse, Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 475, ♀; F. 21

antennale Schlett. — ♂ — Austr.
Gasteruption antennale Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 464, ♂.

arca (Coup.) Schlett. — ♀ — Am.: Canada.
Foenus arca Couper, Canad. Entom. II. 1870 p. 110.
Gasteruption arca Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 489, ♀.

australe (Westw.) Schlett. — ♂ — Austr.
Foenus australis Westwood, Proc. Zool. Soc. London III. 1835 p. 51.
Foenus australis Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 259 n. 12, ♂.
Gasteruption australe Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 303 n. 1, ♂.
Gasteruption australe Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 459, ♂.

barnstonii (Westw.) Schlett. — ♀ — Am.: Hudsons Bay.
Foenus Barnstoni Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 220.
Gasteruption Barnstoni Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 303 n. 2, ♀.
Gasteruption Barnstoni Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 483, ♀.

bidentulum (Thoms.) Schlett. — ♀ — Eur.: Suecia.
Foenus bidentulus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 848 n. 6, ♀.
Gasteruption bidentulum Schletterer, Verh. zool. bot Ges. Wien XXXV. 1885 p. 303 n. 3, ♀.
Gasteruption bidentulum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 405, ♀.

brachyurum Schlett. — ♀ — Austr.: Tasmania.
Gasteruption brachyurum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 293 n. 23, ♀.
Gasteruption brachyurum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 439, ♀.

brasiliense (Blanch.) Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia.
Foenus Brasiliensis Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 300 n. 3, ♀.
Foenus Brasiliensis Brullé, Hist. nat. Insect Hymén. IV. 1846 p. 530 n. 1, ♀.
Foenus Brasiliensis Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 219, ♀.
Gasteruption Brasiliense Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 304 n. 5.
Gasteruption Brasiliense Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 469, ♀.

caffrarium Schlett. — ♀ — Afr.: Cap, Caffraria.
Gasteruption Caffrarium Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 288 n. 18, ♀.
Gasteruption Caffrarium Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 430, ♀.

capense (Guér.) Schlett. — ♀ — Afr.: Cap.
Foenus Capensis Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 257 n. 6 [ined.].
Foenus Capensis Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 405, ♀; T. 65 F. 4 (♀).
Foenus Capensis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 531 n. 2, ♀.
Foenus Capensis Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 219.
Gasteruption Capense Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 304 n. 6, ♀.
Gasteruption Capense Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 429, ♀.

chaeturum Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia. [T. 121.
Gasteruption chaeturum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 477, ♀; T. 22

coniceps Smw. — ♀ — As.: Turcestania.
Gasteruption coniceps Semenow, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXXV. 1892 p. 20 n. 18, ♀.

coriaceum Schlett. — ♀ ♂ — As.: Aru.
? Foenus gracilis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 169 n. 1, ♀.
? Gasteruption gracile Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 307 n. 15, ♀.
Gasteruption coriaceum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 443, ♀ ♂.
crassiceps Schlett. — ♀ ♂ — Austr.
? Foenus Hollandiae Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. 1845 Insect. p. 407 n. 5.
? Foenus Hollandiae Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 218.
? Gasteruption Hollandiae Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 308 n. 18, ♀.
Gasteruption crassiceps Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 462, ♀ ♂.
crassipes (Smith) Schlett.! — ♀ — Austr.
Foenus crassipes Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 479, ♀.
Foenus crassipes Hutton, Catal. New Zealand Diptera etc. 1881 p. 117, ♀.
Gasteruption crassipes Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 304 n. 8, ♀.
Gasteruption crassiceps Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 468, ♀ err. typogr.
Gasteruption crassipes Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 541.
darwinii (Westw.) Schlett. — ♀ ♂ — Austr.
Foenus Darwinii Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 537, ♂.
Foenus Darwinii Westwood, Trans. Entom. London III. P. 4. 1843 p. 259 n. 14, ♂.
Gasteruption Darwinii Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 305 n. 9, ♂.
Gasteruption Darwinii Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 465, ♀ ♂.
deletangii Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia.
Gasteruption Délétangii Schletterer, Entom. Nachr. XIX. 1893 p. 166, ♀.
dewitzii Schlett. — ♀ — Austr.
Gasteruption Dewitzi Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 442, ♀.
dilutum Smw. — ♂ — Afr.: Turcestania.
Gasteruption dilutum Semenow, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXXV. 1892 p. 23 n. 21, ♂.
dimidiatum Smw. — ♀ — As.: Sibiria.
Gasteruption dimidiatum Semenow, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXXV. 1892 p. 22 n. 20, ♀.
diversipes (Ab.) Schlett. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Foenus diversipes Abeille, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 272, ♀ ♂.
Gasteruption diversipes Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 305 n. 10, ♀ ♂.
Gasteruption diversipes Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 408, ♀ ♂.
Foenus diversipes Dominique, Bull. soc. sc. nat. Ouest de la France 1894 p. 208 n. 5, ♀ ♂.
dolichocephalum Schlett. — ♀ ♂ — Austr.
Gasteruption dolichocephalus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 445, ♀ ♂.
dolichoderum Schlett. — ♂ — Eur.: Rhodus.
Gasteruption dolichoderum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 404, ♂.
dubiosum Smw. — ♀ — Eur.: Russia.
Gasteruption dubiosum Semenow, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXXV. 1892 p. 15 n. 8, ♀.
dubium Schlett. — ♀ ♂ — Austr.
Gasteruption dubium Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 294 n. 24, ♂.
Gasteruption dubium Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 440, ♀ ♂.
egregium Schlett. — ♀ — Am. bor.
Gasteruption egregium Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 486, ♀; T. 22 F. 126.
erythrostomum (Dahlb.) Schlett. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Foenus erythrostomus Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 6. 1833 p. 76 n. 3, ♀.
Foenus erythrostomus Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 256 n. 4, ♀.
Foenus erythrostomus Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 847 n. 4, ♀ ♂. [n. 12, ♀.
Gasteruption erythrostomum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 306
Gasteruption erythrostomum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 409, ♀ ♂.
exsectum Schlett. — ♀ — Afr.: Cap.
Gasteruption exsectum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 428, ♀.

fallaciosum Smw. — ♀ — Eur.: Russia.
Gasteruption fallaciosum Semenow, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXXV. 1892 p. 14 n. 7, ♀.
fallax Schlett. — ♂ — Austr.
Gasteruption fallax Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 461, ♂.
flavitarse (Guér.) Schlett. — ♀ ♂ — Austr.
Foenus flavitarsis Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 407 n. 6.
Foenus flavitarsis Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 218.
Gasteruption flavitarse Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 295 n. 25, ♀ ♂; [T. 14 F. 11.
Gasteruption flavitarse Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 452, ♀ ♂.
forticorne Smw. — ♂ — Eur.: Hispania.
Gasteruption forticorne Semenow, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXXV. 1892 p. 26 n. 26, ♂.
foveiceps Smw. — ♀ — Eur.: Russia.
Gasteruption foveiceps Semenow, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXXV. 1892 p. 17 n. 11, ♀.
foveolatum Schlett. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia, Italia.
Gasteruption foveolatum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 410, ♀ ♂.
freyi (Tourn.) Schlett. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Helvetia, Austria, Hungaria, Italia; [As. min., Transcaucasia.
Foenus Freyi Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XX. 1877 Compt. rend. p. IX, ♀ ♂.
Foenus Freyi Abeille, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 276, ♀.
Gasteruption Freyi Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 278 n. 4, ♀.
Gasteruption Freyi Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 408, ♀ ♂.
Foenus Freyi Dominique, Bull. soc. sc. nat. Ouest de la France 1894 p. 209 n. 6, ♀ ♂.
genale Schlett. — ♂ — Austr.
Gasteruption genale Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 436, ♂.
glabratum Schlett. — ♀ — Afr.: Cap.
Gasteruption glabratum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 432, ♀.
gobertii (Tourn.) Kieff.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Foenus Goberti Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XX. 1877 Compt. rend. p. VII, ♀.
Foenus Goberti Abeille, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 267, ♀.
Foenus Goberti Dominique, Bull. soc. sc. nat. Ouest de la France 1894 p. 204 n. 1, ♀ ♂.
Gasteruption Goberti Kieffer, Ann. soc. entom. France 1900 p. 819 & 820.
granulithorax (Tourn.) Schlett. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; Afr.: Algeria; As. min., Transcau-[casia.
Foenus granulithorax Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XX. 1877 Compt. rend. p. VIII, ♀ ♂.
Foenus granulithorax Abeille, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 273, ♀ ♂.
Gasteruption distinguendum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 277 [n. 3, ♀ ♂; T. 14 F. 14 (♂) & 15 (♀).
Gasteruption granulithorax Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 279 n. 6, ♀.
Gasteruption granulithorax Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 427, ♀ ♂.
Foenus granulithorax Dominique, Bull. soc. sc. nat. Ouest de la France 1894 p. 207 n. 4, ♀ ♂.
guildingii (Westw.) Schlett. — ♀ ♂ — Am.: St. Vincent.
Foenus Guildingii Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 537, ♀ ♂.
Foenus Guildingii Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 257 n. 8, ♀ ♂.
Gasteruption Guildingii Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 307 n. 16, ♀ ♂.
Gasteruption Guildingii Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 474, ♀ ♂.
humerale Schlett. — ♀ ♂ — Austr.
Gasteruption humerale Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 n. 459, ♀ ♂.
hungaricum Szépl. — ♀ ♂ — Eur.
Gasteruption Hungaricum Szépligeti, Termész. Füzet. XVIII. 1895 p. 81 n. 15, ♀ ♂.

[1]) *Hymen.:* Osmia bicornis (Kieffer).

japonicum Cam. — As.: Japonia.
Gasteruption Japonicum Cameron, Proc. Manchester Philos. Soc. XXVI. 1888 p. 133.
incertum (Cress.) Schlett. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Colorado, Missouri, Rocky Mountains.
Foenus incertus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 133 n. 5, ♀ ♂.
Foenus incertus Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 236 n. 2, ♀ ♂.
Foenus incertus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 246 n. 2, ♀ ♂.
Gasteruption incertum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 308 n. 19, ♀ ♂.
Gasteruption incertum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 480, ♀ ♂.
inerme Schlett. — ♀ — Austr.
Gasteruption inerme Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 457, ♀.
infumatum Schlett. — ♂ — Am.: Brasilia.
Gasteruption infumatum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 468, ♂.
insidiosum Smw. — ♀ — Eur.: Russia.
Gasteruption insidiosum Semenow, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXXV. 1892 p. 15 n. 10, ♀.
intermedium Smw. — ♀ — Eur.: Russia.
Gasteruption intermedium Semenow, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXXV. 1892 p. 13 n. 6, ♀.
irritator (Westw.) D. T. — Am. bor.
Foenus irritator (Harris) Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 257 n. 7.
Gasteruption irritator m.
kirbyi (Westw.) Schlett. — ♀ — Am.: Hudsons Bay.
Foenus Kirbyi (Barnstorf) Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 219, ♀.
Gasteruption Kirbyi Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 308 n. 20, ♀.
Gasteruption Kirbyi Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 479, ♀.
kriechbaumeri Schlett. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia, Austria.
Gasteruption Kriechbaumeri Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 426, ♀ ♂.
Gasteruption Kriechbaumeri Semenow, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXXV. 1892 p. 25 [n. 24, ♂.
Gasteruption Kriechbaumeri Kriechbaumer, Schletterer: Progr. Gymnas. Pola 1894 p. 10, ♀.
laticeps (Tourn.) Schlett. — ♀ ♂ — Eur.: Italia.
Foenus laticeps Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XX. 1877 Compt. rend. p. VIII, ♀.
Foenus laticeps Abeille, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 279, ♀.
Gasteruption laticeps Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 309 n. 21, ♀.
Gasteruption laticeps Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 414, ♀ ♂.
latigenale Schlett. — ♂ — As.: Amboina, Aru. [T. 14 F. 5 & 9.
Gasteruption latigenale Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 295 n. 26, ♂.
Gasteruption latigenale Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 435, ♂.
leucopus Schlett. — ♀ — Austr.
Gasteruption leucopus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 450, ♀.
leviceps Schlett. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia, Austria, Sardinia, Sicilia, Rhodus.
Gasteruption laeviceps Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 281 n. 8, ♂.
Gasteruption laeviceps Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 403, ♀ ♂.
longicolle Schlett. — ♂ — Austr. [T. 14 F. 8.
Gasteruption longicolle Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 296 n. 27, ♂.
Gasteruption longicolle Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 446, ♂.
longigena (Thoms.) Schlett. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia.
Foenus longigena Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 849 n. 9, ♀ ♂.
Gasteruption longigena Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 309 n. 22, ♀ ♂.
Gasteruption longigena Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 399, ♀ ♂.
lugubre Schlett. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Gasteruption lugubre Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 412, ♀.

macroderum Schlett. — ♀ — Am.: Mexico, Brasilia. [F.118.
Gasteruption macroderum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 473, ♀; T. 21
macronyx Schlett. — ♂ — Austr.
Gasteruption macronyx Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 463, ♂.
maculicorne Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [n. 1, ♀; T. 18 F. 5.
Gasteruption maculicorne Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57./58. 1887 Hymen. I. p. 424
Gasteruption maculicorne Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 475, ♀.
malaicum Schlett. — ♀ — Austr.
Gasteruption Malaicum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 296 n. 28, ♀.
Gasteruption Malaicum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 455, ♀.
mandibulare Cam. — ♀ — As.: India.
Gasteruption mandibulare Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 59, ♀.
marginatum Schlett. — ♂ — Afr. mer.
Gasteruption marginatum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 433, ♂.
mariae (Ab.) Schlett. — ♀ — Eur.: Gallia.
Foenus Mariae Abeille, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 279, ♀.
Gasteruption Mariae Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 412, ♀.
nigrescens Schlett. — ♀ — Eur.: Helvetia, Hungaria, Italia. [1885 p. 288.
Gasteruption vagepunctatum var. nigrescens Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV.
Gasteruption nigrescens Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 420, ♀.
nigripes (Tourn.) Schlett. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia, Italia.
Foenus nigripes Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XX. 1877 Compt. rend. p. IX, ♀♂.
Foenus nigripes Abeille, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 276, ♀ ♂.
Gasteruption nigripes Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 310 n. 24, ♀♂.
Gasteruption nigripes Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 407, ♀ ♂.
var. **annulatum** (Ab.) Schlett. — Eur.: Gallia.
Foenus nigripes var. annulatum Abeille, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 276.
Gasteruption nigripes var. annulatum m.
novae-hollandiae Schlett. — ♀ — Austr. [n. 29, ♀.
Gasteruption Novae-Hollandiae Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 297
Gasteruption Novae-Hollandiae Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 449, ♀.
obliteratum (Ab.) Schlett. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Austria.
Foenus obliteratus Abeille, Bull. soc. hist. Toulouse XIII. 1879 p. 272, ♀ ♂.
Gasteruption obliteratum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 310 n. 26, ♀♂.
Gasteruption obliteratum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 410, ♀ ♂.
obscurum Schlett. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Gasteruption obscurum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 419, ♂.
obsoletum Smw. — ♀ — Eur.: Russia.
Gasteruption obsoletum Semenow, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXXV. 1892 p. 15 n. 9, ♀.
occidentale (Cress.) Schlett. — ♀♂ — Am.: Colorado, New York, Rocky Mountains, British [Columbia.
Foenus occidentalis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 131 n. 1, ♀.
Gasteruption occidentale Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 290 n. 21, ♀♂.
Gasteruption occidentale Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 485, ♀ ♂.
occipitale Schlett. — ♀ — Afr. occ.
Gasteruption occipitale Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 429, ♀.
oculare Schlett. — ♀ — Austr.
Gasteruption oculare Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 437, ♀.
opacum (Tourn.) Schlett. — ♀ — Eur.: Helvetia, Austria.
Foenus opacus Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XX. 1877 Compt. rend. p. VIII, ♀.
Foenus opacus Abeille, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 271, ♀.

Gasteruption opacum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 311 n. 27, ♀.
Gasteruption opacum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 424, ♀.
orientale Cam. — ♂ — As.: Bengal.
Gasteruption orientale Cameron, Mem. Manchester Philos. Soc. (4) I. 1888 p. 177, ♂.
Gasteruption orientale Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 435, ♂.
patellatum (Westw.) Schlett. — ♂ — Austr.
Foenus patellatus Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 221, ♂.
Gasteruption patellatum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 311 n. 28, ♂.
Gasteruption patellatum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 458, ♂.
paternum Schlett. — ♀ — Eur.: Helvetia, Tirolia.
Gasteruption paternum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 406, ♀.
pedemontanum (Tourn.) Schlett. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; As. occ.
Foenus Pedemontanus Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XX. 1877 Compt. rend. p. VII, ♀.
Foenus Pedemontanus Costa, Ann. soc. entom. Belgique XX. 1877 Compt. rend. p. XXI, ♂.
Foenus Pedemontanus Abeille, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 268, ♀ ♂.
Gasteruption Pedemontanum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 282 [n. 10, ♀ ♂.
Gasteruption Pedemontanum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 413, ♀ ♂.
Foenus Pedemontanus Dominique, Bull. soc. sc. nat. Ouest de la France 1891 p. 205 n. 2, ♀ ♂.
pedunculatum Schlett. — ♀ ♂ — Austr.: New Zealand.
? Foenus unguiculatus Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VIII. 1841 p. 537, ♀.
? Foenus unguiculatus Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 259 n. 13, ♂; [T. 15 F. 1.
? Foenus unguicularis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1876 p. 480, ♀; T. 4 F. 8.
? Foenus unguicularis Hutton, Catal. New Zealand Dipt. etc. 1881 p. 117, ♀ ♂.
? Gasteruption unguiculare Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 315 n. 40, ♀.
? Gasteruption unguiculatum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 315 n. 41, ♂.
Gasteruption pedunculatum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 466, ♂.
pensile Schlett. — ♀ — Am.: British Columbia.
Gasteruption pensile Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 483, ♀.
peregrinum Schlett. — ♀ — Austr.
Gasteruption peregrinum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 298 n. 38, ♀.
Gasteruption peregrinum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 447, ♀.
perplexum (Cress.) Schlett. — ♀ — Am.: Colorado, Rocky Mountains.
Foenus perplexus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 131 n. 2, ♀.
Gasteruption perplexum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 311 n. 29, ♀.
Gasteruption perplexum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 487, ♀.
plicatum Schlett. — ♂ — Austr.
Gasteruption plicatum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 466, ♂.
punctulatum Schlett. — ♀ — Afr.: Cap.
Gasteruption punctulatum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 431, ♀.
pyrenaicum (Guér.) Schlett. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; As. occ.
Foenus Pyrenaicus Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 406 n. 2.
Foenus Pyrenaicus Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 217.
Foenus Pyrenaicus Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XX. 1877 Compt. rend. p. IX, ♀ ♂.
Foenus Pyrenaicus Abeille, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 267, ♀ ♂.
Gasteruption Pyrenaicum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 283 n. 11, ♀ ♂.
Gasteruption Pyrenaicum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 405, ♀ ♂.
raphidioides (Westw.) Schlett. — ♀ — Austr.
Foenus raphidioides Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 220, ♀.

Gasteruption rhaphidioides Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 299 n. 31, [♀; T. 14 F. 6.
Gasteruption rhaphidioides Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 444, ♀.

rogenhoferi Schlett. — ♀ — Austr.
Gasteruption Rogenhoferi Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 299 n. 32, ♀.
Gasteruption Rogenhoferi Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 458, ♀.

rubricans (Guér.) Schlett. — ♀ ♂ — Eur. fere tota; Afr.: Algeria; As. occ.
? Foenus hastator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 142 n. 3.
? Ichneumon vastator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 272.
? Ichneumon vastator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 315.
Foenus dorsalis Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 537, ♀.
Foenus Esenbeckii Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 537.
Foenus Esenbeckii Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 256 n. 3, ♀.
? Foenus hastator Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 257 n. 5.
Foenus dorsalis Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 258 n. 10.
Foenus rubricans Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. (1828-39) 1845 p. 407 n. 4.
Foenus rubricans Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 217.
Foenus rubricans Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XX. 1877 Compt. rend. p. X, ♀ ♂.
Foenus Esenbeckii Abeille, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 274, ♀.
Gasteruption Graecum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 279 n. 5, ♂.
Gasteruption rubricans Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 285 n. 12, ♀ ♂; [T. 14 F. 7.
Gasteruption dorsale Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 306 n. 11, ♀.
Gasteruption Esenbeckii Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 306 n. 13, ♀.
? Gasteruption hastator Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 307 n. 17.
Gasteruption rubricum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 400, ♀ ♂.
Foenus rubricans Dominique, Bull. soc. sc. nat. Ouest de la France 1894 p. 212 n. 9, ♂.

rubrum Taschbg. — ♀ ♂ — Am. mer.
Gasteruption rubrum Taschenberg, Berlin. entom. Zeitschr. XXXI. 1891 p. 15 n. 2, ♀ ♂.

ruficorne (Spin.) Schlett. — ♂ — Am.: Chile.
Foenus ruficornis Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 551 n. 1, ♂.
Gasteruption ruficorne Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 312 n. 30, ♂.
Gasteruption ruficorne Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 478, ♂.

rufopectum (Westw.) Schlett. — ♀ ♂ — Am.: St. Vincent.
Foenus rufopectus Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 219, ♀ ♂.
Gasteruption rufipectum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 312 n. 31, ♀ ♂.
Gasteruption rufipectum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 470, ♀ ♂.

rufum (Westw.) Schlett. — ♀ ♂ — Austr.
Foenus rufus Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 537, ♂.
Foenus rufus Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 260 n. 15, ♂.
Foenus rufus Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 222, ♀.
Gasteruption rufum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 313 n. 32, ♂.
Gasteruption rufum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 464, ♂.

rugulosum (Ab.) Schlett. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Foenus rugulosus Abeille, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 149 & 275, ♀.
Gasteruption Kohlii Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 280 n. 7, ♂; T. 14 [F. 10 & 13.
Gasteruption rugulosum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 313 n. 33, ♀.
Gasteruption rugulosum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 401, ♂.
Foenus rugulosus Dominique, Bull. soc. sc. nat. Ouest de la France 1894 p. 210 n. 7, ♀ ♂.

sabulosum Schlett. — ♀ — Eur.: Tirolia.
Gasteruption sabulosum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 423, ♀.
Gasteruption sabulosum Semenow, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXXV. 1892 p. 24 n. 22, ♀.
sartor Schlett. — ♀ — Am.: Columbia.
Gasteruption sartor Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 476, ♀; T. 21 F. 120.
schlettereri Magr. — ♂ — As.: Syria.
Gasteruption Schlettereri Magretti, Ann. mus. civ. Genova XXIX. 1890 p. 529 n. 15, ♂.
schewyrewii Smw. — ♂ — Eur.: Russia.
Gasteruption Schewyrewi Semenow, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXXV. 1892 p. 19 n. 15, ♂.
senegalense (Blanch.) Schlett. — Afr.: Senegal.
Foenus Senegalensis Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 300.
Gasteruption Senegalense Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 313 n. 34.
Gasteruption Senegalense Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 458.
septentrionale Schlett. — ♀ — Am.: British Columbia. [F. 122.
Gasteruption septentrionale Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 480, ♀; T. 22
sericeum Cam. — ♀ ♂ — Am.: Guatemala. [T. 18 F. 3 (♀) & 4 (♂).
Gasteruption sericeum Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57./58. 1887 Hymen. I. p. 424 n. 3, ♀ ♂;
Gasteruption sericeum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 473, ♀ ♂.
sibiricum Smw. — ♀ — As.: Sibiria.
Gasteruption Sibiricum Semenow, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXXV. 1892 p. 24 n. 23, ♀.
simillimum Schlett. — ♀ — Austr.
Gasteruption simillimum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 448, ♀.
sordidum Taschbg. — ♀ — Austr.
Gasteruption sordidum Taschenberg, Berlin. entom. Zeitschr. XXXVI. 1891 p. 16 n. 3, ♀.
spinigerum Schlett. — ♀ ♂ — Austr.
Gasteruption spinigerum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 441, ♀ ♂.
spinitarse (Westw.) Schlett. — ♂ — Afr. occ.
Foenus spinitarsis Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 221, ♂.
Gasteruption spinitarse Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 313 n. 35, ♂.
Gasteruption spinitarse Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 432, ♂.
steindachneri Schlett. — ♀ — Austr. [♀; T. 14 F. 3.
Gasteruption Steindachneri Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 300 n. 33,
Gasteruption Steindachneri Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 446, ♀.
subtile (Thoms.) Schlett. — ♀ — Eur.: Suecia, Austria.
Foenus subtilis Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 847 n. 2.
Gasteruption subtile Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 316 n. 36, ♀.
Gasteruption subtile Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 425, ♀.
tarsatorium (Say) Schlett. — ♀ ♂ — Am.: Pennsylvania, Massachusetts, Tennessee.
Foenus tarsatorius Say, Keating's Narrat. Exped. II. 1824 App. p. 321.
Foenus tarsatorius Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 215.
Foenus tarsatorius Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia III. 1864 p. 133 n. 4, ♀.
Foenus tarsatorius Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 235 n. 1, ♀ ♂.
Foenus tarsatorius Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 246 n. 1, ♀ ♂.
Gasteruption tarsatorium Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 314 n. 37, ♀.
Gasteruption tarsatorium Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 326.
Gasteruption tarsatorium Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 482, ♀; T. 22
taschenbergii D. T. — ♀ ♂ — Afr. mer. [F. 123.
Gasteruption Schlettereri Taschenberg, Berlin. entom. Zeitschr. XXXVI. 1891 p. 15 n. 1, ♀ ♂
Gasteruption Taschenbergii m. [[nec Magretti.
tenellum Schlett. — ♀ — Austr.
Gasteruption tenellum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 437, ♀.

tenuicolle Schlett. — ♀ (♂) — Am.: Mexico, Brasilia.
? Foenus gracillimus Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 258 n. 9.
Gasteruption tenuicolle Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 291 n. 22, ♀.
? Gasteruption gracillimum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 307 n. 14, ♂.
Gasteruption tenuicolle Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 471, ♀ ♂.

terminale (Westw.) Schlett. — ♀ ♂ — Austr.
Foenus terminalis Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 537, ♀.
Foenus terminalis Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 258 n. 11, ♂.
Gasteruption terminale Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 301 n. 34, ♂.
Gasteruption terminale Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 454, ♀ ♂.

terrestre (Tourn.) Schlett. — ♀ ♂ — Eur. fere tota; As.: Transcaucasia.
Foenus terrestris Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XX. 1877 Compt. rend. p. VIII, ♀ ♂.
Foenus terrestris Abeille, Bull soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 269, ♀ ♂.
Foenus jaculator Abeille, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 270, ♀ ♂.
Foenus terrestris Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 847 n. 3.
Gasteruption terrestre Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 284 n. 13, ♀.
Gasteruption terrestre Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 414, ♀ ♂.
Foenus terrestris Dominique, Bull. soc. sc. nat. Ouest de la France 1894 p. 206 n. 3, ♀ ♂.

thomsonii Schlett.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota; As. occ.
—— Rajus, Hist. nat. Insect. 1710 p. 253 n. 5.
—— Mouffet, Insect. theatr. 1634 p. 64 Fig. 121.
—— Linné, Acta Upsal. 1736 p. 124 n. 2.
—— Réaumur, Mém. hist. Insect. IV. 1738 p. ?; T. 10 F. 13 (♂), 14 & 15 (♀).
—— Linné, Acta Upsal. 1739 p. 29 n. 17, ♂.
—— Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 983.
—— Degeer, Mém. hist. Insect. I. 1752 p. ?; T. 36 F. 10.
? Ichneumon jaculator Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 565 n. 48, ♀.
? Ichneumon jaculator Brünnich, Prodr. insectol. Siaelland. 1761 p. 18.
? Ichneumon jaculator Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 406 n. 1626.
? Ichneumon spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 328 n. 16.
? Ichneumon jaculator O. F. Müller, Fauna Insect. Fridrichsdal 1764 p. 71 n. 619.
? Ichneumon jaculator Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 937 n. 52.
? Ichneumon XLII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768; T. 119 F. 5.
? Ichneumon LXXVII & LXXVIII Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 2. 1769; T. 177 F. 4 [& 5.
? Ichneumon jaculator Berkenhout, Outlin. Nat. Hist. Gr. Britain I. 1769 p. 165 n. 10.
? Ichneumon jaculator Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 340 n. 73.
? Ichneumon jaculator Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 856 n. 52.
—— Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. I. 4. 1778 p. 25; T. 36 F. 10.
Ichneumon jaculator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 435 n. 92.
Ichneumon jaculator Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 398 n. 16.
Ichneumon jaculator Fabricius, Mant. Insect. 1787 p. 268 n. 110.
Ichneumon jaculator Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 173 n. 117.
Ichneumon jaculator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2696 n. 52.
Ichneumon jaculator Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 50 n. 781.
Ichneumon jaculator Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 375; T. 39 F. 10.
Ichneumon jaculator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 194 n. 149.

---

[1]) *Hymen.*: Trypoxylon figulus (Giraud), Heriades truncorum (Linné), Osmia triden- (Giraud).

? Ichneumon jaculator Petagna, Instit. entom. I. 1792 p. 365, ♀.
? Ichneumon jaculator Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 177 n. 183.
? Ichneumon jaculator Cederhjelm, Fauna Ingric. prodr. 1798 p. 163 n. 505.
? Foenus jaculator Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 240 n. 1.
? Ichneumon jaculator Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 270 n. 2069, ♀.
? Foenus jaculator Schrökenstein, Verz. d. Halbflügler etc. 1802 p. 29 n. 96.
? Foenus jaculator Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 75 n. 1.
? Foenus jaculator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 141 n. 1.
? Ichneumon jaculator Hentsch, Epit. entom. system. 1804 p. 112, ♀. [n. 1
? Ichneumon jaculator Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p [illegible]
? Foenus jaculator Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 194 n. 1; T. 100 F. 4
? Foenus jaculator Panzer, Faun. Insect. German. VIII. 1805 P. 96 T. 16.
? Foenus jaculator Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 90.
? Foenus jaculator Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 269 n. 3799-3[illegible].
? Ichneumon jaculator Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 74 n. 781.
? Foenus jaculator Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 88, ♀ ♂; T. 7 F. 2.
? Foenus jaculator Latreille, Gen. Crust. & Insect. III. 1807 p. 253 n. 1.
? Foenus jaculator Klug, Germar: Reise n. Dalmat. II. 1817 p. 258 n. 336.
? Foenus jaculator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 148 n. 1.
? Ichneumon jaculator Thunberg, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg VIII. 1822 p. 264.
? Ichneumon jaculator Thunberg, Mém. acad. sc. St. Pétersbourg IX. 1824 p. 318.
? Foenus jaculator Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 30, ♀ ♂.
? Foenus jaculator Curtis, Brit. Entom. IX. 1832 p. 423 n. 1.
? Foenus jaculator Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 6. 1833 p. 76 n. 1, ♀ ♂.
? Foenus jaculator Nees, Hymen. Ichneum. affin. Monogr. I. 1834 p. 307 n. 1.
? Foenus jaculator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª IV. 1835 p. 359 n. 1.
? Foenus jaculator Oken, Allg. Naturg. V. P. 2. 1835 p. 845, ♀.
? Foenus jaculator Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 120 n. 1.
? Foenus jaculator Westwood, Trans. Entom. Soc. London I. P. 3. 1836 p. 201.
? Foenus jaculator Imhof & Labram, Insect. d. Schweiz I. 1836 T. 24 F. 1 (♂) & 2 ♀.
? Foenus jaculator Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV. 1837 p. 258 n. 357.
? Foenus jaculator Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 408 n. 1, ♀ ♂.
? Foenus jaculator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 299 n. 1.
? Foenus jaculator Westwood, Introd. mod. classif. Insect. 1840 Synops. p. 56.
? Foenus jaculator Shuckard, Entomologist 1841 p. 121 n. 1.
? Foenus jaculator Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 255 n. 1, ♀.
? Foenus Caucasicus Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 406 n. 3.
? Foenus jaculator Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3ª Insect. II. 1849 T. 110 F. 3.
? Foenus Caucasicus Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 217.
? Foenus jaculator Dumeril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 893 n. 1.
? Foenus jaculator Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 93, ♀ ♂.
? Foenus jaculator H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.
? Foenus jaculator Giraud, Ann. soc. entom. France (5) VII. 1877 p. 417.
Foenus jaculator Thomson, Opusc. entom. P. 9. 1883 p. 846 n. 1, ♀ ♂.
Gasteruption Thomsoni Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 285 n. 14, ♀.
? Gasteruption Caucasicum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 304 n. 7, ♀.
Gasteruption Thomsoni Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 417, ♀ ♂.
Gasteruption Thomsoni Kieffer, Ann. soc. entom. France 1900 p. 820.

var. **rugidorsum** (Costa) Schlett. — ♀ — Eur.: Sardinia.
Foenus rugidorsum A. Costa, Rendic. accad. sc. fis. Napoli 1885 p. 173.
Foenus rugidorsum A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. 13. 1885 p. 22, ♀.

Gasteruption rugidorsum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 325.
Gasteruption Thomsoni var. rugidorsum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 [p. 419.
horacicum (Guér.) Schlett. — ♂ — Austr.
Foenus thoracicus Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 407 n. 7, ♂.
Foenus thoracicus Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 218, ♂.
Gasteruption thoracicum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 314 n. 38, ♂.
Gasteruption thoracicum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 488, ♂.
ibiale Schlett. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; As. occ.
Gasteruption tibiale Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 286 n. 15, ♂.
Gasteruption tibiale Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 402, ♀ ♂.
ournieri Schlett. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer. [[non auct.].
Foenus jaculator Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XX. 1877 Compt. rend. p. VIII, ♀ ♂
Gasteruption Austriacum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 277 n. 2, ♀.
Gasteruption nitidum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 281 n. 9, ♂; [T. 14 F. 12.
Gasteruption Tournieri Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 287 n. 16, ♀.
Gasteruption Tournieri Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 415, ♀ ♂.
Gasteruption Tournieri Kieffer, Ann. soc. entom. France 1900 p. 820.
adulatum (Ab.) Schlett. — ♂ — Eur.: Gallia.
Foenus undulatus Abeille, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 276, ♂.
Gasteruption undulatum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 315 n. 39, ♂.
Gasteruption undulatum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 407, ♂.
agepunctatum (Costa) Schlett. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Foenus vagepunctatus A. Costa, Ann. soc. entom. Belgique XX. 1877 Compt. rend. p. XXI, ♀.
Foenus vagepunctatus Abeille, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 271, ♀ ♂.
Gasteruption vagepunctatum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 287 [n. 17, ♀.
Gasteruption vagepunctatum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 422, ♀ ♂.
alvulare Schlett. — ♀ — Austr.
Gasteruption valvulare Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 438, ♀.
riegatum Schlett. — ♀ — Austr.
Gasteruption variegatum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 302 n. 35, ♀.
Gasteruption variegatum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 453, ♀ ♂.
ripes (Westw.) Schlett. — ♂ — As.: China.
Foenus varipes Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 220, ♂. [F. 2.
Gasteruption varipes Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 289 n. 20, ♂; T. 14
Gasteruption varipes Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 434, ♂.
riolosum (Ab.) Schlett. — ♀ — Eur.: Ga (Marseille).
Foenus variolosus Abeille, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 275, ♀.
Gasteruption variolosum Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. 1885 p. 316 n. 42, ♀.
Gasteruption variolosum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 408, ♀.
potecum Schlett. — ♀ — Am.: Mexico, Brasilia.
Gasteruption Zapotecum Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 471, ♀.

LEPTOFOENUS

Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. P. 1. 1862 p. 43.
λεπτός, tenuis; Foenus, nom. propr. Hymen.

eciniformis Smith — ♀ — Am.: Panama.
Leptofoenus peleciniformis Smith, Trans. Entom. Soc. London (3) I. P. 1. 1862 p. 43, ♀.
Leptofoenus peleciniformis Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 239, ♀.

3. *Subfam.* Evaniinae

Ashmead, Smith: Insects of New Jersey 1900 p. 563.

EVANIA

Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 345 n. 108.
εὐάνιος, mitis, patiens.

Synon.: Brachygaster Leach, Edinburg Encycl. 1817 p. ?
βραχύς, brevis; γαστήρ, venter.
Hyptia Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 82.
ὕπτιος, supinus.
Ichneumon Linné & auct.
Pelecinus J. Costa.
Sphex Linné & auct.

albata Schlett. — ♂ — Am.: Columbia.
Evania albata Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 320, ♂.
albispina Cam. — ♂ — Am.: Panama. [F. 15.
Evania albispina Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57./58. 1887 Hymen. I. p. 428 n. 5, ♂; T. 17
Evania albispina Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 302, ♂.
albitarsis Cam. — ♀ — As.: India.
Evania albitarsis Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 53, ♀
albofacialis Cam. — ♂ — Am.: Panama. [T. 17 F. 17.
Evania albofascialis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57./58. 1887 Hymen. I. p. 426 n. 2, ♂;
Evania albofascialis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 290, ♂.
amazonica Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia.
Evania Amazonica Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 10, ♀; T. 1 F. 4.
Evania Amazonica Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 332, ♀.
angulata Schlett. — ♂ — Austr.
Evania angulata Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 167, ♂.
animensis Spin. — Afr.: Madagascar.
Evania animensis Spinola, Rev. zool. 1840 p. 247 n. 5.
Evania (Hyptia ?) animensis Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 247 n. 23.
Evania animensis Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 10.
Evania animensis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 145.
annulata Taschbg. — ♀ — As.: Java.
Evania annulata (Burmeister) Taschenberg, Berlin. entom. Zeitschr. XXXVI. 1891 p. 11 n. 1 ♀.
antennalis Westw. — ♂ — As.: India, Ceylon.
Evania antennalis Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 244 n. 13
Evania carinifrons Cameron, Proc. & Trans. Nat. Hist. Soc. Glasgow (2) I. P. 3. 1885/86 p. 296
Evania antennalis Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 10.
Evania antennalis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 148, ♂.
appendigaster (L.) Fabr.[1] — ♀ ♂ — Orbis terrarum.
—— Réaumur, Mém. hist. Insect. VI. 1742 p. 332; T. 31 F. 13.
—— Browne, Nat. Hist. Jamaica 1756 p. 439; T. 44 F. 6.
Ichneumon appendigaster Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 566 n. 50.
Sphex appendigaster Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 943 n. 12.
Ichneumon appendigaster Degeer, Mém. hist. Insect. III. 1773 p. 594 n. 1; T. 30 F. 14-15

---

[1]) *Orth.:* Periplaneta americana, P. orientalis, Panchlora madeirae (Schletterer).

Evania appendigaster Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 345 n. 1.
Sphex appendigaster Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 867 n. 12; T. 26 F. 6.
Ichneumon niger Göze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. III. 1780 p. 385 n. 1; T. 30 F. 14-15.
Evania appendigaster Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 442 n. 1.
Ichneumon appendigaster Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 68 n. 275.
Evania appendigaster Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 271 n. 1.
Evania appendigaster Römer, Gen. Insect. 1789 p. 58 n. 115; T. 35 F. 7.
Sphex appendigaster Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 221 n. 5; T. 8 F. 11.
Sphex (Evania) appendigaster Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2723 n. 12.
Evania appendigaster Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 56 n. 798.
Sphex appendigaster Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 301.
Evania appendigaster Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 453 n. 1.
Evania laevigata Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 453 n. 2.
Evania flavicornis Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 453 n. 3.
Evania appendigaster Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 192 n. 1.
Evania appendigaster Panzer, Faun. Insect. German. VI. 1799 P. 62 & 72 T. 12.
Evania appendigaster Lamarck, Syst. anim. s. vert. 1801 p. 267 n. 123.
Evania appendigaster Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 178 n. 1.
Evania appendigaster Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 193 n. 1; T. 101 F. 1.
Evania appendigaster Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 105.
Evania fuscipes Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2. II. 1807 p. 83 n. 798, II.
Evania appendigaster Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 83 n. 798.
Evania appendigaster Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 85, ♀ ♂; T. 7 F. 1.
Evania laevigata Latreille, Gen. Crust. & Insect. III. 1807 p. 251 n. 1.
Evania laevigata Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 147 n. 1.
Evania appendigaster Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 147 n. 2.
Evania unicolor Say, Keating's Narrat. Exped. II. 1824 App. p. 320.
Evania appendigaster Curtis, Brit. Entom. VI. 1829 p. 257 n. 1.
Evania flavicornis Curtis, Brit. Entom. VI. 1829 p. 257 n. 2.
Evania Cubae Eichwald, Zool. spec. II. 1830 p. 214.
Evania Cubae Leach, Edinburg Encycl. IX. 1830 p. 142.
Evania laevigata Leach, Edinburg Encycl. IX. 1830 p. 142.
Evania fuscipes Nees, Hymen. Ichneum. affin. Monogr. I. 1834 p. 310 n. 1, ♀.
Evania appendigaster Nees, Hymen. Ichneum. affin. Monogr. I. 1834 p. 311 n. 2.
Evania laevigata Nees, Hymen. Ichneum. affin. Monogr. I. 1834 p. 311 nota.
Evania laevigata Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª IV. 1835 p. 358 n. 1.
Evania appendigaster Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª IV. 1835 p. 358 n. 2.
Evania appendigaster Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 118 n. 1.
Evania flavicornis Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 118 n. 2.
Evania appendigaster Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 299 n. 1; T. 2 F. 2.
Evania Desjardinsii Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 299 n. 2.
Evania appendigaster Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 p. 134; Fig. 74; Synops. [p. 56.
Evania laevigata Spinola, Rev. zool. 1840 p. 246 n. 2.
Evania affinis Guillon, Ann. soc. entom. France X. 1841 p. 311 n. 1, ♂.
Evania affinis Guillon, Rev. zool. 1841 p. 322, ♂.
Evania appendigaster Shuckard, Entomologist 1841 p. 120.
Evania laevigata Guérin, Rev. zool. 1843 p. 334 n. 2.
Evania appendigaster Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 241 n. 1.
Evania laevigata Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 241 n. 2.
Evania fuscipes Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 241 n. 3.
Evania Cubae Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 242 n. 4.

Evania Desjardinsii Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 242 n. 5.
Evania affinis Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 244 n. 17.
Evania laevigata Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 405; T. 65 F. 1.
Evania appendigaster Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 405, ♂; T. 65 F. 2.
Evania Cubae Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 405, ♀ ♂; T. 65 F. 1 & 2.
Evania appendigaster Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 525; T. 44 F. 1.
Evania appendigaster Lucas, Explor. sc. Algérie. III. 1846 p. 340 n. 414. [T. 110 F. 1.
Foenus (Evania) appendigaster Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3ª Insect. II. 1849;
Evania appendigaster Lacaze-Duthiers, Ann. sc. nat. Zool. (3) XIV. 1850; T. 1 F. 14.
Evania fuscipes Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 213.
Evania laevigata Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 213.
Evania appendigaster Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 213.
Evania Desjardinsii Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 214.
Evania laevigata Lucas, Ramon: Hist. fis. Cuba VII. 1857 p. 751, ♀ ♂.
Evania laevigata Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 214.
Evania appendigaster Duméril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 894 n. 1.
Evania appendigaster Desmarest, Chenu: Encycl. hist. nat. Annelles 1860; T. 12 F. 2.
Evania laevigata Gerstaecker, Peters: Reise n. Mossambique. Zool. V. 1862 p. 520.
Evania appendigaster Disconzi, Entom. Vicent. 1865 p. 155; T. 9 F. 155.
Evania appendigaster Frauenfeld, Verh. zool. bot. Ges. Wien XVII. 1867 p. 427.
Evania appendigaster Gerstaecker, v. d. Decken: Reise in Ost-Afrika. Gliederthiere 1873
Evania appendigaster J. Costa, Fauna Salent. 1874 p. 532. [p. 362 n. 62.
Evania appendigaster Schmeltz, Verh. Ver. f. naturw. Unterhaltg. Hamburg I. 1875 p. 33.
Evania appendigaster E. K. Brandt, Über das Nervensystem 1878 p. 1-7; Fig.
Evania laevigata Smith, Philos. Trans. Roy. Soc. CLXVIII. 1879 p. 538.
Evania laevigata Blackburn & Kirby, Entom. M. Magaz. XVII. 1880 p. 89.
Evania laevigata W. F. Kirby, Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) XIII. 1884 p. 403 n. 3.
Evania appendigaster Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 10, ♀ ♂; T. 1 [F. 1, 6 & 9.
Evania appendigaster Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57./58. 1887 Hymen. I. p. 427 n. 3.
Evania appendigaster Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1888 p. 356, ♀.
Evania appendigaster Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 136, ♀ ♂; T. 6 [F. 5 & 6.
Evania appendigaster Kohl, Ann. naturh. Hofmus. Wien VII. 1892 p. 233, ♀; T. 13 F. 14 & 23.
Evania fuscipes A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) V. P. 14. 1893 p. 18 n. 186.
Evania Desjardini Bordage, Compt. rend. acad. sc. Paris CXXIII. 1896 p. 610.
Evania appendigaster Kieffer, Ann. soc. entom. France 1900 p. 818; Fig.

areolata Schlett. — ♂ — Am.: Brasilia, Columbia.
Evania areolata Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 298, ♂.

australis Schlett. — ♂ — Austr.
Evania australis Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 11, ♂.
Evania australis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 172, ♂.

azteca Schlett. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
? Evania thoracica Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 299 n. 3.
? Brachygaster xanthops Shuckard, Entomologist 1841 p. 120 n. 2.
? Evania (Brachygaster) bicolor Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 536.
? Evania (Hyptia) bicolor Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 246 n. 25.
? Evania (Hyptia) xanthops Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 247 n. 27.
? Evania dorsalis Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 214.
Evania Azteca Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 14, ♂; T. 1 F. 3.
? Evania bicolor Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 15.

? Evania xanthops Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 45 n. 50.
Evania Azteca Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57./58. 1887 Hymen. I. p. 430 n. 9.
Evania Azteca Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 327, ♀ ♂.

basalis Schlett. — ♀ — Am.: Columbia.
Evania basalis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 322, ♀.

bicolor Westw.! — Patria?
Evania (Brachygaster) bicolor Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 536.
Evania (Hyptia) bicolor Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 246 n. 25.
Evania bicolor Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 15.
Evania bicolor Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 329.

brachystylus Schlett. — ♀ — As.: Ceylon.
Evania brachystylus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 152, ♀.

calcarata Schlett. — ♂ — Am.: Brasilia, Columbia.
Evania calcarata Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 306, ♂.

cameronii Schlett. — Am.: Panama. [[non Blanchard].
Evania dorsalis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 65. 1888 Hymen. I. p. 433 n. 16; T. 17 F. 24
Evania Cameroni Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 320.

capensis Schlett. — ♂ — Afr.: Cap.
Evania Capensis Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 15, ♂.
Evania Capensis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 145, ♂.

carinulata Schlett. — ♀ ♂ — Am.: Guyana.
Evania carinulata Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 307, ♀ ♂.

chilensis Spin.! — Am.: Chile.
Evania Chilensis Spinola, Rev. zool. 1842 p. 189 n. 2.
Evania Chilensis Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 244 n. 12.
Evania Chilensis Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 552 n. 2.
Evania Chilensis Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 16.
Evania Chilensis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 311.

compressa Fabr.! — Am. mer.
Evania compressa Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 178 n. 2.
Evania compressa Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 244 n. 14.
Evania compressa Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 17.
Evania compressa Schletterer. Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 338.

concolor Taschbg. — ♂ — Am.: Neu Freiburg.
Evania concolor Taschenberg, Berlin. entom. Zeitschr. XXXVI. 1891 p. 12 n. 2, ♂.

crassa Cam. — ♂ — Am.: Panama.
Evania crassa Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 65. 1888 Hymen. I. p. 433 n. 17; T. 18 F. 2.
Evania crassa Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 330, ♂.

crassicornis Spin. — ♀ — Am.: Columbia.
Evania crassicornis Spinola, Rev. zool. 1842 p. 189 n. 3, ♀.
Evania (Hyptia) crassicornis Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 247 n. 30.
Evania crassicornis Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 17.
Evania crassicornis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 332, ♀.

cribrata Smw. — ♀ ♂ — Patria?
Evania cribrata Semenow, Bull. acad. sc. St. Pétersbourg XXXV. 1892 p. 10 n. 3, ♀ ♂.

curvicarinata Cam. — ♀ — As.: India.
Evania curvicarinata Cameron, Mem. & Proc. Manchester Soc. XLIII. 1899 P. 3. p. 51, ♀.

curvinervis Cam. — Austr.: Tahiti.
Evania curvinervis Cameron, Proc. & Trans. Nat. Hist. Soc. Glasgow (2) I. P. 3. 1885/86 p. 265.
Evania curvinervis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 179.

curvipes Taschbg. — ♂ — As.: Tucumania.
Evania curvipes Taschenberg, Berlin. entom. Zeitschr. XXXVI. 1891 p. 12 n. 3, ♂.
dimidiata Spin. — ♀ ♂ — Afr.: Aegyptus.
Evania dimidiata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 179.
? Evania Caspia Eichwald, Zool. spec. II. 1830 p. 214.
Evania dimidiata Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 439 n. I, ♀.
Evania dimidiata Spinola, Rev. zool. 1840 p. 247 n. 3.
Evania Abyssinica Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 536.
Evania Abyssinica Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 242 n. 7, ♀.
Evania dimidiata Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 243 n. 8.
? Evania Caspia Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 244 n. 16.
Evania thoracica Guérin, Rev. zool. 1844 p. 39.
Evania dimidiata Magretti, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 526 n. 2.
? Evania Caspia Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 16.
Evania dimidiata Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 17, ♀ ♂.
Evania dimidiata Magretti, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1887 p. 526.
Evania dimidiata Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 138, ♀♂; T. 6 F. 7.
dispersa Schlett. — ♂ — Am.: Columbia.
Evania dispersa Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 309, ♂.
divergens Kohl — ♂ — Afr. occ.
Evania divergens Kohl, Ann. naturh. Hofmus. Wien IX. 1894 p. 340, ♂.
dolichopus Schlett. — ♂ — As.: Ceylon.
Evania dolichopus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 151, ♂.
erythrocnemis Schlett. — ♂ — As.: New Britannia.
Evania erythrocnemis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 158, ♂.
erythrosoma Schlett. — ♀ ♂ — As.: Ceylon.
Evania erythrosoma Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 20, ♀.
Evania erythrosoma Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 149, ♀ ♂.
eximia Schlett. — ♂ — Austr.
Evania eximia Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 21, ♂.
Evania eximia Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 176, ♂.
fascialis Spin. — ♂ — Am.: Mexico.
Evania fascialis Spinola, Rev. zool. 1842 p. 188 n. 1, ♂.
Evania fascialis Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 244 n. 11.
Evania fascialis Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 21.
Evania fascialis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 298, ♂.
ferrugineus Schlett. — ♂ — Am.: Venezuela.
Evania ferruginescens Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 294, ♂.
festiva Taschbg. — ♀ — Am.: Neu Freiburg.
Evania (Hyptia) festiva Taschenberg, Berlin. entom. Zeitschr. XXXVI. 1891 p. 14 n. 6, ♀.
flagellata Schlett. — ♀ — Am.: Mexico.
Evania flagellata Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 290, ♀.
gayi Spin. — ♀ — Am.: Chile.
Evania Gayi Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 553 n. 1, ♀.
Evania Gayi Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 23.
Evania Gayi Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 325, ♀.
gemina Schlett. — ♂ — Am.: Columbia.
Evania gemina Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 296, ♂.
genalis Schlett. — ♀ — Austr.
Evania genalis Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXIV. 1886 p. 23, ♀; T. 1 F. 10.
Evania genalis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 162, ♀.

gredleri Schlett. — ♂ — Am.: Brasilia.
Evania Gredleri Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 24, ♂; T. 1 F. 5.
Evania macrostylus Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 26, ♂.
Evania Gredleri Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 318, ♂.
var. **flavescens** Schlett. — ♂ — Am.: Brasilia.
Evania flavescens Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 21, ♂; T. 1 F. 3.
Evania Gredleri var. flavescens Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 319, ♂.
guatemalensis Cam. — ♂ — Am.: Guatemala.
Evania Guatemalensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 65. 1888 Hymen. I. p. 433 n. 18, ♂.
Evania Guatemalensis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 329, ♂.
helleri Schlett. — ♂ — Austr. or.
Evania Helleri Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 26, ♂; T. 1 F. 3.
Evania Helleri Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 165, ♂.
hirsuta Taschbg. — ♀ — Am.: Brasilia.
Evania (Hyptia) hirsuta Taschenberg, Berlin. entom. Zeitschr. XXXVI. 1891 p. 14 n. 5, ♀.
humerata Schlett. — ♂ — Austr.
Evania humerata Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 173, ♂.
javanica Westw. — ♀ — As.: Java.
Evania Javanica Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 536.
Evania (Hyptia) Javanica Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 245 n. 22, ♀.
Evania Javanica Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 26.
Evania Javanica Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 155, ♀.
impressa Schlett. — ♀ ♂ — As.: Philippines; Austr. Ins.
Evania impressa Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 153, ♀ ♂.
leviusculus Spin. — ♂ — Am.: Chile, Columbia.
Evania laeviuscula Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 554 n. 3.
Evania laeviuscula Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 31.
Evania laeviuscula Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 323, ♂.
longigena Schlett. — ♀ — Austr.
Evania longigena Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 163, ♀.
lucida Schlett. — ♂ — Austr.
Evania lucida Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 175, ♂.
magrettii Schlett. — ♂ — As.: Celebes.
Evania Magrettii Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 160, ♂.
marginata Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [T. 17 F. 21.
Evania marginata Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57./58. 1887 Hymen. I. p. 430 n. 10, ♀;
Evania marginata Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 307, ♀.
maximiliani Schlett. — ♂ — Am.: Mexico.
Evania Maximiliani Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 28, ♂.
Evania Maximiliani Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57./58. 1887 Hymen. I. p. 428 n. 6.
Evania Maximiliani Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 293, ♂.
mediana Schlett. — ♂ — As.: New Britannia.
Evania mediana Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 157, ♂.
minor Schlett. — ♂ — Am.: Brasilia.
Evania minor Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 29, ♂.
Evania minor Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 315, ♂.
minuta Ol.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Evania minuta Olivier, Encycl. méthod. Insect. VI. 1791 p. 453 n. 4.
Evania minuta Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 194 n. 5.

---

[1]) *Orth.:* Blatta lapponica, B. germanica (Schletterer).

Evania minuta Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. I. 1799 p. 20; T. 4 F. 9.
Ichneumon minutus Schrökenstein, Verz. d. Halbkäfer etc. 1802 p. 28 n. 90.
Evania minuta Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 76 n. 1.
Evania minuta Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 179 n. 4.
Evania rufipes Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 179 p. 6.
Evania minuta Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 194 n. 2.
Hyptia minuta Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2 II. 1807 p. 82.
Evania minuta Latreille, Gen. Crust. & Insect. III. 1807 p. 252.
Evania minuta Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 85, ♀.
Evania minuta Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 147 n. 3.
Evania fulvipes Curtis, Brit. Entom. VI. 1829 p. 257 n. 3; T. 257.
Evania minuta Curtis, Brit. Entom. VI. 1829 p. 257 n. 4.
Evania minuta Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 6. 1833 p. 74 n. 1, ♀ ♂.
Evania minuta Nees, Hymen. Ichneum. affin. Monogr. I. 1834 p. 342 n. 3, ♂.
Evania minuta Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª IV. 1835 p. 358 n. 3.
Brachygaster minutus Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 119 n. 1.
Brachygaster fulvipes Stephens, Illustr. Brit. Entom. Mandib. VII. 1835 p. 119 n. 2.
Evania minuta Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 299 n. 3.
Brachygaster minuta Westwood, Introd. mod. classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 56.
Evania minuta Spinola, Rev. zool. 1840 p. 247 n. 4.
Brachygaster minuta Shuckard, Entomologist 1841 p. 120 n. 1.
Brachygaster minuta Guérin, Rev. zool. 1843 p. 333.
Evania (Hyptia) minuta Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 245 n. 19.
Evania (Hyptia) rufipes Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 245 n. 20.
Evania (Hyptia) fulvipes Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 246 n. 24.
Brachygaster minutus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 527 n. 1, ♂.
Brachygaster rufipes Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 528 n. 2, ♀.
Brachygaster Servillei Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 529 n. 3, ♀.
Brachygaster minutus Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 341 n. 415.
Evania rufipes Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 214.
Evania (Hyptia) Servillei Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 216.
Evania minuta Dumeril, Mém. acad. sc. Paris. XXXI. 1860 p. 894 n. 2.
Brachygaster minuta Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 93, ♂.
Pelecinus minutus, J. Costa, Fauna Salent. 1874 p. 533.
Evania minuta Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wen XXXVI. 1886 p. 30, ♀ ♂; T. 1. F. 5.
Evania rufipes Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 36.
Evania minuta Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 143, ♀ ♂.
Evania minuta Dominique Bull. soc. sc. nat. Ouest de la France 1894 p. 196, ♀ ♂.
Evania minuta Kieffer, Ann. soc. entom. France 1900 p. 816 & 818.

mülleri Schlett. — ♀ — Austr.: New Britannia.
Evania Mülleri Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 170, ♀.

nana Schlett. — ♂ — Am.: Brasilia.
Evania nana Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 316, ♂.

nigrata Gmel.! — Eur.
Sphex spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 72 n. 381.
Sphex (Evania) nigrata Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2723 n. 21.

nigricornis Fabr.! — Am.
Evania nigricornis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 179 n. 3.
Evania nigricornis Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 244 n. 15.
Evania nigricornis Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 31.
Evania nigricornis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 338.

nitida Cam. — ♂ — Am.: Panama.
Evania nitida Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57./58. 1887 Hymen. I. p. 431 n. 12, ♂; T. 18 F. 1.
Evania nitida Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 326, ♂.

nobilis Westw.! — Am.: Brasilia.
Evania nobilis Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 215.
Evania nobilis Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 31.
Evania nobilis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 292.

ocellaria Schlett. — ♂ — Am.: Mexico, Antilles.
? Hyptia thoracica Shuckard, Entomologist 1841 p. 120 n. 2, ♂.
Evania ocellaria Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 233, ♂.
Evania ocellaria Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 334, ♂.

ornaticornis Cam. — ♀ ♂ — Am.: Panama.
Evania ornaticornis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57./58. 1887 Hymen. I. p. 429 n. 8, ♀ ♂; [T. 17 F. 20.
Evania ornaticornis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 302, ♀ ♂.

paraensis Spin. — ♂ — Am.: Brasilia.
Evania Paraensis Spinola, Mem. accad. sc. Torino (2) XIII. 1851 p. 27 n. 7, ♂.
Evania Paraensis Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 32.
Evania Paraensis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 303, ♂.

perfida Westw.! — Austr.: Tasmania.
Evania perfida Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 216.
Evania perfida Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 32.
Evania perfida Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 162.

polita Schlett. — ♀ — Am. mer.
Evania polita Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 313, ♀.

princeps Westw. — ♀ ♂ — Austr.: Woodlark.
Evania princeps Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 536, ♀ ♂.
Evania princeps Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 242 n. 6, ♀ ♂.
Evania princeps Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 32, ♀; T. 1 F. 2 & 11.
Evania princeps Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 178, ♀ ♂.

punctata Brullé — ♀ ♂ — Eur. mer.; As. occ.
Evania appendigaster Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. III. 1802 p. 329.
Evania appendigaster Latreille, Gen. Crust. & Insect. III. 1807 p. 232 n. 2.
Evania punctata Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 378 n. 833.
Evania appendigaster Spinola, Rev. zool. 1840 p. 246 n. 1, ♀ ♂.
Evania appendigaster Guérin, Rev. zool. 1843 p. 334 n. 1.
Evania punctata Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 243 n. 10.
Evania striata Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 38, ♀ ♂ [non Smith].
Evania punctata Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 140, ♀ ♂; T. 6 F. 8.

pusilla Schlett. — ♂ — Afr. occ.
Evania pusilla Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 146, ♂.

reticulata (Say) Westw.! — Am.: United States.
Brachygaster reticulata Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. P. 3. 1836 p. 223.
Evania (Hyptia) reticulata Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 246 n. 26.
Brachygaster reticulata Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 682.
Evania reticulata Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 34.
Evania reticulata Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 338.

robusta Schlett. — ♂ — Am.: Mexico.
Evania robusta Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 304, ♂.

rufa Taschbg. — ♀ — Am.: Tucumania.
Evania rufa Taschenberg, Berlin. entom. Zeitschr. XXXVI. 1891 p. 13 n. 4, ♀.

ruficaput Dew. — Am.: Porto Rico.
Evania ruficaput Dewitz, Berlin. entom. Zeitschr. XXV. 1881 p. 205; T. 5 F. 7.
Evania ruficaput Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 34.
Evania ruficaput Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 303.

ruficeps (Shuck.) Westw. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia, Venezuela.
? Evania petiolata Fabricius, Suppl entom. system. 1798 p. 242 n. 5–6.
? Evania petiolata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 179 n. 5.
? Evania pygmaea Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 180 n. 8.
? Hyptia petiolata Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2. II. 1807 p. 82.
? Hyptia petiolata Illiger, Magaz. f. Insectenk. VI. 1807 p. 192
? Hyptia petiolata Shuckard, Entomologist 1841 p. 120 n. 1.
Hyptia ruficeps Shuckard, Entomologist 1841 p. 121 n. 3, ♀ ♂.
? Evania (Hyptia) petiolata Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 245 n. 19.
? Evania Hyptia) pygmaea Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 245 n. 21.
Evania (Hyptia) ruficeps Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 247 n. 25.
? Evania petiolata Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 32.
Evania ruficeps Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 34, ♀; T. 1 F. 1.
? Evania pygmaea Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 34.
Evania ruficeps Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 336, ♀ ♂.

ruficornis Fabr.! — Am. mer.
Evania ruficornis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 179 n. 7.
Evania (Hyptia) ruficornis Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 245 n. 23.
Evania ruficornis Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXIV. 1886 p. 35.

rufipectus (Dew.) Schlett. — Am.: Porto Rico.
Hyptia rufipectus Dewitz, Berlin. entom. Zeitschr. XXV. 1881 p. 205; T. 5 F. 8.
Evania rufipectus Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI 1886 p. 35.
Evania rufipectus Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 303.

rugifrons Cam. — ♂ — Am.: Panama. [F. 19.
Evania rugifrons Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57./58. 1887 Hymen. I. p. 428 n. 7, ♂; T. 17
Evania rugifrons Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 292, ♂.

rugosa Cam. — ♀ — Am.: Guatemala. [F. 25.
Evania rugosa Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57./58. 1887 Hymen. I. p. 432 n. 15, ♀; T. 17
Evania rugosa Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 318, ♀.

scabra Schlett. — ♀ — Austr.
Evania scabra Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 168, ♀.

schlettererii Kohl — ♀ — As.: Caucasus. [T. 14 F. 19.
Evania Schlettereri Kohl, Ann. naturh. Hofmus. Wien VII. 1892 p. 231, ♀; T. 13 F. 6 & 19.

semirubra Cress. — ♀ ♂ — Am.: Cuba.
Evania semirubra Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 8, ♀ ♂.
Evania semirubra Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 36.

sericans Westw.! — Austr.
Evania sericans Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 215.
Evania sericans Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 36.
Evania sericans Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 171.

sericea Cam. — Austr.: Ins. sandwichenses.
Evania sericea Cameron, Trans. Entom. Soc. London 1883 p. 191.
Evania sericea Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 36.
Evania sericea Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 167.

servillei Guér. — ♂ — Austr.: Haiti.
Evania (Hyptia) Servillei Guérin, Revue zool. 1843 p. 335, ♂.
Evania Servillei Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 304, ♂.

signata Schlett. — ♂ — Am.: Columbia.
Evania signata Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 300, ♂.

soror Schlett. — ♀ ♂ — Am.: United States, Guyana, Brasilia.
? Evania (Hyptia) Poeyi Guérin, Rev. zool. 1843 p. 335, ♀ ♂.
? Evania (Hyptia) Poeyi Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. 7. 1851 p. 214.
? Evania Poeyi Guérin, Hist. fis. Cuba VII. 1857 p. 752, ♂; T. 18 F. 3.
? Evania Poeyi Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 33.
Evania soror Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 36, ♀.
Evania soror Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 330, ♀ ♂.

splendidula Costa — ♀ — Eur.: Dalmatia, Sardinia.
Evania splendidula A. Costa, Atti accad. sc. fis. Napoli (2) I. 9. 1884 p. 56.
Evania splendidula Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 36.
Evania Dinarica Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 231, ♀.
Evania Dinarica Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 141, ♀; T. 6 F. 5c.
Evania splendidula Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 143.

stimulata Schlett. — ♂ — Am.: Cuba.
Evania stimulata Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 335, ♂.

striata Smith — ♀ — As.: Celebes.
Evania striata Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 58 n. 1, ♀.
Evania striata Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 179, ♀.

tarsalis Schlett. — ♂ — Am.: Columbia.
Evania tarsalis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 312, ♂.

tasmanica Westw. — ♀ — Austr.: Tasmania.
Evania Tasmanica Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 536.
Evania Tasmanica Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 243 n. 9.
Evania Tasmanica Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 39.
Evania Tasmanica Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 165, ♀.

thoracica Blanch.! — Am.: Carolina.
Evania thoracica Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 299 n. 3.
Evania thoracica Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 328.

tinctipennis Cam. — ♀ — Am.: Panama, Costa Rica. [F. 16.
Evania tinctipennis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57./58. 1887 Hymen. I. p. 425 n. 1,; T. 17
Evania tinctipennis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 289, ♀.

trochanterata Cam. — ♀ — Am.: Panama. [T. 17 F. 23.
Evania trochanterata Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57./58. 1887 Hymen. I. p. 431 n. 13, ♀;
Evania trochanterica Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 311, ♀ [err.].

valdiviana (Phil.) Schlett. — Am.: Chile.
Brachygaster? Valdiviana Philippi, Stettin. entom. Zeitg. XXXII. 1871 p. 289; T. 3 F. 4 & 4a.
Evania Valdiviana Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 338.

varlicornis Cam. — ♂ — Am.: Panama. [F. 22.
Evania varicornis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57./58. 1887 Hymen. I. p. 430 n. 11, ♂; T. 17
Evania varicornis Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 294, ♂.

verrucosa Schlett. — ♂ — As.: Philippines.
Evania verrucosa Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 155, ♂.

xanthops (Shuck.) Westw. — ♂ — Am.: Brasilia.
Brachygaster xanthops Shuckard, Entomologist 1841 p. 120 n. 2, ♂. [n. 27, ♂.
Evania (Hyptia) xanthops Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 247
Evania xanthops Schletterer, Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. 1886 p. 45 n. 50, ♂.
Evania xanthops Schletterer, Ann. naturh. Hofmus. Wien IV. 1889 p. 329, ♂.

PLUMARIUS

Philippi, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 299; T. 1.
pluma.

niger Phil. — Am.: Chile.
Plumarius niger Philippi, Stettin. entom. Zeitg. XXXIV. 1873 p. 299 n. 3; T. 1 F. 2.

VII. Fam. **Pelecinidae** Hal.

PELECINUS

Latreille, Bull. soc. philom. Paris II. 1801 p. 153.
πέλεκυς, securis; *κῖνος*, nom. propr.

Synon.: Foenus Lamarck.
Ichneumon Drury & auct. ant.

brunneipes Patt. — Am.: Tennessee.
Pelecinus brunneipes Patton, Amer. Natural. 1894 p. 896.
polyturator (Drury) Romand[1]) — ♀ ♂ — Am. bor., centr. & mer.
Ichneumon polyturator Drury, Illustr. Nat. Hist. II. 1773 p. 77, ♀; T. 40 F. 4.
Ichneumon polycerator Fabricius, Gen. Insect. 1776 p. 245 n. 51-52.
Ichneumon polycerator Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 430 n. 63, ♀.
Ichneumon polycerator Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 265 n. 75, ♀.
Ichneumon polycerator Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2691 n. 141, ♀.
Ichneumon libellula Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 352, ♀; T. 36 F. 1.
Ichneumon polycerator Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 158 & 186 n. 113, ♀.
Ichneumon polycerator Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 162 n. 119, ♀.
Pelecinus polycerator Latreille, Bull. soc. philom. II. P. 44. 1799 p. 155; T. 10 F. 2.
Pelecinus polycerator Latreille, Hist. nat. Insect. III. 1802 p. 329.
Pelecinus polycerator Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 111 n. 1.
Pelecinus polycerator Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 195, ♀.
Pelecinus polycerator Latreille, Gen. Crust. & Insect. III. 1807 p. 255, ♀.
Pelecinus clavator Latreille, Dict. hist. nat. Ed. 2ª III. 1817 p. 377, ♂.
Foenus polycerator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 149 n. 2, ♀.
Pelecinus polycerator Say, Amer. Entom. I. 1824 p. 29; T. 15.
Pelecinus polycerator Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 29 n. 1, ♀.
Pelecinus clavator Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 29 n. 2, ♂.
Pelecinus tibiator Perty, Delect. anim. arctic. Brasil. 1833 p. 131, ♀; T. 26 F. 8.
Foenus polycerator Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2ª IV. 1835 p. 360 n. 2.
Pelecinus polycerator Westwood, Drury: Illustr. Nat. Hist. Ed. 2º II. 1837 p. 87, ♀; T. 40 F. 4.
Pelecinus clavator Lucas, Percheron: Dict. pitt. hist. nat. VII. 1838 p. 232.
Pelecinus polycerator Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 300 n. 1.
Pelecinus polycerator Romand, Magas. de zool. X. 1840 P. 48-49. p. 2, ♀♂; T. 48 F. 1 (♂) & 2 ♀.
Pelecinus polyturator Romand, Magas. de zool. X. 1840 P. 48-49. p. 2, ♂; T. 49 F. 1 (♂).
Pelicinus polycerator Klug, Zeitschr. f. Entom. III. 1841 p. 382 n. 1, ♀ ♂.

---

[1]) *Col.:* Aegeria acerni (Ashmead).

Pelecinus dichrous Klug, Zeitschr. f. Entom. III. 1841 p. 383 n. 2, ♀ ♂; T. 2 F. 1.
Pelecinus clavator Spinola, Rev. zool. 1841 p. 196, ♀.
Pelecinus clavator Spinola, Magas. de zool. XI. 1841 P. 93. p. 1, ♀; T. 93 F. 1.
Pelecinus polycerator Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 249 n. 1, ♀ ♂; [T. 14 F. 1 (♂).
Pelecinus tibiator Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 251.
Pelecinus dichrous Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 251 n. 2.
Pelecinus clavator Romand, Rev. zool. 1844 p. 98 n. 2, ♀ ♂.
Pelecinus dichrous Romand, Rev. zool. 1844 p. 98 n. 3, ♀ ♂.
Pelecinus polycerator Romand, Rev. zool. 1844 p. 98 n. 7, ♀ ♂.
Pelecinus polyturator Romand, Rev. zool. 1844 p. 98 n. 7b, ♂.
Pelecinus polycerator Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 405, ♀; T. 64 F. 3.
Pelecinus polycerator Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 532, ♂; T. 43 F. 5.
Foenus (Pelecinus) polycerator Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3a Insect. II. 1849; [T. 110 F. 2.
Pelecinus polycerator Lacaze-Duthiers, Ann. sc. nat. Zool. (3) XIV. 1850; T. 1 F. 7-11.
Pelecinus polycerator Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 29; T. 25.
Pelecinus polycerator Desmarest, Chenu: Encycl. hist. nat. Annelles 1860, ♂; T. 12 F. 6.
Pelecinus polycerator Provancher, Natural. Canad. X. 1878 p. 237, ♀ ♂.
Pelecinus polycerator Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 248, ♀ ♂.
Pelecinus polyturator Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 65. 1888 Hymen. I. p. 435 n. 1, ♀ ♂;
Pelecinus polycerator Woodwarth, Psyche V. 1888 p. 13. [T. 18 F. 13 (♀) & 14 (♂).
Pelecinus polyturator Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 230, ♀ ♂.
Pelecinus polyturator Forbes, Rep. Insect. Illinois XVIII. 1896 p. 124 & 134.
Pelecinus polyturator Ashmead, Proc. Entom. Soc. Washington IV. P. 3. 1899 p. 215.

var. **annulatus** Klug — ♂ — Am.: Uruguay.
Pelecinus annulatus Klug, Zeitschr. f. Entom. III. 1841 p. 384 n. 5, ♂; T. 2 F. 4.
Pelecinus annulatus Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 251 n. 6.
Pelecinus annulatus Romand, Rev. zool. 1844 p. 97 n. 1, ♂.
Pelecinus polyturator var. annulatus m.

var. **duponchelii** Rom. — ♀ ♂ — Am.: Columbia.
Pelecinus Duponchelii Romand, Rev. zool. 1841 p. 195.
Pelecinus Duponchelii Romand, Magas. de zool. XI. 1841 P. 86. p. 1, ♀ ♂; T. 86 F. 1a (♂) & [1b (♀).
Pelecinus Duponchelii Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 251 n. 7.
Pelecinus Duponchelii Romand, Rev. zool. 1844 p. 98 n. 4, ♀ ♂.
Pelecinus polyturator var. Duponchelii m.

var. **guérinii** Rom. — ♀ ♂ — Am. mer.
Pelecinus Guérinii Romand, Magas. de zool. X. 1840 P. 48-49. p. 3, ♀; F. 2.
Pelecinus Guérinii Spinola, Magas. de zool. XI. 1841 P. 93. p. 1, ♂; T. 93 F. 2.
Pelecinus Guérinii Spinola, Rev. zool. 1841 p. 197, ♂.
Pelecinus Guérinii Klug, Zeitschr. f. Entom. III. 1841 p. 385 n. 6, ♂.
Pelecinus Guérini Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 251 n. 3, ♂.
Pelecinus Guérinii Romand, Rev. zool. 1844 p. 98 n. 6, ♀ ♂.
Pelecinus polyturator var. Guérini m.

var. **rufus** Klug — Am.: Brasilia.
Pelecinus rufus Klug, Zeitschr. f. Entom. III. 1841 p. 384 n. 3, ♀ ♂; T. 2 F. 2 (♂) & 3 (♀).
Pelecinus rufus Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 251 n. 4.
Pelecinus rufus Romand, Rev. zool. 1844 p. 98 n. 8, ♀ ♂.
Pelecinus polyturator var. rufus m.

var. **spinolae** Rom. — ♂ — Am.: Columbia.
Pelecinus Spinolae Romand, Magas. de zool. XI. 1841 P. 86. p. 2, ♂; T. 86 F. 2.

Pelecinus Spinolae Romand, Rev. zool. 1841 p. 195, ♂.
Pelecinus Spinolae Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 251 n. 5
Pelecinus Spinolae Romand, Rev. zool. 1844 p. 98 n. 9, ♂.
Pelecinus polyturator var. Spinolae m.
var. **thoracicus** Klug — ♂ — Am.: Mexico.
Pelecinus thoracicus Klug, Zeitschr. f. Entom. III. 1841 p. 384 n. 4, ♂; T. 2 F. 5.
Pelecinus thoracicus Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 251 n. 5.
Pelecinus thoracicus Romand, Rev. zool. 1844 p. 98 n. 10, ♂.
Pelecinus polyturator var. thoracicus m.

MONOMACHUS

Klug, Zeitschr. f. Entom. III. 1841 p. 378.
μονομάχος, gladiator.

Synon.: Pelecinus Perty.

antipodalis Westw. — ♀ — Austr.
Monomachus antipodalis Westwood, Thesaur. entom. Oxon. 1874 p. 126, ♀; T. 24 F. 1
Monomachus antipodalis Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 225, ♀
apicalis Westw. — Am.: Brasilia. [s. descr.
Monomachus apicalis (Klug) Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 253 n. 6
eurycephalus Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia.
Monomachus eurycephalus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 221, ♀.
falcator Westw. — Am.: Brasilia. [s. descr.
Monomachus falcator (Klug) Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 254 n. 7
glaberrimus Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia.
Monomachus glaberrimus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 223, ♀.
gladiator Westw. — ♀ — Am.: Panama, Guyana, Brasilia.
? Monomachus Klugii Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 536. [F. 4
? Monomachus Klugii Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 252 n. 1, ♀; T. 14
Monomachus gladiator (Klug) Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 253 [n. 5 [s. descr.
Monomachus gladiator (Klug) Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 535 n. 2, ♀.
Monomachus gladiator Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 216, ♀.
Monomachus ruficeps Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 57./58. 1887 Hymen. I. p. 422 n. 1, ♀; [T. 18 F. 6 [non Brullé.
Monomachus gladiator Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 218, ♀.
megacephalus Schlett. — ♀ — Am.: Brasilia.
Monomachus megacephalus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 220, ♀.
pallescens Schlett. — ♂ — Am.: Columbia.
Monomachus pallescens Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 224, ♂.
ruficeps Brullé — ♀ (♂) — Am.: Brasilia.
? Monomachus lateralis Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 536, ♂.
? Monomachus lateralis (Klug) Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 252 [n. 2, ♂; T. 14 F. 3
Monomachus ruficeps Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 535 n. 1, ♀.
Monomachus ruficeps Westwood, Trans. Entom. Soc. London (2) I. P. 7. 1851 p. 216, ♀.
Monomachus ruficeps Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 216, ♀.
variegatus Schlett. — ♀ (♂) — Am.: Brasilia.
? Pelecinus fuscator Perty, Delect. anim. artic. Brasil. 1833 p. 131, ♀.
? Monomachus segmentator Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 536, ♂
? Monomachus fuscator Westwood, Ann. & Mag. Nat. Hist. VII. 1841 p. 536, ♀.

? Monomachus segmentator Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 253 [n. 3, ♂; T. 14 F. 5a, b.
? Monomachus fuscator Westwood, Trans. Entom. Soc. London III. P. 4. 1843 p. 253 n. 4, ♀.
? Pelecinus fuscator Romand, Rev. zool. 1844 p. 98 n. 5, ♂.
Monomachus variegatus Schletterer, Berlin. entom. Zeitschr. XXXIII. 1889 p. 214, ♀.

viridis Stdm. — Am.: Brasilia.
Monomachus viridis Stadelmann, Berlin. entom. Zeitschr. XXXVII. 1892 p. 237; T. 6 F. 5.

VIII. Fam. Lysiognathidae

Ashmead, Proc. Entom. Soc. Washington III. 1895 p. 277.

LYSIOGNATHA

Ashmead, Proc. Entom. Soc. Washington III. 1895 p. 263.
λύσιος, solvens; *γνᾶθος*, maxilla.

comstockii Ashm. — ♀ ♂ — Am.: New York.
Lysiognatha Comstocki Ashmead, Proc. Entom. Soc. Washington III. 1895 p. 276, ♀ ♂.

REGISTER.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.